


12-3 f. 9





E P I T O M E

GALENI PERGAME

NI OPERVM, IN QVATVOR PARTES
DIGESTA, PVLCHERRIMA METHODO VNIVER-sam illius uiri doctrinam complectens: per AND. LACVNAM
Secobiensem, Equitem auratum, & Medicum longè
excellētissimum, summa fide stu-
diòq; collecta.

CANDIDO LECTORI.

Cūm GALENI Epirome, quam nunc tibi exhibemus, amice Lector, nobis multis nominibus & doctissimis in arte Medica uiris commendaretur, nosq; diligentius re perspecta, omni laude superio-
rem eam comperissemus, statim prælo subiiciendam, atq; in rei Medicæ incrementū, longè lateq; pro-
pagandam censuimus. Cūm enim O A L S N V S medendi artem, ab Hippocrate haud satis explica-
tam, multis modis excoluerit, eamq; explicarit, ornarit, absoluerit: atq; ob illam quidem admirandam
suam doctrinam, ac sermonis fecunditatem, magno studio forum, ut par erat, exciperetur applausu.
ob prolixitatem autē immensam (quæ in tanta uiræ breuitate est incommoda) nonnulli à lectiōne ei-
us deterterentur: ANDREAS Lacuna Medicus & equestri splendore, & doctrinæ præstantia clarus,
ut ad uotum eo omnes uterentur, uniuersa uiri illius opera in exiguū quoddam corpus, uerū ite-
grum, & admodum succulentum, ea fide & diligentia contraxit, ut ex his quæ ad artem spectant, aut
quoquo modo rem Medicam iuuare possunt, prolixis tantū digressionibus, quibus prauas aduer-
sarium opiniones morosè refellit, relictis, nihil prorsus omiserit, planeq; ita adornarit, ut nō etiam
qui immensā eius autoris uolumina indefesso studio quotidie euoluunt, haud mediocrem utilitatē
sit allatura. Exemplaria porro tam latina quā græca deprauata, passim instaurauit, contulit, lapsus
omnes correxit, lucem obscuris sententijs addidit: & ut ego quōq; uerba in compendium cōseram,
succum omnem atq; medullam eliciuit, in ordinem digressit: locos deniq; cōmunes uniuersos, præci-
puasq; sententias omnes, lucis maioris grana, ad margines annotauit. Hos itaq; tanti uiri conatus,
publice utilitatis magis, quā auzæ popularis captandæ gratia susceptos, ac multis tandem uigilijs
laboribusq; perfectos, summa gratulatione prosequi, amplectiq; te decet, quō & plura, æque tuis stu-
dijs prouehendis idonea, elaborare pergat: quod certè sedulo facit, quemadmodum sub finem sui
de ponderibus ac mensuris medicinalibus libelli testatur, quem ob multiplicem pharmacorū à Ga-
leno traditorum usum, in calce operis attexit. Vale, ac frue,



123 f 1

BASILEAE

apud M. H. G. S. W. anno

1551.

AD LACUNAM.

Debemus tibi plurimum Lacuna,
 Quicunq; egregias amamus artes,
 Et Consudys Senis tenemur.
 Tu quicquid pater asserit Galenus
 Versu multiplici & laborioso,
 Paucis contrahis, explicaq; charis,
 Et suum statuis modum labori.
 Felix o ter & amplius vocandus.
 Non frustra tibi contigit Lacuna,
 In re difficili, & parum expedita,
 ἀπαιτὶ μίττω ἱμνῶν αἰσῆτας.
 Pyrrhus.

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSI

MO D. D. FRANCISCO A BOVADILLA ET MEN-

dozza, Cauriensi Episcopo, ac sanctæ Romanæ Ecclesiæ Senatori vigilantissimo,

Patrono suo, & optimo Mecænati, Andreas Lacuna Secobiensis,

Doct̃or Medicus, Miles S. Petri, S. P. D.



H Erostratum illum insolentissimū haud immerito infamant, conuicijsq̃
proscindunt literæ, Pater amplissime, quod combussit antiquissimum il-
lud ac celeberrimum Ephesiæ Dianæ delubrum: idq̃ non odio aliquo in-
deam ipsam accensus sed vt tantum memoriam sui, posteritati relinque-
ret: quæ sanè vel hodie viget, piacularis tamen, & flagitiosa, nimirum qualis fuit ille.
Siquidem si non aliud, ac certè verisimile est, nebulonem illum fuisse caduci, vilis, atque
deiecti animi: qui cum potuisset optimus institutus & artibus iuuare mortalium genus,
simulq̃ immortalem se reddere, maluerit tamen facinus tam indignum perpetrans, om-
nibus innotescere, famamq̃ sibi eam conciliare, quam præsintisset illi si consecutus nō
fuisset. Contrà verò fecerunt veteres illi patres, philosophiq̃ grauiissimi, bonorum nobis om-
nium auctores, qui ob admirandam illam sapientiam suam, strenuèq̃ in cōmunē vsum
nauatā operam, hodie celebrantur ab vniuersis, atq̃ inter diuos relati sunt. In quibus il-
li, mea quidem sententia, summa laude videntur digni, qui arti Medicæ, totius huma-
ni generis tutrici, conseruatriciq̃ summo studio incubuerunt, eamq̃ opibus & facultea-
tibus suis auxerunt, atq̃ locupletarunt: cuius porro inuentionem Græci serè vniuersi,
in deos ipsos, atq̃ illorum amicos, referunt. Tradunt quippe Aesculapium ab Apolline
patre institutum, filios suos postea Medicinā docuisse: atq̃ in hunc modum artem ipsam
cæptam diuinis auspicijs, successione quadam hereditaria, à parentibus propagatā sem-
per in liberos, ad Hippocratem vsque (qui oriundus etiam ab Aesculapio fuit) perue-
nisse. Cautum siquidem erat in illa Asclepiadarum familia, ne quis artem & indu-
striam medendi, possessionem planè diuinam, à Deoq̃ solū ipsis concessam, cuiuspiam
communem faceret, qui ab eodem non esset genere exortus. Id quod fuisse in causa
videtur, vt peritos artis illius, τῶν τε τῶν μὲν αὐτῶν, hoc est, filios Medicorum, Græci semper
vocarint: ac si fieri vilo modo nō posset, vt legitimè quispiam Medicinam proficeretur,
quam minime à genitoribus suis acceperisset. Nec perperam quidem illi, iudicio meo, sa-
cristabant: quando quidem vel optima quæq̃ instituta vilescunt, & dilabuntur, vtiq̃
sunt obnoxia adulterijs, dum citra delectum vllum ab omnibus profanantur: multoq̃
apiores ad quamcūq̃ artem capeffendam, exercendamq̃ sunt ij, qui à parentibus suis,
vnā cum generationis primordijs contraxerunt quandam veluti inclinationē, propen-
sionemq̃ in eam ipsam artem, cui postea indulerint: quā quibus natura & mens, ob
diuersam genituram, ad contraria inclinatur. Quare sepe soleo admirari, cum ad cu-
denda numismata Principes admittant tantum eos viros, qui & ingenui sunt, & indu-
strij, moribꝫq̃ integerrimis præditi: cur ad conseruandā instaurandamq̃ salutem ho-
minum (quæ quibusvis gemmis & margaritis longè preciosior est) vt deligant quidem
in: vltatissima ingenia, eūq̃ solis provinciam adeo periculosam cōmittant: abigant au-
tem illos à tam sacro & heroico munere, qui ad aurigandum vel remigandum sunt, po-
tius quam ad medendum, apiores, non sint aequè solliciti. Hoc siquidem maxime sua ipso-
rum intererat. Vt igitur ad Hippocratem redeam, ille omnium primus artem Medici-
cam rationali methodo condidit, nobisq̃ volumina octoginta reliquit, quæ in cōparabi-

lem doctrinam eius, vitæq; innocentiam, restantur. Eum postea secuti sunt Diocles Caristius, Praxagoras, Chrysippus sophista, Erasistratusq; ex filia Aristotelis genitus: qui antistites Rationalis sectæ extiterunt. Nam sub Philino Coo, eodem ferè tempore, factio Empiricorum est orta: cuius fautores fuerunt Serapion Alexandrinus, Apollonius Antiochenus, & Menodorus. Qui sanè dissidebant à Rationalibus, quòd illi quidem ratione simul & experientia vterentur ad inuestiganda præsidia, morbi ipsi congruentia: hi autem solo usu contenti essent, eorum quæ aliàs obseruauerant. Ab utroq; recesserunt ex æquo Æthodici nuncupati, causarum abdicarum indaginem (quasi Logici summo studio explorabant) respicientes: nec tribuentes quicquid experimentu particularibus, quibus nitebatur Empirici. Reducebant autè hi, ut omnes particulares affectus ad generales duos, nempe astrictum & laxum: sic vniuersas curationes ipsorum, ad duas similiter: astrictionem videlicet eorum quæ laxa essent, & relaxationem illorum quæ astricta. Auspiciis huic sectæ dedidit Themison Laodiceus: absoluit autè eam Thessalus ille Trallianus, qui pollicebatur se e doceturum artem ipsam accuratissimè, vel sex mensibus tantum. Post quos omnes tandem Galenus secutus, Æ medicinam in tot sectas diuisam, laceratq; suæ integritati atq; nitori restituit: explodens quidè omnia peruersa dogmata, quæ grassabantur suo tempore, duramq; exercebant tyrannidem: reuocans autem Hippocraticam rationem medendi, quæ iam plus quàm sexcentos annos sepulta fuerat, eamq; & explanans, & validissimis rationibus roborans. Cuius viri doctrina & methodus, ob dulcedinem insitam, atq; sublimitatem, ad eò allicit omniũ studioforum animos, ut qui semel illam gustarit, amplius abstinere ab ipsa non possit. Ceterum cum ob crebras digressiones, quas facit, dum prauas opiniones aliquantulum morose refellit, nonnulli quibus cordi est breuitas, à lectione illius deterrentur: rem non minus gratam, quam utilem vniuersis, me facturum existimaui, si omnia Galeni opera in Epitomen succinctam redigerem, excutiens quidem illa, quæ nihil succi in se haberent, colligens verò reliqua, ex quibus tota ars constaret. Quod hercle institutu meũ mirũ in modum promouit, ac veluti cõalfecit clarissimus & ornatissimus vir, amplitudinèq; euæ amantissimus, Ioannes Aquileius, Ædicus Pontificius: qui quidem quo seruet sapientiæ incredibili amore, nunquam destitit me hortari, monere, instigare, & (ut ingenuè fatear) cogere, donec ad laborem me accinxi. Quam prouinciã difficilem, ac meum humerus imparè, e quidem vix suscepissem, nisi ille institisset tanta vehemètia. Quantum verò laboris exhauserim, dum huic saxo voluendo incubo, nemo equè nouit ac tua Celsitudo, Anisisti reuerèdiss. sub cuius vmbra & auspicijs omnia fuerus elaborata. Quamquam vel ex ipsius operis mole, atq; difficultate, perpendere lectores candidi poterunt, non potuisse hunc nostrum partem in lucem edi, citra enixus atq; conatus maximos: cum nobis necessum fuerit, in primis quidè, instaurare deprauata exemplaria, tam latina, quam græca: dein ea mutuo inter se cõferre: postea lapsus omnes corrigere, lucemq; obducere sententijs addere: demũ succum omnè atq; medullam elicere, eamq; digerere in ordinè: ac deniq; vniuersos locos cõmunes, præcipuasq; sententias, ad margines annotare. Quòd si addidero, quoties mihi opus fuerit eadem ipsa relegere, examinare, & transcribere, priusquàm traderentur prælo, nec modum nec finè fecero. Perpetuò autè summa cū religione curauimus, ne aut aliquid infereremus huic operi, quod Galeni nõ esset: aut ex doctrina illius quippiã relinqueremus, quod pertinere videretur ad artem.

Iam verò præcipua loca quæ restituenda censuimus, asterisco annotauimus, quo videlicet Lector admonitus possit, si quædo vellet, codices graecos consulere, iudiciūq; suū interponere. Ex annotationibus margini appositis, quæ esse vice scholiū possunt, conflauimus copiosissimū Indicem, ut omnium rerum & sententiā, quæ præcipue in Galeno habetur, lectori ad manū largæ semper copia suppetere. Porro vniuersum opus in quatuor sectiones siue classes, digessimus: quarum prima quidem continet ea omnia, quæ ad artium constitutionē, humaniq; corporis fabricam atq; compositionem pertinent. Secunda autem, quæ tum ad sanitatem tuendam, tum ad morborum cognitionem spectant. Tertia verò, omnes differentiās morborum, generalemq; medendi methodum, ambit. Quarta deniq; vendicat sibi historiam omnium medicamentorum simplicium, atque compositorū. Harum autē nostrarū lucubrationū eam partem consecrare T. C. statui, quæ ut lectu iucundissima est, sic in se veram philosophiā, adeoq; (si Galeno credendū sit) exactissimam Theologiam amplectatur: cum exercitatio meditatioq; assidua circa res naturales, ac præsertim circa nostri structuram corporis, nostrā erga Deum fidem, propensionemq; multum adaugeat, ac veluti concalsfaciat. Nam cognitū is perfecte quæ sapientia & bonitate sua fecit ille conditor noster, in maximā admirationē, commendationemq; sui, omnium animos reuocat. Tali autem admirationi, charitati, fides, atq; firmisimæ spes, euestigio succedunt. Sed ex hac etiam naturalium rerum contemplatione, cogimur aequitatem exercere & iustitiā: quandoquidem & elementa ipsa, & cæteri vniuersi partes, sibi inuicem cedere, & suum amare quæq; ordinē, æquabilitatemq; seruare geometricū, nemo tam cæcitiens est, qui nō cernat. Unde ab ambitione, possidendiq; libidine, naturalis Philosophiæ pars nos reddet alienos. Hinc etiam nō vulgarem fortitudinem comparamus contrā mortis formidinem: cum didicerimus hominē esse portunculam vix perceptibilem vniuersi, cunctaq; si genita sint, etiā corruptioni esse obnoxia.

Ut verò hanc naturalium rerum historiam dicarem T. C. eadem me causæ impulerunt, quæ iam pridem conciliarunt tibi omnium studioforū animos, Pater obseruandissimè: nempe singularis prudentia tua, rara temperantia simul & continentia, non vulgaris animi magnitudo, constantia insensu, admiranda clementia, incomparabilūq; omnium linguarum, artium, atq; disciplinarū peritia. Eo siquidem semper sapientiæ amore flagasti, ut quarū vnā tantū aut alteram, vel optimā quæq; ingeniā vix tandem post multos annos assequi mediocriter possunt, eas omnes disciplinas, non per transennā (quod aiunt) aut primoribus degustandas labris, sed consummate, integreq; tibi esse indispensandas putares. Quem feruorem ac diuinum affectum animi, adeo labore improbo, vigiliisq; immensis souisti, ut non modo tui voti compos, sed promptuarium etiam omnium Acusarum, quid dico promptuarium? imò sacratissimū quoddam templum, nobis euasisse videarū. In quo quidem, si latina, græca, atq; hebraica lingua puritatem ac proprietatem requirat quis: si artium omnium liberalium ornatu: si Iurisprudentia, Theologiāq; veluti summū apicem, vniuersas inquam has scientias & facultates reperiet absolutissimā. In quarum singulis tam feliciter es versatus, ut ex æquo omnes didicisse videarū. Quæ immortales virtutes tuæ, adeo, tanquam per gradus quosdam, se ad maximum dignitatū fastigium pari amoris vicissitudine promouerunt, ut primò quidem, dum egressus pueritiæ fines vix esses, cum maximo bonorum omnium applausu creatus fueris Gymnasiarcha celeberrima Academia Salmanticensis:

EPISTOLA DEDICATORIA.

quamita singulari prudentia tua & consilio rexisti, ut eorum qui eo in munere te
 praecefferat, gloriam prorsus oblitteraueris. Haud multò post factus es Toletanae Ecclesiae
 Archidiaconus: quae dignitas quantopere in Hispanijs illustris sit, nemo est qui viuat
 & nesciat. Nec intercesserunt multa mensium curricula, quin iam Episcopus Cauriensis
 euaderes. Quod pastori tam insigne munus, adeò pie religioseq; hactenus semper admi-
 nistrasti, ut si ceteri Ecclesiastici proceres eandem, quam tu, viam ingrederentur, non tot
 claudibus hodie afficeretur Ecclesia: non tot indies sauciaretur vulneribus: sed semper
 contra hostes suos praualeret. Postea verò PAVLVS III. Pont. max. fama tuarum
 virtutum adductus, à Deoq; ipso inspiratus, te vltro (ut solet complures alios, quos
 & pietate & doctrina ceteris antecellere intelligis) in ordinem Patrum amplissimorum
 censuit esse accersendū. Inter quos adeò splendes & fulges, ut de te cunctis raram quan-
 dam expectationem exhibeas. Nihil dicam impraesentiarum de antiquissima & nobi-
 lissima, ex qua oriundus es, Nendozarum familia: quandoquidem illa vniuerso in-
 notescit orbi: & animus nobis est persequi, non quae natura tibi, sed quae virtutes tuae
 praestiterunt. Ut autem reliqua expediam: quemadmodum ingenuissimus iste animus
 tuus Nussatum omnium delubrum atq; sacrarium est, sic ades tuae semper Academia
 quaedam hominum doctissimorum quam absolutissima existit: quos adeò semper so-
 ues, auges, cohonestasq; muneribus, ut eruditus tantum viri natus esse videaris. Quam
 sanè tibi insitam, cognatamq; in studiosos omnes benignitatem, abunde etiam sum ipse
 expertus: quippe cum me anno quadragesimo sexto supra millesimū, ex Germania re-
 deuntem, ubi primū attigi Romam, qmunificentissime exceperis, exceptumq; praecece-
 ru cura valetudinis tuae, ac postea indies magis summa liberalitate locupletaueris. Hac
 itaq; omnia adduxerunt me, ut hasce mei ingenij primitias, calore splendoris tui conse-
 ctas, ad maturitatemq; perductas, Tua Celsitudini offerrem. Tua igitur partes erunt,
 Pater amplissime, eorum meditationes contra maledicorum morsus defendere, quos in
 tutelam tuam recepisti qbenignissimè. Vale. Venetijs, ex adibus illu-

strissimi D. D. Ioannis Furtadi à Nendoza, in hac in-
 signi Republica Caesarei Oratoris cir-
 cumspectissimi.

XV. Calend. Maias, M. D. XLVIII.

**ELENCHVS LI-
BRORVM GALENI, QVI IN**
*quasq; sectione habentur, cum eorundem Interpretibus,
quorum versiones, dum Epitomen condere-
mus, sequuti sumus.*

PRIMAE SECTIONIS LIBRI.



Xhortatio ad artium libera-
lium studia, Erasmo Rot.
interprete. col. 1
De optimo docēdi genere,
lib. 1. eodem Erasmo interprete. 3
Quod optimus medicus idē sit & phi-
losophus, lib. 1. eod. interp. 4
De sectis ad eos qui introducunt, lib. 1
Augustino Ricco Luc. interp. 5
De optima secta ad Thrasybulū, lib. 1.
Iunio P. Cracouiensi interp. 9
De constitutione artis Medicæ, lib. 1.
Victore Trincauelio interprete. 20
De partibus artis Medicæ, lib. 1. Victo-
re Trincauelio interprete. 31
De elemētis, lib. 1. Victore Trincae-
lio interprete. 33
De temperamentis, lib. 111. Thoma Li-
nacro interprete. 39
De inæquali intemperie, lib. 1. Thoma
Linacro interprete. 61
De optima corporis cōstitutione, lib. 1
Augustino Ricco interprete. 65
De optimo corporis habitu, lib. 1. Au-
gustino Ricco interprete. 67
De animi morum & corporei tempera-
menti mutua cōsecutione, lib. 1. Ioan-
ne Paul. Crass. interprete. 68
De naturalibus facultatib. lib. 111. Tho-
ma Linacro interprete. 73
De naturalium facultatum substantia,
lib. 1. Victore Trincauelio interpre-
te. 89
An sanguis in arterijs natura continea-
tur, lib. 1. Victore Trincauelio inter-
prete. 90
De motu muscutorum, lib. 11. Nicolao
Leonicensio interprete. 91
De uteri dissectione, lib. 1. Iano Corna-
rio interprete. 103
De semine, lib. 11. Iano Cornario inter-
prete. 106
De fœtū formatione, lib. 1. Iano Cor-
nario interprete. 121
De septimestri part. liber 1. Augusti-
no Ricco interprete. 126
De instrumento olfactus, lib. 1. Victo-

re Trincauelio interprete. 128
De ossibus ad tyrones, lib. 1. Ferdinan-
do Balamio interprete. 131
De dissectione uenarum & arteriarum
lib. 1. Antonio Fortolo interp. 141
De neruorum dissectione, lib. 1. Anto-
nio Fortolo interprete. 149
De anatomicis administrationibus, li-
bri 1 X. Ioanne Guinterio Anderna-
co interprete. 151
De usupartium humani corporis, libri
X VII. Nicolao Regio interprete.
col. 194
De placitis Hippocratis & Platonis,
lib. 1 X. Ioanne Guinterio Anderna-
co interprete. 311

SECUNDÆ SECTIONIS LIBRI.

Num ratio tuendæ sanitatis, ad medi-
cinalem, an ad exercitatoriam spe-
ctet, Iunio Paul. Pat. interprete. 359
De exercitio paruæ sphaeræ, lib. 1. Ioan-
ne Fichardo interprete. 365
De alimentorum facultatibus, lib. 111.
Martino Gregorio interprete. 368
De euchymia & caco-chymia, lib. 1. Fer-
dinando Balamio interprete. 404
De attenuatē uicūs ratione, lib. 1. Mar-
tino Gregorio interprete. 413
De cognoscendis curandisq; animi af-
fectibus, lib. 1. Bernardino Donato
interprete. 419
De consuetudine, lib. 1. ex ueteri trala-
tione restitutus. 426
De sanitate tuenda, lib. VI. Thoma Li-
nacro interprete. 428
De usu respirationis, lib. 1. Iano Cor-
nario interprete. 434
De causis respirationis, lib. 1. Iano Cor-
nario interprete. 438
De difficili respiratione, libri 111. Iano
Cornario interprete. 439
De pulsū usu, lib. 1. Thoma Linacro
interprete. 505
Introductio in pulsus, Martino Grego-
rio interprete. 510
De differentijs pulsuum, lib. 1111. Her-
manno Cruferio interprete. 519
De dignotione pulsuum, lib. 1111. Her-
manno Cruferio interprete. 538
De causis pulsuum, lib. 1111. Herman-
no Cruferio interprete. 551
De præcognitione ex pulsib. lib. 1111.
Hermanno Cruferio interprete. 579

De diebus decretorijs, lib. 111. Ioanne Guinterio Andernaco interp. 607
De crisibus, lib. 111. Nicolao Leonice no interprete. 622
De præcognitione, lib. 1. Leonardo la chino interprete. 645
De præfagio ex infomnijs sumendo. col. 652
Quomodo morbu simulantes sint coarguendi, lib. 1. Ioan. Ficardo interprete. 652

TERTIAE SECTIONIS LIBRI.

De differentijs morboru, lib. 1. Guilielmo Copo Basiliensi, & Thoma Linacro interpretibus. 657
De causis morborum, lib. 1. Guil. Copo, & Thoma Linacro interp. 660
De symptomatu differentijs, lib. 1. Guilielmo Copo, & Thoma Linacro interpretibus. 664
De symptomatum causis, lib. 111. Guilielmo Copo, & Thoma Linacro interpretibus. 668
De causis procatarcticis, lib. 1. ex antiqua restitutus uersione. 694
De plenitudine, lib. 1. Victore Trincauelio interprete. 696
De atra bile, lib. 1. Augustino Ricco Lucensi interprete. 702
De tumoribus præter naturã, lib. 1. Augustino Ricco interprete. 705
De tremore, palpitatione, cõuulsione & rigore, liber 1. Dominico Montefauo interprete. 710
De morborum temporibus, lib. 1. Ioanne Guinterio Andernaco interprete. 716
De totius morbi temporibus, lib. 1. Ioanne Guinterio Andernaco interprete. 719
De locis affectis, lib. vi. Guilielmo Copo Basiliensi interprete. 722
De differentijs febrium, lib. 11. Nicolao Leoniceno interprete. 780
De Marasmo, lib. 1. Victore Trincauelio interprete. 802
Contra eos qui de typis scripseru, lib. 1. Victore Trincauelio interp. 809
De typis, lib. 1. Augustino Ricco interprete. 810

Ars medicinalis, Nicolao Leoniceno interprete. 813
De methodo medendi, lib. x 111. Thoma Linacro interprete. 840
De arte curatiua ad Glauconẽ, lib. 11. Nicolao Leoniceno interprete. 955
De uenæ sectione aduersus Erasistratu lib. 1. Iosepho Tectandro interprete. 985
De uenæ sect. aduersus Erasistratæos Romæ degentes, lib. 1. Iosepho Tectandro interprete. 987
De curandi ratione per uenæ sectionẽ, lib. 1. Theodorico Gerardo interp. 989

De hirudinibus, reuulsione, cucurbitula & scarificatione, lib. 1. Theodorico Gerardo interprete. 999
De purgantium medicamentorum facultatibus, lib. 1. Ioanne Guinterio Andernaco interprete. 1000
Quos purgare, quãdo, & qualibus medicamentis oporteat, liber 1. Ioanne Guinterio Andernaco interp. 1002
De pituita, lib. 1. Augustino Ricco interprete. 1008
Consilium puero comitiali morbo laboranti, Augustino Ricco interprete. 1004

QUARTAE SECTIONIS LIBRI.

De simplicium medicamentoru facultatibus, lib. x 1. Theodorico Gerardo interprete. 1012
De substitutis lib. 1. 1144
De compositione medicamentoru secundum genera, lib. vii. Ioan. Guinterio Andernaco interp. 1148
De compositione medicamentoru secundum partes, lib. x. Iano Cornario interprete. 1188
De theriaca ad Pisonem, lib. 1. Ioanne Guinterio Andernaco interp. 1270
De antidotis, lib. 11. Ioanne Guinterio Andernaco interprete. 1280
De ponderibus & mensuris libellus, Andrea Lacuna Secobienfi, autore. 1289
Vita Galeni, eodem autore. 1294

GALENIPER

GAMENI EXHORTATIO

AD BONAS ARTES
DISCENDAS.



Ameriti animalia bruta non habent rationem illam enunciatam, ut, sermocinamur, quia nos ipsi prædiximus, eam tamen ipsi secundum animam intelligunt, quam *inductur* vocant, hoc

est, rationem debilem, fortasse nobiscum habent omnem communem, licet alia magis, alia minus. Ceterum cum animalia omnia sint artis omnino expertia (pauci quibusdam exceptis, quibus natura magis quam instructione cōtingit uidentur artes) solus autem homo scientiam capax, quancumque artem percipiat, ac rem ea quæ subter humum, tum ea quæ supra cælos sunt, contempletur: ac denique omnium bonorum maximam, nempe philosophiam, suam sibi pararit industria, merito solus est dicitur rationalis, quod ratione ceteris omnibus antecellat. Quare longè turpissimum est, hanc ipsam rationis vim, quæ nobis inest communis cum Deo, negligentes, caducarum rerum studio teneri, ac spreis artibus, nos improbe fortune committere, quæ plerumque bonis uiris posthabitis, quorum oportebat haberi ratione, locupletari indignos, ac ne id quidem constanter, sed transire donec, pari qua dedit meritate, rursus eripiat donata. Quam deam qui infelices sequuntur, omnes infelicitate percutit.

Cōtrā uero qui Mercurio, rationis domino, omnibus artis auri, se addicit, nunquam desistuntur ab eo, sed quandoque sequuntur illum, semper eius providentia, patrocinio, & splendore fruuntur. Qui igitur pendentes ex ipsius solo nudi fortune, honestissimas artes & disciplinas, seu uirum, torati inueniunt, & cum interim equos ipsos & canes arnum exercitibus erudiant, famulum autem ignauum, nulliusque peritum artis, nullo precio dignum existimant, currente præterea & agros, & ceteras possessiones, ut quævis sit quam optime excolat, solos seipsos negligunt, abdicantque ab omni liberali instituto, ne hoc quidem intelligentes, animam habeant nec ne, an non ipsi, quamuis Crotos diuiores sint, omnium abiectissimi existunt, cōtempnissimisque famulis similes: Eiusdem farinae uidentur, qui nobilitate sui generis uendunt, atque hunc sibi placentem, erigunt cristas: quamvis non uident infelicitissimi, qui generi non respondent uos, eos magis cōtemni, quam obscuro loco natos. Siquis de imperio, qui genere sunt uehementer obicuro, hoc lucrati sunt, quod plerique nesciant, quales nam illi sint. At quon decus & claritudo generis non finit latere, quid aliud fructus ferunt ex illa nobilitate, nisi ut eorum infelicitas sit illustrior? Proinde si quis sapit, ad exercendam artem se conferat: per quam si nobilis fuerit, uidebitur genere non indignus. Sin minus, suum ipse genus nobilitabit. Sed nec ob elegantem corporis formam, quæ nisi arte fuerit excolta, priorius ad omnia est inuolatus, debemus animi uenustatem negligere, quæ tanto illa dignior

& excellentior est, quanto ipse animus corpore uidetur esse quæpiam præstantior. Oportet itaque adolefcentem suam ipsius formam ad speculum cōtemplari: qui si se conspexerit facie pulchra, aduigilandum est, ut talis sit etiam animus: existimetque uehementer absurdum, in formoso corpore animi habere deformem. Rursus, si se uiderit esse formam corporis infelicem, tanto magis illi curandum est, ut elegantem efficiat animum, quod audire possit illud Homeri:

*Est aliquis cui formam sui corpore pūa,
Sed compos formam uerbo Deus ornauit, Cyre.*

Quod autem nec ipsa Athletarum professio, quæ pollicetur maximū robur, gloriamque apud uilgus concilat, etiam composi debeat cum artibus homine libero dignis, uel hinc nobis licet colligere, quod cum uariæ sint bonorum species, quæ natura hominibus insunt, puta quæ ad animum, quæ ad corpus, & quæ ad facultates etiores spectant, nullam harū Athletæ, ne in formis quidem, agnoscunt. Squidem quod ad primam attinet, animam habeat nec ne, priorius ignorat Athletæ: tantum abest, ut illam scient esse rationis participem. Etenim cum semper maximam uim carnis, sanguinis coaceruent, habent animam suam ueluti multo immerfam cœno, ut nihil possint intelligere, uerū nō minus stupida sit, quam brutior animus. Cui autē supra modum laborent, supra modumque (ut dixi) expleantur, manifestum unguis est, eorū habitudinem maxime periculosam existere: id quod sentiens Hippoc. ait, summæ bonam habitudinem Athletarum in maximo uersam discriminare affectu bonæ Athleticam nō esse secundum naturam: meliorem autē esse habitudinem salubriorem. Quibus uerbis nō solum negatur palam eorum exercitatio nem naturalem existere, sed ne habitudinem quidem illam dignatam appellari, quod obnoxia periculo sit, facileque in diuersum mutabilis. Iam quod ad formam corporis attinet, sic illa habet res, ut nō solum exercitatio Athletica nihil ad pulchritudinem conferat, uerum etiam plurimum obstat, ob ingluuiem illam, qua distendunt, ac su præmodum ingurgitantur. At fortasse nihil quidem ex his quæ exposita sunt, sed robur sibi uen dicabunt Athletæ. Quod per deos roboratur ad quid utile? an ad agrum colendum? Perpulchre igitur uel fodere, uel metere, uel aliud quodpiam, quod ad agriculationem pertinet, possunt. Sed fortassis ad res bellicas uelint. Audi Euripidem igitur, qui laudes eorum canit, dicens:

*Nunc aduersus hostem præstabitur manus
Dyos firmetur! Nunc ne uoluntas offide,
Pelides isti hostem subueniunt patriæ.*

*Nullusque perfidit: nunc sunt huius,
Vbi cæminis firmum uis, are corpus.*

Ergo inde fortè gloriant, quod præ ceteris plurimum colligat, coaceruentque pecuniarum. Atque uidere licet omnes istos æri alieno obstrictos, non solum id temporis, quo exercent artem Athleticam, uerum etiam dum ab ea dimissi sunt. Quamquam ne id quidem præclarum est, ex arte parare diuitias, sed talem potius artem scire, quæ fructa naui, simul cum domino emaret. Ex dictis igitur euadit periculum, ob ingluuiem adole-

Animi uenustas præferenda pulchritudini corporis.

Athletarum professio.

Bonorum species tri.

Athleta omni genere bonorum fere destitutus.

Athletarum animam effectum multo demerfam cœno.

Athletarum habitudinem maxime periculosam existere.

Athleticam exercitatioem pulchritudinem obstat.

Athletarum ergo si robur inuolatus.

Athletarum omnes esse æri alieno obstrictos.

Artem quam paranda.

Bruta uisita
uocantur
inductur

Bruta effe
artium expertia.

Nemo filius
dicitur rationalis,
quod ratio
natura antecellat.

Mercurij domus
datus, cum
omnium artis auri.

Inuolatus ho
minum uisita
tas.

Imperitior uisita
licet tanta il
lustrior est, quod
to genus arum
quod clarum.

Pulchritudo ar
tem excolat,
quod inuolatus.

ut disceret, ad propriū artis finem perueniat. Proinde fieri etiā nequit, ut simul & pecunie suū dō seruamur, & exercemus artem tam sublimem, tamq̃ arduam: sed necesse est, ut qui uehementius incumbit in alterū, alterum negligat.

Medicum oportet naturalis regni dei artis lo-
strasse.

Medicum debet esse citius rem pecunie.

Medicus avarus tu qui sit.

Rationalis artis necessaria medicina.

Medicum debet esse et philosophum.

Philosophia partes, naturalis, rationalis, moralis.

Parum prope transiit, aut avari ne perisus, aut voluptatis salubritas.

Iam uerō cūm oporteat medicum varias regiones orbis lustrare, diuersas ciuitatū & locorū temperaturas, situs, & consuetudines accuratē nouisse, ut de illis possit iudiciū ferre, manifestū utiq̃ est, quod talis sit euasurus, em debere notū modō contemptorem pecunie, sed supra modū etiam industrium, atq̃ impigrū esse. At fieri non potest, ut is sit industrius & impiger, qui inebriatur, qui sese ingurgiat, quiq̃ (ut summariū dicam) pudens tantum, ac uentri obsecundat.

Qui igitur sobrietatis amator est, nec minus ueritatis amans, hic uerus medicus conuenit. Huic autē cum naturali, etiam artis rationalis discenda, exercendaq̃ est: quō sciāt, quot in uniuersum sint morbi, & quo pacto cuiusq̃ sumenda sit curationis ratio, qualisq̃ preterea sit uniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimē. Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quilibet Hippocratis artem, ut par est, exerceat? Et enim si ob dictas causas eum in logica speculatione exerceri conuenit: ut uerū impigrē perseruaret in exercitiis artis, oportet ipsum tum alpernari pecuniā, tum sobrietatē amplecti, nimirū omnes philosophiæ partes habebit, nempe eam quæ rationalis dicitur, & eam quæ naturalis: atque adeo enī cum his, eam quæ moralis. Nec enim uerendū fuerit, ne qui pecunias contemnit, ac sobrietatē suspicit, aliquid absurdū cōmittat. Nam quicquid facinorosi audent patrare homines, aut auaritiæ persuasus, aut uoluptatis fallacia patrari. Nec arbitror ulla esse opus demonstratione, ut probemus, medicis esse necessariam philosophiam ad rectē utendum arte, cūm plerūq̃ uideamus eos non medicos, sed ueneficos esse, qui pecunie studio dediti, in aliud uruntur arte, quā est inuenta. Ergo ipsi philosophiæ nauemus strenuam operam, si modū uerī sumus æmulatores Hippocratis. Quod quidem si fecerimus, nihil uetat quo minus uerā damus, non dicam illi similes, sed superiores erit illo, percipientes quidem quæ rectē ab eo sunt tradita, qui uerō restant, nostrā ipsorum industria inuenientes.

GALENI PERGAMENI de Sectis ad eos qui introducuntur, liber Vnus.



Ropositiū artis medicæ sanitas est: finis, ipsius adeptio. Quibus autē quis uel absente sanitatem recuperet, uel præsente cōseruet, medicis est necessarium cognoscere. Porro quæ absente quidem sanitatē restituant, curationes & auxilia appellant: quæ uerū præsente cōseruant, salubris uictus ratio. Hac igitur de causa, & ipsam medicinā salubriū & morbosorum scientiam esse, antiqua definitio asserit: salubria quidem uocans ea, quæ præsente sanitatē tuen-

tur, restituentēq̃ deperditā: morbosā uerō, quæ contraria his sunt. Viraq̃ igitur medicum nosse oportet. Carterū quæ ratione horum scientiā facile quis cōsequatur, nō pariter adhuc omnibus est cōsensum. Verum hi ex perentiam solam arti fians esse affirmant: alij uerō & ratio nō parū uidetur conferre. Qui igitur sola experientia ducuntur, Empirici, & memores tunc cupiunt: sicuti Dogmatici & Rationales, qui urunt ratione ad in ueniendā remedia. Atq̃ he quidem du principes sunt inter medicos sectæ: altera quidē per experientiam ad remediōrū inuentionē festinans, altera uerō per indicationē. At tum uariant, tum noxia Empirici in duas species diuidunt, quarū primā naturalem appellant, cōplectentē affectus omnes, qui in corpore citra manifestam causam oriuntur: secundam autem, artem fortuitam, quam eorū esse uolunt, quæ ca su solent homini accidere. Ipsius autē inspectio-

nis Empiricæ tres sunt species. Prima dicitur Cræcis *νυσθησις*, quasi incidentiam dicat, dum incō-

sulted ad experiendum accedimus. Secunda *αυτοεξις*, hoc est, ex proposito, nominatur, quando uel in somnijs admoniti, uel alia opinione ducti, aliquid spontē experiunt. Tertia deniq̃ dicitur *μιμησις*, dum quidam eorū quæ opem attulerunt, aut noxiā, rursus in quidē affectibus aut experimur, aut declinamus. Quæ quidem ultima species, ipsorū artem maximē cōstituisse ui-

detur. Quia uerō occurrunt ipsis Empiricis interdum affectus incogniti, uel quorū uō habent satis exploratā remediā, instrumentū quoddam commentum sunt ad inueniendā præsidia, nempe transitū ad similia, nimirū ab affectu ad affectū, à loco ad locū, sicuti ab auxilio ad auxilium. Talis itaq̃ uis est per experientiam ad artis finem. Quæ uerō ratione persequitur, corporis curandī naturam prius adduci iubet, necnon omnium causarū uires, in quas incidens corpus, uel salubritas, uel morbosus seipso efficitur. Præter istā, aeris etiā, & aquarū, & regionū naturā, & uitæ studiorū, & ciborum, & potum, & consuetudinū, oportere medicum uicissim peritum esse, Rationales contendunt, ut ægritudinū omnium causas, & medicaminū facultates inueniant, ritēq̃ tum ab affectu ipso, tum à uiribus ægotantis, necnon ab omnibus ijs, quæ recensui, possit indicationes elicere, congruentiaq̃ morbis semper accommodare remedia: semper contrarijs affectibus contraria præsidia ministrans. Carterū à quibus rei efferentis indicationē Dogmatici, ab ijsdē Empirici obseruationē eliciunt. Dogmatici siquidem interdū plus sanguinis detrahūt, ipsi rei natura & ratione ducti: Empiricus uerō, quod in alijs sic obseruauerit. In uniuersum autē, eadem in quidē affectibus remedia Dogmatici pariter & Empirici admittūt, de modo inuersionis ipsorum interitum altantes. Ex apparentibus enim accidentibus circa corpus, indicationē causæ Dogmaticis sit, per quam inueniūt. Empirici uerō institui recordatio eorū, quæ sepius eodem modo obseruata sunt. In quibus autem Dogmatici nullū habent accidens manifestū, quod causam ipsam demōstret, in his causam procatarticam nō cunctant inuocare: ut, si canis rabidus fuer-

Morbosa quæ.
Medicum quæ
nosse oportet.

Empirici sola
experientia
ducuntur.
Dogmatici &
rationali quæ

Empirici in ipso
Dogma tres spe-
cies.
νυσθησις,
αυτοεξις, &
μιμησις.

Imitatrix.

Transitus ad
similia.

Rationalium
progressus.

Medici quæ
cognoscenda sunt
secundum ratio-
nalis hæresin.

Empirici Do-
gmatici de
seruare.

Morsu rabidi
canis curatio.

Medicina finis, sanitas.
Medicina finis, sanitas
adeptio.

Curationes.

Victus ratio salubris.

Medicina quid salubris quæ.

60

rit, aut uipera, quod momordit, tunc sanè minime cicatricem statim inducunt ulcers, sed potius contrà, particulas quæ circa uulnus cõstitunt, nõnunquã mutatarum præcidit, dein uerò calidus & acerbis medicamentis uenenũ extrahunt, quod in corpus unã cum morsu est illapsum. Eadem autẽ medicamenta etiã Empirici applicant, non ipsa rei natura ad illorum inuentione perducti, quẽadmodũ Rationales, sed recordatione solũ eorum, quæ longo usu atq; experientia explorauerunt. Dogmatici porrò ipsam experientiam accusant, hi tanquã inconstantẽ, aliĩ cœu imperfectam, aliĩ ut artis omnino expertem. Rursum rationẽ Empirici, tanquam probabilem quidem, sed nõ ueram, damnant. Methodici autem (sic enim seipso nuncupauerũt, ac si nõ etiam priores dogmatici artẽ methodo pertractandam esse tradiderint) nõ uerborum cum uerũrũ sectis certare mihi uidentur, sed multa adhuc artis imutare opera: quidquid enim neq; locũ passum, neq; causam, neq; ætatem, neq; anni tempus, nec regionem, nec consuetudinẽ, nec unum ægri in spectationẽ, seu naturæ, seu habitus, cõferre quicquam ad indicationẽ auit, sed à solis affectibus, eius quod confert, indicationẽ sanè sibi esse putant. Atq; horum fane quidam, morborum omnium qui ex uicũs ratione proueniunt, aliĩ omnium simpliciter, duas esse cõmunitates, & tertiam quandam ex illis mistam, ostendere nobis conantur, adstrictiõnẽ uidelicet, fluoremq; atq; ex his tertiam dispositionẽ constarẽ. Morbum itaq; omnem, uel astrictum, uel fluentem, uel etiam ex utroq; complicatum esse contendunt. Vtilis autem indicationem, in astrictis quidem, laxationem: in fluentibus uerbo, suppresionẽ existere. At in cõplicatis affectibus, ei qui magis urget, esse occurrendum. Suam autem sectam definiunt esse cognitionem euentũ cõmunitatum, finem medicinx sequentium. Nolunt porrò dici dogmatici, quod iactauerunt se nõ indigere latentibus, quẽadmodum illi. Nec Empirici etiam se appellari panuntur, licet illi quicquidẽ circa euentũ uersentur, quodd Empirici in euentibus utantur obseruatione, ipsi uerò indicatione regantur: quodq; illi quidem, tanquam ab ignotis, ab obscuris recedant, ipsi uerò tanq; ab inuitibus, innotibusq;. Porro totam artẽ medendi ad cõ breuiem efficiunt, atq; in angustum contrahunt, ut nõ modò in peruulgatis illis sex mensibus (quibus posse doceri eam profiterentur) uerum multo eam citius uniuersam posuit quispiam ediscere: cdm iuxta eorum decreta, fat sit nobis causis uniuersis, tam procaciter, quã conuictis, neglectis, astrictos quidem affectus laxare, fluidos autem sistere, à quacunq; illi causa processerint: idq; nulla habita temporum, ætatum, regionum, aut laborantium particularum ratione. At quantopere hallucinentur illi, uel Empirici percipere possunt: qui uident planẽ, quos rabidus canis momordit, si statim ulcus ad cicatricẽ ducatur, prius non administrari remedijs, quæ ab ipsius cause procacitate in indicatione sumunt, consulsos omnes animã exhalare: seruari autẽ, quibus iuxta indicationem illius, adhibita fuerit medendi ratio. Quare neq; ipsarum causarũ,

neq; ætatum, nec temporum, nec regionum, nec deniq; affectarum particularũ indicationes negligunt: cdm experientia didicerint, nec senectute confectus, nec item admodum pueris, uel si laborent pleuritide, uenam secandam esse. Sub cane autem, & ante eam, laboriosas purgationes existere. Eos qui septentrioni subiacent, aut Aegyptũ, aut plagam meridionalem incolunt, copiosas & semel factas euacuationes, nõ ferre. Qui uerò inter hos sunt medĩ, manifestam subinde ex uenæ sectione utilitatem sentire. Quinetiam oculum phlegmone obfessum, diuersam curationem requirere, ab ea, quam inflammata auris postulat. Quippe acutũ cum oleo rosaceo instillatum, unicũ aurium inflammationi auxiliatur. Oculis autem, si quis id infundat, haud leuem noxam attulerit. Ad hęc gurgulionis instillatio, spina Aegyptiæ fructus, nec nõ scissũ et alumen, præsentanea remedia sunt: quibus tamen neq; in auribus, neque in oculis uti impune licebit. Obijciunt etiã Empirici cõtra ipsos methodicos: ubi pars quæ piam astricta est, nõ continud laxandam esse: cdm nimirum in ipsius cruris inflammatione, quæ sponte decubuit, minimẽ qui dem ante totius corporis euacuationem (cum plethora adest) laxandã sit inflammationis particula: sed refrigerantibus potius & astrigentibus medicamentis admodum cõprimendam. Vbi autẽ corpus uacuatum fuerit, tum demũ laxandam esse. Atque his quidem contrã illos argumentis utuntur Empirici. At dogmatici, quodd tum sudores, tum urinas, tum deiectiones alui, atque adeo etiam sanguinis fluxus per nares, quĩs modum naturæ excedant, in morbis cõtingat oriri utiliter, cõuellunt eorũ methico dicorũ sententiã, qui ex immo deratis fluxionibus morbos cõmuniter iudicant: nempe in fluore quidem uocant morbum, ubi humores excurrunt immodicẽ: in adstrictione autem, ubi præter naturam sistuntur: curantesq; utrunq; remedio cõtrario. Nam tametsi illæ excretiones crentẽ supprimẽdũ uolo modo nõ sint, quia per eas id quod lædit, uacuatur: Methodici tamen, qui naturalibus excretionibus ad omnia, tanquã regula, utuntur, prohibere eiusmodi accidentia conantur. Cæterũ qui methodici non in excretionibus ipsis, sed in affectionibus corporum, cõmunitates suas collocant (nomine si quidem tenus inter se omnes concordēs sunt, sed in rebus ipsis dissentiant) quo pacto eas dicere euentes sunt ausi, cdm à sensibus remouissimæ sint, nec possint nisi per signa cognosci? Quod quidem si nobis fateant, in quoniam à prius medicis discrepent, non satis noui: nec etiam qua freti ratione, sex tantum mensium curricula, se edocẽduos artẽ promittant. Quippe ad cognoscẽdũ ea quæ nostris sensus effugiunt, non uidetur mihi esse opus methico eugyia: cdm præsertim talia indaganti necessaria in primis sit anatomicẽ administratio cognitiua, ac tum naturalis scientia, tum dialectica exercitatio: ut quæ uniuscuiusq; paria propria functio sit, atq; eius usus, facile deprehendat: utq; etiam ex quibus quid concluditur, planẽ perscipiat, ne soplusmatis quandoque aut ab alijs, aut etiam à seipso fallatur. Verũm

Methodici multã artẽ immutauerunt opera.

Methodici à solis affectibus in dicatione sumunt

Methodici constitunt duas cõmunitates morborum, astrictum autem atq; fluens, ac tertiam ex his cõmixtam.

Methodicorum secta quid.

Methodici quibus distinguuntur ab Empiricis & Rationabilibus.

Methodici possidentur si totam artẽ medendi curricula mensium sex.

Pueri sensibiles; nullo pacto uenam secandam esse.

Vacuatioes eo pias qui fredi minime; quĩs facili.

Aurium inflammatio auris acutũ cum rosaceo instillatum. Oculis acutum esse periculosissimum.

Gurgulionis instillatio inflammata quæ contrans.

Empiricorũ argumenta cõtra methodicos.

Depræcationem obijciunt cõtra methodicos.

quoniam

quandoquidem & de phlegmone, & de meatibus, plurima absurda prodiderunt methodici, pauca aduersus eos dicere est animus, quæ iuventuti erudendæ nonnulli utilitatis adferent. Inflammatio est tumor præter naturam, dolorificus, tactui renitens, durus, & calidus, partem ipsam, quam antea (contrà quam illi existimant) nec riorum, nec densiorum, nec etiam duriorem efficiens: sed affluxu humoris superuacui repleta, atque ea de causa distenta. Cuius quidem curatio, euacuatio est humorum: quibus uacuata, partes laxiores redduntur. Tensio igitur, necessariò comitatur repleta: sicuti laxitas, eas, quæ euacuatz fuerint, particulas. At densitas & raritas horum neutri sunt ex necessitate annexæ: sicuti nec fluor, nec retentio. Neque enim si rarum quippiam existit, etià ex ipso quid effluere prius necesse est (quod enim si crassum & pusillum fuerit quod cõninetur: nec si densum sit, nec cessariò quodcumque cõtinebit. Nam multum & tenue, etiam per densos meatus diffuit. Præstat itaque didicisse illos, externi quod prius in particula contenti est, rarefacto co quod ipsum continet: & eo quod continetur, attenuato, copiosioris effectio, & uehementius motus, & ab ali quo exteriori attractio, uel ab aliquo interiori expulso: non autem ipsam euacuationem referre ad solam raritatem meatuum. Frequenter etiam natura ipsa impetu uehementiori insurgens, quicquid sentis sapientiacenti in corpore, expellit, exprimitque. Oculis præterea nonnunquam fluxione affligit, aut copiosiori existente quod fluit, aut etiam tenuiori effectio, aut à natura per eam partem expulso, nihil illis corporibus à natura tutali constitutione mutatis. Ex oportet quidē, si uelutis mederi affectui, tenuem fluxum crassiores reddere, copiosius uero euacuare. Opinari autem inflammationem unam affectum astrictum esse, & complicatū aliā, quemadmodum opinantur methodici, de præterea certe est iudicij. At quia ipsi, qui introduci sunt, ista sufficiūt, huius præsertim sermo non iam suum finem imponam.

GALENI PERGAMENI de optima secta ad Thrasibulum, liber unus.



Edicorū * theorematū singulorum, atque uniuersum omne theorema, in primis uerū esse debet: secundò, uti le tertio, iactis fundamentis cõsentiens. quorū si id est unum, ne theorema quidem dici meretur. Quatenus enim sub cõprehensione omne theorema cadit, eatenus uerū sit est necesse. Falsi namque cõprehensio nulla est. Quatenus autē ad finem aliquem uite cõmodum pertinet, eo uile esse affirmandū est. Quia uerò quemadmodū sub uno principe subditorum multitudine mente concipitur, sic & theorema ipsum ad ante iactum principij refertur: ob id omne theorema uerū, utile, cõsentiensque, ne cessariò dicendum. Quare si omne aliud, liquidū certē est, medica etiā theoremata his tribus esse diiudicanda. Igitur quandoquidem nec uerum ipsum, quale nam sit, nec utile, nec etiam consequens, facile aut æstimari, aut deprehendi pos-

sunt, notas horū aliquas, iudicandi instrumenta in primis tradere, precū operæ fuerit. Ipsum porro uerum, ex orationis cum rebus cõcordia æstimabitur. At rerum, aliquæ sensibus evidentes sunt, aliquæ sensibus latenti. Eui dentium rursus aliquæ per se innotescunt, ut albus aterque color: aliz ab alijs evidentiā adipiscunt, ut quæ deprehenduntur signis. Ad hæc, rerum sensui abditariū aliquæ intellectu & perspicue sunt, & diuisuntur: ut, his duo, quatuor constituitur: aliz cognoscuntur per ostensionē: ut si dixeris, quo bene uti licet, eodem & abusi. Oportet autem semper sermonem, atque omne theorema ad proposita rei speciem referre. Iam uerò iudicia de rebus sensui evidētibus atque oculis differunt. Quæcumque enim sensui evidētium rerum, per se de seipsis notitiā faciant, sensui diuiduntur: ut album & atrum. Quare illi medici iure sunt de iudicandi, qui de rebus sensui evidētibus, sententiam, non sensorij, sed sermone demonstratione conantur. At evidētium quidem sensui, non autem per se cognitorij, iudex est obseruatio. Præterea, sensui abstractarum rerum, ut plures sunt differentiz, ita & diuersa iudicandi instrumenta. Ex abstractis autē sensui, aliqua intellectu per spicua sunt: ut hoc, fieri non posse, ut idem homo Athenis simul atque in Aegypto sit. Aliqua per ostensionem agnoscuntur. De perspicuis intellectu iudicium ex cõmuni omnium hominum conceptione habetur. At quæ ostensionem percipiunt, per cõsensum ab his, quæ ab omnibus conceduntur, diiudicantur. Rursus, concessi diiudicant in plura diuisi. Aut enim ex cõsensu cum sensui apparitibus, aut cum intellectu per spicuis, aut cum demonstratione, concessum discerunt. Igitur quo modo uerum, & ad iudiciū uerū ducit, iudicari oportet, iam explicauimus. Deinceps de utili dicamus theorematum. Vile theorema, cum ad artis finem refertur, dignoscitur. Oportet autem ipsum, primū quidem cõprehendi posse: alioqui inutile theorema redditur. Deinde, ipsius apprehensionem non conuenit uulgaribus esse communem, sed artificibus propriam. Idcirco namque eos falsos esse nos dicimus, qui sensui evidentiā initiū artis existimant. Neque enim ex sensui evidētibus ars constituitur, nec per sensui evidentiā fit eius traditio: quandoquidem nemo sensui nota tradit, sed ea quæ ex sensui notis præcepta oriunt, quæ planē sensui subiecta nō sunt. Hæc igitur artis principium esse, haud ab re quippiam existimauerit: eo enim theorematum, ex evidētibus sensui natura, quod principium tradendæ ab sensui evidētibus artis euadit. Itaque sensui nota, principij inuentionis theorematū esse iure dicentur: principium uerò artis nequaquam. Nam artis principia uulgo ignota esse debent, sicuti & ipse artes illi omnes ignorat. Præterea, artis principia tradunt: evidentiā autem sensui haudquam traduntur. Theorematum namque, aut in sensui notis, aut in his quæ ex alijs percipiuntur, aut in his quæ præostensa fuerint, aut in manifestis intellectu consistunt. Quod igitur ex manifestis sensui cõsensu, aut in his quæ manifesta sunt sensui, ratione inuentū est, & uniuersum prolatum,

Verum uide
æstimatur,
rerum diffi-
cultas.

Vile theorema
quomodo digno-
scitur.

Artem non eo
sensui ex euadit
sensui.

Arts principia
uulgo esse igno-
ta. Artes uulgo esse
ignotas. Theorematum autem in
quibus consi-
stunt. Theorematum quid
dicatur.

*Theorema esse
certum firmum
atq; perpetuum
est.*

id appellatur theorema. Omne autē theorema, æternum, firmum, atq; perpetuum est. Quamobrem hallucinantur illi, qui ab ipsis theorematibus medicinam appellari existimant atrem consuetudinem: cum ab actione, & medendi opera, quæ incertum habet euentum, ea consuetudo reddatur. Cæterum quoniam uti dijudicandum esse profitebamur, si referretur ad finem, artis finem proponere iam temporalius fuerit. Artium igitur alique, ea quæ non sunt efficiunt: ut nauum structoria. Nonnullæ, quæ facta sunt, conseruant: ut nauium gubernatoria. Aliæ utrunq; præstant: ut arthriticaria. Porro in facientibus artibus, aut seruandis, unus est consequendi finis modus: ac proinde in his simplex est utilis estimatio. At in ijs quæ iuxta faciunt, & seruant, non ita facile fuerit dijudicare. Ars itaq; medica inter eas est, quæ faciunt, atq; conseruant: non ob id tamen geminis esse eius sine credere cõuenit, & quod nõ est facere, utpote sanitarum: & eam quæ est, conseruare. Siquidem ipsius artis unicū est propositū, sanitas scilicet: finisq; unus, nempe adeptio illius: quamuis modi sint ipsius adaptionis multiplices. Quippe dum submouemus aduersa & noxia, sanitatem acquirimus: dum uiuamus illa, præsentem sanitatem tuemus. Quare utile in medicina recte estimabimus, nonnunq; si ad sanitatē accedendum, nonnunq; si ad eam retinendam confert, nobiscū reputantes. Consecutionem autem ipsam dijudicare oportet ex eo, quod sublati uno, aliud necessarīo aufertur: si curi & posito, ponitur. Talia namq; consequentia, consociataq; iure putanda sunt. Neq; enim quoddam medicinale theorema uerum uileq; sit, cognoscere satis fuerit, sed nihil fecius ipsum cum alijs coherere, cõsentireq; opus est. Quandoquidem igitur omnis oratio, omnēq; theorema, tribus hisce perpendi: tres autē in medicina sectæ celebres sunt, Rationales, Empirica, Methodicæ, atq; hæc iudicandi rationibus usi, earū singulas diligentiū examinamus, ut synceræ & salutari, cæteris posthabitis, adhareamus. In primis itaque quid inter eas conueniat, & quid cuiusque sit proprium, exponere uidetur necesse. Dein autem, singulas ad examen reducere. Porro cõuenit inter illarum trium sectarū professores, quod euentia theorematibus utilia sunt, analogismus, obseruatio, historia, ad similitudinē. Præterea quoddam historiam sine iudicio nõ admittenda: quod instrumenta, & remediōrū applicandum modus ex uis finit: quod ex alijs alia deprehenduntur: quod ipsēdem præsentibus malis eadem sint faciendū: quod adfectionibus & substructionibus sanitas conseruat, atq; fugant morbi: quod ad materiam adhibendam nonnisi, experientia potēs atq; utilis est. Siquidem quæ nutrit, & quæ nõ nutrit, purgantia & letalia omnia, experientia cõperta sunt. Verum Methodici & Rationales extenus inter se conueniunt, quatenus utriq; utile percipi ex indicatione arbitrantur. Quatenus uerō ad diuersis accipit, extenus sunt discordes. Siquidem methodici ex euentibus sensui, utilia iudicari existimant. At Rationales, ab huiusmodi quidem minime, sed ab occultis, hoc est, a causis. Quæ in re etiam Empirici

Rationales suffragant. Rursum, hoc loco inter Empiricos methodicosq; conuenit, occultū ex euentibus nõ agnoscī, ex quo cõferentium indicatio oritur. Obijciunt autem Empirici & Methodici Rationales, inuicem esse rerū abditum nonniam: nihil enim abditum utile reperiri. Ad hoc Rationales Empirici quidē respondent, sensu cognita non satis esse, ut in ipsis utilia obseruatione deprehendant, cum ne ipsi quidem Empirici in omnibus sensu percipit, utantur obseruatione. Ac proinde occultis esse opus, ut a quibus cõferentium indicationes nascentur. Vt dicta etiam, quandoquidem Empirici asserunt, & in præteritis & in præsentibus obseruandum esse, cum infinita sint, tum præterita, tum præsentia, in infinitis autem obseruatione fieri nõ possit, planē eorum obseruationem ex ijs esse, quæ fieri non possunt. In Methodicos autem, sentiat peripicus cõferentium esse indicationis putantes, hæc Rationales adducunt: Sui sui nota ex seipsis percipi possunt: uulgo igitur nota erunt. Quoniam uerō & cõmunitates indicant, similis quæ iudicantibus esse indicata offerunt, uulgaribus utiq; indubitan cõmunitates: atq; ita nihil a uulgaribus, & Methodici, differetis. Quod ali affectibus uerō cõferentium indicatio non proueniat, hinc maxime licet cernere, quod eodem affectu, exempli gratia, phlegmone, occupante diferentes corporis partes, ut oculos, iecur, & gulam, nõ itum eadem ratione medendi, cum nimirū desideret diuersa. Oculo namq; inflammato, succus feruiculi, & lac multiebre cõueniunt. Gulæ autē, aut rectori, aliud quippiam: cum tamen idem semper in omnibus eidem affectui applicandum esset prædictum, si affectus ipsi cõferentia in dicarent. Non applicatur autem, affectus igitur cõferentia nõ indicant. His summariis expositis, quidnam sit ipsa indicatio, atq; etiā analogismus, & qua ratione ab illis, ne non ab obseruatione sumat utile, expedit aliquid dicere. Quemadmodū igitur sensus euentium aliqua per seipsa percipiuntur, ut album, & uigrum: nonnulla, adhibita obseruatione, ut ea quæ dignoscuntur per notas: ita & in uariis quidem per indicationem patefunt, nullusq; cogitationis ope indiget. Quare quod in apertissimis & sine cõtrouersia cõcessis reperit, id nimirū & in perceptis ex indicatione contingit. Obseruatio autē, proportionē ad ea responderet, quæ per signa & notas comprehenduntur. Verum ex analogismo iuuant ipsam percipitur, quando causi ipsa ignorantur, nullaq; obseruatio habet, sed affectus quamfissimilium ex symptomatibus est. In huiusmodi enim ab indicatione profuturum colligi nequit, cum ignoretur causa. Idcirco nulla præterea facta obseruatione, causum similitudinē inuenientes, cogimur ad similes transgredi. Analogismus itaq; per transitū ad similes fit: quo utentes, a simili ad similia transitus. Empirici uerō secus ac nos (hoc est, nullo prius iudicio adhibito) transiunt huiusmodi usurpi. Est igitur indicatio, inuanti cõprehensio, simul cum cõprehensione infestans adueniētia, sine obseruatione aut ratiocinio. Experientia uerō, est eius quod frequenter & eodem modo

*Empiricorum me
tho licentiam
rationabilis obser
uatio,
Rationales con
tra Empiricos
respondio.*

*Rationales af
fectus contra me
thodicos.*

*Indicationē con
ferentium nõ su
mus ab affectib.*

*Oculus inflama
tus, succus feruiculi
& lac multie
bre auxiliatur.*

*Affectus cõferen
tia nõ indicant.*

*Inuanti per in
dicationem pate
funt.*

*Inuanti quo pa
tienti percipiatur
ex analogismo.*

*Analogismo fe
ri per transitū
ad similia.*

Indicatio quid.

*Experientia
quid.*

*Artium finis di
uersi.*

*Medici esse esse
salutem finem
& conseruati
onem.*

*Medicina esse
propositum at
que finem tu
um.*

*Consequentia
quæ dicuntur.*

*Sectæ impliciū
tres, rationalis,
empirica, me
thodica.*

*Sectarū trium
communio.*

*Methodici extra
moniales qui cõ
ueniant diffi
cilius inter se.*

*Empirici metho
dicos, quib; in
are si sint conser
uati.*

10

30

40

50

60

*Observatio ex
experientia idi,
Analogyum
quid.*

*Empiricorum pro
pria.*

*Rationalis ob-
servatio aduer-
sus Empiricos.*

uisum est, cōprehensio, & memoria. Ceterū ob-
servatio & experientia sunt idem. Analogismus
autem est comparatio, & perceptio causarum in
uantiū, per similitudinem. At deinceps, prop-
pria cuiusq; sectæ cum exposuerimus, aduersus
singulas aliquid inducemus. Empiricorum sunt
propria, iuuantiū in concursibus observatio,
historia, diuersusq; à simili transitus. Ab ipsis ta-
men causa iure petenda est, cur non in omnibus
accidentibus, sed in certis quibusdam, se conse-
rentia obseruare fateantur: cum accidentia, qua
tenus sensui euidētia sunt, tam illa in quibus sit
obseruatio, quā cetera omnia inutilia, nulla
ex parte disideant. * Dicant igitur nobis, quid
nam accidentia utilia cōdemonstret: apparētia ne,
an occultū? Si enim apparētia dixerint, quo uti-
lia accidentia producantur, & in quibus est obser-
uandum, inferemus iterum, hoc apparētia, quan-
tenus conspicuum est, nihil ab inutilibus differ-
re accidentibus. Quod si occultum esse id quod
indicit utilia accidentia, asserim, occultā ad ac-
cidētium obseruationem cōducere, necessum
est fateant. At occultā nulla ui alia, quā ratio-
ne comprehendi queunt. Quare si occultā utilia
sint, in concursibus occultorum est obseruatio.
Et si nihil aliud quā ratio comprehendit ea, ap-
pertum iam est, absq; ratione obseruationē fieri
nō posse. Quod autē in similibus accidentiū cō-
curribus obseruatio colligi nequeat, per hęc eua-
det perspicuum. Cū enim prius oporteat ipsa
concurrentia, nō modō genere eadem, num-
mero æqualia, magnitudinēq; similia esse, sed e-
tiam idem tempus, eundemq; ordinem seruari
necessum sit (ut etiam cōstentur Empirici) si de-
beat integrā, ab solutāq; obseruatio fieri: cumq;
in omni uita, ne duobus quidē ægrotis, nedum
pluribus, omnia symptomata quæ comitantur
morbos, accedere similiter queant, clarū est hu-
iusmodi obseruationē fieri haudquā in istis
concurribus posse. Quod si duo etiam ægri nū-
la in re differentes inuenti fuerint, non ob id ta-
men cōcedenda obseruatio est: quandoquidem
ipsa in pluribus fieri debet. Porro in quibus pro-
positū utile ipsū aut inutile nos obseruemus,
iam dicamus Empiricos. Nos scilicet in solis sym-
ptomatum generibus obseruare, in quibus nec
potentia, nec tempore, nec magnitudine, nec or-
dine, nec alio quopiam est opus: ut in denuū stu-
pore: quæcūq; causæ, loci, facultatisue sym-
ptomata sunt, ea repantes utilia: quæ uerō nō
huiusmodi, seu inutilia explodentes. Ceterū si
dicant, morsum hæmorrhoi plurā symptoma-
ta comitantur, hos autem nihil in his obserua-
tis: ad hæc eis respondēbimus, non in illis sym-
ptomatis, sed in antegressā causā, nos obserua-
tionem facere: symptomata uerō ad antegressā-
rum causarum cognitionem, in quibus obserua-
tionē statuimus, expendere. Causæ nanq; igno-
rata, & facultate cursū ex indicatione carentes,
obseruationē in antegressis causis præstamus.
Etenim cū dentes stupent, minimē portulaca
obseruatur, sed affectus ab acidis acerbisq; or-
tus: qui si ex fluxione, aut uomitu, aut scēlis cer-
re stridore productus sit, nihil in portulaca præ-
sidij fuerit. Prius itaq; causam rimati, dein portu-

*Observationem
absq; ratione fieri
non posse.*

*Observationem
non posse colligi
in similibus ac-
cidentium con-
curribus.*

*Observatio de-
bet fieri in plu-
ribus.*

*Portulaca acri-
tate stupori
dantis.*

laca utemur. Iam uerō Empiricorū historiā, qua
utuntur, cum ut remedia cōtra omnes morbos
abundent, tum ut ipsa traditio sit breuior, ina-
nem omnino esse, nec confici posse, mox patefa-
ciam. Omnis enim historia, aut præsentium, aut
præteritorum est. Siquidem futurorum non hi-
storia, sed potius diuinatio est dicenda. Etenim
ipsi Empirici frequenter præteritorum historia
sunt usi: quā definiūt esse narrationem rerum
fæpius circa eadem probatarum. Cū autem o-
nia in historia enarrata uera esse affirmet, ali-
quem profectō iudicem habere debent, qui re-
ctē historiā instruat esse, djudicaret. Is cū
non adsit, aliquod djudicandæ historiæ instru-
mentum est repertiendum, quo à falsis uera di-
scerni possint. Siquidem circa unam eandemq;
rem, non solum non consentiunt medici, sed e-
tiam contraria opinantur. Quare cum ipsi fate-
ri cogantur, utile esse historiā admittere, inter-
rogandi sunt, experientia ne, an ratione, histo-
riam iudicent. Ratione quidem nequeunt, cum
ipsam exterminēt, & alio quoq; iudicare debent,
quo istorū nūmquodq; percipitur. Atqui ex-
perientia, quæ iuuant, deprehēda fuisse prædi-
cant: experientia igitur etiam iudicari ea est ne-
cessē. Quare necessariō etiam Empirici de histo-
ria per experientiam iudicium faciunt: id quod
si ita est, relinquunt, superuacū inuilem esse
historiam. At Rationalis medicus, per causam
djudicare historiā poterit: qui uia causam nan-
cisci non potest, historiæ iudicium experientie
cōmittit. Nullus autem iuuantis notitiam ha-
beri posse ex historia, non magno quis negotio
probauerit. Siquidem per quæ conclusimus in
concurribus obseruationem fieri non posse, per
eamdem efficiat, neque historiā posse consti-
tui. Neq; enim obseruationē fieri nō posse, posse
autem non obseruata describi, quisiām dixe-
rit. Vniunt autem ipso transitu ad simile Empi-
rici, nonnūq; ab auxiliis ad auxilia, nonnūq;
à locis ad locos: est cū à uirijs ad uitia. Ab auxi-
lijs quidem ad auxilia, ut quando mēspilose, uice
cotoneorū, torminosis exhibent. A locis au-
tem ad locos, ut quando ea que in musculosis
membris obseruantur, talibus etiam applice-
runt. A uirijs uerō ad uitia ita transeunt, ueluti
cū remedia ad sanguinis fluxum probata, ad
hæmorrhoi morsum accipiunt. Quomodo au-
tem intelligant ipsam similitudinem, si interro-
gare, facile ipsos cōuincet, atq; in absurditates in-
numeras præcipitabiles. Nunc uerō declarandum
superest, quo modo Rationales transiunt ad si-
mile (quem nonnulli uocant analogismū) insu-
per. Ipsorum symptomati, aliqua quidem cau-
sa, aliqua passio, locus, aliqua facultates, aliqua
ægotantes sequuntur. Hæc Rationalis omnia
distinguit, notatq; ubi obseruandum sit, nec ne.
Quod alia uerō adsint, absint? ue, non laborat,
cū nihil ad curationē conferant. Quinetis, ubi
concurrit ipse in aliqua symptomate inutili ua-
riare uidetur, haud scēlius sēdem utitur, quā si
penitus consimilis concursus adesset. Quocir-
ca utilia symptomata distinguens Rationalis ab
inutilibus (qua facultate carent Empirici, cū
secundum concursum aut absēntiam similibus

*Historia emul
esse præsentium
aut præteritorū
Futurorum non
historia, sed di-
uinationis esse.*

*Historiam iudi-
care ab Empiri-
co per experien-
tiam, & à Ra-
tionalibus per
causas.*

*Ex historia non
possit haberi in-
uante notitia.*

*Empirici quo
modo ratiocin-
trans ad si-
mile.*

*Rationales quo
passio, respectu
ad simile transi-
unt.*

symptomarū, soleant semper curationē variare) facius dissimili in multis apparente concursus, eadem medicamenta sectatur, ut in emprosthotono, opisthotono, & tetano: qui affectus diuersum cōcursum habere videntur. Intelligentes quidem copul sanguinis (si sic eueniet) in causa esse illorū affectū, musculorumq; esse uitium, atq; unum eundemq; morbum, eadem uia incedet. Nam in priorē, aut in posteriorē, aut æqualiter in utraq; partem conuelli, patientis symptoma est: quod obseruatum, nullum ad curationē momentum adfert: quemadmodum nec lachrymari. Contra nonnunquam simili apparente concursu, ubi causam animaduertit, differenti curatione utitur: ut in illis qui ob erosionem, aut fracturam, cruenta ore emittebant. Diuidens enim symptomata Rationalis, ad uelut indicantia respiciens, atq; utilia tantū ex ipsis deligens, auxilijs contra ea pugnare ualentibus utens, plerumq; diuerso apparente concursu, eodem ipse semper modo curabit: aut contra, apparente simili, diuersam curationē instituit, remedia nempe causas symptomata producentibus, contraria adhibens. Sed quomodo, dicit aliquis, utilia symptomata à uanis, ipse Rationalis distinguat? Ad indicantia propolita referendo, respōdeat. Quemadmodum autem concursus, ita & curationem rationem distinguat: atque in primis perspicuum habet, quænam curationis auxilia, symptomatis quæ à causis producta sunt, aduersantur: quæ symptomatis à loco, facultatē exortis. Sciens namq; hoc à causis symptoma nasci, à locis illud, aliud deniq; à facultate: à causa præterea, auxilijs genus indicari, à loco utendi modum, sicut à facultate mensuram, si quidem eadem causa sit, & causam prodentia signa simul enā appareant, sed nec locus fit idem, nec facultas eadem, utique idem remedijs genus accipiet, sed mensuram, & utendi rationē uariabit. Contra, si causa plane diuersa fuerit, sed locus & facultas sint idem, nō idem auxilijs genus, sed mensura, & utendi ratio seruabitur. Postquam igitur Rationalis medicus & concursus & curationis metiri est idoneus, potest secundum cōcursum similitudines, aliquas curationis partes pro suo arbitratu mutare. At Empiricus neque causam, neq; causarij, aut loci, aut facultatis proditoria rimatus symptomata, id neuriq; facere poterit: quocirca neq; ad simile transitum inter curandum ritē usurpauerit. Ostendimus itaque ea quibus Empiricorum secta insignitur, atq; informatur: nempe obseruationē, historiam, & ad simile transitum, frustratoria esse, minimeq; consistere posse. Modō superest ultima acies cum Methodicis depugnanda, quorum sane instituta sunt hæc. Cum eadem symptomata sunt, affectus autem, quibus hæc inhiænt, differunt, nō eadem medendi ratione est utendum: ut in phrenide generis astricti, atq; laxi. Rursus, si idem ad sint affectus, symptomata aut differant, eadē (inquit) curatione utemur: ut in costari, cerebri phlegmone, si utraq; sub astrictiōis genere continet. Quaiquidē igitur symptomata eadem cum sint, dissidente tamen ratione in medendo utimur, cumq; illa differūt, eodem nō

nūq; modo curamus, ideo inutilia prorsus ad curationē pronunciant esse symptomata. Cum autē sublaris affectibus, ipsa pereant symptomata: positis autem, perdurent, utiles esse affectus contendunt, ut qui hæc exponents producant, extinguant autem euanescentes. Quod autem per ea quæ methodici faciūt, cognatur utilia fieri symptomata, facile cognita est. Nam homines utcūq; infantes, siue ob fluxum, siue ob astrictiōem infantem, collocant in tenebricoso cubiculo, lucē ipsam addere ad infantem existimantes. At ueterinosos, siue astrictiōe, siue etiam fluxu laborent, loco splendido conuenerē conantur. Tenebris enim ueternū augescere putant. Cum igitur delirantes ex astrictiōe, in tenebris, quæ adaugent ipsam astrictiōem, detineant: in luce autem, ueterinosos ex fluxu, licet lux ipsa fluxum reddat magis exorbitantem, uident certē mihi affectus ipsos negligere, solāq; intueri symptomata. Sed neq; affectus conferentia indicare, ut opinant methodici, idē illis rationibus, quibus ipsi inutilia esse symptomata nutebantur probare, etiam elici poterit. Nam si idē affectus sint, causæ uerō differant, non eandem curationē admittunt. Vrine namq; pressio, unus quidem affectus est. Verū si calculus sit in causa, excindimus. Si phlegmone, cataplasma illinimus. Si uelice supra modū distenti, oricularij specillum, aut cathetera imponimus: aut egrum in genus flectentes, aphoristro extremum urinarie fistule perfricamus. At una cum est causa, licet affectus distendant, idem curandus genus admittimus. Cholera namq; & arquantus morbus, quamuis dissimiles, eadem ferme & ipsi ratione curantur. Quamobrem, quoniam sublaris causæ affectus auferunt, posite construit: item diuersæ causæ, quibus affectus sint idē, diuersam: eandem, licet affectus uariant, eandem curationem postulant, non iniuria nos & causas, & affectus, & passos locos expendimus. Et quemadmodū symptomata ipsi methodici, quoniam à diuersis affectibus eadem, & ab idē diuersa promeniunt, nihil cōmodi indicare testantur: itidem nos, à diuersis causis eisdem, ab idē diuersos gigni affectus cernentes, eos ad utilij indicationē incōmodos esse dicimus: ad curationē autē sufficere perceptionē causæ, dignonem perperam loci, necnon ipsius facultatis mensuram. Quādoquidē sit ne fluor, an astrictio, superuacaneum puto cognoscere, cum affectus nō quid agendū sit, aut quo modo, sed suam ipsorū sublationē indicet: quod ne bruta quidem ignorat. At artifices tali indicatione nō egent, sed illa scire exoptant, per quæ languores pellantur. Nam si morbi sua ipsorū remedia edocerēt, laborēstis, per quæ ad sanitatē redirent, intelligerent. Quis & ex auxilijs adhibitis non morbos, sed causas, indicare medetam, deprehenditur. Auxilia namq; non effectus, sed efficiētib; aduersantur. Itaq; non prorsus incōmoda esse symptomata, nec à morbis concludibile, sed à causis, indicari, satis amplē est ostensum. Iam uerō cum methodici medicam facultatem deueniant esse cognitionē per se euidēti cōmunituram, manifeste etiam hallucinantur, atq;

Rationalis cura
tra methodicos.

Infantes, cō-
miser colloca-
re in tenebris.
Luce augere
infantem.

Tenebris ueteri-
nos augere.

Affectus differen-
tia nō indicare

Vrine pressio,
ita uaria cura-
tionē, pro diuer-
sitate causarū.

Curationi quæ
insistunt.

Affectus suam
ipsorum subla-
tionem indica-
re solent.

Causæ morborū
inducunt.
Auxilia nō effi-
cacia sed efficien-
tia aduersan-
tur.

atq;

Causæ prius an-
alytici indicat.
Locus indicat
utendi modum.
Facies autē mensu-
ram præstare in-
dicat.

Rationalis pos-
se curare ut uia-
re ad quod
non licet Empi-
rico.

Methodicorū
dogmata.

atque conuincit possunt: quandoquidem cōmunitates ipsæ, quas uocant, neq̃ euidentur sunt, neque per se perceptibiles. Si quidem cum nō omnis densitas & retentio astrictio sit, neq̃ omnis raritas aut excretio fluoris (in pregnantibus enim retentio mēstruorū nō est astrictio: sicuti neq̃ fluoris, expulsiō illa materie inutilis, quæ in mulierculis molliori uictus ratione usq̃ externi singulis mēstribus solet) relinquatur manifestum, qui sola ipsa symptomatica respicit, cum nec fluxum, nec astrictionem deprehendere possit. Sed hæc ex alijs etiā esse djudicanda. Si quidem den sitas ipsa & raritas, nonnullis quidem ingenitæ, alijs adueniunt, & præter eorum naturam sunt: ac proinde oportet, ut aliud quippiam affectiones eas referentes, ita secundū naturā ne sint, an utioſe, iudicium ferre. Amplius, id quod immoderātū, atq̃ præter naturam est, euident non est: quandoquidem ut cognoscatur, magna est opus inquisitione, nec non collatione ad uires. Atqui cōmunitates (quod fateretur etiā methodici) præter naturam sunt, atq̃ immodica quedam, cōmunitates igitur euident non erunt. Illud etiā considerandum est, num quispiam unquam medicum acceſſerit, ipsitudine aut immodica raritate uexatus. Quod si nemo unquā cōmunitates percipit sensu, cur ipsi artem medicam desinunt esse notitiam per se euentum cōmunitatum, quas quidem inuestigare & cognoscere, Erasistratus & Hippocrates oppido quādam diuicile & laboriosum existimant: Cæterum etiā si cōmunitates ipsæ euidentur sint, nec ob id tamen eas aliquid utile indicare est fatendum, cum aliunde ipsa uera indicatio inuestigari debeat, nempe ab efficiētibus causis, quarum differentia cōmuniſſima est duplex: aliz si quidem in nostro corpore continentur, aliz accedunt extrinsecus. Verū cum ab aliqua externa causa pulsantur, minime lædi possumus, nisi alia intestina causa in corpore delitescens, impetum externi illius excipiat. Porro methodici nō duas tantum cōmunitates, sed plures etiā statuunt. Alias namq̃ in uictus ratione, alias in chirurgiæ collocant. In uictus quidem ratione, ut astrictum, & fluens, adiunctūq̃ magnitudinē, & morbi tempora quatuor, & longinquitatem, & accretionem, & intermissionem. In manuaria autem opera, quod a natura alienum est, ponūt, loco, & tempore, & pluribus alijs. Sed de nā tantum cōmunitatibus, quæ ad uictus rationē pertinent, satis fuerit impræsentiarum aliquid dicere: quas quidem introduxerunt, nihil reperientes, quod auxiliorum differentias indicaret, ut scilicet iuxta ipsarum diuersitatem, diuersimodum inuenirent medendi rationem. Quod autem magnitudo cōmunitatum non indicet magnitudinem remediōri, hanc nobis discere licet, quod in ipsis morbis curandis, noui simpliciter auxiliorum magnitudine egemus, sed huiusmodi certa magnitudine. At magnitudo cōmunitatum, non hanc huiusmodi auxilij magnitudinem, sed simpliciter magnitudinē indicat. Deinceps sequē morbi tempora utile quippiam indicare ostendemus: prius tamen aliqua de temporum differentijs tractanda sunt. Duæ igitur temporū

differentiæ apud medicos celebrantur. Aliqua enim morborum, aliqua auxiliorū dicuntur tempora. Atq̃ hinc iam manifesta curatio fiet. Causarū autē moriones, morbi esse tempora dicunt. At morionis differentie sunt quatuor: initium, incrementum, status, & declinatio. Hæc eadem sunt & temporum nomina. Auxiliorū uerō tempora, ea quæ ad ipsorum exhibitionem idonea sunt, prædicant. Sunt autem idonea, quando remedium postulantia quidem ad tempore auxilia uerō, nullum. Peritq̃ autem auxiliorum morborumq̃ tempora, non re ipsa, sed cogitatione tantum differre existimant: quod auxilij morbiq̃ tempus simul incidant, interduq̃ eodem tempore & morbus sit, & auxilij optima reperitur occasio. Hallucinantur autem non leuiter. Nam si eadem auxiliorum morborumq̃ tempora forent, nec re ipsa distaret, oporteret quocumque morbi tempore, tempus etiā auxilij adesse: nō autē quocumq̃ morbi tempore auxilia adhibemus, non eadem igitur auxiliorum morborumq̃ sunt tempora. Perungit etiam administramus remedia, cum morbus quidem non adest, sed futurus nimerit. In morbi autem uigore & impetu, auxilij cōmodum tempus uō est. Contra uerō in ipso uno declinationis tempore, plura quis auxiliorū tempora, & quidem opportunitissima accipiet. Ad hæc, morborum quatuor tempora habentur, initium, augmentum, status, & inclinatio, quæ quidem in auxilij minime repetere licebit. Quoniam morborū tempora, aliqua uniuersalia, aliqua particularia sunt. At remediōrum, generalia quidem describi possunt, particularia uerō nō item. Ex quibus liquet dō constāt, non sola cogitatione, sed re ipsa etiam, distinguui huiusmodi tempora. Actēpora quidem id quod utile est indicare, methodici hac ratione impulsu putarūt, quod tempora nō omnia ad cibi medicamentis assumptionem apta esse cernebant: cuius temporibus nōnullis hæc utiliter exhiberi, nōnullis uerō noxiæ spectarent, id ob temporū discrimina accidere arbitrabantur. Quarē ex eodem fonte & cibi proposita, & remediōrum tempora manare profitebant. Theſalumq̃ inter illos fefellerit Hippocrates, dicens: Quando morbus in summo est, tunc uictu tenuissimo utendū. Suspiciamus est quippe, ipsam naturā temporis ductum, alimentis qualitatē tunc præscriptisſe, cum tamen a tempore facultate non illic mensus fuerit, ac secundū ipsius facultatis mensurā, cibi qualitatē acceperit: id quod ex his quæ subiunxit, declarat. Coniectandū enim, inquit, an xger possit durare. Plerūq̃ enim tempora, quod a facultate requiritur, interuertūt, & ne accipiat impediat: nō nunquam autē quid faciendū sit, edocent. Cū igitur id quod aliquid postulat, eius quod postulatū propositum sit: quod uerō nos postulatū sumere impedit, propositū nequaquā dicat: utiq̃ morbi tempora non interdu postulatū sumere prohibentia, proposita minime fuerint. Neq̃ alia ratione constat dixisse Hippocratem, Inter morborum initia si quid uidetur mouendū, moue: uigentibus autē, quiescere melius est: quā quod circa ipsa principia, uires nondum infirmas esse intellexerit,

Temporū differentia duplex.

Conferunt morionis differentia sunt quatuor.

Tempora auxiliorum.

Tempora auxiliorum remediōrumq̃: non eadem esse.

In uigore morbi existerit, nō esse opportuna auxilia.

Declinatione morbi opportuna esse auxiliorum res.

Morborum tempora quatuor.

Menstruorū retentio, non est astrictio, sicuti neq̃ fluxus uerū materialis, excretio.

Cōmunitates euidentur non esse.

Conferunt differentia duplex.

Causa externa nō lædi, nisi in interna causa alij.

Tempora interdum interueniunt re quod a facultate requiritur.

sed posse eas facili inaniitiones perferre: at circa morbi statum, & inualescere causas morbosas, & uirtutem languidam effici, proferri, atque la-

Remedia omnia esse preter naturam.

Auxilia per se causa morborum carcerari non possunt, sed uirtutis motus naturae sociantur.

Facultatem non indicare remedia.

Facultas prohibere non accipitur id quod requiritur.

Cumque alimentis modicum cibum probetur.

Tempus nec quantitas nec facultas alimentum indicant.

Facultatem esse ciborum quantitatem scire.

litatem, nec quantitatem ostendere. Nam si morborum tempora ciborum quantitatem & qualitatem praeciberent, aut in sui conseruationem, aut abolitionem id facerent. Primum autem est omni ex parte ridiculum. Ex secundo uero inferitur, talem tantumque cibum, aliquid aduersus tempora contrarietate esse praedictum. A solis namque contrariis, contraria tolluntur. At temporibus nec talis, nec tantus cibus contrarius dici, cum non sub eodem genere conueniant, nec possit quod unum est, dici contrarium pluribus. Hac ad eam rationem efficitur, ut nec remedium differtentiam morborum tempora indicent. Quod autem autem principium indicare, quod augmentum prohibet, scopum autem agnoscere indicare nihil, extremum ridiculum est. Cuius erroris origo ipsi ex altera falsa opinione manauit. Credentes enim quilibet morbum transire per quatuor tempora, uersimile arbitrari sunt, ut morborum initia suppressionem incrementum indicarent. Id igitur ipsos laetari, non omnem morbum incipere, augeri, in summo consistere, ac declinare. Acuti namque morbi, qualis apoplexia est, simulatque inualescent, ad extremam ascendant magnitudinem. Et qui indicantur morbi, uno tempore, de declinatione et scilicet, mutantur. Siquidem iudicationes, in sua uehementia morbos, adhuc etiam augescerent, discuntur. Potest praeterea inter initia, remedia ab his, deleri morbus: atque ita cetera morbi tempora praecursum, succiditque contingit. Id praeterea Methodi doctorum decretum est fatuum, quod inter morborum initia astringentibus semper utendum censent. Causam uero inde placitum illud accepit, quod multae phlegmonae per astringentia, reprimuntur, inter initia definit. Cui autem quilibet secundum ipsos phlegmone, astrictione sit, absurdum plane uidetur, astrictione affectus per cohaerentiam tolli: quod se hoc nomine facere profitentur, non ut causae reprimantur, sed ut corpora firmitiora, minusque paribilia reddantur. Quibus ita responsum uelim, minime fieri posse, ut nocentibus causis simul auctis, corpora aegre paribilia reddantur. Ceterum quod inchoantibus phlegmonis, commode astringentia admoventur, ob reperculsionem humorum laedentium, non ut cohaerent robur particulare, ut illi existimant, nemo id non fatetur. Nam si ex astrictione firmitudo conciliaretur corporibus, cum rigida differentia praeparitate habentes, ualentiores bene sanis, senesque iunioribus longe uegetiores existerent. Qui igitur corporibus robur firmitudinemque coarpare student, minime qui corpus durum reddat, cogitet opus est: sed qua ratione membrorum uires augetur, quibus liberat atque expedit proprios usus exhibeant.

Contraria a se ipsa contrariis tolli.

Vnum pluribus deo citratum non posse. Morborum tempora, ad extremam differentiam non indicant.

Morbi non omnes quatuor tempora transire possunt.

Acuti morbi simulatque inualescent, ad extremam perueniunt magnitudinem. Morbi qui uoluntate, mutantur declinatione. Morbi posse in initio dici.

Phlegmonis inchoantibus, commode adhibere astringentia.

Robur quae ratione conciliatur corporibus.

GALENI PERGAMENI de Constitutione artis medicae, liber unus.



Vandoquidem diuino quodam praeditus affectu, Parophrase, mihi uideris, ut qui omnia cum demonstratione & methodo indidici desideras, nec soli eam prouincia tibi committe

re audeas, statui alacritati tuæ obsecundare, atque in tuam gratiam duos commentarios cōscribere, alterum in quo monstratur, quamlibet artem à finis notione suam habere constitutionē: alterū (quod habemus prae manibus) ubi ostendimus, methodum eam quae omnes alias artes, ipsam quoque medicinā constituisse: id quod iam nobis est exordium. Cum igitur artium ipsarū aliq̃ quidem in sola naturæ rerum contemplatione, quas sibi proposuerūt considerandas, suum habere finem, ut astrologia & physice: aliae edant praeterea nonnullas actiones, à quibus cessantes, nullum permanens opificium ostendant, ut saltatoria: aliae opificium aliquod possint ostendere, ut ars edificatoria & fabrilis: aliae denique nihil efficiant ipsae, aliquid tamen aucupari conentur, ut venatoria: manifestum utique est, autem medicā ex effectivā genere existere: habet enim aliquod opificiū, qd finita actione possit ostendere. Quare iam operam praecipuam fuent, eandem methodū, quam in ceteris factis artibus priorī cōmentario tradidimus, ad hanc, quā in praesenti cōstituerē conamur, transferre, posito hic quoque eodem principio, quod in alijs est statutum, nempe finis notione. Prima igitur quae in nobis suboritur cognitio, est hominum recte ualennum. Altera ab illa, eorundem, cum morbis implicari sunt. Vnde mox in nobis bene ualendi desiderium affurgit, artemq̃ aliquam sanatis conciliatricem constituendā. Vt autem proponi mus efficere integram ualitudinem, sic ex facti- uarum numero ars ea futura est, quam cōstitue- re nolumus. Dein, cum duplices factiuae artes sint (nonnullae quidem res ipsas conficiunt, aliae labefactas instaurant, corriguntq̃) haec quam inuestigamus, in eis potius erit, quae rem iam factam rescitunt, quam quae aliquid, quod prius non esset, edunt. Quemadmodum igitur illi qui aedificaturus, aut collapsas instauraturus est aedes, necessum est prius omnes aedii particulas, earumq̃ constitutionē accuratē nouisse: sic etiā qui artem, quae circa humanū corpus nersitur, constituturus est, illius partes omnes sigillatim necessariō debet cognoscere: quali nimirū substantia, qua magnitudine, quali figura & numero praedita sint, quamq̃ inter se structuram fortiantur. Et quemadmodum ille qui extruit domū, nunq̃ cognitionem particularum, nisi ex resolutione assequi poterit, ita nos corporis humani nōtiā, ex illius dissectione consequimur. Deus quippe & natura, instat illius qui primū aedes et fabricatur, praenouit partes, earum officia pro exemplari usū. Nos uerō illum qui extructā domum contemplatur, imitatur. Vbi autem ex dissectione ipsa, naturā, formam, magnitudinē, numerū, & concretionem partium similariū apprehenderimus, compositorum pariter mem- brorū (quae nonnunq̃ & instrumentaria uocantur) scientiā assequimur. Quo fit deinde, ut du- plices partiū actiones in corpore teperiantur, simplicium nempe, atq̃ compositarū: cum & cras uniuersum moueri, & sigillatim musculos eius omnes uideamus: cumq̃ musculo quocunque per transfertum relecto, necessum sit deperire ipsius mori aliquem cruris: uulneratūq̃ nervo,

primū quidem, musculum cui inferitur, exper- tem mori & sensus reddi, mox uerō & articu- lum qui ab eo mouebatur. Quare hanc nobis ar- tem cōstituturā, necessariū fore arbitror, etiam partium actiones cognoscere: id quod sanē ab edificatoribus nos dūtingit. Duplex igitur est, ut particularum, ita & actionū natura: una qui- dem prima, & maximē propria, dum pariter om- nes simplices partes agunt: altera uerō ex acci- denti, aut secundaria, quae tonus est infirmū. Vt, tonus quidem cruris atq̃ inaccessus est, qui fit, dum articuli illius uicissim nunc extendunt, nunc insecantur. Ipsiū porro facultatis mori- cis à cerebro descendētis, neruus ueluti uia quae- dam est. Cerebrum namq̃ efficit neruus omnibus huiusmodi facultatū originē, principium, inde per dūctas licet, quod secūto quocūq̃ neruo, in supremis partibus, quae cerebrū continentur sunt, actiones seruantur integre, cum tamen om- nes in inferioribus pereant. Inaccessus itaq̃ atq̃ est tonus cruris, cui actioni musculorum praestit genus. Ossa siquidem, cartilagine, adeps, glandu- lae, arteriae, uenae, membranae, ligamenta, à musculis habent initium moris. Primum enim ab ipsis ossa mouentur, mox cetera una cum ipsis etiam moueantur oportet. Ad quem motum necessaria sunt optima cum osium, tum etiam ligamentorū cōmoderatio, constitutiōq̃. Ac de ceterarum partium actione & usu, simili- ter differendum, ut quae optimē constitutae sunt, seruentur, quae autem uisio nō carent, ad melio- rem statum ducantur: id quod minimē nobis lice- bit, nisi uniuersūq̃ partium tum actionē, tum usum, atque adeo etiam structuram examinaue- rimus. Structuram porro cuiuspiam rei, an uti- liosa sit, an ab omni prorsus immunis uisio, ne- mo perpendere poterit, nisi si magnitudinē, nu- merum, figuram, & situm omnium partiū, ex quibus tales res constāt, optimē scrutatus prius fue- rit. Quandoquidē omniū instrumentariorū cor- porū, quae ex cōpositione suam essentia fortien- tur, tum uitū, tum integritas, affectusq̃ omnis, quatuor generibus his continet. Quod si partes unionis quoque ex natura participes sint, quinq̃ hoc genus his addendū erit corporibus: ita ut quod in ipsis se praestantissimē habuerit, sit opni- mas habiturū actiones: quemadmodum primi- mas, qd deterrimē. Si ergo etiam unio solutur, talis affectio erit morbus, quē nūtitia diuortū uocamus, quo nō solum instrumentaria, sed simi- lares etiam affliguntur particulae. Ceterū in offe- si affectus fractura dicitur. In carne uerō mus- culorū parte, si cum distentione accidat, *Myos*, hoc est, scissura. Vbi autem si filamenta tendun- tur ut discurrant, conuulsio. Vbi caro citra tensionem soluitur, uulnus. In nervo dicitur af- fectus is, scissio. Si uulnus ab acuto telo insigni- tur, punctio uocatur. Si à graui, cōtussio. Si à cor- rosione ortum habeat, in offe quidem, caries: in alijs autem partibus, ulcus uocatur. Tot er- go, talestq̃ in hoc quinto morborum genere, quum simplices particulae occupat, differentiae erunt. Instrumentaria uerō saepe accidunt, atq̃ diuisiones dicuntur. Sed si similis quaequam particula dissectur in totū, affectio illa, partim

Medicam artem
distinctionem, ne-
cessaria est par-
tem alicuius
organum.

Cerebrū efficit
neruū facultati
uicissim per
neruos delata.

Musculi praestit
se iocum.

Instrumentariorū
uitū integritas
affectusq̃ omnis,
quatuor generibus
his continet.

Unio solutur
conuulsio uocatur
quo nō solum
instrumentaria
sed similes
etiam affliguntur
particulae.

Myos, hoc est,
scissura. Vbi
autem si fila-
menta tendun-
tur ut discurrant,
conuulsio.

Diuisio.

Arti qualibet à
finis notioe sua
habet constituti-
onem.
Methodus quae
alias artes, ip-
sam quoque medi-
cinā constituit.

Medicam artem
ex effectivā
genere existere.

Factiuae artes
duplices.

Medicam artem
ex iocū quae la-
befactas instau-
rant.

Medicam artem
distinctionem, ne-
cessaria est par-
tem alicuius
organum.

Deus & natura
praenouit partes,
earum officia pro
exemplari usū.

Alitum partium
duplex, simpli-
um uniuersum &
compositarum.



illius quæ secta est, dicatur: partim totius instrumenn: quamvis nōnunquam huius nō nisi ex acci-
denti dicenda sit, ut cūm aliquis muscululus pati-
tur. Quādoq; autē enī primū, ut cūm aliquod
ligamentū. Quemadmodum igitur in hoc uno
morborum genere fecimus, sic in alijs quatuor
differentiæ tibi scrutanda sunt. Quibus examina-
tione, nosse oportet, possit ne parē quēpiam in
alterius locū reſtatu, an minime. Quando quide-
m si reſecueris carnem uitiatam, facili poteris
similem aliam reſicere. Secus autē si ueruus, uel
ligamentū dissectum fuerit. Neq; enim alia reſar-
cies, qualia erant priora: cūm illa quidem ex san-
guine generetur, hæc uerō ex ſemine ducant ori-
ginem. Os quoq; in ijs eſt, quæ per primā ſorma-
tionem conſtituta ſunt. Cæterum in locum
ipſius aliquid ſuggerere poſſumus, quod oſi
quāſimiliſſimū ſit. Verū iam methodus ipſa
nos cogit ad inquirendum, utri unaquęq; pars,
earum quæ & ſimplices, & ſimilares uidentur,
an poſſit ex pluribus conſtituta: & præterea,
quæ ſit earum cōpoſitionis modus. Quæ in qui-
ſino, quāuis nō philoſophia modo, ſed etiā me-
dicorū nōnnullis admodum ſit uſa diſſicilis, ita
men quibus adſint ſeptem adimenta quæ ſub-
dam, facili cūm illius, tum aliarum omnī diſſi-
cilitatū, ipſam ueritatē inueniē: aut ſi minus,
ſaltem nō omnino de inuentione deſperabunt.
Septem igitur illa ſunt, natura perſpicax, educa-
tio optima, præceptores ingenui, labor impro-
bus, ueritatis ardentiffimus amor, optima me-
thodus, exercitatio denigraſſima. Quorū ſi uel
unum deſideret, qui ad uiam ueritatis introdu-
cendus eſt, non eſt admodum ſperandum, illū
poſſe ſui uoti compotem fieri. Si uerō omnia cu-
mulata adſint, quid deinde uetat, quo minus ue-
ritatē, bona etiam ſpe, exquiramus. Reuertar
autem eō, unde diſgreſſa eſt oratio, diſquira-
musq; primū, an carnis (exempli gratia) elemen-
tum, unū ſpecie ſit. Deinde uerō, ſi ſecus uideat-
ur, an plura. Mox quot ea ſint, & quæ, & quem
habcant cōpoſitionis modum. Proſectio ſi caro
cūm uel ſecatur, uel impenſius caſſa, dolet, fieri
nequit ut ex uno elemento cōſiſtēt: ut ex atomo,
quemadmodū Epicurus exiſtiſſimat. Quare pul-
chrē diuſ inquit Hippocrates: Si unus exiſtat
homo, neutiquā dolebit: quia in alterū nequit
mutari, ſi unum eſt, cūm nihil præterea relinqua-
tur, in quod mutet. Quod ſi eſt mutatio, erit
quoq; alteratio, neque enim, atque impanibile, ac
proinde nulli dolori obnoxio. Si itaq; elemen-
tum carnis eſſet ſpecie unum, nunq; illa dolet:
dolet autem, igitur elementū carnis nō erit ſpe-
cie unum. Rurſus, ſi impanibile eſſet elementum
carnis, nō dolet: atqui dolet, non igitur eſt im-
panibile. Quibus rationibus ſubuerſum dogma
tā eorū, qui tum atomos, tum ſimilaritates, tum
elementa quatuor, ſed quæ mutuo inter ſe tranſ-
mutari nequeant, introduxerūt. Quippe ſi duos
digitos ſimul cōmitras, moxq; diſtingas iterū,
neq; eorū conuentus, nec diductio, aliq; ex-
citabit dolorem. Vt enim aliquid dolet, ita pati-
tur. Si quidem pati, ab his duobus proſit, ab al-
teratione per totū, & à continui diſſolutione.
Quandoquidem igitur nec conuentus, nec ſepa-

ratio corporibus uel manifeſtū patibilibus, uell
adſert dolorē, minus proſectū adſerret impanibi-
libus. Etenim quodcūq; in dolore futurum eſt,
neceſſum habet, ut cūm parienti, tum ſentiendi
ſiccatate præditi ſit. Nulla ramen neceſſitas cogit,
id quod ſentit, ex illis primis conſtare, quæ
ipſi etiam uim habeant ſentiendi: nam ſat erit ſi
ex patibilibus ſit. Dum enim patienti, alterabun-
turq; poterit aliq; ſentiendi uim aſſequi. Cūm
innumere poſſint eſſe alterationes elementorū,
unde mox innumere particulariū poterunt pro-
prietates oriri, ſic ut aliz euadant ſenſus exper-
tes, aliz illū prædite ſint. Ex dictis igitur con-
ſtat, elementa eſſe plura uno, eaſq; alterationi eſ-
ſe obnoxia: nun uerō numerus eorū nobis in-
ueſtigandus eſt. Neceſſum autem eſt, ut illa quæ
rem quāpiā alterant, primū quidem illud con-
tingant, quod ab eis alterādo eſt, atq; ita mox
ipſum tandem imminuet, idq; per tactiles qua-
litates, quæ alterat etiam proximæ rei ſubſtan-
tiam poſſunt: cuiuſmodi ſunt caliditas, frigidi-
tas, humiditas, atq; ſiccatas: quæ quidem actiūs
qualitates planē & ſunt, & dicuntur: ex eiſq; uel
maximē oppoſitio prima, atq; in hac ipſa, calidi-
tas. Præter has quatuor, nulla reperiū qualitas,
quæ corpora quibus occurrit, alterare per totū
poſſit. Vnde ſi niuem ad minima uſq; ſecueris,
nix quidem ſeruabitur: ſed ſimilac calſiet, deſi-
net actūtum ſiſ eſſe. Quare quæcūq; corpora
has quatuor qualitates ſibi uendicauerint pri-
mū, erunt omnī corporū elementa: ſunt autē
hæc, terra, aqua, ær, ignis. Ac proinde uniuer-
ſi, qui demōſtrationi parent, philoſophi, hæc eſ-
ſe omnī quæ gignuntur, intercutiūt, uera ele-
menta, necnon mutuo ſe tranſmutare, habereq;
omnia ſubiectum quoddam cōmune, autumāt.
Igitur ex quatuor elementis ſimul contemporanea,
corpus unū ſimulare gignunt: quod per uaria
temperamenta ran onē, aut particeps ſenſus,
aut illius experts euadit. Vnde corporū ſimilaritū
differentiæ, quæ ſimplices quidem ſunt, tot ſunt,
quot elemēta: calidiores nempe, frigidioreſ, hu-
midiores, atq; ſicciores. Totidem uerō & cōpo-
ſitz, ut quæ ſimul calidiores & humidiores ſunt:
quæq; frigidioreſ & humidiores: & præter has,
alia tertia, ſiccior atq; calidior: & quarto deinde
loco, quæ ſiccior eſt, & frigidioreſ: ſic quæ, ut
temperantiſſima eſt, & harum omnīū prima, nō
negligatur. Cūm igitur abū de ſit iam oſtenſum,
ſimilarium partium integritatē & uinum, in ele-
mentorū tum moderatione, tum immoderatione
cōſiſtere, ſuperet ut inquiramus, quomodo
ab eorū uitio morbus ſit diſtinguendus. Diſtin-
guetur autem à rei cuiuſq; notionē. Porro ſalu-
bris conſtitutio corporis, actiones ſibi ex natu-
ra debitas, inoffenſas habet: morboſa, offenſas.
Idcirco ſi quis ſanus quidem ſit, atq; etiam tamen,
quiſdem proſperæ ualitudine fruati, actiones
habeat imbecilliores, erit ſanē in temperatione
illo, necdum tamen aggroſat. Itaq; inter ſalubres
habitus uniuerſos, unus erit temperatiſſimus,
ocſto autē imtemperat. At inter morboſos, nullū
temperamentū inuenias: eundem tamen numerū
complect, quem imtemperatura ſalubres. Ac de
his hæcenus. Deinceps autē dicendum eſt, quo
modo

Dolorum cor-
porum eſſe de-
bet patibilibus
& ſenſibilibus.
Sensibile corpus
nō neceſſario ex
ſenſibilibus con-
ſtat.

Elementa eſſe
tum plura uno,
tum alteratio-
ni obnoxia.
Alterationē ſen-
ſi aliq; cetera ſen-
ſum poſſit.
Tactiles qua-
litates.

Aliaſ qualita-
tes, caliditas, fri-
giditas, humidi-
tas & ſiccitas.

Elementa om-
nium ſunt, ter-
ra, aqua, ær,
ignis.

Similium cor-
porum differen-
tiæ ſimplices,
tot eſſe, quot ele-
mentis, totideſ
etia cōpoſitis.

Similium par-
tium integritatem
& uinum
in elementorum
moderatione, uel
immoderatione
conſiſtere.
Morbus qui di-
ſtinguitur à rei
ſimilium
particularum.

Morbus ſanus,
quod conſtitutio
nō ſalubris.

Carnis inflata,
ſimilem inflan-
tem poſſit.
Nervorum aut li-
gamentorum ſiſ-
ſum, reſtus tur-
ſus non poſſit.
Carnem ex ſan-
guine, nervos
ex ſemine gene-
ram.

Alimentum ſi-
ſtem ad uerita-
tem in abſtruſo
reſci poſſibili-
gandum.

Carnis elemen-
tum nō eſt uni-
cum.

Carnis elemen-
tum nō eſt im-
panibile.

Pati contingit
aliquid, ab alijs
rationem & ſi-
militudinem conti-
nere.

modo quis morbos curet, quo modo & sanitate uetat. Etenim medendi methodus ex ipso cum sanorum, tum aegrorum corporum affectu, suum principium habet. Cum enim id quod exquisitè sanum existit, omni ex parte sit moderatè: quod uero ægrum, immoderatè: a duertendo in primis est, quænam ea sit illius immoderatio. Quippe necessariū est aliis inueniri immoderationē contrariā, per quam illam exterminemus. Reditus siquidem ab immoderatione ad temperiē, in omnibus erit per immoderationē contrariā. Ut tandem necessum sit, id quod præter naturam affectū est, dum ad naturalem statum redit, illam eandem quasi uiam incedere, quam prius consecraret, præter quod ordine contrano. Quare generalissimus curandorum morborum scopus erit, Contraria contrariis remedia esse, & particularibus particularia cōteraria. Calido enim morbo, frigidum: & frigidò calidū. Ira et illico siccò, quod humectat: humidò quod exicat. In similibus siquidē res se habet hoc modo. In instrumentariis autem, oportet in unoquoque prædictorum quatuor generū, morbo si immoderatiōni cōspiciat adhibere contrariam, donec ad moderatiōē, naturalemque statum peruentum fuerit. Ut, si (exempli gratia) caro plus quam par sit, ulceri excreuerit, erodenda est. Sin autem nimis cauum sit ulcus, implendum. Similiter & in alijs faciendum. Considerandum autem in omnibus generibus est, num habeamus facultatem, ea quæ ex indicatione offerūt, perficiendi. Si quidem morbi species, curationis tantum modum in dicat. Id autē fieri posuit necne, haud item indicat. Etenim eorum omnium quæ profunt corpori, in causa est, cum ipsa natura, tum etiam medicus. Quædam tamen medicus, quædam etiam natura præstare nequit. Os nimium ita perforatum, ut de suo loco partes decedant, membrumque distortum reddatur, haud potest natura corrigere aut conformare, sicuti potest medicus. Sed natura potest ulcus cauum implere: quem admodum quæ semicocta sunt, aut etiam cruda, concoquere: id quod negatū est medico. Quamvis ad hæc peragenda, medicus ministerium naturæ potest esse uel esse, ut dum congruis medicamentis ulcus reddat purissimū, & eis quæ concoctione egent, ea offert quæ modicè calfaciant. Iam uero natura ipsa, nonnulla etiam primum à se confecta, denuo non ualet reficere: ut uenam, arteriam, ligamentū, neruū, & alia id genus. Si quidem ob imopiam materiæ, nullum eorum natura reficere ualet, quæ ex femine suum ortum duxerunt. Igitur scopi ipsi à methodo medendi repetitis, eos in particulares materias inducere oportet: deinde comprehendantur, quæ aut omnino, aut ex parte aliqua, aut aliquo etiam tempore secundū eam fieri possint, quæque secus. Nec uero est exigua huius artis portio, remedium omnium materiarum, tam simularium paritum, quam dissimularium morbis congruentium, a diuenerit. Quorum uniuersum genus, in offerendis, efficiendis, euacuandis, & his præterea quæ extrinsecus accidunt, planè constitunt. Quæ omnia, ubi artus constitutor ad maiusculam perfectum, & consecutus fuerit, iam causas omnes salubres, ut nihil illi præterea ad artem medendi de-

fit, absoluisse putandus est: his omnibus reductis in capita duo, nempe corporum cognitionē, quibus remedia offerenda sunt, atque ipsam remedium naturam. Verum hoc mox illi quoque supererit, ut sibi aliquam affectuū omnium dignoscendorum facultatē comparere, maxime uero eorum, qui partes in alto sitas occupant: quos exactè cognoscere, una cum affectis particulis, haud fuerit obuius cuiusvis. Quocirca de his etiam aliquod impræsentiarū dicendum. Tria sunt genera rerum præter naturā. Primum, affectus qui lædūt naturales functiones. Secundum, horū causæ. Tertium, symptomata. Sed causæ potissimū appellantur, cum agunt: quales uia nonnunquam dicant, quod uim habeant agendi. Symptomata uero genus in tres differentias digerunt: in actionis lesionem, in ea quæ corpori accidunt, & in excrementorum exuperantiam. Quocirca omnia symptomata existit causa ipse affectus: ob idque merito ex illis agnoscitur. Symptomata porro nonnulla affectus ipsos necessariū cōcomitantur. Alia non ex necessitate, sed aut sapienter, aut aequaliter. Sicuti alia rursus, affectuū differentias necessariū sequuntur: quædam sæpe, alia raro, alia incipiunt sunt. Ea itaque symptomata, quæ morbos ex necessitate sequuntur, quod affectuū in se cognitionē habeant, dicuntur Græcis pathognomonica, & pro morborum notis habenda sunt.

Quæ uero non necessitate, ea uel morbi differentiam, uel illius mores, uel magnitudinē indicant. Vt utrumque autem uim uno eodemque aperiamus exemplo. Costas succingens membrana teneat inflammationē: quæ affectum necessariū sequuntur tumor præter naturam, rubor, & dolor ueluti pungens circa ipsas costas: quoniam est substantia affectuæ partis membrana. Latè etiam uagabitur dolor, quod ea ipsa membrana latè etiam diffunditur. Febrim quoque tum ex ipsa phlegmone, tum ex uicinia cordis, sequi necessarium est. Quorum si uel alterū desit, tam non ex necessitate febris aderit. Nam si digitus inflammationē laboraret, aut costas cingens membrana* scirrhus, & de matre affligatur, non cōtinuò adoriatur febris. Quin & spirandi difficultas incidit, quam affectus ipse producit, ponus quam lesa pars. Dolor namque respirationis operæ (eius usu nondū expleto) dissoluit: ut mox necessum sit alterā celestius illi succedere actionē, unde spiritus frequē & paruus redditur. Adert etiam, præter eam quæ coniungi à febre nō potest, & pulsuum quoque alteratio, nempe durities remissioni iuncta: quia pars phlegmone obfessa, neruosa est. Cum autem duplex sit ea tunica quæ costas uelat, si ea pars quæ exterius obfusa latet, ualde aliquid oblabore, facilius egri in latus decumbunt oppositi. Nam si decumbant in latus, cōpressio molestiam adfert. At si interior (quod frequenter contingit) uehementius dolent, si in oppositum latus reclinant, cum nimirum pensilis sit reddatur infirmata particula. Quod si utraq; membrana afficiatur, par in utroque latere decubitus fuerit. Ad hæc, si inflammatio in supremis illius partibus exciteretur, clauicala trahi deorsum uideretur. Si in inferius, dolor præcordia pertingeret. Quamobrem ex qua inflammatio erit, & secundū partes costarū

Rerum præter naturā effectus genera. Affectus. Causæ. Symptomata.

Symptomatum differentia tria. Affectum cognoscit ex symptomata.

Pathognomonica.

Phlegmonides symptomata.

Dolorem lateris euacuare respirationem operari.

Effluxus ratio.

mediâ, si in neutram se inclinet partē. Quod uero tenue quid, purulentumq; ex inflammata effluit particula, cum ex morbo ipso, rum ex parte læsa procedit. Suboritur etenim inflammatio ex humorum affluxu. Vbi igitur multus, tenuisq; is humor fuerit, qui in fluxu in inflammatam partem, atq; pars etiam ipsa est rarior, plurimum est quod effluit. E contrario autem, si fluxio fuerit rum exigua, tum crassa, corpusq; præterea densum, minimū erit quod transfundetur: ac proinde excitabitur tussim, ita ut nihil inde excernatur. Quemadmodū si copiosum fuerit, tussient plurimum, nec parum expuent. Hunc itaq; affectū semper ac necessariū sequitur tussis. Scretus autem post tussim, non semper: at maiori ex parte. Quod spūto reijciatur, necessum est semper esse infectum colore, non ramen perpetuò eodem, cum nec excrementū in inflammata particula semper sit eiusdem nature. Etenim cum sanguinolentum fuerit, biliosumq; (eiusmodi siquidem ferē semper ea fluxio est, quæ in pleuritis phlegmonem gignit) a detento succo in inflammata particula, ipsū colore inficitur: rubeo quidem, si sanguineū id fuerit: flauo autem, si biliosum. Cæterū si purulentum primum fuerit siccus, qui & conclusus demū purefcat, ac deinde sit in causâ fluxionis gignentis phlegmonē, tunc spumosa excreantur. Sed quandoq; ceruitur scretus niger, dum bilioſus, sanguinolentus fluxio præfatur. Quare omnia hæc, cum partis affectus, affectusq; ipsius dignatione, enām fluxionis indicant differentiam. Ex dictis igitur constat, per necessariū esse ad affectus, lociq; affecti inuentionē, tum unicuiusq; affectus partis substantiam, actionemq; tum eisdem cum uicinis consortium callere: nec non morborū & symptomatum genituræ, adeoq; morborū effectrices causas, prius inuestigasse. Porro in nuper proposito exemplo, perniciōsissimū succus efflūit atra bilis: omnī mitissimū, sanguis. Medium in simplicitate & malignitate reliqui duo obtrunt. Ex symptomatibus autē, ut nihil omnino expuerit, perniciōsissimū est ira scretus facili, saluberrimus, præcipuē si concoctū expuantur. Pulsum etiam symptomata morborū mores ostendunt: sicuti & quæ lege consortij accidunt, ut deliria, somni quidam inexpugnabiles, talidia, urinæ, deiectionesq; alui. Ex quibus omnibus erit pendenda ratio cum præſagiendi, tum cōmodē utendi remedijs. Præſagia namq; & medicum ab omni mortis culpa reddunt immunem, & ægros ad obtemperandū faciles, occasiōemq; remedium præmonstrant. At uerò quod aptus remedium usus, id sit, quod in arte est præcipuum, liquet. Iam excrementorū species, multorū noticiam adfert, cum & corpus secum cōnexum habeat, efflūit quo aliæ externi uideamus. Locus autē per quem fit excreto, poterit certius nos ad affectus partes perducere. Nam si per inferiorem aluum, membranam quid excernatur, ulcus indicabit in intestinis. Si per superna uomatur, in uentriculo. Si per tussim excreetur, abradi tunica asperæ arteriæ, indicum erit. Sicuti si mingatur, uel uescam, uel pudendi meatus. Sed non parū præterea ad rem faciet, ea quæ primario affectū, ab

his quæ per consensum laborant, distinguere. In uniuersum autem maxime necessariū est ad cōmodum remedium nūm, partem, quam curaturū sumus, substantiam, figuramq; & positum, accuratē cognoscere. Substantia enim affectus primos, qui in intertempe consistunt, quantū à naturali statu aberrant, ostendit, quantumq; refrigere, calfacere, humectare, aut exsiccare oportet. Figura uerò, morbos qui ad ipsam spectant, eorumq; magnitudinē indicat: necnon quousq; sit opus ad naturalem habitum per contraria reducere. Obstructiones autem ad hoc genus pertinent: quanq; habent aliquā cōmunionē cum illis indicationibus, quæ defumuntur à situ: de quibus iam agam, uno proposito exemplo. Obstructio affectus est partium instrumentariarū, quæ præcipuē iecori solet negotium facessere. Nam uenæ quæ à portis oriuntur, per uniuersam huius uisceris partem suam disseminatæ, tandem illis quæ in gibba sunt, per quādam oscula sensum effugientia applicatæ. Uniuersum uerò alimentū, ex uentriculo in hunc unum locū, qui ob id ipsum, quod nuper diximus, porta appellatus est, fuggerit. Quemadmodū enim in urbes nihil inuehi nisi per portas potest, ita ferri nihil potest in iecur, nisi in hunc prius locum fecturur: unde in totam iecoris partem caua demittuntur: inde uerò, per eos quos diximus terminos, in ipsam gibbam. Quare nihil mirum uideatur, si uiscus hoc, & ob uiam angustiam, & ob copiam pertransientis substantiæ, assiduē obstructionibus corripitur. E igitur curatio adhibenda est, prius quā obstructiones exerceant, atq; accendat febris, tum cibis, tum medicamentis attenuantibus ad ministratis. Nam si auctē ita fuerit, euacuatione erit opus: quæ per quem locum molenda sit, membri figura & situs dicta bunt. Quippe si quid iecoris cauo adhaereat, id per intestina detrahemus. Quæ autem in gibbo comprehenduntur, urinam ciuentibus euacuabimus. Eodem etiā modo, quæ in pulmone & pectore deliteant, per tussis sunt expurganda: si cūti deducenda ad nares, quæ in cerebro sunt. Nec minus à membri figura & situ desumpra ratio est, sanandi phlegmonē detentæ particulas. Si quidem fluxiones quæ decubuerint in coxam, secus uenis in poplæ aut in talo, euacuamus: & eas pariter quæ in utero cōprehensæ sunt. Quæ in thorace aut pulmone, per cubiti interiorē uenam. Sicuti eas quæ in capite & collo, per humeralem. Ea quippe euacuatio facillimè & optimè fiet, quæ per uicinas uenas, & affines partis affectus, licet administrata. Porro & suam ex morbo habet indicationē, in halitum distansdū esse, quod in inflammatū locum defluxit. Situs tamē affectus partis, uariū deinde in sinuā particula rum auxiliorum usum. Etenim quæcūq; in summa cute orum habent, tale expolcunt distillatorum remedium, quale ipsa indicat inflammatoris species. At quæ in profundo, eo egent medicamentis acrioribus, quò magis ab exterioribus recedere: ut quandoq; cucurbitulis sit urendum, si sedem plurimū profundam labrant, quod tamen inflammationibus quæ in summa cute consistunt, quamaduersissimū est. Nec minus erant

Substantia partium quid indicet.

Figure partis quid indicet.

Obstructionem esse affectū partium instrumentariarum.

Porta uenæ cui sit dicatur.

Iecur assidue ob obstructionibus corripitur.

Iecur pariter ea ne obstruat, per quæ regios per gaudet.

Pulmonis phlegmonis excrementa expurganda per tussim.

Vena secunda ratio in fluxionibus quæ decubuerint ad coxam, uicinis ab aciem pulmonis, caput, & collum. Vacuatio optimè optima quæ.

Situs variis auxiliis remedium particularium usum.

Cuto summa affectus, quæ a remedium possunt.

Profundum partis affectus quæ a remedium possunt.

Pleuritis uenæ fari sequitur tussis.

Sputum coloris variis, ob raritatem humorum, gignitur pleuritidem facit.

Atra bilis perniciosissima succus.

Scretus qui saluberrimus.

Præſagium vitæ.

Remedium nūm aptum, est in arte præcipuum. Excrementorū species. Locus per quem fit excreto.

firus loci æstimandus est, quādo astringente me-
dicamento opus fuerit. Quia si medicamentum
ipsum astringens potest eo peruenire, nil uerat
quo minus ipsum administraremus. Sin minus, ca-
uendum tunc, ne humorem ex uicinis partibus
in affectum locum pellamus. Quare uel aliquid
admiscendum astringenti medicamento est, qd
ad uirtutem illius perducatur: uel ab illius usu
in totum fuerit superfedendum. Ac de his quidem
iam dicta sufficiunt. Deinceps nonnulli de præ-
sagio dicendum, cuius artem qui constituere uo-
luerit, is necesse habet prius examinasse, an sicu-
ti culibet rei animaræ propriū uitæ spacium cō-
stitutum est a natura, sic etiam omnibus mor-
bis: ut nullo deinde pacto, si sit aliquid illorum a
natura constitutum bimestre tempus, possit is
quatuor debus abolui: ut uerō & in longum
protrahi, & celerrime possit finire. Vbi igitur ex-
crementa in locum aliquem decubuerint, nec de-
fluant amplius, si cuiusq; humoris naturam ex-
plorauerimus, facile artificiali quadam obiecta-
ra concoctionis rationem & tempus deprehē-
demus. modō cetera omnia recte circa ægrotan-
tem tractentur. Nam quicquid erroris fuerit in
his commissum, erit profectō in causā, ut uel se-
ritus morbus soluitur, uel mors celerius aduen-
tet. Quare tunc sanē præsgia sunt euentura, ubi
& medicus præstantissimus fuerit, & æger in nul-
lo delinquat. Medicus igitur his duobus, mor-
bo inquam & naturæ, ueluti colluctantibus, sem-
per mente intendit: ac dum discernit quodnam
horum robustius sit, primū quidem suū de
salute hominis aut interitu, præsgium depro-
mit. Dein uerō, quod alterum altero forius esse
nouit, eo & illius præstitutum tempus agnoscit.
Vt enim celerrimè morbus soluendus est si uires
sint ualidiores: sic citō mors adueniat, si lit im-
becilles fuerint, morbus autem uicemens. Sed
magnitudo excessus horum tempus indicabit.

Nature robur ex proprijs illius actionibus cō-
prehendes, maximè uerō ex pulsū. Si quidem is,
facultatis uitalis est opus. Morbi autem magni-
tudinē cognosces ex suis symptomatib. At qua-
ritus alterum altero præualeat, concoctio crudi-
tatis indicabit: quas subinde ex proprijs excre-
mentis cognosces. Quæ enim in uentriculo con-
sistunt, deiectiones cōmonstrant: quæ in uzi-
næ, urinx: quæ in corpore uniuerso, sudores.
Qyo etiam modo & reliquæ concoctiones omnes
se habent, quæ in una quapli parte, aut plu-
ribus absoluitur. Quibus omnibus cōmune est,
nunquam morbum solui posse, nisi prius in ex-
crementis, concoctionis signa cernantur. Nam
ut concoctiones omnes celerem crifim, salutarisq;
securitate indicant, sic cruda, & quæ in prauos
uertantur abfcessus, uel nullam crifim, uel labo-
res, uel tempus prolixum, uel mortes, uel recidi-
uas declarant. Ac iam mihi uidetur uniuersa me-
dendi methodus (que formam tantū, ac ueluti
uniuersalem speciem totius negotij continet)
ad finem suum peruenisse. Reliquū autem nunc
fuerit, ut modum aliquem, quo quis possit eos, qui
a morbis sunt liberati, reherere: prospicere au-
tem hā, qui in morbos prociues sunt: ac eos de-
niq; qui iuculpara fruantur corporis ualitudi-

ne conseruare, doceamus. Ergo ex symptomati-
bus, quæ medium inter ea quæ finis insunt, & ea
quæ eueniūt ægris, seruant, deprehenditur ipsa
in morbos prociuitas. Affectiōnes uerō quæ ta-
lem prociuitatē gignunt, per contraria sunt cor-
rigendæ: si tamen hæc res summam tractanda
est: nam si transgredia particulam, omne exu-
berans est euacuandū: sic ut prius sit distinguen-
da exuberandi ratio, quantitatē uē an qualitate,
aut utraq; etiam ratione exuberet. Ac deinde,
quod potest iterū ad naturalem statum redire,
sic per contraria alteretur, ut quod crassum len-
tū est, tenue fiat: quod tenue, crassius redda-
tur: ambo uerō pariter concoquantur: obstruc-
tiones præterea aperiantur: quæ toto genere
existunt præter naturam, quæ modū uenena
animaliū, tum alterentur, tum euacuantur. Altera-
tio autem per contraria fiat, quæ uel tota sub-
stantia aduerfantur, uel altera, uel utraq; qualita-
te. At euacuatio, per ea quæ trahendi uim habet.
Cæterū hæc omnia quibus sint peragenda reme-
dijs, ab ipsis morbis pendendum est. Quin si om-
nes pariter humores accreuerint, præcipuū ipso-
rum euacuatio erit per scētum uenam. Deinde ue-
rō per frictions, per exercitia, per balneas, per
inediam. Nec alia etiam erit uacuandi ratio, cum
solus sanguis excefferit. Vbi autē fluxus uel atre-
bilis succus, uel serosus humor cōtineatur in pri-
mis uenis, purgandi tales humores sunt ijs, quæ
alium cōmoueant. Sin alijs tenuia & aquosa ex-
crementa fuerint, per urinam: si biliosiora, per
purgatoria. Possunt tamen & tenuia etiam alui
deiectione purgari. Sed quæ totum corporis ha-
bitum occupauerint, cum tenuia fuerint, aut su-
dore, aut medicamentis, quæ cum applicita, aim
exiccandi habent: cum uerō biliosa, primū qui-
dem purgatione egent, mox euacuatione per cu-
rim. At cum pruritulosi succus exuberarit, si sal-
sus sit, est purgandum. Si * acidus, experiendum

an possimus eum alterare: & longē etiam magis
si dulcis fuerit, erit enim is cōcoctū facilius. Por-
rō ad concoctionem conducit quies, calfactio
modica, cibi parcus usus, boni tamen succi, po-
tus uni parī calfacientis, moderata frictio, me-
diocri usui calidarum aquarum, insuperq; cibi
atq; medicamentū moderate calfacientia. Obstruc-
tiones referant quæcumq; uel esculentia, uel me-
dicamenta attenuantia. In quibus autem nulla
causa, nullusq; affectus præter naturam est, sed
cum gracillitate, sola imbecillitas uirium, ij facile
in naturalem habitū reduecentur, si mo deratis ci-
bis & morionibus reficiantur. At materias qui-
bus huiusmodi instaurandis sunt, in opere de sani-
tate ruenda explicuimus. Ne tamen deesse ali-
quid huic sermōi uideat, non modō ipsius ana-
leptices, sed uniuersi etiam salubris negotij me-
thodici, hoc quoq; loco repetenda est. Si solum
hoc eueniret corpori, ut in halitus distaretur, &
subinde inaniretur, cibis potusq; defectū illum
sarcire posset. Quia uerō humorū copia, prauisq;
excrementa gignuntur, ægemus excretionis
bus. quarum nimirū est manus, superfluum suc-
cum euacuare, excrementa uerō cōcoquere & ex-
purgare: si tamē causæ omnes uidentur, & quibus
solet uiuam sanitas, refrigeratio inquam, æstus,

Prociuitas in
morbo uide
prociuitatē.

Exuberans om-
ne uacuandum
esse.

Tenuis facies af-
si increffandis,
Hæc uacuatur:
crassus autem is
uacatur.

Venena alteran-
da & uacuanda
esse.

Alteratissimæ
excretionis molles-
dam.

Vacuatio fiet
per tracheam.

Sectiones uena-
rum huiusmodi uacu-
antur pluribus.

Purgatio quibus
debetur humo-
ribus, quælibet.

Præterea dulcissi-
mo cōcoctū facilius.

Cōcoctio quæ
conducit.

Obstruuntur
aperiuntur.

Analeptice.

Excretionum
typus.

Sanitatem ijs
sanantur.

Astringentium
typus, quando uo-
luntur.

Animarum omni-
bus propriū ui-
tæ spacium con-
stitutum esse a
natura.

Erroris circa æ-
gri aduersionē pro-
ducunt morbum,
uel etiam mor-
tum accipiunt.

Præsgia quan-
do cōueniunt.

Medicus intui-
tu morbi &
morbo.

Robur nature
cognoscitur ex pro-
prijs illius actio-
nibus, ac maxi-
mè ex pulsū.

Morbi magnitudo
cognoscitur ex
suis symptomati-
bus.

Concoctio quid
uidetur.

Cruda aut quid
uidetur.

Durities.

Vires.

Sedens.

Morbi uicissitudo
signa, nisi conco-
ctionis signa
reuerentur pra-
sentia.

Concoctionis
quid uidetur.

Cruditatis quid
uidetur.

*Aut autem ad
siccam declinat.*

*Vern non esse di-
citur calidum &
humidum.*

*Temperamentum autem
calidum atque hu-
midum, esse om-
nem aliarum pos-
simum, nec re-
rim posse in qua-
tuor anni tempo-
ribus.*

*In corrupta ser-
uatur a frigido et
sicca nimis, per-
frigens a calido
& humido.*
*Itemque seruatur
impetria vana-
nosa.*
*Autemque statu-
pote fieri si-
cula.*
*Ver tempera-
et saluberrimo*

*Animantia di-
cta esse calida
& humida non
absoluti, sed cal-
data ad stupor.*

*Canis scior ho-
mies.*

*Canis humidior
feruiscit & ap-
tem.*
*Temperamento
rum collationem
diuersa.*

*Elementa sola
duo absolute ca-
lida, aut humi-
da, aut frigida,
aut sicca.*

spere: nec in humidum & sicco omnino medium
statum obtinet, quemadmodum ver, sed ad sic-
cum declinat. Idcirco patere arbitror, nec autum-
num absolute sermone, & citra exceptionem, fri-
gidum & siccum dicendum esse: sicuti neque ver
calidum atque humidum. Ego siquidem, tantum
abest ut ver, aut si quid aliud est temperatum, ca-
lidum & humidum esse credam, ut quod plane
contrarium est, id affirmem, omnium scilicet aë-
ris temperamentorum id pessimum esse, quod hu-
midum est & calidum. Quod sane temperamentum
in quatuor anni temporibus inuenire non
possis: quamvis id in pessilenti aëre constituto
ne incidere aliquando videatur, quemadmodum
Hippocrates olim congnisse in Cranone memo-
rat, ubi nimirum aëris per ætatem largo im-
bri fuerat (quod calidi humidique status est pro-
prium) quam intemperiem aëris comitant sunt
uani & grauissimi affectus, haud dubie dixit pu-
tredinis foboles. Nam ut a frigido & sicco om-
nia in corrupta seruantur, sic a calido & humido
facilissime cōpurescunt. Boreæ etenim status sic-
cus & frigidus, omnia si diuersimode impetria cō-
seruat. Austrinus autem status, qui calidus & hu-
midus est, illa subito ad corruptionem perducit.
Ver itaque haudquaquam calidum & humidum pro-
prium unciamus, cum nec tale sit, nec si esset, unquam
salubre esset, aut saniam accōmodum. At quatuor
qualitatum mitionis æqualitas, & mediæ tem-
peraturæ eius, & salubritatis est causa. Perperam
etiam faciunt, dum ætatem temperamenta, ad
quatuor anni tempora transferunt, quum non
idem sit, aut similiter dicatur animalis temperies
calida & humida, sicuti aëris temperamentum
calidum & humidum dicitur. Qui error inde il-
lis uidetur ortus, quod non meminerint, animan-
tia ueteribus pronunciata fuisse calida & humi-
da, non proprie temperaturæ ratione, nec sermo-
ne absolute, sed ad stirpes, & demortua, collata.
Quique demortui & stirpibus, animantia cali-
diora humidioraque sunt. Quinetiam ex animi
stirpibus ipsa inter se speciatim collatis, canis quidem
est scior, homo autem humidior. At si formi-
cet, uel ipsi animalium comparet, illas scior
hunc humidiores inuenies. Ita idem ani-
mans, præter hominem, sicum: præter apiculam, hu-
midum fuerit. Rursus ad hominem collatum, ca-
lidum: ad leonem, frigidum erit. Calidus etiam
est canis, ut uiuens (cū mortuus non amplius
calidus sit) non calidus autem, si ad alterum com-
paretur canem. Atque hæc quidem omnia per col-
lationem inter se dicuntur. Quæ uero in animan-
tium genere conferuntur, alia ratione: sicuti et-
iam quæcunque in aliqua a nimalium specie. Ca-
nis utique ad formicam est humidus: in animan-
tium genere est sicus. Rursus, ipsorum specia-
tim canum, hic sicus, ille humidus, alius (ut fas
est canis) temperatus existit. Quod ergo absolu-
to sermone, nec ad aliud ullum collatum, uocat
sicum, id in solis est elementis: similiter de
ceteris qualitatibus est sentiendum. Nullum enim
ceterorum corporum, proorsus calidum aut
frigidum est, sed sola elementa. Quicquid præter
hæc reperis, ex his mitionis constat. Ac propter ea
per secundam significationem, non amplius ab-

soluta ratione, ueluti syncerum & a mitione alie-
num, reliquorum quoduis calidum aut frigidum
dicitur. Ac duo quidem significata calidi, frigi-
di, humidi & sicci, hæc sunt alteri, absolute ser-
mone loquentium, mixtura carens atque syncerum
alterum contrariis quidem mitionis constans, cæ-
terum ex pollentis in mixtura nomine appella-
tum. Quo genere sanguis humidus dicitur, sicuti
& os siccum. Formica uero sicca est, & uermis
humidus: scilicet ut sunt animalia. Dicitur por-
ro unumquodque secundum genus, uel speciem,
non modò calidum esse, aut frigidum, sed alijs
etiam qualitatibus præditum, cum supra medio-
cre atque medium fuerit. Verbi gratia, animal dici-
tur calidum, cum supra mediū temperie fit ani-
mal. Equus calidus, cum supra medium tempe-
rie equum fuerit. At uero in quoque genere spe-
cies sunt media, quæ a summis in eo genere, spe-
cies, finibus æqualiter distant. Ac genus quid-
am est animal, species equus & canis. Medium
temperie in toto animalium genere, est homo.
Medium uero ut in hominum specie, quem Gre-
ci eusaron, hoc est, quadratum appellant, ab om-
ni excessu, defectuque remotus. Quisquis igitur
supra hunc fuerit, is aut proorsus calidior, aut
frigidior, aut humidior, aut scior erit: idque
parum absolute sermone, quia minime uni alie-
cui priuatum collatus dicitur talis: parum non
absolute, quod symmetrio & medio totius spe-
ciei comparatur. Ergo unumquodque horum que
talia sunt, aut calidum, aut frigidum, aut humi-
dum, aut sicum tripliciter dicitur. Nempe aut
comparatis ei cultibet particulari indiuiduo:
aut cum uniuscuiusque tum generis, tum speciei
medio id conferentis: uel denique summum atque im-
permittum ipsum esse æstimates, id quod sane
ad sola pertinet elementa. Quare ad tractionem
de temperamentis illi duo primi modi nobis tan-
tum sunt necessarij. Quoniam autem multa gene-
ra sunt, quemadmodum & indiuidua, ad quæ cō-
parare possumus, poterit idem corpus multis
modis, calidum, frigidum, humidum, atque sicum
existere, similiter suscipere uarias appellationes.
Verū ubi stirpem animantis uel ullum, eucraton, si-
ue optime temperatū dicimus, nequaquam in ea di-
ctione, simpliciter contraria inter se cōparamus:
sed ad naturam uel animalis, uel stirpis referi-
mus, cum eorum quodque per sua natura optime
sele habeat, optimeque suas obeat functiones. Sic
enim dicimus animalia ipsa & stirpes optime
& medium habere suo in genere temperaturā, non
unquam absolute sermone, ac si paritas exquisita cō-
trarium in ijs reperitur, sed quod ea medio-
critas, quæ ad potestate refertur, eis addit. Ac tale
quid etiam dicimus esse & iustitiam, non quæ men-
sura & pondere, sed quæ eo quod pro dignitate
conuenit, æqualitatem explorat. Est ergo tem-
peraturæ æqualitas, in omnibus animalibus tem-
perans, stirpibusque, non ea quæ ex pari elemento
rum committitur mole spectatur, sed quæ tum
animalis, tum stirpis nature conuenit. Conue-
nit autem alia, ut humidum frigidum, & frigidum
calido præponderet. Itaque ad interrogantem, cuius
temperamenti sit homo: si quidem ut in anima-
libus interrogatio fiat, ad id quod medio est inter

*Media in quo-
que genere, uel
specie, quæ dicitur.*

*Homo est me-
dium in toto ani-
malium genere.*

*Temperatura
corporum quous
pluriter assigna-
tur.*

*Temperatura
ad iustitiam.
Iustitia quid.*

exanguis ut neruus, nec sanguine abundans ut caro, sed ueluti neruus sanguine præditus. Si igitur hanc omnium animalium partium, ueluti normam iudicem proponens, reliqua illi cõseras, octo in uniuersum diuersas intemperies reperies: de quibus membratim disseram. Humidissimum frigidissimumque in corpore pituita est. Calidissimum, sanguis: non tamen perinde is humidus est ut pituita. Frigidissimũ est ac siccissimũ, pilus. Minus eo & frigidum & siccum, os. Hoc uero minus siccum est cartilago. Proximè hanc sequitur chondro syndesmus. Post lucem tẽdo. Deinceps membrana, & arteria, & uena. Succedunt dein nerui duri: molles quippe in humiditate & siccitate mediam naturam, sicuti curis, obinent. Nam in altera oppositioe tantum caloris defiderant, quantum sanguinis. Ita uerò & reliqua prius dicta, tantò sunt frigidiora cute, quãtò minus habent sanguinis. Etiam uasorũ tunice: nõ solum exangues sunt, sed etiam naturæ frigide: contracta tamen sanguinis calfiunt, atque ad mediũ temperamenti statum deueniunt. Sanguis uerò ipse à corde suum calorem accipit. Id uiscus siquidem tum omnium animalis particularum maxime sanguineum, tum uerò calidissimum est. Proximũ illi est iecur. Verum cor, paulò minus quam cutis est durum: iecur multò. At caro humidior cute est: eadem tamen calidior. Spinalis autè medulla cute est humidior, atque frigidior: sicuti hac rursus humidus est cerebrum. Cerebrum autè ipso adeps: cui cõcreno cõtingit, propterea quod oleosa cum sit, membranis irrigidis adiacet, ob quarũ uiciniam cogitur. At nec circa iecur coire adeps potest, nec circa arterias, uenas, aut cor: sicuti nec circa ullam aliam præclidam partem. Quoniam autè cogitur ab eo quod ualde est frigidum, idcirco calfacta liquantur, cæterorũ coagulatorũ more. At cerebrum calfactũ liquatur minimè: eoq; adipe minus est humidũ. Minus humida quàm adeps est ipsa etiam pulmonum caro, quæ nec calfacta quidem liquatur. Iam longè etiam quàm hæc adipe minus humida est tum lienis, tum renum caro. Omnia nam hæc cute sunt humidiora. Quorũ rerum de monstrationes proximo commentario trademus.

GAL. DE TEMPERAMENTIS LIB. II.

Ergo quot sint in uniuersum temperamenta, quotq; modis unumquodq; illorũ dicatur, in proximo definitũ est libro. Vbi à nobis etiam est traditũ, animal ipsũ minime quiddam absoluto sermone calidum & humidũ dici, quod in eo scilicet humiditas aut calor exuperet (sic enim liceret inuenire animalia sicca, frigidaq; cõplura, ueluti canes, muscas, apes, formicæ) sed tantũ ad demortua collatum. Monstra tumq; similiter est, cutem uolbe manus, in homine qui optima temperatura fit præditus, esse temperatissimam, rotiusq; medium tubitantie. Frigidam autem plurima in hominibus disiecta. Verum maxime temperatus is est, qui corporis habitu medius horum extremorũ uidetur, gracilitatis neque, crassitudinis, mollitiei, duritiei, temq; caloris & frigoris (nam interdũ in animalis sangui-

ne prædito & humido, frigiditate quãdam polentem reperias) quique etiam liber cùm sit ab immodicis animi affectibus, omnes tam naturales quàm animales actiones & facultates habet inculpatissimas. Idem medius oportet sit inter somnolentum atq; perurgilem, inter glabriũ & hirtum, inter nigrum & candidum: pilosq; habear cùm puer est, magis rufos, quàm iunq;: cõm in flore consistit, contrã. Cæterũ quãdoquidem se nobis occasio iam obtulit, de ætatibus nonnullis dicendum est. Prima constitutio animalis reens formati in utero, ex semine & sanguine est: qui humores calidi sunt & humidĩ. His autè magis semper siccescẽtibz, primũ quidem formantur membranz, tunice, nerui, uiscerag; & sanguinis uasa, nempe illorum substantia tensa. Vltimò uerò perficiuntur ossa, ungues, & cartilagine, scilicet substantia ipsorũ cõcreta. Quibus perfectis in utero, ita deinde paritur infans, adeo tam men molli & humidus omnibus partibus suis, ut omnia ipsius membra nutrices, perinde ac si cerea sint, pro arbitrio forment & fiant. Idcirco nuper nam animalis corpus, maxime si fuit lum, ouiliumue id sit, propter redundantem in eo humorem, tunice non comedas. Nam capillum, quod siccus fit, & melius eius est, & iucundius. Contrã uerò quàm in nouellis percellis, quæcunq; iam conueniunt, hæc omnes partes præfæcas rigidatq; & sine succo possident. Quæ medio itatu horum, est etiam maioris sunt, ea quantum à senio absumt, tantũ & ab extrema sunt siccitate remota. Quæ minora sunt, atq; adhuc augefcunt, tantũ ea quoq; absumt ab liuore fortis delitescens utero, quantũ processerit ætate. Florescent uerò etas omniũ animalium, maxime in medio extremorũ est. Porro senes naturali particularũ temperamento sunt sicci, licet copia excrementorũ humidĩ esse dicantur. Siquidem cum particule senilium corporũ per caloris imbecillitatem similiter nutrirĩ non possint (quaratione dicuntur sicce) foris illis copia humidĩ excrementorũ redundat, & superfluitat. His itaque sicci sunt senes, quibus scilicet puer est humidus: ipsis nimium solidis corporis partibus. Quod igitur siccissima ætatum tendis sit, etiam dictũ constat. Quod autem & frigidissima, ex tactu ipso, ex liuore qui uidetur in ientibus, ex frigidis morbis, quibus faciliè corripuntur, ac deniq; ex imbecillitate naturalium functionũ, faciliè etiam quis iudicauerit. Et quid quæso aliud est senium, quàm uia ad interitum? Si enim mors, naturalis caloris extinctio est, uti que senium ueluti rabes quardam eius fuerit. At uerò de puerorũ & florentium ætate, uita nam sit calidior, maxima inter medicos digladiatio est. Qui quidem omnes perperam mihi uident facere, dum sensibilibz rerum cognitionem, laborioso cõsequi ratiocinio molunt. Nam cùm eorũ que actũ calida sunt, alius esse iudex quàm tactus nullus possit, sanè si multos uiros, tum senes, tum adollescentes, tum pueros, tum infantes tetigerint, inuenient faciliè, qui magis, minusq; calidi sint. Ego siquidem, quod actũ calidum est, tactũ iudico: sicuti & quod potestate calidum indicatur, id ratione conor inuestigare.

*Tematissimum
primam anima
in consistere ex se
mine, & sanguine
ne mensuras.*

*Partes quæ
tens, quæ postea
sensitue re
tens.*

*Reens edita
animalium cor
pora eius incepta
existunt.*

*Capitulum
carnis lœdantur.*

*Ætatem florentem
esse etiam me
diu extremorũ.*

*Senes esse natu
rali temperie sic
ci, humiditatem ex
crementorum co
pia.*

*Senilem etatẽ
esse siccissimam
aliam, & frigi
dissimam.*

*Senium esse ad
interitum uia.
Mortem esse ex
tremam natura
lis calorem.*

*Tactum solum
esse iudicem co
rum quæ alto
calida sunt.*

*Potestate calidi
inuestigare ra
tione.*

*Intemperies cal
lata ad cutem
acta.*

*Pituita.
Sanguis.
Pilus.
Os.
Cartilago.
Chondro syn
desmus.
Tunica.
Membrana.
Arteria.
Uena.
Nerui.*

*Sanguinem à
corde suum cal
orem accipere.
Cuius parti
cularum tum
maximi sangui
nem, tum cal
idissimum esse.
Hepar.
Cor.
Spinalis medu
lla.
Cerebrum.
Adeps quæ pat
to coagulator, et
qui heret par
tibus.*

Pulmonis caro.

*Lienis caro.
Renum caro.*

*Animalis frigi
da quæ.
Animalia dicit
calida et humi
da, non simpli
ter, sed ad de
mortua collata.*

*Cutem uelut esse
medium totius
substantie.*

*Homini tempe
ratissimi notæ.*

Calidum itaq; quod in ætatis cognoscere cupimus, primum & maximè tactu diiudicemus. Fiet autè optimū iudiciū in alicuius infantis corpore. Potest nangi, & qualis calor illi ante biennium fuerit, in memoria reponi: & qualis nunc sit, post duos fortè ad tres interpositos annos. Nam si mutatio omnino ulla ad calidū frigidū ue infanti facta uidebitur, nullū præterea negocium erit, quod usq; ad florentem ætatem excelsus

Aut ætatem calorem qua methodo degnoscendi.

Puerorum inueniuntur calorem differre totæ se qualitate tantum. Puerorum calor mira. Florentium calor ætatis.

Tactus quorū sit molles, succa omnia qd se dura. Dura que sunt, nō necessariū qd se sicca.

Molle cum modico calore esse humidam.

Caros plures speciei.

10 caro appellatur, quā scilicet nusquam in corpore per se solam inuenies, sed est perpetuo masculi pars. Dein cuiusq; uiscerum propria substantia est, cui ipsorum tota actio tribuitur. Porro ceteri pulmonisq; corpus, proximum ad ipsi est, humiditatis ratione. Propinquam habet naturam lus, osium medulla: nō est tamen eiusdem generis cum ipso cerebro, neq; etiam cum spinali medulla. Hac cerebrum calidius est, & humidius, eoq; mollius. Cuius anteriores partes tanto humidiores sunt, quanto molliores. Omnia tamen hæc cute humidiora & frigidiora existit: ac breuiter, omne exangue, frigidius est sanguine prædito. Proxima cuti est mollium nervorum natura. Dures autē in humido & sicco, secundum cutis naturam se habet. At calore ab eius natura tantum absente, quantum consentiens est exangue corpus à sanguine prædito abesse. Lienis autem, renum, & icterioris caro, tantū cute est humidior, quantum est mollior: calidior uerò, quantum magis abundat sanguine. Iam cordis caro ipsa omnibus tantū est siccor, quāto durior: calidior autem nō modò hæc, sed etiam omnibus absolutè corporis partibus. At icterioris, lienis, renum, pulmonisq; caro, simplicia cuiusdam naturæ est, circa cuiusq; uisceris uenas, arterias, & nervos cretens. Cordis simplex carnis natura nō est, sed sunt in eo fibræ, quales in musculis cernimus, quibus caro circumhæret. Atq; hæc quidem carnes cute sunt calidiores: fibræ uerò q̄ cutis, partim paulo magis, partim paulo minus, tum frigide sunt, tum sicce, partim similes omni nō cutis substantiæ. Porro omnes membranz cute sunt sicciores: ligamentis ipsa, quāto cute duriora sunt, tantò etiā sicciora. Tendones quoq; longè duriores sunt cute. Cartilago uerò post ligamentum est: ac deinceps mediū quoddam inter ea corpus, quod anatomici prædico uisceris quædam anatomici appellant, ac si dixeris ligamentum cartilaginem. Os uerò omnium quæ cute operit, durissimum est. At eorum quæ cute exant, siccissimus est pilus: deinde cornu, mox ungues, ungulæ, calcaria, & rostra. Succorum optimus ac maximè familiaris est sanguis. Huius ueluti sedimentum & fax, atra bilis. Quæ idcirco tum frigidior, tum etiam frigidior sanguine est, sicuti ita ueluti bilis longè calidior. Frigidissimū uerò ac humidissimū omnium quæ in animalis habent, pituita est. Instrumentū autem quo id cognoscitur, ipse est tactus. Ac particule quidem, & succi corporis, ad hunc modū se habent. Iam uerò crassitudo & gracilitas habitis, corporum temperamenta sequuntur, non ea modo quæ naturalia sunt, sed etiam si qua ex longa consuetudine sunt cōtracta. Multos siquidem, qui natura graciles fuerant, pingues reddidos uidit: contraq; qui pingues fuerant, graciles: illis quidem ex ociofa & delicata uita, toto temperamento ad humidius mutato: his uerò, multa tolerantia, & curis, & te

Carni nusquam per se perpetuo.

Exanguis omnia frigidiora sunt sanguine prædita.

Cordis caro calidior uisceris corporis partibus.

Fibra.

Membrana.

Tendones.

Cartilago.

Chondroidea diffusi.

Os.

Pilus.

Sanguis succorum optimus.

Atra bilis fax sanguinis.

Pituita frigidissima uisceris omnium que in corpore habentur.

Tactus est instrumentum quodammodo differens dætem.

Pingues de uita contrahunt.

Graciles de uita contrahunt.

Veni latius prædico, calidiores: frati an pueris, frigidi.

uenarum,

10

30

40

50

60

uenarum. Quod si quis simul pinguis crassusque est, ac uenas latas habet, is consuetudinis alicuius occasione, non natura, pinguis est redditus. Sicuti est diuerso, qui angustas habet uenas, & gracilis est, ne huc quidem talem esse natura, est necesse.

Quinetiam cum fames urget, ex laxitate & angustia uenarum, non ex cetero corporis habitu, spectanda esse mediocritas, monet diuus Hippocrates. Quippe qui angustas possidet uenas, & exigui sunt sanguinis, nec longam in ediam fedunt. Quibus fuit late, ijs copia sanguinis inest, & circa noxam cibo abstinere. Etenim quicquid pingue est in sanguine, leuiter, id in corporibus calidioribus alimentum quoddam calido fit: in frigidioribus uero assersum. Vbi igitur id a uenis transfusum, in cideret in particulas frigidarum, in ipsis quidem concrefceret. In calidioribus uero natura partibus, cuiusmodi sunt carnosae, a calore absorbuntur, & digeruntur: nisi forte frigidi tati temperamenti uita indulgentior accedens, ipsi carnosae particulas aliat aliquid pinguius dinit.

Atque hac ratione & ferme uirum pinguiora sunt, quod nimirum sunt eis frigidiores, plurimumq; domi uersentur. At qui habitus natura sunt temperati, mediocriter exercitio utuntur, hos necesse est euscarcos esse, hoc est, mediocri habitudine corporis. Quibus uero abundat humidum, & calor i mediocritate summa non longe abest, ijs corpulentum sunt. Corpulenti etiam sunt, qui natura sunt temperati, ceteri ociosi & desidiosi uiuunt: cum uidelicet confuersio sit ueluti acquiescentia natura. Adeps etenim, ex habitus frigidi tate gignitur. Corpulentia, ex sanguinis copia. Mediocritas, temperatae naturae est nota. Et corpulenti quidem, omnino plus adipis habet, quim mediocri habitudine praediti. Nec ramen per carnis semper portione, adeps simul augetur: sed alios habere plus carnis, alios plus adipis uidetur: alij ambo pari modo sunt aucti, cum uidelicet tantu illis, supra temperatam naturam, humoris est, quantum & frigoris. Quibus autem plus est adipis, in his frigidi plus est, quim humidi: atque ut quibus caro est plenior, his leuioris plus iusto est, non tam frigoris. Porro ubi nullu adhuc morbosum symptoma crassato corpori incidit, ipsa abundantia humoris intra sanitatis est fines. Quam autem mediam temperatam naturam, reliquarum ueluti canonem semper statuamus, quae uero ex huius utraque sunt parte, iudicemus intemperatas, manifestum utiq; est, in sanitatis statu & latitudine, & maioris minorisq; inueniri rationem. Est enim alia sanitatis, alia morbi intemperies. Morbi quidem, ea quae i media temperie quamlongissime abest. Sanitatis, quae paulum. Desinit autem modum, nec mensura, nec ponderis licet. Ceterum intemperiei quae intra sanitatem consistit, sufficiens nota est, quod nulla functio animalis manifeste adhuc sit obfusa. Quam igitur interuallum est inter id quod perfectissime suam obit functionem, & id quod actione aliquam habet manifeste uitiatam, tantum est profectus & sanitatis, & intemperiei, quae intra sanitatem consistit, latitudo. Ab hac proxima est intemperies morbofa, cum scilicet animal uitio intemperiei iam egrotat. Rursus, quemad-

modum naturali calore optimam seruante temperiem, humidum, quod intra sanitatis terminos est, auctu, non adipem modum in homine, sed etiam corpulentiam gignit: & adipem quidem parcius adicit, liberalius autem carnem adauget: sic etiam, si humidum & siccum mediocritate ad unguem inter se seruent, calor autem sit in homine minor, necesse est huius corpus adipe quam carnis copia magis abundet. At uero si calor augeat, seruentq; mediocritatem altera contrarietas, minus erit ei animalis adipis, quam carnis. Sicuti est diuerso, si quando praepoleat siccum, altera contrarietas medium modum seruare, & gracilius & durius corpus euadet. Ex quibus liquet, non solum ratione monstratum esse, quod simplices in animalium corporibus intemperies habeantur, sed etiam, quod singularum manifeste sint nota, idq; in uniuersis habituum corporis differentia.

Porro calida & sicca temperies, iurata est: uerum ea in summo. Mediocriter autem, quae calida quidem est, sed in altera contrarietate mediocritate habet. Similiter & quae sicca quidem est, sed in calido & frigido mediam temperiem obinet, modice est iurata. Nuda pilis sunt frigida omnia temperamenta, siue ea modice se habeant in humiditate, siue etiam immodice. Ceterum ad summum glabra est frigida temperies & humida. Minus hac, quae frigida est, sed in altera oppositione, temperata. Adhuc minus, quae frigida est & sicca. Si quidem siccitas cutis, in ijs qui molli sunt cute, maxime omnium idonea est ad pilorum generationem. & quod siccior calidiorque fuerit, eo magis pilos gignere potest. Hanc enim siccam & calidam cutem, uelut terrae statui assimilamus, quae abunde fit uere, uel incute exstat. Etenim per omnem cutem digeritur semper a calido aliquid, quod secum etiam nonnulli interni humoris euehit. In quibus igitur humida est cutis, & mollis, qualis modo coëctens caseus, in ijs, eorum quae exciderunt, uix per cutem dilatare non manent: neque partibus eius, quae prius dissidebant, rursus inter se coeuntibus. At in quibus dura est, nec ab illis caseo coëctro, perforatur quidem, eorum quae exeunt transfluxum. Cuius autem uniri rursus per siccitatem nequeat, seruat immutatos meatus, qui etiam perpetuo transfusentium ictu, indies magisq; fistulant. Per eos igitur, halitus minimè impeditus est transitus. Sui autem fuliginosus, terreusq; uapor sit, id quod permeat, subinde contingit, ut in angustis spiramentis impactus, nec facile rursus intro redeat, nec item possit uacuari, sed impellatur ab alio secundo uapore, atq; ille rursus ab alio, & sic consequenter, per multos multi uapores fuliginosi inuicem complicati & coniuncti, in unum corpus degenerent, quale est fuligo ea, quae foris cernitur. Fit autem niger pilus, cum deusto uel caloris uapore, excrementum in exactam fuliginis puritate. Flauus uero, cum uapor minus torref. Nam quod tunc est impactum, flauae bilis excrementum existit. At albus pilus ex pituita nascitur. Rufus, sicuti coloris albi, flauisq; est medius, sic generatio eius ex pituitose biliosaeque fecis, media quadam natura prouenit. Crispi pilii sunt, ne propter siccitatem temperamenti, quae intorquet illos (qua

Hirsuta esse quae calida sunt & sicca.

Glabra esse temperies, quae frigida sunt & humida. Cutis sicciora temulentiam esse pilorum generationem.

Pilorum generatione.

Pili nigri generatione. Pili flauis generatione ex flaua bile. Pili albi generatione ex pituita. Pili rufi generatione. Pili crispi quae sunt.

Venas angustas habentes, aegri ferri cibum. Venas latas habentes, sanis cibo abstinent.

Feminae car sunt uero pauciores.

Euscarci.

Corpulentum quae.

Confectura uelut aquiescentia natura. Adeps qui gignatur.

Temperata naturam esse omnium aliarum canonicam.

Sanitatis statu habere in latitudine. Intemperies sanitatis & morbi, quibus uita depulsa.

*Aethiopes an-
na cur crisp.*

ratione Aethiopes omnes sunt crispi) uel propter imbecillitatē exhalationis, quae rectam uis sibi moliri non potest: uel denique ob duriorē cutis naturam, quae ipsam exhalationē, etiam si ualens sit, prohibet recta ferri regione, cogit ut ad latera se inflectat, ac sibi obliquum transitum parat. Est quidam ambobus coeuntibus, & exhalationis, quae meatum fixit, imbecillitate, & cutis siccitate, pilorum radicibus obliquitas ipsa contingit. Quales autem in radice finguntur, tales rationale est pilos perpetuo fore. Atque licet quidem pilorum est generatio. Sequens est, ut causas omnium quae temperamenti in pilorum pro aetate, regione, & corporis natura, differentiis contingunt, dicamus. Ergo Aegypti, Arabes, Indi, quique calidam & siccam regionem incolunt, nigros, exigui incrementi, siccos, crispes, & fragiles pilos habent. Contra, qui humidam, frigidamque regionem habitant, Illyrii, Germani, Sarmatae, & omnis Scythica plaga, modice autem, graciles, rectos, & rufos obtinent. Qui uero inter hos temperatum colunt tractum, hi pilos plurimi incrementi, robustissimos, & modice nigros, mediocriterque crassos, tum nec profusus crispas, nec omnino rectos, emittunt. In aetatibus ad eundem modum. Infantium quidem pili, Germanis: florentiū aetate, Aethiopsibus: Epheborum atque puerorū, iis qui temperatum locū incolunt, in robore, crassitudine, magnitudine, coloreque ad portionem se habent. In corporum quoque naturis, ad aetatem & regionis portionē similiter se habere pili uidentur. At pueri admodum parui, nudi prolixi sunt pilis, quod nec meatus adhuc ullus illis in cute sit, nec excrementum fuliginosum. Incipientes autem pubescere, paruus & imbecillēs exigit. Qui uero iam florent, hi ualentiores, multos, magnos, & nigros habent: quod & frequentes meatus iam illis sunt facti, & excrementis fuliginosis, praesentitate & calore, abundant. Ceterum pili qui in cute, cultis, & super cultis habent, etiam pueris uobis innascuntur. Siquidem generatio non est, non qualis herbas, sed qualis stirpibus prima ratione a natura conditis, non temperamenti necessarii sequentibus. Verum hi quoque, quod quidē sunt, id naturae arti acceptum serunt. Quod nigri, rufi uis, aut alio quouis fuit colore, id aetatis temperamento omnino debent. Subnigri enim fere sunt, quoniam quod in meanbus est impactum, nondum totū est nigrum: quippe cum humiditas multa sit, & transitus facili, & deulio imbecilla. Boni uero incrementi & modice crassi sunt, propter excrementorū, quibus aluntur, copiam. Siquidem ipsa pars corporis, in qua fiunt, sicca est. Tota namque calua ossa est. Cutis uero quae illi est circumdata, tanto reliqua totius corporis cute est siccor, quanto durior. Ascendunt tamen tum ab iis quae circa cerebrum sunt, tum uero ex toto corpore, fuliginosi excrementi non parua uis. Quo fit, ut quae aetate florentibus totū corpus, euismodi iam infantibus fere capitis cutis. Eoque rationabilis nonnulli procedente tempore calui redduntur, quibus scilicet a primo ortu cutis durior erat. Siquidem in ea cute, quae fuerit siccata impensius, nihil nasci potest. Itaque etiam

*Pilorum vari-
tate significand-
varia aetatem,
regionem, corpo-
rumque tempera-
mentum.*

*Infantes cur
glabri.*

*Pilos capiti,
colorum & su-
periorum generatio
quasi exilis.*

Calui qui sunt

interna manuum, & interna pedum, semper sunt pilorum experta, quod si scissimus, densissimusq; tendo sit, qui sub cute habetur. Quibus autē ad summā ariditatem cutis capitis non peruenit, imbecilli iis omnino, albi pili sunt: quos uulgo canos appellant. Imbecilli quidem, congruentis alimenti penuria: albi uero, propterea quod alimentū quo aluntur, uelut marcor pituitae est, quae spacio computruit. Vbi enim meatus etiamnum manet, excrementū uero exiguum est & lentū, languideatque calore propellitur, non dissimuliter putredini afficitur. Iam calui fiunt homines, cum senescunt, & scynopie magis. Canescunt magis a temporibus: quoniam regio illa est omnium aliarum scississima. Haeret enim cutis illic ossi uento. Tempora uero, humidiora sunt, quod in his musculi magni sub ipsa cute habent. Omnis namque musculus carnosus est. Ac caro tum ossi, tum cute humidior. Verū enim uero, quandoquidem humanum corpus nonnullis quidem squabilis per totum temperamento esse potest, nonnullis autem, neque paucis, inaequaliter esse affectum, cum eorum aliae partemque temperat, aliae temperatē esse possint, certē ex una ea particula corporis, simpliciter de toto semper coniectandum non est. Neque enim hi, qui docere mores ex ingenio corporis proficiuntur, de omnibus pronunciant simpliciter. Verū si quis impense luto est pecciore, hunc auidem iudicant. Sin cruribus hirtis, calcare. Quare hominum temperamenta considerantibus, singulae partes per se examinandae sunt. Nec si cui thorax hirtulus est, huius totū corpus calidius, scissiusque ex necessitate putandum: sed plurimum in corde caloris esse, eoque audacem illum, cum talis fuerit, existerē. Possē uero aliquid etiam huius ipsius rei occasione accidere, quo minus totū huius corpus similiter calidum siccumque sit, quod scilicet plurimum caloris sursum spirauerit, atque in ambientē abierit. Nam si tota corporis temperies aequalis sit, erit his statim thorax ipse uniuersus latissimus, uenae amplae, arteriae magnae, eadeque maxime uelentissimaeque pulsantes: tum plurimi per totum corpus pili, atque hi quidem in capite plurimi incrementi, nigri, & crispi: utique in prima aetate. Procedente uero tempore, caluitas excipiet. His etiam & robustum, & exacte delinatum, & musculorum totum erit corpus: tum cutis nigrior, durior, hirtuliorque. Ad eundem modum si contraria omnia in thorace sint, atque equalis in toto corpore uigeat temperies, hoc est, si humidiores & frigidiores uniuersae corporis partes fuerint, thorax quidem angustus, & glaber erit: sicuti etiam totū corpus pilis nudum. Cutis uero mollis & alba, capilli suberecti, potissimum in iuuentute. Hi in senectute non caluescunt, timideque statim, & ignaui, & fegnes: adde etiam, parus uenis, ac minime conspicuis, & adiposi sunt. Idem neruis musculisque imbecillis, & artus parū exacte delinatis, & bigis. At ubi uaria partium temperies est, ex una calui, de toto pronūciare non licet: sed ad eundem singulae sunt, earumque temperaturae ex functionibus singulatum inuestigandae. Cutis siquidem in nostra regione (quae temperata est) subiectae partium naturae prodiit: non ta-

*Vale manus
ex glabra
flantia pedis
cur glabra.
Calui qui sunt.*

*Caluitur cur in
scynopie magni.
Canuitur cur in
temporibus potius.*

*Pronunciandū
simpliciter de
corpore uniuersū
non est, ex una
ea parte particula.*

*Hirti pollere,
audacis.*

*Hirti cruribus
hirtulosis.*

*Calui & scissi
temperamentis nota.*

*Frigidū humi-
dūque tempera-
menti nota.*

*Temperis partium, ex eorum
functionibus, potius
siccitate.*

*Cum in regione
temperata,
subiectae partium
naturae prodiit.*

men

men omnium, sed earum tantum, quæ similem habent ipsi cuti temperi. At in regionibus ipsæ recesserunt à temperamento, non potest ex eo affectu, qui in cute cernitur, interiorum partium temperies dare discerni, cum interne externæ partes non ad eundem modum se habeant. Gallis enim, Germania, & omni Thracia ac Scythico generi, frigida, humidam cutis est: ideoque etiam mollis, alba, & pilis nudata. Omnis uero natura his calor in uiscera confugit, uñ cum sanguine: ubi dum agitur & premis, feruetque, iracundis, audaces, & præcipis consilij redduntur. Aethiopiis uero & Arabibus, omnibusque breuiter ipsæ, qui ad meridiem incolunt, natura cutis ex ambiens æstu & naturali calore foras actio, uista, sicca, dura, & nigra redditur: toto nimirum corpore, naturalis quiddam caloris exigui obtinent portionē, sed alieno, atque adscitino incallescunt. Quare attendendum in singulis corporibus est, suo ne ac proprio, an adscitino calore incallescant. Quæ enim putrefcunt omnia, adscitino calore sunt calida, frigenti proprio. Qui meridianā plagam incolunt, adscitino calore sunt calidi, proprio frigidi. Apud nos quoque naturalis calor hyeme est uberior, adscitinus minor. Aestate contra, adscitinus maior, & naturalis minor. Omnia namque hæc definiri oportet, qui recte temperamentum est cogniturus. Neque enim si cutis nigrior appareat, totus homo omnino calidior est. Nam si alter in sole uersatus diutius fuerit, alter in umbra, illi nigrior, huic albidior cutis erit. Verum hoc ad totius temperamenti alterationem nihil facit: quare singulæ partes particularim examinandæ sunt, iudicandæque ex functionibus proprijs. Verbi gratia, uentriculus, si bene concoquit, temperatus: si non bene, intemperatus cognoscitur. Si nidorosus, uel fumosus ructus edat, quoddam igneus calor in eo sit: si acidus, quoddam beccillus, deprehendens. Simili modo, si qui bubulum, & omnia quæ concoctu difficilia sunt, concoquant, quoddam immodicus eorū calor sit: si qui autem hæc concoquere nequeant, conficiant autem faxatiles pisces, aliaque similia, quoddam infirmum, pronuntiare ne dubites. Videndum autem his rariū, num succi alicuius aliunde conuenientis culpa, cuiusmodi symptomata uentriculo accidit. Compluribus locis ex capite pituita, idque maxime Romæ, ac locis perinde humidis, in uentriculo confluunt. Nonnullis etiam, licet hoc raro, & paucissimis accidat, fluxa ex iecinore bilis. Si quidem ipse uis qui bubulum perquam pituitosis hominibus, multam in uentriculo colligi fluxam bilem. Vidi & qui bilem nunquam uomuerunt, qui tamen & graciles, & hirsuti, & musculosi, & nigri, & uenioli erant. Intelligere autem conuenit, meatum illum, per quem iecur bilem in uentriculum uomit, alij geminū esse, alij unicum. Ac plurimū quodam is unicus est, in exortu intestinum insertus. Vel si geminus meatus sit, in exortum ipsum maior inferior: minor in fundū uentriculi, parum supra pylorum. Sed tamen in paucissimis superior pars maior, inferior minor exit sit. Cæterum quibus est maior, his quotidie in uentrem, non exiguum bilis effunditur: quam & uomant ante cibos oportet, & nisi id faciant, læ-

duntur. Quibus autem unicus est omnino meatus, ipsæ tota bilis in iecinū confluit. Hos igitur licebit nobis dignoscere, primū quidem, ex totius corporis temperamento. Dein ex ipsa quæ infra ex cernunt. Tertiū nota: genus, in ipsa quæ uomitu reuertunt, consistit. Si quidem qui multā colligit bilem, cuius nihil per supernā partem exernunt, non biliosa mera desciunt. Qui autē & pituitoso sunt corporis habitu, & bilem euomunt, ab his minus desciunt biliosa, quoddam & minimū fluxa bilis gignant, & eius maxima portio in superiorē uentrē perueniat. Iam uero, quibus in uentre biliosum excrementū gignitur, id porri uero temper præfert: debetque omnino ipse cibis fuisse iusto calidior, tum cacochymus. Quibus autem ex iecinore in uentrē defluxit, his fluxa ea, pallidæ euomit, etiam si boni in primis fuisse fuerit id quod sumperit, ad summunque fuerit concoctum. Imò uero magis ipsæ qui ad ungues exierunt uomunt fluxa: atque etiā magis his, qui diutius cibo abstinerunt. Quæ uero bilis porri refert, ipsa solus gignitur in uentre, qui utique concoxere male. Quinetiam sollicitudo, ira, dolor, labor, exercitatio, uigilia, & inedia, plus succi fluxa bilis coaceruat, propterea quod plus eius in iecinore gignunt. Sunt igitur hæc certa indicia: tum præterea, quod ubi siccu & igneus uentriculi calorem conuersio ad biliosum sequitur, panis, & iustia, & bubula caro, commodius quam laxatiles pisces concoquantur. Quod si ex iecinore bilis affluat, ex comestorum mutatione nulla secuturæ est concoctionis diuersitas. Ad eundem modum, si defluis ad capite in uentrē pituita, acidi ructus in causa est, aut si caput etiā dolore teneatur, discernere semper oportet illa quæ propria sunt, ab ipsa quæ per consensum accidunt. Iam cerebrū ipsum cuius sit temperamentum, per se firmare est fatius: nempe ex canitie, catarrhis, rufis, deflillatione, & fluxu copia (quæ illud frigidum, humidumque esse docent) quam ex corporis totius affectu. Ad caluities ex siccitate prouenit. Nigrorū autem, & frequentium pilorū prouentus, equalis in cerebro temperamenti est nota. Qui igitur refimos, humidos, aduncos autē absolute siccos dixerūt, dupli nomine hallucinari uidentur. Primò, quod unius particulæ occasione, de toto corpore pronuntiare sunt ausi. Secundo, quod formatricis in natura uirtutis, quæ artifex facultas est, & particulæ secundū animæ mores effingit, parum me minerūt. De hac enim Aristoteles dubitauit, nūquid diuiniore originis esset, atque à miscella elementorum diuersa. Rationi autē est consonū, qualitates quidem ipsas esse organa: at formatorē, alium. Nec uero propterea quod pueri nasus magis sunt refimos, florescentes ætate magis aduncus, idcirco rationabile est, refimos omnes censere humidos, aduncos siccos: cum fieri possit, ut formatricis potentie id opus sit, potius quam temperamenti. Quod si temperamenti est nota, at certè eius quod in naso tantum habetur, non eius quod in toto corpore, nota fuerit: nisi forte totius corporis temperies, cum nasi temperamento pari ratione se habeat. Ad eundem modum est iudicandum de cute, de cæterisq; corporis partibus. Nec enim si cutis sit duræ, necessariò sic-

Bilis uisceris quibus in uentrē confluit.

Note quibus di-
scernitur liqui-
bus bilis in ven-
triculo atque in
uentrē confluit.

Bilis profusa quibus in ven-
trē gignatur.

Bilem gignen-
tia.

Bilis orta ab
igne calore ven-
triculi, ex eam
quæ consistit in
uentrē, pudica.

Cerebri tempe-
ri: quibus ali-
manda fit uoca

Caluities ex sic-
citate oritur.

Formatricis na-
turæ affingit par-
ticulas secundum
animæ mores.

Qualitates esse
organæ officia.

Cuti frigida et
humida quibus

Irascunda na-
ture qua.

Putrefactio om-
nia, adscitino
calore ipsi calida,
naturalis frigida.

Aestate adscitino
calore ipsi
maior, proprio
minor, ceterisq;
lygma.

Ventriculi tempe-
rati, intemper-
rati; nota.

Romani regio-
nem esse adu-
dam humidam

Bilis in uen-
triculo quibus
confluit.

cum est animans. Quippe ostrearum coepris hu-
midissimū est, cutis ipsa siccissima. Verū si per
totum æqualiter sit corpus attemperatum, ra-
tio est, ut qualis sit cutis, talis sit & reliquarū par-
tum unaquorū. Spectandum præterea in uni-
uersum est, ex quibus in quæ, mutationes ipse
sint factæ. Fit enim nec raro, ut præterea nota,
prioris temperamenti sit, non eius quod in cor-
pore nunc habetur. Velut si quis sexaginta an-
nos natus, denso pilo sit, non quod calidus &
siccus nunc sit, sed quod talis antea fuerit. Iam
uero neque ex ipsa excrementorum natura, in-
definitè de temperamento est pronuncian-
dum. Fieri siquidem potest, ut colligantur piui-
tosa excrementa, nec tamen humida sit particu-
la, sed simul frigida & sicca: cum tamen ex ci-
bis, neuquā ex nostro corpore, ipsa piuita oria-
tur. Corpus enim ubi ingestos cibos nō uincit,
simile ijs ipsum quoque excrementum gignit. Cæ-
terum quod nō omnia quæ calfaciunt, necessa-
rio etiā excident, ut perperam nōnulli putantur,
nemini obscurū existimo. Aqua siquidē calida,
& quæcunq; natura sunt calida & humida, si in-
flammationis, ex ipsi gratia, admouent, tamet-
si ipsa quidē superuacanea, quæ meda similium
spacia occuparēt, euocēt, corpora tamē ipsa tan-
tum abest ut siccēt, ut etiā illas humores adiciāt.
Atq; iam hūc secūdum cōmentariū claudamus.

GAL. DE TEMPERAMENTIS LIB. III.

Vm igitur antea traditū sit, unumquodq;
actū calidorū, frigidorū, humidiorū, atq;
sicciorū, uel ex eo tale dici, quod summū ha-
beat huiusmodi qualitātē: uel quod uincat in
eo id genus qualitarū alius: uel quod ad co-
gnati generis mediocre aliquid, uel ad unum-
quodlibet, a nobis sit collatū: mōstratumq; præ-
terea est, quemadmodū ea quis cognoscere exa-
ctē possit. reliquum est, ut de ijs, quæ talia po-
tēstate sunt, differamus. Etenim quod quale dicitur,
tale nōdum est, sed potēstate tale esse, id hoc esse
potēstate dicimus: uerbi gratia, hominē qui
nuper natus fuit, rationalē, & aenem uolantem,
scilicet quod eorū unumquodq; futurū est, hoc
cui iam id sit, appellantes. Est autem perfectum
quid, ac præterea, ipse actus: sicuti imperfectum,
ac futurū, potēstat. Ac maximē qui dem propriē
sola ea potēstatē esse dicimus, in quibus natura
ipsa suo pte impetu ad absolutiōē uenit. Proxi-
mus huic modus, eorū est, quæ sunt propinqua
materia: ut, dum sanguinē potēstatē carnem ap-
pellas, quod minimam mutatiōē ad carnis ge-
neratiōē requirit. Dicitur potēstatē etiā esse,
quod ei quod ex accidenti dicitur, est ex aduer-
so positum: ut si quis dicat, frigidam lauatiōē
ex accidenti, non ex propria potēstatē calfacere
corpus carnosū iuuenis. Porro quæcunq; medi-
camenta calfacere nostrū corpus sunt nata, ea,
licet talia nō appareāt tangenti, calida tamen po-
tēstatē uocamus, quod facile possint calida esse,
quodq; promptē in ignem uertantur: hoc inter
iecto discrimine, quod olea & ætea, in flam-
mā, in prunū autē terra degenerēt. At quem-
admodum neq; ignis ipse augeatur prius quā

uicta ab eo ligna mutata sint, ita nec animantiū
calor a medicamentis, nisi illa prius & cōminuta
aliquantisper, & nostro corpori iuncta, ab ipso
etiā mutent. Quæ quidem si perfrigerato cor-
pori quantūvis tenuia inpergantur, non calfa-
cent illud. Proinde quæ refrigerata sunt partes,
eas cuiusmodi medicamentis plurimū perficimus,
rarefacimusq;, quod scilicet interiorum phar-
macum penetrans, naturali animalis calori iun-
ctum, mutetur, & calfat: quippe cuius si parti-
cula quæpiam uel minima, calorem actū concipiat,
hunc deinde in totum, propter continuitatem,
porrigat. Ac quicquid potēstatē quidem ca-
lidum est, huic nondum in natura sua frigido ca-
lidum præpōlet, sed in propinquo est ut præ-
pōleat, ad eū ut breuē opem quō uincat, requi-
rat extrinsecus. Hanc illi modō frictio abundē
præstat potēstatē, modō uel ignis, uel corporis na-
tura calidi contactus. Alia tamen citius, alia tar-
dius corpus nostrum recalciant. Cum autem
quatuor sint corporis facultates, attractrix, re-
tentrix, alteratrix, expultrix, quæ effectus sunt to-
tius in quouis corpore substantiæ, quam consistat
ex calido, frigido, humido & sicco, inter se mi-
stis, dicimus, finē ubi coepris nostrū unaquali-
bet earum qualitarū corpus sibi ad motū demu-
tar, nec ipsum hoc casu tota substantia existimā-
dum est agere, nec quod ab ipso mutetur, posse
ei assimilari. Quare nec unquā tunc quod ita
mutatū est, id quod ipsum mutauit. At si exactē
illud mutet, id est, si tota operetur substantia, uti
quæ tūc sibi assimilabitur id quod murabitur, tum
enī ab eo nutrietur. Neq; enim aliud nutritio
est, q̄ assimilatio perfectæ. Omne autem animal
edgruenti, sibi ipsi alimento nutritur, quale
est, quicquid corpori, quod nutritur, assimilari
si potest. Carterū pro ratione similitudinis, alia
citius, alia tardius assimilantur. Aut si quidem
caro, haud magno negotio: suilla, maiori: bubu-
la etiam hæc maiori: unum uero, omnū miti-
mo, assimilari poterit, ubi prius in instrumentis
coctiōnis manerit aliquandiu. In quibus ante-
quam demutari sit, fieri non potest, ut animalis
corpore sit nutrimentū. At quæ quidem assimi-
lantur, omnia quidem nutrimenta uocant: reli-
qua omnia, medicamēta: quorū duplex natura
est. Quippe uel cuiusmodi sunt assumpta, cuius-
modi etiā permanentia, uincunt, corpusq; mu-
tant, ad eundem modum, quo id cibos: atq; hæc
prioris tum ueniosiora, tum naturæ animalis cor-
ruptiora medicamenta sunt. Vel mutationis ini-
tium ab animalis corpore consecuta, deinceps
iam putrefcunt, & corruptunt, ac deinceps cor-
pus unā corruptunt, & putrefaciunt. Sunt hæc
quoque noxia uenena. Est præterea & tertia medi-
camentorū species, eorum nimirū, quæ corpus
quidem recalciant, mali tamen nihil afferunt:
sicuti & quarta alia eorū quæ & agunt, & parant
tur aliquid, sed spacio uincunt, planeq; assimilantur
tur: quibus accidit, ut tam medicamenta sint, q̄
nutrimenta. Nihil autē miri est, si exguis consecuta
momentū habuit, maximā a priori natu-
ra mutationē alient: cum cōter olim in Myria-
domū integrā cōstargasse ex solo stercore colū-
bino, quod ab ardenti sole inflammari, fenestras

Medicamenta
augere calorem
nostrum nō pos-
se propterea ab
ipso mutentur.

Facultates na-
stri corporis qua-
tuor, attractrix,
retentrix, altera-
trix, expul-
trix.

Nutritio est as-
similatio perfec-
ta.
Animalia unum
sibi simili
alimento nutri-
tur.

Vinum quoniam
rassimi assimilari
non possit.

Nutrimenta qua
dicuntur.

Medicamentorum
natura duplex permixtio-
nis.

Medicamentorum
facultates
natura duplex.

Stercoris colubini
non inflammari
sile.

proxime

Piuita oritur
ex cibis, minimi
ex nostro corpo-
re.

Calfacientia om-
nia non ex ne-
cessitate faciant

Actus calidi, fri-
gidum, humidum
atq; siccum, quæ
suppliciter dicantur.

Potēstatē qua
dicantur.

Actus, perfectus
ac proprius quid.
Potēstat, imperfectus
sicuti atq; futurum.

Potēstatē pro-
priam qua dicuntur.

Oleum in flam-
mam uertitur.
Terra in primum
degenerat.

Archimede in
doctrina.
Spicula virentia.

Lapides attriti
adunt flammam.

Medea medica-
mentum.

Calida pote-
stare.

Vinum munda-
re uolentem.

Nutrimētum di-
citur.

Vinum immodi-
ce haurit, si-
godes afflicto
docere.

Eroditum co-
loma inuola, cur
intus tui fo-
manetur.

Nihil inuol
fuerit, pari agri-
do facili fieri
tem.
Cyreniam Cy-
reniam fieri
per se non fieri.

proxime suum comunicauit incendiū. Qua ratione etiam aiunt Archimedeum hostiū trimeres urentibus speculā incendiū. Succenditur his prompte lana, stipula, ellychnium, ferula, & quicquid similiter his succum & rarum fuerit. Flammā edunt & lapides attriti, atque eo magis, si quis sulfure illos illeuerit. Quare lucernā extinguens quidam, ac rursus lapidi, uel muro admouens, quē antea flammā illeuerat, seu prodigiū quoddam, illam accensam ostendit. Eiusmodi erat medicamentum Medex, ex sulfure & humido bitumine constans: quod quidem quibus illatum erat, omnia, ubi in id incidebat calor, accendebat, & inflammabat. Vniuerfa igitur hæc, potestate dicuntur calida. Iam uero quicquid corporum natura calidorum proprium est nutrimentum, id ea semper non roborat tantum, sed etiam infirmorum eorum calorem augebit, id quod omni nutrimento est cōmune. At uino præter cetera proprium ac suum est, in uariationis celeritas, ita utique ut tædæ, ellychnio, stipulæ, & picis. Porro cum trifariam nutrimentum dicatur, secundum Hippocratem, nempe & quod nutrit, & quod ueluti nutrimentum est, & quod futurum est nutrimentum: id utique quod iam nutrit, propriè nutrimentum uocatur, cum corpus nutriat & calefaciat: quod reliquorum neutrum facit. Quemadmodum igitur si exiguæ & imbecillæ flammæ, confectum multū olei infundatur, illam prorsus extinguet: sic etiam uinum, ubi plus bibitur quam ut uinci possit, tantum abest ut animal calefaciat, ut enī apoplexias, paralytias, comas, cæcos, neruorum resolutiones, epilepsias, conuulsiones, & tetanos, qui affectus sunt frigidi, inducat. Generationem enim, quæcunque assumpta iu corpus ut nutrimentum calefaciat, hæc interim fingere deprehendens, si immodice aut intempestue fumantur. Nec uero mirari debemus, si nonnulla quæ cuti imposita, hanc erodunt, exulcerantque, ut sinapi, muria, allia, & cepæ, quamtu-
tissime comedantur: cū nimirum negintus in uno semper loco permancant, sed undequaque ferantur, ac tum cibis, tum itarijs succis permixta cōmuntur, innumeras subest alterationes: ita ut quod conueniens in eis est, assidue tur: quod superuacaneū & acre, per album, urinas, sudoremque excernatur. Quod autem si acrimoniam suam seruarent, etiam exulcerarent interna, ex his quæ ob cacochymiam sponte accidunt ulceribus, cū in internis partibus, tum uel maxime in ipsa cute, facile intelligere poteris. Neque etiā est dubitandū, cur medicamentorum nonnulla, cum nihil nos offendit extrinsecus, intro assumpta magnā afferant malum: aliqua rursus intro assumpta, nonnunquam lædant, nonnunquam conferant: aliqua nō solum intro assumpta, sed etiam extrinsecus applicata offendant. Quippe nihil intus foris parem agendi facultatem sortitur. Mirum etiam esse nō debet, si lachrymam Cyrenicam ipsam quidem per se non liceat citra cōmodum fumere: quæ tamen si omnino exigua, uel cum alijs opportune sit sumpta, magno opere conducit. Atque ad hunc quidem modum, quæcunque corpus excalefaciunt, ubi mutationis principium in ipso accipere, recalcace-

re illud sunt apta. Quæ uero refrigerant, ueluti papaueris succus, licet & nostro corpore, ne uel paululum quidem demotūtur, sed ipsū statim uincunt, ac mutant, etiam si calidior prius dederis. Est enim eorum natura frigida, ut aqua: quæ per se quidem frigida est, ex accidenti uero aliquando calida. Verūm acquisitiuius eius calor breui perit, naturalis frigiditas manet. Quemadmodum igitur aqua calida flammæ iniecta tam extinguat, sic meconium, uel si id quantum uis calfactum dederis, & calorem animalis refrigerabit, & necis periculum afferet. Quamquam id genus medicamenta, si parce exhibita sint, & unā cum ijs quæ ipsorum frigiditatem reuocant, nōnunquam usum aliquem nostris corporibus præstāt. Iam uero medicamen id quod cantharidis recipit, hydericis auxiliatur, tamēti cantharidis ipsa uellicam exulceret. Discernere autem in omnibus quæmaximū oportet, quæ per se sunt, ab ijs quæ per accidentia. Nonnulla quippe cū sicca sint fortia substantiant, ubi largo calore liquata fuerint, humiditatis specie exuberant: ut æs, & ferrum. Quædam per se humida, ubi in sincero frigore sunt morata, apparent sicca: uti glacies. Quocirca de illis absolute pronuntiandum non est: sed qualiter in calore frigoreque se habeant, considerandum: ac sic tandem non ad id quod secundum accidentia est, sed ad id quod per se, respicientibus nobis, iudicandum. Porro cōmūis in omnibus, anali iudicandi ratio, est alterationis celeritas. At cū calidum, frigidum, humidum, aridum, quicquid dicantur: nempe hæc quidem, per id quod exuperat: illa uero secundum qualitate quam habent summam, à qua nimirum denominantur in utroque horum promptè uertitur, de quo agitur iudiciū, tale potestate fuerit. Oleum nanque, bitumē, resina, & pix, calida potestate sunt, quod in flammam uertantur facili. Vixit autem, quod facili fiat sanguis. Pari modo mel, caro, & lac. Atque hæc quidem, totis ipsorum alterationis substantijs, nutritiōe se alterantur sunt. Quæ uero unaqualiter qualitate alterantur, ac mutantur, ea medicamenta tantum sunt. Medicamenta indena sunt, & quæ nulla substantiæ suæ mota parte, sed rora seruata integra, corpus ipsum afficiunt. Cæterum totum eorum genus nature ipsi contrarium, graue, ac maxime deleterium existit: quæ multis ubi planè exhibenti per minima, nullum exhibent sensibile nocuum. Porro iodicabitur contrarietas ipsorum, ex ea, quæ media intercedit, mutatione: In elementis, uerbi gratia, neque aqua mutari potest in ignem, neque ignis in aquam, sed ambo in ætrem, ipse uero in oraque. Ergo continens & sine medio est aquæ mutatio in ætrem: itemque ignis non continens ignis & aquæ in alterutrum. Hæc igitur inter se contraria, pugnantialia sunt. Non dissimili ratione papaueris succus humani corpori prorsus contrarius est, ut quod in eum quicquam agere, ne una quidem qualitate possit, ac multo minus rora sua substantia. Atque unum quidem deleteriorū genus eiusmodi est. Alterum est eorum, quæ ex nostro calore momentum aliquod mutationis accipiunt, ac dein-

Papaueris succus nō immutatur à nostro corpore. Aqua per se uel frigida.

Cantharis resina exulcerat.

Distingueda resina, quæ per se, atque ex accidenti dicuntur.

Potestate tale quæ ratione datur aliquod. Potestate calida quæ dicitur.

Nutrimētum quæ. Medicamenta quæ.

Deletoria quæ dicuntur.

Contrarietas qualiter uel tandem.

Elementorū in se inuicē transmutant.

Papaueris succus humani corpori omnino contrarius. Deleteriorū primum genus. Deleteriorum secundum genus.

de in multifariis alterationes uertuntur, quibus corrupti naturam nostram accidunt. Quæ igitur corpus rodunt, putrefaciunt, & liquant, merito potestate calida nominantur. Contræque refrigerant, & sensum auferunt, notabiliter inducunt torporem, frigida. Verùm in applicandis hæc quæ natura quidem sunt frigida, sed per accidens calida, cōtingit eorum calorem acquisitionem necessariò petire: propriam autem temperiem frigidam, à nostra nihil immutatam peruenire. At quæmadmodum salamandra ad certum usque terminum ab igne nihil paritur, uritur autem si longiori spacio sit igni admoda: sic & mandragora, & cicuta, & psilium, breui spacio igni applicata, propriam adhuc temperamentum seruant: largius autem excalescit, illuc commutuntur, nec quicquid effecere, eorumque prius poterant, valent. At salium quidem omnium natura, hominibus maximè exister contraria: eorū uerò quæ celerimè nutriunt, cōuentissimum. Reliqua omnia, media inter hæc sunt, quorum alia magis, alia minus, agere ac pati à nostro corpore possunt. Siquidem castoreum & piper, agere magis in corpus nostrum, cū pati ab eo ualent: unum, & mel, & priana, pati magis quàm agere. Cæterum ubi duo corpora inter se cōmixta multo repugnant tempore, certantius de alterando, utrumque eorū rum agere, tum pati est necesse. Semper quippe agit id quod uincitur, in id quod uincit: adeo tamen exiguum, ut sensum effugiat. Hoc autem in his quæ nutriunt, etiam compertum est. Lactuca squidem, quando ab situanti uentriculo coquitur, manifestè quidem refrigerat, sitim compescit, atque adeo, quod frigida & humida sit, somnum conciliat. Vbi uerò ex ea nutritus homo iam fuerit, insiti caloris substantiam augebit. Ventriculum autem ex læditi refrigerat. Quare ubi id genus utrumque præstant, & quod ueluti medicamentum corpus nostrum afficiant, & tanquam nutrimenta naturalem calorem augeant: cum hoc exploratū iam sit, interdum qualitatem caloris intendi, interdum substantiam eius augeri: si ergo non concoquatur lactuca, aut si mauius, succus ipsius, quando is, si liberaliter sumatur, similem cum pauperis succo in homine effectum fortitur, erit utique tantum medicamentum. At si absolute concoquatur, quis ambigit, quin corpori etiam sit nutrimentum? Lactuca itaque, tam cibum, quàm frigidum medicamentum exiit. Eruca autè, & ex herbis anethum, ruta, origanum, pulegium, calamuntha, thymbra, atque thymum, tum cibi, tum medicamenta calida sunt: dum scilicet adhuc coquantur, medicamenta: mutata uerò in sanguinè, nutrimenta: secunda nimirum nutrimenti significatione, quæ id significatur, quod nodum est alimentum, sed ueluti alimentum. Si igitur frigidior iusto fuerit uentriculus, quando in eo delinuerint, donec concoquantur omnes id genus herbe, calfaciunt ipsum, atque ad temperantiam qualitatem reuocant, promittunt ut medicamenta. Si uerò calidior impendit sit, inflammabit illum, ac magnopere lædent: atque has quidem alterant, ut, qualitate sua inducent. Nam omnino percoctæ, atque in sanguinè boni cōuerse, substantiam

caloris naturalis augebunt, non qualitatè intendunt. In uniuersum autem, siue frigidus, siue calidus potestare sit cibus, posteaquā in sanguinem est cōuersus, naturalem similiter calorem augebit. Quod uerò ad sanguinis formam spectat, nec dum planè sanguis est redditus, refrigerat, calfacitque animal, medicamentum ritu. Etenim cūlibet corpori proprietates quædam temperamenti est, quæ huic quidem nature cōsentiens, ab hac uerò dissentiens uidetur. Quod si id quod sibi cōsentiens est, in suam naturam transmutetur, caloris proprii substantiam augebit. Sin uerò ipsum temperamentum mutatum sit, utique uel calorem quendam conquiret, si id à quo est mutatum, sit calidum: uel etiam proprium amittet, si id minus calfaciat. Quare omnia eiusmodi ex eorum sunt numero, quæ ad aliquid relata dicuntur: cum ad proprietatè mutantis nature, quicquid assumitur, uel nutrimenti, uel medicamenti, uel utrumque uoluen foratur. Verbi gratia, cicuta sturno nutrimentū existit, homini medicamentum. Rursus, coturnici ueratrum est nutrimentum, homini medicamentum. Ergo manifestum iam arbitror factum, iudicium eius quod respectu nostri calidum, frigidum, humidum, arum, sic secum dicitur, non ex his quæ posita extrinsecus sunt, sed ex illis quibus ipsi afficiuntur, certum exactumque fieri posse: atque id tanquam primum ac maximum spectandum esse: deinde, si res emigrit, etiam quod ab externis petitur: idque non quomodo, sed secundum quæ sit re substantiæ.

Ut igitur absolutissime iudicemus, cibus uel medicamentum quod admouetur corpori, experta esto omnis acquisitionis caloris & frigoris, planeque sit tepidum. Nam siue potestate frigidum, cum id applicas, manifestè calfacias, siue calidum refrigeres, corpus primo occurru qualitatè acquirat, non eius quæ propria est rei admodum, sensu afficietur. Applicetur autem ipsum medicamentum, quum eius uim exploras, non cūlibet corporis affectui, sed simplicissimo, & summo.

Quod si summi quidem caloris affectioni admodum, frigoris sensum exciter, erit profecto sic frigidum. Pari modo, si frigidus affectui applicetur, calidum statim appareat, id quoque erit calidum. Sin uel calidæ affectioni calidum, uel frigidæ frigidum percipiatur, non est quod hoc calidum, illud frigidum omnino pronuncies. Iudicabimus autem quod ex accidenti aliquid facit, rum ex affectu ipso, tum tempore. Ex affectu, si unus sit, & simplex: ex tempore, ad hunc modum. Quod protinus ut admodum est, manifestè calfacere uel refrigerare cernitur, id utique ex se, & per se tale fuerit. Quod tempore id facit, fortasse ex accidenti aliquid hoc est actum. Veluti iuueni quadrati corporis terano æstare media laborant, frigida liberaliter assula, caloris repercussu ex accidenti facit, cutem nimirum adstringens. Cæterum quod aqua frigida per se semine calfaciat, ex primo eius occurru patet. Sed non minus quandoque calor ex accidenti perfrigerat, uacuatio unoque intercedente: sicuti persusio phlegmonem. Cum enim ex calida fluxione consistat phlegmone, propria quidem eius curatio, uacuatio superuacui est, cui succedit affectus par

Cibus autem in sanguinem uertitur, naturalis calorem augebit.

Ad aliquid quædam dicuntur.

Cicuta sturno nutrimentum existit. Veratrum autem nutrimentum coturnicibus.

Medicamenta ex plerisque admodum tepida, & corpori simplicissimo afficiuntur.

Accidentem aliquid qualitate indicande.

Aqua per se frigida, calfacit ex accidenti.

Calor ex accidenti refrigerat phlegmonem generatam ex uacuatio.

tis refrigeratio. Ergo cū duplex, in his quæ phlegmone laborant particulæ, affectus cōstitat, unus quidem in quantitate, alter in qualitate, sequitur prioris curationem, etiam posterioris curatio: suntque ex accidenti ea medicamenta, quæ materiam calentem euacuant, inflammationis etiam particulari refrigeratoria. Sed pro modo simplicis affectus etiam unū medicamentū inueniatur modus. Nempe calido in summo affectui, frigidum in summo medicamen paretur. Paululum recedenti ad summo, medicamen etiam pro ratione adhibito, quod declinet parū in summo frigore. Quippe si auspicias, ad tali coniectura eximen ipsorum sit, facilius propriam uim eorum inuenieris. In unieris autē, in omni simplici affectu calido, quodcumq; adhibebim medicamen primo statim occurrit, frigoris sensum intrulit, id frigidum potestate est: ac multo profecto magis, si post primam exhibitionem tale perpetuo manet. Quod si prorsus calidū ipsum affectum facit, frigidum id est necessitate fuerit. Adhibendum uerō est, quum exploratur quidem, omnino tepidum. Vbi autem iam cognitum est, & gratia curationis pectur, rectius frigidum sumitur: nisi medicamen quidem ipsum, summi sit frigoris, morbus autē in summo calore non sit. Porro cum frigidum calidiusue aliquod per se, ut primū, uel nullo intercedere medio, esse dicimus, omnibus eiusmodi uerbis idem potestate significamus. Quemadmodum igitur actū calidum corpus dicitur, uel ad modum caliditatem habens, uel ut prepolleat duntaxat, uel ut collatum ad medicore sui generis, uel ad quoduis aliud, quicquid fors ipsa tulerit, sic etiam quod potestate calidum est, intelligi, probari multis modis oportet. Quo utiq; munus scēte, si quod non statim inflammatur, id aliqui, uel ad nos quidem, calidum nō esse potestate existimant. Nam siue facile concoquatur, & cito nutrit, siue admotum, uel unū medicamentum, calidum erit id ut ad hominem potestate calidum. Est enim ex his quæ ad aliqd referuntur, quicquid potestate aliquid dicitur. Quare & probatio quæ propria est, melior utique est, quā quæ ab externo pectur. Propria uerō est una in singulis, utique si celeriter tale fieri appareat, quale id esse potestate diximus. Est enim potestate ignis, quicquid celeriter in ignem uertitur. Potestate uerō calidum, ut ad hominem, quicquid homini applicatum, naturalis eius caloris uel qualitatem, uel substantiam adauget. Idem etiam & de alijs censendum est, quæcumq; potestate frigida, humida, & sicca dicuntur. In omnibus autē, tactus ipse, qui iudicaturus est, omnis acquisitū caloris frigorisq; oportet sit expertus.

Frigidum potestate
Medicamentum quale applicandum sit.

Actus potestate calidum quo tepidius dicitur.

Quæ potestate dicuntur, uicem referunt ad aliqd.
Probatio propria.

Tactus iudicatorum temperantia, dolore si expertus aliter uel qualitate

GAL. DE INÆQUALI INTEMPERIE LIB.

de inæquali in temperie, liber vnu.

Næqualis in temperies aliis in toto

nem, ut dum ex tumore aliquo præter naturam affectus sunt: tum ob solā qualitatis alterationē, quæ multarū solet accidere, atq; in octo intemperaturis, quatuor quidē simplices, quatuor uerō cōpositas, ut diximus antea, digeritur. Quod autem eiusmodi in temperies eo ab æqualibus distent, quod in omnibus in temperanter affecti corporis partibus, non in sunt æqualiter, id clarescitur. Ergo quis sit omnis inæqualis in temperie generandæ modus, in proposito libello exequi est animus. Meminisse tamē oportet, corpus quidē ipsum diuidi in maximas partes: has rursus, in alias minores: atq; illas deniq; in similes et primas, quas diuisisse in aliam speciem nō est: quæritur cōplura esse spacia inter ipsas similes particulæ, atq; his etiam plura & maiora, inter ipsas instrumentarias, cōpositas: alii quæ uerō, & in unaquolibet similitudine particula, ueluti ossē, cutēq;. At quæ mollia quidē sunt corpora, ea, quoniam sibi inuicem incumbūt, interposita spacia latere conspēctū nostrū faciunt. Quæ dura siccāq; sunt, iū hīs cernere spacia licet: sicuti ossium cauernulas, quæ plurimo humore tum crasso, tum albo replete sunt, ad alenda ossa.

Quandoquidem igitur omnī particulæ inæqualiter affecti corporis, non eadem est temperies, certē differentia ipsius in temperantem inæqualis, naturam corporū affectorū sequuntur: cum aliter simplex caro, aliter uniuersus musculus, impari temperamento afficiuntur. Quippe calida fluxio, ubi procubuit in musculum, primū maiores artenas, uenarūq; opplent, ac distenduntur. Ab his, minores: atq; ita res procedit ad minimas. In his, ubi ualenter impacta fluxio est, neque adhuc sistitur, pars quidem eius per ipsā orā, pars per tunicas transcolatur ad exteriora. Tum uerō spacia ipsa uacua, quæ inter prima sunt corpora, fluxione implentur. Sic omnia ab humore, omni ex parte incalescunt, & perfunduntur. Ea sunt nerui, ligamenta, membranae, caro ipsa, anteq; hæc, artenas & uenæ, quæ scilicet & primæ, & præter cætera, uario dolore afficiuntur. Interius namque à fluxione tum excallescunt, tum distenduntur, & diuidentur: exterius nō modō calsiunt, sed etiam premunt, ac degrauiant: appellatur morbus ipse phlegmone, quæ musculi inæqualis est in temperies. Feruet enim iam qui in eo est sanguis: ac secum excalfacit primam quidem, ac maximē, arteriarum atq; uenarum tunicas: mox omnia quæ extra has sunt, quibus scilicet circumfunditur. Ita donum alterum necesse est sequi, ut si fluxio uicerit, corruptio sequatur uictorum corporum: si fluxio sit uicta, ut musculi ad naturalem statum redeant.

Est igitur prius uicta fluxio: duplex hic incidit curationis ratio: nempe aut discussio omni eo quod in partem confluxit, aut cōcoctio. Verūm discussio, siue digestio, optanda maximē curatio est. Concoctionem hæc duo necessariō sequuntur, puris generatio, & eius in aliquod spaciū abscessio. Abscedit aliquando in capacitatem quæ proximè sunt, tum maximam, tum minimē momentaneam: qd sanè abscessionis genus optimū est. Aliis in nō momentaneam quidem, non tamen maximam. Interim in maximā, non tamen

Inæqualis in temperie, quæ multarū solet accidere, atq; in octo intemperaturis, quatuor quidē simplices, quatuor uerō cōpositas, ut diximus antea, digeritur.

Quæ potestate dicuntur, uicem referunt ad aliqd.
Probatio propria.

Tactus iudicatorum temperantia, dolore si expertus aliter uel qualitate

Inæqualis in temperie, quæ multarū solet accidere, atq; in octo intemperaturis, quatuor quidē simplices, quatuor uerō cōpositas, ut diximus antea, digeritur.

Corporis hominis diuisio.

Spacia particularia in corpore.

Inæqualis in temperie, quæ multarū solet accidere, atq; in octo intemperaturis, quatuor quidē simplices, quatuor uerō cōpositas, ut diximus antea, digeritur.

Phlegmone generatio, quæ musculi inæqualis est in temperies.

Phlegmone est morbus in musculi inæqualis est in temperies.

Phlegmone est morbus in musculi inæqualis est in temperies.

Digestio, siue phlegmone, est morbus in musculi inæqualis est in temperies.

Abſceſſum in
du diſcreti.

non momentaneam. Ac quæ in uentriculum in-
cidunt abſceſſus non optima eſt, quæ in finum e-
ius internū abit: in quem etiam plerumq; fe ape-
riunt. Mala uerò, quæ ſub peritonæum. Pari mo-
do in iſis quæ circa cerebrum exiſtunt, bona eſt,
quæ in priores uentriculos eius abſcedūt: mala
quæ ſub inuolucria ipſius, & quæ etiam in poſti-
cum eius uentrē fe recipit. Qui uerò circa coſtas
colliguntur abſceſſus, hi in capacitates erum-
punt peſtoris. At muſculorum abſceſſus, ſub eu-
tem: nuſcerum autem, in arterias & uenas, quas
in ſe continent: uel in membranā quæ ipſis pro-
cure eſt. Verū ſi uicte à fluxione fuerint parti-
culæ, in tantam inſuperiem deuenient, unde
tam eorum percat ætius, tum ipſe tempore cor-
rumpant. Porro deſinit tum primū dolere, cum
mutatrici qualitati fuerint aſimilare. Nō enim
cū mutata particulæ rēperies iam eſt, dolent,
ſed dum mutant. Siquidem dum alteraſcit, cor-
rumpiturq; natura (quemadmodum dixit Hip-
pocrates) dolores ſunt. Alteratur autem, cor-
rumpiturq; natura cuiuſque, cum uel calit, uel
frigeſcit, uel humectatur, uel exſiccatur, uel uiri-
tas eius diſſoluitur, in iſis quidem inſuperan-
tijs, quæ inæquales ſunt, ex calſcicando, uel frige-
faciendo, poſſimum: quippe cum eſſicaciſſi-
mæ qualitates hæ ſint: ſecundo loco, è ſiccando
uel humectando. Ex eſuriendo uerò, uel ſitien-
do, deficientie licet humidā, illa ſicce ſubſtantia.
Ex uulnerando, & rodendo, & tendendo, & pre-
mendo, & conuellendo, uinitate ſoluta. Ergo ſi
calor ſanguinis in particula quæ phlegmone la-
borat, eſt mitis, tum qui in toto animalis eſt cor-
pore, mediocriter tēperatus, non facile unā cum
aſſiſta particula calit. Sin uel ille ſeruet uhe-
mentius, uel qui per totum ſpargitur animal bi-
lioſus eſt, illic totus ad calorem uertitur. Multo
uerò magis, ſi ubi ambo concurrant. Porro
calit primū, qui in arterijs eſt ſanguis. Poſt hūc
uerò etiam qui in uenis eſt. Quod ſi in propin-
quo uicerī cui plurius ſit ſanguis, obſeſſa
phlegmone particula fuerit, iam celerius cum
hoc, uniuerſus qui in animali eſt ſanguis ipſum
calorē excipiet. In ſumma, quicquid facile altera-
bile eſt, aut calidū natura, id à quouis calſcien-
te primū calit. Non ſecus & ab eo quod frige-
facit, quicquid facile alteratur eſt, uel natura frigi-
dum, id primū refrigeratur. Ac promptus qui
dem, ut alteretur, ſpiritus eſt. Calidiſſima autem
natura eſt, ſuauiſ bilis: frigidiffimāq; pituita. San-
guis poſt ſuauiſ bilem maximē eſt calidus. Secū-
ti nigrā bilis poſt pituitam, eſt frigida. Quin etiam
alteratur ſuauiſ bilis leui momento, ex quouis in
eam agente. Nigrā ægrē alteraſcit. In ſumma,
quicquid tenuiſſimum eſt partium, id promptē altera-
tur. Cōtrā, cui craſſe ſunt partes, ægrē. Iam ue-
rò quæ perſipiat carent, celerius putrefcunt,
preſertim ſi calida ſint & humidā. Quare, pro uā-
rietate horum omnium quæ dicta ſunt, necel-
ſum eſt mulſariæ phlegmonum inæquales al-
terationes incidant: maximē quidem inſamma
eo qui in phlegmone eſt ſanguine: dem eo,
qui in uiceribus habet & corde: atq; huius ma-
ximē eo, qui in ſiniſtro eius ſitu cōſiſtit. Etenim
ubi totū corpus incaleſcit præter naturam, ſimul

Inſignis par-
te dolor quan-
do ſilicet.

Dolores fieri, dū
alteratur, cor-
pore natura.

Qualitates effi-
caſſima quæ
mutant.

Spiritus alterari
facile.

Flens bilis eſt
calidiſſima.

Pituita eſt frigi-
diſſima.

Sanguis qualis.
Atq; bilis qua-
liſ.

Tenuiſſimum
omniū promptē
alteratur, craſſi-
ſſimum citrā, ægrē.

Perſipiat carent
celerius putrefcunt.

ille ad ſummum calorem peruenit, cū tenuiſſi-
mum ac maximē ſpirituoſum ſanguinē habeat, &
moueatur perpetuū. Caterū in febrisbus id ge-
nus omniſus, caleſcit quidem ſanguis aliquandō
uniuerſus, & recipit calorem illum præter natu-
ram, qui ex humorum putredine eſt ortus. Non
tamen aut arteriarum, aut ipſarum nazarum tuni-
cæ, aut aliud illum circumiacentium corpo-
rum, ſuiſ prius mutauit temperem, ſed adhuc
calēſcis mutatur: quod ſi id paratur diutius, etiā
aliquando uincetur, priuſq; mutabitur. Ter-
minus mutationis cauſaſ particule, eſt functio
nis illius leſio. Ad quem uſq; terminū omnis al-
terationis latitudo, uia eſt in id, quod præter na-
turam eſt. Ergo toto hoc tempore corpus incale-
ſcens, pro modo alterationis, ad portonē ſen-
titur dolorem. Quum uerū omnes ſolidæ particule
corporis excaleſcāt ad abſolutionē iam ſunt,
euiſmodi febrem Hec ſicam Græci nōnunt, cū
non amplius in humoribus & ſpiritibus, ſed in
corporibus iſis, quæ habitura nonem habent,
comprehenſam. Hæc doloris eſt expreſſio: putitū
qui ea febrili, omnino fe nō febrile. Neg enim
eius calorem percipiunt, nimirum omniſus eo-
rum partibus ægrē percaleſcit: quum neque
etiā circa alterationem ſentienſis, neque in iſis
quæ iam ad perfectionem ſunt alterata, dolor.
Porro, quod alicubi Hippocrates ait, omnē mor-
bum eſſe nlcus, id quidem nō uique adeo alenē
uideri debet. Viciſſim nāq; unitatis ſolatio eſt. Im-
modicus autē calor, ſegregando ſubſtantia con-
tinuitatem: ſummum uerò frigus, ſtipando, ex-
primendo, & quaſſando, proſumē acceditur ut
unitatem ſoluant: id quod ceteri immediſi calor-
is & frigoris terminus cōmōdē ſtatui poterit.
Ceterū omnis immoderatus exceſſus, in habi-
tudine conſiſtit ad aliquā. Non enim pari ratio-
ne à calidis frigiditūſ afficit omne corpus. Vnde
ſit, ut aliqua animalium cōuenientes inter fe
ſuccos habeant: aliqua nō ſolum nō conuenien-
tes, ſed etiā qui ſe mutuū corrumpant: neſti ho-
mo, atq; uipera, quorū utriuſq; ſaliua alteri per-
niciens exiſtit. Ita uſiq; & ſcorpium necaueris, ſi il-
li ieiunus inſpuas. At non homo hominē, nec ui-
pera uiperam, nec aſpis aſpidem, morſu interi-
mit. Siquidem quod ſimile eſt, id cōgruum, ami-
cūſq; eſt: quod contrarium eſt, inimicum & no-
xium. Augetur enim quidq; ac nō uirritur, ſimili-
bus: perimitur & corrumpitur à diſimilib. Quo
circa ſanitaris tutela, per ſimilia perſicit. Morbo
rum ſublati, per cōtraria. Hec ſic itaq; febrem
minimē ſentit, qui ea laborat. Reſiqui uerū febrili
nulla eſt, quæ non à laborante ſentiat: ſed aliq;
magis, aliq; minus ſunt graues. Sunt enim ex iſis,
& quæ rigorem ingerant: quod ſymptoma ſit ab
inæquali inſuperie. Iam uerò accendi febrem,
& circa phlegmonem, ex ſolis humoribus putre-
ſcentibus, licet: ſicut & aliud genus inæqualis
inſuperie in toto corpore oriri, modō fulgi-
noſo uapore detento, modō exercitationibus
& piſculis laboribus calore aduulſo, modō ab
ira, modō à deuſione quouis externa, ſanguine
incaleſcente. Quod igitur inſuperie ipſa non
nunq; ſpirituoſam duntaxat inuadat partē, non
nunq; etiam ipſos humores, quod omniſus huius

Finalitiam leſio
non eſt termi-
num mutatio
cauſaſ particu-
la.

Hec ſic febrem
occupari ſolida
corpore partem.

Hec ſic febri
eſt doloris ex-
preſſio.

ſenſus non eſt
aliquæ altera-
tionis.

Morbum omniſ
eſt uiciſſim.

Viciſſim eſt muta-
tiō ſolatio.

Exceſſum omniſ
immoderatum,
conſiſtere ſe ha-
bitudine ad ali-
quā.

ſaltem inſuſ
horum inuicem
ſcorpiorum.

ſimilia omniſ,
ſibi eſſe mutuū
conueniens & ami-
cūſ.

Diſimilia, ſe
inimica & no-
xium.

ſentiat totū
lun perſimile
perſe.

Morbus per
contraria ſolu-
t.

Febriſ partem

Febriſ phono-
ſa generat.

huiusmodi febribus, si diu perdurauerint, hec-
tica superueniat febris, nemini obcurum exis-
timo. Quemadmodum ergo ex deultione accen-
ditur febris, ita nonnulli saepe ex frigore refrige-
rati uehementer toto corpore sunt: aliqui uero
etiam perierunt. Sed quod quod omnes etiam dolent,
ne id quidem latet. Dolent etiam, maxime circa

*Refrigeratio ve-
hemens.*

*Doloris causam
esse inaequalem
intemperantiam.*

Episala febris.

Lypria febris.

*Rigor absque
febre, quibus ac-
cedit.*

*Vitium fuisse
intemperantiam.*

*Rigor saepe acci-
dere circa fe-
brem.*

*Episala febris
qua dicitur.*

*Febris fieri im-
mo praefer hec-
ticam, tunc fieri ex
duplici inaequa-
li intemperie.
Tumorem uiculi
cum inaequali
intemperie.*

unguim radices, & qui ex rigore ingenti uehe-
menter perfrigerant, & cluiter sese calfacere prope-
rarunt. Quam quidem inaequalem intemperan-
tiam, quili uideat aperte quis esse causam dolo-
ris, non est quod de ceteris dubitet: nec si simul
riget & febricitat & grotantili aliqui, sentiant
humorem pituitosum, qui frigidos esse, multum
amarum bili, quae est calida, moueri per sensibilia
membra: ut in episala febribus, in quibus simul
ambas qualitates contrarias intra corpus ager
sentire uidetur, cum nimirum calidum ipsum &
frigidum, per id genus febres, tenuissimis por-
tionibus asperguntur, adeoq; misceantur inui-
cem, ut ne minimam quidem unius sumere pos-
sit particulam, in qua alterum * non sit compre-
hensum. In ipsa tamē accessione inuafione, non
nulli & riget & sicut: atque intus quidem, & in
ipsis uisceribus, magni incendii: in externis au-
tem partibus, frigus maximum sentitur. At tales
febres sunt, quae graecis lypriae uocantur, atque
ardentium febrium quoddam perniciosissimum ge-
nus. Quinetiam his qui rigent, nec tamen febricitant,
inaequalis temperamentum adeit. Rarum tamen
est id symptoma, licet tum mulieribus, tum ui-
ris quibusdam accidat, ubi aut defecit uita, aut co-
tinua ciborum copia praesensit. Porro antiquis
nemo, ut uidetur, ita est affectus, cum neque
adeo otiosi, nec in uictus fastidit tunc uiue-
rent. Unde factum est ut scripsissent ueteres me-
dici, rigori febrem necessariū superuenire: tamen
etiam saepenumero rigorem uidimus, quem nul-
la sequuta sit febris. Componitur autem ex hac
intemperie, & ea quae febrentium est, epusala.
Appello ita febre illam, cui ambo semper simul
accident. Nam in qua rigor quidem praecedit, fe-
bris sequitur, uelut in tertianis & quartanis,
hanc episalam non uoco. Ita ex duplici inaequali
intemperie epusala componitur, atque etiam aliae
ferē omnes febres, praeter heclicas. Pariter & qui
particulae alicuius cum tumore sunt morbi, hi
quoque omnes cum temperamento inaequali cō-
sistunt: ut cancer, erysipelas, carbunculus, her-
pes, oedema, phagedaena, gangrena: differunt ta-
men, pro ipsa fluxionis diuersitate. Siquidem
qualis fluxio fuerit, talem praeter naturam tumo-
rem gignit.

GALENI PERGAMENI de optima corporis constitutione, liber Vnus.



Vandoquidem temperamentū ex
calido, frigido, humido & sicco, de-
finitum congruenti mensura, simi-
lariū membrorum exult mensura: no-
stri autē ex omnibus his constru-
ctio, positio, magnitudo, figura, & partium
numero constituit: concedendū iure est, corpus
aliquod, licet ex plurimis opinione temperans parti-

*Similariū par-
ticulae quae
fuit.*

culis compositū sit, secundum tamen ipsarū ma-
gnitudinem, aut numerū, aut figuram, aut mu-
tuum inter se consonantiam, nonnulli posse utriq;
contrariere. Porro, ut à cōmuni nonione exordia-
mur, saluberrimum corpus omnes uno ore lau-
dant: necnō id quod Graeci *εὐκτατα* uocant,
hoc est, optimo habitu praeditum: idq; ad uocem,
eandem rem respicientes. Quippe omniū ip-
sius corporis particulariū functiones esse robu-
stas aut, nec à morbidis causis facile uinci pos-
se. Ceterum cum ipsae particulariū functiones se-
cundum naturam prompte obeunt, sanitas est.
Vbi uero id cum quodam etiā robore praesentat,
bonus habitus dicitur. Cōmune autem utrisq;
est, nō facile morbis succumbere. Quare bonus
habitus, omnium illa saluberrima cōstitutio acci-
dit, quam uniuersi percipiunt: cuius accidens
& mensura est, in obeundis functionibus stre-
nitus, atque constantia. Quae ratione merito bo-
nus habitus appellatur. Meminisse autem oportet,
nostra corpora ex miscella quatuor elemen-

torum consistere, uariatasq; esse partium tempera-
turas: ad haec, singulis organicis membris unicam
in esse particulā, cui tota actionis causa tri-
buitur: cuius gratia reliqua omnia creata sunt,
quae totum cōpleant instrumentū. Quibus prae-
missis, erit optima corporis cōstitutio ea, in
qua similes partes propriam temperiem possi-
dent, necnon cuiusq; instrumentariū compo-
sinitio ex illis, secundum ipsarū magnitudinē,
numerum, figuram, mutuūq; inter se conue-
nientiam, certa quadam & exacta mensura consti-
tuta fuerit. Quocirca id tale corpus optimē sua
fungetur actionibus, ac proinde aliorū omniū
& firmissimū erit, & minimē grolabatur in mor-
bos. Siquidem uniuersis causis morbidis tam
extrinsecis quam intrinsecis facile relabatur,
quod omnino ab utrisq; extremis recedat, adeoq;
optimis succis abundet, ut tristitia, iras, uigilias,
curas, imbes, equalores, & pestilentiam, aliis o-
mnibus ferat multo facilius. Nam quae maxime
uitiosis succis redundat, facile ab huiusmodi cau-
sis tentant, neque quae per se iam morbis proxi-
ma sint. Quoniam autē sanitas extendi in satis am-
plam latitudinem potest, non solum in hoc com-
mentario corpus illud absolutissimū, quod raro
inuenitur, & tanquā Polydetti regulae exem-
plum est, debet esse cognoscere, sed eorū etiam memi-
niscere, quibus cum quotidie uersamur, quare ab
eo breue aliquid deficiunt, nō tamen adhuc in-
signem admodum lapsum sunt nacta. Quod igitur
exquisite bona temperie praeditū est, mediū
sanē locum obtinet inter molle & durum, & in-
ter luscitū & glabrum: pariter neq; amplius, neq;
angustius est uetus, nec pulchius magnis aut par-
uis recedere à medio critate uidetur. Quod uero
undecunq; exacta in instrumentariis particulis
mensura constat, id tanquam Polydetti est regu-
la. At ea corpora quae iam calidiora sunt, plus
quam par sit, non tamen admodū multo, pariter
etiam quae frigidiora, humidiora, & sicciora
modice, et si parte unam nō recte efformatū ha-
beant, corpori tamen symmetro nonnullū praes-
tare uidentur. Quippe ubi id genus corpus mode-
rato durus euasit, aduersus omnes externas

*Notio cōmuni,
saluberrimum
corpus.*

*Sanitas quae
dicitur.
Habitus bonus
quid dicitur.*

*Corpora nostra
constare ex qua-
tuor elementa-
rum miscella.
Instrumentariū
singula inesse
particulam uid
causam tota ac-
tionis tribuunt.
Cōstitutio opti-
ma quae.*

*Vitiosus succus re-
dundans a cor-
poris, facile à
causis morbifi-
cis efficitur.
Sanitatis esse la-
titudinē ampliā*

*Temperatissimi
corporis nota.
Polydetti regula*

*Durius modera-
to corpus aduersus
fuerit: ut si
sua firmius red-
dit: mollius, ad-
uersus internas.*

causas, firmitus ac tutius redditur. Vbi uero mollius, aduersus internas. Atque eadem ratione ubi densius fuerit, externis magis resistit. Vbi uero rarius, ab internis minus offenditur. Raritas siquidem corporis, quibus plus recrementi per distillationem educitur, salubrior existit: quibus uero minus, insalubrior. Nam ab omnibus externis causis facilius corpus raram oblectatur. Corpus autem quod exquisitissima cōstat mensura, nec rari, nec densum dici potest, sed in medio prorsus consistit. Cui quidem utrumque excedens corpori praeestat secundū aliquid. Quod enim densius est, magis ab exterioribus causis est tutum: quod uero rarius, ab interioribus. Vtriusque autem quod ex aequo resistit, planē non inuenies. Sed mediocriter ita resistit, quod inter omnes excessus est mediū, quodq; omnī etiā corporum saluberrimū esse censemus. Quare id singulis excedentibus mediū, secundū aliquid est deterius: collectum uero omnī optimū, & maxime eligendum uidetur. Quod autem corpus ipsum, quod tum similibus, tum instrumentis particulis optimē constitutum est, uel paruum, uel magnū, uel mediocriter necessariū esse nō debeat, hinc discas licet, quod magnū quidem, ob humoris, uel materiae multitudinem: parū autem, ob siccitatem, aut ob materiae penuriam efficitur tale. Potest itaq; aliquod corpus & pulcherrimum, & optimē temperatum effici, quantūcumq; magnitudinē sortitum id fuerit. Augmentum enim fit, quousq; ossa confirmantur: confirmantur autem, in exigua magnitudine, ob materiae defectum, uel ob siccitatem: ita ut simpliciter neq; magnitudo, humiditatis indicium sit, neq; paruitas siccitatis, nisi aut magnū molle, aut paruum etiam sit durum. Quamobrem optimā constitutionē in his duobus merito collocabimus, moderata scilicet consimiliū particularū temperie, necnō ex aequo in instrumentalium mensura.

Raritas corporis quibus salubrior est insalubrior.

Densius corpus magis esse ab exterioribus causis tutum.

Medium requiritur corpus, ecce densius minus cretius, secundum aliquid est deterius.

agnū corpus, unde fit tale. Paruum corpus unde fiat tale.

Magnitudinem uel conferre ad optimā constitutionem corporis. Augmentū fit, quousq; ossa confirmantur.

Optima corporis constitutio in quibus consistat.

GALENI PERGAMENI de optimo corporis habitu, liber primus.

Habitus de quo hic dicatur.

Habitus simpliciter bonus.

Habitus ut simpliciter bonus. Senectas latitudinem habet. Habitus bonus est sanitatis instrumentum. Athletarum habitus periculosus.

Habitus simpliciter bonus, uel si ad summam perueniat, omnino affectibus resistissimus. Habitus simpliciter bonus, cui simpliciter bonum, inueniuntur, dissimulantur.

Habitus nomen de omni fixo & uix solubili prouinciat consueuimus: nihil adhuc magis laudātes, uel improbantē. At cum bonum habitū aut malum dixerimus, iam rē quam lem nam habitū dicamus, distinguimus. Quippe bonus simpliciter habitus, optimam corporis constitutionem sequitur: eum uero qui non simpliciter bonus sit, in quacūq; corporis natura reperire licebit, aut simpliciter, aut ad aliquid relatum. Igitur quum sanitas latitudinem habeat, intensiorem quidem ipsius medici bonum habitum uocant: lapsum uero nondum non mine proprio appellatur, sed perinde ac genus ipsum, sanitatem nuncupauerūt. Itaq; bonus habitus optima quēdam sanitas est. Ceterum habitus Athletarum, non est simpliciter bonus habitus, ac proinde periculosus existit, si ad summam peruenierit, quemadmodum dixit Hippocrates. Nam bonus simpliciter habitus ad summum botutatis perueniens, omnīū erit corporis affectuum tutissimus. Porro tam bono simpliciter

placiter, quā ipso Athletarum habitui, bona omnīū particularum temperies cōmunis est: ut enam functionis robur, atq; succorum bonitas. Interest autem, quod in habitu simpliciter bono, sanguinis cōmoderatio, ac totius solidarum partium molis, habeatur: in Athletico autem, horum ipsorum, ponsamumq; carnosī generis, excellens sit copia, ratione cuius periculū necessariū sequetur, si in summo consistit, ne aut exstinguatur, & suffocetur calor innatus, ob plenitudinē illam exuberantem distillationem prohibita, aut aliquod ex praecipuis uasis rumatur, quae in pulmone, & in iecore, & in thorace sunt sita. Siquidem sanguis ipse, tum ob naturalis caliditatis copiam, tum ob actiōis perpetuitatem, necnon ob incrementum assiduū quasi effluens, ipsorum uasorum tunicas, ut mustum doha, disrumpit. Hec igitur omnia, nec non repentinē omnium functionum resolutiones (ut paucis docuit Hippocrates) necessariū immoderatas repletiones sequuntur.

GALENI PERGAMENI de animae morum & corporis temperamenti mutua consequentione, liber primus.



Vemadmodū ex cibo & potu, nec non ex quotidianis exercitationibus, bonam corpori conciliamus temperiem, sic etiam ex hac, ad uirtutem animae comparandam, nihil emolumentū atrulerimus: id quod certē in actionibus atq; uniuersis affectibus, qui secundum tres animae species, ob temperamentorum diuersitatem maximē in puellis differunt, liquidiū constat. Alij enim timidissimi sunt, alij audaces, alij inexplēbiles, alij sobrii, alij uerecundi, alij deniq; admodū impudentes. Ex quo quidem in illis morū discrimine, ratione concludere aliquis poterit, non eandem omnibus animae naturam, siue substantiam, inesse. Nam si substantia animae esset illis per omnia similis, easdem utiq; affectiones agerent: eisdemq; ob causas similes, afficerentur affectū. Quare haud dubie pueri tantum inter se animorū essentia differunt, quantū proprijs actionibus atq; affectibus discrepant. Quod quidem cdm sic habeat, facularibus quoque differunt. Porro singulorum quae sunt, effectrix quaedam causa est, quae ad aliquid referri intelligitur, cuius nomen per se est inditum. In quadam autem a seipsa ad gentis relatione, genti faculas conuenit. Quocirca tot facularibus substantiam, quot etiam actionibus, esse praedicam dicimus. Siquidem quia alio (exempli gratia) uires habet purgandi, os uentriculi roborandi, cruenta uulnera glutinandi, plena ulcera solidandi, & humidas palpebras excedidi, tot facultates, quot etiam opera, profuturū ipsam fortiori. In uniuersum autem, animae species sunt tres: rationalis scilicet, irascibilis, & appetitoria. Quarum quidem illa prima (quam etiam intellectūcū uocamus) ueritatis, scientiae, disciplinarum, atque, ut summam dicam, honestorum omnium desideratrix est, secundum desiderij commune

Repletiones immoderatas quae sequuntur.

Temperim optimū unde conciliemus.

Temperim prae bonum esse ad uirtutem animae.

Pueri morū diuersitatem.

Anima substantia nō eadem omnibus ingit.

Effectrix causa.

Substantia est ut facularibus, quot albidus praedicam. Alia substantia.

Anima species tres.

Rationalis enim quae appetit.

Frigiditatem ad-
versam omnib.
animæ adhiben-
bus.
Animam totam
corporeâ susti-
nere Galenus.

Malum est no-
minis verò, Ple-
to afficit.

Animæ vires si-
que temperem
mentem, Aristote-
les ait.

Mores signati
ex figura partium
Aristot. ait.

Septentrionalis
lunæ mores esse
agrestissimos.
Asia, Asiaticis
mores, magis
grævis comites
dantur.

Mores signi plu-
rimus naturam
regionis.

Formidulos esse
quibus rubra et
terra rebovent
pulsat.

Inaccediam ea-
lorum abundan-
tia excitat.
Strupidos frigidi
tas efficit.

Vina citra duo-
decimum aënis
partes Plato in-
terdicit.
Vina lenia ac-
tatem senectutis

Vinum senibus
esse visum.

Vinum aduersum
per excelsitatem.

Vinum quibus in
bellum Plato.

id non ob ficitatem, sed ob frigiditatem acci-
dere: quæ omnibus animæ actionibus officit.
Ex hoc igitur ingens mihi iam oboritur suspicio,
ut totam animæ substantiam esse corporeâ
credam, quod interdum non modo pereant in-
genitæ animæ facultates, sed etiam alie contra-
riæ illis introducantur: ut dum cernere quæ nō
cernuntur, audire quæ non audiuntur, sese quis
arbitratur. Quo pacto enim ea quæ ipsi cum
corpore intercedit necessitudine, in naturâ pla-
nè cōtrariam transire possit, nisi aut qualitas ali-
qua, aut forma, aut affectus, aut facultas corpo-
ris esset? Porro ex utinoso corporis habitu lan-
guere animâ, ac nemini sponte esse malum, sed
ex prauam habitudinē corporis, & rudem edu-
cationem: ac promde nec debere turpia vituperari,
professus quidem est Plato in Timæo. Aristoteles
autē, secundo de partib. animalib., ipsius animæ
vires, materni sanguinis sequi temperiē
existimat. Qui rursus, primo de hystoria animalium
inuit, instrumentariarū partium figuratio-
nem, animæ moribus accommodari: ac proinde
ex illa recōditos hos cognosci. Hippocrates etiā
in libro de aquis, aëre, & regionibus, ait, eos qui
plagam Septentrionalē incolunt, aut enā mō-
tana loca, agrestissimis esse moribus præditos:
Asiam autem regionibus cæteris longè dementi-
orem existere, in eay omnia multo meliora &
grandiora nasci: necnon mores hominū rum mi-
tiores, tum ad agendū præptiores esse, ob opti-
mam Asiaticā celi temperiem haberi tamen illic
magis imbelles homines, quā in Europa. In
summa uerò, species & mores hominū aut ple-
rumque naturam regionis sequi: calido autē, frigi-
do, humidio, & sicco, unam agerem differre ab
alia. Alibi etiam tradit Hippocrates, quibus cu-
biti uena (ueteres enim arterias etiam uocabant
uenas) uehementē ederet pulsationem, eos ho-
mines fures existere: & merito quidem. Nam
proximitia in corde abundantia caloris, ita uelut
menter mouentur arteriæ: fures autem atq;
iracundos, caloris abundantia efficit. Strupidos
uero, graues, & pigros, temperaturæ frigiditas.
Hippocrates itaq; uoluit, non solum iracibiles
appetitorie partis animæ, sed etiam cogitati-
cis vires & facultates, corporis temperaturæ ad-
herere, atq; illam omnino sequi. Nec secus Plato,
ex terræ diuersis habitationibus, ex uario spi-
ritu, ex insolationibus, ac deniq; ex uarietate nu-
trimentorū, non solum ipsorū corporū, sed ani-
morum etiam proficitur nasci diuersitates: tem-
peramento scilicet ipso (quod subintelligere o-
portet) intente. Quare pueris quidem ci-
tra duodecimū annū prorsus uino interdicit,
secundo de legibus: idly ne in uenem agantur.
Prouectis autē, ut ipso utantur, permittit: quip-
pe quod aduersus acerbitatē senectutis remedi-
um sit, animiq; mercores discutiatur, ac deniq; durio-
res mores emolliat. Etenim iuuenilis ætas cali-
da est, ac multo referta sanguine. Cōtrā senilis,
& frigida, & sanguinis inops. Propterea senibus
uini potus utilis est: ipsi autem qui crescit, aduer-
satur q̄maximè. Iam uerò neq; in exercitu per-
mittebat Plato ut uinum gustarent milites, neq;
in ciuitate ipsā seruificati neq; principes, neque

administrantes rempublicam, neq; iudices, neq;
hi breuiter, qui de re aliqua essent consultaturi:
quod nimirum ueluti quidam tyrannus animæ
facultatibus imperet. Sed neq; interdum, nisi aut
exercendi corporis, aut tollendi morbi gratia,
permittit unquē uini potione: neq; item noctū,
dum liberis nauandæ esset opera. Pro uirili autē
esse enitendum singulis, ut alimento, studiis, &
disciplinis simul & uitium fugerent, & uirtutem
ipsam caperent, idem professus est. Ceterum
qui cunctos homines uirtuti comparandæ ido-
neos, & qui nullum iustitiam amantem esse arbi-
trantur (quod est nullū naturalem finem statuere)
utriq; hominū naturam ex dimidio tantū
cognouerunt. Neque enim omnes iustitiam hostes,
neq; omnes amatores nascunt, ob corporis tem-
peraturam utriq; tales geniti. * Ac sanè qui talia
astruunt, subinde perunt: quod uidelicet iure quip-
piam debeat laudari, uituperari, odio haberi,
aut amari, cū bonus aut improbus nō suo pte
ingenio, sed à temperatura sit factus, quam ab
alijs causis quicq; accepisse deprehenditur. Quia
(scilicet respondebimus nos) omnibus loc non
bis inest, ut amplectamur bona, ambiamus, a-
memus: malum abominemur, atq; procul arce-
mus, ignorantes adhuc, genitū nē sit tale, an mi-
nus. Scorpions enim, phalangia, uiperasq; neca-
mus, cū tamē à natura, non sua sponte, talia
creata sint. Primū etiam, maximumq; Deum nō
genitum Plato asserens, bonū tamen illum esse
pronūciat, nosq; ipsum talem ab æternitate, nō
ex seipso bonū effectum, natura duce colimus,
& amamus. Prorsus enim nullo unquam tempo-
re genitus est, omnibus seculis increatus, semper-
ternusq; existens. Merito itaq; malos odimus,
causam cor mali existant, necdum præmeditati.
Bonos uicissim, siue natura, siue institutione &
doctrina, siue honesto uitæ exercitio probitate
sint affecti, recipimus, atque amore prosequimur.
Quocirca Stoicos admittit, qui homines
uniuersos ad uirtutē adipiscendam liabiles esse
opinantur, sed ab alijs quibus cum uiuunt, à re-
cto itinere detorqueri. Haud quidē dicere po-
terunt, qui omniū hominū primi geniti sunt, à
quibus nam deprauati fuerint, ante se nullam al-
lium habentes. Videmus enim pueros complures,
hisdem parentibus ortos, ab eisdem præcep-
toribus educatos, hisdemq; alimentis ufos, natu-
ra tamen quædam uitiorum semina, & tanquam
igniculos delitescere: nec tam nobis à uitiis alio-
rum, quā uitiorum incrementis restinguere
& coercere esse opus. Non enim (ut fert Stoico-
rum opinio) totū extrinsecus in gruit in nostros
animos uitium, sed plurimū in ipsis uitiis ho-
mines causæ habet. Quod extrinsecus aduenit,
longè minus est. Proinde sanè consuetudine præ-
ua accedente, secundum partem anime ratione
carentem,

Vinum impera-
torem a facul-
tibus, ueluti quod
dam tyrannum.

Inclinatio ho-
minum ad con-
mendam boni-
tatem, corrupta
vituperanda.

Deum non geni-
tum, ab æterni-
tate, non ex se, ho-
minis existit.

Stoici sui gen-
itales Galenus.

Homini genus
non fuisse ab æ-
ternitate, ueluti
tamen Calenus.

Præterea pueri
esse natos
ad uirtutis pro-
pensionem.

Possidenda ego-
gia, iusticia.

Citiusculi qui-
bus possit ad be-
niam mori-
vel prauitatem.

carentem, prauū reddunt: falsis autem opinio-
nibus, secundum intellectum pariem imbui-
mur. Sicuti dum à bonis, syncensibis uiris instrui-
mur, opiniones quidem ueræ sunt, mores autē
humani. At in cogitante animæ parte, intelle-
ctio, stultitiæq, ratione maioris minorisq, euan-
tes, corporis temperaturæ sequunt. Ipsæ au-
tem temperaturæ, primam in utero generationē
& cibū probos succos parant, habet autorem:
atq; hæc mutuo sese & adaugent, & fouent. Cal-
ida namq, exempli gratia, temperies, iracundos fa-
cit: inde rursus iracundia ingenitū calorem accen-
dit, & igneum reddit. Contra quæ mediocri tem-
peraturæ constant, mediocriterq, commoti ani-
mo, ad probos succos gignendos proficiunt.

GALENI PERGAMENI de naturalibus facultatibus li- ber primus.



Vandoquidem sentire & moueri
secundum electionē, propria ani-
malium sunt: augeri uerō, & nutri-
ri, plantis etiam cōmuniæ: erunt u-
tiq; priora quidē, animæ, postero-
ra uerō, naturæ ipsius opera: quare animalia ip-
sa, simul & ab anima & à natura gubernari dici-
mus, stirpes à sola natura. Quoniam hæc etiam
animā uegetariem aliquis imbucere liuid im-
meritō poterit, distinguens illā à sensitiue, quæ
animalibus inest. Porro cum corpus aliquod ab
iis sub quibus antè fuit in nullo est immutatum,
quiescere id dicimus. Quod si in aliquo ab iis re-
cessit, etatenus id moueri. Vbi igit corpus ipsum
ab una in alterā qualitatem mutatur, ut ab albo
in nigrū, aut à frigido in calidum, motū ipsum
alterationem uocamus: estq; unū morus genus.

Alterum genus in corporibus iis est, quæ situm
mutant: cui generi latro nomen est. Atq; hi qui-
dem duo motus simplices & primi sunt: actiō
uerō & diminutio, ex his compositi. Illa, cum ex
minori maius fit: hæc, cum ex maiori minus: pro-
pria scilicet utrobique seruata forma. Alij autem
duo ab his motus sunt, generatio & corruptio:
illa quidem ad substantiā productio, hæc illi cō-
traria. Omnibus iis motibus cōmuniū est prioris
status immutatio: sicuti est duobus quonibus,
prioris status conservatio. His præmissis, inqui-
rendum jam nobis est, quot & quæ naturæ sint
facultates: nim, quod opus edere singule earū
sint naræ. Porro opus appello, quod iam factū
atq; completū per actionē est: ueluti sanguinē,
carne, neruū. Actionē autē, ipsiū actiui motū.
Causam uerō, à qua hæc procedit, facultatem.

Enim ubi cibis fit sanguis, passus quidē ci-
bi, actiui uerō ipsius uenæ fit motus: quæ actio
nem licebit nbi appellare naturæ opus, nō tamē
opus ipsum, actionem. At mihi quidem tam ue-
na, quam reliquarij particulari lingule, ob cer-
tam quandam temperiem quæ ex quatuor sunt
qualitatibus nascit, hoc uel illo modo uidentur
agere. Quasq; Aristoteles, atq; ipsum Stoici secu-
ti, calido & frigido omnem actionem tribuunt
siccum & humidū propter panentibus iis subijci-
tū: cum tamen satis fuisset omnium particularium

causæ ad ipsas quatuor qualitates reducere. Nā
tametsi in animalibus & stirpibus calidum & fri-
gidum magis agere, siccum uerō & humidū pa-
ti, uideant, nō ob id tamen sic res habet in omni-
bus. Cæterū omnis potentia siue facultas, in re-
latione ad aliquid intelligitur. Primum siquidem,
actionis ipsius potentia est causa, dein etiam o-
peris, ex accidenti quodam: quare & si causa ad ali-
quid est, potentia quoq; in relatione dicitur ad
aliquid, nimirum quia cū sit. Cuius quidem

agentis causæ substantiam quandū ignoramus,
facultatem eam, siue potentiam, appellamus: in
uenis quidem potentiam quandam sanguificā,
in uentriculo concoctricem, in corde pulsato-
riam dicentes. Incipiendum itaq; nobis ab ipsis
operibus est, si certa ratione & uia, quot & quæ
facultates sint, inueniri sumus. Singula namq;
opera, ab aliqua procedunt actione. Hanc uerō
omnino aliqua præcedit causa. Ergo naturæ o-
pera dum adhuc in utero gestantur, ac finguntur

animal, omnes corporis sunt partium. Editio ue-
rō in lucem, cōmune in omnibus naturæ opus
est, earū ad magnitudinē perfectam perductio.
Postea uerō, etiam ut omnes perdurent, mō-
tuo. Actiones quæ tribus hæc operibus respon-
dent, necessariō tres sunt, una scilicet cuius gene-
ratio, actiō, & nutritio. Verum generatio, sim-
plex actio naturæ nō est, sed ex alteratione & for-
matione cōposita. Siquidem alterari oportet, et
singulis materiam ipsam, ut ex ea gignat animal.

Actiō uerō, solidariā ac iam formatarū anima-
lis particulari augmentum, ampliatioq; in lon-
gum, latum, & profundū est. At nutritio, ipsam
partibus appositio quædam est, sed sine am-
pliatione. Ergo primō omnium agamus de ipsa gene-
ratione. Proiecto in uterū, aut etiam in terram
semine, statim quibusdam temporibus, multæ cō-
stantur partes eius quæ gignunt substantiæ, hu-
miditate, siccitate, calore, & frigore, cæterisq;
omnibus, quæ hæc sequuntur, qualitatum (hoc est

taetilibus, atq; iis enī quæ gustu, odoratu & ui-
su diiudicantur) inter se differentes. Quocirca
primas & elementares alterationis facultates re-
quiris, hæc sunt, humiditas, siccitas, caliditas, &
frigiditas. Si uerō eas quæ ex his inter se mis-
tuntur, tot sanē omni in animalis erunt, quot
fuerint in eo sensibilia elementa, hoc est, simi-
les particule: quas nimirum in prima animalis
generatione, natura creat, ipsa generatrice, alte-
ratriceq; potentia. Propriū autē uniuscuiusq; ui-

siferis corpus, si ab eo uenas, neruos, & arterias
exueris, simileq; simplex, atq; cōpositio nis
est expers. Cæterum si quæ organa ex geminis
constant tunicis, sed simplicibus & dissimilibus,
horum ipsæ tunicæ elementa sunt. Atq; in utraq;
tunica sua quædam alteratix uis est, quæ ex men-
stuo sanguine eam particulam generat. Itaq;
alteratrice facultates in omni animalis genere
tot membratim erunt, quot habet in se elemen-
tary particulas. Sed & actiones propriæ cuiusq;
membratum particule necesse est esse, quemad-
modū & usus. At alteratrices nature facultates,
quæ particulares sunt, omnes tunicarū & uentri-
culi, & intestinorū, & uteri substantiæ, grælis est,
esset: erunt cōpagem uerō, formamq; formatrix

Facultas omni
in relatione est
sua ad aliquid.

Veni inest fa-
cultas sanguis
fca.
Cordi inest
rem passio
nam.

Partes corporis
naturæ esse
naturæ opera.

Aliter nato-
re tres genera-
tio, actiō, nutri-
tio.
Generatio est
si actiōnem cō-
positam.
Actiō quid sit.

Nutritio quid.

Generatio
proposita.

Facultates ele-
mentares primæ,
quæ.

Facultates ex
primis cōpositæ,
quæ.

Elementa sensi-
bilia sunt simi-
lari particule.

Alteratrice fa-
cultates tot un-
iuscuiusq; mem-
bratum particule
sunt.

Formatrix fa-
cultas.

Temperies quæ
sequantur.

Temperies cal-
ida iracundos
facit.

Iracundia ignem
reddidit calorem
infiam.

Animalium pro-
pria.
Plantis cōmuni-
a cum anima-
libus.

Animæ opera.
Naturæ opera.

Animalia gu-
bernari ab ani-
mā et à natura.

Serpens diffusa
est à sola natura
Stirpibus carni
anima regu-
latur.

Alteratio.

Latro.

Actio.

Diminutio.

Generatio.

Corruptio.

Opus quid
dicatur.

Actio quid.

Causa quid.

Partes omnes a-
gere cōparantur
tatione, quæ
producit sunt.

quas quidem cūm etiam feratur sanguis, quod
ferofum eius, & tenue est, id per renes, seu per co-
latoria quædam transibit (non quidem consecra-
tione ad id quod uacuatur, qualiter Erasistratus
existimauit, sed ob renum facultatem tractricē,
alioqui nulli ex renetra urina perirent) quod ue-
rō sanguinem & crassum, id coercetur, ac per
uenerisum corpus regetur. Non est autem di-
uersa ratio, qua urinx per renes in uesicam fe-
runtur, & qua sanguis in omnes animalia par-
tes: neque etiam qua staua fecerunt bilis.

GALENI PERGAMENI
de naturalibus facultatibus liber
secundus.

QUOD necesse quidem sit fateri uim quandā
in renibus esse, quæ huiusmodi qualitatē,
qualis in urina percipitur, ad se trahere sit
habilis, superiori monstrauius libro. Qua ni-
mirum facultate cor etiam, unicū ex ijs quæ post
icor habentur, in dextero proculdubio sinū,
suum alimentū trahit, deinde per arterialem ue-
nam ad pulmonem transmittit. Reliquorū quip-
pe nullum, nec Erasistrato quidem ipsi, nutrirī
ex corde placet, propter eas, quæ super uasis cre-
sunt, membranas. Iam uerō, qui pro tenuitate,
aut crassitie & humorum, latitudine autem, aut an-
gustia meatuū, fieri aiunt ipsam humorū segre-
ganonem, hi nobis rationem reddant oportet,
cur urina, quam bile effe tenuiorē constat, in bi-
lis uasis nō infuit. At certē nullam aliam redde-
re poterūt, præter facultatem illam à natura uni-
cuique instrumentum statim ab initio tributam, sine
qua durare animalia nō poterūt. Siquidē nec ui-
uere, nec durare uult animalium, uel breuissimo
tēpore fas erit, si tot in se particulas, tamdi di-
sidentes cūm habeat, nulla facultate utatur, nec quæ
conueniens tractat, nec quæ alienū fecerit, nec
quæ id quod nutrat alterabit. Quibus quidem
facultatibus utitur natura illa, quæ particulas ef-
fingit, easque sensim adauget, atque omnino est per
eas totas extēdit: quæ sanē totas per totas, sin-
gat, nutrat, atque auget, ueteri semper ipsius ma-
terix forma mutata: quo uel maximē nomine

diſſert natura ab ſtatuaria, quæ foris quidē ma-
teriam ipsam adornat, intus autem illaboratur
atque neglectam relinquit. Pluidas siquidē ex ce-
ra efflicere ebur, aurumue nō potuit, sed neque ex
auro ceram: quippe horum quodque manens id
quod à principio erat, foris tantū speciem artis
adeptū, perfectā sit statua. At natura, nullius ma-
terix ueterem formā seruat: alioqui sanguis om-
nino essent cunctæ animalis particule, is scilicet
qui à matre cōcipiente conſtitit ad matris ſe-
men, inſtat ceræ cuiuspiam, atque unus & unifor-
mis materie, artiſci ſubiectæ. Nulla autem ani-
malis particula ex ea ipſa materie, ſit ita rubea,
humidaque, ſicuti eſt ipſe ſanguis. Nam os, cartila-
go, arteria, uena, neruus, adeps, glandula, mem-
brana, medulla, exanguia quidē ſunt omnia, licet
cōcreta ex ſanguine, uidelicet materiali prin-
cipio. Semen uerō cūm ſit efflicere animalis prin-
cipium, trahendi ſanguinis poſideat facultatē,
nō ſecus q̃ magnes ferrū. Quare primō quidem
competentem ſibi ſanguinem attrahet, quem &

facile uincere, & celeriter aſſimilare, & ſibi nutri-
mentum facere poſſit. Mox arſuor ſecūdō attrahet,
& tertio, quō ſcilicet ſibi molem magnā di-
menſiſſimā ex nutritione adiciat. Vnde iam
alteratix inuenta uis eſt. Tertia uerō formatrix
apparebit: cuius ope ſemen primū uelut cōcre-
tum quiddam tenue, membranam illam ſibi in-
duidit, quam Hippocrates ſexta die cūm ſetu, Mu-
ſicæ cūdam mulieri oſuorū tunice ſimilem exci-
diſſe ait. Poſt hoc uerō reliqua etiam quæ ſcripſi
ab eo, in libello de infantis natura, ſunt ſcripta,
ſingit. Cæterū cūm augeri illa poſt formatio-
nem cōueniat, id proſectō aſſequenti, tum in om-
nem extēta partem, tum uerō nutrita. Cor igitur
ab initio ita mihi paruum eſſe, ut nihil à mi-
liſi ſemine, aut ſi maius à ſaba diſſet, intellige. Au-
gentur porrō ea tantū, quæ uiuunt, quorum ni-
mirum formæ perfectæ iam ſunt. At eius quod
ſit, proceſſus ille qui eſt ad formā, non utiq̃ au-
ctio, ſed generatio nominal. Siquidem augetur
id quod eſt: gignitur quod nō eſt. In uniuſum
autē deridenda Erasſtrati eſt opinio, diſcis a-
tractionē fieri ſucceſſione continui ad id quod
uacuatur. Quæ ratio, tantū ſuccedere cōtinui ne-
ceſſariū facit, quantum eſſuit. Hoc uerō iſi qui
cōmodo ſunt corporis habitus, ſatis ad nutritio-
nem eſt: utpote quibus ea quæ apponuntur, iſs
quæ eſſiunt, paria eſſe oportet. At in iſs qui ad
ultimum ſunt graciles, ac liberaliter reſici poſtu-
lant, niſi multo plus ſit quod apponitur, quā
id quod uacuatur, priuſquam reſitui habitus non
quam poterat. Liqueat igitur, quōd tanto plus
ſunt hi attrahituri, quanto etiam pluribus egent.
Trahit itaque nutrimentū, non ſucceſſione conti-
nui, ad id quod uacuat, ſed perinde ac à magne-
te lapide ſerum, qui ſcilicet talis qualitate tra-
hende uim habet. At uerō diſtributionis prin-
cipium expreſſio uentriculi præſtat: reliquū autē
eius progreſſum omnem, tum uenæ ipſæ cōſe-
cutæ ac propellentes, tum ſingula quæ nutritiū
ad ſe trahentia. Quare improbe Erasſtratus li-
lucinat, dum horum omnium cauſam ſucceſ-
ſionem illam ad id quod uacuatur, ſtatuit: ſicuti
erit ubi ex ſecnoris ſcirrho gigni ſemper hydro-
pem ait: id quod certē hominis planē eſt ſecor-
dis. Siquidē ex diuturnis hæmorrhoidibus, uel
ſuppreſſis, uel immodica profuſione, hominem
ad extremā frigidiſſatē ducentibus, nō ſemel au-
bis, ſed ſæpe iam aquam intercutem collectā uidi-
di. Sicuti mulieribus quoque tum menſtrui pur-
gationis omnimodo ceſſant, tum immodica ua-
cuatio, ſæpe hydropem accerſiuerunt. Nonnul-
lis uerō earum, & qui mulieribus uocatur fluxus,
in hunc terminatus eſt morbus: ut interim qui
ad aliq̃ incipiunt, aliq̃ue quopiam opportunorum
ad id membrorum, hydrophas impræſentiarum
prætereant. Eſt tamen ea prima generādi hydro-
pis cauſa, quæ ex ſanguinis omnis defectu proce-
dit: ſimili genere, atque ex ciborū cōcoctionis de-
fectu diarrhæa. Atque in tali hydropis genere,
nec aliud uſcus ullū, nec incur uitio eſt affectū.
Sed illud etiam, quod innuere uidet, præ ſe fert ex-
tremā abſurditatē: nepe fieri poſſe ut bilis cibus
ſtatim multa, formiceſ nobis adueniat, non gi-
gnatur in corpore. Mel ſiquidē, nō eō quod plu-

Formationis ſu-
tur ratio.

Antio quo ſat.

Corde in agni-
tudo in primo
etia.
Augeri tantum
qua uiuunt.

Generatio quid
dicatur.

Nutritum
tr. hi, nō ſecere
ſine ad id quod
uacuatur, ſed
perinde ut à ma-
gnete trahatur
ſerum.
Diſtributio ali-
menti quo mo-
do fiat.

Hydrops quibus
ex occaſionibus
ſecus poſuit.

Hydropsis gene-
rādi prima cau-
ſa, ex ſanguinis
omnis defectu.
Diarrhæa ex ci-
borum cōcoctio-
nis defectu.

Lacu reſurgens
de riuu.

Pulmonem ſolū,
inter omnia tri-
ſtera, ueterem ex
corde.

Facultati na-
turali eſſe ſu-
ſſiciant ad ui-
tam.

Natura eſſe pro
totius corporis
partem eſſentiam.

Natura abſta-
tuaria qui diſſi-
rat.

Thudau.

Sanguis eſt ma-
teriale prin-
cipium, ex quo cō-
ſtituitur multi-
corpora partes.
Semen eſt eſſen-
tiam animalis
principium.

rimam in se bilem continet, sed quod intra corpus est mutatū, in hanc alterat & uertitur. Quippe amarum gustantibus esset, si bilem in se extra corpus contineret: omnibusq; similiter hominibus qualis ex eo gigneretur bilis copia. Verū id fecus habet. Si quidem qui iam sunt in flore, potissimum si calidiore natura sint, ac uitam laboriosam transigant, in ijs totum mel uertitur in flauam bilem. Scilicet uero admodum est ac commodum, ut pote quibus non in bilem, sed in sanguinem conuertatur. Gignitur autē in iecunore, atq; etiam in uenis, ipsa bilis una cum sanguine. Est enim exacte iam demonstratum ueteribus, dum in uenis alimentum ab innato calore alteratur, sanguinē quidem ex mediocri calore fieri: reliquos uero succos, ex eodem immodico. Atq; huic sententiae, quae euidenter sensibus apparet, omnia consentiunt: quando & ex cibis, hi qui natura sunt calidiores, magis sunt biliosī: qui frigidiore, magis pituitosī. Simili modo ex aetatibus, quae calidiores natura sunt, hias biliosiores esse cōstat: quae frigidiore, pituita magis obnoxias. Iam uir & ratio, & regionis, & anni temporum, multoq; priores hie, ipsarū quoq; uariarum, quae frigidiore sunt, ex magis cernuntur pituitosae: quae calidiores, magis biliosae. Praeterea ex morbis quoq; qui frigidi sunt, hi a pituita oriuntur: qui calidi, hi a bile ortum habent. Cū enim ob certam illarum quatuor qualitatū temperiem, particula quoq; certam habeat functionem, necesse omnino est, propter eius temperiei uitium, aut prorsus corrupti functionem, aut impediri: ac proinde uel totū, uel in parte regitare animal. Ac primi quidem, maximēq; generales morbi sunt quatuor: qui calore, frigore, sic citate, humiditateq; inter se dissident. Porro in febribus, admodum uariarū ipsa cōcoctio uentriculis, ob calorem illum praeter naturam, qui cū substantia sua functionem lēdat, merito inter primos morbos annumeratur: quare actio ipsa necessariō ex commoda nascetur temperie. Necq; enim alia de causa potest autemperies primorum esse causa morborū, nisi quod cōmoda sit temperies corrupta. Cū enim ab hac manent actiones, necesse est prima earum uitia, ex hac manare corrupta. Est autem cōmoda calor temperies, ipsius actionis causa. Quare in omni actione, id quod melius est, cōmodo temperamento ferre acceptum cōuenit: quae deteriora sunt, uitioso. Sanguinem itaq; a mediocri, bilem a immodico calore nasci, purandum. Vnde ijs qui sani citra uitium sunt, ubi aliqua coactio occasione contra consuetudinem cibo abstinerunt, os quidem amarum, lotium uero biliosum redditur, atq; etiam mordetur uenter, quod uidelicet ea quae coquuntur immodicē, primū quidem salisiora, postea uero a maiora reddantur. Nam si mel ipsum, quod omnium dulcissimū est, plurimum percoquere uelis, id quod reddideris amarissimū. Quod namq; ad dulcedinem gerandam caloris ei debet accedere, id totum prorsus intra se obtinet. Quare si calidum cū sit, calido adhuc iungatur, statim fit bilis, non sanguis. Postulat itaq; uertatur in sanguinem, naturam hominis frigidam, etatemq; frigidam.

Non ab re igitur censuit Hippocrates, mel biliosis naturis nō esse ex usu: inimicū autē esse morbus, quos amara excitauit bilis. At femili naturae, maximē cōueniens existit. In uniuersum autē, corporibus calidis, quacūq; ex occasione sint calida, mel atq; dulcia omnia, generantur bilis causam praebent: ijs autē quae cōtrarij sunt liabitus, sanguinis. Atqui non potest idem cibis alijs uerti in bilem, alijs in sanguinem, nisi intra corpus eorū generatio peragatur. Etenim si cibis quicūq; a se & hinc se hanc habens, nec in animalis corpore mutatus, bilem gigneret, utiq; in omnibus eam corporibus pari modo generaret. Sunt igitur semper nobis causae ipsae inquirendae: qui enim intemperamentorū causas cognorit, in facile ad naturam suam ea reducit. Porro affectus qui minimē ex accidunt, sed primum & per se laefacti functionem, in uere morbos est. Iam uero Hippocrates temperatū calorem, & qui modicē est humidus, sanguinis generandi causam affirmat: quae ratione sanguinem potestate calidum & humidū esse ait, & quē ut flauam bilem calidam atq; siccam, quantumuis sit aspectu humidam. Quippe dissidet quod secundum apparentiam humidum est, ab eo quod uiribus tale existit. Cū enim ubi plurima in uentriculo flaua bilis cōnnetur, perpetua siti urgeamur, signum est, potestate ipsam calidam esse, & siccam: inquit ut pituita frigidam, humidamq; cum quae etiam albacum ille succus, quem *phlegma*, id est, mucum, appellat Prodicus, frigidus atque humidus est. Est & alius humor frigidus simul & siccus, qui & in autumno, & in xate illa quae succedet uigori, crecit, quam atram uocamus bilem, flaua multo acriorem, & maligniorem. Dysenteriam siquidem quae ab atra incipit bile, mortiferā pronunciat Hippocrates. Non tamē quae a flaua oritur, prorsus mortifera est, sed pleriq; ea ea seruatur. Est autem atra bilis receptaculum lien: qui ubi minus quam iustū sit, illam ad sese trahit, ut puta quando est multū affectus, neq; uolenter trahit, ut sanguis impurius est, sic totū corpus magis redditur decolor. Tum regij morbi, qui a lie ne & agrotante oriū habet, nigriores sunt: itemq; ulcerum cicatrices nigrae. Ceterū quibus corpus floret, ijs lien, Hippocratis testimoniū, minuitur. Quibus uero id uisus magnū & tumens augetur, ijs corpus minuit, & caecumque reddat. Quemadmodū igitur in seruētū multo duo prouenire excrementa cernimus, alterū leuius, magisq; aëreum, quod nimirum florem uocamus: alterum grauius & magis terreneum, quod appellamus faecem: sic etiam in sanguine gerando, excrementa gignunt duo, quae illis proportionē respōdent: alterū tenue, humidumq;, & fluidū, quod flaua dicitur bilis, & in uiscā felis excipitur: alterum fuscū & terretū, quem ueteres atrum succum appellant, quemq; ad se lien ipse trahit. Ceterū nō eandem habent hī succi speciem, cum respondent naturae modo, quam ubi praeter naturā se habent. Quippe quae flaua dicitur bilis, dum ad uiscū perasat, crassa, ignea, & uittellina redditur. Atra etiam bilis, per se ipsa idem, lōgē malignior quā naturalis, euadit. Si quidē tum acris, in morē aceti, fit: tum corpus

Mel flouentibus in bilem conuertitur.

Mel flauum cōuenit admodum.

Bilis generatur.

Sanguis fit ex mediocri calore

Frigidi morbi a pituita oriuntur. Calidi morbi a bile.

Morbi primi quatuor.

Concoctionem uentriculi uariari maximē in febribus.

Aetatem ex cōmodo aetatis temperie.

Ieiunantiū, diu praeter consuetudinem, quānam accidant.

Quae coquuntur immodicē, primum salisiora, postea amariora reddi. Mel reddit ex longa coctura amarum.

Mel biliosis naturis non efficitur, conseruit autem sanis.

Affectus primi laefacti hī functionem, est morbus.

Sanguis calidus & humidus. Bilis calida & sicca.

Pituita frigida & humidum.

Atra bilis acrior & malignior quā flaua.

Lien receptaculum atrae bilis.

Lien imbecillus, quae accidant.

Regij morbi a lie ne acris agrotant.

Melli cōueniunt non corpora in

Flauam bilem dum ad uiscū perasat, crassa, ignea, & uittellina reddit. Atra bilis per se ipsa, quā naturalis, euadit. Si quidē tum acris, in morē aceti, fit: tum corpus

corpus radit, necnon terram ipsam fermentat, ubi scilicet alcutina putredo nigro illi succo naturaliter se habenti accessit. Malum uidentur ueterum medicorum plerique, id quod est tali succo naturaliter se habere, quodq; infra deperitur, & sic per supra fuit, atrum uocare succum, non atram bilem: quod uero exustione quapiã ac putrescentia, in acidã migratur qualitatẽ, id atram nuncupare bilem: quod excrementũ iam præter naturã est, quum nimis ab uisione non naturalis caloris acrimoniam illam acquerit, ac ueluti cinia quidam sit redditum. Sic quodammodo & fex uisã, in acidã difiudet. Illa namq; admodum calida est, aded ut carnem urat, liquet, atq; corrumpat. Altera quæ nondum est uisã, ad omnia uruntur medicis, ad quæ terra figulari, alijsq; etiã quæ rum ficcandi, tum refrigerandi facultatẽ habent. Sanẽ in atrã bilis sic uisã speciem etiã uis tellina illa subinde uertitur, quoties ipsa quomq; igneo percussa est calore. Reliqua bilis generis, partim ex iam dictorũ mistura constant uniuersa, partim tanquam uix quædam sunt ad harum tum generationem, tum inter se mutationem,

Asa fucum.

Atra bilis.

Distant inter se, quod aliter errare sunt, ac solæ alie ueluti fero quodam imbuat. Verum feri genera quæ in succũ habentur, omnia sunt exercementa, purumq; ab his esse possunt animalis corpus. Ea uero quæ prædicta sunt, naturæ usum aliquem conferunt. Purgatur autem ab his sanguis tum per lientem, tum per eam quæ icinori subest uesicã. Requirit enim sanguis in non paucis animalis particula crassitudinem. Est etiã quando nec in postremis siliuum succum possit, qui tamen igneus ad extremũ factus non sit. Porro quod pituitum expurget, natura nullum instrumentum cõdidit, propterea quod frigida & liumida est, ac uelut ex dimidio coctum nutrimentum. Desiderat igitur talis succus non utiq; uacuari, sed in corpore manens alterari. Excrementũ uero quod à cerebro destillat, fortasse

Tax uisã uisã

atq; corrupta

carum.

Vitellum holi

uerti in speciem

atra uisã, ubi

nomen percellit

est.

Seri genera omnia.

esse exercementa.

Bila uisã q; à

quod instrumentum

tu purgare.

Pituitum repur

gari nec uisum

instrumentum

si cõdidum.

Pituitum dol-

cem saluari ef-

fe animantibus

etiam esse cõdi-

ci potuisse sal-

sam.

GAL. DE NATURALIBUS FACULTATIBUS LIBER tertius.

Nutritionem quidem fieri, quum id quod nutrit, ei quod nutritur, assimilatur: esse in singula animalia particula facultatem quandam alteratricẽ, quam membranis assimilatricem & nutritorẽ uocauimus: aliamq; præterea attractricem, quæ materiam cõuenientiam uentri suppeditat, in proximo demonstratum est libro. Indicari præterea est, & quod

ante assimilationem agglutinatio sit: hanc uero ab appositione præcedi, quæ finis est actionis quæ ab attractrice perficitur. Porro à nutritionem ipsam ampliori opus est tempore, quam ad perficiendã aliarum facultatũ actiones: requiruntq; ut appositus in particula succus, si illam sit nutriturus, minimè transferatur ad alias, sed in ea quiescat: quare necessaria etiam uidetur naturæ ipsi facultas quæ dicitur retentrix, quæ id quod appositum est retinet. Talis autem uis, in maxima, maximeq; causis instrumentis conspicua admodum censur: in parua aut obfcurior. At inter animalis partes maxime causæ, amplissimè sunt, uentriculus, uterus, & quæ secundæ uocantur. Retinet aut uenter cibum, quoad eum concoxit: nec minus sarsi uterus, quoad hunc consummat. Cæterum longè amplius perficiendũ factus tempus, quam cibi concoquendũ. Ac proinde retentrix uteri à nobis multò clarius cognoscitur. Quippe nouem mensibus plerique mulieribus perceptor in utero factus, qui tota quidem ceruicæ conuiuit: completur autem factum undiq; unã cum secundis. Estq; tum oria conuiuentis, tum moris factus in utero finis, ipsa actionis unitas. Nam ubi id completum est, cuius gratia retentrix facultas est ulus uteris, utiq; hanc inlibet, ac cessare facit, propultrice, quæ hæcenus quiescat, loco eius assumpta. Sanè erat sicuti queris huius facultatis finis, ipse usus: ita etiã actionis eiusdẽ finis, simili ter ipse usus, utpote quo excitante agat, nõ esse tante quiescat. Succedentibus igitur rectè omnibus quæ in utero sunt, expultrice quiescit omnino facultas: imperoperè à sit cõcedendus, non amplius expectat uterus nouem mensium temporis moram: imò retentrix facultas statim desinit ab opere, & expultrice ut moueat permittit: etenim sibi murus succedit. Iam uero prægnantes ipse primis diebus, potissimèq; eo ipso quo semen est conceptũ, moueri, atq; in seipsum concurrere uterum sentiunt: quod si præter hæc, citra affectum aliquem, etiam conuiuent oria uteri, iam semen ipsum à mare, & se cepisse, & retinere arbitrantur: quo rēpore aëdò clauduit uterus, usq; ad horam partus, ut ne specilli quidem mucronẽ admittat. At uero Hippocrates cõnuere os uteri, & in conceptionibus, & dum phlegmone affectũ est, proficitur. Cæterum in conceptione, seruato naturalis habitu: in phlegmone, in durum murato. Igitur absoluto, aut etiam mortuo feto, sub facultate expultrice os uteri aperitur: fundus aut, atq; uniuersæ partes circũiacentes utero, sese deorsum contrahunt, atq; factum propellunt: idq; tanto labore & conatu, ut interdum ipse uterus excidat, potissimè cum cilm eius ad spinã ligamenta sunt laxa. Porro obiter scire ipse non iubent surgere parturientes, neq; in sella collocant, donec ad factus transitũ os uteri facta pareat: id quod ex assidua manu cõtractatione sentiri fieri paulatim. Opus autem ipsam quod à seipsis præstant parientes, non uteri est, sed mulcorum qui sunt in abdomine, qui scilicet tum ad dñctionẽ, tum ad reddendam urinam nobis etiã auxilio sunt: atq; ita quidem in utero, duæ memoratæ facultates apparent, in-

Nutritio quæ

facit necessaria.

Retentrix facultas in quibusdẽ speciebus.

Partes maxime

utero.

Ventriculus facultas in quibusdẽ speciebus.

Partes maxime

utero.

Ventriculus facultas in quibusdẽ speciebus.

Partes maxime

utero.

Ventriculus facultas in quibusdẽ speciebus.

Partes maxime

utero.

Ventriculus facultas in quibusdẽ speciebus.

Partes maxime

utero.

Ventriculus facultas in quibusdẽ speciebus.

Partes maxime

utero.

Ventriculus facultas in quibusdẽ speciebus.

Partes maxime

utero.

Ventriculus facultas in quibusdẽ speciebus.

Partes maxime

utero.

Ventriculus facultas in quibusdẽ speciebus.

Partes maxime

utero.

uentre uero, ad hunc modum. Quum is pro sua natura se habeat, ac contrictoria uirtute utitur, quilibet exiguū sit quod in se continet, totū id undiq; complexus nullum uacuum relinquit loco. Quum imbecillus est, quacunq; parte complexū exactē assumpta nouo ualeat, ac proinde laxum quoddā spatium efficit, permittitq; ea quae in se continer humida, ex alio in alium locū transire, ac fluctuationum sonitus edere. Talis autem uentriculus, quum imbecillus sit, haud quidem probe concoquit: sed in eo diutius uidebitur quaedam manere grauitas, tum cibi, tum potus, ut qui etiam tardius cōcoquat. Eius autem diuturnus ciborum morae, non est causa angustia infimi orificii uentriculi, quā uideamus in dies multa longē crassissima, quae per imprudenti uorantur, facili excerni: sicut & alia liquida retineri: unde neq; etiam euasem in uentriculo morę finis aut terminus erit ciborum in cremorem conuersio (alioqui sorbitiones, & lac, & pnsang cremor, in omnibus illuc transirent) sed concoctio, quae ad conuersionem in cremorem res est diuersa, sicuti nutritio ad sanguificationem. Est autē concoctio ipsa in uentriculo, nutrimenti in propriam eius quod nutritur qualitatem mutatam. Vbi igitur ad perfectionem concoxit cibos uentriculus, tum aperit inferus os, exciditq; per ipsum facile cibi, enā si lapides, ossa, acinus, aliāque uerū in cremorem non possunt, plurima secum habeant. At inter dum coquit uentriculus, cibos totus (perni de uteris fortis) ambit, & amplexatur, clau dirigit ad unguē infimum illius ossiculi, quod pylorum nominat. Itaq; neq; in utero, neq; in uentre, neq; in uesica utrauis, licet reperire locum aliquem uacuum, scilicet instrumentorū tunicis, ea quae continent, semper arctē amplectentibus, quādiu naturaliter se habet animal. Quare illis omnibus ingenitae sunt aliquae facultates, quibus retinere quae expedit, expellere aliena, possunt. Siquidem quod bilem ad se trahat ea quae iecinori subest uesica, supra est monstratū. quod autē & in uentrem quotidie eiciat, id quoq; euidenter cernitur. Atqui si tractus operā statim expultricis actio exciperet, nec media semper inter eas intercederet uis retentrix, par semper in uesica bilis inueniret modus: at non sic inuenitur, sicuti nec urinae in altera, quae lorio est addita. Porro ubi uentriculus circa utras partes multitudine ac acrimonia humoris afficit, si firmæ sint quae circa stomachum habentur partes, diarrhæa citantur. Quum uero sic eius os infestatur, si ceteræ partes ualentes sint, uomitiones sequuntur. Quippe uentriculus, non secus quā partes reliquæ, ut conuenientem sibi qualitatem expent, sic prorsus alienū respuit. Quare si expent, trahet utiq; sicut & expellet, si etiam subtilis aliquid. Ad huc autē, si trahit, necessariō etiam fruatur id quod non licebit illi, nisi retineat. Sed ipsius firmitudinis aliquis erit finis, nempe benigniora ciborum substantia fluctus, & repositio intra uenas. Post quem finem iam expultricis facultate agendi succedet tempus. Nam ubi abundē saturatus est uenter, quicquid reliquū nutrimentū est, ueluti onerosum aliquid respicit, quanquā ex eo, quod cū uentriculo

habuit, commercio, ipsum quoq; consecrātū est salutare aliquid. Quippe ubi conueniūt duo corpora, quae ad agendū ac patiendū sunt nara, si pares ut uires sint, ex quo tum agit, tum patiens. Sin longē superet, uincatur alterum, magnum quiddam, in id quod patitur, efficit: ipsum uero uel exiguū aliquid, uel omnino nihil patitur: quo nomine dicitur nutrimentū ad medicamentum uenenosū: hoc nanq; uim corporis uincit, illud ab hac uincitur. Minimē igitur potest conueniētia animalī nutrimentum esse, quod ab his quae in animalī sunt qualitatibus non uiocitur. At uinci aliud nō est, quā alterari. Non tamen equali omnes modo uincunt nutrimentū particulae. Siquidem alteratio quae fit in uentre, maior est quā quae in ore perficitur: minor uero ea, quae in iecino re & uenis. Horum nanq; alteratio, nutrimentum in sanguini substantiam mutat. Quae in ore agitur, mutat quiddam in alteram speciem manifeste, non tamen ad perfectiorem transformat. Ceterum quā magna sit ciborum in ore alteratio, hinc discas licet, q; manifestum trinitū crudos furunculos occisimē & mutat & coquit: quoniam tamen si aqua admiscatur, nequeat tale quicquam praestare. Nec est quodd id mirare. Nam putita quae in ore habetur, & lichenium remedium est, & scorpius statim necat: praeter ea multas ex uenenatis bestis, partim proptius perimū, partim spatio: omnes certē insigniter laedit. Verūm quanto hī qui mansi sunt cibi, hī qui inhaerescunt in uacuo dentium interuallīs, magis sunt alterati, tanto enī his magis qui deuorati sunt. Siquidem incomparabilis est horum alterationis excessus, si & quae in uentre est putra, & bilis, & ipsius, & calor, & tora uentris substantia, estimetur. Quod si uiscera quoq; illi adiacentia, tanquam magno lebent plures ignis focī, pariter estimata sint, ad dextris quidē iecur, ad sinistris lien, supernē cor, & transuerſum seprum, & eleuatū, & assidue motum, ingentem quandam ciborum, qui in uentriculo sunt deuorati, alterationem fieri credideris. Quae autem pacto mutari facili in sanguinem possent, nisi tali essent mutatione preparati. Monstratū nanq; est, nullū in contrariam qualitatem totum simul migrare. Porro uenter duas habet tunicas, usq; ad ipsum os pertinentes. Quarta interior quidē, qualis in ipso est uentre, talis persistit, in directisq; porrectas fibras forntur, trahendi nimirū grata. Altera ad carnosiorē speciem in gula conuertit, habetq; transuersas fibras, ad contrahendum undiq; Quippe singulorū quae mouent in instrumentorum corpora, pro fibrarum positura motus habent. Jam in singulis intestinis circulares in utraq; tunica fibræ sunt, quod contrahantur duntaxat, nec quicquam trahant. At uenter alias fibrarum rectas habet, quibus scilicet trahit alias transuersas, quibus cōstringat. Verūm ubi transuersæ fibræ tendunt, latitudinem uentris minorem reddunt. Rectæ autem dum contrahuntur, necessariō longitudinem minuunt. At uero deglutenibus nobis, liquidū cernitur larynx sursum in tantum currens, quantū gula deorsum trahitur: quāq; cōpleta iam deglutenē diuisione laxauerit sese gula, luculēter descēdere

Ventriculus quidē non uelle concoquat.

Concoctio est nutrimenti in propria eius quod nutritur, qualitate mutata.

Pylorus.

Uesica sicuti trahit bilis.

Diarrhæa quidē excreuit. Vomitiones quædam.

Nutrimentum a deterio re cernit quomodo differat.

Vinci nō est aliud quā alterari. Alterationem ubi differens.

Alteratio quae fit in ore.

Trinitum manifestum crudis fortis cibis coquitur. Putrita uim nocere corpus.

Alterationis actio in uenereis suis facit ingentem.

Ventriculo duas tunicas habet: ad os pertinetes. Fibræ rectæ, trahendi grata. Fibræ transuersæ ad contrahendum.

Intestina non trahunt, sed contrahunt tantum.

Larynx sursum tantum trahitur, quatenus gula deorsum.

dere cernit illa summitas asperæ arteriæ. Siquidẽ interna * uentriculi tunica, quæ rectas habet fibras, quæq; tum gullũ intrinsecus uestit, tum os ipsum, ea inquam super internis partibus ipsius laryngis extenditur. Itaque fieri nequit, quum ipsa à uentriculo deorsum trahitur, quin simul etiam secum detrahat laryngem. Sed quod superius paribus contractis, inferne dilantentur, cõmune quidem id est, tum uiuui, tum demorui corporibus. Gula igitur, ut monstrauimus, trahitur: alioqui laryngem non traheret. Trahit aut per gulam ipse uentriculus cibos: quos enã per eandem euomit. Atq; idcirco facilis est deglutire quàm homere, quod scilicet deglutitur ambabus uentris tunicis operantibus, interna quidem trahente, externa se contrahente, ac trudente: uomatur autem altera rantiũ, quæ foris est, ac trudit, agente, nec ulla in os trahente. Nõ enim sicuti uentris appetentia deglutendos cibos præcedit, sic in uomitionibus appetit oris pars ulla, excitati affectus quippiã, sed sunt ambo uentris affectus inter se contrarij: quorum utriusq; inferuit gulæ tunica externa, cui transuersæ sunt fibræ. Et enim deglutitio in ijs qui immo dicẽ appetunt, ocyssimẽ fit: uentre nempe cibos deorsum uellente, prius quàm sint mansi, ut in Haerulis, & Synodontibus accidit, quorum prægulositate (ut Aristoteles inquit) uenter aliquando in ore inuenitur. At uerò utraq; gulæ tunica prædictis fungi actionibus posse, hinc deprehendẽs: quod si in uno animali externæ quidem tunicæ, cui transuersæ ad sunt fibræ, in alio autem internæ, cui rectæ, transuersæ in cisionẽ fecuerit, utriusq; planẽ animal deglutire uidebit. Ex quo manifeste patet, qd altera earũ deglutire licet, ceterum deterius quàm ambabus. Sed hoc interim perpendendũ est, spiritũ qui ualid cum cibis deglutitur, gullũ inter deglutientiũ impleri, effectũ sitũ huius obliquũ. Indicauimus igitur quatuor in uentre uirtutes sitas: nempe in deglutiendo attracticẽ, in coquendo retentricẽ, in uomitione, & concoctoriũ ciborũ in tenuẽ intestinũ descensũ, expultricẽ: ipsam uerò cõcoctionem quandam existere alterationem. Quas quidẽ facultates ministras esse nutritiõnis, similiter expositiũ est. Sedenim ut stercus humanũ canibus existit suauissimũ, ita iecinoris excrementorũ, aliud lienĩ, aliud bilis uescicæ, aliud renibus est acceptum. Ergo uniuersa instrumẽta geminas facultates obtinent, & qua cõue niens trahunt, & qua alienũ repellũt. Proinde si quod uel ex unica tunica instrumentũ cõstat, ueluti ambg uescicæ, uerus, & uena, utriusq; fibrarũ genus obinet, rectarũ & transuersarũ. In ter tũ quorũ fibrarũ genus obliquarũ tẽtĩminũ omnino, quàm dno prædicta genera, numerosũ. Inuenitur in ijs instrumentis, quæ ex duabus tunicis constant, in altera sola, rectis scilicet ipsis fibris immixtum. In his autem quæ ex singulari consistuntur tunica, ubi cum duobus alijs generibus. Sanẽ hæc maxime opitulante (etenĩtĩr) facultatis actioni. Postulat etiam in hoc opere particula quorũ super ea quæ continet, strĩgĩ ac circum ea tendi: ut puta uenter quidem, toto concoquendi cibi, uterus toto gestandi fer-

rus tempore. Venæ porro tunica, ex multitudine fibris est condita. Externa arteriæ tunica, ex circularibus: interna ex rectis plurimis, paucis autem cum luis obliquis, constat. Sola instrumentorum omnium ex duabus tunicis, atq; harum utraq; ex transuersis constante fibris, facta sunt intestina. At uetẽ & utraq; uescicæ, & uteri, ubi uel multitudine eorũ quæ continent degra uantur, uel qualitate mordentur, quod offendit abscere properant. Quorũ utriusq; aliquando uolenter incidit, quo casu prouocatur abortus: fit autem is plerũq; ex naturæ cõmodo, quod genus non abortus, sed partus nominatur. Atq; abortus quidem sequuntur uel medicamentis quæ ipsos prouocant, uel etiam tensionẽ uteri: partus autem, ipsius fortis motiones uehementissimas. Cõmunis aut omnibus his affectibus ipsa est offensio. Cuius triplex est causa: aut moles nimia, aut pondus aliquod, aut morsus. Moles, ubi amplius distendi uterus nõ tolerat. Pondus, quod supra uires eius sit, quod cõiunct. Morsus, ubi uel humores qui prius in mēbranis continebantur, his ruptis, in ipsum uterũ sunt effusi: enã totus partus corruptus & purus, ac innoxiam saniem dissoluit, uteri tunicæ eius occasione scindit, atq; mordet. Ad hæc, excrementa singula, si morĩ in corpore diutius trahant, putrescunt: quare mordaciæ & acriæ, atq; his quæ ipsa continent, infesta redduntur. Munimẽ tamen id in ea uescica quæ iecinori subest, similiter se habet, ut quæ neruorũ planẽ sit experts. Quanyquid certẽ cum hæc ipsa trahat liquidũ, excrementũ, necesse est eam uel succi multitudine pressam, uel qualitate illius offensam, expulsiõnem desiderare. Iam nec illud difficile cõpertũ est, & tractũ & expulsiõnẽ diuersis in temporibus per eundem eius meatum fieri. Vteri præterea stomachus, pari modo sicut inrõ seminis, ita foras partus uia est. Venim hic prætrix facultas, quæ atq; expultrix, non liquet uulgo. Quum igitur attractiõnem & expulsiõnem, per unam cõdemq; firmitatẽ cenamus, non debemus mirari, etiam si per uenas in uentrem natura nõnunquã excrementa propulset, dum purgatiua pharmaca propinamus: at multo minus, si per quas uenas à uentre in iecur facta est digestio, rursus ex iecinore in ipsum trahu aliquod alimentum in longiori inedia potest. Venæ siquidem illæ, quæ medium spatium inter iecur & partes circa uentrem occupant, duplex ministerium præstant: nempe ut quum in his abundantia fuerit alimenti, per eas sursum feratur in iecur: quum autem uia sunt, nutritiũ auent, per easdem ipsas ex hepate rursus trahatur. Siquidem totum ex toto trahere, ac toti impartire, unaq; omnium confusio ac cõspiratio esse uidetur. Quare multis eorum qui ualentem exercitacionem subito ac prorsus intermiserunt, ut artuum aliquem præciderunt, languinem per intestina certa per nodis simul plurimũ certissimũ euacuari: sicuti illac etiam alios humores à natura in morbis expelli. Ac trahit quidem id quod est ualeuimus: uacuatur aut id quod est imbecillius. Porro uacuatur, imbecillioris altera quim altera particula est, nẽ absolute sermone, naturarũ, et cõmunitate

Vena constituta.
Arteria constituta.

Intestina sola consistunt ex duabus tunicis, quarum singula ex transuersis fibris consistunt.

Abortus.

Partus.

Vteri offensio triplex causatur.

Excrementa singula ab morantur diutius in corpore, compunguntur.
Vescica fillis, ut uentrem exagere.

Vteri stomachus est uia partus cõseruati.

Venarum quæ inter uentriculum & hepatis sunt, habent uia in iecur.

Trahere totum ex toto.

Sanguis quibus euacuatur per uentriculũ, certis quibusdam per nodis.

Ventriculi interna tunica est uiscosa.

Colum est ciborum ad uentrem uiam. Deglutitur cor facilius quum uentris.

Gula exterius tunica inferius tunica, atq; deglutit.

Venter quibus in ore inuenitur.

Gullũ inter deglutendum in platũ situm. Gula sita obliqua.

Ventriculi quæ inter facultates naturales, quæ uentris uirtutes sunt.

Instrumẽta singula consistunt attracticẽ & expultricẽ potestatem.

Vena obliqua opitulante retentione potestatem.

est, etiam trahitur, id quod constat, cum ob foramina illa interpositi septi, quæ à lato ore magis magnis in angustis procedunt. tum uel maxime, quod cum in dextro cordis sinu duo ora sint, unum quo sanguis inuehitur, alterum quo emittitur in pulmonē, longè maius est id quo infertur, quàm id quo emittitur. Neg: est quod dicat aliquis, absumptum esse sanguinem aliquid in ipsam substantiæ cordis nutritionē. Siquidem alia uena est, quæ in id uariæ fissæ dispergitur, quæq; nec ortū à corde habet, nec sanguinē ab eo accipit. Manifestū igitur est, aliquā portionē illius sanguinis, qui inuehitur in dextrū uentriculum, in sinistrū finū transmitti: cum etiā duorum numero quæ in sinistro cordis uentriculo sunt uasorū, longè minus id sit, quod à pulmone in eum ducit spiritum, quàm arteria illa magna, quæ ex eo procedit, à qua reliquæ omnes, quæ sunt in corpore, oriunt: ceu non spiritū modo à pulmone accipiat, sed etiā ex dextro sinu, per iam dictas cōmunes uias, sanguinem. Porro

carnes tum uiscerum omnium, tum musculorū, ex sanguine exigua alterationē confectæ, nutriuntur. Offa uero quod nutriant, numerosa quæ intercedat mutatione egent. Estq; qualis carnibus sanguis, talis ossibus medulla. Nam quibus similia est substantia, ipsæ mutari inter se fas est: quibus plurimū inter ipsa est discrimen, ea fieri similia citra omnes quæ in medio sunt mutationes, nō possunt. Tale quiddam & cartilaginū est musculum illud quod ei circumfunditur: necnon ligamentis, membranis, & neruis, lentus humor qui in medijs eorum spacijs inspersus cernitur. Iam uero quod ossissimè aliquid digeratur per corpus (ut in plurimis eorum qui biberunt immodicè, atq; id quod biberunt, intra breue tempus totū plus minus emingit, uidere licet) qualitas cōuenientia, humoris tenuitate, uasorum laxitate, atq; ad cōtrahentis facultatis robore id accidit. Ita nihil miri est, unū aqua, propter qualitatis cōuenientiam, citius excipi à uenis. Ipsorū uerò uinorū, quod album est, & purum, tenuissimè gratia, promptè in corpus digerit. Sicuti è contrario nigrum & turbidum, crassitudinis uitio, per uiam hæret, & tardari.

GALENI PERGAMENI de naturalium facultatum substantiis, liber unus.



Vid quidem in nobis anima sit, ne mo est qui nesciat: utpote cum norit, earum omnium functionū, quas corpore indies obimus, aliquam optere esse causam. Quippe nihil fieri sine causa potest. At quænam ea sit causa, unde hæ functiones procedant, non æquè est compertū. Varij enim uario modo opinantur. Ego autem, licet non sim is, qui uelim mihi persuadere, me eorū certam habere notitiam, quorum certā demonstrationē nō habeam, de his tamen impræsentiarum pronū nō dissimulā, in de nobis exordio sumpto, quod ego hæc firmiter me scire profiteor. Omnia nimirum corpora, quæ hic pene nos gignūt, ex quatuor elementorum

per totum misorū temperatura suam habere ortum. Quorum elementorū ipsi corpore substantiæ, an per se inuicem permeent, uel solè potius qualitates, ut id scire non duco esse operæ precium, sic nec pronuciare uelim. Probabilius tamē mihi uidetur, quod temperamenti id per qualitates fiat. Anima uero ipsa, an immortalis sit, quæ corporis immutā substantiæ, animantia gubernet, me nequaquam hoc certè scire affirmauerim: sicuti neg illud, an ullam eā pe culiare, & per se, substantiam possideat. Sed hoc malū planè constat, quod quantumlibet animæ in lix cōmigrēt corpora, ipsorū tamen naturis ex elementorū temperie constantibus, obnoxia est. Oportet autem corpus ipsum, quod animam susceptrum est, paratū idoneitūq; esse. Nam si magnam subierit illius temperamēti alterationē, cogitur inde anima exire: ueluti etiam cum omnino respiratio intercipitur. At dum corpus ipsum naturalem seruat suam constitutionē, nunquam fieri posse crediderim, ut ab illo anima fecernatur. Et hæc de causa, fice quemam sit animæ substantia, nec est ad morborum curationes necessarium, neg etiam ad ipsam philosophiā. Porro stirpes, internū aliquod motus innū, & abquæ præterea rerum sibi congruentium sensum habent, prædicte nimirum facultatibus illis quatuor, attrahere nēpe, retentrice, alteratrice, & expultrice, quas naturales di-

cinus. Sensu autem & motu, qui ab interno & proprio impetu fit, animalia ipsi plantis præstant. Est enim stirpibus ea tantū cognitio tradita, quæ ex uoluptate quādā, uel tristitia, aut alia quapiam istis simili affectuōne, aut saltē istis ex proportionē respondente, nascitur: cum uulla alia causa esse possit, cur ea quæ sibi competīt, & attrahant, & concilient, præter uoluptatem, & fruinonem, quæ ab illis gignitur. Nam alterius cuiuspiā cognitionis quæ ad sensus spectet, nequit esse parti ceps anima naturalis, utpote quæ uisibiles qualitates, uel auditiles, uel gustatiles, uel olfactiles, uel tactiles nequāq; possit apprehendere: sed illas tantū, quæ his quæ alere possunt, uel secus, insunt. Ceterū cum stirpes trahāt, retineāt, alterent, atq; à se expellāt, rectè mihi uidetur Plato eas & sensu congruentiū in cōgruentiūq; prædicas, & animalia etiam esse, dixisse.

GALENI PERGAMENI an sanguis in arterijs natura continetur, liber unus.



Vm secta quacūq; arteria, sanguis inde effluere uideat, duorū alterū necesse est: aut illum in ipsi arterijs cōmneri, aut aliunde in eas trāsfundi. Sed si aliunde trāsfundit, iam sanè cuilibet cōstat, eas solum spiritū (cōm secundum naturam habent) cōtinuasse. Quod si ita res esset, profectō esset apus, ut illato uulnere, ante sanguinē, exeuntē spiritū uideremus: at nō uidemus, igitur neq; prius solus ille continebat. Itaq; arteriæ nusquā uisæ sunt solum spiritū continere. Etenim secto abdomine unā cum pento nq; in hædis qui nuper læsarūt, manifestē uidere licet mensesq; arterias repletas lacte. Enum-

Temperamentū fieri per qualitates, probabilius uidetur Galeno.

Animā esse immortalē, Galenus non ambigit.

Animam cōstituisse naturam corporis.

Animam non posse sciri à corpore, quādiū illa à naturalibus constitutionibus seruetur.

Stirpes habere augmentū sensum, prædictaq; esse quatuor facultatibus naturalibus.

Animalia præstare plantis sensum & uoluntario motu.

Anima naturalis quæ qualitates in apprehendendo nequit.

Stirpes animalia appetant placid.

Cer uenit à re na que per mui superstiti differ gunt non ab ea qua dextris uenit uigilatur.

Carnū uiscerum nutritio est sanguine.

Medullā esse nutrimentū quib.

Cartilaginū nutriri ex maciis quoddā humore.

Distributio humorum uelut per corpus, unde accidit.

Vinum aqua citius excipi à uenis.

Vinum albi coloris promptè in corpore digerit, nigrum contrā.

Nihil fieri sine causa posse.

Corpora uisceris cōtinere et menses quatuor elementorum.

Arteria nōquā solum spiritum continere.

uero quæ in humanam ueniunt cognitionem, omnia tum sensu, tum ratione deprehenduntur. Vnde quædammodum ex sensibilibus multa sunt, quæ plurimum de causis sensus effugunt, ita etiã & rationem. Dubitant autem Erasistrati sectatores, quomodo, si sanguine repletæ sint ipsæ arteriæ, posset spiritus à corde in uniuersum corpus deferri. Ad quos dicemus, non mitti spiritum, sed attrahitur ex solo corde, sed undiq. Demonstratũ quippe à nobis est, in libro de usu respiratiõis, aut nihil penitus, aut admodũ parũ subtrahitur spiritus, in cor transsumi. Vniuersus siquidẽ expirari potest, ut diligentioribus tum philo-

Spiritus non mitti in corpus à corde, sed undique attrahi à corpore.

Spiritus non subtrahitur, sed quæ sita sunt ex usu esse cordis, cum respirari appetat.

Respiratio est spiritus respiratio.

Arteria non dilatat, sed implentur, sed implentur quæ dilatantur.

Vicinusque differt à non corpore.

Arteria omnis partes mouetur simul.

Motus celeritas facilius, arte flatur, materis aduersatur.

Musculi sunt in strumina uoluntatis motus. Musculus uoluntatis non passus.

sophis, tum medicis usum est: qui nõ eius substantiam, sed qualitatẽ potius cordi esse ex usu autumant, ut pote quod refrigerari appetat: atque hunc esse respirandi finẽ. At uerò arteriæ ipsæ non eò dilantur, quia implentur, sed ideo potius implentur, quia dilantur. Cũ enim in suis tunica uires quædam habeant, quibus se dilant, ex una quaq. sui parte, per extrema foramina, quicquid illis cõuenit, esse, unde possunt, attrahunt. Poteris facilius intelligere exemplis, quæ sit differentia, quod aliquid repletum dilatur, uel quod dilatum repletur. Vires quippe facilius, dum implentur, dilantur: fabricorum uerò folles, dum dilantur, implentur. At facilius illius quæ arteriæ dilatur, cor ueluti fontẽ esse, alibi à nobis est dictum. Et est hoc sanẽ magis naturæ congruens, ut sic opinemur, quàm ut spiritus per eas, ueluti per inania quædam corpora, ferri arbitremur. Differt siquidem uires, à non uiuente, non tam substantiæ cõplexu, quàm quod sit facultatis participes. Quod autem à corde ipso tunica arteriarum facultas quædam quæ dilaturur, non autem materia per illarum qualitatem, mutatur, ex hoc cognoscere manifestissimẽ, quod si aliquam conspicuam arteriã cute nudaueris, illius per longitudinem secta, fistulã aliquam impuleris, ita ut totum uulnus obstruatur, uidebis illam pulsantẽ. Vbi uerò circũducto laqueo, ipsius arteriæ tunica circa calamiã astrinxeris accuratẽ, non amplius ultra laqueũ quantumlibet tam sanguinis quàm spiritus delano per cavitatem fistulæ fieri possit) pulsantem uidebis. Porro mouetur arteria uniuersa uno eodemq. tempore, nec altera eius pars prius, altera uerò posterius: sed quemadmodum simul ac mouere pedis digiti propofuerimus, quibus nulla in ea parte ratiocinandi uis sita sit, confestim tamen facultate illi, in temporis momento distributa, mouemus, ita etiam idipsum fit in corde et arterijs. Motus enim celeritas, ut facultatib. arte flatur, ita materijs potius aduersatur.

GAL. PERGAMENI de motu musculorum liber I.



Instrumenta motus uoluntarij musculi sunt, quorũ ad eò magna multitudine est, ut ne numerari quidẽ facile possint. Nam & natura ita quidẽ coalescit inter sese, ut uideantur unus esse. Et cùm unus aliquis in multis tendones desinat, non unus amplius solus esse uidetur, sed quorũ tendones. Idcirco, & quia multi-

plici sunt figura, & in dissimiles inferuntur partes, modum motus difficulter comprehensibilem habent. Ceterum omnis musculus tendẽue transuersum atque insigniter sectus, aut phlegmone, aut scirrhus, aut punctatione, aut cõtusione, aut dantie cicatricis affectus, nocet quidẽ omnino quibusdam moribus particulæ in quã inferuntur. Tendons porro natura, multa medijs est, inter ligamentũ & neruum. Etenim ligamentum ipsum, corpus neruolum est, ex osse omnino ortum habens, insertum autem in os, aut in musculum. Nerus autẽ & rã ex cerebro aut spinali medulla oriuntur: quorum substantia est ueluti durissimum factum cerebrũ, qualem esse spinalem medullam constat. Sed ipsi etiam cerebri pars posterior, diuor et anterior: & quicunque neruorum molliores sunt, nil nihil à spinali medulla tibi uidebuntur differre. At aliorũ ossium medulla, humida & fluxilis est, pinguedinis permissilis: quare ex ea oriri nullum neruũ uidebis: neque est ipsi inuolucrum ullum, nec arteria, aut uenæ complexus, nec ulla prorsus comunicatio cum musculis. Porro à cerebro aut spinali medulla musculi omnes necesse est et neruum accipiant, qui usui quidem paruus, sed uirtute magnus existit. Cognoscies autem id ex passionibus. Nam incusus, oppressus, contusus, laqueo interceptus, scirrhus affectus, & putrefactus, aufert musculo omnem motum & sensum.

Quin & neruo inuflammato, non pauci spasmõ correpti sunt, & mente alienati: quorũ quidam sic affecti, cum sapienno rem medicum nasci essent, qui neruum illis abscederet, statim ipsam, & mens alienatione sunt liberati: sed postea musculum, in quem neruus insertus erat, insensibilem atque inutilem ad motum habuerunt: tanta uis nerui à superno principio affluit. Non enim ex seipsis eas, neque connatas habent. Id autem in eis facile cognoscere poteris. Nam si aliquem neruum, aut ipsam spinalem medullam incideris, quantum superius est incisionẽ, continuum cerebro, id quidem adhuc conseruabit principij uires. Omne autem quod inferius est, neque sensum neque motum ulli præbere poterit. Nerui itaq. triuocum insit, à cerebro, ceu à quodam fonte, deducunt musculi suas facultates. Quos quum primum attingunt, scinduntur multin pliciter in aliam subinde atq. aliam sectionem: tandemq. in tenues toti & membranas fibras soluti, totum sic musculi corpus texunt. Ligamenta uerò, per quæ ossibus musculi colligantur, coalescunt, membranas circa ipsos gignunt, & quasdam intro propagines in ipsam carnem musculorum demittunt: quæ ueluti quendam locum intellige multo ruius irriguũ, uno quidem prædicto neruo, duobus uerò alijs, altero sanguinis calidi & tenuis & uaporosi, altero frigidiõis atq. crassioris. Vocatur autem ipsorũ alter, arteria: alter uena. Ibi irriguũ principium à corde & hepate habentes, corpus musculorum irrigant. Quorũ gratia fit ipse musculus, ueluti quædam planta. At propter sensum & uoluntarium motum, quibus animal à nõ animali differt, & quos musculi ab ipso suscipiunt neruo, factus est animale instrumentum, sicut propter arte-

Tendons natura media coalescentia neruum. Ligamentum quidẽ Nerus.

Medulla ossis.

Nerui omnes aut à cerebro, aut à spinali medulla oriuntur.

Nerui inuolucrum à superno principio.

Nerui aut spinali medulla transuersum incisi, quæ inferius sectionem sunt partes desinunt motu simul & sensu.

Nerui à cerebro desinunt musculi sunt facilius tates.

Ligamenta quædam membra sunt circa osses.

Musculi sunt quædam planta.

Arteria. Vena. Musculus uoluntatis quædam planta. Musculus animalis instrumentum, sicut propter arte-

Motus natura-
les quæ.

Motus anima-
les quæ.

Sensus inest cum
est in partibus
nervi prædictæ.

Tendo tanto de
vires nervi, quod
to legemini mol
litas.

Legemini omni
ne infensibilis.

Nervus omni
sensu prædictum.

Tendens in
nervum.

Nervus est via
facilitatis motu
in a cerebro de
scendens.

Tendo omni in
os infertur.

Lingua muscoli
carum tendens
huius.

Lingua muscu-
li.

Cor mouetur
perpetuo circa
voluntatem im
petram.

Abstrahit, oculi
longum, movetur.

Musculi nullum
mouentur in.

arteriam & venam, naturalem. Etenim motus qui
est arteria & venæ procedunt, sunt naturales, &
voluntatis experies: qui autem à musculis, & ani-
males, & voluntarij. Est autem musculus, in stru-
mentum non a sensu, sed motus, etiam si utriusq;
sit particeps: quia nullus motus voluntarius po-
test sine musculis fieri: at sensus inest universis
particulis, quæcumque nervi particeps sunt. Iam
tendo, tanto durior est nervus, quanto ligamen-
to mollior: quin & mole corporis talis, ut qui ex
ampliobus maxime factus sit. Et ligamentum qui-
dem omne infensibile, nervus autem omnis sensu
præditus: tendo uero, neq; infensibilis, quia est ner-
vi particeps: neq; ita sensilis ut nervus: non enim
est nervus tantum. Quatenus igitur ligamentum na-
turæ est particeps, eatenus bebetur in eo acro-
monia sensus. Cum namq; ex huius musculi orna-
tur, multo maior nervus qui descendit in muscu-
lum, liquet utriusq; ex nervo tantum ipsum consti-
tum esse, utrumque aliquid momentaneum ex na-
tura ligamentorum sumpsisse. Multa quippe lo-
cus sexcupla, multis etiam decupla crassitudine
verius superat. Et merito sane tantus & talis est
factus, ut qui & nervi, & ligamenti usum exhibi-
tus erat. Alligat enim musculus subiectis osi-
bus, in quorum capita munita cartilagine in-
feruntur: & hac quidem ratione nihil differt à liga-
mento. Sentit autem, atq; movet, quia ratione ner-
vi est particeps. At nervus ipse via quædam exis-
tens facultatis motricis, à cerebro descendens,
ut eam communem faciat, extensus est, atq; liga-
mento cõmixtus. Tendo itaq; sic ex utroq; con-
sistat. Omnis igitur tendo, in os omnino infer-
tur: non tamen omnis musculus definit in tendonem.
In nullo enim musculorum moventium lan-
guam (cõstat enim ex utroq; musculis) tendo na-
scitur. Nullum siquidem os erat lingua motura,
sed educta voce articularetur, & saporis dijuda-
nura, & masticationi atq; deglutioni adumen-
to futura. Iam cor plurimum à musculo differt, &
crassitudine, & formatione, & contextu, & duri-
tie, sicuti & ena operibus. Perpetuo quippe mo-
vetur, cor, tum systole, tum diastole, idq; citra vo-
luntatis imperium. At musculus nec similes motus
sunt, nec sine voluntate fieri unquam possent. At
labra oris, ex cute musculoy concreta, absq; osi-
se moventur. Similiter oculi, motum habent vo-
luntarij à musculis. nullum autem os cum eis mo-
vetur. Præterea & cutis quæ in fronte & super-
cilijs est, tum plurimæ partes faciei, osibus quæ
scenibus, motu voluntarij moventur. Quod si
stomachus ipse, vel œsophagus, musculus etiam
est, erit unus musculus neque in tendonem defi-
nens, neq; os secum movens. At qui in ceruice us-
que suscipiens urinam, & qui in sede etiam est,
quib; in testes & penem descendunt musculi, nul-
lum profectio secum os movent: quare à prædi-
ctis musculus nullus profertur nascitur tendo. Cæ-
teri omnes musculi, quicquid ossa movent, in ten-
dones omnino definiunt. Qui uero aliud quip-
piam movent, quàm os, ut musculi oculorū, lin-
guæ, testium, penis, pharyngis, atq; laryngis, ho-
rum quibuscum sunt tendones, quibuscum mi-
nime. Musculi igitur oculorum, membrana quib-
uscum, sed ualidis aponeurosis, in duram &

nervosam tunicam adiacentem ragonidi, perue-
nunt. Penis autem & testium, nulla aponeurosi fa-
cta, carnes ipsorū particulis innascuntur. Muscu-
lorum qui in pharynge & larynge sunt, quibuscum
dam obicurs quædam aponeurosis, quibuscum
omnino non sunt. Mononis autem modis alibi
alius exiit. In lingua quidem motus uideri
possit: sursum enim atq; deorsum, ante & retrò,
sinistorsum & dextorsum circumferri uidetur:
partem etiam quasi reflexa & propensa, nonnun-
quam circulariter undiq; circumducta. Sed in oc-
culis quatuor quidē sunt recti motus: in oculis,
deorsum, dextorsum, & sinistorsum: duo autē
aliq; circulares. Duo etiam musculorū circa ten-
dones. Infrantibus enim dentes, inuicem tendun-
tur, atq; curuantur: hiantibus uerò, laxantur &
porriguntur. Ad hanc, in magna illa brachij mo-
tione, dum musculus flebit cubitum, curuatur
planè & in seipsum coir: dum extendit illud, laxa-
tur & exporrigit. Eosdē motus & musculus ma-
gnus interna parte cubiti apparet: contrahitur
quidem in flectendis digitis, laxatur &
exporrigitur, dum illi extenduntur. Sic etiam &
aliq; musculi penè omnes qui in artubus sunt, du-
plices motus uidebuntur habere, si eos denuda-
ueris cate. Sedis musculus propriū motū, quo-
niam & figurā diuersam, possidet, cõtraheis simi-
lem similem. Ceterū septum transversum limi-
le est tali cupiam rei, nisi quod non perforatum
est. Accidit autē ab omnis musculi, diuersum
ab his qui in artubus & facie locantur: hi enim
cum tenduntur & ad principium retrahuntur,
curuantur illi autem dum tenduntur, exporrigun-
tur: enruantur uerò dum laxantur. Porro mu-
sculorum qui in crutibus, manibus, atq; tempo-
ribus sunt, nullus habet tertium alium motū di-
uersum ab extensione & contractione. Quare il-
li omnes hallucinantur, qui unicuique mus-
culi multos esse motus affirmant, ignorantes
aliam ab alio musculo gigni motionē. Vterque
enim oculus, quatuor rectos obtinet motus,
quia & rectos musculos quatuor. Habet enim
duas circulares motiones, quia duos circuer-
tentes musculos. Ergo ut actio una, sic illorū mu-
sculorū singulis, natura unicus motus inest, aliis
uero per accidens. Siquidē operat quicq; trahēs
ad seipsum particulam quæ mouet: non operatur
autem, cum in contrariū locū ab alio musculo si-
mul cum mora particula abducitur. Ideoq; om-
nis pars quæ mouetur, uel uti ualid, in contrariū
distrahta habens, uicissim habet alterū ipsorū,
nempe qui trahit, intensus, alterum qui trahi-
tur, laxatur. Iam uerò si toros musculos atque
tendones per transversum abscindas, penitus
dissolues motū subiectarū particularū. Siu autē
incidens solūm, utiq; tantū lædes, quantū inci-
di sit. Quod si unusquisq; musculorū contrariorū
perat, morio simul peribit. Necessē nanque est,
morum qui sibi inuicem succedunt, altero pe-
reunte, & reliquum simul perire. Nam si is mo-
tus perat, qui particulā est nanis extendere, fle-
ctetur quidem primū, manebit autē in hoc statu
semper, quod non amplius extēdi possit, moru ex-
tensorio priuata. Quia cū extēdi nō amplius po-

Lingua
motus.

Oculorum
motus.

Temporis
musculi.

Brachij in-
stabilis.

Cubiti in-
stabilis.

Sedis muscu-
li.

Septum trans-
uersum.

Abdominis
musculi.

Crurum
musculi.

Oculorū utrius-
que habere qua-
tuor motus re-
ctos, quia totidē
musculos similes
rectos.

Musculorum sin-
gulis, ut unam
distrahta sit
motus esse natura
motum trahēti

Motus qui sibi
succedunt inuicem,
necessē est
uno perente: per-
ire alterum.

reſt, idcirco nec flexi quidem. Similiter ſi motu, qui natus eſt particulam ſeſtere, exolui accidar, extendetur quidem primi, ſed immobilis in poſterum fiet, qui nō amplius ad flexionem uenire poſſit, qua præcedite extenſio ſequitur. Itaq; abſciſſo eo qui intus eſt muſculo, exteſa pars in hac figura perſeuerabit: eo autem qui foris, flexa non extendetur amplius. Quod ſi tunc illam extendas manibus, ſtatim in priſtinū ſtatum redibit. Quippe flexio ab internis, extenſio ab extrinſecis editur, tum muſculus, tum tendonibus. Ad hæc, ſi principium ſuperum muſculi tranſuerſim abſcideris, totus ad caudam feretur. Si ſinem inferiorem, retrahetur ad caput. Si utriq; abſcideris, eum concurrentem ad medium inter ipſos ſineſus habebis: adeo omnis particula muſculi cognatam habet motū in ſe, ipſam ſcilicet conſonē. At uerō, ſcirrhus genito in interno, aut tentione aut muſculo, pars flexa non amplius extenditur: in externo uerō, extenſa non amplius flexabitur: contrario modo quā in uulneribus ſe habebat. Quæ autē in ſcirrhis, eadem in phlegmone, & in ſcaticum duritie fieri cernuntur. Ergo reudi quidem ſurſum, & demitti manum, articuli qui in humero eſt, & muſculorum ipſum mouentium: extendi autē & flexi, brachij ad ulnam: at uolui ad pronum, & ad ſupinum, brachij ad radium eſt actio. Quæ uerō manus tangit ſpinā, ea actio d quatuor articulis ſimul moti ſit. In uniuerſum autem, uulſi quicq; dum tenitur muſculus, trahit ad ſeipſum partē in quam inferitur. Qui enim in caput brachij inferuntur, ſurſum tendunt ipſum. Cubiti uerō os extendit qui in cubito ſunt, foris in ipſum. *Quædam ſineſtae.* Radium ad pronū qui intus in cubito ſunt, in ipſum extrinſecus terminantes. Porro quicq; dignus ab internis tendonibus flexitur. Cæterum neq; omnis motus manū, actione ſit muſculorum: neq; omnis immobilitas quiete. Nam cum duo motus ſint ſibi inuicem proximi, ſed 40 qui diſſimiliter ſunt, reſcitant ſcilicet ac decidentia, reclinant quidem actione muſculorū, atq; ob id uoluntariē, perſcitur. decidentia præter uoluntatem accidunt, nec muſculo agente, ſed potius quieſcente indiger. Hac enim ratione, decidere & declinare diſſerunt: eademq;, & deorſum ferri manum, atq; demitti. Deorſum enim fertur ceſſantibus omnibus muſculis qui in ea ſunt, & corporibus ab innata grauitate deorſum trahitis. Demittitur autem, muſculus qui ſub ala ſunt, ad ſeipſos trahentibus brachium. Tertiū itaq; hæc decidentie motus inuentus eſt muſculorū, præter duos illos iam dictos: quo quidem etiamſi nec extendantur, nec contrahantur aliquis muſculus, ad totius tamen membri motū mouetur, pennde ut offa, aut aliquod inanime corpus. Ex ipſis autem ueris muſculis motibus, contractio quidem eſt tanquā instrumenti animæ actio: extenſio autem tanquā instrumenti quidem, nō tamen actio, ſed ſimpliciter motus. Eſt 60 & quartum genus motionis, quo quidem agūt ualenter muſculi, quamuis haud moueri uideantur: ut ſi manum ſurſum tenſam eſſe ſingamus, & in ea diu figura ſeruari: quia nāq; tunc muſculi agunt, idco eos moueri dicimus. Quatuor

igitur omnino differentie motuum reperiuntur in muſculis. Nam aut contrahuntur, aut extenduntur, aut tranſferuntur, aut tenſi manent. Eſt autē eiſdem generis quarta differentia cum prima: ambe enim actiones muſculi ſunt. Porro qui muſculorū corpus ſic conſtitutum auit, ut ſuapte natura contrahat & flexi poſſit, ſine admitticulo animalis potentie, hi quidē minime probabili pronuntiant. Nam ſi uterq; muſculus, 10 quod ſecundum illos natus eſt facere, id ſemper ageret, nihil certē prohiberet, perpetuo corpus obnoxium eſſe tetano aſſectui, qui tum ſanē ſit, dum inuitæ partes in contraria retrahunt ab oppoſitis muſculis. In exactam itaq; & perfectam flexionem nunq; corpus muſculi ex ſeipſo peruenire poterit, niſi a facultate animali adiutū: licet magis propriū ſit corpori ipſius muſculi contrahere, q; extendi. Tam uerō cum offa inuicē cōant, ut aliquis articulus fiat, alterū quidem ipſoſa eſt 20 quod moouetur, alterum uelut ſedens quædam eſt quod mouetur eſt ſubfirmatum, quomodo cernis cardines oſſium eſſe habere. Quare neceſſario manenti quidem, cauſas, ei uerō quod mouetur, conuexitas adeſt. Vocatur autem cauſas glene & coryle: ſicut conuexitas, caput, condyluſq;. Verim tantō coryle quā glene eſt profundior, quantō caput cōdylō eſt longius. Cū uerō hoc modo bene ſe haberent quæ mouenda erant, multo adhuc aptius artiſticiouſuſq; natura cōiunxit eis, quæ morura erant. Nam muſculos quidem, inſtrumenta motū produxit ex ſuperiacentibus oſſibus, in quibus ſunt corylix. Inferius autē in capiti ſubiaccntū, quæ erāt mouenda 30 & per huc extenſa, capinbus ſurſum trahitis, ſimul cum eis totum membrū ſurſum trahitur. Cū autem alter ipſorum manus, alter uerō minus os eſſet moturus, magnitudinem muſculorum qui motui erant, creauit proportionē parē moli mouendorū oſium. Quare alij quidem ſu re ex ipſis capinbus aut condylis ſuperiacentū oſium ſunt exorti: alij uerō paulō his inferius iuxta corylem aut glenam, ſed non multū. Pari ſiquidem hoc paſſo penitus fuiſſent, nec poſſent mouere ſubiectū os. Ergo nullis muſculorum dictorū, extremam flexionē, aut ſummā extenſionem partis efficere poterit, abſq; animali impetu: quo quidem ſi priuētur muſculi, mediſ uidebis figurā oſſiū inter ſe mutuō fieri. Quod ſi extremū incidieris muſculo, flexi membrū 40 ultra mediam figurā uidebis. Pari modo ſi muſculum in internū incidās, extēdi particulam plus medio uidebis. Itaq; præualente muſculo externo, extenſionem: interno autem, flexionem fieri contingit. Quare quipollens ipſius corporis muſculorum fit motus, quando neuter totum animale habet auxiliare: uon æquipollens uerō, cū alter ſolus dominatur: ac proinde neceſſum eſt uncat cōtractio illius muſculi, qui ab animalis facultate adiutū. Porro muſculi, quantum ad ſtructuram quidem ipſorū pertinet, perfectē contrahi poſſunt: ob ligamentum autem in caput oſis inferunt, prohibentur quo minus extremē cōtrahantur, cogunturq; mediam ſeruare figuram, niſi fortē ab animali facultate moeantur. Ex dictis igitur conſtat, abſciſſo muſculo

Motuum quatuor differentia in muſculo.

Tetanus quando ſit.

Muſculus abſq; facultate animalis non poſſit recipere contractionem. Oſium uicinatione ratio.

Glene coryle. Condylus.

Muſculorum in ſeruantia ratio.

Flexio ab internis, extenſio ab externis ſit tum muſculus, tum tendonibus. Muſculus tranſuerſim ſectus, in quā reuoluitur pars.

Muſculus omniſi diſtinctiſſi, trahit ad ſeipſum partem in quā inferitur.

Reclinatio quā ſit. Decidentia ſit præter uoluntatem. Delatio manus, atque dilatatio, quomodo diſſerant.

Contractio. Extenſio.

Motus quatuor generis.

Motus figura in motione artuū quā ſi ſeruetur. Extenſio quā muſculo ſit. Flexio interne ſit muſculo.

musculo externo, ultra quidem mediā figuram subito iussit membrum, non tamen ad extremam: quandoquidem externus musculus non potest penitus extendere ipsum, absque animali impetu. His subscribunt quæ ab Hippocrate de figuris sunt tradita. Primum quidem, quod flectentes penitus aut extendentes quācumque partem, dolemus. Secundum, quod media iutarum figura, minimū dolorem affert. Tertium, quod mutari onē celerem in extremis figuris appetimus.

Extremam at totam figuram dolores affert.

Media figura dolorem caret.

Mediam figuram formamque duntaxat.

Figura omni molesta, summe imbecilis est.

Figurarum extremarum celerem mutationem optant, media tardam.

Quartū, quod duntaxat media figurā seruamus, nullā mutationē cupientes. Quintū, quod hanc quoque mutare aliquod desideramus. Sextū, quod omnis figura molesta, est summe imbecilis. Nam figurarū excessus, merito dolore affertur: nempe quum alter musculorum agit, alter extendatur præter naturā. Media uero istorum figura & ab actione & a nimia tensione utroque inhibens, merito iucundissima est. Quare & mutationem figurarum quidem quæ dolorifice sunt, celerem optamus: eius uero quæ dolore caret, tardam: quippe & ipsam mutare aliquando desideramus, quia in ea etiam tensione quando musculi sustinent, minore tamen quā in omnibus alijs. Eam autem dolore caretē dici mus, non quod nullus penitus doloris sit particeps, sed quod minimū, & eius ferre insensibilis, propter paucitatem. Atque ipsam mutari tum cupimus, quum egregregat paulatim, sensibilis reddat. Dum enim iumentū imbecille fuerimus, ut in stomachicis & cardiacis syncopis, tum nec breuem quidē tensionē ferimus, nec mediā toleramus figurā: quo fit, ut quāvis impotētes simus ad motus, tamen alijs alio tactibus mēbra, alijs quidē cōsequi figurā dolore caretē optantes, sed nihil tale prorsus inuenire potentes. Igitur omnes musculi, ex se quidem in extremā contrāctionem festinant, sed non possunt hanc consequi, quod oppositos in contraria trahentes lia-beant, & cum illis grauitatem ossium annexam.

Musculi omni in extremam contrāctionem festinant.

GALENI PERGAMENI de motu musculorum Lib. II.

Porro in media figura, quæ in partibus certitur, necesse est duplicem constitutionem inesse musculis: alteram, qua neuter oppositorum musculorum agit, sed ambo quiescunt: alteram, in qua similiter utriusque agunt: quæ actio tonica nominatur. Sic autem est: prope mediā figuram utriusque constitutus membrū, & quæ utriusque musculi agere poteris. Quum autem ad aliquā superantium figurarū duxeris ipsum, alteri musculi satis esse possunt actioni eiusmodi. Quare media figura cum tali actione, neutra superantū inferior est: unde nec ipsam simpliciter carere dolore dicamus, sed eam quæ in quiete fit. Media namque figura cum intentione utrorumque musculorū, & quæ ac extremā, dolorem affert. Quis uero in ipsa quiete media figura partim simpliciter est, partim nō simpliciter: simpliciter quidē media omnium membri superantū figurarū: non simpliciter autem, quæ alterius oppositiōnis solū est: quæ quidem simpliciter media est, ea sine farigatione duntaxat fuerit: de nulla tamē aliarū

exactly id dici possit. Huius autem sermonis in manu constituamus exemplum. Etenim quum in ipsa extremæ figuræ sunt quatuor, pronā, supinā, iumentā extensio, & flexio summa: atque figura quidem supina manus fit, quum eius concava pars, sursum est, cōuexa autem deorsum: pronā uero huic cōtraria: sita media ambarū, quum intrinsecus quidem fit concavum, extrinsecus autem conuexum: ac subiectus quidem est paruus digitus ceteris: os uero cubiti, osi radii, quæ figura media, potest quidem extensio perfecte manu, potest etiam flexa consistere: quemadmodum & alterius oppositiōnis media figura consistere potest, quum supina est manus, & quum etiam est pronā: certe quæ quidem simpliciter media figura est, omnium istarū est media. Quæ autem non simpliciter media, unius est media uersus ipsius oppositiōnem. Alia enim extensio-nis atque flexionis extremā, alia supinæ & pronæ, media figura existit. Media itaque simpliciter ex cō-cursu ambarū dectarum quatuor figurarum consistat. Aliæ uero medæ quatuor quidem e-runt uniuersæ, sed nulla ipsarum simpliciter me-dia totius membri erit, sed unius tantū oppositiō-nis. Aut enim extensionis & cōtrāctionis solū erit media, aut supinæ & pronæ. At quum utraq ipsarum sit duplex, iuncta uicissim excessibus re-liquæ oppositiōnis, sic necesse est quatuor omni-nino fiant. In singulis autem ipsarum, aliud quidem commune est omnium, aliud uero proprium cuiusque. Commune quidem, quod omnino unum aliquod genus musculorum agit: reliqua uero tria tenduntur quidē per accidens, non au-tem agunt. Propriū uero cuiusque angularis quidē & pronæ est, ut agant in quidē musculus, qui intus conuertunt os radii, alij autē omnes quies-centes tendant. Ceterum angularis quidē, sed supinæ, est propriū, ut qui extra circumducunt, agant, reliqui uero quiescentes tendantur. Eo-dem autē modo & in media inter pronam & supinam, ut cum summa quidem extensione soli exten-deutes agant, est propriū: cum flexione uero soli flectentes, quum ceteri omnes ociosi quidem sint, sed tendantur. Rem autem accura-tius examinemus in hunc modum. Brachium est pars totius manus maxima: cuius termini sunt articuli duo, quorū alter in flexura brachij, alter in humero cernit: ceterū illi unicus os rotundum & magnum. Altera pars totius manus, quam ulnam dicimus, brachio quidem iungit per cubiti articulum: carpo autem, per ipsum. Constatque ulna ipsa duobus ossibus: uno quidē, quod etiam dicitur ulna: altero uero, quod radi-us. Inarticulatur autem ambo ad brachij inferiorem oram: ulna quidem ubi medius locus condylorum brachij est: radius uero externum brachij ipsius cōdylum amplectitur, in glenem desinens, atque circum ipsum ueluti axem quendam, manus cōuersiones regit: quare intro quidē dum circumagitur, pronā figura manus: extra uero, supinā sequitur. Extendere autem & flectere manum, dearticulatione cubiti ad brachium est actio. Brachij enim ora inferior dilatata, nodis circumscribit. Vina uero, processus duos flexos faciens sibi inuicem oppositos, me-

Figura manus quatuor extre-ma.

Figura manus simpliciter media, quæ sit.

Figura non simpliciter media, quæ sit.

Angularis figura proprium.

Brachij descriptio.

Vina. Radius.

Media figura quæ cum trifido utriusque sit musculi, affert dolorem.

Figura mediam simpliciter dicitur.

diamq; ipsorum cavitatem figura x literæ simili efficiens, hac cautate amplectitur medium locum condylorum brachij. Quum igitur concavitas ulnæ congruitur circa concavitatē brachij, extendi arq; flecti accidit toti membro. Ut autem in neutra partem in claret, superolice mediz cavitatis, causæ sunt, coarctantes ulnæ apophyses. Quum igitur anterior apophysis, motus dux est, flectitur membrum: extenditur autem, quum posterior. Terminus uero, flexionis quidem, ut anteriorem apophysin asserim ad os brachij: extensionis uero, ut posteriorem. Duo autem musculi, in partibus anterioribus brachij, ac toridē in posterioribus orti sunt, ualidis ligamentis ulnæ inferti. Incipiunt enim maiores eorum à capite brachij: minores multo inferius: ferunturq; omnes quatuor rectā ad ulnam: & inferuntur in hunc maximē locum, unde oriri incipiunt coronæ. Ab his igitur musculis ulnam attrahentibus, extensio, & flexio fit. Quatuor autem alij, principia quidem habent ab ulna, ex utraq; parte flexuræ, quæ in gibbero est: duo quidem extrinsecus, duo uero intrinsecus. Omnes tamen quum sint obliqui, osi radij inferuntur: ad finem quidem ipsius inferiorem, magni in medio uero, parui: qui etiam ipsi dum tenduntur, ad principia simul attrahit radium, & per hunc totam manum, pronam quidem internam, supinam externam efficiunt. Ex prædictis igitur facile demonstrare licebit, in quatuor differentiis figurarum non simpliciter mediarum, unum quidem genus musculorum semper agere: omne autem aliud quiescere quidē ab actione, uerū extendi: ut in angulan simul & pronam figura, in qua musculi quidem interiores moventes radium, operantur, exteriores autem otiosi extenduntur. Similiter & ulnæ musculi, & alij omnes in figura æ inuertunt, quantum rota manus discedit à figura secundū naturā. Nec secus in figura alij non simpliciter medij existimandum. Ergo media simpliciter figura, præterquam quod nullum musculum habet, nec agentem, nec qui uolenter moueatur, ne aliquid quidem eorū quæ in membris sunt distorquet: quare sola prorsus caret dolore. Cæteræ uero omnes, aliz magis, aliz minus inuertos habent musculos omnes, & tendones, & neruos, & præterea etiam arterias & uenas, ac proinde dolorificæ sunt. In singulis autem ipsarum, quantum discedens ab extrema constitutione ducis membrum ad mediam, tanto minus dolorificam efficit figuram. Sola itaq; figura simpliciter media, musculos omnes perfectē quiescentes exhibet. Iam uero ex dormientibus ij tantum musculos omnes perfectē quiescentes habent, qui ob ebrietatem, aut defatigationem, aut uirium infirmitatem, omnes corporis partes omnino exolutas habentes, in mediam eam figuram reducere, ipsi musculi permisunt. Non tamen in extremis figuris ullam particulam quiuiscere habere, dum dormit. Quæcumq; autē in medio sunt inter extremas & mediam figuram, in his ut plurimum, somnum capimus. In quacunque enim talium constituitur membrum, musculis circa ipsum toticē agentibus * commi-

seris ipsius figuræ conseruationem, adeo illam tuent, ut sedentes quidā dormierint, & deambulantes nonnulli. Id quod mihi olim conigit, qui semē stadium integrum dormiendo peregi. Sunt qui paruum aliquod corpus flexis digitis enam dormientes seruant, nec citra tonicam actionem uehementem. Ad hæc, inferior maxilla, non discedit à superiori, nisi aut ebrius, aut ualde ignauus, aut defessus sit is qui dormiat. Et ipse quoq; stertor, propter hæc fieri asolet, relaxata quidem inferiore maxilla, supino autem iacente homine. Itaque & supinum iaceat, & hiat * cum stertore, aut exolutionis, aut ebrietatis, aut ignauiz sunt signa. Ob idij Hippocrates utrunq; e damnat: decubitus autem in alterum larus commendat: sicuti & medietatem hiarum. Extremæ igitur inferioris maxillæ figuræ sunt, tum quæ maximē hiantibus, tum quæ dentes inuicem firmanibus sit: quarum illa quidem à musculis qui in mento & collo sunt, deorsum trahentibus: hæc autem ab ijs qui intra maxillam ex palato oriuntur, & eis qui temporales uocantur, perficuntur. Verū mediocriter hianti, media figura sit, omnibus dictis musculis quiescentibus: ad quam morientibus maxilla inferior sponte sua merito accedit: omnes enim tunc musculi sua actione priuantur. Porro meatu excretoriorum finibus, cum portis quibusdam, custodes præstant præuolenti musculi, qui ne in dormientibus quidē permittunt quicquid externi, priuquam ratio iusserit. Contingit autē inuiri nobis aliquod excrementum externi, aut resoluti his musculis, aut ratione deprauata, ut in phrenencia, aut etiam ratione & musculis grauant, ut in ebrietantibus. Temeraria igitur sententia est, quæ assent dormientium animam quiescere: quandoquidē cessano illa non quies perfecta, sed inter missio uigoris existit. Non enim sensus expertes sentientes sunt dormientes, sed difficulter sentientes: ac proinde actiones quæ in illis sunt, nō omnes sicut naturales, sed ex eis multæ animales existunt, quum nimirum uariē transferant membra, necnon dormientes loquantur. Ac respiratio ipsa, actio existens phrenon & musculorum thoracis, motu etiam sit uoluntario, estq; anime, non naturæ opus, nepe iudicio subdita: quippe mouere musculos, animi officij est. Etenim si quæ sunt, sedare potes quū uis, & quæ nō sunt, facere, idy citius aut tardius, crebrius & rarius, hic motus est uoluntarius. At motus arteriæ & cordis, quandoquidem non subijctus nostre uoluntatis imperio, non anime, sed esse opus naturæ dicitur. Respirationi itaq; etiam inter dormiendum dominatur uoluntas, etiam si id non assequamur mente. Siquidem neque palpebrarum motui, neq; alij multis actionibus animalibus animū adhibemus semper dum uigilamus. Quare quæ causam in uigilantibus dixeris, quod sæpe non animaduertant particulares actiones: hæc etiam & ad dormientes & grauius oppressos trāsferre licet. Multos enim homines interdam actiones quasdam egisse constat, quarū paulō post penitus sunt obliui, q; interm actionibus tota mente non fuerint. Pars quippe anime imaginatrix, quæ

Dormiens Gal. catopis stadium abijit.

Stertor quomodo accidat.

Decubitus supinum damnat.

Decubitus in alterum larus commendat ab Hippocrate.

Maxilla in ferro res figuræ accipit, à quibus masculis hiant.

Maxilla figura media moriens bus accidit.

Musculi excrementorum resoluti ducunt.

Dormientes nō esse animæ sensus expertes.

Respiratio est uoluntatis actio, non naturæ.

Motus uoluntarius quæ sit.

Motus arteriæ & cordis est naturalis.

Imaginatrix vim recordari.

Extensio, flexio que brachij, à quibus masculis hiant.

Figura resque media, sola prorsus caret dolore.

Somnus in quibus capaxat figuram.

que etiā & recordari uidet, si insignes impressio-
nes rerum imaginatione conceperit, conseruat
perpetuū eas: atq; id quidem est memoria tene-
re. Sin uerō obliuiscas & penitus superficialias,
non conseruat: & hoc est obliuisci. Obidij in ue-
hementibus animi affectibus, nullius eorū quæ
egerint, in posterum meminerunt. Quid igitur
muri est, in somnis obſcurē agente anima, obſcu-
ras etiā imaginationes fieri, id eorū neq; ſtabiles,
quū id enim in uigilijs contingat: Quod autem
totum opus reſpirationis uoluntariū & ſpontē
ab ipſa anima fiat, declarauit quidē id barbarus
ille ſeruus, qui cohibita reſpiratione a mortem ſibi
conſciuit. Caterim uoluntariū opus, alia quidē libera eſſe, alia uerō affectibus corpo-
ris inferuari uidentur. Priora itaq; ut ite ad ali-
quem, & alioqui (uerbi gratia) perpetuū a nobis
& abſq; obſtaculo ſiunt: quare abſolutē ſunt libe-
ra. Poſteriora uerō, ut egerere, mingeretq;, non
perpetuū, ſed in tempore quodā & cum menſu-
ra ſuntq; corporis affectuū remedia. Atqui non
nulli tacerent quidem ultro annū integrum:
egeſſionem uerō uel urinaū retinere non mo-
do annis, ſed nec diebus quidē paucis nemo po-
tuit. Simile igit & his eſt ſpirationis opus: imō
multo magis urget, ac celeriore neceſſitate
labet. Etenim periculum eſt, ne quis moriatur,
niſi reſpirauerit. Quare non eſt quod quiſpiam
exiſtmet, naturale eſſe opus reſpirationē, quod
uſquequaq; retinere ipſam citra diſcrimē uitę
ſolliceat. Sed iam quod deſt ſermoni de medijs ſig-
uris, deinceps abſoluamus. Vt enim in manu-
bus angularis figura, omnis proutis doloris eſt
expers: ſic in cruribus illa dolore caret, quæ cōſi-
ſit inter mediā figuram, & extensionē extremā.
Cauſa aut cōſuetudo eſt. Plurimū enim extenſis
cruribus uniuſ: multoq; magis laboramus in
extremis flexuonibus, q̄ extensionibus. Tantum
igitur a media figura ad extensionē progreſſum
eſt, quod perfectē caret dolore, quantum a diu-
tina conſuetudine membrorum eſt coactum.
Hæc igit duo conſiderans in articulis uniuſis,
naturam uidelicet & conſuetudinem, inuenies
medium & dolore carens. Videtur autem in idē
conſpirare ubiq; conſuetudo cum natura: ſig-
ura uerō dolore carens cum medio. Etenim in
cruribus idem eſt quod dolore caret, & mediū.
In uniuſum igitur in omnibus articulis extre-
mos motus cōſiderans, inuenies medium, & ſig-
uram doloris expertem. Vt enim in articulo
ad giberum, quod uocat angulare in articulo
uero ad genu, quod propius eſt extenſioni: ſic
in ſpina quod propius eſt flexioni, in articulo ue-
rō ad carpum, quod exquiliē rectū eſt, doloris
expers exiſtit. Etenim non ut carpi, ſic etiam ſpi-
næ rectum ipſum eſt medium, ſed aliquantum
curuū. Quia propter rectū magis laboramus par-
ticulari ſpina, quā ſedentes, aut iacentes. Opus
enim eſt ſtantiū quidē, tenſam eſſe: iacentibus
uerō & ſedentibus, nihil prohibet eſſe curuſſatam
ſpinā. Porro quicunq; muſculi ſine articulis
ſunt, etiam in his media conſtitutio ſine dolore
eſt: ſicuti in ano ſe habet, uel ſcā, & lingua. Nam
& ſummē conſtringere, & maximē dilatare a-
nū, dolore inducit: ac ſic de cæteris. Atque

omnes homines quo tempore ceſſant ab actio-
nibus neceſſarijs, medijs figuram & dolore ca-
rentem in omnibus partibus habent. Verum in
lingua quidem per coniugationem omnes muſ-
culi orti ſunt ſuperne, infernæ, & à dextris, & à
ſiniſtris: quare nihil miſi ſi in contrariis motus
particula deducal, à muſculis oppoſitis. In mu-
ſculo aut ani & uellic, necnō diaphragmati, ali-
ter habet uerſionē. Nam quum lingulis harum
partū unicuique tantum ſit rotundus, ſine ullo op-
poſito, muſculus, in contrariis deduci motus hæc
particulæ uellic, non eque facile poſſunt. Atq; quicunq;
qui eſt ad uellicam & anum, officiū eſt, nō ex-
tere ſuperſua alimēt, ſed retinere: niſi forte per
accidens, quum deſiderint agere. Caterim inſtru-
menta excretionis, duplici genere ſunt. Eorum
quippe alia animæ, alia naturę ſunt. Atq; animæ
quidem inſtrumenta ſemper motu uoluntario
agunt: inſtrumenta uerō naturę, citra ipſum. At
phrenes quidem, & omnes muſculi epigaſtri,
inſtrumenta animæ ſunt. Intestinorum autem
ſtructura, unū cum uentriculo, ipſius naturę. Mu-
ſculi itaq; epigaſtri omnes, quum agentes ten-
duntur, premunt intro naturę inſtrumenta: hæc
autem, ſi phrenes ipſis cedant, in illarum locum
abeuntia, muſculorum uolentiam exoluūt. Sin
autem reſiſtit, tunc ceu à duabus manibus preſ-
ſa, extrinſecus à muſculis, intrinſecus à phreni-
bus, a anteriore quidem parte cartilagini pecto-
ris, poſteriore ſpinae coherentibus, ea quæ con-
tinentur in cauitatibus illorum, fortiter propul-
luntur: quo tempore muſculus ani eſt ocoſus.
Caterim in egerendo quidem, ſuperiores in
meiando autem, inferiores magis tenduntur mu-
ſculi. Simul autem cum ambobus extenduntur
muſculi ſeruientes reſpirationi: ut uidelicet oc-
currant uentriculo & inteſtinis, ab epigaſtro ip-
ſo propulſatis ad regionē thoracis. Iam expira-
tionis nullus muſculus omnino eſt opifex: ſed
uidet hoc ipſum opus, aut potius affectus tho-
racis, omnino eſſe ſimilis decidentē illi à no-
bis expoſitæ. Eſſatio autem eſt ſpiritus conſer-
tim emiſſus ab intercoſtalibus muſculis: ut
etiam thoracis opus, diſtæ reclinationi, quod
proportionē reſpōdet. Verum quū expirationi
contraria ſit inſpirationi, eſſationi uerō uellemus
inſpirationi, priorem quidem oppoſitionem ſo-
le phrenes efficiunt: alteram uerō in tercoſtalis,
cum muſculis qui ad thoracem ex collo, ſcapu-
liſq; proueniunt. Quum autem maxima quidē
inſpirationi per externos, maxima uerō expira-
tio per internos intercoſtales fiat, uſtus utiq;
quiſpiam muſculos thoracis externos, q̄ qui
thoracis parte interna ſunt, quum phrenibus,
oppoſitos eſſe dixerit. Porro diaphragma ip-
ſum, ubi agere deſicit, laxiusq; fuerit, nunc qui
dem ipſius cōuexitas uerſus ſpinā uergit, nunc
uerō ad uentrē: multo tamen promptus uerſus
ſpinā fertur. Eātq; in omnibus figuris hominis
(una excepta pronā) ſuperius quidem diaphrag-
ma, inferior uerō ſpinā: quare merito ad eam
uergit: tum quia grauā quidē ab his quæ an-
teriori parte ſuperiacent, tum quia retrō molliſſi-
mum & tenuiſſimum omnū uicerū habet pul-
monē. Duplex igit quū ſit tenſio omnibus mu-
E 2

Natura tenet
et quid.
Obliuisci quid.

Respiratione co-
hibita. ſeruum
quidē ſibi mor-
tem conſciuiſſe.
Velut extra op-
ta duplicia.

Tenſio uel
animum uel
grauem.

Respirationis
natura.

Naturā conſue-
tudinēq; conſi-
derans, inue-
nit mediū ſi-
ne dolore ca-
rentem.

Doloris expertem
in figura.

Spina figura me-
dia, nō eſt recta

Muſculi ani &
uellicæ moueri
eſt uellicæ extre-
mæ, ſed conſtru-
gere.
Excretionis in-
ſtrumenta dupli-
cia.

Phrenes.
Intestina ſunt
naturæ uolun-
tariæ.
Epigaſtri mu-
ſculorum opus.

Expirationis
nullus muſcu-
lus eſt opifex.

Eſſatio quid.

Inſpirationi expi-
rationi contra-
ria.

Inſpirationem
maximam ſer-
uit per externos in-
tercoſtales mu-
ſculos, ut capta
uicem per in-
ternos.

Tenſio duplex
omnibus mu-
ſculis.

sculis, una quidem, quum agentes in seipsis coeunt: altera uero, quum à musculis oppositis extenduntur: priorem quidem phrenes, in inspira-
nombus non violentis habent: altera uero sit, alijs musculis uentris agentibus, alijs intercostalibus, & his etiam solis. Verum musculi costarum & uentris, quandiu quiescunt, conuexi perpetuo sunt: quum autem agunt, intro cedunt, minusq; curui fiunt, contra quam ceteri omnes aliarum partium musculi.

GALENI PERGAMENI de Vteri dissectione, Liber Vnus.

Vtrum inter uiscum & intestinum rectum.



Colla vesicae, semina.

Rectum intestinum.

Vteri moderati magnitudo.

Partes muliebres descriptae.

Cornua, sine apice uteri.

Vteri conuexio.

Terus sub peritonio, inter incumbentem uiscam, & rectum intestinum, suam sedem forsitur. At uero focumiarum uesica circa pubem sita est, collum breuius & laxius habens, quam uesica urinis, quod inter ossa pubis ad iocimineum pendendum extenditur. Rectum uero intestinum osi sacro, & quibusdam spinæ uertebris innititur: ac proin de spina circa id incuruat. Magnitudo uteri non aequalis omnibus est. Cæterum magnitudine moderatus, superna quidē extremitate est propinquus umbilico, inferna aut muliebri pendendo committitur. Etenim spanti ab illa extremitate suprema, usq; ad oram exteriorem pendendi, ut plurimum, quod moderatum est, undecim digitorum. Secundum latitudinem uero, ad utrumq; latus per suos apices, siue cornua, extenditur. Ipsum autem muliebre pendendum circa externas partes pellicem eminentiā adnatā habet, instar preputij urinis. Corpus uteri, uesice simile est: à lateribus tamen habet papillares exortus, uersus lumbos nutatis, qui apices & cornua appellant. In mulieribus tamen minimè reperitur fœtus intra ipsa cornua, quem admodum in cæteris animalibus numero sum partu gestantibus (multo enim minora sunt, quam pro magnitudine fœtus) sed in reliqua tota uteri cavitare. Cōtingit aut moderatæ magnitudinis uterus ipsa tenuis infirma: qui uero excellenter est paruus, ac folium cum quibus coaluit. Rursus maximus uterus, nēpe qui iam fœtum gestat, latera implet, ac inuicem uentrē, & multa intestina contingit. Appender aut per fibrosas quasdam & tenues distantias intestino recto & uesicæ. Appender itē osi sacro per quasdam ligamenta robusta, ac per similia etiā, ipsius spinæ uertebris: cuius musculi magnis (qui memorabiles utrinq; faciunt exortus, & in utrumq; uteri partē, & in uesicæ collū, & in sedē distribuunt) connexus est. Laxa sunt autem hæc omnia ligamenta, & ob id uterus plurimū moueri, & habitu suo transmutari potest. Sunt ligamenta alia & appendices quæ in ipsum uterum inferuntur, partim quidem eius corpus rextentia: quorum pars nō exigua sunt nervi ab spinali medulla orti: partim uero incrementi & nutrimenti ipsius uteri, itemq; fœtus gratia, constituta: ut sunt arteriæ atque uenæ. Vesicæ autem & podici sic iuxta collum coalescit uterus, separari ut per excoriationem facile ab ipso possit. Coalescunt etiam ei testes & seminales uasā: quemadmo-

dum cum pendendo ipse circa extremitatem sui collū. Iam uero à uena caua, & arteria magna illi incumbente, exoriantur duæ uenæ, & duæ arteriæ, utrinq; sanè una, uena quidē à uena caua, arteria uero ab arteria. Deinde altera quidem à dextris ad dextram, altera uero à sinistris ad sinistram uteri partem delata, antequam in ipsum uterum inferantur, ramulos ad testes extendunt, posteaq; in uteri corpus se insinuant, atq; intertexunt ipsum. Hæc itaq; quatuor uasā, paulo inferius sunt sita, q̃ quæ deferantur sub renes: uenæ tamen multo sunt arteriæ maiores. Aliæ præterea uenæ & arteriæ, ab utraq; uteri parte, circa collum ipsius inferuntur, ab ea quæ ad pendendum & sedem peruenit, manifestè distinguēte. Ipsum autem uteri corpus duæ constituunt tunice obuersim posite, ad distensionem & contractionē aptissime: quarum externa quidem, nervosior, simplex, & una est: interna autem ueniosior & duplex: cuius partes cōstituunt quidem inter se, non coalescunt tamen, nec prorsus uniuntur, sed se distinxat coniungunt, & à circumscissa tunica continentur. Si igitur per excoriationē eas separare cōtēdas, duo uidebunt tibi uteri esse, sub una eademq; tunica sita. Hanc enim tunicam ueluti uterum in duas partes separare amplius non potes. Habet autem multas aspredines illa uenosa tunica, maxime circa fundū. At nervosa quæ ipsam ambit, multo crassior quam uesicæ tunica est, & ipsa multis uenis arteriisq; intertexta. Cæterum collum uteri muscululosum existens, ex carne natum est dura cartilaginosa: quæ ad progressum temporis adeo cartilaginosa euadit, ut quæ sæpius pepererunt, aut iam aniculae sint, his multum durum & cartilaginosa existat. Habet autem in se foramen, per quod excernunt menses, ac tum uin semen excipitur, tum egreditur partus. Finit autem collum ipsum in muliebre sinum non rectum, neq; rectū in omnibus: sed declinat in sinistram, & dextrā, sursumq; & deorsum. Quod autem ad anteriorem & posteriorem partem attinet, similiter se habet in omnibus. Consistentiam etiam uteri, pro ætate atque affectuum ratione, contingit uariari. Quin secundum naturam, crassius quidem & magnas, ac tumidas appareret uterus, lunari purgatione prodeunte. Sic autem & tenuis est, qui longissimè ab eo tempore abest. Crassior item pregnantis: crassissimus, eius quæ sæpe peperit. Rursus, eius quæ iam concepit, crassus est: eius uero quæ partu est uicina, magnus simul & tenuis. At uero testes fœmini à lateribus uteri sin sunt, singuli ab utraq; fundi parte, prope cornua: magnitudine multo minores quam in maribus: figura item et corporis musculi omnino multum differentes. Lat enim sunt fœminis, rotundi uero & oblongi maribus: & glandulosi quidem illis, tenera uero carne masculis. Complectitur autem utrumq; fœmini propria pellicula tenuis. At fœotum fœmini testes non habent: eis tamen & arteriæ & uenæ inferuntur, ex eis quæ ad uterum tendunt, in singulos singule progredientes. Verum cōmissa inter se hæc uasā priusq; inferantur testibus, instar cæcæ intertorquenti, nō secus quam

Vteri uasā

Vtrum constituantur duæ tunice.

Vteri collū cartilaginosa.

Vtrum præterea tunica crassior.

Testis fœminis non sit.

Testis fœmini necum masculinioris differentia.

Testis fœmini non sit.

Testis fœmini non sit.

*Seminaria va-
sa in fœmina.*

quàm in ipsiſ maribus. Cæterũ ſeminaria uafa,
quæ & ipſa continent ſemen, prope teſtes quidẽ
ſunt ampla, ſeſilemĩg poſideant cautatem: an-
guſtiora uerò ac ueluti nõ cauã redduntur, pau-
lũ longius inde progrefſa. Deinde rurfus iuxta
cornua dilatantur, ubi fanẽ in uterum inferun-
tur. Porro prægnante muliere, primò quidem in
tra uterum ſecunda productur: itẽ tunicẽ for-
tum ambientes, ac demum factus. Secunda ipſa,

*Pregnante mu-
liere quæ prius
concepta. Secunda deſcri-
pta.*

*Agnina mœtra-
na. Farciminalis.
Secunda conue-
nio cum utero.*

*Conceptionem
ſuam aut incipit
ſibi ſuere men-
ſium, aut deſinit
ibi.*

*Conceptio cor-
poris aut incipit
ſibi ſuere men-
ſium, aut deſinit
ibi.*

*Aſperum quàm
læue, apertum ad
concretiuam.
Secundum co-
ncretiuam autem
la tuncum ipſi
utero accreſcit.*

*Coryledones, ſi-
ne acetabulo.
Vaſtrum ſecun-
da progrefſus.*

Umbilicum quid

Vrator.

mor autem non modicus in utraq continetur
membrana: ſtatuſ quidem in farciminali, albi-
dior uerò in agnina, & copioſior: quandoqui-
dem hæc altera maior eſt, utpote uniuerſum ſe-
tum contegens.

*Agnina mem-
brana con-
tegit totum ſe-
tum.*

GALENI PERGAMENI de Semine, Liber primus.



N ſemen ſit tum materiale, tum effi-
ciens generationis principium, ut
Hippocrates quidem profeſſus eſt,
an efficiens tantum, ut Ariſtoteles
autumat, nobis uenit conſideran-
dum. Quodd igitur ex animalibus brutis, quæ
quidem retinent ſemen, omnia etiam concipiũt,
minimè autẽ quæ excernunt illud poſt coitum,
ipſe didici experiri: id quod etiam in mu-
lieribus poſtea explorauĩ, quæ quum hac de re
percontari eſſem, reſponderunt mihi, ſe quen-
dam, circa uterum, motum percipere, ut qui ue-
luti uellatur, & paulatim in ſeipſum contrahatur,
ubi ſemen concipiant. Quibus etiam & ſcri-
pta medicorum ſubſcribunt, & quæ ipſe etiam
expertus ſum, per reſectiões animalium præ-
gnantium, quorum omnium uteri apparebant
ſcibus obuolati. Videntur enim uteri (ut Pla-
to ait) uelut animal quoddam, proliſ deſide-
rio aſſici, & ob id attrahere in ſcipsos ſemen, &
circum circa in rugas cõplicari continere, quem-
admodum & hoc ipſum uiris aliquando cui-
denti ſenſu eſt perceptum, nimirum ad cucur-
bitulæ medicinalis ſimilitudinem attrahente u-
tero ipſorum pudenũ. Maximè autem contin-
git hoc, ceſſantibus iam ipſiſ menſibus, quo præ-
cipue tẽpore utri ſemen concipiunt. Porro qui
putant Ariſtotele quidẽ uoluiffe, ſemen maſculi
coniectũ in uterum, principũ motus menſtru
recremento imponere, ac mox excerni: quid id
partem fieri factus ex Ariſtotelis ſententia exiſti-
mant, utriq menſẽ illius uiri ignorarũt. Is quæ-
pe, uelut ex ligno & fabro ſit menſis, ſic ex me-
ſtruo ſanguine, & motuo principio uiri, factum
conſtitui ait. Quapropter nonnulla animalia,
nec excernere geniturã affirmat, ſed diſtribuere
tantum in feminam animalẽ caliditatem, eſſeque
talia ex infectis quædam: ita ut feminã quidem
articulum in marem demittat, commorataq in
complexu per multum tempus, corpus quidem
accipiat nullum, ſed ſolam facultatem forman-
tem, & formam ipſam ſpecificantem. Iam uerò,
quod ipſemet Ariſtoteles ait, inſtillari & diſ-
ſolui genituram in utero, alienum è ratione ui-
detur: quum nimirum conceptionis tempore,
minores & minus inſtillati cernantur uteri. Cæ-
terum, etiam ſi id concedamus, perſcrutabimur
poſtea, utrum in ipſa amplitudine uteri, me-
nſtrum quidem recrementum conſiſtat, ſemen
autem acerrimam allabens, ipſum percutat, atq
exhibito motus principio excernatur rurfus,
per ipſius uteri collum: an potius eo tempore
quo ſemina maſculo coit, ſemini obuiam me-
nſtrui ſanguis ſeratur, ut ſuſcipiat eam, quam
illo aſſequitur, facultatem. Vtrumq tamen abſur-
dum. Nam ſi in utere utri acceruatũ, ac longo

*Bruta recrementa
tra ſemini poſt co-
itum, non concipi-
unt.*

*Uteri proliſ de-
ſiderio aſſici, ut
tunc animalia
quædam.*

*Semen quo præ-
cipue tẽpore con-
cipiatur. Ariſtotelem in-
terpretatur Ga-
lenus.*

*Ariſtoteles opi-
nus improbat.*

grumum quon-
do fiat.

tempore contineatur menstruum, non amplius
utiq; sanguis hoc fuerit, sed grumum. Quando-
cunq; enim exciderit sanguis ex uasis in quodq;
organum cauum in animali, statim fit grumum.
Nec reperio quo pacto etiam semen sine sangui-
ne excerni possit, cum quo conuenit & conspirat
in idem iuxta amplitudinem uteri. Si uero ob-
uiam uenit femini sanguis, oportet sanè ipso-
rum congressum in uasorū oscula fieri. Verum
si hoc ita libet, unum in tot partes semen dice-
mus diuidi, quot sunt ipsa uasorū oscula, ut ad
singula sua pars deueniat? (id quod feminis ui-
scontari aduersat, & altera moderate substantia
opus habet, quæ diuidatur aut coherens sibi ma-
nere? quod longè conuenientius est ipsi substan-
tiæ feminis: & tertia alia substantia non indiget,
præterquam attractione uteri, & feminis
electione. Quemadmodum enim uenter ubi ci-
bos appetit, cum fundo suo ad gulam recurrit,
qua nuntum uelut manu untur: eodem modo

Vtrum ad pu-
dendum proce-
rer, ut eat ubi
am femina.

Membranam ob-
uolui femina in
utero.

Hippoc. ait qd
quandā fieret
abortum, citra
quod in suo loco
reuerteretur qd
pulsatum.

Semen (præter
generatorem ve-
ni, arterias, &
ipsum primum et
genuum.

Naturam nihil
frustra moliri.

principium optimè corpus, ut quod non solū
medium tonus, sed potètia etiam totum esse di-
catur, uel testimonio Aristotelis. Absurdū itaq;
fuerit dicere, statim in ipsis auspicijs frustra ope-
rari naturam: habentemq; album & crassum &
uiscosum humorem, ad neruorum, uenarum,
& arteriarum generationem, eijcere quidem
hunc, ut Aristoteles putat, ex sanguine uerò ali-
um similem gignere. Si namq; exanguem esse ho-
rum trium organorum substantiā natura uult,
siue crassam, siue extendi, & in fistule modum
cauari, ac quamlongissimè progredi citra diuul-
sionem, ad hæc omnia certè nihil substantia fe-
minis reperiri possit aut cōmodius, aut aptius.
Est autem semen uitali spiritui plenum. Qua-
re maxime cōstrarius hic sermo naturę operibus
est, si excerni quidē in aërem dissolutum, ipsum
dicamus, retineri autem sanguinem menstrui,
cū benignissimum, quem ut alienum natura
excernit singulis mensibus. Non enim est fami-
liaris utero sanguis mēstruus, sed ipsum semen:
& propterea susceptorium huius organum natura
constituit uterum. Quantum igitur ex se-
mine uterum ipsum cōtingit, hoc fit statim me-
brana. Reliquum uerò totum, habuit quidem
& ipsum infiras facultates: attractricem quidē
familiarium, & per quam retenturum, & altera-
tum, alimentumq; sibi faciendum erat: expultri-
cem deniq; alienorum & superfluum. Habuit
præterea & familiares materias quas attractu-
rum erat ab utero, sanguinem uidelicet & spiritum,
per oscula quibus connexū est. Et sanè hæc
statim à principio per ambientē membranā nō-
dum duram factū, attraxit. Ad finem uerò, tan-
tum per foramina illius, ob attractricem perpetuam,
obiq; interuētum humori, minimè coalescentia,
sed adaptata magis, per quæ scilicet ere-
bantur materiæ. Solet autem alimentum non
semper pari copia, sed iuxta proportionem aug-
mentū illius quod alitur, aut exiguum, aut co-
piosum affluere. Sanguis quidem ex uenis, spiri-
tus uerò cum sanguine tenui, modico & calido,
per arterias, utruq; ad propriam suam raurita-
tem. Quia & temporis progressu necessarii est
hanc uiam in fistule modum cauari, ac uas fieri.
Ceterum quandoquidem impossibile erat, se-
men ad fundum uteri illapsum, ipsum totum
illinare, utpote qui exortus utrinque ueluti cor-
nua quædam haberet, hæc sanè facinorea femi-
ne illeuit natura. In hæc siquidem cornua, sin-
gula ab utraque parte existentia, uas feminale se-
ingerit, ex facinore profectum testibus. Quan-
do igitur simul sub idem tempus, cum mare
semen facinora emisit, ipsum muliebne semen
per utrumq; eiecit cornu, delatumq; in me-
dium uteri spatium, simul quidem oblinuit uias,
simulq; ad masculi semen perueniens, una cum
illo miscetur. Sic ita per membranas ambo in-
uolutū innectuntur, quas tunc in sua professione
ipsum muliebne semen produxit, ut totam gen-
turam amplectens, hanc factui utilitatem præ-
staret, & ut uelut alimentū quoddam, masculo
semini fieret: cuius enim est illo, & frigidius,
familiarius uerò omni alio ad ipsius nutritio-
nem. At uerò fines illi uasorū, per quos singulis

Principium dici-
tur patris esse
totum.

Semen substanti-
um quibus re-
bus aptissima.

Semē uitali spi-
ritu est plenum.

Sanguis men-
struus non est
familiaris utero.

Membrana ex
qua femina par-
te generatur.

Semini inest
quatuor facul-
tates naturales
Semen quas ma-
terias trahat ab
utero, & per
quas man.

Seminalia uas-
sa feminina, pro-
fecta à testibus,
insinuantur in cor-
nua matricis.

Semē muliebne
uastius uitali in
utero.

Semini femi-
ni uisus.

Semen femininum
tenetur frigidi-
usq; masculo,

men

menfibus fuperfluum fanguinis ex roto corpore in uterum deriuatur, exiftunt uera acetabula, fiue coryledones. Appellatur autem fecunda, externa illa membrana, quam pertranfeunt rum arterie, tum uenae, materias ipfas ad forum ex utero deferentes. Altera autem mem-

Acetabula quae
Coryledones.
Secunda quae di-
catur.

Parciminalis
membrana for-
mam fufcipit lati-
ssimam.

Cor et hepa-
r generantur.

Cor numeri per
partum.

Ventriculus, arte-
riae, et uenae, gene-
rantur.

Cerebrum ex fo-
le fuit in oris.

Cranij preda-
ctio.

Cerebrum in al-
tiori loci fede

Spinalis me-
dullae oris à
utero, aortam oris à
cordis.

Ventriculus cano-
muri ab hepate.

Thorax primus
et principalis
mammas refferat
ne organum.

Tempora et ge-
nerationis fuit
quatuor.

Omnia quod

mentaneam iam habent, hoc tempus secundum
erit. Tertiū deinde est tempus, quando illa prin-
cipia tria manifeste uidere licet, reliquarum ue-
rō partium designationem per lineamenta, &
quasi obfcuriorum quandam adumbrationem.
Quartum denique & pofterum tempus hoc est,
quū fetus omnibus artubus suis est integrè con-
summatuſ & abſolutuſ: quo tempore non fo-
tus ſolum, ſed iam puer ab Hippocrate noma-
tur. Fetus itaq; ueluti planta, omnem genera-
tionem & formationem à ſemine accipit, du-
plexq; principium motuſ & formationis ſtatim
ab ipſo principio. Qualis enim eſt radicatio in
plantis deorſum, talis eſt fortibus inferio artu-
riarum & uenarum in utero. Qualis uerō ſur-
ſum uergens truncuſ in plantis, tales ſunt in fe-
tibus à tribus principijs exortuſ. Etenim natu-
ra ſeminis non alijs uiriſus producit plantam,
alijs animal: ſed quemadmodum plantae ſemen
terra indiget, ut nutriatur ex ipſa & auſcultat ſic
noſtrum indiget utero ſemē, ob cauſas eaſdem.
Ad haec, radices ſibi generat planta, quibus tra-
hat alimentum ex terra: ita chorion, hoc eſt, ſe-
cunda, gignit uafa, ſeruiſ radices. Producit qui-
dem truncum à ſeipſo ſemine plantae, & ab illo
alioſ & alioſ ramos, uſq; ad extremaſ propa-
gationeſ: at non ſecus in facta uidere licet iuxta illa
tria principia tres truncuſ natos, arteriam nempe
aortam, uenam cauam, & ſpinalem medul-
lam: qui in uariuſ ramos diſtribuantur, uſq; ad ul-
tima germina. Quae triplex planta animal futura
eſt, non reſecta illa, quam à principio habuit ſa-
cultate ueteratrice, ſed altera inſuper acquiſita.
Ex loco autem in locū ipſum tranſire oportet,
ubi perfectū fuerit, ex uteroq; ſolutum: quod
facere minimè poſſet, ſi frigidum ut arbores ſie-
ret, & ſi organu� ad ambulandum aptuſ careret.
Quare duo principia acquiſiuit, alterum orga-
norum, quae cuſtoditura ſunt ipſi naturalem ca-
liditatē. alterum eorū quae ſubſtrutura ſunt om-
nibuſ ad quas concitatur actionibuſ. Sed huiſ
quidem poſterioruſ utitur. Principio autem plan-
tariuſ primū eſt uſum: quod utiq; nō ex ſangu-
ne, ſed ex ſemine, arteriam, uenam, neruū, oſ
& membranam produxit: & ſecundam quidem
primū ei forſiſ uſuſ circūdedit, ac ſimul cum
ipſa ſarciminali membrana condidit, tenuem
quidem, anguſtamq; & infirmam, futuram ta-
men adiumento ſecundae, in materiem attra-
ctione, ſuſcepturamq; formati animalis urinae.
Nam ad totum factum ambiendum, excipien-
dumq; uaporem deſluentem ab illo, generata eſt
tunica agnina, ſatis ampla & robuſta. Reliqua-
rum autem membranarum, quibuſ uarię parteſ
teguntur, nulla in primis diebuſ neceſſariam ha-
bet generationem: neq; enim ſufficeſſet ad ipſo-
rum omnium opificium, ſubſtantia ſeminis ſed
precedente tēpore, dum quod antea erat ſemē,
iam grandis factum eſt fetus. Ad quatuor ge-
nerationem natura uſitur geniturę uſcoſitate:
ex qua quidem quicquid craſſiſ magiſq; terre-
re, ac minus tractile eſt, ad oſſium regionem
delegat: quae ſanè arida & terrea, pinguitudi-
niſq; expertia, ſed obducta membranulis tenui-
buſ, carneq; operta perfecit, ad id maximè uſa

Fetus ad plan-
tas comparatur
palſteriana.

Animal diſtribuit
triplex planta.

Principij plan-
tariuſ, quae ex
ſemine generat.

Secunda.

Sarciminalis.

Agnina tunica.

Generatio uſcoſi-
ſſima, quibz ſuſ
generanda ideo-
ra.
Opium genera-
tio.

caloris ut: quia nimirum omnem glutinosam substantiam ab osibus exugēs, bgamentis quibus inuicem copulantur, impoluit. Cæterum ubi ipsius osibus carne superferuit, prius quam membranis integer est, ibi minus arduum totum os factum est. Extendit autem à membranis circumosibus, etiam carnisbus ipsius gracilia opercula. Quin & neruum in unamquamque ipsarum disperit, ubi eo prius in fibras arancorum telis tenuiores dissoluit. Sed abas etiam fibras & similiter tenues ex bgamentis productas & carnisbus implicatas inuexit, atque ita rursus in unum & idem ambo coegit fibrarum genera, totum quidem organum in quo hæc fabricauit, musculo efficiendo: id uero ubi fibræ cōgrediuntur, tendinem. Ligamentorum etiam non modicam partem in ipsos musculos indidit: ut neruorum, non in hos solum, sed & in uiscera omnia. Est & aliud fibrarum genus in uentre, intestinis, & utraq; uelica, adeoq; in utero & corde, generationem ex semine habens, quibus ueluti nexui culpiam totum uisceris corpus circumcirca accretuit, ex sanguine ortum. Omnia siquidem quæ carnosæ specie prædita sunt, sunt ex sanguine condita. Membranosæ uero omnia, ex semine suum ortum sortuntur. Ob id quæ ex sanguine generata sunt, si corrumpantur quandoq; , faciliè regenerantur, ut quæ materiam generationis largiri possideant. Quæ uero ex semine, aut neq; prius, aut ualde raro, regigni possunt: quamquam efficiens ipsius causa perfectis animalibus insit. Quod si quicquam eorum quæ ex semine ortum duxere, carne nudatū sit, caro quidem circumcinctetur, simile uero illi quod denudatum est, nullo modo amplius innasci potest: uel si Aristoteles moncat, singulorum inesse naturis, ut sibis ipsi similia faciant. Etenim in id quod naturæ eius quod transmutatur propinquius est, facilius est transmutatio. Ac proinde sanguini facillimum est carnem fieri: difficillimum uero * membranarum, neruorum, uenam, arteriam, tunicamue. Primam igitur unumquodq; eorum quæ nutrirī debent, familiarem sibi ex sanguine, ac similem succum trahit: qui postea dissolutus uaporis instar, his quæ ipsum attraxerunt, apponitur: ac tandem ab eis transmutatus, illis assimilatur. Non ergo uidetur, unamquamque primarū partium animalis à principio quidem ex semine natam esse, aliud autem esse ipsarum ultimum & familiarissimum alimentum. Procedunt porro arteria & uena in utrumque testem non recta uia, sed flexuosa, multiformiq; , in qua quidem licet uidere sanguinem albescentē paulatim: postea uero, ubi ipsum uas testem contingit, in eo planè seminis substantia iam perspicuè conspicitur. Est enim utriusque parte arterie tum uenæ, generatrix natura seminis. Verum ex sanguine ipsam conficiunt, diuissimè in uertiginibus illis uersato. Alteratur enim sanguis transiens in semen: quomodo omne alteris, in suam naturam ducat ipsum quod alteratur, quemadmodum etiam apparet. Album enim & crassum & uiscosum est semen, aptum ut ex eo arteriæ & uenæ nutrantur. Cæterum amputatas uenas, ac rursus generatas in magnis ulceribus uidimus:

id quod assoler fieri conspirante in unum robustissima facultate cum materia seminaria copiosa. Arteriam uero aut neruum nemo unquam uidit regeneratum, ob penuriam materiæ, quam & copiosam & ualidè facultati iunctam, adeo crassiorum ualorum requirit generatio. Verum iuxta primam generationem ex semine, coactus uatus adhuc est humor, ex quo uas ipsa formantur: opifex autem ipsius duplex est, tum facultas, quæ ut ipso semine habetur, tum quæ in uteri uasis, quibus allapsum est. Quare nihil mirum, prima nature organa uelociter formari in foetibus. Sed nec tribuere uasis illis flexuosis totam seminis generationē est æquum, ut Aristoteles facit, prius testes facultate semen gignendi. Arteriam itaq; & uenam, à uasis quæ circa ipsas sunt progredientes, per illa deorsum feruntur, donec perueniant ad uenam testicularem ductam, quæ iuxta caput testiculi incumbit, quod epididymus appellatur, ex qua fistulæ multis in testem perueniunt, seminario humore repleta. Huic testiculari uenæ, & arteria & uena adnascuntur, circa paulo antè relatum obuolutionem: cui & par uiam quandam à seipsis distributionem largiuntur, priusquam inferantur testi. Inde feminilis meatus genituram hauriens, ad pudendi exitum eam subuehit. Quousq; enim intra illa sunt arteria ipsa & uena, peritior eo integuntur. Hinc uero peritiorū, utrimq; momentaneo foramine perforatū est, & meatus ab ipso maximus ad testes descendit. In quo & obuolutio ualorum gignitur, & uas feminale ex uena testiculari enascens, ad illa ascendit: contingens quidem circa exitū ipsum testiculum, non tamen ex ipso generationē habens. Iam uero iuxta utrumq; meatum arteriam & uenam descendentem reperias, ascendens aut uas seminariū. Inde uero rursus non amplius extra pubis ossa, sed per profundū & supra ipsa in decliue fertur, donec ad uelice perueniat collum, cui pendendum continenter coheret. Quia enim uas seminariū longissimum sacrum est, ob id tantam uiam circumcurrit. Contingit enim ita sanguinē in uasis morantem concoqui, & in grumos cogi, & uas feminale longissimū & uaricosum iuxta uelice collum existens, genituram quam longissimè iaculari. Cæterū in quibus testes excēti sunt, epididymide intacta, nihil patitur uas seminariū. Depedit autem animabus nō solum emissio seminis (hoc enim ipsi felicitate cederet, qui abstinere à ueneris percipiant) sed & uirilitas & omnis masculina inclinatio. Sic etiā si animalis femine excindas testiculos, neq; libidine concitabitur, neque marem admitteret, sed amitteret femineam naturam. Quo nomine scrofæ castrantur, suntq; sic castratus masculus uas uerius alimentum accipit, pinguioremq; & suauiorē carnem, quam reliquæ scrofæ, habent, quemadmodum & mare maribus. Non tamen similiter periculo uacans ablato testū ipsi seminis est. A lateribus enim ab utraq; parte singuli adiacent, arteriam quidem & uenam, ueluti qui in masculis sunt, pampinosiformiter sibi insertas habet: uas uero feminale ad utrumq; cornu finiens. Nec cessaturum itaque est utrumq; latus diffundere, si quis

Musculi constituto.

Tenda.

Ligamentum.

Visceribus uisceris esse uerum indicio.

Carnosa omnia esse ex sanguine orta.

Membranosæ omnia à semine orti.

Genita ex sanguine regenerari possunt.

Genita ex semine regenerari non possunt.

Naturis uisceris esse familiari illis portio sanguinis.

Sanguinis in semine degeneratio.

Vas seminariū uisū uas generatricem se munus.

Semen ex sanguine fieri.

Venas amputatas, regeneratas. uidet Galenus.

Arteriam, neruum amputatum, cur regnerari non liceat.

Testes prius Aristotelem fecisse gignendi se men.

Testiculari uena.

Epididyma.

Seminaria meatus.

Peritiora perforata.

Seminariū uas inferius uagum descendens.

Spalmodium, omnes ueritatem perit.

Scrofæ castrata.

Castratum carnis suauioris existit.

Testium ablatio in femina peritiora, & quare.

*Castrati quia
accident.*

*Castrati sunt
aliud quoddam
magis quam a-
nimal.*
*Testes quo vo-
minis praesent
cordis.*

*Testes alterant
universum cor-
pus.*

*Carnes non ca-
stratarum re-
lere quippe
gravi & vi-
ram.*

*Testes quid per
sunt.*

*Cor viciat
principium tan-
tum.*

*Testes bene ni-
mum principia-
m.*

*Testium sem de
versu.*

*Essentiam cu-
iusque particula
dico secundum
corporum solu-
tionem substantiam.*

*Testium corpus
mutari ab hu-
more siccis quod
conuenit.*

*Testes confecti
sunt.*

*Testes cui cele-
ritas tunc cor-
poris semina quali-
tatem commu-
nicant.*

*Facilitas fur-
tis corpus in su-
am naturam mu-
tat.*

quis excindere velit: atq; in hoc sanè maius peri-
culum est, quàm in maribus. Porrò quibus exe-
cti sunt testes, q̃ nulli robore destituantur, per-
frigeranturq; , ceu urinum fomite: alteroq; insiti
caloris principio priuati, neq; amplius illis est ue-
na, neq; floridus sanguis, neq; ualide pulsant ar-
teriae, suntq; glabri uniuersum corpus, neq; uene-
re appetant, aliud quippiam magis exsistentes,
quàm animal. Quare hac parte testes etiam ip-
so corde sunt praesentiores, nempe qui praeter
hoc, quòd caliditatem ac robur animalibus ex-
hibent, amplius etiam generi conseruando pre-
sunt. Quam eorum facultatem insignem, haud
scio quomodo neglexerint neteres, conferant
ne, an non conferant semini, discipiantes. Altera-
tur enim totum corpus per ipsos testes. Nec
solum infusior est caro uiscerum non ca-
stratorum, sed & qualitas ipsa carnis simile quid-
dam testiculorum qualitati habet, graue nemp-
e, & uisum. Testes itaq; praesentia sua, tum
calorem, tum robur, atque adeo coeundi appete-
rentiam ipsi animali conciliant. Ceterum ter-
tium hoc, neq; cor ipsum exhibere potest: qua-
re illud quidem uiuendi tantum, testes uerò be-
ne uiuendi principium fuerint. Quanto autem
melius est bene uiuere, quàm simpliciter & soli-
um uiuere: tãto in animalibus testes corde sunt
praesentiores. At in senectutibus & debilibus,
testes ipsi sunt laxi, contrà quàm in iuuenibus,
fortibusq;. Nōnullis ex quadrapedibus substri-
cti quidem sunt testes, ut subius: uolucribus au-
tem omnibus intra peritonaeum prope spinam
firmantur. Iam uerò unaquaq; animalis pars,
humorē ad se loco alimentis indigentē, in sui ip-
sius naturam permutat. * Est autem propria ui-
scisq; particulae essentia haud quidem secun-
dum humorum, qui in ipsis sunt, naturam, sed
secundum corporum solidorum substantiam, et
quibus contentorum humorum sit alteratio.
Quod quidem sic se habet, conuenit autem
serosus humor in testibus, ab huiusmodi unque
iporum corpus nutritur. Vnaquaq; autem pars
familiaresum sibi alimentum conficit: qua-
re testes semen etiam conficiunt. Sed operantur
ipsum tum arteriae, tum uenae, quamuis pau-
cum tempore: at testes non solum multum,
atq; id breui tempore, sed exactissimē elabora-
tum: sincerissima enim exactē est ipsis feminis
qualitas: ac proinde omnibus animalis parti-
bus quamcelerrimē illam comunicat. Fortes si-
quidem facultates in naturam suam alterant to-
tum corpus. Pauxillum quippe delecterij humo-
ris, corpori animalis illapsum, totū ipsum trans-
mutat quàm breuissimo tempore. Similiter au-
xiliaria medicamenta corpus uniuersum altera-
rant, alteratione uenenosis contraria, non sub-
stantia iporum totū corpus perfoluente (quod
unq; impossibile esset tam breui tempore) sed
qualitatis facta distributione. Quid igitur mi-
rum est, ex testibus in totum corpus facultatem
quandā distribui, qualis nervis quidem sensus
& motus ex cerebro, arteriis uerò pulsandi fa-
cultas ex corde? Atq; ea quidem facultas in ma-
ribus, roboris & uirilatis, in feminis uerò effe-
minationis existit causa. Ob idq; semineum a-

nimal exectis testibus, castrato masculo asumi-
latur: reliquae uerò omnes partes eisdem facul-
tates in utrisq; habent. Trahunt itaq; serosum
humorem testes, quem ipsi antē preparant ua-
sorum inuolutiones. Deinde ubi qualitas ex ip-
so fructum ceperunt, eamq; ceteris communi-
cantur partibus, id quod superfluum est, in me-
tus seminarios deponunt, in uerò foras in co-
gitu excurrent. Idcirco per immoderatam quide-
m uenerem, omnia spermatia organa, uacua
& exhausta redduntur: turgenna uerò, ubi ad est
uitae ratio caussima. Trahunt itaq; uolenter se-
men ab ipsis uenis testibus: uenae rursus à su-
perapofitis: atq; haec rursus ab his quae deinceps
sunt sitae: qui tractus non cessat, donec ad om-
nem corporis partē trāsumptio ipsa perueniat:
quo fit ut totius animalis partes omnes pro-
prio alimento priuentur, donec omnium for-
tissima expleatur. Neq; uerò solum serosam hu-
miditatem ab omnibus animalis partibus sic a-
ferri contingit, sed etiam uitalem spiritum. Qua-
re mirum non est, immodico uenteris coitu im-
becilliores reddi: uidelicet à roto corpore, utro-
que humore sincerissimo ablato, accedenteq;
ad haec uoluptate, quae ipsa per se est sufficiens
ut firmitudinem uitalem dissoluat, adeo ut iam
quoddam ex nimia uoluptate consistat animam
extalasse. Igitur omnes solidæ corporis partes
ex semine generantur atq; nutrantur. Quippe
quæq; pars, ex qua primum facta est substantia,
ex eadē semper nutritur, quòd nutritio expletio
sit substantiae desoluentis. Quapropter etiam
num generari licet, quæ cingit à principio ex san-
guine sunt concreta: non generari autem (præ-
terquam alicubi uenam quandam, atque id ra-
rò) quibus sua ex femine generatio à princi-
pio contingit. Vt autem de uasis seminariis rursus
aliquid dicam, sciendum est, ipsa esse plena
semine, uel eo tempore quo animalia uenerem
non utuntur. id quod fieri potest trahentibus ip-
sis genituram à testibus, & ipsius testibus etiam
ad illa eam relegantibus: idq; per epididymi-
dem maximam, per quam scilicet mediam, con-
nectuntur ipsi glandulosi testiculī seminariis ua-
sis. Imò uerò si licet fateri quod uerum est, e-
pididymis ipsa est principium & radix uasorum
seminarium, quæ ex toto testiculo semen in sei-
psam haurit.

*Uasis semi-
naria, castrato ma-
sulo asumitur.*
*Testes trahere
humorem sero-
sum.*

*Uitalem spiritum
etiam rapi
cum humore sero-
so à feminis
reperitur.*
*Causa immodi-
ci uentris, uel im-
becillioris red-
dendae.*

*Voluptas uitalem
firmitudinem
seminis potest dis-
solvare.*

*Salutis partes
ex femine gene-
rantur ex ueneris.*

*Nutritio est ex
pleno substantia
desoluentis.*

*Spermatia uerò
ita esse semper re-
feruntur.*

*Epididymis est
radix seminaria
uasis uasorum.*

GAL. DE SEMINE LIB. II.

Porrò testes muliebres adiacent quidem u-
tero, utrinque singuli, consimilem uasorum
in uolutionē, ueluti si qui in maribus
sunt, suscipiunt. Non procedunt tamen in eun-
dem locum hæc uasa, propterea quòd neque fo-
ras, quemadmodum marem, sed in ipsos utero-
s oportere feminam emittere semen. Ideoq;
uelut seminali meatui obuiam cunctis uenter, à
lateribus prelongos exortus extendunt, per
quos semen susceperant. Maximē uerò plenum
est uas seminale in animalibus nenerē appeten-
tibus: sicut uicissim uacuum à recenē coitu. Ha-
bet etiam idem aliquando non modicam co-

*Femina non
mittere foras
semen, sed in ip-
so uero.*

piam in ijs quæ ex longo tēporis intervallo imprægnantur. in quarū lanē pærlongis illis exortibus, quæ cornua appellantur, uidebis manifestè humorem feminariū crassiusculum. Ad hunc enim locum farciminalis membrana peruenit, necnon gestura crassa. Admirari autem subit etiam hic eos, qui dicunt uas feminale extra uterum habere adaperita oscula, inseritq; in collum uelice, eodem quo in maribus modo, ac proinde feminarium semen effluere. Cuius opinio-
Herophilus.

*Seminales med-
 tur in formam
 apici circa cor-
 nua, intra uter-
 um, iuxtaq; su-
 perius, semina effun-
 dunt.*

*Foram formen-
 do ratio.*

*Semen mulie-
 bre quod possit
 præstare.*

*Semen uicini
 perfectum possit
 ex uicini & ma-
 lebris constare.*

*Pollutiones cum
 tangeri feminis
 uel abq; mare.*

*Similitudo in li-
 berorum ad pa-
 rentes conside-
 ratio.*

*Similitudo vo-
 de orator.*

*Animalia om-
 nia gigni ex utro-
 que, & femi-
 ne.*

*Similitudo in
 uero & femine.*

neq; in ipsius uteri collum: uerū à lateralibus uteri partibus adnāt, alter hinc, alter inde, ad summum perueniunt uterq; apicem, siue cornu, à sua parte situm. ibidem intra uterum effundens semen, quod grauidis aceratur circa eum ipsum locum. In profusione ipsius autem seminis quæ per somnum sunt, primis quidem in ute-
 10 rum ipsū illabitur, postea uerò foras uacuatur. Itaq; in facinus, tum uasa feminaria plena sunt semine, tum etiā testes. Quod si in utero ipsū muliebre semen cum urini miscetur, cogaturq; & crassescat, tunc formatio factus contingit, ut pulchrè Hippocrates tradidit. Potest etiam natura, ex solo muliebre femine farciminalē mem-
 20 branam gignere. Potest & alimentum familiare & primum, subornare masculo semini. Possē autem ex utriusq; mixtus unus fieri semen perfectū, Hippocrates opinatur est. * Sed quæ obsecro possibilia essent, si hęc foret impossibilia? Quod etiam fœmina ad uenerem incitetur, uel maxime possibile est. In eis siquidem feminariū meatus pleni femine, excernunt ipsū, citra ullum congressum cum masculo: quin & seminis effusionē per foramen similitur ut mares patiuntur. Iam uerò quod opificis opus sit, similem aut dissimilem alterutri ex parentibus factum efficiere, nemo ignorat. Pueros autē matri similes,
 40 ob alimentum illis assimilari, sunt qui contendunt, idq; producentes omnes alterationes, quæ tum animalibus, tum plantis, ob alimentū contingunt. Non intelligunt tamen, quod nullam earum alterationum, quas dicunt, possunt speciem alterantem offendere. Neq; omnino præterea quicquam immutat formā ex specie animalis, siue plantæ: sed ex feminibus omnia tale principium habent. Quin etiam similitudo ipsa ex partium fit formatione, non secundum communem speciem, sed iuxta infortas differentias ipsarum. Generantur autem omnia animalia ex femine & sanguine menstruo. Quando quidem igitur factus utriusq; parentibus assimilantur, commune habent principium, quod eos paren-
 50 tibus ipsis assimilat. Quippe factū similitudo ad parentes, secundum principium contingit. Quod si sic res habeat, aut ex femine, aut ex menstruo, similitudo factū ad parentes oritur. Sed non ex menstruo, quoniam substantia eius utrique parenti non sit communis: à femine igitur proficiscitur. Si uerò ex femine oriantur factum similitudines, necessarium utiq; fuerit factinam semen emittere, quod multi pueri matri simillimi appareant. Scrutemur autem nos iam, an

quæ tandem sit causa, ob quam species animalis magis fiat secundum matrem: iuxta alterutrum parentem ipsa similitudo: hoc tamen præmissio, quod à natura quidem corpus præparatur animæ moribus & facultatibus aptū, * sed quod mores & facultates habet, ex temperamento secundum substantiam infortis, unde etiam prima ipsorum est generatio. Contingit igitur ex his suppositis, tanquam fulcris, concludi, species à naturalium, ad subiectas generationi substantias, hoc est materias, consequi: & esse ipsū animal, aut equum, aut bouem, aut hominē, iuxta substantiam ex qua factum est, & non secundum facultatem illius substantiæ motricem, formatricemq;. Cæterum nec semen ipsū facultas solam est, sed & materia quædam: nec menstruum materia solū, sed facultas. Vt enim semen ad materiale principium animalis maxime cōfert, fit menstruum ad potentiale conducit. Est autem semen sanguis accuratè percoctus, à uasis continentibus ipsū: unde sanguis non solū materia generandi ipsius factus fuerit, sed & semen potentia. Quod igitur ex materia simul & facultate unumquodque gignatur animal, omnibus in consensio est. Quod uerò tum semen, tum menstruum habeat utraq; principia, non tam aequalibus uiribus prædita, sed semen quidem effectuum fortissimū, materiale uerò modice molis: menstrui autem materiale quidem plurimum, potentiale uerò siue effectuum, maxime debile, id etiam est consistendum. Si ergo materiale gignendi principium, iuxta quod species animalis absoluitur, in solo menstruo esset situm, factus utique exactè eiusdem species cum matre generaretur: quemadmodum etiam, si effectuum solū in semine esset, semper unus similes foret patri. Quando uerò utrumq; ambo ipsa principia libet, ac prædominatur in menstruo quidem materis copia, in semine autem facultatis, aut roboris: meritò (opinor) speciem à maternalis à matre potius ipse suscipit factus, quam à patre, etiam si ipsius semen ad materiale principium conferat. Similitudinem uerò non magis iuxta matrem, quam patrem, refert: quāuis quod ad robur quidem seminis attinet, factum patri magis assimilari oportebat. Verūm genitura mulieris etiam ad ualitudinem conferens, quum facultatem ex menstruo per nouem menses proceduntē assumpserit, tanto exuperat, quanto citra primum congressum exuperabatur. Propriū enim muliebris semini est, suam ipsius substantiam ac facultatē magis quam masculini, augere, atq; corroborare. Non desunt qui, si fœmina non solū materis, sed etiam facultatis principium sit, si per uacuos esse masculos dicant. Quidam uerò gallinarum hac parte mentionem faciunt, quæ subuentanea & fauonia appellata oua pariunt, citra mixturā mascululi. At Empedocles futuri fortis partes diuifas esse contendit, easq; partim in masculo, partim in muliebris semine contineri, atque inde etiam ipsius ueneris complexus appetentiam oriri animalibus, nimirum diuifis partibus inter se uniri appetentibus. Quæ opinio longè absurdissima est, faciliq; redargui potest. Quæ uerò sit

Naturam præparare corpus anima moribus aptum.

Materiam generatam primam ex temperamento.

*Species animalium ad substantias generatissimas materiam con-
 sequi.*

Semen esse facultatem atque materiam: menstruum autem facultatem et substantiam.

Semen quid sit, sanguis est formæ potentia.

Animal omne gigni ex materia simul & facultate.

Speciem animalis à matre potius suscipit factus.

Oua subuentanea citra opus gallinæ oriuntur.

Empedocles opinio refellitur.

rd sit causa ob quam quā ipsū fœmineum animal enām semen emittat, masculū tamen sit generatum: atq; cur generato masculo, enām adhuc seruatum sit ipsū semen fœmineum, considerandum. Præstabilis enim erat ipsū fœmineum animal habere excrementū confertens ad factum generationē. Quippe semen fœmineum, ex quo diximus gigni fœminalem membranam, propriū ac familiare alimentum masculo semini exiit, quum sit illo tum humidius, tum frigidius, necnon magis tenue. Quare perperam faciunt, qui frustra ipsū generatum esse pronunciant, impossibīleq; esse fœminam utraq; coaceruare excrementa, contendunt. Melius siquidem eos modicè castigato sermone eras dicere, impossibīle esse fœminam & sanguineum habere excrementū, & etiam semen prolificum, ut cui frigidi temperamenti ratione, superfluous sanguis accumulatur: forti autem caliditate opus sit ad generationem feminis exactè elaborari & percipi. Est enim humidior atq; frigidior fœmina: calidior autem & siccior masculus. Vnde merito alteri quidem deest quid, ad exactam feminis concoctionem: alteri uerò impossibile est sanguineum excrementum habere, præ caliditate & siccitate idipsum totum siccante. Ob id igitur & animalia quæ siccior temperamento prædita sunt, quæ generare solent citra conuerſationem masculū. Deest tamen his quippiam ad perfectionem, si non assument ex illo caliditatem. Itaq; possibile est animo concipere tale temperamentum corporis, quod * imperfectum animal generet absq; alterius miscelæ. Perfectum uerò in seipso id concipere, sanè difficile, & fortassis enām impossibīle est. Porro tale debet esse generatiuum semen, ut statim simulatq; diffusum, substantia ipsius partim in membranam abeat, partim in uas diffundatur, partim deniq; pulset. Quod igitur in plantis est terra, hoc est in conceptibus mater, alimentum suggerens, donec totum animal perfectè absolutum fuerit. Et quemadmodum plantarum semini largus ex terra humor, sic animalium semini, materia in matris uenis insitum alimentum exiit. Dicere autē quis possit: Si iuxta prædominans semen similitudinem particularū naturarum ad parentes fieri cōtingit, omnes partes alteri parentū necessariò futuras similes, cuiusq; tandem semen prædominabitur. id quod secus apparer. Cæterū (in discutiatis hæsitationem hanc) quum semen ipsū similitudinem partium exiit, si fœmineum quidem in utero semini uirili miscetur, possibile sanè est ipsa circa effingens dos fetus inuicem prædominari, iuxta partes diuersas. Imò uerò, etiam si dissimilariū partium ipsū semen existeret, posset tamen ex omni sui ipsius particula, pro eiualutionis modo alterata, omnes animalis partes efficeret. Prædominatur autem iuxta mixturem in aliquibus quidem partibus semen masculū, in aliquibus uerò fœmineum. At ubicunq; ipsū præpollcat, ea pars domināti sit finem. Etenim in omni particula materis opifex simul adest, seminisq; semper mouet atq; concinnat seipsum. Nilū itaq; miri est, utriq; parenti natos alimi-

lari circa diuersas partes. Num igitur etiam sic de genitalibus partibus eandem assignabimus causam? quod ex ipsiſ hæc quidem masculina fiat, hæc autem prorsus fœminea? & quod masculus toto corpore ad fœminam in uniuerso animalium genere differat? Barbæ nanq; & crista, & calcaria, dentesq; exteri, necnon uniuersa cornua, ut in ceruis, masculorum sunt partes: secundum quæ fœminæ maribus longè inferioris sunt. Differunt etiam ab illis secundū alias. Arteriarum tamen omnium arg uenarum numerus, formatio, & positio, eadem est, per totum masculorum & fœmineorum animalium corpus. Opinari autem, masculum animal, ubi præualuerit masculum semen, & fœminè iuxta fœminei seminis gigni excellentiam, sanè probabile est: pugnat tamen cum hoc, quod fœminæ serpenumero simillimæ patri gignantur, & ex masculis non pauci marri. Quod igitur masculus aut fœmina generetur, nilū sanè uidetur causam ipsam tribui debere qualitarum actiuarum (quæ caliditas & frigiditas sunt) temperamento. Apparet siquidem masculus non solum calidior fœmina, sed siccior etiam statim à principio esse: atq; ob id, quā illa tempore breuiori ipsū formari traditur. Est autē siccior, quod citius accipit formam, quod nimirum ea quæ præ maximo humore distillant, uix effingi, aut formari queant, nisi prius compagem firmā habuerint. Ad hæc amplas arterias, & uenas, & thoracem, & omnes partium cauities habet quod est insitū, * quādoquidem hoc à spiritu exuberant & calido effici maxime solet. Quare & arterias maiores, & fortius pulsantes habet, ac totum corpus concitatur & uegetum ad motum, aliisq; id genus, quæ omnia non solum in iam ædificata, sed in his etiam quæ adhuc gestantur in utero, signa sunt caliditatis prædominantis. Idcirco in dextro utero scilicet semper masculi gestari uidentur, sicut in sinistro fœmellæ. Sic etiam testiculus dexter magis succulentus, quā sinister exiit: priusq; in pubertatis tempore inflatus, generatores masculorum efficit: sinister uerò macrior, & posterius tumescere incipiens, fœminarum genitores ostendit. Si igitur dextre partes sinistris sunt calidiores, fuerit utiq; hoc signum, masculum calidiorum existeret, quem etiam esse sicciorē ostendimus. Quod uerò ad calidum & siccum temperamentū consequatur actiōnem robur, omnibus est in cōfessio. Cur autem eiusmodi temperamento præditus, extrā pendentes habeat testiculos, & iuxta ipsos pudendū prælongū, atq; ex nulla parte uterum: contrā uerò humidior frigidiorq; sortus, testiculos inus habeat reconditos, itemq; uteros, atq; adeo totum pudendum intrinsecus, imprægnarum uenit nobis considerandū. Est enim proportio maxima inter genitalia masculū & fœminæ. Omnia siquidem genitalia mascula tum masculus, tum fœmina habere eadē uidentur, positione tamen ac magnitudine differentia. Quin & uasa testes nutritiua, utriq; sexui ex ipsè uenis & arteriis procedunt. Eandē enī proportionem sortiuntur principia uasorum nutritiua uterum, cum ipse quæ sunt in scroto uero-

Mater possit esse similes utriusque parentis secundum diuersas partes.

Masculorum & fœminarum de fœmine.

Generatio masculi et fœminæ, tribuitur tempore & actiuarum qualitate.

Quid sit caliditas & frigiditas.

Masculi & fœminæ formæ quæ sunt in utero.

Sic ut est, quod citius accipit formam.

Caliditas prædominantis signa.

Masculi in dextro utero, fœmina in sinistro gestantur.

Testiculus dexter masculus, sinister fœminæ genitor.

Robur & actiōem consequi ad calidum & siccum temperamentum.

Genitalia mascula et fœmina proportionem sibi correspondere.

Semen fœmineum masculino abominem effi.

Forma uis effi frigidior & calidior masculo.

Animalia sicciora temperamento sunt citra conuerſationem masculū.

Ecce aliquid perfectum animal absq; alteri in miscelæ, perdifficile est.

Semen prolificum, quale nō esse debet.

Semen similitudinem partium ostendit.

ram. Nec uero neruorum principium utriusque diuersum est, sed ab ipso demum medullis spinalis regionibus in maribus feminis procedit. Omnia ergo quae generales partes constituunt, in utroque sexu existere apparet, in nulloque penitus feminis à masculo, aut masculum à femina, superari: sed uno solo differre, quod altere partes intus, altere foras existant. Quare si animo uolueris, quod in formatione animalis, quod haeret utero, genitales partes primam delineationem, & quali adumbrationem intra partitionem accipiant, possint ita uero emergant, sic utique masculi animalis generationem didiceris. Atque in hunc sane modum natura circa unamquamque genitalium partem omnem extrinsecus lineamentum, uelut septum munitionem effingit. Postquam uero opifici speciem delineauit, ac uero ipsius impetu utens, simul & quod effusum est, propellit, & quod continet & ambit, simul permittit. Si uero aliquando circa ultimum opus debilitetur, ipsum quod

Genitalia mascula à feminis uero hoc solum differre, quod si foras protrusum fuerit, autem intus exstant.

Talparum oculi ab imbecillitate naturae, erumpere non possunt.
Canes per sestrationem cecum carulos edere.

moliebatur imperfectum relinquit: quemadmodum profecto circa totum talparum genus apparet, quibus lineamenta quidem oculorum intus expressa sunt, uerum foras emergere non potuerunt, natura debiliore effecta, quam ut id efficere posset. Canes porro, cecos carulos parere per sestrationem, in proverbio est. Sanius tamen est ipsos recte edutos carulos, imperfectos, quam cecos, dicere: utpote post paucissimos dies uisuros. Nilul igitur mirum est, quemadmodum talpae oculos intus habent, quos natura extra producere non potuit, eodem modo & genitales partes feminis intus effigatas esse, & extrinsecus emergere non potuisse, propterea quod tota natura ipsarum debiliore, & imperfectior sit. Verum tanto sane femineorum animalium naturae perfectior est quam talparum, in quantum talpae nullo cecitatis commodum fruuntur. Non parum uero ad generis propagationem femineum animal conseruit: nam & humidius & frigidius productum, crementa secum conuolutum erat, ad alimentum foetibus ipsis idonea. Quum enim primi & recens fetus compages liquidior sit & frigidior, tunc & principium formationis serius accipit, & finem adeo tardum & debilem, ut hae partes foras emergere non possint. Et quum circa partes quae postremum effigantur, naturam delassari & debilitari contingat, absoluntur etiam alijs imbecilliores. Expellitur autem semper excrementum superuacuum à fortioribus ad imbecilliores partes. Quia uero omnium feminearum particularum debilitatae sunt genitales, ob id sane in hae superuacua eius sanguis peruenit, qui salubris quidem purgatio fit feminis, priusquam concipiant. Tempore uero gestationis in utero, idonea materia in alimentum ipsis existit foetibus. Manifestum igitur iam factum est, in calidiori & ficiore temperamento masculum generari: in frigidiori uero & humidiori, feminam. Speciem autem, siue animalis genus, hominem uidelicet, leonem, atque equum, ad naturam materis, in animalis generationem subiectae, consequi: quemadmodum sane & formae similitudinem ad utrumque parentem, effigiantes ac formantis facultatis esse,

Excrementa expelli semper à fortioribus ad imbecilliores partes.
Mensura sanguinis idonea est alimentum foetibus.

Masculum genus in calidiori temperamento: in frigidiori & humidiori feminam.
Speciem animalis ad naturam materis subiecta consequi.
Similitudo formae ad patrem, unde etiam.

quae in semine continetur. Quare trium similitudinum, tria principia habebimus: similitudinem nempe generis animalis iuxta substantiam ex qua generatum est, fieri dicentes: formae uero, iuxta motum ex semine: ut eam quae est, aut masculi, aut feminis, secundum utrumque principiorum temperamentum. Verum autem principia appello menstruum & semen. Ac de his liae tenus. Deinceps aliquid & de astibus glandulosis: quos quidem semen & continere & generare existimant, hallucinantur. Cur enim, si & hi seminis uasa sunt, animalibus quibus testes exsecti sunt, deperit penitus coeundi appetentia? Impossibile quippe est, organa seminis generandi uiribus praedita habere, ipsorum uero usum non habere. Natura etenim, quae neq. inutilem, neq. superuacuum aliquam partem fecit, inutiles facultates omnium corporis organorum, animalibus dedit, easque nulla infirmitate edoluit, ad proprias actiones abundas. Astibus itaque glandulosis ex testium castratione nihil peris, castratum animal ad uenerem consortium non excitant, cui quidam aliud potius existentes, quam organum feminale, & alterius cuiusdam utilitatis gratia genit. Porro duplicem omnium glandularum utilitatem esse, optimus Marinus tradidit. Aut enim fulcunt uasa sublimia, quae sindi solent, & diuulsiois periculum circa uehementiores motus sustinere: aut ob humorem generationem partes madscaeae possunt, quae humectatione uiscosa, & ex natura dispersa indigent, ne facilius efficiant, pigra ad motum reddantur. Atque in hoc secundum glandularum genus, quod uiscidiorum humorum est productum, inseri arterias & uenas ait, & quoddam in uasorum mesenterij glandulas desinere: Duplex namque harum glandularum genus esse, quod & uisuras duplex existat: densas quidem & siccas, quae uasa quae sindi solent, fulcunt: raras uero & humectas, in quas uasa inferuntur. Si igitur & oris amplitudinē, & gulae summum, & uisuerum intestinum certis quaedam glandulae humectant, nihil sane mirum est etiam collo uelut simile quoddam auxilium praeparatum esse, ne resiccatum aliquando, egre mobile fiat. Ac multo magis uersimile est, huiusmodi auxilium ipsis uirilis pudendo à natura praeparatum fuisse, propterea quod memorabilis magnitudinis in uiris hae glandulae existant. Periculum enim est, ne quum praelongum & nudum sit constructum pudendum, aliquando resiccatum obtorqueatur, & obstructus meatus eius conueat. In feminis sane ipsum uteri collum nec praelongum nec nudum est: sed intus fissū, & ex ambientibus ipsum & circumfissis multam humectationem suscipit: imò ex ipsis mensuris etiam irrigatur. Potest fortassis & natura uerita mordacitate urinae, hunc humorem uelut lanimentum huic pudendi meatui praeparasse. Si autem in astibus glandulosis generaretur semen, castrata animalia ipsum unquam excernere appetent: atque appetere non uidentur: palam igitur est, quod neq. generatur: id quod incultum debet nobis seruari.

Similitudo generis, principia tria.

Astibus glandulosis.

Naturam nihil superuacuum facit.

Glandularum duplex utilitas.

Glandularum duplex genus.

Pudendum uirile.
Astibus glandulosis constructum fuisse ad uenerem lae uenerem per sestrationem.

Semen non ex utero in astibus glandulosis.

GALENI PERGAMENI de factuum formatione, lib. vms.



On est unus limitatus ac certus terminus factibus manifestis formationis, aut motionis, aut partus. Ceterum qui libellus de natura factus est scriptus, sua est Hippocratis, siue Polybus fuerit, genturā quæ ubi sex diebus in utero misit, foras prolapsa est in quadā muliere, aut similem fuisse obo crudo, cui adempta sit restia externa, & in cuius interna membrana pelluciscat inclusus humor. At liquor ipse in ea genturā (ut autor ille recenset) ruber atque rotundus erat: in membrana aut ipsa fibræ quædā albæ crassæq; uidebantur inesse, cū cruore crasso & rubro obuolutæ, ac circa membrana foris etiā cruenta uestigia. Iuxta cuius mediū, tenue quid eminebat, instar umbilici, per quod sanè extrā & intrā spiratio primū fieri apparebat. Quin & membrana quidam genturā ambiens cōplectensq;, tota ex illo protendebatur. In qua descriptione membrana genturā cōplectēs, ea erat quæ secundā appellatur. Albas uerō atque crassas fibras, quas cum cruore crasso & rubro in se uidebatur habere, generationis uenarū & artieriarū lincamenta fuisse putandū est. Cōstat enim membrana ea ex numerosis artierijs & uenis, coniunctis tenui & membranoso corpufculo. Principiū aut generationis horum uasorū, ex artierijs & uenis uteri exiit. Quarū extrema, in internā uteri regione oscula aperta habent, & per hæc uasula sola fecibus ad imprægnatas communio exiit. Ex nulla enim alia parte secunda perforata est, imò neq; contingit uterū, præterquam iuxta hæc sola uasula. Reliquū uerō spaciū interiaccens, subtendit quidem utero intrinsecus, at circa concretionē. Ipsa porro secunda uasula, angustissima quidē principia habet, per quæ unita sunt osculis uasorum uteri. Secedentia aut ab ipso, in idem inter se multo remeant, uelut plantarū uariæ ac tenues radices, in principiū trunci cōiūntes. Sic siquidem totus ille partialiū uasorū cōgressus in duas amplas artieras, ac totidē uenas absoluitur. In quarum medio, meatus quidam appellatur uragus, hoc est, ductor urinae, gignitur, in fundum uesicæ ipsius factus perforatus. Cuius pori alterum osculum, ubi à quatuor uasis segregatur, paulatim dilatarur, tenuem membrana farcimini similem generans: quæ forinsecus alteri agnoscitur nomine membranae, in qua factus continetur, præterduntur. Atque hæc quidem extra factum existunt. Partium uerō quæ ipsi factui sunt propria, prima omnium est cutis, ad tegendum corpus producta. Deinde consequenter sub ipsa, continuæ his quatuor uasis intra cutem partes, quarū nullam prius possibile est generari, quā omnia secundū uasula, per quæ factui nutritio cōtingit, in prædicta quatuor sint cōgregata. Impossibile siquidem est, in factu aliquam generari particulā, circa substantiā sanguinis. Non tamen quæ albæ & exangues sunt partes, gigni ipso ex sanguine possunt, uelut general substantia hepatis. Celerim enim generationem hoc uisus ex sanguine habet, utpote quod substantiā ipsi quissimā possidet. Reliquæ partes omnes sanguine longiori tēpore indigent, ut gignant. At uenarū, artieriarū & membranarū corpus omnino exanguie quū sit, merito à semine primam habere generationem, nimirum prædicto glutinosa substantia. Facta aut prima uasorū radicatione in osculis eorum quæ in utero tendunt, uerisimile est ipsorum opificem, uidelicet semem, alimentū ipsi suppeditare, trahēdo ex utero sanguine: paulatimq; sic primū genita dilatatare, in longū extendere, augerē: & semem in idem coagmentare tenuiora, ad ampliorū generationē. Apparet aut ex his quatuor uasis, quæ iuxta umbilicum & porū qui ad uragū est, coagmentant, statim ubi cutē factus ipsius penetrarunt, alterā per cœlestigū uniri, atque sic unam magnā uenā produci, eamq; inseri in hepar. Nec uerō existimandū est, quod præexistēt hepar hæc inferat uenā, sed quod huius ipsius uenæ rursus diuiscatq; & sciss, ubi interiorum penetrat, alteri quidem uisū fissuræ, iecoris substantia innasci: alteri uerō, quæ melenentū gignit, adungatur uenter, splen, omentū, & intestinorum uolumina, quum nihil uorū antea existeret, sed ad fissuram uenarum cōcreta & congenita sint. Non tamen sic ipse artierij, ubi primū permeantur cutim, statim aut adnascētē sibi aliam substantiā habent, aut in multas partes sciunduntur, sed quamdiuissimè dux permanent, & uesicam factus percipiunt, libiq; firmatæ, tum aliorum, tum ad corporis profundū ferunt, donec in os sacrū perueniant. Iuxta quod dux artierij apparent, quarum singulæ ab utraq; parte deferunt in crura, maxima nimirum quæ in spina est, & quæ fini stro cordis uentriculo annexa cernit, in ipsas diuiscata. Cordi porro generādo materiam, ex pregnante aut per artierias, aut per medium hepar suppeditari est necesse, idq; secundum uenam, quæ ex ipso sublimis fertur ad suprenarū huius uisceris partium generationem: id quod longū tempus desiderat. At uerō in aboribus factum supra triginta dies, præter ipse sita manifeste apparent tria lūc animalis membra, hepar, cor, & cerebrum: atque maius quidē uisq; alijs hepar. Itaq; possibile est inuenire, quid cor principij sui formationis fortis. Quum igitur librorum de semine scripti, cor similiter ut hepar circa primos gestationis in utero dies, uelut fundamentū quoddā generationis dixi obnere, ex usu ipsius, qui in perfectis animalib. maximè insignis exiit, ad hanc rationationē perductus. Vbi uerō reliquis omnib. tū medicis, tum philoſophis complacitū esse reperi, factum usq; ad manifestā effigurationē similiter gubernari ut plantarū, mihi probabilius est uisum, nullā generationis ipsius in principio uniuersæ haberi, imò penitus hepate posterius ipsum formari: ex duob. his alterū necessariū iudicant, aut ex emergente ab hepate sanguine, unā cum hepatidie uena etiā cor ipsum gigni: aut per magnam artierij, quæ non solum spiritum, sed etiam sanguinē habet. Qui aut in cōmentarijs de respiracione & pulsū usu à me conscriptis exercitati fuerint, cognoscent factū in principio generationis, quādiu ab unica anima, hoc est, à natura regitur, neq; artieriarū,

Partes à semine
ante.

Naturalis mem
brarum ortus.

Artieriarum fo
cunda in factum
perueniunt.

Hepar uideri
maius alijs mem
bris in prima
generatione.

Palinodia Gali
ni.

Cor hepate pos
teriori formari.
Cordis genera
tio.

Facti, dum à so
la natura inge
ntur, nec cordis
suauitatem egre.

Fetus comparatur ad fœtem.

neq; pulsū, neq; cordis functione necessario egeret, quemadmodum neq; placentia. Porro quemadmodum ubi plantæ semen in terram moderate calidā & humidā est coniectū, ex ipso statim duplex exortus uidet nasci, alter infra terram, alter supra terrā, qui progressu tēporis & crassescunt, & in alios atq; alios exortus scindunt, quos nutriti & augeri in dies cōstat, feretq; tandē fructū in extremitatibus suis, planta iam absoluta & perfecta: sic fetus primo suæ formationis tēpore exiguum augmentū habet: quando uerō manifeste in articulos digeri incipit, uberior: quemadmodum maximū & uberrimū, ubi totus fuerit articulatus. Terminus igitur primi tēporis, in quo fetus nondū corde habet opus, mihi uidetur is esse, in quo iam uniuersa fissura uenarum circa hepar est facta. Etenim ipsius magnū uenę, quā uidemus per umbilicum ferri, uniuersę alię corporis uenę, tum partes, rū germina existit: alioque quidē porta (est enim duplex foribus) gratia generationis omnium, quę circa hepar sunt, facta: inferiori uerō, causā productionis illarum, quę in uentrem, splenem, omentum, intestinalē disseminant. Completo autē hepate, ex uenis quidē iuxta gibbū ipsius, ueluti ex radicibus quibusdā stipitibus, coacervatur maxima totius corporis uena, quam cauiam ob excellētē nominat. Cuius uenę altera quidē pars infra feri iuxta spinam firmata, in renes ac lumborum regionē quēdā germina emittens: altera sursum per mediū thoracē in collum tendit, primū quidē obtinet in septū transversum, postea in membranas succingentes thoracē, inq; tunica cordi obuoluturam, ac deinde in dextrum cordis uentriculū, inq; ipsum thoracem uanos faciens exortus. Ex quibus pars spini & thoracis supra septū transversum materię generationis suscipiūt: quo tempore etiam cor ipsum format. Eodem uerō tempore uniuersale est etiam uenę ex inferiori porta in omnes partes circa uentrem fissas, his ipsis fieri causam generationis. Formato corde, in ipsū inseri potest prædictū par arteriarū, iam coactū in unā, quod in media spina firmatū certissimū, donec prope cor perueniat. Quum autē duo cordis uentriculī sint, in dextrum quidē sanguis ex hepate accedit calidus moderate: in sinistrū uerō multo calidior, & tenuior eo, per dictā arteriā feri. Quare & uentriculorū, & utraq; materias iam habens cor, pulsabit utiq; & arterias eodem suspensus motu mouebit, adeo ut nō amplius ueluti planta, fed quemadmodū aliquod animal, fortis gubernari uideatur. Inest autē pulsus corporibus calidis. Ceterum ut nullū exangue animal est manifeste calidū, sic nec manifeste calidū, est exangue. Cor itaq; est inditum animalibus, ueluti focus ignis: ex eo si quidē animalis corpus maiorem caliditatē acquirit ea, quę in se est: si natura uenis ac hepatis, & sanguini in ipsis cōtento. Quemadmodum autē cor posterius hepate generat, consentaneum rationi erat, ob idq; prægnātis utero est propinquius ipsū lepar locatū: sic cerebrū adhuc longius quam cor ab utero locari expediebat, utpote quā enī structura ipsius posterius sit producta, propterea & neq; indiget fetus qui in utero gestat, cere-

bro, quū nec uoluntati motu aut actione, nec sensu ullo aut exteriori aut interno habeat opus. Posterius itaq; circa tertiū tēporis ordinem cerebrū, nū omnia circa faciem sunt efformata, quō tēpore uenę partes ad perfectionem suspensus structurę perueniunt. Manifestū est autē, quōd capitis eo posterius omnibus alijs ossibus congelat, confirmaturq; & ob id iuxta finciput adeo tenue & imbecille est, ut in recens editis puellis motū cerebri nō solum tactū, sed uisū etiā deprehendamus. Et iam quartū tēpus adest: a primo conceptu, in quo partes iuxta motum posterius formate corroborant: quam ob rem sanē infantes actiones animę nutritiue robustissimas possident. Secundum in illis sibi nēdicant sedē actiones protectę a corde. Dehinc imę uerō sunt quę procedunt a cerebro, quū nec moueri, nec stare firmiter ualeant, tantū abest ut ratiocinari. Postremū omnium eo capitis ipsis cor roborat, & enascunt dentes, & calua pilosa reddit. Postea uerō unā cū organis absolutę animę facultates, & actiones suas obeunt. Arterias igit & uenas, necessum est primas omnium ex femine generatas esse. At circa facultates uitam nostram administrātes & gubernantes, ratio ipsa postrema omnium & sit, & absoluitur: quę quidē feliciter dispensat res hominum, ubi uniuersa anima iuxta naturam habet: infeliciter uerō, quū præter naturę emota fuerit. Iam uerō unde nam corporis actiones oriuntur, facile ex dignotionibus liquet. Prima igitur digno non ex præcisiss, aut laqueo interceptis arterijs & neruis est, in quibus partes quidē ex altera laquei parte, uident proprias obire actiones, ex altera uerō eas prius amittere: ut si medulla spinę (ex ipsi gratia) circa aliquē spinę locū fuerit dissecta, nerui quidē, qui supra regionem spinę, ipsi medullę incumbunt, fauciari oriuntur, tum mori, tum sensum cōseruare uident: qui uerō infra, omnes utrumq; amittunt. Unde liquet, eas facultates ipsi spinę medullę superne ex cerebro influere. Similiter quū arteria quocūq; aliquo uinculo excepta, id quidē quod ex ipsa supra laqueū continuū cordi est, pulsare, ueluti antea, appareat, altera uerō pars infra laqueū statim pulsū priuē: conspicuā sanē etiam hinc est, arterijs principii motus ex corde esse. Ad hęc, medullę quidem spinalis ac neruorū, per omnia eadē, quę cerebri, substantia existit: quemadmodum & cōnennium ipsa tegminum eadem etiam est cum inuolucris ambubus cerebrū. Arteriarū uerō substantia, nihil, ne prope quidē, cordis habet: quemadmodū neq; uenarum, hepatis. De origine autē hepatis dū uenę, dubitant sectōrij artis periti. Rationabile autē est coniectare, principia uenarū in utero, similia esse extremitatibus radicum plantarum: stipiti uerō cuiuspiam, uenam per umbilicum in lepar propecentem assimilari: atque omnes deinde uenarum extremitates, quę in animali uidentur, ramulis, & non radicibus, cōsimilem proportionē habere. Semen igit opificis rationem habet, a quo uisū, per quę sanguis est prægnante attrahitur ad uiscerum generatio-nem, omnium prima generabitur. Secunda autem ab his, hepar, & cor, ueluti fundamentum domus:

Calvariam post alia omnia esse completissimā.

Infantibus inesse primum natura naturę actiones, aut mali aut admodum imbeciles.

Arteria & uenę primę uniuersę ex femine oriuntur. Ratio postrema omnium & sit, & absoluitur. Ratio quidē feliciter seu fatigatur moritur. Aliorum corporum uideatur origines.

Cerebrum demittit utrumq; facultatem spinę.

Cor esse principium motus arteriorum. Substantia eadem, neruorum, & spinalis medullę, radem.

Hepatitis uenę cōsiderant.

Semē habere rationem opificis. Generatio quibus prius, et qui bus posterior est videtur.

Vena porta duplex.

Vena cava rotunda.

Vena cava diuisa.

Spina supra spinam uide signatur.

Cor quę formatur tempore. Venerit portam uide & quando signatur.

Cordu uentris diuisa, quid & unde recipiant.

Cor quidē pulsat.

Pulsus in ossibus corporibus calidis. Exangue nullū ex manifeste calidum.

Cor esse inditum animalibus, ut latet fœci ignis. Cor posterius hepate generari patet ratione.

Cerebrum postea ratiocinatur ipsū corde. Partem in utero non indigere & rebus.

domus: quo tempore & alia quædā finguntur, tum his uicina, tum inter hæc & uterum sita. Quando uerò neg iuxta quantitatem, neq iuxta qualitatem, substantia partium permanet, nimirum defluxi ipsarum magni quotidie fiene, & qualitate item multiformiter uariare, auxilio utiq inter se mutuo opus habent, quo & uacuatum rursus expletur, & quod uariatum est, corrigitur.

Substantiam partium ut per manere, sed fluxu re, atq; mutari.

Cor primarium spiritus motus est.

Respiratio à quibus causis in hubeatur.

Nervi mouent thoracem, à me dulla spinali oriuntur.

Respiratio inspiratio, quomodo fiat.

Hepar gratis fuisse ciliatū re- uer atq; relictū dicitur.

Lenis motus.

Venter hepatis alimentum præcoquit.

Particulae singulæ ad se ipsas uolunt, ut simulata quæ nata sunt animalia.

Animæ constructio partium.

Opificum artem quæ inducet.

Cassa corporis plana ducentis.

Natura scopi circa corpus fingenda.

se crediderim citra sapientissimum, eundemq potentissimum opificem factos esse. Quis uerò luc sit, pronuntiare non audeo, præ consiliū inopia obmutescens. Supremā enim uideo in formatione sapientiam & potestatem: neq animam in semine plantatam quidem ab Aristotele, appetitricem uerò à Platone, ac Stoicis denique appellatam naturam, scitum ipsum formare existimo, quum nō solum non sit sapiens, sed & penitus bruta & rationis expert: neq rursus dicere ab hac opinione ualeo, propterea natorum ad parentes similitudinem: apparere enim animam corpus formantem, ex parentibus in ipsum scitum transfundi, ceu contentam in semine. A rationali uerò anima, quæ post partum per omne uitā se ostendit, recedo, propterea quod ante corporū dissectionem non cognoscimus, neq partes corporū, neq ipsarū actiones. Itaq dubitare me, consilij inopem esse fateor, de opifice fuisse causā, non secus quā de substantia animæ, quum de his nullam opinionem scientificè demonstrari repererim. Hoc uerò ut possibile pronuntiare potero, uidelicet uniuersum corpus, ubi iam efformatum est, per omnem uitam tribus principijs motuum gubernari atq regi: eo quod ex cerebro est, per nervos, & musculos: quod ex corde, per arterias: quod ex hepate, per uenas. Ex quibus autem principijs hæc fiant, hæc ætenu nihil habeo quod pronuntiare intrepide posim.

Cordis uero magis communis datur.

Animam plantatā esse brutam, et rationis expertem.

Rationalis animæ non formatur.

Galenus fateatur se dubitare de opifice fuisse causā, et de substantia animæ.

Principia motuum tria nostrum corpus regunt.

GALENI PERGAMENI de Septimestri partu, lib. unus.



IX seminis conceptionibus (sine quaru observatione fieri minime potest, ut idoncum pariendi tempus quis ritē inueniat) pleraque mulieres grauidas in medio temporis spatio, intra centum nonaginta dies, & ducentos, peperisse animaduertit: paucas tempestiuus, aut tardius: nullas planē celerius ceterisimo & octogesimo secundo die cum dimidio, & qui buisdam horis, uel post exactum quartum supra ducentisimum, lursē igitur septimestris partus ædendi, primus terminus esse censetur dimidij anni tempus: quum nimirum tempestiuus nulla partum ædiderit, sed tardius omnes. Tempus autem id centesimo & octogesimo tertio die, minus quibusdam horis absoluitur. Atque ego uiam semel mulierem reperi, quæ centesimo & octogesimo quarto die completo peperit. Diem impræsentia appello, interuallum uiginti quatuor horarum quinquiescibulum. Si enim & anni trecentis & sexaginta quinque diebus, & quarta insuper diei parte constare dicunt: tempus uero menstruum, circiter uigintinouem cum dimidio. Nimirum mensem appellari spatium id, quod ab uno lunæ congressu cum sole, usque ad alium mox sequentem intererit, omnibus in confesso est. Si enim triginta diebus quilibet mensis constaret, nonimēstres factus exactē usque ad ducentisimum septuagesimum diem utro gestarentur, quod nō conningit. At annus dicitur tempus illud, quod

Septimestri partus ædendi primus terminus.

Diei quid.

Annus quot diebus constet.

Menstruū tempus.

Annet quod et
pos dicatur,
Septem quod
Hippocratu de
Septembris fuit
sententia.

ab uno signo solem in idem signum restituit. Signum autem ipsum impræsentiarum pro puncto capitur. Porro Hippocrates, septem quidem menses septimestris factus constituit: ex quibus quinque etiam integros ait, qui inter primum & septimum mediâ habentur: duos autem deficientes, nempe primum & septimum: at non ita deficientes, ut supra dimidium eis deficiat. Mensis enim dimidium, est dierum quatuordecim cum dimidio, & quarta adhuc diei parte: quamobrem primi mensis & septimi tempus, prædicto hoc erit maius spatium. Si igitur primi mensis tempus à conceptu uicissimum diem excedat, sicut uerbi gratia dierum uigintitrium, quum sequentes quinque menses centum & quadraginta septem dies supra diei dimidium contineant, tempus sanè id, quod ex utrisque constabitur, dierum erit 170. cum dimidio. Septimester autem factus ab eo tempore, quindecim, ad minimum, actis diebus, in lucem produci poterit. Necessè quippe est, ut si sextum mensem partus debeat excedere, septimi plus quàm dimidium attingat. Quia ratione omnes hi in uniuersum dies erunt 185. cum dimidia adhuc diei parte. At sicuti citius his præscriptis diebus septimester infans xdi non potest, ita neq; omnino tardius ducentis. Si enim centum & septuaginta diebus cum dimidio uigintinouem adq̃cias, omnes simul centum & nonagintanouem cum dimidio erunt. Fingamus rursus mulierem prioris mensis dies 38. gessisse fetus: qui sanè dies si adiciantur quinque subsequentiū mensium diebus 147. cum dimidio, atque his insuper septimi mensis dies 29. accedant, uniuersum hoc tempus quatuor & ducentis diebus ac insuper dimidio cōstitabit. Quia uero in maximis distantijs primus & septimus extiterūt menses, infantem hunc non esse uitale, Hippocrates profiteretur. Quod autem ad mensem lunarem pertinet, in minori etiam tempore quàm sit anni dimidium, sanè septimester p̃di posset: quod iam ostendam. Quia enim ratione necessè est ut septimester partus anni saltem dimidium attingat, ea nimirum ante centesimum & octogesimum secundum diem, & 15. horas, uel circiter, uitalis nullo pacto existit. Quatenus autem si dies ad menses lunares exactè computentur, prius etiam eo tempore liceat facundum partum existi mare, nunc declaro. Fingamus enim primo mense mulierem sexdecim dies utero gessisse: post quing autem subsequentes menses, pariter sexdecim dies: quippe hac ratione tempus id omne 179. dies cum dimidio explebit. Verum in minori intervallo quàm sit anni dimidium, septimestres fetus uitalis xdi negat Hippocrates. Atque idcirco tum primi, tum etiam septimi mensis plus quàm dimidium partem factum attingisse est necessè, prius quàm xdatur in lucem.

LIBRI DE FORTVM FORMATIONE FINIS.

GALENI PERGAMENI
de instrumento olfactus,
Lib. unus.



On modo perceptionem odorum, sed etiam facultatem cuius est odorem percipere, medici olfactum appellant. Secundum autem utrumque significatur, unum est instrumentum* olfactus, quo facultas ea sibi sensibilia apprehendat. Porro si ipsos nasi meatus aliquo odorato unguento repleueris, nunquam prius senties, quàm aërem inspiraueris: & ob id nonnullis uidetur nasum uiam esse olfactilium: id uero corpus cuius est odores percipere, interius esse situm. Scire autem oportet, quod quum nasus septimum medium habeat, & duos hos omnibus patentes meatus, utraque nare alterum, supra mediam nasi regionem uterque eorum bipartitur, ita ut pars quidem altera, in interiores oris partes declinet, altera uero re-
ctâ se ad cerebrum conferat. Nam sunt ibi duo quoque ipsius exortus oblongi, & caui, qui ex anterioribus cerebri uentriculis suam ducit originem. Hi in eam caluariz partem descendunt, unde exoritur nasus: ibidemq; ea ossa habent se dem, quæ colatoria uocant. Sed & crassior membrana, qua parte hæc ossa attingit, exilibus quibusdam foraminibus est pertusa. Vnde per eam primum, dein per iam dicta ossa in meatus illos excolantur crassiora excrementa cerebri. Nam quæ similia uapori sunt, per caluariz suturas uacuantur. Extensâ insuper est uniuersis illis nasi meatibus exanguis quædam tunica, crassior quàm sit membrana: atque ea quidem illi continens est, quæ ori, linguæ, gutturi, faucibus, asperæq; artē, & gulæ subternitur. In hanc autem tunicam à cerebro nonnulli nerui inferuntur, partui quidem omnes, præter illos qui deferuntur in linguâ. Satis quippe crassus sunt hi, quum ea particula copiosior enâ eget sensu, utpote genita ut existit gustus sensorium. Ob hoc ipsius natura oculis impertita est neruos, eosq; longè crassiores illis, qui ad linguam attingunt: & secundum hos, auribus, atque ori uentriculi, quod & ipsum sensu egebat quamplurimo. Oculis itaque uisus est instrumentum: auris, auditus: lingua, gustus: appetentia uero cibi & potus, uentriculus, & præsertim os eius. At uero tactibile facultatem, quod ad cognitionem spectat, natura cæterarum crassissimam fecit: quam uni definito loco, sicuti alias omnes, minime adscripsit, sed per corpus uniuersum dispersit: ac proinde plures illi nerui exiliores, durioresq; & qui magna ex parte ab spinali medulla oriuntur, indidit. Eas uero quæ recentissimus particula, utpote quibus ampliori sensu erat opus, maiores, & molliores, & omnes à cerebro prodeuntes, dedit. Iam igitur instrumentum uisus, ad quod solum pertinet luminis atque splendoris sensus, quam maxime efficit lucidû: aërem uero auditus, cuius erat eos percipere sonos, qui cum aëre feruntur. Linguam præterea ex luumidiori corporis specie constituit, ceu instrumentum futurum, quo succi omnes discernere-
tur,

Olfactus est quo
nas dicatur.

Nasus est uia ad
faciliorem.

Nasi meatum
uterque bipartitur

Cerebri exortus
uicem radicem
nasi.

Colatoria ossa.

Nasi tunica.

Lingua nerui.

Lingua est gustus
sensorium.

Sensuum instru-
mentum.

Tactilem facultatem
efficit omnem
Tactilem facultatem
omnem efficit per corpus
dispersam.

Visus astrum
tum lucidum.
Auditus instru-
mentum auditus
Lingua complexio
liber.

Mensis lunaris.

40

50

60

Olfactus frigidus

*Olfactum sub
frigidum*

*Tactum instru-
mentum est ter-
restre.*

*Olfactum frigidum
est vaporisum
exhalans.*

*Olfaciendi sen-
sus non est
nisi pelliculam
naris, et uti est.*

*Inspiratio
media.*

*Olfaciendi sen-
sus in antero-
ribus cerebri ve-
niculis sit est.*

*Nigella oleo
intremat & inspi-
ratam, & modo
sternutatio accendit
motum ut qui
laborat exhalat.
Cerebrum antea
lesum concito
fuerit.
Lentum refri-
gationem existeret
capiti curio.*

tur. At uero sensibile id quod sibi olfactus acciuit, inter aërem humoremque, & ignem est medium. Nam id quod à singulis corporibus diffundit, ipsa est olfactum subfrigidum. Quum autem pro suo rum sensibilem similitudine, instrumentum unum- quodque à natura paratum sit (instrumentum quippe usus, humidum ac pellicudum est, tactus uero, terrestre & durum) sensorium sane quo percipiuntur odores, opus est ut uaporo- sum existat. Quare neq. os nasi, neq. item mem- brana illa cuius nuper mentionem fecimus, sen- sorium esse possit olfactus, quum & dura cor- pora sint: neque tantus eis inist aut talis ner- uus, quantum & qualem olfaciendi facultas po- tuit. Nervus etenim qui uisui inferuit, quam- uis ad crystallinum tantum peruenit corpus, eo longe maior est, qui defertur ad os uentri- culi. Extrema & interior pars illius auditorij meatus, ubi situs auditus est, quamquam brevis- sima sit, crassum tamen est neruum adepta. Nec lingua quocq. exiguorum neruorum, ex his qui à cerebro oriuntur, esse uidetur percipere. Quam- obrem haudquaquam uersutis est, facultas olfaciendi tributum esse à natura tam exi- guum sensorium, ut est et nasi pellicula. Nam quod pertinet ad os nasi, tantum abest ut sit odoratrici facultatis percipere, ut ractrice e- tiam careat. Sed ex hoc etiam, quod eo tantum tempore quo spiritum introducimus naribus, ipsos odores percipimus, plane constare uide- tur, neque ossa, neque tunicam nasi, neque eam que palatum, guttur, ac fauces uelut, sicut nec colatorium meatum, esse odoratus sensorium, sed aliquam aliam particulam interioris sitam, at- que in penitior corporis sede delitescentem. Porro ubi pectus à musculis dilatar, pulmo- nes sequuntur ipsum: quos subinde externus aër per asperam arteriam, guttur, os, atque e- tiam nares, continuatione quadam, subsequi- tur. Potest autem cerebrum, quum inspiramus aërem, & ipsum sua actione, & suis etiam qui- busdam quasi germinibus, pectus dilatare, ali- quid in suos sinus attrahere. Fieri etiam potest, ut ipsum quod alia mouet, sibi quoque leuem aliquem motum, tum in seipsum, tum uero ex se præstet. Contrahatur enim dum sese contrahit: quum uero undique se dilatat, funditur: atque ita externus aër, ex continui ratione, illud, quò se retrahit, subsequetur: sicut etiam dum dis- funditur, efflabitur. Quod igitur olfaciendi sen- sus in anterioribus uentriculis cerebri situs sit, multis rationibus sum ad ductus ut credam. Pri- mum, quod illos qui capitis grauedine, ob cere- bri crasis uaporibus oppletis, tenent, atq. inde obtusius olfaciunt, sternutamenta præcipue u- uent: qualia ex nigella oleo intra inspirantibus aëris, & capite resupino instillare naribus so- leo, idq. prius ore aqua replero. Ad hæc quum cerebrum contento spiritu repleat, incalecatq., consentaneum rationi uidetur, expirationem ad ea que noxia sunt excutienda, inspiratio- nem uero ad refrigerium illi summè conducere. Terno autem, quod in eis quibus exultu est, aut exalta caput, tum rolarum, tum alio- rum refrigerantium odor, manifestè remedium

calori adferat. Instrumentum itaq. olfactus, mi- nimè in illa nasi pellicula, sed interioris recondi- tum est: ita tamen, ut foraminum nonnulla eò perueniant, que neq. etiam perpetuò adaperita sint, sed habent opercula quædam membranosa & tenuia. His igitur, per inspirationes uiolen- tia spiritus referat, patet rei sensibili aditus ad eam particulam, cui uis illam dignoscendi in- ditta est. Quare nō quemadmodum palpebrarū motus pro nostro sit arbitrari, sic meatus illi o- pera nostra aperiunt, quum nullum habeant uo- luntarium motum, imò nec naturalem, nec di- latentur etiam ab instrumentis quæ inspiratio- ni defertunt, sed à solo per inspirationem insi- liente aëre. Nisi autem per inspirationem cere- brum dilaretur, expellaturq. ab eo antea conten- tus spiritus, fieri non potest, ut aër ad ipsum per dictos meatus urumpat, quibus sit ut uelien- tissimè illatus: licet ipsius aëris occursum, tun- ca in quam ij meatus descendunt, facile sentiat. Quare si secundū nares meatus olfactorij con- sistent, aperirentur utiq. in maximo aëris im- pulsus: quibus adaperitis, subinde odoris sensus subsequeretur. Non subsequi aut, ergo nec secun- dū nares meatus olfactorij consistunt. Ad hæc, si meatus ullos secundum nares ad odores per- cipendos extruxisset natura, utiq. non obstru- xisset illos: quemadmodum neq. eos qui in auri- bus sunt: quum longè præstet quencunq. sen- sum semper esse ad sua sensilia apprehendenda promptum, quum solum eo tempore quo sit res- piratio. Neque ob eam causam natura oculis operimenta palpebrarum apposuit, quod me- lius non sit eos usquequaq. operari: sed quod molles illi sint, ac proinde expositi, facile pos- sint à rebus extrinsecus occurrentibus lædi. Li- uant etiam palpebræ ad capessendum somnum. Nemo siquidem in aëre lucido reclusus oculis potest dormire. Quare & illis animantibus, qui- bus nullæ sunt palpebræ, fouea quidam na- tura indidit, quæ totos oculos, ubi somnus ur- geret, quasi in cubiculo receptos, admitterent. Est enim id nature institutum, ut in suis fun- ctionibus perpetuò sensus uersentur: etsi rei cuiuspiam utilioris oblata occasione, interque scere aliquan tisper cogantur. Nequit autem ani- mal dormiens, sensus integrè sentientes serua- re. Nam que simul esse non possunt, ne Dij quid- em omnes, etiam si uelint, coniungent. Quod si eodem fuerint extracti modo ipsi olfactorij meatus, quo ait Aristoteles, erunt potius dam- no non leui, tantum abest ut allatari sint nobis ullam utilitatem: nimirum nos per maius uix- spatium sensu olfactus priuantes, quod in nul- lo alio factum fuisse nunquā uidimus. Porro ster- nutamenta, capitis grauedini auxilio sunt. Sunt autē, quum maximas inspirationes progressas, quamcēssimè efflatio subsequitur. At efflatio- nem noco cōfictum factam expirationē: Unde si per sternutamenta nihil excernatur à cerebro, non solum non leuant ipsa capitis grauitatem, sed magis etiam repletionem eius accumulunt. Cæterum ægrotis ad solem conuersis, pronita- tus sternutationem: quia uaporosus in cere- bro spiritus ab eo funditur. Exurbant porro

Olfacendi ratio.

*Palpebrarum
visus.*

*Palpebræ inua-
re ad capessen-
dum somnum.*

*Aristoteli fructu
na de olfactu-
ri meatus cō
sistat.*

*Sternutatio an
utilis grauedi-
ni.*

Efflatio quid.

*Sternutatio pro
necatur ad juu.*

*Verum tamē
rum a fo.
Quibus nobem
tiones caput re
plera.*

*Respiratio à
cerebro quā de
causa fiat.*

*Cerebrum in ip
sate, respiratio.*

crassiores & lentos de cerebro mucos sternuta
menta, eos unā cū spiritu excussio explodentia.
Quod aut ab odoribus uehementioribus caput
cōtinuū ledat, repleturq, atq; reddat grauius,
ac nonnunq; excitetur deliriu, id rectē argumen
to est, portionē aliquā substantiæ illorū cō in fili
re: alioqui ex sola qualitatē communiōe nun
quā ab affectibus adeo repentinis & ualidis caput
arripere. Si signur respiratio uniuersa à
cerebro ea de causa adit, ut in corde seruē quid
dam caloris modus, cur sibi quoq; non admini
strabit id ipsum, quum suapte natura facillimē à
rebus tam calefactis quā refrigerantibus lēdi possit. Aut cur natura congenitā quan
dā mōiōē cerebro nō tribueret, quā inspirādo
se uēntilaret atq; excitaret ad pulsū: expirādo ue
rō pituitosa & mucosa excrementa à se abigeret:

GALENI PERGAMENI de ossibus, ad Tyrones, lib. vms.



X ossibus singula, qualia sint, &
quam inuicem structura habeant,
nota esse medico debent, si rectē ea
uel frācta, uel dimota sua sede, sit cu
raturus. Quare in omnibus quę ad
medicinam pertinent, id quod secundum naru
ram est, tanquam scopum semper habere conue
nit. Sunt autem ossa inter animalia partes di
uersissima & arduissima, necnon terrestria maxi
mē: quę quidem ceu fundamenta quędam, to
tam molem corporis sustinent, atque stabiliunt.
Eorum tamen quędam grandia & ampliter
concaua, medullofilla sunt: quędam parua, &
solida, ac sine ulla medulla. Grandibus magna
ex parte in extremo, aliorum ossium appendi
ces adnascuntur: ut puta, iunior superius, cu
bito inferius, radio uerō ac femori, itemq; ti
biz ac surz, infra supraq. Maxilla inferior me
dullofa est, adnascensq; appendicis expta.
Sed ex eius extremis partibus, quę infra est, uni
tus per symphyisin, hoc est, coalitum. Supra in
duos processus, in cornem uidelicet, quę in
acutum tendit, ac ceruicem tantum, definit. Por
rō compactio humani corporis ossium, sceler
tos appellatur. Ceterum alia per articulum, al
ia per symphyisin ossa iunguntur. Articulus
enim naturalis ossium est compositio: at sym
phyisis, naturalis unio eorundem. Articuli dif
ferentur sunt duę: diarthrosis, & synarthrosis.

*Seriem.
Articulu.
Symphyis.*

*Diarthrosis.
Synarthrosis.*

*Enarthrosis.
Arthrodia.*

*Coryli, acetab
lum.*

*Glen.
Cylindri.*

Dicitur quidem diarthrosis, ossium structura,
quorum motus est euident. Synarthrosis uerō
ossium quoque compositio est, quę obscurum
inualidumq; habet motum. Diarthroseos est
triplex species, Enarthrosis, Arthrodia, & Gi
gymos. Enarthrosis, quum excipiens cauum,
admodum alium est, caputq; quod in id inferi
us, oblongum. Arthrodia uerō, quę cauum le
niter & in superficie, & capitulum etiam depres
sum habet. Ex causa capitula ipsa excipientibus,
quod alius descendit, coryle, hoc est, acetabulū:
quod in superficie situm est, Glenē à nonnullis ap
pellat. Gigymos est, dum ossa sese inuicē ingre
dientia, coniunguntur: quemadmodum uertebra
inter se, ac humerus cubitusq; alligantur. Synar

throseos quoq; triplex habetur species: Sutura,
harmonia, & gomphosis. Sutura compositio
quędam est, ad conlutarum rerum similitudinē.
Harmonia uerō, ossium structura est per simplici
cem lineā. Gomphosis, quā instar clauis os ossi
infigitur. Symphyisis dupliciter differt. Nam alia
inter se inuicem ossa, ut molliora: alia aliorum in
terueniunt, ut duriora, coalescunt. Huius differe
ntie ultimę, tres sunt species, Synchondrosis, Syn
neurosis, & Symplocosis. Quia uerō ipsa occasio
se obtulit, nonnulli & de nervis dicamus, quorū
tres sunt species. Qui enim ex cerebro, & dorfi
medulla oriuntur, uoluntarij nervi: qui ex muscu
lis, tendones: qui ab ossib. ligamēta appellant.

DE CAPITIS OSSIBVS. CAP. I.
OS capitis calvaria dicitur, estq; futuris distin
ctum: quarū numerus positorumq; pro capitis fi
gura uariā. Naturalis capitis structura, ad oblon
gę sphærę similitudinē structa est habetq; prio
rem & posteriorem partem prominentiorem.
Ac tali quidem capiti tres insunt future: duę
quidem transuersę, quarum altera in occipiti
no est labdoeides, ad similitudinem A litterę sic
appellata: in scipite altera, quę coronalis uo
catur: ac tertia, quę à posterioris medio, per ca
pitis longitudinē, ad medium usq; anteriorem
extenditur. Harum futurarum figura H litterę
præcipue similis est. Id quę figura fassigata est
ueritē, ea quidem utiturq; atque. Atq; ubi in ipsa
quidem posterior eminentia perit, sutura labdo
eides abolet. Si anterior non addit, coronalis etiā
sutura deperditur: siq; utraq; remanentium fu
turarum figura T litterę similis. Harum autem
utring; eminentia deperdita, geminæ quę ser
uantur future, ad rectos se inuicem angulos in
terfecantes, X litterę similitudinē referūt. Namq;
altera quę transuersa per medium potissimū
caput extenditur: altera à parte posteriori per
longitudinē in priorem, ut in cæteris caluarijs
omnibus, tendit. Hęc quippe semper feruāt: re
liquę cum totius capitis figura uariantes interci
dunt. Duę quoq; ab hac æquē distantes lineę su
per aures feruntur, duobus inter se ossibus, non
per futurā, sed per appositionem, squamaram
instar, coherentibus: ob idq; lepidoeides uocan
tur. Quo fit, ut quinq; peculiare future sint capi
tis: Labdoeides, coronalis, & hæc rectā per lon
gitudinem ferunt, ac duę illę ab hac æquē distan
tes, quas lepidoeides appellant. Sunt & duę al
iæ communes superiori maxillæ, necnon ossi
sphenocidi, quodd cuncti similitudinē referat, ap
pellato. Id autem os apophyses quasdam sorti
tur, quas ab alarū similitudine pterygoeides uo
cant: eęq; utring; sunt concauę. Alia autē sutura
capitis, quę ipsūm à superiori maxilla diuidit, ex
caus temporis inuicē sumit: inde à oculorū se
des procedit, perq; eos medios tendens, iuxta
mediū superciliorū subsipit iungitur. Sex itaq; in
uniuersum sunt totius capitis ossa, idq; ipsienq;
de excepto. Duo scilicet scintipia: duo itē petro
sa, unūquodq; uidelicet ad sinum aurem: quinq;
os occipinis: sextum densq; frontis. Sunt porro
scintipia ossa quadralatera: quę uerō iuxta au
res hærent, trium latera sunt. Os occipinis, ma
ximum omnium quę sunt in capite, foramen iux
ta pri

*Sutura.
Harmonia.
Gomphosis.*

*Synchondrosis.
Synneurosis.
Symplocosis.
Nervorum aut
differeuntia.*

*Capitis ossium
conspiciuntur.
Capiti natura
lib. figura.
Capiti tres fu
ture: Labdoe
ides, coronalis, &
media.*

*Caput scintipia
tum distat.*

*Sutura per se
pota longitudo
nem semper fer
uāt.
Lepidoeides fu
tura.*

*Sutura capis
quinq; spec
ies.*

Sphenocidi u.

*Pterygoeides a
pophyses.*

Ossa capitis

*Scintipia ossa
quadralatera,
Occipitis firm
ius maxime.*

*Ossium capituli
differentia.*

xta primam uertebra[m] habet. Horum autē sex
que duximus, simplicitas ossa rarissima & infirmis-
sima: occipitum densissimum, firmissimumque
medium inter hæc ipsa, os frontis habetur. Re-
liqua utrinque ad aures posita, malarum se ha-
bent. Namque horum pars, quia petre speciem re-
fert, lithoides uocatur: id os, protensis labioden-
tis futuræ sinibus terminatur. In eo Styloides
(quia columæ est similis) processus inest, in eodem
cōtinetur auditorius meatus. Altera dein-
ceps pars, iuxta eos exortus habetur, quorum
unus mamillaris dicitur: alter ossis iugalis est.
Præter hæc tertia quoque pars à temporibus
occupatur.

DE OSSIBVS IUGALIB. CAP. II.

*Iugalis ossis con-
sideratio.*

Temporis musculo præpositum est os, quod
transuersam in medio futuram habet: eiusque po-
sterior pars omnis, cum capitis ossis quod iuxta
aurem habetur: anterior, cum parte supercilij ex-
trema, ad paruum oculi angulum continua-
tur. Id os totum Zygoma, à nostris iugale ap-
pellatur.

DE OSSIBVS SUPERIORIS MAXIL- LAE. CAP. III.

*Maxilla superio-
ris futura.*

DE futuris que in maxilla superiori continen-
tur, dicamus: quarum prima pars ossis iugalis exor-
itur, cuius pars posterius tendens, sub eiusdem
ossis concavo desinit, ibique cum communi ipse
nōdis ossis futura committitur. Altera partim
recte, partim oblique sursum ad oculorum se-
des procedens, per medium illorum ambitum
inferiorem fertur. Mox ibi tripartito scinditur.
Altera enim pars, magnum prope angulum, ex-
terior in parte ad medium superciliorum pro-
cedit. Quæ deinceps huic succedit, per concavū
sub eodem angulo ad communem capitis futu-
ram pertinet, eademque angulum ipsum compre-
hendit, & illi quoque naturale foramentum subie-
ctum, quod omnium que sunt in eo loco fora-
minum maximum est. Sub dictis duabus futu-
ris, tertia pars antedictæ scissuræ, inferiorem in
sede oculi ambitum inscendens, interius ad imū
tendit, ibique communi capitis futuræ iungitur.
Quare terna maxillæ ossa ab utraque parte cen-
sentur. Quorum habetur maximum, quod iuxta iu-
gale situm est. Deinceps sita & magnitudine os
illud in oculo ipso habetur, quod nervos ad su-
periores maxillam cōtinet. Minimum omnium,
iuxta magnum oculi angulum esse locatum. His
tribus ab utroque latere os unum insigni magni-
tudine subiacet: cuius os mali, denuntium om-
nium, exceptis incisorijs, alveoli, partes sunt.
Hæc autem ossa discernuntur futuris quatuor.
Adiacent uero & his maximis ossibus duo a-
lia exigua, quæ scilicet nasi foramenta ad pala-
tum tendunt.

DE OSSIBVS NASI. CAP. IIII.

*Nasi ossium con-
sideratio.*

Nasi quoque ossa duo sunt, quæ futuris à medio
superciliorum descendentes discernuntur. His
ossibus inferiorem in parte cartilaginea tenui
corpufcula (alas uocant) ab utroque latere adna-
suntur. Omnis in maxillæ superioris extre-
mo, os unū, in quo densū, qui secant, radices &
alveoli continentur, id quod nonnulli simplex,
nonnulli compositum esse tradunt: quemadmo-

dum in superiori maxilla, alijs quindecim, alijs tan-
tum ossa octo numerant.

DE DENTIBVS. CAP. V.

Dentes in ossium numero habendi sunt, qui
sexdecim in utraque maxilla existunt. Eorum au-
tem priores quaterni, quod fecerit, *uulgo* appella-
ti, nituntur radicibus singulis. Deinceps illi ca-
nant larent utrinque, quibus singulæ quoque radices
insunt. Ultra hos maxillares, quini ab utroque
latere: sed qui maxillæ superiori insiguntur, ter-
nis: qui inferiori, binis radicibus maiori ex parte
adhaerescunt. Nonnulli autē nō utrinque quinque
maxillares, sed quaterni senuic oriunt. Eos non
maxillares modo, sed molares etiam appellant,
quod his cibi atterantur. Caninis nomen inditū
est, quod canum dentibus quamissimū existi-
tant. Omnes in suorum ossium cōcauis insiguntur.
Ex ossibus dentes tantummodo molium cerebri
neruorum participes sunt, ob idque eundem
sentientium possident.

DE OSSIBVS MAXILLÆ INFERIO- RIS. CAP. VI.

OSSIS maxillæ inferioris, quod eluxum in sum-
ma menti extremitate laxatur, pars que quasi
capitulata est, duobus ceu cornibus termina-
tur: quorum alterū in mucronem definit, ten-
donem à temporis musculo descendente[m] re-
cipit. Alterum capitis ossis sub eo exortu, quem
maxillarem uocant, annectitur: ibique in paruum
suum rotundo quodam quasi tuberculo
se se inserit.

DE SPINA. CAP. VII.

SPINA ex uertebreis quatuor & uiginti constat:
quæ si plures paucioresue sint, præter naturam
sunt. Harum contextus omnis in ceruicem, dor-
sum, lumbos, & os sacrum diuiditur. Ceruicis ca-
pitū annectitur. Huic dein dorsum, cui par inest
quæ & pectori longitudo: quod subest reliquū,
lumbi appellantur: cuius pars ultima a sacro lato-
re ossis finitur. Septem in collo uertebre, duode-
cim ad costas, ad lumbos quinque.

DE VERTEBREIS COLLIS. CAP. VIII.

EX uertebreis colli, primæ quidem dux inter se
undique colligantur. Reliquarū uero quinque an-
terior pars coalescit nexu constructa firmissimo:
idque interuentu eius membranz, quæ geminas
spinalis medullæ tunicas ambit: qua ratione
uertebre omnes se habent, duabus primis ex-
ceptis, quæ ut capitis obsecudent motioni-
bus, paulo laxius coherent. Prima uertebra la-
tissima & tenuissima est. Secunda angustior, ua-
lidiore: ac reliquæ deinceps eodem modo se ha-
bent. Quid enim spinæ medulla in gignendis ner-
uis consumitur, attenuaturque magis, cō inferiorum
uertebrearum minuantur foramina. Quum
autem capitis duplex sit motus, atque alter zin-
nuendo, abnuendoque fiat, aliter in latere: illum
quidem uertebre secundæ processū potissi-
mum præstat, hunc uero ipsius summæ uerte-
bræ, & capitis transuersæ partes efficiunt. Poste-
riorem processum, quem spinam uocit, omnes
habent uertebre, prima excepta, quæ duntaxat
in parte anteriori exiguum quandam processum
exigit. In ceteris ceruicis uertebreis, transuersi pro-
cessus semper sunt perforati, septima eademque

*Dentes in utra-
que maxilla sex-
decim.
Incisores dentes,
Canini dentes.
Maxillares den-
tes.*

*Dentes tantum
respicere molles
nervos à cere-
bra.*

*Maxilla infio-
ris ossium cōsti-
tuta.*

*Spinæ constare
ex uertebra.*

*Colli uertebra-
rum constructio.*

*Vertebrearum
foramina angu-
stari paulatim.
Capiti duplex
motus.*

*Vertebrae
processus.*

ultima excepta, cui interdū etiā, sed raro, à lateribus foramina insunt. Hos ipsos processus solæ ceruicis uertebrae leniter quasi bipartitos gerunt, præter duas primas, in quibus simplices planè habetur: in sexta uerò duplices manifestè apparent, & cæterorum omnium maximè: sicut & ea ipsa maxima est: quorum internus, latus admodū est. Pars cuiuslibet uertebrae anterior, qua inter se coalescunt, earum potissimum quæ in ceruice sunt, prima excepta, oblonga est. Neruis autem ab spinæ medulla orientibus, ac iuxta uertebrearum compages proceduntibus, utraq; uertebrae pars primæ quasi operam confert. In cæteris superior aut magna ex parte, aut omnino id præstat.

DE VERTEBRIS DORSI. CAP. IX.

Thoracis uertebrae, quæ maiori ex parte sunt duodecim, omnes ad decimam usq; processus habent permagnos: rum eos qui sursum, deorsumq; uersum spectant, tum etiam transversos, quibus costæ annectuntur.

DE LUMBORVM VERTEBRIS.

CAP. X.

Lumborum uertebrae quinque, & omnium crassissimæ sunt: quibus sanè per angulum inest foramen, tenuisq; medulla. Earum autem processus spectat sursum: atq; ab ea tantum uertebra, quæ præposita est, semper nervus erumpit. Habent singulæ lumborum uertebrae interiore in parte foramina nullo disposita ordine, in quæ se inferunt uenulae, sanis manifestæ & conspicuæ, cum in cæteris uertebribus, uel nullæ usquam, uel perexiguæ spectentur.

DE SACRO OSSE. CAP. XI.

Id os uertebribus, qua parte cum superiori alligatur, proportionè respondet. Ipsum autè transversus processus grandes patentesq; sunt, quibus in exteriorè parte sinus inest quidam leniter cauus, in cuius ilium os ingreditur. Id ipsum os ex tribus particulis constat, harumq; in extremitate os aliud quartum, quod coccyx nominatur, additum est. Nervus autem, qui à spinæ medulla per sacri ossis foramina procedunt, iuxta suarum ueluti uertebrearum compages, sicuti per spinam totam, proficiunt: non tamen ab utroq; latere, sed intrinsecus quidem, atq; extrinsecus: his omnes tria constituent paria.

DE COCCYGE. CAP. XII.

At coccyx ipsum ex tribus particulis constat, quæ plus cartilaginis, quam latum os, habent. Iuxta earū compages nerui posteriore ex parte procedunt. Gemini priores ex ea oriuntur parte, quæ coccyx latum os attingit. Insequens pars inde ortum habet, ubi prima huius ossis pars cum secunda committitur. Duo aliq; inde egrediuntur, qua secunda eiusdem pars, cum tertia coniungitur. Iuxta tertiam huius extremitatem, quod reliquū est ex spinæ medulla, simplex nulliq; associatum proficit.

DE THORACIS OSSIBVS CAP. XIII.

Os pectoris, costæ, itemq; ex spina dorsi uertebrae, thoracis sunt ossa. Costæ ab utraq; parte duodecim, singulæ cum singulis uertebribus connectuntur. Ossa pectoris per synarthrosin inuicem alligantur. Sunt autem numero septē, sicuti

ueræ costæ, quæ cum eo alligantur. Nam quinque inferiores costæ, quæ notæ dicuntur, in cartilaginem parum firmam degenerant, & cum diaphragmate, non cum pectore conglutinantur. Imò pectoris ossi cartilago triangula adnascitur, quam ensiformem appellant. Costis omnibus nō par longitudo est, sed suprema inferiq; medijs brevioris sunt.

DE SCAPVLIS. CAP. XIII.

Scapulae post thoracem sunt sitæ, gibbæ quidem exteriorè ex parte, intrinsecus autem sinuæ: ad hæc in ima basi tenues, oblongæq; in summa uerò crassæ, paruiq; exsunt. Os scapulae maiori ex parte cartilagine, sed in imo uerberis, contegitur, à spinâq; tenue inchoatur, & paulatim plenius efficitur, donec ad acromion locum peruenit, ubi iugulo annectitur. Hanc enim compactionem, nonnulli acromion appellant. In ea parte, scapularum ossi processus quidam subest, quem scapulae ceruicem nominant: isq; in acetabulum desinens, cum humeri capite colligatur.

DE IUGVLIS. CAP. XV.

Iugula, hoc est, clauæ, ab utroque latere summæ pectoralis ossis extremitati annectuntur: eaq; fistulosa sunt, figurâq; & crassitie inaequalibilibi. Pars namq; eorum inferior, quæ pectoris ossi alligatur, crassior cæteris, rotundiorq; est. Huic succedens, longè gracilior. Quod reliquum est, totum rotundum, inaequalibilibi est, quoad cum scapularum osse committitur, ubi quasi laniusculum est. Mediae iuguli tonus partes exterioris gibbæ sunt, præterim qua ad scapulas tendunt.

DE HUMERO. CAP. XVI.

Maximum omnium os humeri (semore excepto) est, idiq; utrinque supra infraq; alligatur. Summa eius pars grandiusculum habet caput, parue quidem ceruici coagmentatum, adnatumq; In eo iuxta anteriorè partem sinus quidam est, seu alicuius patulae scissuræ similis, qui totum ipsum caput in duo quasi tubercula bifariam diuidit. Pars autem inferior, in tubercula desinit inaequalia: quorum et quod extrinsecus situm est, capitulum radj annectitur. Cum eo uerò quod est in interiori parte, nullum os prorsus committitur. In ima humeri parte sinus persimilis est concauis trochlearum orbis. Cubitus hunc circum mouetur. Vbi autem sinus hic desinit in extremis utrinque lateribus, duo præterea sunt sinus, quorum anterior posterior est minor. Ille coronas cubiti, hoc est, aceros processus excipiunt: horumq; anteriorem, quem cubitus omnino flectitur, anterior sinus: quem tenditur, posterior posteriorè recipit. Cæteræ humen partes gibbæ quidem anteriorè atq; exteriorè in parte: in posteriore atq; interiorè, sinuæ sunt.

DE CUBITO. CAP. XVII.

Pars omnis quæ inter humerum & carpum sita est, eiusdemq; etiam partis os grandius, cubitus appellatur. Is alteri subest ossi, quod radium nominant. Huiusq; pars extrema superior leniter caua, externus humeri tuberculum recipit, eiq; alligatur. Cuius quidem cōnexionis est

Costa vera
prima, uero
quap.

Cartilago
ensiformis.

Scapularum
consideratio.

Acromion.

Scapularum
consideratio.

Humeri
consideratio.

Cubiti
consideratio.

Cubiti
radio
subest.

Cubiti
proci
sui dno.

est

Dorsi uertebra
rum
consideratio.

Lumborum
uertebrearum
consideratio.

Sacri ossis
consideratio.

On sacro
ossis
tribus
ciliis
par
tibus.

Coccygi ossis
consideratio.

Thoracis ossium
consideratio.
Costa ueroq;
duodecim.
Pectoris ossis
spina.

est minus, modò in pronũ, modò in supinum, toram manum adducere. Cubitus duos habet processus: quorum anterior minor est, alter uero grandior: ab istis cubiti ipsius sinus figmẽrẽtẽr similis consistitur. In hunc sinum, humeri orbita inferitur. Huius autem nexus, tendendi, curuandi toram manũ officium est. Radius suprà infraq; ualidis ligamentis cubito ligatur: media inter se omnino deficiunt. Vterq; adnatam appendicem iuxta carpi habet partes: sed extrinsecus gibbam, intrinsecus autem cauam: cubitus quidem iuxta minimum digitum, radius uero iuxta maximũ. In finũ eiusmodi se se carpus infundit, annectiturq;. Inest autem cubito ex abundantia quadam, processus quem columnarem appellant, istis brachiali etiam nectitur. Ad hunc quidem nexum pertinet carpum in obliquum ducere: ad alterum uero, in rectum, cuius operam summam manum extendimus, inflectimusq;.

DE CARPO. CAP. XVIII.

Prima pars palmæ carpos dicitur, ex ossibus octo, duplici distinctis ordine, constans. Dura omnia, & parvula, nec medullifera, multiplicibus figuræ sunt. Cuncta nervis cartilagineis nexi sunt inter se per synarthroin constructa, non congnata cernuntur: exteriore quidē in superficie, leniter gibba, sinuata intus infusus. Pars carpi superior ex tribus ossibus constat, que in rotunda quasi formam constructa, cum cubito, radio, & columnari processu annectuntur: hoc tamen excepto, quod carpi os, suum minimum digitum recipit, exigens lenis liquis, columnarē cubiti processum admittit. Ex his autem mediis, ibi pontilim sedem habet, ubi cubitus radiusque inter se copulantur. Tertium, quod bipartitum est, a radio comprehenditur. Pars carpi inferior, quatuor ipsius ossibus metacarpi alligatur. At quoniam, ejus carpi partibus infidet, quo iuxta cū heu eriguntur columnarum sunt sine.

DE METACABRIO, CAP. XIX.

DE METACARPIO. CAP. XIX.
 Inter digros & carpum ossa quæ palmam ex-
 plent, metacarpium appellant: id quod per syn-
 chrothrin carpo, digitorum autem priori pha-
 langi per diarthrothrin alligatur. Pollicis tantum-
 modo prius intermedium, ex transfuero ipsi me-
 tarcapio esse annexū. Singuli autem digiti ex tri-
 bus ossibus constant, priori semper intermedio
 in subsequētis summe fubeant. Iureque con-
 struunt esse, pollicem ipsum ex triplici ossi con-
 struū esse: ac primum ipsius intermedium, cum
 metacarpio minimè connumeratur. Vnde re-
 cte dixerit quissimæ, ex quatuor duntaxat me-
 tarcapio, ipsos autem digitos ex quindecim ossi-
 bus constitutos esse.

DE OSSIBVS QVAE CVM SACRO

officer commanding, Cap. XX.

RELIIS ab utroque latere magnitudo latius ofisi pro
cessibus, duo quaedam ossa appodita adstructa
sunt: quibus integrit nullum nomen est in
dum. Nam late ipsorum superne partes, alium
ossa: exteriores post femoris ingressum, infe
rioresq; coxendiculi: quæ inde in anteriora pro
tensa, tenuisq; forata, quæ inter se in extre
mo coarctæ sunt, pectinis ossa appellantur. V

trique coxendici prægrande acetabulum inest, cum femoris capite nexu ualidissimo copulatum, cognatumq.

OS FEMOR. CAP XXI.

OS femoris magnitudine cunctis animalis omnibus præstat: id supra, coxendici infus, tibie alligatur. Superiori in parte rotundissimum caput habet, proluxæ quidem ceruici ad interiora inclinatæ adnatum. Infra leniter patefcens, in duo tubercula definit, adeo quædam grandia, ut capita appellari possint: quæ sanè tibie annectuntur, non modo membranis ligamentis, sed tribus quoque alijs ualidis, rotundissimæ: quorum unum ab exteriori totius connexionis parte, ab interiori alterum, à medio posteriori interiorali, tertium porrigitur. Totius autem femoris forma, anteriori in parte extensius, gibbata: in posteriori interiori proficiat. Sub huius ceruice sunt duo exigui proceffus (trochantæres uocant) quorum exteriorum, qui est maior, appellatur natem.

DE TIBIA, CAP. XXII

TORAPA CRURIS, quæ inter talum genally posita est, cuiusdemq; etiam partis os grâdus tibia, appellatur. Hac interiore in parte sita est, eiq; tantummodo femur ipsum annectitur. Os autem quod extrinsecus locatum est, sura nominatur quæ crassitudini tibiæ admodum cedit, nec adeo protenditur, ut genuum ipsum cõtingat, verum supra infragî tibiæ per synarthrosin alligatur: media inter se penitus dehincut. Tibia, quæ femori copulatur, magna quidem adnata, coagmentatâ appendice, duplicem in se finem habente, capta femoris scic infirmatuna recipit. Tibiæ quicquid anteriori in parte tenet & carnis est expers, Cera dicitur: imx ab urre quæ latere tibiæ, suræ partes, malleoli nuncupantur. Hallucinantur autem qui eos talos appellant: nam sub his utrinq; talus consistit, ac un dequaq; confutitur, ut ne eum tangere quidem possit. Malleoli uerò extreme tibiæ suræq; processum partes sunt: gbgb quidem externote ex parte, intrinsecus caue.

DE PATALLA, CAP. XXIII.

DE PATELLA. CAP. XXIII.
QVa femur tibiæ annectitur, qu extrinsecus cartilaginofum, rotundumq; appofitum eft: quod gibba tubieftorum ofsium apns finibus comprehendit: paulumq; intrumefces, quod inter femur, tibiamq; fpatium patet, completitur. Id ipsum os patella & mola appellatur.

DE PEDIS OSSIBVS. CAP. XXI.

TALIS AB IMIS NIBIS SURSUS PROCESSIBUS COM-
prehenditur. Eius pars quoniam *scapus* uocant
sursum uergit. Posteriores leuigatæ omnes, mo-
dico forficulæ sunt, & ad superiora potius
spectant: anteriores rotundo quidem capite ob-
longæ ceruici adnato, cum offe connectuntur,
quod scaphoides dicitur. A dextro & sinistro
latere, in duo extantia superolula id definiunt, sub
nibus sursum cauis exspirat. Ipsius quoque pars
interna leuorem ferè habet. Huic subest os pe-
dis maximum, quod calcem uocant: id idy-
pum & rotundas partes extalo recipit, & gmi-
nos quoque habet excessus, in finem eius percom-
modè infert. Pars uero quæ ingredimur, leni-

Famulus confidens.
Famulus et cum
habet abbas
et auctoritas.

Trentham, N. S. W.

Tubia campylodonta

Sutra

Crea.

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

Paralla confida
nota

228

Feles officium
considerationis.

concluded as

cat

ter rotunda & latiuscula est. Posterior quoque rotunda est, eaq; ribis rectitudinem excedit admodum. Ex partibus eius anterioribus, quæ è regione magni digiti sira est, ipsius tali capiti subiacet, nec cum altero copulatur osse. At eius extremitas quæ minimo respondet digito, cum cyboeide osse per synarthrosin necitur. Cyboides autem à parte exteriori iuxta scaphoeides positum est. Verum hoc, quæ cum talo iungitur, sinuatum, cyboeides uero gibbum existit. Tria deinceps ossa parua inferiori scaphoeidis parti per synarthrosin copulantur: cum quibus etiam exteriori ex parte cyboeides pariter porrigitur.

*Cyboides et
Scaphoeides.*

Post hæc quatuor ossa, prima pars pedis quam tarsion uocant, finitur.

Tarsion.

DE PLANTÆ OSSIBVS.

CAP. XXV.

Planta inde inchoatur, quæ ex quinque ossibus constructa est. Post hæc demum pedis digiti finiti sunt, qui ex ternis internodijs omnes constant, pollice excepto, qui ex duplici tantum constat. Horum dearticulationes membranosis quæ uero in talo calcetys habentur, ualidioribus ligamentis coarctantur. Satis autem sint hæc tyronibus, prima de ossibus rudimenta addiscitibus.

*Planta pedis
quæ: quinque
ossibus
constat.*

LIBRE DE OSSIBVS FINIS.





GALENI PERGAMENI
de dissectione Venarum & arteriarum, Liber Vnus.



Cava vena co-
fervata.

Cor omnis ar-
teriarum origo.
Ante confide-
ratio.

Infraicervum
venarum confi-
deratio.

Pancreon.
Pylorus.

Vix in uentrem intestinalis deferun-
tur uenae, ueluti radices arboris
sunt. Ea uero quam cauam appel-
lant, quidam ceu truncus existit, o-
mniumque toto corpore spargun-
tur uenarum. Eadem ratione arteriae, quarum
origo omnium est cor, quae quidem pulmones
petunt, imaginem radicis ostendunt. Quam au-
tem Aristoteles zortam nominauit, ea caudicis
in arbore proportionem subit. Igitur ab ea ue-
na, quam iuxta caua iecoris, portas appellant,
ceu ab uno principio prodentes, septem ue-
nae in regionem uentris descendunt. Quarum
prima, brevis quidem illa, atque interdum sola,
interdum alijs associata minutulus, ad dodeca-
dactylum intestinum descendit, carne quadam
glandulosa, quam pancreon dicunt, suffulta. Se-
cunda autem, exigua etiam, ad pylorum, imam
uentris partem, affurgit, atque in eam regionem
uentriculi, quae circa & ante pylorum est, disse-
minatur: idque praeter alios duos insignes ramos,
qui a portae uena orti, in uentriculum & lienem
se expandunt. Tertia similiter, ex magna uena

enascitur, quae uersus sinistram descendens, ex-
tremum magnorum intestinalium mesenterium,
ad sedem usque complectitur. Quarta post hanc
uena, a dextro partibus ex eadem magna ue-
na, uersus pylorum descendens, ad gibba uen-
triculi effertur. Quinta deinceps, ex eadem ma-
gna nascitur uena, in ipsius latere dextro, quae
coli mesenterium, numerosiori propagine ue-
narum inuadit. Sexta similiter orta, ad spatium
peruenit, quod inter duo iam dicta mesenteria
iacet. Id enim plurimas uenas habet, & in ieiunum
primum, deinde in omne deinceps tenue inte-
stinum fissura multiplici diuiditur. Postrema ue-
ro eius uenae pars, tum caecum intestinum com-
plectitur, tum quandam exiguum coli partem,
qua ipsum caeco annectitur. Ad hunc sane mo-
dum uenae illius quae a portis prodit, in intesti-
na, splenem, & uentriculum, digestio perficit. Quin
etiam omnes omento intestinae uenae, ab ipsa ipsa
uenis propagantur. Igitur per omnes iam dictas
uenas, cibis ad hepatis portas suggerit. Hinc ue-
ro per uenas ad ipsius fibras pertinentes, in totum
iecur permanat. Indeque rursum in alias assumit
uenas, per gibbā quidem partem dispersas, ceterum
a maxima alia uena ortas, quae ob id causā uomi-
nāt. Ab ea etiam alae propagantur, quae in omnes cor-
poris partes sanguinem rulant. A iecore enim utriusque

Omenti vena
a iecore orti
entur.
Distribuitur
alimenti confi-
deratio.

Cava vena
duscia.

prolapsa, sursum quidem per septum transfuerum, ad cor attollitur: deorsum uero in spinam dorsi contorquetur, atque inibi super magnam defertur arteriam. Iam uero ab ea quæ sursum tendit, oriuntur primo quidem coniugata ad septum transfuerum: dein capillorum modo tenuis permixta, in membranas intercipientes thoracem, mox in pericardium tunica. Postillas alia magnitudine insignis, in dextram cordis aurem fertur, atque inde ad dextrum uentriculum. Ab hoc alia duplici, ut arterie, tunica habens, in pulmones progreditur. Quinetiam alia quædam exigua per exteriorē cordis superficiem, in totū eius uisceris corpus spargitur. Quæ autem cor ipsum præterit uena caua, iam iam festinans ad iugulum, obiter quoddam sui germen diffundit in omnes thoracis partes, præter prima duo, interdum uero etiam tria, costarum interualla. Deinde alias quædam prætenues uenulas, ad membranas mittit thoracem interficientes, necnon ad thymum uocatum. Quum uero prope iugulum peruenit, in duas diducit partes: atque ita oblique in latus utraq; pars inclinata, à media paululū regione diuertit. De quibus, dum ad sibi uicinam utraq; ascendunt clauicula, in media latrone, quæ ad thoracis anteriorem perueniunt, radices sparguntur. Præter has, magnarū uenarum multiplices fissura scinduntur coniugatio, inter costillas superioris thoracis alit spacia, & quæ circa scapulas sunt loca, tum nonnullos etiam ex interioribus colli musculis. Ab his ipsi uenis enim hic nascuntur, quæ ubi ad sextam colli uertebra perueniunt, in ipsa se foramenta insinuantes, ad caput usque efferuntur. Quicquid autem ex eis superest, ad axillas porrigitur: & dein fissura multiplice, per manus excurrit totam iunius magni musculi partibus, in ipso brachio exporrecta. Ex eius autem propaginibus uua, per interna hæc quoque percurrentes, circa brachium in orbem complicatur, 40 posterioremb; ipsius regionem ita perrepat. Mox in exteriorē partem, eandemq; anteriore, subit ad cutem, atque illinc deorsum tendit, donec ad brachij cōmissuram perueniat. Postrema uero eius pars, aliquando exteriorem brachij nodum excedit paululum: nonnunquam multo ulterius progreditur, sub cute secundum os cubiti deorsum tendens. At omne quod de magna uena reliquū est, ad medium peruenit cubiti articulum, una cū uiciniore nervo ramos expandens ad intimas musculorum eius loci partes, usque ad interioris brachij caput, nihilolū minus per profundum ad posteriores, anterioreb; musculos. Sed enim priusquam in cubiti flexum ingrediat, in uenas scinditur complures, è quibus multæ in superficie extant: omnium maxima profundius demergitur. Atq; magna ex parte una quidem uena, à magna propagatur, ad inferiora magis oblique declinat: ac subinde altera ex inferioribus cubiti partibus, multiplici sparsa fobole, ad carpū peruenit: ac tertia deinceps, circa medium maximè cubiti. Cæterum earū fines iuxta carpum miscuntur. Elarissimus autem simul & maximus ramus, qui ab ea uena de qua modo institutus est sermo, propagatur, in medium

peruenit flexum, quā cubitus cum brachio coire: quō etiam oblique confluit alterius uenæ, quæ per brachij anteriorem sub cute sita est, nō exigua portio. Dux enim hæc tonus sunt manus uenæ: tum ea quæ per axillam in manum fertur, tum ea quæ per clauiculam, quā humerariam appellant. Verūm non semper idem harum uenarum positus, sicuti nec par crassitudo est. At secundū naturam maximè est, ut utriusq; uenæ pars in interiorē cubiti flexum quadrintenus deferatur: quæ partes posteaquam coierint, uenam producant, quæ omnium in cubito extantium fertur amplissima. Secundum hanc præcipua magnitudine humeraria est. Ea hinc profecta, quā cubitus cū brachio coarctatur, perig; radiū porrecta, ad extremi cubiti tuberculum, quod carpo adheret, peruenit: atq; inde mox infimæ, eademq; extrinæ carpi ipsius parti distribuitur. At illa, quæ ex confluxu duarum uenarum, omnium in superficie extantium maximam fieri dixi, ab interioribus cubiti partibus incipiens, primum consendit radium: deinde in extremam euadit partem: ubi in ramos scissa duos, altero ad radij extremum procedit, altero ad summum pertingit cubitum, quā & ipse cohæret carpo: atque inibi uenam contingit, quæ ab humeraria propagari retulimus. Iam uero, quemadmodū quæ in interiori cubiti parte sunt uenæ, ferè iuxta carpū in multas exiles uenas, & inter se comixtas scinduntur, licet etiam, multoq; his magis uenæ quæ per exteriorē cubiti partem feruntur. Porro quæ alius per cubitum manumq; extremam uenæ immerguntur, à duabus magnis oriunt, hoc modo. Quæ parte ab utraq; magna propagari quædam ostendimus, quæ ad flexum brachij tenderent, duo rami, ab utraq; singuli, in profundum procurunt, ibiq; similiter mixto complexu iunguntur. Ex quibus rursum alie duæ insignes uenæ exoriuntur, quæ tandem suis germiūbus musculis totius manus penetrant. Quæ autem ad anteriorem thoracis regionem feruntur uenæ, ad hunc constant modum. E medio duarum uenarum in quas caua memorauius scindi, uena oritur, quæ ad dextram ossis pectoris tendit: ab sinistra autem caue parte, altera. Hæ igitur per totum feruntur thoracem, ossi pectoris subdant, usque ad radicem cartilagineis ensiformis: & ad singula obiter interualla costarum, ramulum ex se mittunt, quō coniunguntur extremis eius uenæ, quæ spacia intercostalia perrepat. Harum uenarum portio extra thoracem emergit, ad subitatos illic reficiendos musculos. Quæ uero ad mucronatam cartilagineam pertinent, tum in mammis asurgentes, tum in reliquū pectus dispensatæ, deorsum procedunt, rectis subnixi musculis, in quos partem aliquam mittunt. Quā porro clauicula ad cent caue uenæ * partibus, in quas secari ipsam diximus, subiecta est uenæ radix maxima, utrinque una. Quæ quidem confestim assurgens, bipartito scinditur, duas ædens magnas uenas: quarum altera per anteriorem, auctamq; colli partem, ad interiora magis recedens effertur: altera in partē anteriorem deorsum quadrintenus subsidens, mox sursum sublata, clauicula ipsam ample-

Arteria uena
Cervicalis uena

Thymum
Iugulares uenæ

Cubiti venarū
consideratio.

Axillaris uena
Humeraria uena.

Media uena
consideratur.

Venerat diuis
perceptum
cubiti consideratur.

Venerat peruenit
interualla
clauiculae
scinditur.

amplectitur, ad modò commemoratam uenam
contendens extrinsecus. Et confluentibus, selesq;
còmixcentibus, gignit in summo eminens iuga-
laris utringui uena. At uox eodem semper aut mo-
do aut loco miferetur. Duo autem hic luitimo
de uenarum solent esse coniugia: obliquum alte-
rum, còfuntium ipsarum, & sese inuicem con-
tingentium in cauo sugili: alterum autem mini-
mè còfuntium. Declinant enim quasi in extimà
colli partem oblique. Tres autem conspiciunt uen-
as oriunt ab ea quæ circa clauiculâ contorquetur.
Vna quidem quæ humeraria dicitur (quod ob-
liquè defleat ad humerum) & sæpe eadem uisi-
tur crassitudine, cum uena ad collum subeunte.
Rebique duæ, radices utringui humeraria mino-
res habent: quarum altera ad summum ascendit
humeru, ac in proxima quæq; corpora transi-
ens, ita occurrat: humilior altera, per profun-
da magis surreptans, secundò magnum muscu-
lū ab ossè pectoris exortecta, ad caput brachij
peruenit. Cæterum axillaris uena multò hume-
rali est maior, & numerosiore quàm illa in bra-
chio sobolem habet per eundem ex se ramo-
rum. Porrò quantum reliquū est de magnis illis
uenis, in quas uena caua diducit sub clauiculâ
rectâ per collum, gulam habet ante se positam,
sursum effertur, producens interim uaria germi-
na, sed ab ipsâ collis superficie remota: quæ nimirum
nutriunt musculos alios descendentes. Nam
uenæ ab extrantibus in superficie iugularib; propa-
gatæ, plurimæ & tenues sunt, quæ per totum
ambitum colli, faciei, & capitis, uario plexu disse-
minantur. Quin & lingua magnas accipit ab in-
timis iugularibus uenâs, posteaquàm ex per-
ramos cum extimis se coniunxerunt. Reliquū au-
tem omne ex internis iugularibus ad cerebrum
affurgens, in caluam excedit per extremam sutu-
râ labdozæ partem. Coniunguntur autem ue-
narū omnium extrema circa ipsum caput, ipsiusq;
cum prima uertebrâ commissuram. At uerò ea-

*Regularium ve-
narum conside-
ratio.*

*Humeralis ve-
na.*

*Axillaris uena
humerali est ma-
ior.*

*Lingua unde ve-
na accipiat.*

*Caua uena li-
berum, est origo
venarum quæ
ad inferna de-
scendunt.*

*Emulgentes ve-
na amplissima.
Seminariæ ve-
narum origo.*

*Tympani semi-
narum qualis.*

cas uenas, de singulis uertebreis ad illâ uenâ mit-
tuntur, quarum postrema ad musculos qui ab-
domini prætensi sunt, arrolluntur. Quæ autem su-
pra hos musculi extra thoracem iacent, alimen-
tum accipiunt à uasis circa clauiculâ exalantibus;
rum etiam ab his quæ pectoris os ad mam-
mas tendunt, si cum etiam ab his quæ sunt in spa-
tijs intercostalibus. Quinetiam per singula fo-
ramenta spinæ, singulæ uenæ in medullâ ipsâ
ad caua lumbos per teptatè inferuntur. Porrò in ul-
timis lumborum uertebreis non amplius uidere
est arteriam uenæ subilesciam, sed elatior quidem
arteria supra uenam ceu prouehitur, uena au-
tem per ipsas uertebreas. Hac igitur parte & se-
se contingit utringui uas, & in duo membra di-
uancatur, instar literæ Λ. utraq; autem coheren-
tium uasorum pars ad sibi subiectum crus obli-
quior descendit: prius tamen ipsorum uasorum
quibusdam ramulis, ad alendas lumborum car-
nes, atq; interdum etiam ad eam peritonæi par-
tem, quæ ad lumbos spectat, reuulsis. Vtriusq; au-
tem uenarum coniugationis extrema, ad exte-
riores latè ossis partes se promunt, inq; muscu-
los eam regionem consistentes, distribuuntur.
Deinde ad uteri partes inferiores, aliæ uenæ
ferunt, quæ in ceruicem ipsam disseminantur, &
quædam sui parte amplexantur testiculos, altera
usq; ad uteri fundum pertinent: indeq; abze sube-
unt uescicæ: aliæ per pubis os ad exteriora cum
eius nervo extendunt, atq; per inferiores illius
regionis musculos disseminantur: aliæ per rectòs
ascendunt musculos, extremisq; coniun-
guntur uenarum, quæ per thoracem ad subcar-
naginæ descendunt. Ab eadem radice uenulæ
utringui singulæ in uterum perferuntur, per quas
mammas cū utero maxima necessitudo existit.
Insuper aliud extra musculos est coniugium ca-
rum, quæ ad utriusq; sexus pudenda pertinent.
Ab his aut statim aliæ est uena utringui, quæ ad
internos femoris musculos tendit. Post has uerò
aliæ ab inguinibus ortæ, uisuntur per illi regio-
nem ascendere. Aliæ etiam obcuræ, à mammarū
uenis deducunt, has quas nuper dixi, sinibus suis
contingunt. Reliqua magna uena in crus diui-
ditur, primam iuxta inguina emittens propa-
ginem, quæ cum parua arteria in musculos ante-
riores spargitur: secundam utringui uenam, quæ
ex internis partibus ad genu usq; subter cutem
disseminat, ac alias nō paucas ad profundiores
femorum partes. Cæterum paulò alius quàm
femur cū nbia articulo iungit, in tres partes di-
uiditur: quarum media, quæ maxima est, per ip-
sum deorsum ad popliteum fertur, atq; inde per
profundum suræ procedens, non modicam in
musculos eius sobolem ramorum spargit. Alte-
ra autem parte quæ in superficie eminet, per ex-
teriorem partē alterius tibie ossis porrecta, ad
pedis pertingit articulum. Tertia uerò quæ inte-
rior est, ad anteriorem nbiæ partem procedit, ac
inde ad malleolum peruenit, ad ipsum nbiæ ex-
tremum, ut sanguinè mittat, quàm commodissi-
ma. Enim uerò à maxima quæ per profundum
musculis distribuitur, duo cum arteria, extrema
sunt, quorum alterū quidem maius, à tibia fer-
tur ad interiora: alterum uerò, per mediâ duorū

*Abdomini ve-
na.*

*Thoracis muscu-
li extensi à qui-
bus uena alen-
tur.*

Veni uena.

*Pubis derum
vena.*

Cruris uena.

tibiſe oſium regionem, ad interiora pedis perducitur, ac propagini alterius uenę immiſcetur, quā ab exterioribus tibiſe partibus per fibulā diſcedere. Ita ſit ut ſint uenę quatuor, quę ad pedes deſcendunt: una quidē omniū extrema, per gibboſum fibulę extremum: altera per partes ipſius interiores: tertia per anteriorem tibiſe extremi regionem: & quarta, quę ex interioribus partibus exuberātes tibiſe proceſſus complexa eſt. Hoc igitur tibi diſſectionis uenarum principium eſto. Deinceps de arteriis dicendū.

Arteriarum origo, ſinifſter cordis uentriculus.

Arteria venoſa. Arter.

Tertium arduu uentriculum non uenę reperiunt. Arteria magna diuſa.

Carotides arteriæ.

Plexum reſiforme produci ab arteria carotidiſe ſub caluſia.

Inuicem arteriam mitti ſingula uſque ſub.

Harū origo eſt ſinifſter cordis uentriculus. Hinc autem in pulmones, gratia trahendi ſpiritus, deſcendit radices inſtar, una tenuis ſimplicitate tunica conſans: tum altera etiā hac multo craſſior, quę ueluti truncus omnium arteriarum exiſtit. Habet præterea cordis ipſius corpus circumfulas in amburum arterias duas: alteram quidē maiorem, quę maximam ipſius partem amplectitur: alteram eā maximē regione diſtribuit, ubi tertium uentriculum eſſe exiſtimauit Ariſtoteles, quum tamen nuſquam in reperiatur. Haſ igitur arterias, ſimulæque maxima de corde ſe prompſerit, ab ea producti uideas, ipſarū mox in membra haudquam paria diſcui. Et horum quidem, quod minus eſt, ſurſum ferri, ipſarū conſeſſum in partes ruſum inæquales ſindas, ac ſubinde ipſarum maiore, ad iugulum tendentem obliquam, de ſiniſtra ad dextram thoracis partem porrigi, alteramq; oppoſitam habere ſitum. At uerō arterie pars maior, quę ad iugulum tendit, ubi prope thymū peruenerit, primum quidem ad ſiniſtram iugularem emittit ramum: poſt illam, alterum ad dexteriorem. Deinde quicquid ipſius reſtat, ad ſcapulam axillariū ſiniſtram tendit. Quintam quædam ad pectoris os, alia ad primas thoracis coſtas, alia ad ſpinales muſculos, alia denique per foramina ſex primarum colli uertebrarum deducta, unā cum uena, ad ſpinalis medullę membranas, deſcendit: alia ad ſummum humerum, ſcapulam, axillariū dextram extenditur. Quę quidem, ſicuti & alię omnes, diuiduntur unā cum adiacentibus uenis: quemadmodum & quę arterie carotides appellantur: ex quibus unā cum iugulariſis iuuenis, aſcendit quædam arteria. At quę in ſuperficie extāt iugulares, ex ſine arteriis conſpiciuntur. Omne autem quod ex carotidibus reliquum eſt, ſurſum rectā procedens, in caluam penetrat, inibiſque plexū reſiformem producit: deinde in duas ruſus coiens arterias, ſubut ad cerebrum. Porro arterie quę a corde ſe promittunt, pars maior ad ſpinam deſcendit, quintamq; thoracis uertebram aſcendit: & inde per totam ſpinam, uſq; ad latum os, deſcendit, primum propagationem quandam tenuem emittens in eas thoracis partes, quibus pulmones adiacent. Extrema autem ipſius ad arteriam uſq; aſcendunt: deinde per ſingulas uertebras rami tum in ſpacia intercoſtalia, tum ad ſpinalem medullam exoriuntur. Vbi autē egreſſa eſt magna arteria thoracem, primū duas in ſeptum tranſuerſum arterias mittit: deinde in uentrē, hinc, ac iecur inuicem unam. Interdum ex una radice bifariam diſcui, uentriculo quidem, & hinc, & hepatis al-

tera pars: altera inteſtinis diſtribuitur per duo meſenteria, tum id quod ad dextram ſitam habens, primum eſt coli partium: tum id quod eſt omnium inteſtinorum medium. Nam tertium meſenterium, quod prope ſedem pertingit, in ſiniſtra ſitam, nullam inde aſſumit arteriam: ſed de imis partibus in ipſum quædam inferitur, quę propter renes a magna arteria iniungitur & ipſa naſcitur. Atque inter hanc & modō commemoratas, dux magnitudine præcipuè ad renes tendunt. Cum uenis etiā quę ad alia & teſtes ſeruntur, arterie etiā ad eundem procurunt modum. Cæterum arterie magnę pars extrema, quum ad latera lumborum peruenerit, ſuprà poſitam ueniam tranſcendit. Quod poſtea quā factum fuerit, haud aliter quā uena ſciſſa, bipartito arteria partem utranque in ſibi ſubiectum crus mittit: à quarum utraq; obiter ſinguli propagantur ramuli, qui conceptibus per umbilicum inferuntur: in perfectis autem animantibus, ipſi ad os larum excurrunt. At ipſa cruris utranque arteria ad intimas diſtribuitur partes ſeruit cum magna uena. Nam ipſe uenis quę in cruribus, manibus, abdome, dorſo, & collo, per ſummam ſuperficiem uiſuatur, ne una quidem ſubeſt arteria. Sedenim arterias in ſolo capite iuxta cutem iuuenis, tum eas quę poſt aures, tum eas quę ad utraq; tempora extant. Porro in conceptibus uenę arterie iuxta uentur, ab extremis uenarum oſculis prodentes, quę ad utrum pertinent. Quibus inter ſe coeuntibus, concurrentibusq; ipſis, quę ex coitu ſunt factę, arterie & uenis, contriugit ex ipſis fieri coniugium illud utrorumq; uſuſorum, quod inferitur in umbilicum. Arterie ſiquidem ueſicę ſectus cõplexę, ad arterias illas tendunt, quę a magna per ſpinam porrecta mittuntur. Venę autem, ſimulæque ex umbilico ſe proiecerint, coeũtes, unam magnam perficiunt quę ad concauum iecinoris tendit, haud procul ab ea uena, quę ad portas eſt. Hęc igitur uena ſine arteria eſt, ac poſt illam tota cauā, donec ad ſpinam peruenerit. Sic nec ſeptem tranſuerſi uena, nec illa quę alit thoracem, nec humeraria item, nec axillaria (præterquam ubi alius coarctantur, ut in cubiti articulo) habet ullam arteriam adiunctam. Omnes ſiquidem quę per cubiti ſuperficiem expaſe ſunt, carent arteriis, ſicuti & quę tum iugulo, tum collo in ſuperficie ſparguntur. Omnibus denique ſuperficiariis, aut quę per dorſum, latera, rotum thoracem, in ſenoreniſ uentrem ſub ſumma cute expanduntur, nullam inuenias arteriam ſubdatam. Quę autem ab ipſis quę profundius abſconduntur ortum habent, ſi quidem ex ſublimi deorſum tendant, adiacentem habent arteriam. Si uerō ex uno ſubeuntes, ſuperne deſcendentibus uenis iungantur, ſine arteriis ad glandia quædam euadunt. Sed ne illę quidem uenę cum arteriis coeunt, quę in exteriores pudendi muſculos inſeruntur. Arterie autem ſine uenis eſe ſunt, quę ueſicam ſectus amplexantur in utero, propagę ea, quę a magna arteria procedens, in conceptum uenam arterioſam ſe inſinuat, non ſubſtantia modō corporis, ſed uſu etiā & ſunſione

Meſenteria in plex.

Arteria lumbi in crura diuſa catiſe.

Venę quibus nulla ſubſt arteria. Arteria ſuperficialis thoraciſe. Venarum arteriarumq; in conceptibus ſigillatim.

Vena ab ſe artiſe quę ſunt.

Vena adiuncta arterie lobulæ.

Arteria abſe uenis.

functione existens arteria. In perfectis autem animalibus, sine uenis arteriæ uiſuntur, primum magnæ illæ quæ ex corde procedunt: una quidē, quæ ad quantam uſq; thoracis uertebraſ descendit: altera, quæ prima omnium eſt ad ingulū. Poſt hæc etiam quæ ad ſcapulā & axillā ſiniſtrem ſe inclināt. Iam arteria ſine uena eſt, ex carotide propago una, quæ ad rextum reſtorſum aſcendit, quod etiā rete ſine uena eſt. Tum uerō, quæ ad ſeptum tranſuerſum, earum nulla cum uena iungitur priuſquam in extrema inciderint uenarum, quæ à caua exoriantur, quem admodum nec primæ illæ propagines: quæ ad iecur, & uentrem, & lienem, & inteſtina mittuntur. Nam ne illis quidem adiacent uenæ, priuſquam incipiant coniungi.

GALENI PERGAMENI de neruorum diſſectione, lib. vñus.



Vôd nulla particularum animalis nec motum arbitrarium, uec ſenſum ſine neruo obſtinet: quodſi ſi incidatur neruus, immobilis conſtitit, inſenſibilis reddatur particula, inter omnes conſtat medicos. Quod autem origo neruorum atq; ſpinalis medullæ ſit cerebrum, quodſi alij nerui ex cerebro, alij ex medulla ſpinali oriantur, iam demonſtrandum aggredior. Anteriores uentriculi cerebri in priorem procedentes partem, ſenſim leuiter in anguſtum coarctantur, donec ad principium pertingant naſi, ſeſe contingentes perpetuò, tenui tantum membrana diſtincti. Horum autem ſinum, ad partem utranque, unus dextra, & alter ſiniſtra, neruus eſt craſſitudine in ſignis, & aliorum ſerē omnium neruorum molliſſimus, ex ipſo quidem prodians cerebro in oculos extra caluam, per foramē æquē patens ac latum, quantum eſt ipſius nerui craſſitudo. Vident porro nerui ipſi, ceu quædam oculorum radices. Vterque ſiquidem in ſibi aduerſum oculum ſeſe quamlatiſſimè explicat, ipſumq; qui in oculo eſt, utrum humorem, in orbem, ſphæræ modo, ambit, imbi etiam naturam cerebri retinens. Sed in ſolis hiis neruis, antequā in oculos inferantur, ſenſibilis quidam meatus inest. Ac prima quidem hæc coniugatio eſt neruorum, qui à cerebro oriuntur, longè aliarum omnium molliſſima. Altera poſt hanc eſt coniugatio in muſculos qui oculos mouent diſtributa, durior multò & tenuior ea quam nuper memorauimus. Huic, dum per caluam procedit, non etiam quam primum naſcitur, adiacet coniugatio neruorum tertia. Sunt autē molliores iſti, tum ſecundæ, tum quartæ, atq; aliarum deinceps coniugationū neruis, multiſq; circa primū ſtatim radicē apparent. Pauſa iſis durior, neruorum ex cerebro prodeuntium quarta coniugatio, ſtatim poſt exortū, cum tertia miſcetur, ac perrepat primum quidem craſſum inuolucri cerebri, deinde etiam ipſum capiti obductum os: tum rurfus ad palatum recedit. At tertia coniugatio ubi ſecundam attingit, uariè ſcinditur, atque deſinit. Primum igitur ſingulæ ipſius partes, per commune cal-

uæ foramentum, ad inferiorem capitis partem deſcendunt. Intelligere autem conuenit, nullum neruum aut à cerebro, aut ab ſpinali medulla emitti non coniugatum: ſed ſemper alterum ad dextram, ad ſiniſtram alterum, eadem proſuſus utrinque magnitudine, ſinum obtinere. Igitur pars exigua tertiæ coniugationis ſtatim quā maxillā iungitur, ante aures erumpit. Quod autem ueluti truncus eſt omnium indidem proceduntium particularum, bipartiſto ſcinditur primum, deinde membrum utruſq; in multas ruſum partes: & alterum quidem tum in temporum ac ſuperioris maxillæ muſculos diſpenſatur, tum in gingiuas, dentes, & ceterum, quæ faciei prætenditur: alterum uerō in radices dentium inferioris mandibulæ, gingiuasq; & labra inferiora, necnon linguæ tunica diſſeminatur. Quamobrem coniugationem hanc nonnulli guſtatoriam appellant. At quarta coniugatio neruorum, à tertia recedens, ſeſe in palatum inſinuat. Eſt & quinta coniugatio, cuius nerui non produnt ex una radice, ſed ſibi uicini ſunt uicini. Sub hac enim auditorius neruus, in priori magis parte ad auditorium meatum deſcendit, unā cum dura membrana, quæ indidem, unde neruus, emergit: cum qua in latitudinem ſeſe eſtendens, meatus leuiter obducitur. Alter uerō, ex parte aduerſa in alterum quoddam oſſis petriſſimum cæcum foramen inſeritur. Coit autem mox neruus hic cum eo qui progreditur foras, quā maxillā iungitur. Quod autem ex ipſis duobus conſtat, in larum muſculum ſcinditur, qui ſubiectus cuit, buccam ſiue maxillam mouet. Ad hunc itaque modum quinta digeritur coniugatio, quam duplicem eſſe conſtat. Sexta autem neruorum ex cerebro ortorum coniugatio, foramine uſa eſt, quod ad ſuturæ labdoſæ extremitatem inferiorem inſeritur. Principia autem ſtatim è cerebro prodeuntium trium neruorum obſtinet: quæ ubi à calua emerſerint, muſſifariam cum inter ſe commiſcentur, tum etiam cum adiacentibus alijs. Super eſt ſeptima neruorum cerebri coniugatio, cuius pars maxima in linguæ muſculos diſpenſatur. Exigua uerō quæpiam particula ad muſculos prouenit communes cartilagini in gutture ſcutiformis, & inferiorum laterum eius, quæ appellatur labdoſæ, atque in alios quoddam non ſemper. Commiſcentur autem inter ſeſe nerui ad inferiora capitis tendentes, tum iſ qui à tertia coniugatione, tum iſ qui à duabus nouiſſimè memoratis oriuntur. Aſanē ueruorum qui à ſpinali medulla naſcuntur, prima ſecundæq; coniugatio ſerpiſ ſocietatem inat cum hiſce neruis. Et tibi quidē perſepſe uidebit, quod de altero in alterū traſſit, ceu uinculi aliquod duntaxat ambobus eſſe commune: id uerō alterum augeat, alterum exiliore reddit. Porro ignorarunt uniuerſi anatomici, quomodo proprijs laryngis muſculis nerui è ſexta coniugatione diſtribuantur, tertiū utrinque prodeuntes, ut ſex numero omnes ſint. Laryngis etenim muſculi, ab illo neruo quædam accipiunt germina, quæ per foramen ad extremam labdoſæ ſuturam interpatens exoritur: qui ſi laqueo quidē intercipiatur,

Nerui omnes
coniugati pro-
ducti.

Coniugatio ner-
uorum quinta.

Larum muſculus

Coniugatio mol-
lium neruorum
ſexta.

Coniugatio mol-
lium neruorum
ſeptima.

Laryngis nerui
omnes ſex.
Nerui animal-
que nerui inter
ipſos reddatur.

statim mutum animal redditur. Aliorum porro duorum, alter ad utroque faucium musculos, linguarum radice, pertingit: alter ad scapulae musculum, & ad eum qui latus est, aliosque quosdam illius loci musculos.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus Liber I.

Osium sub-
124 125



Simia cur-
quam similia
hominis.

Forma cor-
poris
esse osibus
similem.

Anatomia
theatru.

Vod pali in tentorijs præstant, & in ædibus muri, id nimirum in ani- malibus osium substantia: ad cuius imitationem cætera in animante so- lent effingi, formantur. Idcirco & si- mia, inter universa animantium genera, tum uisceribus, tum musculis, tum arterijs, & nervis (quandoquidæ & osium forma) homini simi- lissima est. Quoniam igitur corporis forma osi- bus similis est, quibus etiã natura partium respondet, operæ precium fuerit in primis ex- actam humanorum osium in disceptis peritis: eamque haud quidē ex libris tantum, sed oculata inqu- sitione uenari: id quod licebit tibi, si assidua ca- dauera contempleris accuratissime, aut etiam earum simularum ossa, quæ homini quam simi- lissime existunt. Quamquam præstent in utroque animali, & in simia & in homine, cognitionem osium inuolucris, post quæ mox ad concisionem muscularum est properandum. Deinde licebit quidvis discere primum, siue artenas, siue ue- nas, siue nervos. Atque in horum cõsuetudinibus uer- sari, uiscerum & reliquorum omnium natura inuolucris. Ac sanè postura osium, eorumque no- bis exposita est, sicut & muscularum anatome.

Actio-
nem muscu-
lorum
maxime ex
126

Quare si in illis commentarijs te exerceras prius- quam ad hos accingeris, haud inutile fuerit. Quum autem per chirurgiam musculos ipsos propter abscissos altiores, incidere interdum co- gamur, actionis ipsorum cognitio maxime ex usu est, ut rum perdiscere, tum prædicere possis, omnem abigendo calumniam, functionem in magnis uulneribus, ubi musculus totus trans- uersim dissectus fuerit, abolituram. Taceo qui musculorum actiones norit, eum chirurgum alios quidem musculos cautè, alios autem in- cisionum audacius. Præstat tamen pro fibrarum ductu, ipsorum diuisionem moliri. Nam inci- siones transuerse, quæ utique ad angulos re- ctos sunt, actionem dissoluunt. Necessè autem est interim, partes quaslibet uulneribus angustis altioribus cõsectas, ad huc amplius diuidere, alias ob alios usus: quo in opere, fibrarum posi- turæ, muscularumque actionum intelligentiæ, om- nium maxime deudetur. Hanc qui ambit, ne pigeat ipsum uel proprijs manibus pellè aufer- re cadaueris. Nam octo statim musculos ignora- runt, qui ante me simas alios excoctandas tradi- derunt. Sunt uerò horum octo muscularum, duo ad baccarum motum à natura formati: alij au- tem duo, brachia lateribus adducentes. Porro quatuor reliquos reperi, duos quidem sub il- lis glabris pelliculis, quæ uestiunt interna ma- nuum: alios autem duos, sub illis quibus plantæ pedum reguntur. Ad hæc uerò, quum simar cui

Musculorum
fibrarum
motum
maxime
ex
127

Musculi
motu
maxime
ex
128

pij, quæ in aqua extinxeris, detraxissem olim ex- tremam cutem, inueni in illa etiam musculum te- nuem & membranofum, cõstis omnibus incu- bentem: qui habebat inferius principium, sub- ter uniuersam illum cutem expansum. Vt igitur exordiamur à manibus, singulis in singulis digi- tis ad extremum usque extenduntur musculi fibras quasdam exiguas, & tele araneæ perfimiles, in ossa post articulum iuncturas fixa, immitten- tes. Similiter se habent hæc & in summo pede.

Musculus
motu
maxime
ex
129

Musculus
motu
maxime
ex
130

Musculus
motu
maxime
ex
131

Primum itaque rotam cubiti atque digitorum cu- tem exteriorē detrahemus, ab ea solum quæ ma- num intus cooperit, abstinentes. Dein, quæ in carpi articulo sunt, studiose adimere oportet, si forte quæpiam membrana ex detracta cute reli- qua sit. Verum huiusmodi auellendis, scalpellis acutior est commodus: quemadmodum musculus inuicem separandis, reusior. Iam uerò membra- nis ademptis, primò post ipsas, medijs cubiti sub cute summa, musculo, uidebis ligamenta cõpa- gibus articulari iniecta, posita in utraq mem- bri parte, foris & intrinsecus transuerse: quibus capita tendinũ subiacent, interna parte digitos ipsos flectentiũ, externa tendentiũ. At ex utra que ligamentorij, quæ dixi, parte interna quidē, duo sunt musculi flectentes carpi, quorũ hic re- cto tramite uersus paruũ digitũ, alter uersus in- dicē est porrectus: externa uerò, unus in cubito, qui carpum extendit, duo in radio, carpum utri que mouentes. Alter ipsorum etiam magni digi- ti motor est, quem duos esse potius quàm unũ, existimandum. Exterius omnium a foris mu- sculorum, de quibus uerba fecimus, capita, liga- mina habent transuersim concidenda. Iam alius quidam musculus desuper rati radio incumbit, nequaquã in tendinẽ alijs quos recensui similē cessans, sed inferius ipsius extremum, quo ad interiora conueniunt, paulò membranofius at- que carnosius obtinet. Qui musculus quanquã mediam uidetur habere sedem, externis potius cubiti partibus, quàm internis, ascribendus ue- nit. Exstat sub cute in superficie internæ partis manus, medius inter radium & cubitum mu- sculus, qui in latum tendinem desinit, de illi manij parti subnascitur, mediusque interiorum muscularum apparet. Tendo autem eius paulò ante carpi nodum manifestè emipit: quare hinc probè ipsius dissectionem inciperis: nem- pe scalpello obtusiori tendinis caput in subli- me eleuans, incidens ipsum sursum uersus ad cubiti iuncturam, ex qua originem duxit. Vbi autem transuersum ipsum incidieris, partem in- ferioiorem attolles, diuulses ipsam non modò à subiectis particulis, sed à cute etiam cui adhæ- rescit. Sic enim cognosces, quod ex tali musculo is tendo ortus sit, quodque internæ omnium di- gitorum parti tendatur. Post hunc tendinem di- latatum, uas & nervi inibi distributi se osten- dunt: quibus etiam membrans incumbunt, quæ cum ipsi tollendæ sunt. Nam sub istis tendines qui digitos flectunt, à binis prodeuntibus capiti- bus, illic maxime sit, ubi & ligamenti, & tendi- nis super illud dilatat caput, positum est. Ho- rum autem subiectorum capitum, alterum qua- tuor producit tendines, digitis omnibus, pro- terquam

Musculus
motu
maxime
ex
132

Musculus
motu
maxime
ex
133

Musculus
motu
maxime
ex
134

Musculus
motu
maxime
ex
135

Musculus
motu
maxime
ex
136

terquam magno, iuxta secundi internodij principium infertor, à quibus secundus eorum articulus flectitur. Alterum quod huic subiacet tendinum caput in quinque discretum particulas, in extremam usque digitorum aciem pertingens, inibi inseritur. Tendines autem uniuersos ualens aliquod munimentum, singulos priuatim ambit, multo sanè ipso rectine diuarius, atque membranæ crassiori simile. Porro si post caput in ramos scissum, tendines singulos unà cum prædicto inuolacro attrahas, flecti per eos, qui subiecti digitorum ossibus insident, primum ipsorum tertiumque articulum cernes: hunc quidem, tanquam inibi tendine inserto: illum autem, per circumiacens ligamentum, quod ossibus adhærescit. At pollicis nihil neque ex subtilioribus illis tendinibus, neque ex communi eorum capite accedit, sed aliunde quidam tendo in tertium ipsius articulum exporrigitur, illumque similiter illis mouet. Nam internodium secundum, per tunicam quæ ipsum tendinem ambit, mouetur. Cæterum aliorum duorum musculorum, qui carpum flectunt, confectionem, paulò supra articuli commissuram exordieris. Quippe secernens ipsos à circumiacentibus partibus, adusque superiores inferiusque extremum, tendines quidem inferioribus articuli partibus insinuari uidebis: capita autem ipsorum, cubiti atque brachij nodum adire. Vnus itaque tendinum in carpo iuxta parui digiti rectitudinem, ossi cartilagineo columnariue inhaerescit. Alter tendo statim ab articuli iunctura profundius mergitur, ut in carpi os aliquod putes cum inferi, quum inferatur tamen iuxta principium illius ossis, quod in metacarpio consistens, digito præponitur indici. Hi ergo quinque musculi totam interiorem cubiti occupant regionem, quibus ademptis, apparebunt radij motores. At externorum dissectio sic administranda est. Sub cute, uas nerygij superficiali extant: quibus cum membranis exemptis, quatuor ligamina transversa clarescunt: unum cubiti radijque extremum constringens, alterum in cubito duntaxat priori subiacet: reliqua duo soli radio inhaerent. Sed primum quidem ipsum, recta linea incidendum est. Dein diuisas particulas, ad suam quantæ radicem reuoltere, aut penitus præcidere, oportet. Post hoc autem, primum caput quatuor tendinum digitos, præter magnum, tendentium, in medio aliorum situm, hamo in altum attollere: mox id quod exiguos duos digitos ab alijs adducit in latera, in binos scissum tendines. Postea reliquum tertium, simile morum grandioribus tribus digitis suppediata, similiter attollere exedit. Primum itaque tendinum caput, sicuti & secundum, ex uno musculo prodit. Tertium bifariam tibi incidere licet. Nam quod duos digitos, indicem & medij mouet, caput ex uno procedere musculo deprehendes: quod uero magnū, ex altero. Atque hac ratione quatuor musculi prædictis ligamentis subferunt. His succedunt quæ carpum, iuxta paruum digitū, extendit tendine unico, metacarpij ossi, quod exiguo digito præponitur, inserto. Continet ipsum haud ualens ligamentum, quod ex solo cubiti tubercu-

lo oritur. Prope magnum autem digitum, alterum huc quoque ualidum ligamentum caput duorum constringit tendinum, quorum unus in os, quod ante magnum digitum in carpo collocatum est, conijci: alter in ipsum magnum digitū, statim à primi articuli iunctura, ingreditur. Quo & duos tendines & duobus musculis inuicem coeuntes genitos dicere, laud inueniens fuerit. Reliquus exteriorum cubiti musculorum, qui extendens carpum bifido tendine metacarpio se ante indicem mediumque digitum inserit, caput tendinis in radio fixum, iuxta carpi iuncturam exigit. Porro in exteriori brachij nodo, tria musculorum capita inuenies: eius sanè qui digitos quatuor extendit, elasticum, qui iuxta paruum digitum, carpum reflectit, humillimum: mediū uero inter illa, quod digitos duos minores abducit à cæteris. Sub his interiori in uno, duorum digitorum musculi recondunt, qui ex toto osse cubiti inuicem coeuntes originem ducunt: qui quidem duobus digitis seruit maxima ex parte: qui uero magni digiti est, prope superius extremum. Incumbit huic alius, carpi colicærens musculo, qui maioris digiti caput extollit. Idem uero totæ profunditate regionis, quæ inter utrumque os radij & cubiti habet, occupat. Cuius musculi dissectionem, quemadmodum & aliorum omnium, à carpo auspicari cõuenit. Sub eo autem, ubi ipsum à ligamine atque à colliærente musculo auulseris, occurret quidam alius obliquus, exilis, de cubito in radium perueniens. Prius tamen adoriere musculum prædicto adnatum, qui cubitum priori ipsius extremo attingit leniter. Dein elatior hoc musculum incidere oportet, qui in metacarpium ante indicem & medium digitum bipartito tendine inseritur. Huius musculi finis superior, iuxta sublimem exterioris brachij nodi regionem, quodatenus iam quoque descendit ad superpositam nodo brachij partem. Qui uero & huic & radio superne expansus, totam manum reddit supinam, ac simul cum alterius exortu suas etiā mittit propaggines, is musculus secundum extremitatē sui in tenues membranas degenerans, sceleret in musculos brachij insinuans, inuisionis cõfundit opus. Eius tamen caput ossi brachij alligari comperies, ubi huius musculi difficeris. Exteriores itaque cubiti musculi, talia quædam habent capita. Ex interioribus autem, qui quidem caput iuxta paruum infleclit digitū, à nodo brachij interno incipit, attingitque cubitū: qui uero iuxta magnū, ex eodem nodo ducit originem. Cæterum inter utrumque caput, exortus habetur musculi in manus cutem elabentis. Atque huc rursus subsunt capita duorum musculorum, qui digitos mouēt, & mediam cubiti, radijque totam regionem implent. Verum omnibus quos recensui exemptis, radij peculiare musculi apparēt, per quos supina pronay tota manus efficitur. Quatuor autē sunt uniuersi: duo ad primas radij partes, duo ad priora carpi extrema pertinent. Ex his qui ad carpum spectant, alterum ipsorum sciro esse obliquū, radium ac cubitum intercedentē: per ipsumque nempe agentem extrorsum, fieri supinam manum. Alter uero qui radium intrò cir-

Tendinum
ambitus.

Pollicis
motus
modo.

Cubiti
exteriorum
musculorum
dissectio.

Musculorum
in exteriori
brachij
nodo
tria
capita.

Interioribus
cubiti
musculorum
tria
capita.

Radij
musculi
peculiari
sunt
quatuor.

cūducit, eam effici pronā. Reliqui duo musculi radium in superiori parte mouentes, & ipsi quodammodo inuicem opponuntur, obliquum finem habentes: unus ab interna parte situs, ex brachij nodo prodit, capitis flexentis carpum ad magnum digitum musculi adhæret: alter exterius quidem est, sed hoc minor, atq; ideo transuersum magis fibrarū sitū obinet. Constat aut omnib. interior et tenio pronā manū cōstitui, supinam exteriore. Ad dictū illū iam sunt omnes musculi, qui cubiti radiūq; in orbē ambiunt. Post quos tu summę manus exiguos aggredere. Etenim reperies exiles quosdā musculos, tendinibus tertium articulum digitorū mouentibus adnatos. Quatuor autem ut tendines ipsi, ita & digitorū musculi, hi sunt: parui nēpe, annularis, medij, & indicis. At magni, alij mouēt duo musculi: unus enim illū longissimē ab omnibus digitis abducit, ex primo carpi ossē profectus: alius, indicē uersus agit. Alius præterea musculus paruū digitū a cæteris plurimū remouet, ex primo ossiū carpi, quod secundū illū cōstitit, pro cedit. Hi igit septē musculi meritis anatomicos non lauerūt. * Aliorū aut singuli, ipsi quatuor tendinibus metacarpi in uno sistē quā adhærescant, haud mirū si non ita faciliē conspiciant. Ex quibus binā ad priorē cuiusq; digiti articulū intrinsecus perueniunt, ac ipsius latera iam quoq; attingunt: reliqui omnes ex carpi ac metacarpi ligamento iuxta ossiū ferē com missurū pōcesserunt. At pollicis musculi elatiorem huius processum exigunt, & ipsi ex ligamento nati, non quidem ossium distorum, sed quod musculorum maximorum binā capita, unde mouentur digiti, constringit. Porro ligamen hoc ex carpi ossibus utrinq; prodit, nec cubiti extremum attingens, nec inthum ossium que in metacarpiō habetur. His ablati musculi, neq; in extrema manu, neque in cubito superē ullus alius secundus. Post quos ligamēta scalpello acuto omnia sunt abscindenda. Quorum ligamentorum triplex in corpore est usus: ossa quippe cōnectūt: munimento sunt corporibus subditis: ac deniq; indumenta his ipsa tendinibus extrinsecus circumdantur. Apparebit autem caput musculi qui radio incumbit, quum anteriorem musculum brachij detexeris. Cæterum sectio ipsa prope uenam humerā, quæ per totam fertur brachij, declinā administretur, tota quæ inibi adhæret, cute ablata, & uniuersis musculorum membranis. Sectionem uerō quæ in superiori humeri parte faciendā est, administrabis, fibrarum similitudinem dissimilūdinemq; obseruans. Ex quibus etiam totam humerale musculi circumscriptionem, ad unum cacumen peruenientē, cognosces: cuius processus tanquam triangularis, in brachium conijctur. Qui musculi peculiaris est humeri articulo. Verum solus ex mouenti bus ipsum, necessariū nunc te auert, ut anterior res musculi, brachij caput biceps appareat. Brachij interior musculus, duo habet suspensā capita: unum ad scapularum ceruicis supercilium, alzerum ad processum anchorę similem. Ligamen ueriusq; capitis abundē trahens, est paulo minus toto rotundū. Quapropter hæc duo capita ip-

sua, deorsum procurerēt, sequēris: quippe quæ in idē cōfūna, hunc musculū generāt, qui alteri, sed minori musculo, subdito (qui quo enā cubitus flectit) iuxta cubiti articulū insidet, radiūq; ualido tendine adnascit, ac totū flectit articulū. At uerō ut duo musculi anteriores sunt qui cubiti articulū flectunt, sic tres alij connexi inuicē, extendunt hunc ipsum. Vbi igit musculū interius partibus brachij inieciū fustuleris, duo principia musculorū totā manū extendenti cōfide rato: quorū alterū ab humili costā scapulari nō tota, sed ex dimidio ferē ipsius partis superioris prodit: alterū uerō ex posteriori brachij regione, subter caput. Hæc iam procedētia, in brachio cōtūt: deinde per tendinē latū, cubiti tuberculū ingrediunt. Iam uerō si diuisiō utriq; musculi partem attrahas, totam extendi manū ab utroque uidebis, hoc discrimine inclinationis ad latum factō, quod prior in exteriora, secundus intro oblique deflectat. Cæterū sub hoc, alius delitescit torus carnosus musculi, brachij os ambiens, qui secundo adunat aded, ut particula ipsius esse planē putet. Quem si tendas musculū, interim rectā & indeclinabilis circa cubiti articulū intensio fieri uidebit: nonnunquam intro paululū emergere. Dicti itaq; multi iam sunt, omnes totius manus musculi.

GAL. DE ANAT. ADMIN. LIB. II.



Vōd ueteres nihil scripserint de cōsectionibus administrandis, uertendū illas uisio non est: quandoquidē erat eis tam frequē, tamq; in cōmuni usu ipsa anatome, ut domi apud parentes enā ab ipsa pueritiā, in illa omnes olim exercerent. Postea uerō tam præclaro illo exercitio intermissio, opus ceteri nobis fuit commemorare, quæ anatomicā disciplinā, chirurgicę medendi rationi maximē necessariā, integrā cōseruarent. Quæ quidem quoddā ab alijs hæcenus nō usque adeo accuratē tradita sit, ob id nimirū ad cōscribendos hosce cōmentarios me accinxit. Ignorētia quippe eorū quæ per exquisitā anatomē inueniunt, in reb. quidē securis timidos, in periculosissimis aut, maximē audaces quorūda reddat. Tonus autem anatomicos uniuersam partē, circa musculos, nervos, arterias, & uenas extremarum partū uertatur. Atq; ob id ipsum manuum & crurium anatomicas administratiōnes alijs præposui omnibus, quod ad ea, quæ tū usui hominum necessarii, tum arti maximē cōducant, ire primū iuuenes oportere precipiū fuit: deinde uerō, quoddā eundē ita disciplinæ ordinem commentarij de usu particularum obseruare. Quum igit superiori libro, quo modo musculo rū qui in manu sunt, sectio administrari debeat, tradiderim, hic simili modo & de cruribus uerba facere est animus. Ergo priusquā exactē cognoscas musculos, discicare nervos aut uas, neq; ipse poteris, nec aliū itē docere. Quare & hic cū auertēda est: attendendūq; diligēt, ne in primo plantę exortu iuxta calcis initū undā cum cute tendit subiectū eo loco auellās: cuius

Musculorum
tam manū re
tenditū prae
cipua dno.

Anatomen uo
ribus fuisse
laryngianam.

Anatome part
principia ois
que uerba

explicati

Manus exte
rie musculi.

Digitorum mus
culi.

Ligamentorum
triplex in corpo
re est usus.

Humerale mus
culus.

explicati interuentu, cuius depilis rigidis mem-
bro subreſcit eſt. Hac igitur cute intacta, oportet
reliquam omnem a dimitte, ac ipſos femoris mu-
ſculos omniū primos incidere: mox qualeſcūq;
uelis. Ac facile quidem ſecundum diſcrentiā fi-
brarū muſculi unuſquiſq; cognoscitur. Omniū
itaq; primus tendo, paulatim in carnem uerſus,
ſub cute ſumma apparebit, qui tibi infra genu
innatſatur. Superius aut huius muſculi ininū, car-
noſo exortu ex media maxime illius oſis ſpina
procedit. Cæterum poſt neruoſum huius muſculi
li exiſtat, etiam alius quidam ex amuſi tendo,
ab oſſe pubis deſcendens, figuramq; recte reſpex-
ſentans, in anteriore parte oſis tibiſq; inferatur.
Atq; hi duo numero muſculi, in utroq; crure u-
nus, ſeſe mutuo iuxta primos exortus cōtingūt.
Quibus ſanē uel tuis manibus tractus uerſus mu-
ſculorū exortus, in animali exnēctō, nūa ipſa e-
laſia ſimul & interior attollitur. Porro tertia à
duabus prædictis in ſerſio lati tendinis eſt, nomi-
natq; in anteriori tibiſq; parte cōngua. Cuius exor-
tus & caput inferiori exteriore coxę oſis parti
debet. Muſculus itaq; hac ab externa coxę parte
deſcendens, obliquē in internā tibiſq; inferatur.
Neceſſum aut eſt nūiam hac tractā anſa, retroſum,
ſurſumq; ferri, atq; * omnino in orbem con-
uolui. Quare nō ſimplex, ſed compoſitus ſis mo-
tus erit. Sciendum uerō eſt, reſtos muſculos re-
ctum motū miniſtrare perpetuo: ſicut obliquos
obliquū. Hi ergo tres muſculi, tibiſq; tendinibus
innatſunt, quoſq; auſerte oportebit, li nūā prius
q̄ femur, diſſecare inſtituas. Eſt & alius quartus
muſculus, qui ab extrema oſis coxę parte proce-
dens, in externā nūa regione inferitur: ſolusq;
quantū ad loci rationē attinet, alijs tribus oppo-
natur. Cuius quidē eſt munus, ſiliam torā ſimpli-
ci motu in externam partem abducere. Iam poſt
quatuor dictos muſculos, quintus alius exiſtit,
ad inferius femoris caput, & muſculi nūa prin-
cipiū, à parte interna deſcendens, ſimiliter à co-
xę oſſe ortus. Atq; li nunc exemeris omnes fe-
moris muſculos iam expoſitos, adhuc magni,
tum in priore, tū in poſtiori, internāq; uniuer-
ſa femoris parte reſtabunt: ex quibus anterior es
prius diſſecabis. Omnes aut extendunt articuli
genu: nō tamen uel ſtrum eundē habent, uel enī
ſimilia capita: quidē in totū quatuor exiſtūt.
Elaſtiſimū quidem ex ſpina illū oſis procedit,
ē directo muſculi omniū primi dicti, idq; parte
ipſius inferiori. Huic uerō ſuccedit aliud multo
maius priore & humilius, quod in extrema po-
ſtus femoris regione, propter natis proceſſum,
eminet: à quo maximus anteriorū femoris mu-
ſculorū exortus eſt. Hi aut reſectis, alia muſcu-
lorum capita duo ſubſecta, manifeſtō in conſpe-
ctum ueniunt: atq; eorū quidem alterum, primā
grandioris in femore proceſſus (Græci trochan-
teris uocant) originem attingit, & præterea ca-
pitis femoris ceruicem: reliquum uerō huius,
infra ex anteriori oſis femoris ſede emergit. At
quod omnium muſculorū qui gennā articulum
mouent, ualidiſſimā ſiſtunt obire creduntur
hi, qui extendunt, cuius notum eſſe arbitror.
Nam poplitis flexura, inter leues infirmasq; e-
ius actiones reſertur. Quamobrem natura nec

magnis, nec multis muſculis ipſam cōmiſit, ſed
uni ſoli ex cōmemoratis, qui in caput interioris
furæ muſculi inferitur: quip̄ non magis nūā ſe-
ctere quā abducere ad internā regionem uide-
tur. Sed hunc cernere nō eſt, priuſq; à tibia mu-
ſculos ad emerſu ſurſu conſtituentes. Femoris mu-
ſculus præter magnū reſectis, liceat nūā & coxę
articulū mouentes, necnon orca nūā uniuerſos
deinceps incidere. Maximus igitur ille femoris
muſculus, rectis & poſterioribus fibris ſuis coxę
articulū ſectat. Iſ aut quæ in lateribus ad pubis
os peruēnit, obliquū ad interiora tonus femo-
ris motū adminiſtrari deprehendes. Hunc itaq;
à toto pectinis oſſe reſectans, abſtineto ab eo qui
in illius foramē inferitur: necnon ab alio humili
muſculo, quē in hiſce animalibus ſemper luidū
uidimus, orientē ex inferioribus pectinis oſſis
partibus, à quo obliquus intrō motus coxę præ-
ſtat. Præter hunc eſt & alius muſculus ex ſuperio-
ribus lumborū, illuſq; oſis partibus ortus, at-
que deſcendēs. Quorū ca ſolus lumborū muſcu-
lus cōſpicitur triplex. Quippe interna ſui parte,
per ualidū tendit, in illam partē deſcendit, ubi
pectinis os coxę cōmiſum deſinit. Externa aut,
altero tendine breuiore & ten uore, illū oſi inſi-
nuatur. Alia deniq; ipſius pars, quæ media inter
neruea filamenta deſcendit, tendit quendam
producit ex quo trochanter adhaerentē: qui ten-
do manifeſtē intrō ſectat femur, erigitq; Profe-
ctus aut ad exteriores muſculos, nūiuerſos cōpe-
ris, qui femoris caput ambientes, in magnū tro-
chantera immittuntur. Quorū primus ſub cute
ſumma poſitus eſt, ex tota illi oſis ſpina rectā
procedens: ac partim quidē carnoſus, partim in
membranā quandam degenerans. Incumbit hic
muſculus iſis oſis illi partibus, quæ magis emi-
nent, & obliquē retroſum ſpectant: cæterum ſpi-
nialium muſculorū extremo cōnexus eſt. Vbi ue-
rō hoc eius membraneum deſinit, alius exortus
carnoſus occurrit, ē regione primi, qui ex illi
oſſe emergere dictus eſt. Auſerēdus igit ſis obſu-
ſior ſcapello eſt, ſed ita, ut deorſum uerſus, fi-
bras ipſas ſequaris: ſimuliterq; circumpoſite car-
nes circunciden dæ: ſic enim femoris caput dete-
ges, & bipartitū muſculi ſinē inuenies. Muſculus
igitur latus, retroſum abducendo, femur extēdit,
per inſertionem quæ ē directo ſis capitis, tum ex
coccygis oſſe, tum ex coxarū oſſe enaſcens, idq;
femur ipſum paulū in exteriora declinans. Ve-
rūm altero eius extremo dilatato, in latus magis
femur ſurſum uergit. Ambobus aut ſimul tentis,
per ſe ſuſum à totius membri extensionem con-
ſpicias. Vbi hunc ſuſtinent muſculum, alius ua-
lens & omnino carnoſus occurrit, qui ex tota
proprio modo illius oſis ſede progrediens, ui-
cinis enā oſibus ſimul incumbit. Cuius tendo
uerni magni trochanteris inferitur, adeoq; ulte-
rius adhuc ad anteriora procedit. Caut aut tū
hunc muſculū incidis, ne cū eo confundas quen-
dam alium exigū, qui ab externis inferius la-
ti oſis ſinibus ortus, femur retroſum erigit, cū
leui ad interiora deſlexu. Porro alius inibi mu-
ſculus, colore luidio, deſectis, grādi quoq; mu-
ſculo ſubiaceat, ex interiorib; ſimul & lateraliſibus
lati oſis partibus ortus, Atq; hi ſanē tres muſcu-

Femoris mu-
tus obliquus ad
anteriora, à qui
bus muſculus
ſtat.

Lumborum mu-
ſculus ſolus com-
pſitus triplex.

Muſculus vniſ-
quiſq; cognos-
citur ſecundū ſu-
ſtrentem fibrā
ram.

Muſculus rectus
manifeſtē etiam
reſtō motus: ob-
liquus autē obli-
quus.

Muſculi rectus
deorſum extendit
genu.

Muſculorū qui
genu articulum
mouēt, ualidiſ-
ſimam ſiſtunt
obire qui
reſtōtatur.

Poplitis flexura
ab uero muſcu-
lo diſtincta.

Musculi tres in
magnâ trachina
terra inserti.

li in magnâ trochantera ingreditur. Ab his 2
lij duo cõditi planè iuxta os femoris caput de-
torquẽt, per validos tendines in grandioris tro-
chanteris finem inserti: quorũ uterq; ex offe pu-
bis procedit. Numerosus aut musculorum exor-
tus à foramine quod in pectinis offe est, ad uici-
na loca exporrigitur. Porro exteriorẽ musculũ
facile ab ossibus ipsis dissoluẽs. At interiorem, si
totũ uoles contemplari exquisitè, ossiũ pectinis
commissuram, quæ cartilaginea est, ualenti prius
scalpello dirimes. Nam ossibus à se inuicẽ disso-
luis, musculus innoteſcet. Ceterũ ambo hi
musculi femoris caput introrsus circumagunt:
unus per totius articuli anteriore, alter per po-
steriora. At talis quidem est musculorũ coxę arti-
culũ mouentiũ cõfectio. Iam uerò ademptis ijs,
qui ex femore in tibiã descendũt, musculis, duo
musculorũ capita in tibia conspicuntur manife-
stissimè, quæ ex posteriori femoris regione, illa
potissimâ, qua nodorum radix habetur, ducunt
originẽ. Dein aut popitem prætergressa, eo in lo-
co qui sura dicitur, miscuntur inuicẽ, unum gi-
gentes musculũ: in quẽ etiam haud exigua ca-
pitis exterioris portio propagatur, quæ muscu-
lus per se efficitur, in tendinem latum paulatim
cessans, qui subterrefert pedi. Nec minus ex u-
troq; musculi nuper in sura geniti capite produ-
citur tendo, qui memorato cõtiguus incumbit,
posterioriq; calcis extremo inserti, quod ad scilicet
psum est trahere idoneus. His recitatis musculis
alij etiam coherant, qui ex lateribus tibiæ internis
exorti, omnes ad pedem infimũ porriguntur. At
ubi tendines primũ generant, ibi ligamentũ ip-
sis extrinsecus est insertũ, ex tibia ad calcem per-
tinent: quo recta linea diuiso, si tendines deinde
sequaris, digitis ipsos insertari comperies, a m-
bosq; mouere primũ, secundum, atq; tertium arti-
culum, si magnũ excipias digitũ. Nam ad secun-
dum ac tertium, tendo qui ipsum mouet, porrigi-
tur. Tertius uerò alius tendo tibiæ fini adhære-
scit: eiq; innixus, ligamento iterũ peculiari con-
stringitur: qui & ipse pedẽ uniuersum, sicuti qui
calcẽ ingreditur, retrorsum flectit. Verũ ip-
sius extremũ in primum tarsũ os interius conijci-
tur. His singulatum recessis, diuertendũ est ad ex-
teriores tibiæ musculos, qui quantũ sanè ad su-
periores exortus attinet, tres existunt: fin autem
tendines, motuumq; differentia species, plures.
Has itaq; membranas adimens, hic etiã sub cute
ligamentum sicut obliquũ conspicias, robustius
longè, eo quod in manibus cernit. Oportet aut
& hoc incidere iuxta longitudinẽ membri: mox
partes ad originẽ suam erigere, capitibusq; ten-
dinum subiectorũ detectis, hinc totorũ muscu-
lorum cõfectionẽ auspicari. Ac primũ sanè con-
ruberis musculum usq; ad superius caput porre-
ctum: cuius extremum ligamentũ cõtinetur, &
tarsũ ante digitũ magnum innascitur, paulũ in
interiorẽ atq; inferiorẽ pedis regionẽ excedens.
Secundum dein musculũ alium spectabis, huic
ad eũ uicinũ, ut pars ipsius esse putetur. Verũ
tendo eius in caput primi maioris digiti interno
diũ in sinuatur. Huic aut coheret alius musculus
gracilis, medio inter tibiã fibulamq; loco situs,
qui totius pollicis latus ingreditur. Porro post

Tibia retrorsum
et musculi tres.

musculos quos nominauit, tendinũ caput, liga-
mento subiectũ, contemplaror. A quo deorsum
uersus incipies, tendines quatuor, quaternos di-
gitos extendentes, inuenies. Sursum uerò, mus-
culũ illum uidebis fibulæ ad usq; superius caput
adnatum: cuius extremũ, tarsum prope digitos
maiores ingredit. Hi igitur musculi in prioribus
magis totius tibiæ partibus constitunt: alij tres
ab uno capite in exterioribus. Habent etiã & hi
præpositũ ligamentum ex fibula ad calcẽ ipsam
pertinens: quo soluto, tres neruosis musculorũ
spectabis exilitates, quæ cognatas inuicẽ propa-
gines obtinent. Quarum prima, quæ ex superius
fibulæ partibus ad infimũ pedem pertingit, ex
tenuibus ligamentis carni connexis efficitur. Se-
cunda, ubi eius quæ prius dicta est, caput definit:
& ipsa non multũ post principium in tendinẽ ro-
tundũ degenerat, gracilis tota existẽs. Tertia ue-
rò quæ torum pedem efficit simũ, ex reliqua fibu-
læ parte procedit. Hæc itaq; pedẽ eleuat, simul &
extrorsum declinat. At prior illa, quæ & in ma-
gnũ descendit digitũ, introrsum ducit. Verũ
utraq; simul tenet, & declinabilẽ pedis eleuat-
ionem moliant. Hoc modo etiã ex musculis qui-
pedẽ retrorsum agunt, uterq; in latum sensim de-
clinat: ambo aut simul directè pedem ducunt re-
trorsum. Alius uerò incognitus musculus in arti-
culo poplitis delitescit, quẽ inuenies ablati po-
sterioribus musculis ad surã porrectis: cuius ca-
put si tendas, tibiã flectitur. In pede quatuor mu-
sculorũ sunt genera: tria quidẽ infra pedem, unũ
supra, in aduersa tarsi parte, quod duos cõplecti-
tur musculos, qui obliquos motus quatuor digi-
tis subministrat. Qui sub pede habentur, septem
& hi, cum septenis qui in manu uisuntur, conue-
niunt, singulos digitos in obliquum mouentes.
Quorũ duo enati à tarsi ossibus, magnũ & parũ
pedis digitos plurimum ab alijs abducunt. Alij
quatuor in interioribus partibus parui sunt mu-
sculi, qui ex tendinib; digitos flectentibus, prius-
quã exactè scindantur, procedũt: quorũ munus
est, medium uniuscuiusq; digiti articulum flecte-
re. Septimus musculus in est, qui pollicem in duci
adducit. Duo alij musculi subter pedem ossibus
adhærescunt, atq; cuiusq; digiti primo præpositũ
articulo, leuiter ipsos flectunt, simul quidẽ pari
actione functi, priuatim aut uterq; in latum sen-
sim declinans. Cõfectis his musculis, nullus præ-
terea ex his restat, qui in toto crure cõsistunt. Cõ-
siderare aut oportet omnium articulorũ, quos de-
texeris, ligamẽta. Etenim coxarũ articulus unũ
in orbem ambiens possidet ligamentũ, quale ar-
ticuli omnes sortiuntur. Aliud aut in imo recon-
ditum, femoris caput coxę sinu connectit, uelu-
ti neruus cartilaginis existens. At genu articu-
lus unum ligamentũ habet in imo, ac præter id,
alia duo in lateribus: unũ uidelicet internũ, atq;
externũ alterũ. Quin etiã ab his alia cartilago-
sa ligamenta in ipso genu cernuntur, utriusq; m-
bis sinui orbiculatim circumdant. Ad hæc sunt liga-
menta non nulla in pedibus, quæ nihil iuuant of-
fisi articulos, sed in aliqua ossis particula proue-
niẽtia, tendinũ capita firmat & roborat. Quæ
uero ab offe in os perueniũt, ut quod à tibiẽ extre-
mo in calcẽ definit, aut quod fibulæ tibiẽ uertit,
et fa-

Pedis musculorũ
genera quatuor.

Coxarũ articu-
lus omniũ ligamẽ-
tum duplex.

Genu articulus
tres ligamẽta
sortitur.

ea sanè unà tendines subiectos cōstringunt, atq[ue] ossa ipsa committunt. Sunt quatuor ligamenta alia, quæ ueluti nerui quidam cartilaginei, talium ipsium ambiens ossibus colligant, eandem proportionem habentia cum ijs, quæ coxæ & genu articulum in imo coniungunt. Ita siquidem & in pede talo quatuor ossibus confirmato, ligamentum cartilagineum creatum est, extrinsecus ad fibulæ os, intus ad ribiam, inferius ad calcem: sicuti in priori etiam parte ad os scapulo-

Vngues anfractuosos.

Vngues igit ossis, neruo, cuti, & carni adnascuntur: haudquaquam ex his ipsis eorum substantia constatur, quod nonnulli putarunt. Nam singulæ partes similes, ex materia quæ animanti subiecta est, tales à natura finguntur, quales sunt. Neq[ue] enim ex brachio cubitus, perinde ut neruus ex cerebro, oritur. Quippe non parum differunt, coherere cuiuspiam, & ex illo oriri. Nam quod ex aliquo nascitur, seu propago quædam substantiæ illius à quo nascitur, similis speciei esse oportet cū origine sua. Sic igitur nerui ex substantia cerebri propagantur. Vngues autem non extant extremi internodij digitorum (oboles, sed diuersa essentia species est). Coniungunt autem natura illos extremis terminis digitorum, ualido ligamento: idij ipsorum radicis, extrinsecus quidem cutim apponens, intrinsecus autē carnem subdens. Cæterum in radices ipsorum, non modo neruus, sed arteria etiam & uena porrigitur, unde sensum, uitam, & alimentū, sicuti aliæ partes, accipiunt: quarum nulla ex trium horum uia forum temperie aut coitu constata est.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus Liber III.

Artuum natura ex quibus constat.



Ora artuum natura cōstat ossibus, ligamentis, musculis, arteriis, uenis, & neruis, communis omnium uelamento, cui nōmē est cuti. Quorum cognitio exacta desideratur, ad commodè curandos affectus. Quippe ob eorum ignorationem, contingit inter medendum medicos quamurpissimè hallucinari: quemadmodum illis methodicis accidit, qui insensibilibus cuiusdam digitis frustra adhibebant omnē medendi rationē, tanquā in ipsis esset affectus: quem ægrum postea ipse restitui medicamentis quæ digitis admovebantur, ad dorsi principium (nimirum ex casu collisum) iuxta radicem nerui qui in digitos prius os sensu porrigebatur, trāslatis. Cæterum aduertendum est, non ex hōidem neruis sensum & motum singulis digitis dispensari. Interdum siquidem os insensū clurigu, sensus, interdum motus, sicuti aliquando utraq[ue] affectus petit. Quamobrem opere precium fuerit, quemadmodum de musculis fecimus, sic etiam in præsentiarum nos, quo modo uasorum, neruorumq[ue] cōsecutionē administrare cōueniat, exponere, ab ipsa nimirū tota manu auspicatos, quæ ab humeri articulo incipit, nō secus quā ab ar-

ticulo carpi ipsa manus extrema. In primis igitur cutim ipsam per se solā acutiore scalpello à subdita membrana, quæ uenæ cutem nutriendas permeant, separare oportet, ubi prius eius pilos abradere: promptius siquidem depilem, quā pilosam, incidere. Derracta cute, uenas, neruosq[ue] membrana intextos expendas: nerui tamen in macilentis quā in obesius euentius apparent: sicuti & uenæ in ijs qui sanguine abundant. Semper autem radicem neruorum, atq[ue] lationis modum, meminisse conaror, ut si quando cogaris incidere, iuxta longitudinē ipsius lationis sectionem ducas, à radicibus quālongius in me abscēdes: hoc enim pacto, uel unū, uel nullū neruum interfeceris. Si autē transversum scalpello admouens, multos simul diuides. Exteriorum igitur neruorum qui in brachio sub cute summa nescantur, hi quidem à neruo, qui musculum, à ltera o, quā imitatur, Deltoidei dictum, iuxta caput brachij intercurrit, ueluti à radice quadam oriuntur, atq[ue] ex imo procedentes, pilorumq[ue] modo præteruenes, uario plexu, per summa brachij, paulo ultra cubitum disseminantur. Hi autem, qui illinc usq[ue] ad extremā manum procedunt, à maximo neruorum omnium pertinentū ad brachū, qui & posteriores musculos intertextur, & ad exteriorē membri regionem permeat, cubitiq[ue] articulo inferitur, propagantur. At uerō anterior cutis, neruulos accipit, superioris quidē parte, ex primo ortu secundi nerui, inter eos qui de spinali medulla in brachium porriguntur: inferiorē uerō, ante cubiti articulū ex alio quopiā spinali. Sed internam, posterioremq[ue] brachij cutē uniuersam, a dursq[ue] scapularū, quæ ibi sunt extrema, alius quidam neruus interterrat, ex secundo intercostali intervallo per axillam, sicuti & alij omnes, in brachium ipsū porrectus. Ac oportet cum qui clare ipsos conueniunt uelit, musculum parū anatomicis prætermisum, prius incidere. * Iam uerō glandibus etia, membranis, uasisq[ue] ab axilla exemptis, amplè magnitudinis per profundum exporriguntur nerui. Insūt porro sectionis facies propter uenā humeralem, cumq[ue] musculū qui inter brachij lacertos anteriores, duo quidē habet capita, nerues uerō propaginē in radij principij immitit. Vbi igit duo liuus musculi capita in unū coitura sunt, primū neruū brachij os cōscende re inuenies: eodemq[ue] in loco posterior axillæ musculus magnus in brachij lato tendine inseris: quō dein protendit etiam tendo maximi musculi torū, qui mittunt à pectore: post huncq[ue] rursus tendo deltoidei musculi, qui superam humeri partem cōplebitur. Porro quum in unū coaluerint illius iam dicti musculi capita, scinde separaq[ue] directā lineā utriusq[ue] musculi partē: nam iuxta eam neruus quoq[ue] uenis deorūm mittunt. Dū hoc agis, alius quoq[ue] neruus multo hoc inferior, in cōspectū occurrit, ascensum molitius in brachū. In horū neruorum processū, interim ab altero, interim ab utroq[ue], in caput minoris ex brachij anterioribus musculi, propagines transmittunt. Deinde secundus neruus primo tantū de se ramum impartit, quantum illic primi reliquū fuisse apparet. Vnus autē ex duobus neruus

Manus extrema.

Solus quo modo administranda.

Neruum brachij exteriorē erigens.

Sensum ex uenâ non ab ipso dem neruo distorsens fingunt in digitis.

Manus tota.

conflatus, ad cubiti, per mediū ipsius articuli cubiti flexū, porrigitur. Secundus uerus humiliorum firum habet, infidetur ibidem brachij nodo, ubi planissimus est. Præter duos illos prædictos, tertius quidam maximusq; neruus insequitur, ferè prope secundum, profundius ramen, brachium ipsum ingrediens, unū cum grandibus uasis, arteria nempe, ac uena, quæ per axillam ad brachium etiam perueniunt. Qui neruus cū ipsis uasis in magnos brachij msculos propagatur, à quibus extenditur articulus cubiti, atq; magnos sui ramos utrisq; ipsis transmittit, obliquus in externam partem emergens. Vbi uero effertur paulo supra articulum cubiti, ibi pars quædam ipsius ad cutem elabatur, ut prius est dictum. Reliquum per cubiti msculos diffeminatur. * Detectus porro multis iam brachij partibus, reliquos duos neruos prope internā ipsius regionē, in qua etiam prædicti tres inferunt, conspici paulo inferiores q̃ situs sit tertius neruus: quorum alter summa sub cute omnium primus apparet. Idem neruus in brachio ante cubiti cōmissurā in ramos propagari incipit, ferturq; per totum ipsius flexum, scissa iam numerosiore ramorum serie. Insuper quintus alius neruus restat, ex ijs qui de spinali medulla brachium addeunt. Hic per internā ipsius regionem aliorum modo fertur, sed nulli brachij particulæ aliquam sui portionem communicat. Iam uero ad cubiti cōfectionē accedens, secreta cute à membrana substantia, neruorum quidem primum priuipium uidebis eius esse, qui in narratione eorum qui in brachio sunt, quartus est dictus neruus. Quod principium internam cubiti regionem ferè totā occupans, inferiori uniuersæ, & exteriorum nō paucis inferitur partibus. Quæracunq; uero cubiti pars ad radium eminet, utrinq; tum exterius, tum interius, aliorum neruorū processus exigit: interna ab omnium primo dicto, exterior à tertio neruo mutatur. At fines magno rum neruorum, qui per nodum quo brachium cōmittitur cubito, ad cubitum ipsum feruntur, quinq; numero sunt. Sed horum unus in solam ipsius cutem spargitur. Ex alijs quatuor, primus in mediū se articulum cubiti insinuans, ramum sui postea externis cubiti partibus usq; ad carpum ipsum transmittit. Secundus hoc humilior, super interiōrē inferioremq; nodum brachij ingreditur: ac dein alium in eam partem dispergit, qua caput musculi bicorni tendine extendentis carpum, ascendit. Atq; huius quidem nerui propagata, totam summæ manus exterioris partem dimidiam amplectitur, sub cute extrema ad summos procurrens digitos: paruos sanè totos, mediū autem dimidiam: reliqua uero soboles, msculo quatuor digitos extendenti, etq; etiam qui duos paruos in obliquum agit, sicuti & illi qui carpum propter paruum extendit digitum, infertur. Qui autem reliqui sunt alij duo nerui, internis omnibus cubiti & digitorum msculis distribuuntur. Quos incidens diligenter, assequeris neruos in ipsos diffeminatos. Inuenies quippe ab utrisq; neruis processus, msculis qui digitos flectunt, & carpum, communicatos. Msculus aut ne unus quidem in exteriore

summæ manus regione, sicuti in interiore, habetur. Cæterum una arteria, dug autem uenæ, propagantur in totam manum. Ex uenis igitur illa quidē quæ in superficie exat, quæq; iuxta interius latus musculi Deltoidei excurrunt, ad extremum ipsius proficiscit, humeraria uocatur: quæ quidem iuxta articulum cubiti, radij msculum oblongum confendit, ibiq; in pares ferè tres ramos scinditur: quorum unus in alium demergitur, alter ad ipsius articuli flexum pertendit, unitus parte alterius uenæ, ex ijs quæ in totam manum excurrunt. Reliquus tertius ramus, paulatim in exteriorem cubiti regionem declinat, ibiq; in ramos diffunditur. At uena per axillam procurrens, quum humerali multo sit maior, simul cum lulis loci arteria, quæ axillam perperat, per totum brachium in ramos finditur. Ac prædicti nerui in singulos msculos æditi, utrumq; uasorum, arterie dico & uenæ, propagationem sibi connarram habent. Quæ quum brachium perperauerint, in totum cum maiori ex anterioribus msculis, parte interna delatæ, arteria quidem penitus ad cubiti msculos tendit: uena autem bifariam scissa, paulo ante articuli commissuram, altera parte in profundum dilabitur, ubi arteriam contingit, unaq; in ramos cum ipsa propagatur perpetuo: altera oblique sub cutem producta cernitur. Huius igitur uenæ soboles prima, deorsum ad cubiti os, obliqua ferè uidetur: at ubi cubiti superauerit, reliquam ipsius partē oberrat. Secunda propagata aliquatenus clarius defertur, mox bipartitū diuiditur. Cuius pars demissior, uersus eam quæ ad os cubiti porrigi dicta est deferit. At elanor, oblique paulatim tendit, longiusq; porrecta, interm ad eam uenā peruenit, quæ cum cubito porrigitur, quæq; ad extrema usq; ipsius pertingit cubiti. Iam uero omnium quos retuli terminorum ora cōiunt, & ex unoquoq; duorum coitu, uas unū confluit, ita ut quot unira cōiunt, præ multitudine & paruitate ne quidē numerare queas. Cæterū quod uas ex humeraria & magna uena cōstitatur, in altiori radij partem ascendit, ac dein per exteriorem ossis radij sedem binis ramis expanditur, ut duo hæc uasā Y litteram representent. Quippe alterū uasorum directè ad magnū extenditur digitum, alterū uersus paruum declinat: in manu autem uterq; ramus uario modo diuicatur. Illius tamen quæ uersus paruum digitum tendit, exigua quædam propago medij digiti medij & annularis regionem ingreditur. Quam uenam nonnulli in sinistra manu fecantes, sinentesq; sanguinē ex ea fluere quousq; ultrō sistatur, lienem ex tali uacuatione iuuari assentunt. Conspiciuntur autem facilius omnes id genus uenæ, in calidiore cōstitutione aëris ambientis, ac præcipue si mēbro ipso tum demisso, tum loto, eas laqueo uasā Y litteram representant. Quū igitur uniuersas uenas, quas in hominibus ante cōcisionem conspicias, in simia dissecta uidere liceat, conspulerim te prius in simia exerceri, ut si humani corporis dissectand quidōq; copiam sis nactus, promptè singulas partes detegas. Porro ubi sanguinem mittere est animus, in ijs sanè qui totam manifestō uenam habent conspicuā, quamlongis-

Musculus axillaris in exteriore manus extremitate reparet haberi.

Humeralis uena.

Axillarem uenam esse longe humerali maiorem.

Vena media cōsideratio.

Vena inter annularem & mediam digitum sita, in sinistra manu scilicet, apud latus bini.

Vena qua ratio ne cōspiciantur facilius.

Cōstitutionem prius uoluculā in simia.

Venas fecerunt, quamlongis esse uenas, quamlongis esse ab arterijs.

Neruum magnorum in cubiti descendens, finit quia que amittit.

gissimè recedendum est ab arteria. In quibus autem id solim quod arteria incumbit, in numero attollitur, reliquum uero totum, conspectū effugit, nunquā uenam ipsam loco inflato secueris, sciens arteriam subditam, quæ lata & ualida est, ubi intrumescit plurimum, simul secum extollere, atque undequaque circumtendere incumbentem uenam. Accidit enim inde, uenā in gibba arterie parte eleuatam, adeo penes regionem qua circumdantur inaniri, ut scalpellus mediocriter iniectus, eam quidē subito penetret, subiectū uero arteriā conuulneret. Quare consilium est recedere ab hac, ad uicinariā aliquam, maximè ex his, quæ ad cubiti os deferunt. Sin autē ex his quoque nulla cernatur, eam adibis quæ in flexu ex uenarum coitu facta, ad radij superiora peruenit. Si hæc occultatur, illam series, quæ ab humeraria ad cubiti flexum porrigitur. Quod si hæc non appareat, eam diuides quæ ab ipsa in flexum deducitur. Si nec ipsa, illam quæ sursum ad radium obliqua expanditur. Si nec illa se ostendit, uenā ab axilla ad cubiti flexum procurantem incidere: quæ accommodatissima est ipsi qui partibus infra clauiculas sitis laborant: sicut & humeraria ipsi qui in superioribus. At commemorata, secundum tertiumque ordinem post ipsas obtinēt. Communis autem utriusq; est, quæ ad radij superiora confendit: quare tertium quoque ordinem in ambabus manibus ei attribuiamus. Atque hæc nunc de superficialibus usque ad digitos totius cubiti uenis: quibus ademptis, uidere licebit radij & profundiores, primò quidem mutuò coeuntes, mox ubi cōgessæ fuerint, iterū in binos ramos dissolui: quorum demissior quidem, per os cubiti: elatior, per radium unā cum arterijs in musculos propagatur: atque utroque tandem in propagationes uarias diffunditur, nonnullæ quarum paucis postea germinibus exteriorum uenarum miscetur. Porro arteria una duntaxat in manum proficiscitur, uicina uenæ quæ ad illam permeat. Vtræque autem thoracem elabitur cum nouo pari neruorum à spinali descendentiū medulla, & brachium illic ingrediuntur, quò tertius peruenit neruus. Inde omnibus brachij musculis processus notandos mittentes, decliues ad flexū articuli, quò brachium iungitur cubito, excurrunt. At uenā in brachij extremo in duas diuisa est soboles, quarum altera usque ad cutem effertur, ut antea declaratum est. Quantum uero ipsius per profundiora cum arteria deducitur, id tertiam humerariæ partem assumens, bifariam scinditur, & cum utraque parte arteriæ, quæ & ipsa bipartitò diuisa est, simul tum porrigitur, tum in uniuersos, usque ad digitorū initia, musculos ramorum serie dispensatur. Itaque elatorem arteriam quæ ad radij usque os decurrit, prope commissuram carpi tangimus, pulsus exploraturi. Sensibilem etiam in macilinis motum arteria quoque ædit, quæ mediam indicis & magni digiti regionē perperat, originem ab hæc ducens. Humilioris uero mortis, huiusmodi facile discernere possumus. Iam uero in extremis cōiunctis manibus nullam reperire est arteriā, quod ne musculum quidem unū. At interna regio, quoniā multis septa est musculis, ideo multas quoque arterias singulis

ipsorum porrectas obtinet. Verūm uniuersas arterias internas carpi, unā cum uenis coniugibus spectabis, lato amputato tendine. Arterijs autē ipsæ & uenis, pro ratione magnitudinis uirtus inest, non item neruis omnibus: sed alicubi exiguus neruus haud exiguum obtinet potentiam, ut qui musculos motores magni digni & indicis, intercurreunt: qui soli si seruentur in naturali habitu, cæteris abolitis, non utiq; mancus homo in totum euaserit. Rursum, si quatuor existant incolumes, musculus autem qui magnum flectit, uel tendit digitum, laborarit, omnia manus officia interibunt. Pariter enim musculorū qui sibi inuicem sunt oppositi, altero resolutio, utriusq; semper actio uisat. At uero iuxta principium femoris, separata prius cute à membrana subdita, quatuor radices neruorum in cutem excurrentium apparent, pares numero principijs grandium neruorum, qui in musculos disperguntur, unde solite processere. Proinde tertia est, quæ ab anterioribus musculis deorsum uersus, in totam cutem ipsi uicinam fertur. Hæc alia interior per inguina longo angustissimo musculo uehitur. Tertia autē iuxta os quod coccyga Greci uocant, minus cōspicua cæteris. Quarta deniq; ad iliac marginem condita, in pectinis foramine delitescit. Cæteris exiles superficialioresque cutis nerui intuitus quam fueris, incidito omnes femoris musculorū, quibus inuicē separatis, grandium neruorū distributiones planè apparent. Sunt igitur tria neruorum initia magnitudine sibi inuicem coequalia, quæ primū exquirat. Quartū uero aliud maximū, bifidum ipsi succedit, quo de posteriori agam. Itaque ex tribus primis ipsi unū in anteriores musculos solos diffunditur: alterum simul cum magnis uasis porrigitur, ipsiusq; uasis ramos tely araneorum modo præstenuos, ut musculis cōiungis, impartit. Quod restat tertium neruorum initium, amplum olis pectinis foramen permeat, duosq; paruos musculorū id amplexos, unum utriusq; astoris alterū, intrinsecus reliquit. Hæc iam tria principia intuitus, ad quartum duorum ramorum grandis, qui in crus deferuntur, mittuntq; ad extremos usque digitos propagines quasdam, descendens. Euadet autē & hoc conspicuum, musculis natum incisio, cum quibus inciduntur etiam capita femoris musculorum, qui numero quatuor, ex coxendicis osse exoriantur. Quippe grandes nerui illis subiecti apparēt, qui foras ab interiore latitiosis parte cum neruulis tenuibus ex eo productis, emergunt. Verūm illi in omnes articuli iuncturæ musculos exteriores diffeminantur: primū ex uniuersis in ipsum superficialiū, qui articulum retrorsum agit: mox in carnosum sub ipso magni: dunde in paruos infra ilium latentes. Nam grandes soli per femoris regionem potestram excurrentes, apparent: qui in uarios inde musculorū disperguntur. Porro in tibia etiam, duo soli grandes nerui, descendentes per femoris posteriorem sedem, sub unico lato musculo conspicui uisuntur, qui ad tibie principij excurrunt, atque ibidem primū separantur in ualtem: alter qui minor est, exterioribus ipsius musculis distribuendus: alter, puta maior, in-

Arteriæ ex uenis pro ratione magnitudinis, uirtus perceptiua: nec non autem nō semper.

Neruum in radii quatuor, in eam femoris differtur.

Nerui in musculis femoris de his quatuor.

Femoris musculi quatuor.

Tibia nerui.

Vena quæ scienda.

Axillaris uena scienda, accipit molatissimam esse si qua partibus infra clauiculas laborant.

Humeralis uena scienda, accipit molatissimam esse si qua partibus infra clauiculas laborant.

Arteriā unā duntaxat proficiscitur manū.

Arteriā carpi tempore à nobis pulsus exploraturi.

Arteriā inter indicem & pollicem mediam, proficiscitur in macilinis motum.

Manus clauiculae carpi arterij.

terioribus. Sed externus tibiæ subter fibulæ ca-
pi ingreditur: interior iuxta suræ initium pro-
fundius ingreditur. Atque huius nervi pars reliqua
non mediocriter in pedis inferiora porrigitur. Al-
terius autem tenuia extrema supremis tarsi par-
tibus dispendantur. Porro quedam ipsius etiam
ad nervum alterum pervenit, qui per suræ, prope
inferiores tibie partes defertur. Cæterum in-
simam pedis sedem nervus unus subit hand exi-
guus, ex altero grandium, quem in posteriores ti-
bæ musculos digerit commemoravi mus, pro-
pagatus. At in supernam partem pedis, exiles
nervi quatuor porrigitur, ab his quos recen-
suimus, exorti. Ad hæc uero, exigua quædam ue-
na cruris per os pectinis adit, modici ipsius par-
tem nutriendi. Vna autem alia maxima uena in to-
tum crur ab anteriore parte per inguina dissemi-
natur. Cuius ramus unus statim in priore, in-
ternamque femoris regionem perfertur, multifa-
riam summa fub cute in ipsum distribuitur. Ab
hoc, alie tenues propagines in cutem tres qua-
tuorue disseminantur. Dein alius primo similis
ramus in femore prope musculum angustius cer-
nitur, post eumque alie duæ aut tres perpulsi-
bæ. Ab his alia insignis genu interius subit: quæ
sequitur alia duas in partes diuiscata, cui succe-
dunt alie complures. Atque hæc quidem subter cu-
tem summæ omnes constitunt. In imo alie quæ-
dam sic se habent. Prima enim post inguina an-
terioribus duobus musculis dispendatur. Mox alia
penitus grandis satis intra maximum omni-
um musculum, & ex anterioribus internis por-
rigitur: à qua plures uenarum propagines in om-
nes propemodum femoris musculos disper-
guntur. Post hæc alia quæpiam deinceps in gran-
dem ex anterioribus musculum ingreditur, elati-
us ad externam femoris regionem emergens.
Insper post illam alia uenarum digna profundius
in maximum musculum citius uicinis inferitur.
Atque post has, in superficiali enumeratione præ-
dicta, quæ ab intima genu parte ad usque tibie ex-
tremum multiplici ramorum serie cutem subit.
Iam uero, præter alias quasdam propagines, quæ
interdum in tibia nascuntur, etiam ipsi fibulæ bipar-
tita uenæ soboles apponitur: quarum altera in
superficie externis partibus fibulæ ad malleolū
usque, ramorum seriem spargit: altera, per ima ex-
teriorum musculorum ducta, ramos communica-
ns singulis, intra tibiæ fibulæ iuxta infe-
riorem huius finem peruatit, in imamque pedis
regionē disseminat. Ab hac autem procedunt
duæ alie uenæ, propè exuberantes tibie fibulæ
terminos, conspicuè satis: quarum interius sanè
miscetur ei, quæ iuxta genu descendens, in-
trinfecus supra suram tibiæque totam ad malleo-
los est porrecta: à exteriori societatem inuit cum
nemine ab illa exporrectis, quæ per exteriores fi-
bulæ partes dehisit fertur. Verum ab his quæ
ad tibie fibulæ extrema inuicem coeunt, exiles
quædam ad tarsum, digitorumque pedis excurreunt,
maiores autem ipsæ ad imas partes euadunt, ex
quibus tota pedis regio inferior alimentum ac-
cipit. Nam posterior pars, quæ ad calcē habetur,
à proximis intus, foris, ramos inuicē coeun-
tes suscipit. Vena igitur per inguina excurrens,

hunc in modū propagatur. Quæ uero pubis os
percepit, solis indigēti partibus (quæ tres muscu-
li sunt) distribuitur, easque nutrit. Porro arteria
maxima cruri per inguina inferitur, eo nimirum
loco, quo uena magna. Vtrunque autem uas per
interiora protendit femoris, arciori ipsius mus-
culo incumbens. Ac uenæ quædam arteriæ in mus-
culos inferis coheret: non tamen arteriæ su-
perficarias uenas unā consendunt, uersum alius
semper per musculos ingreditur. Id autem
inde liquidū constat, quod carnosius nullus
in crure pulsus appareat, nisi in tarsio rectē ad se-
cundum digitum post maximum. Tangimus
itaque subinde arteriam imbi firmam, quum eam
quæ carpo inest, percipere non poterimus. Ar-
teria autem quæ per os pubis foramen in fe-
mur pervenit, perinde ac uena, ipsam tribus mu-
sculis distribuitur.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrandis Liber III.



Aud temerē in his commentariis à
manibus sumptū exordium, quod
nimirum has partes uidere in solis
hominibus liceat. Neque absurdum
fuit statim de cruribus commenta-
ri nonnulla, quandoquidem beneficio eorū, so-
lus homo ad amissum rectus incedit. Nūc uero
de faciei & capitis partibus, opportūm uidetur
dicere. Porro duo musculi rennes simul & la-
ti in buccam & labra descendunt, à colli spina or-
ti unde membranæ, fibrosiusque ligamentum
procedens, substantiā ipsorum constituit. Com-
plures etiam fibræ ex scapularum sping regionibus,
quemadmodum & ex uniuersa clauicula se-
de, in buccā terminantur. Atque oportet hoc mu-
sculos, quum uisus aliosque possiderent, pro fi-
brarum natura incidere. Nam si experiantur ma-
gnam incisionem transversam, buccas ad alterā
partem reuellunt. At musculosa compages, quæ
fronti subiecta est, & à qua pericula attollun-
tur, & motus frontis perficit, suas fibras habet
deorsum uersus dentes: quas transversim et-
iam chirurgi imperiti secantes, in causa sunt, ut
frontis cutis tota delabatur ad oculos. Iam uero
alij musculi masticatores dicti, expansis infe-
rioris maxillæ lateribus sunt subiecti, qui uariis
totam ipsam modis circumagunt. Nam tempo-
rales musculi, non circumagunt, sed dum morde-
mus, uel edimus aliquid, aut os claudimus, ad-
ducere maxillam sunt nati. Et enim animalia om-
nia, præter crocodylum, inferiorē maxillam mo-
uere, superiori immobili, natura uoluit. Vniuersi
autem motus ipsius tres sunt: unus in man den-
do, alter in ore claudendo, tertius in aperiendo
peragitur. Atque ab his fecerunt laborum atque
buccarum motus, qui sunt immota maxilla: ut
quing sunt in ore functiones, quina uero muscu-
lorum genera. In simia igitur intra aquam exten-
da, ubi pilos abstuleris, leuissimè cutem incidas
scalpello acutissimo, rectam ducens lineā à men-
to usque ad prætus, iuxta ceruicis ipsius longitudi-
nem: statim siquidem sub cute se ostendet latus
tenuissimū

Arteria in crure
distribuitur.

Arteriam tarsi
tangendi esse
non pulvis car-
po oculatur.

Manus reperi-
as sili hominibus.

Homo sili ad
aurum uelut
incidit.
Laborum ma-
sticis uide.

Frontis muscu-
lus habet fibras
deorsum uersus
dentes.

Musculi masticatores.

Temporalium
musculorum
visus.

Maxillam infe-
riorē, superiorem
autem, ut in
animalia omnia,
præter
crocodylum.

Maxilla inferior
tri tres musculos.

Ore sunt tres
musculi, qui
non genere am-
buntur.

Lati musculi in
secundis ratio.

Pedis uenæ.

Vena in cutem
cruris diffusi-
mæ.

Vena cruris
interior à innu-
dant.

Pedis inferior
regio unde ali-
mentū accipit.

*Latius musculi
venerunt raris.*

*Latius musculi
fibra à quibus
magis arceatur.*

*Animalia quæ
sua aptiora an-
atomia adma-
nistranda.*

*Maxilla homo
feritur breviss
max.*

*Animalia duo-
bus incedentia
cruribus.
Labiorum sub-
stantia.
Labiorum motus.*

Labiorum nervi.

*Dentium et gin-
givarum nervi.*

*Nervi musculi
quales.
Latiora muscu-
li inveniuntur Ga-
leno.*

*Masseteres ma-
sculi.*

tenuisq; musculus, unâ cū numerosa serie nervo-
rum, talem utrinq; situm habentium, qualē fibre
quibus adnascitur. Quippe omnes ad labra defi-
nunt, ex utriusq; procedentes initiis. * Siquidem
ab uniuersis colli uertebreis incipiunt quædam,
aliæ à scapulis, aliæ ab utraq; clauicula. Quæ igitur
à scapulis ducunt originem, oblique omnes
per buccas in oris latera porriguntur: quæ à uer-
tebris, transuerse magis: quæ uerò à clauiculis
emergunt, propemodum recte sunt. Hæc autem
omnia quæcommo dimissimè discernuntur in ijs
animalibus, quæ pæ senio extenuata sunt,
quæ ad propositum opus talia sunt deligen-
da: post quæ, recens nata præstant magnis & pin-
guibus. Cognoscens autem exortus singulorum
nervorū, si ubi laqueos illos exceperis proximè
ad ipsam maxillam, abstulerisq; omnes fibras ut-
rinq; eis adiacentes, iam nudos ipsos reducas
ad propria principia. Posterius itaq; musculi hu-
ius initiū ex spina omnino procedit: inde ad oc-
cipitijs osis basim defertur, mox sub aurem, de-
inde musculum masticatorium dictum torum
ascendit, osisq; superioris maxillæ committitur.
His igitur omnium primis ademptis musculis,
licet uel occipitio, uel faciei adherentes, ostē-
das. Iam uerò ex omni animantium genere, ho-
mo breuissimam, pro totius nimirum corporis
proportione, maxillam sortitus est. Mox simia:
dein lynces & faryri: postea cynocephali. Hæc
autem omnia & collum ita prolixum, & clauic-
ulas hominis modo possident. Ac quædam ip-
sorum magis insunt, quædam minus. Insunt
igitur recta, gradiunturq; alia perus, alia
melius. At certè gradiuntur omnia binis inni-
xi pedibus. Aliud autem nullum (quod scimus)
animal, duobus cruribus incedit. Labra itaque
naturam singularem extimamq; obtinent, ad-
hærescuntq; osi maxillæ, tertiam quandam in
se, eandemq; sanguisam substantiam sortita, ita
ut tota ipsorum natura, ex illa ipsa substantia, cu-
re, & tribus lateri musculi terminis, confata sit.
Proinde laterum musculorum beneficio, in la-
tera secundum transuersas ipsorum fibras mo-
uentur. Deorsum uerò, sursumq; uersus, mo-
tum, tota ipsorum substantia suppeditat. Atque
hos ob motus, nervos ipsius natura, tenuissimis
foraminibus perforans maxillam, transmittit.
Per quæ foramina elabuntur etiam reliquæ ner-
uorum, qui dentium sedibus adhærescunt: à qui-
bus gingiuar, dentes, & etiam membranæ am-
bientes, ipsam sensum accipiūt. Trahuntur por-
rò deorsum labra, beneficio nervorum qui ex
imo sursum uersus feruntur. Contrahuntur au-
tem ab extremis utrorumq; musculorum, gracili-
um, & latorum, ipsis insertis. Sicuti autem his
nerui ab inferiori maxilla, sic superioribus labi-
bris, à superiori subministrantur. At uerò mus-
culos qui narium alas mouent, tales natura esse
pronunciare palam oportet, qualem & latum
musculū, quem nos inuenimus. Hinc paulatim
usq; ad malas descendens, cutem à uicinis illarū
partibus auferens. Hoc enim confecto, binī mu-
sculi masseteres dicti, singuli proprio ex capite
in extrema inferioris maxillæ profecti, clare cer-
nentur: neruis ipsos intercurrentibus, qui ad buc-

cas definiunt, quipè hamulis ad initium propriū,
quod post aures oris, sunt reducēdi, priusquā
masseteras, hoc est, masticatorias, incidas. Ex
horū musculorū capitibus, alterū in malis, ut uo-
cāt, alterū iuxta os iugale consistit. Post hos mus-
culos, eos qui intra maxillā in ore habent, ad bi-
bis: tū tēporales ipsos. quæ tria musculorū paria
maxillā mouent: tēporales quidē, cū interiorib;
sursum eduecentes: masticatorijs, in latera circū-
agentes. Osse iugali ablato, euidenter totus mus-
culus tēporalis conspicit, & diuersimodū simul triū
musculorū societas: quorū duo quidē simplices,
masticatorii autem duplex exitit. At uerò iufe-
rior maxilla, ex duobus osibus circa infimam
partem coarctans consistit: quæ diducenda sunt,
ut recte oris partes cernantur. Porro uniuersā
capitis cute ablata, delineamenta quædam mus-
culorum circa aures conspicies, quæ in reliquis
animalibus non delineamenta solū, sed per-
fectos etiam musculos spectabis. Habetur enim
unus in utroq; spinæ latere musculus. Neuter ta-
men usq; ad aurem procedit, sed tantum uterq;
abest, quantū ab occipitio pcedit. Iam uerò sca-
pularū magnis agunt moribus, nec minus ipsis ca-
put. Cæterum musculus ille duplex ceruicis, qui
in scapulas ipsas inseritur, non capitis, sed sca-
pularū grana est à natura cōdurus, ut illas ad ca-
put contrahat. Siquidem si transuersem is in cer-
uice scindatur, confectum conuelluntur, deor-
sum uersus, scapula: sursum autem non amplius
moueri queunt, idēq; capitis motu minimè reso-
luto. Sunt tamen alij musculi, qui caput agunt
in latera. In istum autem scapularum musculum,
à cerebro quidam neruus descendit, quem ig-
norauit Lycas, perinde ut par illud musculo-
rum maxillas mouentium, quod intra os est si-
tum. Secundum musculorum par est, quod præ-
dictis quibus subiectum est, longitudine respō-
det. Nam ex eadē occipitijs osis regione procedens,
sublimi scapularū basis angulo inhiçitur.
Verūm latitudo ipsi equalis non est, sed multò
minor. Hi enim scapularum basim ceru ad occip-
put (unde transuersem oriunt) retrahūt. Priores
uerò musculi, non modò basim, sed totas ipsas
sursum reuellant. Vtriq; autem, à media occipitijs
osis regione incidendi sunt. Quibus sublati,
alia pleraq; musculorum coniugia comperies,
quæ carnosus anulus caput ad posteriora resiste-
tūq; totius colli longitudini iniecit. Sunt & alij
musculi, sic ab occipitijs osse orti, ut oblique ip-
sorū fibre ad spinam sint inclinare: à quibus ca-
put in obliquum conuertitur. Ab utrisq; autem
ipsis incumbenibus, de obliqua hac inclinatione,
ad rectitudinem æqualem, quæ naturalis est
figura, reducitur. Exordiens igitur tria horum
musculorum paria ab occipitijs osse, cui inhiære-
scunt, disseccare, perges usque ad extremum in-
ferius. Quibus ablatis, circa articulum capitis
alia quatuor exilium musculorum paria cernū-
tur, quæ retrò habentur, absq; paruis in articulo,
iuxta latera primæ uertebre, recondita. Succedit
aliud quartum par musculorum obliquum,
tertio obuersim respondens. Hi musculi primū
ceruicis uertebra secundæ conuectunt. Eorū
uerò extrema ad laterales primæ processū, &

Ori musculi.

*Temporales ma-
sculi.*

Os iugale.

*Maxilla infieri-
or ex duobus os-
sibus constat.*

*Scapularū ma-
sculi & motus.*

Cephalis motus.

secundæ spinam, eadundem. Porro tria hæc paria, nempe, primum ex omnibus quæ recensimus, tertium, & quartum, triangulū æquis lateribus tri-
bi constituitur uidebuntur. Itaq; in reflexione ca-
pitis, occipitij os cum ipsis primæ uertebrae sinu-
bus innitit, atq; secundæ præterea contingit ma-
ximè ipselq; extremum in tenuendo capitis reflex-
u, hos ipsos terminos obtinet. Annuentibus
rursus, in priora caput recedit, & super antero-
rem primæ uertebrae processum innitit. Verū ex
tremis sinibus laxa insident, à posterioribus par-
tibus disjuncta: * alioqui primam caput uerte-
bram ad anteriora transcenderet, & musculis &
propria gravitate decussum, nisi in processu an-
teriori ipsius primæ uertebrae, sic constituto à na-
tura, accurate innitens confirmaretur. Verū
hinc exiguum securitatē, maximam uerò inde,
quā prima cum secunda committitur uertebra,
natura molita est. Nam quā particulam quandā
turbini similē, rectā ex hac produxisset, inferio-
ra anterioribus constabuluit, primam uertebra
leuiter excauans, ubi maximè in anteriora pro-
cessus exiit. Posteriorē quippe ipsius partem,
secundæ uertebrae processus acclius, extremum
ingreditur, ligamentumq; ualidum ē uertice ip-
sius ortum, & capiti inferitur: item aliud quoddā
transuersum ex ipsa prima uertebra profectum,
secundæ extremū turbinatum ad amulsim con-
stringit. Obliqui autem musculi in latera caput
conuertit. Iam uerò qui torquent caput ad an-
teriora, ij musculi ad pectus & primas clauicu-
larum partes protendunt, ex duplici orti prin-
cipio, altero post aurē, altero in ipsiusmet aures
sitis: quapropter duplici extremo etiam in prius
nominatas particulas inferuntur. Quod autem
& pectus & clauiculas cum ipso thorace cir-
cumducunt, simul & sursum uersus ad capitis
latera, aut caput ipsam in priora circumagunt,
cuius uerū esse existimo: sicuti & ipsos hoc pa-
cto non posse mouere thoracem. Quare caput
ab ipsis prorsum circumuerti necessum est. Nā
qui musculi rectam positionem obtinent (ut qui
ad scapulas & ceruicem porrigebantur) ij om-
nes simplici motui præstant: qui uerò non re-
ctam, composito. Quare musculi qui à regione
aurium ad clauiculas & pectus descendunt, quā
obtineant situm non recto tramite, situi similē
morum sortiuntur. His musculis amputatis, ad
eos qui in scapulis habentur, digredi licet. Duo
sanè iuxta spinam luxent, quos solos scapulas
retrorsum agere dicimus. Alius tertius, à pri-
mæ uertebra oritur, & in extremo scapularum
iuxta summum humerum desinit. Quartus gra-
cilis, longusq; ab osse initio laryngis præpo-
situs, quod hyoides dicitur, originem ducens, ip-
sas illi connectit. Sunt & alii duo musculi utrin-
que per spinam dorsī exporrecti, à quibus sca-
pulæ spinam uersus tendi uidentur. Ab elatiore
siquidem leniter ad ceruicem inclinari: ab altero
ad inferiores dorsi partes deduci: ab utriusq;
uerò simul tensis, totas scapulas retrorsum, nul-
lam in partem inclinantes, deseri ad primas se-
ptem thoracis uertebras, ad quas protensi sunt,
uidebis. Atq; in sex musculi peculiarem scapula-
rum existunt. Alius autem humerorum articu-

lo communis est, scapulas deorsum uersus de-
trahens: quo de suo tempore agetur. Musculis
quos retuli ademptis, apparebit is, qui maxil-
lam inferiorem aperit, incipiens à capitis osse
petroso, sursum autem ad summam maxillam
protendens: ut uterque muscular, & qui à dex-
tris, & qui à sinistris pergit, eodem coeunt, ac
medio itinere, ipsorum pars in nervosa ligamen-
ta degeneret. Quod par solum neruorum, tri-
bus ori claudendi creatis natura opposuit.

Maxilla inferi-
or à quo aperit
ur muscular.

GALENI PERGAMENI de anatomici administrationibus liber V.



Ute quæ pectus contegit à subditis
liberata, musculum inibi spectabis
in aliorum superficie extrēmē, qui
ex mammarum regione incipiens,
sursum uersus ad humeri articulū

obliquus porrigitur. Ipsum itaque à subiectis
paribus diuisum, hamo quidem primum ip-
sius fibrarum finem eleuans, dem usque ad hu-
meri articulum totum musculum separans, post
hunc ad alium eo maiorem accedis, qui ad eun-
dem nimirum articulum peruenit, ex toto pec-
toris osse oriens, mammarq; subiectus. Qui ma-
sculus bipartitus quodammodo est, fibras ipsius
in similitudinem X literæ, mutas sibi incumben-
tibus: alijs ab humiliori ossis pectoris sede ad
articuli eminentiorem porrectis, alijs ab elati-
ore ad demissiora inclinantibus, omnibus au-
tem sese intersecantibus inuicem. Porro ipsa axil-
læ cōcauitas à duobus gignit musculis: uno cer-
tè quo de hic agimus, altero ad costas porrecto.
Quæ igit prædicti musculi fibræ ab elatiore pec-
toris ossis sede incipiunt, brachium thoraci ad-
dignant, non deorsum reuolvente: nam ab humi-
lioribus fibris, os brachij unā cum obductis ei
carnibus ad thoracem adductum, deorsum leu-
niter declinat. Iam uerò alius huius tertius succe-
dit motus secundū primi musculi functionem,
quem à regionibus propter mammam oriri dixi-
mus. Ad hanc alius quartus, quo brachium ad
thoracis costas expanditur. Post confectionem
illius qui sese intersecat musculi, alius tertius no-
bis se ostendit muscular, qui ex pectoris osse du-
cit etiam originem, quæ secunda, tertia, quarta,
quinta, & sexta costa cum ipso coarctant, eiusiq;
beneficio brachij elatius thoraci admouet. Secun-
dum hunc sequitur, qui iuxta eminentiorem
scapularum costam, euidenter iam brachium at-
tollit. Omnes autem illi dicti tres musculi, in ten-
dines latus, brachio sese inferentes desinūt. Post
quā igitur tres hosce musculos adusq; articu-
li iuncturam secueris, scapulae à pectoris parti-
bus separantur. Verum duo adhuc musculi ab
imo sursum procurrentes, ipsas ad thoracis late-
ra continent: quorum alter quidem in superfi-
cie tenuis, ex membranis quibuscumq; gignun-
tium cuti connexis: alter uerò inter musculos,
qui ab imo sursum feruntur, magnus, interiumq;
sumens ex spinæ uertebra, præcipue quibus spu-
rix costæ coarctantur, cum scapularum basi haud
mediocriter consortiū obtinet. Huius musculi
ulq;

Humeri ma-
sculus.

Axillæ cōcauitas
à duobus sterni
musculis.

Brachij motus
& muscular.

Musculi scapu-
larum admoventes
thoraci.

Capitis motus
nunc securitas.

Capitis motus
ad antero, à
quibus uertitur
musculus.

Scapularum mo-
tus seu.

Or hyoides.

uisq; ad brachii cōlectis, * adhuc scapulae unius
 grandis musculi, ipsarum parvis cōcauis sub-
 nat, interuenit, cōssae & ossis claviculae interce-
 dente, pectoris ossi cōnnectitur. Primum igitur
 ad claviculae ossis musculum, superiore lue-
 meri partem amplexantem, amputato: deinde
 claviculae ad pectoris ossis tollito, membranosa cir-
 ca articulum ligamina interfecisse, donec mus-
 culum ab interna interna ipsius parte in pri-
 mam costam oblique in ferunt, euidenter con-
 spiciat. His rite peractis, scapulis reuulsis, uis-
 a axillam pertransit, & nervus cum membris
 nec percidit. Porro functio illius musculi qui
 scapularū cōcauis ipsis costis cōnectit, est thora-
 cē uniuersum reuellere. Sunt alii alii duo mus-
 culi, in utraq; thoracis parte unius, ille uidelicet
 in anteriori regione, ille in posteriori, costas enī
 reuellens: adeo ut tres hi musculi sint ipso thora-
 ce elatiore, prior scilicet, posterior, & medius.
 Quippe medius musculi est ille de quo nuper
 diximus, medio ambortu collocaus. Ac thorax
 solo hoc mediorum muscularum coniugio mo-
 rus, abunde satis animanti subseruit. Altera pro-
 prium muscularum coniugatio ex secunda cer-
 uicis uertebra incipit, sed ab omnibus alijs con-
 sequentibus orta, in quinq; thoracis costas per
 ualida ligamenta inferitur: quemadmodum &
 reliqua coniugatio muscularum subleuium, inci-
 pit quidem a spina extremarum trium collu uer-
 tebrarum, & primis simul dorso, ac supenarum
 tertie costae, in quartam, quintam, sextam, & se-
 ptimam insertata. Quod si caput ipsius prehensum
 in se attraxeris, costas sursum conuelli, di-
 stendit thoracem, uidebis. Idem & in medio
 priorisq; motus musculi, paria ipsorum magni-
 tudini interualla thoracis fieri conspicias. Hae
 igitur tres sublimium thoracis musculi cōi-
 iugationes, sunt respirationis opifices. Quarta
 deinde, quae in primis costis consistit. Nam ad
 pristinam sedem eius atrolens musculus, prio-
 rum sane costarum ossa retrahi sursum uersus
 prehendens: partem uero thoracis quae hic est,
 distingit. Ceterum alia duo muscularum paria,
 thorace detecto, iuxta longitudinem appare-
 bunt: hoc quod carnosus est, spinæ omnibusq;
 illi adiacentibus costis: illud quod membranoso
 pectoris ossi expansum. Huius musculi ten-
 do, recto ab dominis musculo cōtinuus est, om-
 nibus costarū terminis, qui ad pectus pertinet,
 incubens. Etenim musculi hic in omni animatū
 genere, ad primum usq; costam pertendit,
 ubi & carnosus assumit, & tenui carni supernutri-
 ta tendit, latitudine quam accipit. Tam uero
 alius muscularis hic similem habet functio-
 nem, qui per spinam porrigitur, & cum thorace
 simul incipit, definit, orbiculari circumscriptio-
 ne. Ceterū finis ipsius inferior, spinæ cōtrectus
 musculo, obliquus, in posteriora uergēs, ut ten-
 sus costas intro contrahat, stringatq;. Superest
 aliud unū muscularū par extra thoracē diffusi-
 quod in extremis costis, thoracis inibi finem de-
 orum uersus detrahit. Cuius quoq; caput, uni-
 inter abdominis musculos admiscetur. Muscu-
 lis omnibus quoque percussis ablati, situs fibrarum
 manifeste apparebit obliquus, si omnia

musculus intercostales respiciat. Examinetur autem ipsarum, & spinalibus auspiciens musculus, & duo cuiusque fibræ extrema contuebare: alius propter spinas magis sitū, densius inde longius remoratur: tanquam singulis fibris oblique in priora, non recto tramite, deorsum versus procurrensibus. Spinalibus præterea exemptis, fibras quoque similiter obliquas ibidem ipsæ fibræ subiectas spectabis, nonnunquam cum costarum conuersione inter se sumas variantes. Non enim ut unūquodque costæ os à spina prodiit, ad pectoris obliquum porrigitur, ab eianonibus animantibus partibus ad humiliorē inclinans: sed ubi prope os pectoris iam cartilago uice ossis creata cernitur, alium obtinet situm, priori cōtrarium, oblique rursum, fed circūlarim quodammodo, ad pectus cui coarctatur, protendens. Similiter itaq; fibræ ex imo sursum obliquius prolata, subcontrariā positiuram recipiunt. Hoc etenim in costis omnibus cernitur, si spurias duntaxat exceperis, quarū extrema, pectoris osi non committuntur. Vniuersim siquidem harum costarum ab initio aduorsū finem latio existit. Definūt porro ipsæ non in os pectoris, sed in cartilagineam quandam, quæ exortus septi transcurrī existit. Ab externis itaq; partibus fibræ musculorū intercostalium obliquum situm fortiuntur, quatenus dictum est. Quæ uero in partibus internis habentur, contrario modo iuxta X litteræ figuram extensiores fectant. Conspiciunt autem & hæc facili, costis ipsis ad spinam reiectis. Vnus igitur adhuc thoracis musculus superest minimè cōtendendus, nēpe pectoris transuersum: cuius munus exultimatur Plato, distinguere duntaxat animosā à concupiscibili animæ facultate: quum præter id etiam maximè sit ex usu ad respirandi functionem. Ligamenta complura tenualit ex ossibus proceduntia, quibus simplex circumducitur caro, hoc septum habet: cuius centrum, exiguus quidam circulus & membranofosus existit. Verum totam ipsius naturā manifestè prius contemplari nō licet, quum octo abdominis musculis dissecueris, ad quorum confectionem nunc diuertendū est: quanquā tum ipsorum, tum ulcerum omnium, quæ in imo uentre consistunt, primò omnium soliorum eram confectionem moliri, nē uidelicet diutius assuetata computrescerent: dein uerò aliorum anatonem persequi. Nunc autem disciplinam prædictis succedentē nō deferēs, costas à pectoris osse reueltas, rursum ad pectoris os reducas oportet. Dein de quod ex abdominis cute adhuc reliquum est detrahas: sub ea siquidē, primi & maximi duo ibi musculi occurrūt, obliqui, atq; alijs omnibus abdominis musculis superfluiti, unus quidem à dextris partibus, alter à sinistris porrectus: quorum musculorū suprema, maximo thoracis musculo circa sextā costam cōiunctantur. Nec tamen à sexta costā duntaxat, sed ab alijs etiam spuris, quæ in cartilagineam magnam degenerant, hæc prima abdominis musculorum coniugatio oritur, obliquis fibris ad uentris anteriorē protendens. Cuius uterq; musculus tum ad ilium osse, tum ad inguinā cōtraria procedit, ac pubis ossi, per membranē, fed ualidū tendit, ac

Cystus rufirostris
maculatus.

*Castarē spuria-
rum extrema of
si pollens mō cū
mure, sed desine
re in cartologi-
am.*

Filtras transfendo-
rum liberare in
termas habere
laticem cūtra
riam externa-
rum latens.
Septi transfuerſi
confiderat.

Exposition
de la musique.

Anatomen aut
Calumni ordari
sileat ab inferi-
ori sententi.

Abdominis mus-
culorum confi-
deratio.
Obliqui muscu-
li abdominis.

Pilina mysticlerum thoracis ex
terna quatuor la-
tiorum, quatuor
filiis sustentat.

ante inguina ortum, inferitur. Hoc interdū tendine relaxatur (qui & peritonæum, & ea quæ ab ipso ambiuntur permeat) aliquod intestinum, aut omenti pars, propriam sedem egreditur, ac perisperm laxitate elabitur. Qui morbus cele, atque ramex dicitur. Pars autem horum musculorum, quæ ad ventris anteriora porrigitur, in tendinem tenuissimum definit, rectis extrinsecus musculis superpositum. Pari modo & secundæ coniugationis musculorum abdominis (qui obliquum fibrarū suarū primis contrariis possident) tendo in membranam degenerans, anterioribus musculis insidet. Vterq; uerò horum ex illius ossis ducit carnosam originē. Hinc deinde oblique sursum protēsi, musculis trāsuer sis insident: postea quatuor notharum costarū finibus, carnosæ intercedente substantia, iniunguntur. Tendo autem ipsorum tenuis, medius inter rectos musculi, & prædicti ortū tendinem, pergit: uterq; ab ea regione ortus, quæ circa externa rectorum musculorum latera posita est. Porro ipsi recti musculi, qui tertiam coniugationem constituent, tota substantiā carnosā, à superius deorsum uersus descendūt, atq; in pubis os carnis in teruentu inferantur: quā in parte exactē iniuicē cōeunt. Nā elanor ipsorū porno adiacet quidē, nō autē accuratē adunū. Quarta & ultima coniugatiō tū ex recta illi ossis linea, tū ex lateralibus uertebrarū, qui in lumbis uisunt processibus, exoritur. Verū nō ita ut simul atq; uterq; enascit, efficitur musculus: sed membranosiū ligamē ualens ex commemoratis ossibus productum, deinde in processū fibrarū adauctum transfueris, in musculi figuram degenerat, partibusq; internis cuiusq; spinæ costæ finium subhærescit, necnon rectis miscetur musculis. Cuius tendo curiosē à peritonæo auellendus est, cui uel maximē adheret. At peritonæum latius araneorum telis simillimum est, simplex & tenue insigniter. De octo igit in abdomine musculis, iuxta primam anatomicè ipsorum administratiōnis speciem, quæ longē facilior & aptior est, abundē satis disputatum exultimo. Ita uerò & coniugationes ipsorum uoces licet: primam sanē maximorū obliquo ritq; qui à sexta thoracis costā incipiunt: secundam, qui sub contrariorū obliquo ritq; tertiam, rectorum: & quartam, transfuerorum. Poteris etiam ab ipsis musculis anatomē auspicatus, ubi recta linea uniuersum abdomen in dextram & sinistram regionem distinxeris, ab eorū ipsam finem detraheris, à rectis musculis separare primum superficiariū maximē musculi tendinem: deinde secundum ab ipso, qui à secundo nascitur. Vbi uerò utrunq; utriq; connexum ostenderit, rectorum musculorum consēctionem aggredere, ac dein eorum, qui subditi sunt, semper fibrarum connuitatem usq; ad ipsum musculi caput sequimur. Sic enim totum opus nbi clarū euadet, ut nihil confundatur. Atq; hæcenus de præcordiorum musculis. Intestinis exemplis, primum sepi ex spuris costis processum indicare expediet: dein quo modo spinæ inferā, patefacere: postea particulas ipsius distinguere. Etenim medium ipsarum est musculus, qui in tendinem latum omni ea parte à carnosis compre-

hensum definit. Ex utraq; autem ipsius parte, superiora pura & inferiora, tenuis membrana adhærescit: quarum elatior, quæ duplex est, totum thoracis cauum subliniit, à dextra parte altera, à sinistra quoq; altera. Non enim una quædam est intra thoracem spaciōsa laxitas sibi cōtinna, sed à prædictis membranis intercipitur, quæ recta linea ad pectoris longitudinem mutuo sibi cohererit, nisi quantum ea in parte abscedit, quæ costis situm est. Hoc enim inter se medium capientes propria inclusum membrana, quæ pericardium dicitur, ita ad mucronatam nique cartilaginem porrigitur. Toram itaq; utranq; thoracis regionem internam, membranas quæ dū succingunt, natura simplices, telæ araneorum persimiles. Basis ipsarum superius septi partibus obiecta est: quædam modum inferioribus alia quædam membrana similis huic, substrata, quæ peritonæi uertex iure optimo nuncupatur. Caterum hæc membrana sibi continua toram inferiorē sepi transfueris regionem subliniit: ubi illud usus necessarii grana foratū est, ibi cū ipsis quæ permeant, circumliæret, simulq; expanditur. Sunt enim duo foramina septi: alterū grande, quā uertebriis uia exhibetur, stomacho & magnæ arteriæ præparatum. Reliquum uerò minus, uenam cauiam superius animalis partibus sanguinem deriuantem, excipiens: quæ uena prius ceteris partibus dissectanti occurrit, ceru & in sublimi suspensa, & nihil ante se continens, musculis sublati. Detectis quæ infra septum latentur, nihil mali fuerit membranam lumborum carnis superstratā detrahare. Est autem hæc, peritonæum lumbis cohærens, quo uulso carnes ipsorū clare conspiciuntur singulos nempe utriq; musculi exactos per spinæ longitudinem sibi mutuo connexos, deluiperq; toti lumborum longitudini expansos. Qui quidē quam prope os sacrum peruenierint, decimantur inuicem, internis illis adhærescentes: in quibus quidem musculus duo rēdines reperiunt, quos anatomici neruosiū musculorum propaginem nominant. Prædictæ itaq; dux lumborum carnis partes tenæ, deorsum hæcunt tum eam partem spinæ, quæ per lumbos totos labetur, tum eam quæ dorsi continua est. Pari modo musculi stomacho subditi superiorem spinæ partem in hæcunt. Verū lumborum carnes in seipsis caput obtinēt tendinis, qui ad femoris trochætera pertinet. Iam uerò post prædictos omnes musculi, spinaliū totorū processis diligenter consideranda. Incipiūt etenim ex secunda cervicis uertebra, singuli duo capita inuicem diuisa obtinentes. Semper autem magis ac magis corpulent euadunt, quibus à tenuibus oriuntur capitibus. Nā ex unaquaq; uertebra processus aliquis ipsis miscetur, ac inibi collum permeat, tum magnitudine, tum robore insignes sunt. Et primū in colli extremo in idem cōeunt musculi, ubi illa quæ spinæ parte nati, hic dextra, ille sinistra, ut omnia amborum musculorum capita, quatuor numentur. Fibre autem ipsorum oblique sunt: quædā à spinā ad priora inferioraq; decurrentes: nonnullæ contrā, ex lateralibus orientes processibus, quæ retro, deorsumq; uergant. Qui

Membrana sub linens thoracem.

Thoracis capaci tas est: ea duas laxitates demonstrat.

Pericardium in uulso uer.

Peritonæi uertex.

Septi foramina duo.

Vena caua.

Lumborum musculi duo.

Spina partes 2 quibus scilicet uertur musculi.

Spinalium musculorum processus.

Spinalium musculorum capita quatuor. Spinalium musculorum oblique fibre.

Cele.
Ranex.

Recti musculi abdominis.

Transuersi abdominis musculi.

Peritonæi araneorum telis simillimum.

Abdominis musculorum quatuor coniugationes.

Septem transversos natis ab spina costis. Septem transversos partes.

bus diligentem adhibere curam, dum utroque musculo dissecto, ad lumbos deuenieris. Ibi siquidē musculus ex ligamento quoddam membraneo, quod à locis spinae prodegit, gignuntur, ex ima parte ad postremas thoracis costas sursum paulatim obliquē tendētes. Atque hi musculus extremas costas detrahunt, ab anatomicis sunt prætermissi.

GALENI PERGAMENI
de anatomicis administrationibus
Liber VI.



Imia igitur homini simillima est, præcipue pedibus atque manibus. Quia si conspexeris aliquando de currente figura erecta, statim ex longinquo eam simile homini deprehendes.

Quemadmodum ergo præstat, simiarum homini quàm fieri poterit simillimarū dissecare artus, quum te in exemplo exercere studes: ita statim est in talis simæ inopia etiam dissimilium aliquid capere: sicut etiam si in totum lima desideret, cynocephalū, uel faryrum, uel lyncem, summatim ex animantia, quibus artū extremā in digitis quinq; discreta sunt. His animantibus succedunt, ursus, leo, & quæ ferarum dentes fortituntur. Ex actionibus autem quæ obeunt, & figura particularum, quam singula animantia extrinsecus habere uident, nonnulla & de structura ipso

tum tibi indicano sumet. Nam quæ animalia similem actionē obeunt, similē figurā exteriorē repræsentant, quæ similes nimirū & interna tota particularū natura existit. Quippe natura cuius animanti corpus animi affectibus idoneū condidit: atque huius gratia simulatq; nata fuerunt, omnia particularia ununtur, tanquā à magistro edocta. Quare aliquod animal antea nō uisum, intuitus, ipse equidē iudicari, qualēnam sub cute structū habere, non alium de eius cognitionem atq; peritiam indeptus, quā ex firma persuasionē, quod singula animantia corporis structū animi moribus facultatibusq; propriā haberent. Quinetiam uoce animantis audita, de illius instrumentis coniecturā aliquam sumere poteris. Sed de his alibi latius dicturi sumus. Nunc uero de cibi instrumentis differere animus est. Quum igitur unus sit usus communis animantibus cunctis, cuius gratia alimento indigeant, reperies instrumenta in singulis ipso rum generibus triplicia. Quædam prima ratione à natura facta, ad concipiendū alimentum, conficiendūq; & in totū corpus distribuendū. Alia secunda ratione, quæ excrementorum sunt receptacula. Reliquas alias particularis tertiarie extruxit, quæ horum excretionibus subseruiunt. In quam itaq; particulam cibum animantia recipiunt, uentriculus nominatur. In hoc leuēnam quandam & primā subeunt mutationē ingesta, ac præparant iecitori, quod maximam cibi in ipsum permeantē alterationem molitur.

Hinc uenit confectū ipsum, in totum corpus de iustis. Ut autem ex iecine ore purum, nulliusq; superflui particeps, alimentū uniuerso corpori dispenses, natura instrumenta ad id accommoda condidit: idq; secunda ratione, nō primaria, sicuti

nuper commemorauī. Ex his instrumentis, alia quod subtile & leue in ipso habet, expurgant: ut bilis meatus, uelutiq; bilis exceptrix: alia quod terreste est & graue, ut lien, & ima pars intestini reſtialia quod inter hæc duo constitit, aquosum, serosumq; ut urinariorum meatus, renes atq; uelica. Cæterum ut pro arbitrio animantis superfluo excremento fieret, musculus natura terminus ualorum ea continentū asfabricata est, qui tertiam ratione inter cibi instrumenta habentur.

Itaq; necessariō tria hæc instrumentorum genera in omnibus animantibus ad alimentū distributionem natura condidit. Atq; hoc est commune & idem in uniuersis. Quoniam uero nonnulla animalia ualidis aluntur cibis, quædam imbecillibus, eodē natura respiciens, particulares uentris differentias est machinata. Quare si aliquando uideris animal tibi nunquā cōspēctum, quod alimentum ligneū & spinosum edat, magnū huic & asperum nois esse constructum uentriculū.

Si autē etiam superiores dentes non habeat, uentriculus est necessariō plures existere, ut in primū statim pabulum ingerat: mox ex hoc ruminans, ore conficiat, ac deinde in alium atq; item alium uentrem deglutiat, est iudicandū. Contrā uero quibus superior dentium acies concessa est, ea animalia nec ruminare possunt, nec uentres plures habēt. Iam cornigeris magna ex parte superiores dentes abesse nouimus, ut quibus terreſtre capitis partium recrementū in cornua absumat.

Iraque in instrumenta quæ cibum conficiunt, tantam magnitudinē possident, talemq; formam, qualis alimento ingerendo requiritur. Omnes igitur uenas quæ per intestina, uentriculum, lienem, omentumq; (quod uelut congenitū operculum, caloris gratia conditum est): intercurrūt, porrigi ad hepatis portas uidebunt. Porro musculi uarios inferiores uentris mucronata cartilagine usque ad pubis ossa diuidens, in corpus quoddam tenue, & late araneorum telis simile incidens, cui ob id nomen inditum est peritonæo, quod simplex & simile existens, prætendatur omnibus tum uisceribus, tum intestinis, tum uasis, cæterisq; alijs corporibus, quæ inter septum transuerſum & crura habent. Ipsum autē separare incipies inuento loco, ubi per se constitit, nulli musculorū incumbendū adhaerens. nempe nō multo post regionē umbilici, ubi primū à transuersis fecernitur musculus, atq; solum relinquatur. Etenim quum grande fatis animal fuerit, licet facile peritonæum sibi continuum & integrum ad costas spurias usq; seruare: ubi transieris musculus definitens, alius excipit musculus, nempe septum transuerſum. Siquidē huius quoq; substantia, musculus exactus figura, circularis existit. Quod in medio ipsius liabatur, torum neruolum est. Quod autē in orbem hoc ambit, uniuersum carnosum existit. Peritonæum itaq; carnosæ septi particulæ obortur, à qua eodem modo detrahere ipsum conuenit, quo & à reliquis musculis auulsum fuerit. Seuiosē autem incumbendū operi, facile liabatur, quo usq; ad caudā uenam peruenit sit, propter quam gibba hepatis sepro transuerſo adiacent, & conuectuntur. Ab hoc cōnexu uelut sinistra regio

Vesica bilis exco-

perit.

Lien.

Intestini reſtialia

Lien.

Vesica,

Simiam homini
in similitudine offe

Animalia scilicet
in apta, dum si
ma ipse non
decur.

Animalia quæ
similia dicuntur.

Naturam cuiusq;
animæ corpus
animi affectibus
congruū se
offe.

Animalia omnia
particula
naturæ similia
et nata sunt.

Cibi instrumentis
triplicia.

Ventriculus ei-
us respondit
uulso.
Iteu maximā
ob alterationē
uulso, quem po-
tius per uulso de
pau.

Ventris differen-
tias pro differen-
tia ciborum, offe
a natura ciborum
illas.

Animalia carni-
bus sepius de
tribus habere ut
tribus ciborum
genium.

Cornigeris cur
magna ex parte
superiores den-
tes careant.

Omentum tale
inſerendo gra-
tia conditū est.
Magis ac uer-
sus uulso por-
rigi ad hepatis
portas.

Peritonæum præ-
terea de omni-
bus uisceribus or-
ganis.

Septi transuerſi
substantia tra-
dia musculari si-
gura, circulari
existit.

Septi transuerſi
conueniunt.

nem, peritonæum humilias cum ore uentriculi coit, deinde toti capacitati crassius seipso factū, obducit, sic rariet ut non magno negotio possit ab illa seungi. Quæ non autem inibi crassius est, tanto tenuius iecori obtenditur, omnesque ipsius particulas, seu tunica quædam peculiaris, continet. Quod uero adhæret uentriculo, germinibus uenarum, quæ in illum descendunt, inuoluerum, uasū, firmamentumque efficitur. At quemadmodum exiguae grandium uasorum propagationes in uentriculum demergunt, ita in primum, seu ad umbilicū, aliæ parue, magnarū soboles, ex alto deferuntur, duabus peritonæi partibus comprehensæ. Ex hoc corpus ex duplici peritonæi, seu plexu (intra quem continetur uasū) constitutum, dicitur tum omentum, tum epiploum. Oportet autem uenā utrobique gibbum uentriculi intercurrensem persequi accuratissimè. Si quidem per dextram amantissimam partem deducet et ad processum, quo tenuis intestini ex uentriculo oritur: altera parte ad lienis concauā, in sinistra posita. Cuius uisceris gibba pars ad extrema natham costarum conuersa est, & quicquid huius ad sinistra illa contiguit est. Concua autem ad dextram partem inclinat, contra iecur & partes inibi sitæ. Mittit itaque à se uena illa ramos quosdam exiguos, partim in lienem, partim in omentū. Non ramen uas in lienem absumit, sed quod ex eo reitit, una cum arteriæ sibi iunctæ reliquo, deorsum uersus, per sinistra illa pendentem, sibi omento generationis principium, penes hanc partem. Eodem modo in dextris illis omenti portio descendit, cum illius loci uasū, quæ in uentris gibbo sese contingunt. Quapropter & hic illud, tanquam indicem sequatur, ad amussim ipsius originem, præter iam dictas, conspiciet. Porro inferior omenti portio, pauciores uenas & numero & magnitudine obtinet. Enascitur autem ex uentris finis, unde & uasū habet, reliquias quasdam simul ipsi deorsum uersus abducentia. Omnes autem hæc particule sibi mutuo continuæ sunt, corpusque unum, nempe omentum, constituit, idque figura marsupij, quod orificiū quidem ex uentriculo exortū superius & inferius obtinet: totū uero eius spatium, quatenus ex dictis cōstitit principij, deorsum uersus procedit. Adnascit autem interdū omentū ipsi alicui fibree iecinoris, licet, atque etiam loci. Sed quale nam sit omentum, & unde oriat, si ad prædictum modum confectionem moliaris, haud recte inuenies. Quam autem multæ sint coagulationes ex arteria, uena & nervo, in singulis orbibus intestinorū: insuper multa inter eas spacia, in quibus duplex peritonæi habetur: ex his omnibus consistere mesenterij substantiā, ipsi omento persimilem, intelligit. Hoc siquidem corpus, quod mesenterium, mesargum, & lætes dicitur, medium inter intestina habet sitū, & omnes uenas ex iecore in ipsum descendentes, una cum uicinis arterijs & uenis, in orbem complectitur, quod madmodum ipsa iocetina singula. Vbi igitur uasū & intestinis obenditur, simplex est: ubi uero ipsi medium iocetina habet sitū, nō amplius indumentū usum, sed copulæ exhibet, nimirū duplex quum sit. Quod si obiectum abunde animal fue-

rit, eatenus augei mese nerij pinguitudinē accidit, ut interdum uasū confendat. Quamquā in huiusmodi animantibus etiam alias plerisque peritonæi partes pinguedinē habere conspiciamus, præcipue in quibus non grandia uasū habentur, & uiscera longius absunt: quippe à calore liquefit, à frigore conseruatur: atque ob id semper in ueruosus confistit partibus, & his qui orisiam uitam agunt, abundat. Talis fane peritonæi, & eorum quæ ex eo gignuntur, natura est. Porro me mesenterij arteriæ ac uenæ inuicem cōiungentes, seu in arboribus ipsis radices, ad principium unum omnes perueniunt. Iam uero ea quæ intra peritonæum consistunt, præstat singula per se, ex corpore exempta, inspicere. Licet etiam, post exemplatā intestina, glandulas mesenterij nō cū uasīs, quæ ad ipsas perueniunt, ab illis orta, quæ ferebantur ad intestina, intueri. Ventriculo igitur, atque singulis intestinorū, duæ tunice insunt: una ea autem tum uescit, tum uulue. Habet autem interior uentriculi tunica, fibras rectas, exterior orbiculares. At in testinīs, pleræque circulares insunt fibræ, quibus paucule rectæ superpositæ sunt. Omnia igitur hæc coactis animalibus sanguine præditis insunt: quibus omnibus etiam & iecur inest. Quæ uero iecur habent, ipsæ & lien omnino est, & meatus qui bilem excipiant, etiam sellis uesci ea nonnulla careant. Cuius sinus idem ipsius per totis animalibus, sub maxima fibrarum iecoris perpetuū est. Non ramen iecoris fibræ pares numero, uel genere, uel specie, uel magnitudine, in animalibus cunctis habentur. Gulosis enim & timidis inest magnum iecur, multitudineque: diuersum autem, contrario modo affectis. At quibus magnum est, in plures maioresque fibras, quàm hominibus, scissum est: quancquā in hominibus uniuersis, nec magnitudo, nec fibrarū numero similis uisitat. Occupat autem interdum paucis in hominibus partem sinistram iecur, sicut & in multis animalibus alijs. Intestinorum uasura, quateus intestina sunt, omni eadem habetur: magnitudine autem & numero anfractuū euariar. Primum igitur intestini est, quod exortum, siue *suprapylor* uocant, pyloro continui. Ab hoc secundum, quod à duodecim digitorū longitudine, dodecadactylon dicitur: tertium autem, quod cibo semper sit uacuum. Tertium tenuius iocetini, est substantia huic simile. Differt autem, quod neque reperitur uacuum, nec tot uasū scateat. Quartum est, quod cæcum appellant. Quintum, quod colon. Ab hoc in extremo reuertitur intestinum ad sedem usque porrectum est. Sic & lien in sinistra parte consistit, concua ipsius in dextram conuerso. Atque uena quædam ex iecore ad ipsum pertinet, cuius processus in uentriculū deriuat. Porro iecur uenas ex mesenterio ad concua ipsius partem pertinentes, excipit. Vocant autem hunc locum, in quem omnes uenæ mesentericæ colligunt, portas. Hic enim reperies maximū uenarū os, in quam aliquo specillo immisso, per singulas fibras leuiter ipsum propellēs, substantiā incumbentē scapello præcides, donec ad eam uenam, in qua later specillum, perueneris. Hæc detecta, sic ut ipsam nō dissecueris, carnē uisceri circumdata uasū inde procedentibus,

Pinguedinē à calore liquefit, à frigore conseruatur à figura.

Mesenteria uasū.

Ventriculo singulis intestinorum duæ tunice insunt. Vescit & uulue uena tunica. Fibræ uentriculi rectæ, intestinorum circulares. Sanguine præditis quæ insunt.

Vescit sellis situm.

Iecur magnum multitudine, in timidis & in munda.

Iecur nonnullis hominibus in sinistra parte locatum.

Intestinorū uasura, & cæcum.

Exortum intestini.

Dodecadactylon, siue uasū.

Tertium intestini, siue uasū.

Cæcum intestini.

Colon, siue intestini.

Lien in sinistra parte locatus.

Vena à hunc in uentriculū.

Porta uenarū.

Omentū quid. Epiploum.

Lienis positiō.

Omenti figura.

Mesenterij substantia et quibus consistit.

Mesenterium. Mesargum. Lætes.

Vena arterialis
duabus tunica
constat: proinde
circa ad pulmo
nem ex dextro
cordis specia.

Venas totius
corporis canila
re ex tunica
unica: arterias
ex duabus.
Arteria tunica
quales.

Arteria ve
nosa.
Vena arte
riosa.
Arteria aspera
composita.

Spissum thora
cis consideratio.

Cor inter
traque thoraci
spatia medium
constitit.
Spiritus respi
randum esse
sinistrum cordis
ventriculum.
Costarum lae
ues.

Quod uero ex dextro procedit, tamen si duas for
tiatur tunicas, perinde ut arteria, quia tamen non
pulsat, appellatur uena, sed arteriosa. Optimum
quippe fuerit, pulsus, atque eius defectus ipsa uasa
discernere. Verum quum hoc sensibus nō adeo
clare distingui queat, a communione quam cum
utroque cordis uentriculo habent, indid nomen
debet: appendix uero, a corpore substantia. Cae
terum iuxta corpoream substantiam arteria quidem
est illud uas, quod ex dextro cordis uentriculo
oritur: uena autem, quod ex sinistro. Contra
trā, usus ratione, quod ex sinistro prodit, arteria
est: quod ex dextro, uena. Totius igitur corporis
uenae, ex peculiari una tunica constāt: arte
riarū uero, ex duabus: quarum exterior quidem,
quales uenae tunica existit: interior autem, cras
sissime huius ferē quintupla, duriorque, & transuersis
fibris distincta: quae interna superficie habet a
liam, cūa cuticulā quandam araneorū telae per
similem. At exterior, quam etiam uenae obtinent,
rectis fibris, & quibuscūq; mediocriter obliquis,
transuersis nullis, contexta est. Ex tribus itaq; ua
sibus pulmonem intertexentibus, quod a sinistro
cordis uentriculo proficiscitur, nuncupetur arte
ria uenosa: quod a dextro, arteriosa uena: tertiu,
arteria aspera, ex cartilaginibus quae imaginem
Creserunt, fabrefacta. Quae cartilaginee circula
res, tum in grandi arteria, quae in collo caudici
rationem obtinet: tum in paruis, quae ab illa in
pulmones inferat sunt, in priori parte situm
habent: in collo quidem, uicēque oesophago: in
pulmone autem, uenae quam paulo ante uoca
uimus arteriosam. Porro uasorum intercapedi
nes, peculiari pulmonis substantia replentur. Li
cet autem pulmonem thorace exemptum, sicuti
& cor ipsum, incidere, non tamen ita societatem
ipsorum, quam cum membranis ineunt, cognos
cere. Iam uero osium thoracis naturam simili
ter speculabere, quae euident quidem, corde a
nimali exemplo, in conspectu prodit: quamquā
& insiro adhuc ipso, palam cernatur. Praeterea in
tali administratione, praeter iam commemoratū
tum, hoc cōspicis, nempe cor, inter utraq; tho
racis spacia medium, consistere. Motus autem
ipsius indicat, quasi in parte sinistra sit colloca
tum: idq; duplici de causa. Primum, quia spi
ritus conceptualum hic consistit: deinde, quia
vertex eius ad hanc magis regionem inclinat.
Porro costae singulae deorsum uersus simul &
prorsum oblique feruntur, ex spina ducentes or
tum. Nam duplicibus inibi articularis cum una
quaq; dorū neruebra committitur. Vbi uero
ad pectoris regionem perueniunt, cōtrario mo
do, sed oblique etiam ad os illius attolluntur: ubi
cartilago iuxta osis genia, diuersam naturam
obtinet, faciliq; acuto simul & ualenti scalpello
potest incidi. Rectam itaq; utraq; parte lineam
deorsum uersus per totius thoracis regionem
ducent, eam pectoris partem attollas, quam u
trinq; ducta lineae diffiniunt: postea uero didu
cās latera, robore maximo adhibito, ad refle
ctendas eas partes costarum, quae uertebribus uici
nae existunt. Sic enim omnes thoracis partes pa
liam intruere licebit, ac multo magis sepro a co
ctis abscisso: insuper hoc magis adhuc, si duabus

costis diemptis inuicem, omnem carnem inter
mediam praecidas. Sic igitur & uenam causā ma
nifeste ad iugulum usq; recto tramite percurrentem
cernes, & cordis processum, quos aures no
minant, peculiarem naturae fortientes substantiam,
quae in alia nulla particula habeatur, quem
admodum profectū & cordis ipsius essentiam.
Quod autem corporea cordis substantia, per
multum a musculorum differat, ex illius sane con
stituta. Est enim cordis motus nō arbitrarus,
nec cessare, quoad animal uita fruitur, potest.
Musculorum autem functio subinde quiescit,
ac rursus excitatur, animantis arbitrio subie
uens. Actiones uero imitatur proprietate sub
stantiae. Huius rei gratia, quae quidem particulae
eandem speciem substantiae possident, similiter
operantur, est diuersis permixtae animantibus
insint: quae uero non habent, diuersa harum est
functio, quamuis unus animantis particulae ex
stant. Quapropter nec musculi eandem cum cor
de functionem habent, quoniam neq; substan
tiam. Etenim si quis cor & musculum quemlibet
pariter coctum, utrunq; gustat, haud medio
crem ipsorum gustu differentiam pericient: id
quod substantiarū si differentia maxima nota ex
istat. Hallucinantur igitur qui cor musculum esse
existimant, aut nerui id ad suam functionē ege
re: non intelligentes actionis ipsius excellentiā,
ex sua uisceri substantia necessario inesse. Cor si
quidem thorace exemptū, diu moneri uidentur:
quare nerui ad eum motum non indigent. Qui
si similem motum praestare possent, cur ceterae
partes cui nerui insunt, non similiter pulsare ui
dentur? Porro omnes neruos utranq; facultate
habere, sensitiuam nempe & motricem, ratio
est. Verum molles ad sensum aptiores, dum ad
motū existunt. Ab eadem tamen radice pluries
discissa, apparent quidam nerui in musculis, alij
in alias partibus uisceri, quemadmodum & in
tertia ipsorum coniugatione, & sexta nihilo mi
nus, habere nouimus, a qua cor exilem quen
dam neruum accipit: unde etiam pulmo, iecur,
uentriculus, & mesenterium insuper totum, una
cum intestinis, necnon inuenerit laryngis musculi,
suas excipiunt propagines. Iam uero cordi,
quod animosae uirtutis institū est, ac uelut fons
quidam narij caloris, aures quaedam annexae
sunt, neruosiores ac magis cunculares ipsa cor
dis substantia. Quae particulae & colore nigrores
sunt, & corpusculis cuticularibus manifestō si
miles, sinus cuiusdam ante cor effluentis grana
te: ob quam rem, ipsas naturae & concuās & cuncu
lares condidit. Duae uero hae sunt, in utroq; uaso
rum materiam inuidentium singulae. In dextra
quidem parte, quae uena in cordis sinum inferi
tur: in sinistra uero, quae arteria uenosa. Has
aures quā aperueris, tum ipsū cordis corpus
in conspectu erit, tum ex dictis orificijs utranq;
deinde membranae inferioni ipsorum incumben
tes, tres quidem in sinu dextro, duae uero in sin
istro: quarū structura figura, similis telorū cuspi
di existit. Sed hae quidem & cor de thoracis exem
pto licet accurate intruere, sicuti etiā reliqua duo
orificia uasorum, quae materias ex dextro qui
dem uentriculo in pulmonem educunt, ut uenae
arteriosae.

Corda auro.

Corda subtilia
nunc permixta
differe a ma
festa.

Corda motum
esse nō arbitra
rium.

Musculorū fun
ctio arbitrio a
nimantis subie
nit.

Animantis uici
ter proprietati
substantia.

Costas differen
tas, differenti
aliter uicem job
stantias arguit.

Cor nec muscu
los est, nec ege
t nerui ad motu
adhibere.

Nerui a motu
sensu: cy mo
uendi facultas
infusa.

Nerui molles
ad sensum, du
res esse ad mo
tum aptiores.

Viciorū uicē
nerui recipiūt.

Cor animosae
uirtutis institū
est.

Corda cuncu
la.

Corda cuncu
lata uenerunt.

Corda auro
incumbent
membrana
rio natura &
figura.

arterioſe: ex ſiniſtro autem in totum animantis corpus, ut grandis arteria. In quibus iterum tres utrinque membranas ad C. litteræ ſimilitudinem factas compertæ, extra cortendentes, ueluti trifidulas intro. Prius uero quàm cor ex animante auferas, cauè uenæ ramos conſidera: ad hæc glandium magnum, quod Græci rhythum uocant: ruſtiſque cordis panniculi radicem. Inſuper examina, quo modo à dextro ſinu uena quædam ad ſpinam portendat, quanta dori conſcendat

Glandium.
Thymum.

Vena et arteria,
unde
coramur.

Arteria duas
corpus cordis in
soluere.

Cordi inſe et
ram cartilagi-
nosum.

Cordi aſſi
oſum.

Cordi aſſi in-
uoluntati ratio.

Cordi ad inſe
ſuam ſinu.

Cordi ſtruc-
turam caſſerant
huius aſſi eſſe
omnibus ean-
dem.

Pulmonis ſtruc-
turam eſſe om-
nibus eandem.
Pulmonis ſtruc-
turam eſſe om-
nibus eandem.

mirari, quàm Marylli Mimographi puer curatus ſit, uiaſque adhuc, etſi cor illi aliquòd fuerit de-
tectum: Vbi igitur cor citra thoracis perforatio-
nem detectum eſt, uiaſorum exortum ſunt excipe-
re minime poſſis: cordis autem baſim poſſis, ue-
rum animal ſtatim cõmorieſcit. Porro alterutra,
uel utraq; capacitate thoracis forata, omnia que
reſpirationi ſubſeruiunt, deſtruntur. Ante uero
quàm perforata ſit una uel altera pars thoracis,
non licet ipſum pulmonem cernere, niſi forte co-
ſta exciſa, luſcigentem membranam conſerues
integram. Si uero animus ſit utraq; thoracis ca-
pacitatem ſciudere, duas lineas per coſtarum ſe-
xus ad animalis longitudinem ducito, quibus
oſſa reſſexa dirimes. Deinde aliam tranſuer-
ſam lineam tertiam per mucronatam cartilagi-
nem incides. Poſt hæc toto pectoris oſſe reſſexo
ſurſum, pericardioſy diuiſio, ambos cordis ſi-
nus æque pulſantes uidebis. Cæterum euiden-
tius adhuc quàm antea cernes arterias, aut ul-
ciſum, aut eodem tẽpore & numero per totum
animal eleuari, ſubmittit. Hæc igitur conſectum
ipſo detecto innotefcit. Procedente tẽpore, bre-
ues utriuſque uentriculi motus, longis interval-
lis intercipiuntur. Iam dextri ſinus eleuatio, pec-
tiali ipſius natura perſicitur. Huiusmodi autem
ſpectabis poſſiſſimum, ubi ipſi uentriculi immo-
biles propè euaserint. Primum etenim, utraq; ip-
ſorum, que ad uerticem conſiſtunt, moueri ceſ-
ſant: mox que ſi proxima ſunt: atq; hoc ſit per-
petuo, donec ſolæ baſes in motu uerſantur. Qui-
bus ceſſantibus, languidus breuiſque motus ex
longis interval-
lis in cordis auribus cernitur. Ex-
numerò qui pollicentur ſe oſtenſuros arteriam
ſanguine uacuum, inania illi, & minime proba-
bilia pronuntiant.

Marylli pueri
curatus fuiſſe,
cui detectum cor
uit at.

Cordi utrinque
ſinum poſſare.

Arterii inſe
ſanguinem.

GALENI PERGAMENI de anatomicis adminiſtrationibus Libro VIII.



Horacem porro nominant, quod à
coſtis comprehenditur. Sunt autem hæc
omnibus que prius retuli animanti-
bus, in duodenum numerum expo-
ſectæ. Rariſſime ſiquidem decima
tertia coſta uideſtur: atq; hæc ita rara ſunt, ut in ter
mille uix unum tali coſtarum numero inuenias. Ela-
tior autem thoracis ſinus, ipſe clauiculi exiſtunt:
quemadmodum demulſior omni animantiũ gene-
ri, ſeptem tranſuerſum, quod phrenas & diaphrag-
ma nominant. Sedes omnibus coſtis duplex:
prior, pectoris os: poſterior, uertebra ſunt, que
toridis numero planè, quot & coſtæ habentur.
Pectoris os, unum quidem apparet, ob ſtructuræ
concinnitatem. Membranas autem deraſis, quod &
plura oſſa ſint, & numero totidem, quot cum eo
coſtæ cõmittuntur, palam innotefcit. At uero ſep-
tem priores thoracis coſtæ, cum pectoris oſſe
coarctantur. Octaua uero ad radicem cartilagi-
nis enſiformis conſiſtit. Reliquæ quatuor in tho-
racis latera deſiſunt, tantum prioribus parte deficient
tes, quanto etſi alijs breuioribus ſunt. Minima in-
ter ipſas eſt que poſtrema habetur. Omnes igitur
retro cõ dori uertebriſ coarctantur, idque du-

Thorax dicitur
quod à coſtis cõ
tinetur.
Coſtarum duo-
denum numerum

Clauicula.

Septem tranſ-
uerſum.
Phrenes.
Diaphragma.
Coſtis omnibus
duodecim de
pleve ſedes.

Pectoris oſſa tot
quot coſtæ cum
eo cõmittuntur
ſunt.

Coſtarum ſep-
tem priores cõ
pectoris oſſi cõ-
arctantur.

*Costae omnes
inter se dorsi
aliqua duplo
nodo.*

*Sapi transver-
si ergo.*

*Respirationem
(que potatur
esse naturalis et
prima) à solo septo
transverso sup-
pellicem.*

*Septum trans-
versum est mus-
culosum.*
*Musculosum in
tercostalium fi-
bra.*

*Collatum sin-
gula in propo-
sita esse arteri-
am, venam, &
nervum.*

*Fibræ venter-
que musculari
intercostalium
difficili perire
videntur.*
*Sicut maxime
est apertum
ad spirationis
ergationis ana-
tomen.*

plici nodo: altiori quiddē, ad ipsū uertebrae cor-
pus: humiliori, ad lateralem ipsarum processum
declivē. Hinc autē in priorem, inferiorem regio-
nem longius oblique procurrit, & quoniam iam
anteriori lamine, ab hac latione cessante ubi natu-
ram cartilaginis fortiter, sursum ad pectoris os,
contra priorē motum mouentur: quarū finis car-
tilago exquirita censetur. Ab his autē cartila-
ginis partibus intimis, septū transversum occit.
Elauior, anteriorq; ipsius pars, cartilagini mucro-
nata subnalecta: quemadmodū posterior atq;
demulsiore, ipsi spini coherescit. Verū superior
pectoris osis finis cū prima semper costa com-
mittitur, necnon cū clauiculis, in quibus hæc ni-
mirum habent. Ceterū nō omnes musculi, qui
thoraci quocunq; modo coherescunt, motus ip-
sius grana sunt conditi. Nam quidā à pectore &
costarū spuriū sedibus sursum tendentes, hu-
meri subseruiūt articulo. Quidam ad abdomen
descendentes, suos usus habet, & thoracē paulu-
lum detrahūt. Quemadmodū qui costarū extre-
mis alioris obiecti, iuxta pectoris os prorsum,
& uertebrae retrorsum, iuncturas cōstringūt, &
thoracē leuiter compriment. Torū uerō ipsius
motū manifestē gubernat inferior septū ipsū
transuersum, dum intensus, laxaturq; uicissim:
dilatans, cōprimensq; indidem terminū, ac attra-
hens ab ima parte per mucronatā cartilaginem pe-
ctoris os: costas autem spurias sursum leuiter &
prorsum. Jam uerō respirationē (que naturalis o-
pus, nō animale putatur esse) septū transversum
duntaxat suppediat. quod non modō substantia,
sed usu quoq; musculus est. Vt autē ad interco-
stales musculōs nos cōuertamus, eorū fibras su-
perficarias ab elatiore costa ad humiliorē leni-
ter oblique in anteriora penitentes conspicias.
Paulatim uerō has difficans in animali cōmor-
tu, rūc internas accedes situ has aduersas, ut am-
bo ad X literæ similitudinē habitum inter se exi-
gant, quē usq; ad cartilaginosas singularū costas
particulas conferuari uidebis, in illis autē ua-
riari. Etenim in his exteriores fibræ talem haud
dubie situm occupant, qualem interiorē fortiter
erant: contra interiores, qualem possidebāt ex-
ternæ. At in musculis costarum, quas nostras uo-
cant, ad finē usq; ipsorum, eadem fibrarū natura
consistit: quoniam hæc nullo flexu incuruantur. In
ipsis porro intercostalibus musculis, proximē
ad ipsius costæ os, arteriā, uenam, & neruum, in
ima cuiusq; ipsorū parte cōperies: propius tamē
ipsorum neruū. Quare diligentiā adhibeas oportet,
corporibus quæ fibris incidendis subiacent:
nam hæc tria mutuō se uidentur cōtingere, nem-
pe arteria, uena, atq; neruus. Ceterū medio in-
ter summas atq; ipsas fibras situ neruū cernes, si fi-
bras ad amussim sequaris. Plures ramen superfi-
ciariz fibræ q̄s que in alto habentur, esse appare-
bunt. Porro animal amplissima uoce prædum,
apissimū est ad cōfectionē, in quibus uox que
dam læditur. Vtrūq; igitur fibris dissectis, uocē
simul & efflationē animalis perire, ipsa res per-
suadebit. Quare præstat in huiusmodi admini-
stratione suum magnū adhiberi. Valens enim ei
membrana costas succingens inest, quā ne perie-
ces, sedulo curandū est. Hac enim secta, dum tho-

rax attollitur, nō parum aëris ambiētis, in me-
diam thoracis pulmonisq; regionē trahit. Dum
autē submittitur, hoc ipsū rariū per uulnus e-
greditur. Notum uerō est, ex aëre qui per inspira-
nem attrahitur, tantum necessariū ob uulnus pe-
rire, quantū uidelicet in ipsū thoracem insuit
extrinsecus. Quāto autē per os minus quā ne-
cessariū sibi usum inspirauit animans, tantō et-
iam minus efflabit. Ceterū quanto efflatio ip-
sa decreuerit, tanto uocem sequi breuiorē neces-
se est. Jam uerō in quocunq; musculorū interco-
staliū, si incidatur costas succingens membra-
na, idq; linea notabili, animal semspirans protin-
us & leuius uocale redditur. Sin autē in altera tho-
racis parte atq; secta fuerit, spiratio & uox abo-
letur. Quemadmodū si in contractione thoraci-
s uacui aëre, qui per uulnere elapsus est foras,
plagas obturaueris ipsas, respirabit cessitum a-
nimal, uocemq; emittet. Quod autē utriq; fibris
sectis in omnibus musculis intercostalibus, non
uox modō, sed efflatio quoq; intereat, nostrum
inuentum est: quemadmodum etiam, ubi solus
neruis præter dorsi medullam sectis, inoffensē
quidem musculorum fibræ seruantur, actio au-
tem deperditur. Licet uerō circa spinam dorsi
neruus omnes, qui in musculōs intercostales
perueniunt, hinc exceptos attollere, non tamen
uinculo astringere. Clamar enim sic percussum
animal: deinde subito obmutescens, ob neruos
hinc constructos, spectatores reddit attonitos.
Nam miraculum esse uidetur, neruis exiguis in
dorso laqueo interceptis, uocem perire. Com-
plures tamen in huiusmodi indicationibus tibi
subseruiant oportet, ut quælecebre laquei om-
nibus neruis circumponantur. At magnitudo
offensæ haud æqualis in tori omnibus interco-
stalibus obuenit: sed ipsi qui costas spurias arti-
gunt, tanto minor, quāto musculi earū elatiori-
bus minores existūt: quanquā musculi qui
ad primam pertinet costam, obliquis, minimā et-
iam offensam adiciūt. Porro in elatioribus co-
stis, neruus ipsis porrectus alnus inuenitur: rece-
dens autē paululum ad imam regionem, in humi-
lioribus. Cauendum itaq; est, ne quæ fibræ diui-
di, neruum subditū lædas: cuius offensionē im-
mobilitas musculorū intercostalium, colubritio
efflationis, atq; abolitio uocis sequitur. Ad hęc,
nerui propter arterias carotidas transcurrentes,
si noxa aliqua momentanea afficiantur, animal
reddunt mutū: non autē q̄s similiter, qui interco-
stalia excurrunt. Quippe rarus quiddā strepitus
in q̄s relinquit, qualis in somno sterentibus fieri
apparet. Hic strepitus musculis intercostalibus
resolutis oblietatur. Resoluntur autē cōfessim,
aut fibris ipsorū cōfessis, aut costis excisis, aut
neruo ad radicē uitio, aut tota spinali medulla
propter dorsi ininiū incisa: qua sectione postea
mutus rarus strepitus abolet, similis omnes infe-
riores particulas, quæ ad musculōs intercostales
atq; imū uentrem spectant, quæ eisq; et cōfessim
musculi, pudendorum, uescicæ, & crurum, subito
resoluntur. Verū diaphragma, licet infra mu-
sculos intercostales labear, non resoluatur ta-
men, quod uidelicet ipsius neruorum origo, ro-
ta sit elatior thorace. Neq; etiam illi musculi sex,
qui

*Spiratio et uox
quando perit.*

*Mutuum que re-
sione subitū red-
de posset anim-
mal.*

*Mutuum reddi-
animalis, possum
ter lasso neruis
qui excurrunt
propter arterias
carotidas.*

*Intercostalium
musculi que re-
sione resoluti fu-
erant.*

*Diaphragma-
tas nervi trans-
versam originem
thoracis.
Septa transver-
sa tria animalia
sola, ad parvas re-
spirations.*

*Musculi qui ra-
tione principium
motu.*

qui ex ceruice descendunt, attolentes supernam
thoracis regionem, quicquid inde offenduntur:
etenim & in hos nervi deferuntur à medulla spi-
nali ceruicis. Vnde aut animal septo transverso
solo in parvis respirationibus. Quis uero maio-
ris respirationis usus ipsi obontur, aut ob exer-
citiis, aut febri, aut uehementi aeris calore,
necessitas quidem est, functioni diaphragmatis
etiam intercostales musculos subuenire. Sin au-
tem magis usus respirandi increuit, ut ipsi es-
terioribus musculis illam functione obit. Com-
mune autem hoc de omnibus musculis sciendū
est, quod siue nervos ipsorum laesis, siue amputa-
ueris fibras omnes transuersas, totos statim mus-
culos suo motu priuabis. Quare necessariū tibi
admodum fuerit, principia nervorum, qui in ip-
sos distribuantur, & fibrarū situm, pernoscere.
Etenim coctū cuiusq; os, iuxta inferiorem circun-
ferentiam nudare oportet. Vbi autem iam appa-
ruerit nervus, unā cum eo uenit inspicienda ue-
na, & arteria, quæ in superficiei magis quā ner-
ui exant, humiliter tamen paulatim sitæ. Igitur
ab elatiori parte iuxta costæ circunferentiam ha-
mulo exiguo subdilo, licetibi nibi neruum excipe-
re, citra adiacentia uasā, præcipue citra ipsam ar-
teriam: quoniam ea, uelamentum sanguinis
profluuiū, neruum obscurat. Si uero ipsam quan-
doq; uulneres, scalpello statim prehensio, trans-
uersam rotam dissecā: licet nāq; communis est
omnium uasorum sanguinem mittentium pro-
hibito. At spinalem medullam rotam transuer-
sim incidis, nihil integrū ex ipsa relinquens: nisi
forte ex industria dimidium eius tantum uelis
resoluere. Iam uero spinālē medullā, quum iux-
ta longitudinem deorsum uersus per medium
ad rectam secatur lineam, nullum ex intercosta-
libus neruis resoluit: necq; eos qui lumbis uel cru-
ribus insunt. Transuerſim autem quum dimidia
duntaxat pars eius diuisa fuerit, siue sinistra ea
sit, siue dextra, omnes nervi, iuxta rectum inci-
sæ partis transmittent, ordine resoluuntur. Quum
itaq; semiuocale animal uoles reddere, in hunc
secabis modum. Vbi autem muti subdit, rotam
spine medullam transuersam diuides. Quoniam
uero costis etiam excisis, tum efusio, tum uox
animalis offenditur, quemadmodū ob musculo-
rum, nervorumq; sectionem: dum animal uo-
cem edit, transuersam aliquam costam dissecā,
usq; ad succingentem membranam, ita tamen ut
illam nec conuellas, nec uulneres. Vbi uero co-
stam à subdita membrana deraseris, facillimum
erit partes eius diuisas, ad utrumq; terminū, nem-
pe ad os pectoris atq; spinam, reflectere, ac si ig-
nitionem deprehendere. At si musculi alterutra in
parte, aut dextra, aut sinistra, resolutionē ex-
perti fuerint, dimidiata effusionis ac uocis portio
abolebitur. Sin autem alterutrum dimidiata, tum
amborum functionum pars quarta utiabitur.
Nam pro musculorum qui resoluuntur numero
& magnitudine, semper noxa uocis succedit. Ver-
um si fibris musculorum inter costalium sectis, uel
excisis costarū ossibus, musculi quidā relinquin-
tur ex his, qui thoracē comprimunt, tum qui co-
stas extremis porrigunt, adeoq; eorū qui in
tuo uentre consistunt, primum atq; tertium coniu-

gium. Quum aut thorax modicè ab his compri-
matur, modica enā effusio gignitur, cui uox ip-
sa proportionatur. Ac siue intercostales muscu-
los, per nervos qui de spinālī medullā ad ipsos
pertinent, motu destitueris, in quē duo modū: dia-
phragma uero, ubi huius nervorum principia simi-
liter ut reliqua afficeris. Descendit enim in tho-
racē li nerui per ceruicis latera inter duas gran-
des colli uenas, deorsum uersus obliqui, muscu-
lis collis subditis iuxta, tres quē duo modū: ex
parte, qui plerumq; in subus habent: in simis ue-
rō plurimum duo. Tertius aut raro in his uidef,
ut in subus quatuor. Origo ipsorum omnium est cer-
uicis spine medullæ. Ex quartē siquidē & quintē
uertebre interuallo, prima coniugatio procedit:
ex quintē & sextē spacio, secunda: ex regione
post sextā uertebre, tertia, quē enī exigua admo-
dum est: quemadmodū si quarta quandoq; acce-
dar, eius quē post septimā uertebre habetur coniu-
gationis, propagō perpusillā existit. Igitur omni-
bus his incisis, diaphragma motus fit expers. Pa-
ri modo si musculorum singulorū ex ceruice ad
thoracem descendēnū, qui sex numero inueni-
untur, nervos affeceris, actionē uitras. Affectus aut
est duplex: uel dum secātur, uel dum intercipiun-
tur. Hoc itaq; in uniuersum de omnibus muscu-
lis intelligo, q; dissectio ipsorum capite, non am-
plius functionē obibunt. Quia uero in quibul-
dam musculis caputū numerus ne deprehendi
quidem potest, quū ex pluribus incipit ossium
processibus, rursus fuerit illic ipsos secare, ubi ca-
pita in idem primum cōspiciunt. Atq; hoc quidē
in anterioribus musculis facilius confici, in
quibus profunda sectione opus est, ut qui peni-
torem sitū occupant, ubi capita ipsorum coierint.
Nam in posterioribus expeditissima diuisio est,
adeo ut uel unguitibus possit administrari. At uer-
sō si in regione media tertiz quartēq; uertebre,
percuteris totam spinalem medullā, spiratione
confestim totū animal destituitur, nō solum tho-
race, uerumetiam infra sectionem toto corpore
resoluto. Atq; perspicuum est, quod si post se-
cundam aut primam uertebrem, aut in ipso spi-
nalis medullæ principio sectionem ducas, repen-
tē animal corrumperet. Verū si post sextā uer-
tebram, medullā spinæ transuersam totam secue-
ris, uniuersi quidem thoracis musculi statim mo-
tum amittent: solius autem diaphragmatis bene-
ficio animans respirabit. At inferioris hac uer-
tebra sectiones spinālē medullā, per multis ipsius
partibus thoracem moueri concedunt. Et quan-
to magis ad humiores uertebres sectio ipsa in-
clinauerit, tanto plures thoracis musculos actio-
nem obuentes habebis. Non tamen sexta ner-
uorum à cerebro coniugatio, respiracionis mu-
neri subministrare uideatur: quia ne uel particula
quæpiam ipsius in ullum thoracis musculū pro-
pagatur. Quod uero ad pulmonem situm spe-
ctat, costā excisā, atq; unā cum membrana que
illam ambit, quæq; *visceralis* uocatur, ablata, sic
cingens costas simplex foliis relinquitur, quæ
adeo transparentem per se inspectionem effi-
cit, ut omnes facili cernā alios, pulmones dico,
in uiuo animali esse thoraci coniunctos. At ma-
nifestior adhuc sit speculatio * per diaphragma

*Diaphragma-
tas nervi rōde
propagantur.*

*Nervorum affe-
ctus duplex.
Musculi nō ob-
stant functio-
nem, si capita
eorum dissecti-
untur.*

*Spinālē medul-
lā sectā inter
terciā & quartā
uertebre,
spiracione con-
festim destituit
animal.*

*Sexta nervo-
rum coniugatio-
nis nullam par-
tem in alia-
quem thoracis
musculum pro-
pagat.*

*Medulla spina-
lis incisa trans-
uersim, quid ac-
cedat.*

nudatum, ubi peritonaei vertex auellitur. Sic si quidem admodum conspicua diaphragmatis nervosa pars redditur, ut omnes palam fateantur, pulmonem semper thoraci appositum esse, siue inspiret, siue etiam expiret animal. Ceterum uel si etiam id suffocaueris, pulmonem à septo plurimum frumctum uidebis: nec secus à thoracis lateribus: unde liquet colligere, spiritum in ipso contentum, in regionem eius & thoracis mediâ uacuari. Omnino siquidem in animalibus quomodo cunctis extinctis, pulmo à thorace distare uidetur: quod fieri non posset, nisi spiritus aliquid per substantiam pulmonis transiliens, in amplam thoracis capacitatem transiret: id quod certe Erasistrati opinioni aduerfatur.

Pulmo à thorace distare uidetur in animalibus quomodo cunctis extinctis.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus Liber IX.



Vonam pasto ea quæ in cerebro & spinali medulla per confectionem apparent, optimè quæcque intueri, tum mortuo, tum uiuo adhuc animante, hoc libro indicabimus. Quæ autem anatomie quæ in cadauere celebratur, cuiusque particulæ naturâ & situm indicet, in uiuo autem, interim functione ostendat, interim autem ad inuentionem huius, rationationes exhibeat, manifestum utriusque, mortui animantis confectionem præcedere eam oportere, quæ in uiuo administratur. Igitur omnibus caluarie exemplis, membranam quæ cerebrum in orbem contegit, quæque dura siue crassa appellatur, ad amulum suspicies, iuxta mediam ipsius longitudinem multâ crassiore scilicet apparet. Pari modo sub futura quæ à Græcorum literæ Λ similitudine appellatur labdoideæ, crassam ipsam membranam, duplici structam plexu, cerebrumque aliquatenus ingredientem, cernes. Venæ porro per ipsam utriusque singulæ iuxta futuræ labdoideæ latera excurrunt. Vbi uero hæc in idem mutuo coierint, altissimus is ferè est locus, eorum qui in orbem circumiacent: quam regionem Herophilus uocat lenon, à rotularis similitudine. Non autem æqualis ab eorum prior, tum posterior cerebri pars existit, sed anterior est multo maior. Verum ad id quod elatissimum habetur, alter etiam crassæ membranæ implexus accedit, necnon tertia quædam alia uena, præter duas prædictas, ad longitudinem porrigitur in anteriora excurrens. In superficie uero, alius uenarum exilis, quæ leno incumbunt, egressus est, iuxta illam partem, ubi futura labdoideæ osibus. squamatis connectit. Quapropter uenas hæc superficieras prius secabis ad leni usque summitatē. Dum autem secas, primùm uacuabis, si grumus quispiam in ipsis coalescit: deinde internam membranam superficiē intueberis, quomodo substantiæ speciem, etsi non tenuitatē, uenis habet simillimam. Inde tenues uenas ab utraque leno rum parte orientes spectabis, nonnullas quidem admodum graciles, quasdam uero ampliores. Cernes autem has quidem à parua leno, quæque in superficie est, in propinquas cerebri particulas superficieras disseminari: illas uero ab altitudine ma-

gnam, tum in posteriore totâ cerebri partem, quæ à nonnullis cerebellum, siue parentcephalis dicitur, tum in priorē propagari regionē. Cerebello igitur uenæ se inferentes, & ab ipsi quæ per futuræ labdoideæ latera in lenum perueniunt, & ab ipso leno exactam uenæ tunici habent. At in ipsam cerebrum, quod nonnulli anterioris cerebri uocant, per crassam membranam, mediam exactè sitam, secantemque cerebrum in duas partes æquales, sanguinem denuat. Ceterum & hinc uenæ frequentes omnino per totam longitudinem, in utramque cerebri partem, sinistram & dextrâ distribuantur, omnes tamen exigue, duabus tantum exceptis, una quidem ad lenum, in anteriora penitus procedente, ad totius capitis longitudinem, altera uero multo maiore, neque propinqua admodum leni regioni, neque remota, sed in medio totius cerebri sita. Hæc uenæ in altum deorsum descendit, unde & multas rami propagatur. Spectabis igitur omnia hæc, priusquam cerebrum ali quæ ex parte diuideris, in sola membrana crassa. Nudabis autem ipsam tribus in locis, quousque & triplici plexu totum cerebrum secutur. Deinde iuxta sectiones tuas met digitis attolles scorum partem ipsius sinistram, atque scorum dextrâ, quibus contegebatur antenus cerebrum: scorumque similiter reliquam, quæ nimirum posterius: omnesque uenarum processum in tres totius cerebri partes disseminari conspicias, nonnullas quidem tam superficieras, ut ipsarum rami in conspectum prodiant: quasdam uero altè penetrantes: omnemque tenuem membranam, quam barbari piam matrem appellant, & quæ enumeratas uenas colligat, & cerebro extrinsecus circumdat, cum uenis ipsis in uentriculum illius descendentes. Hæc itaque secundam, quæ inuoluitur factus utero, referes, cerebro semper, etiam in profundo, coheret: crassa uero, ab illo plurimum distat. Vbi ea fueris intutus, quæ cerebrum ambiunt, opportunitatem iam erit cerebrum consecrare, anatomem ipsius exorsus à meningē illa tenui, bifariam anteriorem partem secante. Vnde abscisus uel auulsus uenarum exortibus, à priori aspicatus termino, sursum tuis ipsius digitis illam attollito, donec ad grandem uenam peruenieris, ex ea procedentē, quam in penitiora decliuem ferri retulimus: atque hic rursus in altum sublatam altè tenendam dabis: mox ipse iuxta longitudinem dissolues, utramque cerebri partem à mutuo connexu leniter tuas secernens digitis, quousque ad uenam in longum inibi porrectâ ueneris, quam prius magnitudinis esse notandæ commemorauimus. Post quæ uero decliuem illam uenâ, de qua facta est mentio, uideas, atque ipsius usum simul inspicere cognoris, uenâ ipsam à subiectis corporibus adimes, regionē interim quam detexeris diligenter inspicias, quæ calli imaginem refert, ita ut naturalis quædam inibi concauitas esse uideatur, quæ ex circumstantibus partibus portionem alimentum integrè elaborari recipit. Ceterum leniter auellere pergens, effigies etiam micram tenuium, quæ ad medium usque perueniunt uentriculum cerebri, inuenies. Notandum porro affectus uentriculorum cerebri, callosam illam portionem mac-

Parentcephalis.

*Cerebrum san-
guinem quæ
leno influit.*

*Meningem cras-
sam secare tri-
bus in locis cere-
brum.*

*Meningem te-
nuem cum ve-
nis penetrare ad
uentriculos cere-
bri.*

Lenon.

so

so

so

*Meningem pri-
mam ad men-
tem uentricu-
lorum cerebri.*

spicatus,

spicatus, quæ manifestâ adeo differentia à dissec-
tione cerebri particulis obtinet. Cernens autem in
his etiam plexus, secundarum modo efforma-
tos, cum quibus qui dem ascendit tum arteria,
tum uenæ, atq; in uarios ramos diffeminantur.
Quare plexus hos inuolatos seruire conabe-
ria. In prima igitur utriusq; uentriculi consuetu-
ne, plexum ductorum, atque adeo callosi cor-
poris in cerebro aspectus, tibi index fuerit. Mox

uero corpus illud, quod dextrâ uentriculû cere-
bri à sinistro dispekit, inspicito: quod eandem cû
toto cerebro substantiâ possidet. Atq; hoc iam
facile abruptum, si uolueris extendatur. At si hinc
quocq; totum ipsum simul cum unitis
particulis auferas, & uentriculi euentius, & ue-
na declinâ circa corpus quoddam turbinarum
discindi apparebit. Cuius uenæ propagines, te-
nuis quædam membrana, quemadmodum alias
omnes uenas, connectit: quæ à membrana subdi-
li, nec substantia, nec continuitate euariar. Atq; 30
huius membranz introitu, corpus illud turbi-
narum, cui uenæ incumbunt, absconditur: neq;
fieri potest ut prius ipsum uideas, quàm mem-
branas aliquatenus diuuleris. Quod si à basi il-
lius propter uerticè lineam rectam duxeris, ac
postea utriusq; tunicam incisam detraxeris, facile
corpus ipsum detexeris. His peractis sic, iam li-
cet antequam mediam turbini & uentriculorû
sedem detexeris, utraq; uenas considerare cum
plexu ipso, circa turbinarum tendentes. Si qui-
dem ubi corpus inter medullâ detexeris, mani-
festò illinc ipsa prodire conspices. Contegitur au-
tem ab illo corpore, præter iam dictas, quidam
alicius tertius uentriculus cerebri. Itaq; illis potis-
simum locis ipsum nudabis, per quæ uenæ, tan-
quâ foramina quædâ irruentes, priorib; uen-
triculis incidunt: nam media regio simul cum
anterioribus patebit ad ipsa foramina. Vocatur
porro illud corpus *vasculum*, ob fornicis simi-
litudinem. Quod si ipsum defeces, callus occur-
ret tibi, ut in uentriculis anterioribus. Ad basim
ipsius affirmatæ sunt uenæ, quæ concauitatem
fornicis permeat. Extrinsecus siquidem gibbû
habetur, intrinsecus autem cauum, quemadmo-
dum fastigiû fornicis. Cæterum si perpendas quo-
modo in animali uiuente omnes crassæ membra-
næ partes, caluarie adhæreant: cerebro autem
soli, quæ ad ipsius implexus est: credes utiq; uer-
ticem cameræ, siue fornicis, sursum uersum ten-
sum seruari, uentriculum sub se magnum effici-

entem. Sica utem quum priores enæ uentricu-
li grandiores existant, totum septi caput in subli-
me simul cum continuis corporibus attolli ne-
cesse est. Ea quo igitur corpora quæ superia cent
sublimia & suspensa sunt, latam intus trient uen-
triculorum capacitatè efficiunt, quam in consue-
tionibus perire necesse est, corporibus quæ su-
perstrata sunt delatib;us. Insuper meatus qui-
dam maximus tertij uentriculi basi subia-
cet, qui ex prioribus superfluitates recipit, nec
non ex *suprapositis* partibus. Omnibus igitur
quæ hic propofite sunt particulis probe dete-
ctis, tertium uidebis uentriculû, inter duos prio-
res, & quartum posteriore, medij. Etenim me-
atum cui pars turbinata infidet, ad medij uentri-

culum pertingentè cernes, ut foramina haud ex-
igua duo uideantur, unum ad cerebellum, alte-
rum ad medium uentriculum pertinens. At præ-
dictus meatus, qui ex medio uentriculo ad po-
steriorem peruenit, inter carunculas quasdam,
nates & testes cognominaras, quæ cerebri par-
tes sunt, cõstitit, peculiari uelutis tunica, qualis
nimirè est tenuis membrana cerebri. Quin etiam
alia particula cerebri tali meatui incumbit, eiq;
contegit, quæ uo similitudinem quam habet cû
uerme, excrementa uermicularis uocat. Cuius
duplex spectabis extremum: alterum in priori
parte corpori turbinato expositum: alterum
retro, ab elatiore cerebelli parte occultatum:
quo quidem ad anteriora reflexo, nudari prorsus
contingit quartum ultimûq; uentricu-
lum cerebri.

GALENI PERGAMENI de Vsupartium corporis huma- ni, liber I.



Orpora quæ nec undequaque pro-
priam habent circumscriptionem,
nec undequaque consuetudine sunt
alijs, ac omnia particule uocantur.
Quod quidem si uerû sit, mul-
tæ erunt animalium particule, aliæ sanè maio-
res, sicuti & aliæ minores, atque aliæ etiam om-
nino in alium speciem indiuisibiles. Vtiles au-
tem hæc omnes ipsi animæ sunt, quippe cuius or-
ganum corpus existit: & propter ea multum dis-
ferunt à seimicem animalium particulis, quoniam
& ipse animæ. Omnibus uerò aptum est corpus
animæ moribus & facultatibus. Equo siquidem
fortibus unguis & iuba est munitis: etenim ue-
lox, superbum, ac generosum est animal. Leoni
autem, uirgine animosâ & seroci, dentibus & un-
guibus ualidum. At cerno & lepore, animalibus
timidis, uelox quidem est corpus, sed nudum om-
nino, & inerme. Timidis quippe, uelo citas: ar-
ma uerò audacibus expediebant. Neq; igitur ti-
midû aliquod armauit natura, neq; audax qui-
piam nudum destituit. Homini autem (sapienti
enim hoc animal est, & solum inter terrestria om-
nia diuinum) pro omnibus simul defensorijs ar-
mis, manus largita est, instrumentum ad omnes
quidem artes perneccissarium: paci uerò, non mi-
nus quam bello, idoneum. Non igitur indiguit
cornu, aut ungula sibi innata, quam meliora il-
lis arma, quando cungi uolet, manibus possit ac-
cipere. Sed uelocior est homine leo. Quid tan-
dè est? Homo sanè equû domuit sapientia &
manibus, uelocius leone animal: quo utens, &
subterfugit & leonem persequit. Quin & sedens
ex alto, humilè illum percurrit. Non igitur est nu-
dus, neq; inermis, neq; facilis uulneratu, neq; cal-
ciametorum expertus homo, quum & thoracem
ferreum, & multiplicem cum armorum, tum e-
tiam calceamentorû atq; operimentorû species,
inter quæ sunt domus, turris, & murus, sua sibi
parare possit industria. Si autem innatû ei esset
cornu in manibus, minimè posset eis uti ad earû
rerum omnium compositionè. Iisdem manibus
homo uestem, rete, nassam, uelum, & sagenam

Nati cordis.

Vermicularis ex-
crementa cere-
bri.

Particula.

Animæ organum
existit corpus.
Moribus anima
est aptum cor-
pus, ut moribus.
Equi natura.

Leoni natura.

Timidis expedit
uolocitatem.
Audacibus ex-
pediit arma.

Homo sapiens
animal, & solum
inter terrestria
diuinum.

Manus homini
tribuitur uti à
natura, pro om-
nibus simul de-
fensorijs armis.

Equus uelocior
leone.

Homini præpar-
ata sunt.

Ventriculus de-
xteræ asque fini-
stæ carceris.

Ventriculus co-
rporis interius.

Ventriculus de-
xteræ asque fini-
stæ carceris.

Crassa membra
partes omnes
adhererent
caluarie, in an-
tâ uentris.

Ventriculus an-
terioris cerebri
asque posterioris.

Ventriculus cere-
bri.

Tertium ventri-
culum cerebri re-
priu uideri da-
ri priore, &
quartum poste-
rioris, medij.

contextit. Quare nō solum iis quæ in terra sunt animalibus, sed etiam quæ in mari & aëre, domina. At talia quidem homini ad fortitudinē arma sunt manus. Artamen pacificum & politicum animal homo, manibus & leges scriptis, & aras, & simulachra Dijs erexit, & uniuersa artium instrumenta construxit, commentariosque etiam speculationis eorū scriptos reliquit. * Vt aut sapientissimum omnium animalium est homo, sic

Manus esse organum sapienti animalium conuenientissima.

Manus esse artium organum.

Animam habere facultates quasdam à sua ipsius substantia etas, non posse tamen operari sine organo.

Particula non impellens animam ad agendum.

Animalia præfensuri sua animam facultates ab ipsi vili dote re.

Animalium natura à nulla fuit dote.

Animalia cetera natura potius quàm ratione innotant excretionem artem.

Homo ut corpus nudum, sic animam artibus destitutam habet.

Manus esse organum anter & sensu.

Rationis esse artem ante alias artes.

Apprehensio organi optimi constituitur, primis capis quod. Manus cum dote.

Nam si indiuisa mansisset, cōtingeret tantummodo sibi æqualem corporis cuiusque ad moti magnitudinem posset. At in multas partes diuisa, moles seipsa mole maiores facile amplectitur, & minimas quasque res exacte etiam uenatur, colligit. Quam autem eadē circum corpus sphaericum posuit in orbem contrahi, rectum autem & cauum si deliter etiam amplecti, manifestum est, utique omnem comprehendit figuram: quæ nimirū omnis, ex tribus lineis constat, aut curua, aut caua, aut recta. Ceterum quoniam corpora non pauca maiori mole sunt prædita, quàm quæ manu una comprehendere queat, adiutricem alteri, alteram natura æqualem manum adiunxit, ut ambobus ex oppositis partibus ea corpora complectentes, una manu maxima nihil finit inferiores. Nec uerò ad firmiter comprehendendum sat erat manus esse diuisam, nisi etiam

Manus omnem comprehendit figuram. Figuram omnem consistere ex lineis curuis, & non rectis.

Manus cum bona.

Pollex non oppositus quatuor reliquis digitis. Comprehensio integra quomodo fiat.

Vnguis apertus ad apprehendendum debet summam partem digitorum aquare.

Particula uari-

etiam sibi inuicem consensit.

Manus apprehendendi gratia conuoluitur.

Pulchritudo vera, est constitutio optima, quæ aliusmodi exploratur.

Temperamentum completi particulari substantiam. Sensum singulum à temperamento quatuor qualitatibus primariis accideret.

10

20

30

40

50

60

matio,

*Alia omni- ma
que ex part. it
propria et, una
substantia pro-
cedit.*

*Manus et hic est
apprehensio.*

*Manus in dextra
et sinistra
sunt.*

*Vng. vicia ge-
nus pro ista erit
quod si viciis est,
viciis si cur me-
dus ver duri.*

*Vit. non rotunda
sed si flectatur
gratia.
In utrumque sola
in ista pati-
te agere.
Vng. cur sic
arguatur.*

*Vng. vicia an-
guis pro ista erit
quod si viciis est,
viciis si cur me-
dus ver duri.*

*Ossium genus
in digito gra-
tia non quod
melius est.*

*Digitorum sim-
plicitas ex res-
tione ossibus con-
sistat.*

*Figuram em-
plicitatis digiti
similitudinem
similitudinem
similitudinem.*

matioq. Ceterum maiori ex parte omnis actio à propria organi substantia procedit, licet interdum fiat propter aliquid consequentium, ut visio propter colorem. Debet autem ipsa actio esse in propolita indagatione, principium simul inquisitionis, & inventorum examen. Quoniam igitur actio quidem manus est apprehensio, apprehendere autem nihil possit ipsa immobilis per manens, utique precipua ipsi actionis pars erit, per quam movebitur. Quam autem omnes voluntarii motus, quales manus sunt, à musculis fiant, hi utique, primum monitionis organum manus erunt: alia vero universa, hæc quidem, ut melius actio fieret: alia, ut sine quibus fieri non poterat: sicuti & alia, pro custodia omnium horum condita sunt. A genus quidem unguium, gratia eius quod est melius, videlicet factum: quum absq. illis manus apprehendere possent, at non æque feliciter. Eorum autem securitatis natura prospiciens, medicocriter ipsos duratos effecit, ut neq. unguis, cuius gratia facti sunt, quicquam decederet, neque ipsi facile paterentur. Omnes siquidem animalium particulas prominentes & nudas, ex tali substantia creavit, quas neque quasiari facile propter mollitiem, nec rumpi propter siccitatem posset. Etiam securitatis gratia rotundi constructi sunt ungues. Sola quippe figurarum rotunda ad viam parientium exquisitè comparata est, ut quæ nullum expositum angulum frangi potentem habuit. Sed quoniam scalpendo, vel aliud quodvis unguibus agendo, exteri debebant nobis eorum extremitates, solas las animalis particulas ita constructis natura, ut semper augeri possint, quamvis iam totum corpus augeri desierit. Augentur autem, pilorum instar, in longum tantum, subnascensibus alijs semper unguibus novis, & veteres propellentes. Ossium vero genus in digitis, quod & hoc ipsum gratia eius quod est melius, factum sit, hinc discas licet, quod moveri quidem multiformiter inesse sit, vel sine ossibus, sicuti polyphobus: firmitatem autem in actionibus nunquam haberemus, ætantes dura & obfistente particula: & quod inest propter morbum tremantibus, id nobis inesse semper natura. Ad hæc, si sine ossibus facti essent digiti, illas actiones solas probe perficerent, in quibus eos circulo implicari oporteret, circa comprehensibile. Si autem unicum os haberent, illas actionibus solis recte servirent, in quibus eis egeremus extensis. Quia vero nec sine ossibus, nec ex uno solo creati sunt, sed ex tribus inuicem per singulos connexis articulis uniusquisq. est factus, ob id sanè ad omnem actionem promptissime figurantur. Pleunque enim quum neque omnibus extensis, neque omnibus curvatis egeramus, aliquando quidem primum solum, vel secundum, vel tertium articulum: aliquando autem, vel primum simul & secundum, vel secundum & tertium, vel primum simul & tertium extendentes aut flectentes, hoc modo sex figurarum universales differentias exprimitur: articulus autem secundum magis & minus, innumeras. Est autem mollis carnis generationem natura, nõ quidem in externa digitorum regione, quod illi esse futura oneri,

sed sub internis partibus, ut quum eius consistencia sit mollis, & occurrentibus cedat leuiter, ossium rectitudinem corrigat, quando est altior circulo comprehensura. Proinde in articulis quidem perpaucam, plurimam in partibus inter articulos medius carnem produxit. At late ribus digitorum, tantum carnis adnasci fecit, quanta medium inibi spatium repletura erat. Hæc igitur tot & talia commoda, manus à carne obtinet: præterea etiam, ut fricat, & molliat, quæcumque moderatè mollibus instrumentis egerit, qualia in omnibus artibus plurima existit. Propterea igitur hæc sunt carnis manus utilitates. Communis autem utilitas, quod veluti propugnaculum quoddam & regmen sit, adversus omnes tam frigidas, quam calidas iniurias extrinsecas, calidam in se quandam humiditatem possidentis, eademque utrique intemperantis resistens, ut balneum. Si quidem nihil inuenias quod valido xstu occupatos præsentius refrigeret, aut rigentes frigore, promptius calefacere queat, quam balneum. Quum enim natura humidum sit, & moderatè calidum, humiditatem quidem, naturam ex calore siccitatem irrigat: caliditate vero, ortam ex gelu frigiditatem perfrangit. Quum igitur omnium digitorum actiones, per ossa tria compleant, consistant sanè quod nec pauciora, nec plura tribus illa fieri expediebat: quando si plura essent, minus firmam extensionem præstarent: sicuti si pauciora, tam diversas particulares figuras digiti non haberent. Manifestum præterea est, positorum os minus esse debere, quum prolocatum, à quo utrique vehitur: & quod in nalde paruum atq. rotundum desinere digitorum summitates oportuit, ossium magnitudine decrecente paulatim, ad optimè apprehendendum. Quod autem unumquodq. os extrinsecus quidè exactè conuexum sit, intus vero & in lateribus non exactè, id melioris gratia factum existimo. Internis siquidem partibus suis ipsi digiti molliunt & terunt, ac breuiter omnia accipiunt: quæ quidem deterius fierent, si ossa inibi conuexa fuissent. Externis vero, quum nihil agant, reliquum fuit ut ad solam patiendi difficultatem exquisitè constructi essent. At in lateribus, ut nullum in medio spatium vacuum, dum adducuntur, relinquere, hac parte eos minime curuos fieri expediebat. Quare mentis magnus digitorum supernam, si cuti & paruis inferni circumlarentibus exactè conuexam obtinet, quum ab hac parte neuter illorum aut ab aliquo custodiri, aut alteri adiungi debeat. Sed neq. simpliciter, neq. à casu aut temerè, ex tribus ossibus unusquisq. digitorum est factus: sed veluti inuicem cardines, ita & articulorum unusquisq. eminentiam cavitati appositè immisit, & æqualem sortitus est. Quas quidem cavitates ossium, quasi supercilia eminentia circulo ambiunt, ad maximam firmitudinem articulorum, ne aliquando excidant. Ad facilitatem autem motionis, atq. ossium securitatem, auxiliu duplex excogitavit natura: unum quidem, cartilagine os utrumq. subungens, obliensque: alterum vero, ipsi cartilaginibus humorem unctuosum & viscosum, veluti oleum quoddam, suffundens, per quem faciliè mobilis, & attri-

*Cave non solent
sa interna digi-
torum regionis,
minime autem
externa.*

Balnei visum.

*Digitorum om-
nium actiones
per tria ossa com-
pleti.*

*Os positorum
proleat mi-
nus esse debere.*

*Digitorum ossa
curvata quod
exteriora sunt
vero non
unquam, sicut
in lateribus.*

*Ossium structura
in digito.*

*Supercilia em-
inentia cantia-
tes ossium, quod
ambiant.*

*Motionis articu-
lorum in digitis
auxilium duplex.*

ru cōtūmāz omnis articulatio ofsiom est facta.

Vt oerō longē adhuc tūius articulus omnis inconcussum custodiretur, ligamenta quādam ex utroq; ofse produxerūt, ab uno uidelicet in alterū peruenientia: maxima quidem crassissimāq; ad præcipuos articulos continendos: minora uerō ad minores. Cæterū labia ofsiū, extrinsecus quidem maiora sunt, intrinsecus uerō minora, tum propter firmitudinē extensionis, tum propter flexionis diuersitatē. Sunt autem dura, densa, medullisq; experta digitorū ofsa: quia nuda sunt omnia, & propterea facile patibilia. Nō potest tamen rectē iouenturi utilitas partis, antequā eius actio nōscatur. Quōd igitur principiū neruorum omnium cerebrum sit, atq; spinalis medulla: & quod ipsius rursus spinalis medulle cerebrum, arteriarū uerō omniū cor, ut hepar uenarum: & quod nerui quidem à cerebro animalem uirtutem, arteriæ autem à corde pulsantem, sicuti uenæ ab hepate ueterariam accipiunt, de monstratum alibi à nobis est. Erit itaq; usus quē præstant nerui, facultates sensus & motus à principio in partes deducere. Arteriarum autem, custodire naturalem caliditatem, & nutrire animalem spiritum. Sanguinis autem generandi, si mul & in omnes partes ferēdi gratia, factæ sunt uenæ. Quum igitur digitorū ofsa ex se moueri motu uoluntario oō possent, natura ex cubiti musculis productos tendones, secundum rectitudinem digitorum deduxit, eosq; inseruit in articulos singulos, hoc est, in caput secundi ofsiis, quod nimirū monendi erat. Quorū generatio tendonū, ex neruis & ligamentis in musculos dispersis, rursusq; inuicē cōiunctis, est. Sentiant itaq; & mouentur motu uoluntario tendones, ratione neruorū ex quibus constant: colligant autem musculos ofsiibus, ob ligamenta quæ in se recipiunt. At ligamentum ipsum album, exan-

numerus prius
cipium ofi cere-
brum, & spina
li medulla.

Cor ofi omniū
arteriarū prin-
cipium.

Hepar ofi uena-
ri omniū prin-
cipium.

Nerui dolentia
facultatem sensu-
s & motus.

Arteriarum nu-
merus.

Venarum ofsa.
Tendones mouē-
tes digitos præce-
dere à cubito mus-
culis.

Tendonū ge-
neratio & ofsa.

Ligamentū ab
ofse transire in
os, ofsiq; in ofsi-
bus penetrare, nec
posse quicquam
mouere.

Extriusus articu-
li sit ab exteriori
tendone.

Intus articuli
sit ab interiori
tendone.

Tendones car-
posi sunt membra
na atq; rotundi
sunt.

Digitū quadri-
fartum mouē-
tem, quatuor of-
sa applicantur ten-
dones.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

Pollicis tendō-
nes & ofsa.

quidem quæ est uersus in dicem, paruum & tenuem habet musculū altera uerō parte, ubi manus assurgit, hoc multo maiore. Reliqui omnes quatuor digitū, intus quidē duos tendones magnos, foris uerō unum sortiuntur, alteri illorū, scilicet minori, æqualem: tenuiorem autem hoc, eum qui ad latera exteriorū partium peruenit: reliquū uerō omnium tenuissimū ad latera partium interiorum attinent. Ac sic quidem recte natura, molem ipsorum tendonū, ætionis & utilitatis excellentiæ respondentem constitu-
xit. Quum enim quatuor digitis flexis plurimas & uehementissimas æctiones obeamus, nō magnos tantum ipsos tendones ioterinos, sed etiā duplices erat nobis opus habere. Contrariæ res habet in magno digito. Ad nullū enim aliam æctionem nobis flectendum est, nisi quando alijssimam curuati illum desuper insicere oportet. Quia uerō primus eius articulus ofsius est, ad eum nullus interna parte tendit applicatur, sed ad secundum & tertium duntaxat eius articulum, unus exiguus peruenit. Porro duo illi tendones qui extrinsecus apparent in magno digito, si ambo quidē tendant, digitū tendunt ex ætē: si uerō alter eorum, partem alteri sibi proximā ad latus trahit. Atq; æctionem quidem tendonis ad indicem perducentis, musculus paruus fuscipit, ad hoc ibi locatus. Contrariam uerō, magnus, qui in palmæ altiori parte, quam thenar oocant, con-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Digitus unum
versus in aduoc.

Flexit ubi di-
gitus cur magis
duplexq; tend-
ones sunt dati.

Pollicis tra-
do-
nes car l'ea.

Themar.

Natura premi-
dentia.

Neptulorum de
neruatione et do-
plices.

Tendones in
articulis digito-
rum inferius
sunt.

uerq;

uero ad secundos articulos perueniunt, ibi rur-
sus tendo superior bifariam diuisus, & utraque
parte amplificata circa subiectum tendonem in
uolutus, internis partibus capituli secunda aciei
inferitur. At ille qui subditus est, solus inde ad
tertiam articulationem ascendens, ad caput ter-
tiæ & ultimi ossis digitorum, etiam ipse implan-
tatur. Flectitur quidem unusquisque qui iuxta
ipsum est articulus a dictis tendonum implanta-
tionibus: extenditur autē ab externis carpi ten-
donibus. Sed tendones interim, qui per profun-
dum feruntur, primū & tertium articulum unius-
cuiusque quatuor digitorum mouent. Qui autem
per superficiē, hoc est, exigui, ad unum, nempe
mediū, implantant duntaxat. Quia uero nulla
caro ex seipsa sensum habet, & absurdū erat ap-
prehensorem organum insensibilem tegi particula,
non paruam neruorum portionem in carnes ma-
nuum natura disseminauit. Ex quibus sic factis
musculis, produxit tendines, lateralesque unius
cuiusque digiti partibus eos implantauit: dextre
quidē manus, his partibus quæ uersus sinistram
iunguntur uero, eis quæ uersus dextram sunt fir-
mæ. Reliquos uero tendones, qui ad laterale unius-
cuiusque digiti partem perueniunt, a cubiti muscu-
lis generauit. Ceterum oriuntur ipsi tendones
ab eodē principio, quod iuxta carpi est, omnes:
feruntur autem ad digitos secundum rectas li-
neas, quales angulos a d caput ipsum efficien-
tes. Quare principium ipsum, summitates tendo-
num sectū ad seipsum cogit. Nam si cessantibus
motibus ipsi qui sunt ad latera, potius extende-
ris, uel flexeris digitos, extendente quidē te, di-
stabit: flectente autē, in idem mutuo cohibet. Ad
hæc, tenso eos coniungere possumus, si dextri
quidē digitorum eum, qui est in lateribus, sinistri
tendonē, sinistri uero, dextrū tendamus. Rursus
plurimū a seipsum abducemus, si ipsius quidem
dextri, dextrum, sinistri uero sinistrum similiter
distenderimus. Si uero nullo laterali tendono
agamus, sed externis tantum, mediam præ-
dictarum constitutionē habebunt digiti. Enim-
uero in unoquoque articulo, unica quidem no-
bis figura est indolens, media uidelicet: alie ue-
rō omnes utringue dolent, sed magis quæ longius
a media recedit. Omnino autē dolorificæ sunt ex-
tremæ figuræ, post quas nimirū nec flectere, nec
extendere licet. Merito igit inter omnes figuras
ea est maximè dolorifica, quæ dux quidem mo-
tionis muscularis, extrema contractione, huic au-
tem oppositis, perfecta extensione cruciatur. Fi-
guram uero mediam utringue circumstantes ope-
rantur, aut ambo musculi, aut alter omnino: po-
test tamen aliquando in ipsa neuter eorum ope-
rari. Ceterum paruorum tendonum motus non
poterit unquam magnis agentibus apparere. Nul-
la autem ex parte offendet digitorum flexio
aut extensio, etiam si abdicantur laterales ten-
dones: quorum is quidem imbecillior est, qui
est interior: uterque autē operatur tensis digitis,
quiescit uero flexis. Quum autem in utriusque ma-
nus digitis articuli triginta habeant, quorū u-
nusquisque in locis quatuor implantationes ten-
donū habet, præter primū magni digiti articu-
lum, qui secundū quidē lateri, extrinsecus ap-

plicationes tendonū recipit, intus uero nullam:
erunt utique omnes applicationes ad digitos per-
tinentes centum & duodecim. Porro firmæ,
utpote secundum animam animalis ridiculo, ri-
diculū quoque corpus natura tribuit: ad quod ma-
ximè licet cernere in formatione pollicis, qui &
paruus & ridiculus est, parūque ad indice distans.
Quod autē si pauciores digiti essent, multæ actio-
nes imperfectæ abolerentur: pluribus autē
ad nullam rem indigemus, id adeo periculosū
est, ut demonstrari non debeat. Quare pulchrè
quidē natura quing in utraque manu digitos fa-
brefecit, quæ ut est ne quid deficiat sollicita, ita ni-
hil frustra operatur. Cur autem inæquales digi-
ti omnes sunt facti, atque medius omnium lon-
gissimus? Sanè quod eorum summitates ad æ-
qualitatem uenire melius erat, quam magnas a-
liquas moles in circuitu comprehendit, & quū
in seipsis humidum uel paruum corpus contin-
ere conantur: ad quod quidem inæqualitas digi-
torum utilitatem præstat manifestissimam.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium lib. II.

VNumquenque autem musculum, ex ipso
quæ radius & cubitum circulo compre-
hendunt, a deo adornauit natura, ut ne
construendo quidem melior ulla posset excogi-
tari. Porro musculorum omnium cubiti & ma-
nus numerus, ad uiginti tres peruenit. Septem
nanque parui sunt in manu: alij totidem magni
totam anteriorem regionē cubiti, ut reliqui no-
uem totam anteriorem occupauerūt. Parui ita-
que manus extremæ musculi, duces sunt alteri-
us obliquo rum motuum. Eorum autem qui
sunt intra cubitum, duo quidem maximū, digi-
tos flectunt: magnitudine autem his secundū,
duo etiam numero, totum carpus: obliqui ue-
rō duo, primū quidem radium, cum eo autem
& totam manum, ad pronam figuram circum-
agunt. Reliquos eorum septimus, qui minimus
est eorum qui in longum extensi sunt, nullum di-
gitum mouet, sed alterius utilitatis gratia factus
est, quam procedente sermone enarrabo. Ex ip-
sis uero nouem musculis qui in cubiti externa par-
te consistunt, unus quidem digitos omnes, præ-
terquam magnū, extendit: duo autem alij eorū-
dem quatuor digitos ad transversum abducūt.
At quartus alius muscularis, solum magnū di-
gitum mouet, altero motu exteriorum duorū,
scilicet obliquiori: alius item unus reliquum ma-
gni digiti motum præstat, moderatèque carpus
totum extendit. Fornit autem hoc circa car-
pum efficiunt alij duo musculi: reliqui uero duo
conuerntes a d figuram supinam radium, cum
eo & totam manum, ad eandem ducunt figu-
ram. Ceterum in tres magnas partes tota ma-
nus diuiditur: quarum una brachium, alia cu-
bitus siue ulna, tertia appellatur* extrema ma-
nus. Sed de brachio quidem nunc sermo non
est suture. Cubitus dicitur totum membrum,
quod est inter articulationem carpi & anconis
medium. Ancon autē est pars illa cui innititur,
& quam etiā totius nomine appellant cubitum,

Implantationes
tendonū ad do-
gitos, centum et
duodecim.
Summus rici-
culus anima ri-
diculū corpus
tribuit.

Naturam ni-
hil frustra ope-
rari.
Digitos inæ-
qualiter ad
quid extendi
cat.

Musculi cubiti
et manus, uiginti
tres.

Musculorū ma-
nus vsus,
Musculorum cu-
biti vsus.

Manus totius
dicitur.
Brachium.
Cubitus.
Extrema ma-
nus.

Ancon.

Carum omni-
um est ex se insensibilem.

Tendones digito-
rum uide omnes
manuum.

Figura indolens
est in singulis ar-
ticulis mediæ.

Figura extrema
fuit dolorifica.

Figura mediæ
qui hant.

Tendones later-
alium conside-
ratis.

Articuli omnium
digitorum ma-
nus, triginta
habent.

Extremū ofissimū cubiti, alterū quidem maius, cuius pars est ancon, specialius uocal cubitus, quod in media manu figura, ofsi alteri, nempe

Radius.

*Processus cubiti.
Digitorum sin-
guli proprii
adesse maximo*

*Manus musculi
spectrum.*

*Tangitū tū in
mano a quo per
sualet videtur.*

*Corpi motiones
quos, & a quo-
bus proficiscen-
tibus.*

radio, subiacet. Gibbi uero processus ofissimū radii & cubiti, qui carpo inserunt, uocant quidē & id ipsum quod sunt processus, & interdū capita, & tuberanda. Vnicuique igitur digitorū proprius unus paruus musculus inest: duo autē alij maximi in manu thenara generāt, per quos tum carnosā pars manus alta, media uerō caua efficiuntur digitorū uterq; maximus & minimus, plurimū abducuntur ab alijs. Qui autē inter magnū & indicē cōstitit musculus, eam partē replet, pollicemq; adducit ad indicē. Inferunt tamen in ipsum pollicē alij fortiores tendones, i musculus ulnæ producti. Quare quū quatuor quidē sint qui quatuor dignis insunt, duo autē circa magnum, alius uerō unus ad parūū digiti, rationabiliter omnes manus musculi septē sunt facti, a quorū singulis haud ab re unicus est tendo productus. Eam uero duo illi musculi, qui intra cubitū siri, ipsos dignos flectunt, mediū exquiritē regionē obtinent: quoniam & capita tendonū flectentiū digitorum, ad mediā regionē peruenire erat melius. Vtriusq; uerō unus est flectēs carpi. Alij autē duo intrinsecus in ulna cōstitit, eam ad obliquū ducentes. Reliquos extensorū secundū longū musculorū intra ulnā, tenuissimos omniū, in superficie cōstitit, a quo quidem unus tendo productus, sub interna cute manus disseminat, nullū quidem articulū mouens, sed ipsam perficiens tangendi uim, quæ ad apprehensoriam requiritur. Exteriorū uerō cubiti musculorū, qui quidem extendit quatuor digitos, in superficie sub ipsa cute locatus est, mediū maximē torius membrum regionem obtinens. Alij autem post eum, obliquē ad mediā descendētes regionem, tribus quidē maioribus digitis, duo: reliquis uerō minoribus, reliquas explantationis mittit. Reliquorum uero trium, unus quidē qui in ulna est, carpum tendōne simplici extendit: qui autē sunt in radio, alter quidem condylum eius transcendens, obliquus, in duobus diuisus, extendit simul carpum, & magnum digitum abducit ab alijs: reliquos autem extrinsecus, ad pronum circumducit extremam manum, atq; ipsam carpum extendit. Sunt & alij duo in ulna, ipsam circumuertentes: obliqui quidem, quoniam & motus quē efficiunt, obliquus est: peruenientes autem ad radij os, quoniam hic motus est actio dearticulationis huius ofsis, quæ ad brachium cōstitit. Apparent itaq; nouē quidē externi, septem autē interni musculi, si annumeres duplices illos musculos, qui circumagunt obliqui ulnā. Nam qui manus grātia sunt conditi, septem quidem externi, quinque interni habentur. Quum autē quatuor sint motus carpi, extensio, flexio, ad pronum circumductio, & ad supinum: duo quidem tendones & musculi sunt duces flexionis, duo autem alij extensionis. Hi uerō ipsi etiam conuersiones laterales cōnstant ad pronā figurā, simul a diuante quippiē quo musculō, qui in externa ulna locatus, definit in medium potissimū metacarpium, per tendonem duplicem. Flectentium igitur carpum tendonū, alter quidem ad

eam quæ supra paruum digitum, alter autem ad eam quæ supra magnum est, regionem internā peruenit. Ad eundem uerō modum extendentium uterq;, hic quidem supra paruum, ille autem supra magnum digitum, superna parte implantantur. Ac si utriq; sanē tensi fuerint, flectit quidem internū, tendunt externi manum: tensio uerō alterutro ipsorum, altero quidem qui ad magnum digitum, parte interna, altero autem qui ad paruum, parte externa est, ad pronū sensim quodammodo manus circumducitur: eo uerō qui ad paruum digitum, tensio intrinsecus, uel eo qui ad magnum est, extrinsecus, ad supinum. Si uerō simul tensi fuerint, & qui ad magnū digiti intrinsecus est, & qui ad parūū extrinsecus, non amplius sensim, sed quamplurimum sic ad pronū circumagitur manus. Ita etiam & eo qui ad paruum digitum intrinsecus est, & simul eo, qui ad magnū extrinsecus, tensio, admodum manus supina fit. Distingere autem oportet carpi motus, a moribus torius ulnæ. Sunt enim & huic quatuor motus, proportionē quatuor moribus respondentēs, qui ab ijs, quæ ad brachii sunt, dearticulationibus sunt. Etenim extensam, & flexam, & circumductam ad pronū & supinum, uidebis totam ulnā, quiescente manu. Sed extensionē quidē & flexionē, ulnæ dearticulatio, quæ est ad mediā brachij, efficit: circumductionē uerō ad latera, articulatio brachij ad externum eius caput. Ac duo quidem musculi ad pronum circumducunt, duo autem ad supinum conuertunt radio: nam satis fuit duobus musculis, quā uni talem motum cōmittere. Eorum autem musculorum, hic quidem in supernas partes quæ iuxta brachii sunt: ille in infernas, iuxta carpum inseritur: fertur uerō ultra amplius uterq;, neq; in ipsas solim inserunt extremitates, propterea quod carnosus partibus immitruntur, antequam in tendones definant. Ab eis siquidem nullus tendo producit, quū impossibile sit ita propinquis sibi ofsibus, incipientem ab ulna musculum, in neruofam tenuitatem mutarē, inseri radio. Nervis quippe & ligamentis in carnes musculi disseminatis, postea paulatim in idē acueratis, generatio fit tendonibus: paulatim autem illud longiorē eget uia, & maxime quando ex magno musculo a ceruicio fit. Verum autem esse id quod dicitur, ostendit qui radio incumbit supernē musculus, a quo solo inter quatuor prædictos musculos, quod minimum & longissimus fit, membranofus iuxta finē explanat tendo, carus a partibus radio internis, prope carpum. Collocat autē natura, eos quidem, qui ad pronam figuram membrū circumducunt, ex internis partibus, omnium primos, securitatis grātia, quum plurimas & maximē necessarias, & uehementissimas, in hac figura, actiones obeamus: eorum uerō qui ad supinū abducunt, alterum quidē occultat in regione inter ulnā & radiū mediā, eum ab ulna in radiū producent: alterū uero imposuit desuper ipsi radio, longissimū faciendū hunc omnium, qui circa membrum hoc sunt musculorū. Peruenit itaq; elij superior quidem extremitas ad externam brachij partem: inferior autem,

*Vina quatuor
motus.*

*Maximi numer-
tories radii ad
pronum, sup-
inum.*

*Tendonum ge-
neratio.*

per

per quam mouet radium, in membranofum tendonem definit, applicatur intrinsecis eius partibus, prope ipsam cum carpo articulationē. Porro ubi quis uiderit, quando neruū aut tendonē aliquem praeferri opus est magnam ossis conuexitatē, unum horū trium fieri, aut cauari particulam, aut perforari, aut omnino circa basim eius, neruum inuoluī, nūquam autem nudum, aut non munitum uelū per conuexitatem, intelligit omnino tunc quantam artem in securitate singularum partium offendit natura. Ac tendones quidem ipsos trium externorum manus musculorum carpum mouentium, radix, & ulnæ caua excipiunt. Mox autem & ligamenti latius, & foribus, & duris, quæ ossa ipsa suscipientia producant, induuntur omnes eius loci tendones, ut neq; ab incidentibus extrinsecus promptē pariantur, neq; a duritie ossium lædantur. Iam uerō imbecilliores quidē actiones, paruis commisit natura musculis: ad uehementiores autem, non magnos solum, sed etiam binos fecit.

Quod pertinet ad carpi compositionem, is concavus quidem intus, conuexus foris, octo ex ossibus constat, quæ unum putabis esse, nisi prorsus membranas abfuleris ea cooperientes. Habet autē ad anteriorem sui finem, quatuor cavitates exiguas, quæ inarticulantur cum metacarpj ossibus, numero nimirum quatuor. Cartilago autē non has modō, sed etia eas quæ in ipso sunt carpo commissuras omnes oblinat: easq; foris cōprimunt membranas fortes, quæ sunt ligamenta simul ipsi articulis & operimentum, totis ossibus circumpositæ. Quatuor uerō metacarpj ossa sibi inuicē propinqua usq; ad digitos protenduntur. Distant tamen à se inuicem, nec sunt coniuncta, sicuti ossa carpi, quia plurimum inuicem distantibus digitis debebant articuli. Sed & figura, conuexa foris, quædem leniter, intus uerō firma magis facta sunt, ut possint ossa carpi locata, illorū speciem imitantur. Tam ligitur carpi, quā metacarpj ossibus robur colligationū a uulso est, ut minus laxentur in manus uelementi extensione. Extendimus autem organa quæ in carpo & metacarpio sunt, ut cavitatem quidem manus replamus, complanemus autem conuexitatem. At concavum effectū manu, prorsus cōtraria facimus, prius tenta flectentes. Quibus moribus minime obsequerent carpi & metacarpj ossa, si essent omnia unum simplex. Iam uerō si inter digitos & ulnam unum simplex os esset, ubi semel confringeretur, mox totum præter naturā haberet, utiq; unum existens ad quod minime accidere posset carpo, nec metacarpio, uel si aliquod eorum os confringeretur. Quinens ut omnino nihil pariantur, melius fuit ex multis componi, & potissimum ita duris. Cedentia enim occurrantibus ad suas articulationes, exoluunt ipsorum uiolentiam. Sagitta siquidem, rema cōnia facilius quā laxa penetrat. Ad hæc, multiformis figurarū uarietas, ad eam, quæ cōmunis est, patendi difficultatē conducit incredibiliter.

At uerō primus articulus pollicis, ossi carpi propinquo inarticulatur. Nam si alicui ossi metacarpj cōmitteretur, parua utiq; effet ei distantia ab indice. Constat autē metacarpium ex quatuor

ossibus, quoniam quatuor tantum digiti in ipsum articulum debebāt. Carterum quia in carpo multa fieri ossa fuit melius, componi uerō fines eorum cum ulna non similiter ut cum metacarpio, in duos ordines ea digressi uat. Quum igitur necessariō sint quatuor metacarpj ossa, adiacet autem eis in uno ordine primū magni digiti os (quod sanē nonnulli propter hoc ipsum metacarpio attribuunt) & hic uniuersus ordo inarticulatur inferiori parti ipsius carpi, conuenienter ex quidem hæc pars, altera autem quæ ulnæ inarticulatur, ex tribus ossibus facta est. Quum itaque tres sint ordines inter ulnam & scissionem digitorū medij, qui quidem est ad ulnam, ex tribus ossibus quāmaximè iunctis: qui uerō deinceps est, ex quatuor laxius compositis: tertius deniq; huic inarticulatur, ex quinque compactus est, quorū unum quidem est magni digiti, alia uerō quatuor, metacarpj. Videbitur itaq; sic quidē carpus septē omnino constare ossibus, præter quæ est aliud prælongum, quod uehitur per internas eius partes, in quibus & inarticulatur ad tenuem ulnæ processum. Quoniam igitur carpum oportebat inarticulari ulnæ, ac radij finibus, conuenienter horum os utrumq; epiphysium habuit, gibbā quidē & rotundā extrinsecus, concavā uerō intrinsecus: sed epiphysia quidem radij, undiq; labij habet circumpositū, à quo exacte stringitur is terminus carpi, qui ad ulnam spectat: ulnæ autem epiphysia, nō amplius similiter, sed interna quidem sua pars, & quæ spectat ad radij, est similis: alia uerō extremas, quæ secundum longitudinem & rectitudinē totius membri extat, in rotundū caput finit, quo circumdatur locum ibi os carpi, cōcavitatē leniter profunda: ut duplex sit articulatio in carpo: altera quidem finium ipsius carpi ingredientium cōcavitatem inter epiphysiam radij & ulnæ mediā: alia autem parua, ossis circumplectentis parua apophysim ulnæ. Atq; hæc quidem gratia uersionis manus ad pronum & supinum facta est: propter aliā uerō magnam extenditur & flectitur carpi articulatio. Ob hæc sanē, gibbositates factæ sunt finium ulnæ & radij. Quia tamē extrinsecus quidē magna erat alitudo ipsi extremitati ulnæ, interne uerō partes imæ & demissæ, propter apophysim eius parua extrinsecus & inferne locatæ, posuit hic natura, ueluti quoddam uallum, prælongum os, intrō nutans rectum, à quo ea quæ ibi sunt sita, muniantur. Atq; hoc est os carpi octauum, de quo differere distuleram. Cuius finis quidē inferior, subtilis & cartilagineus est, ualidissiq; quibusdā membranis alligatur circumiacentibus ossibus, atq; in ipsum radij inferiorem ita tendo, qui carpum flectit. Quinetiā aliam quandam ualsorem ossis parui cartilaginosa natura creauit, per colligationes fortes copulati, partim huic nunc dicto ossi ipsius carpi, partim ei quod est post ipsum, articulo ad primam aciem magni digiti, ut & ibi cōtingat parte altera tendonem, à quo magnus digitus atq; carpus mouentur. Nam aliquis poterit hoc os numerare, sed non est numeratū ab anatomicis, sicuti nec aliquod eorum quæ *epiphysia* uocantur, quæ multis manuum & pedum

Carpi ossa octauum, qui uelut uer.

Epiphysia radij et ulnæ, quæ committuntur carpo.

Carpi articulus duplex.

Carpi ossis octauum.

Deonitidis.

*Tendones retin
dentes arg. fe-
cilius carpum.*

*Vina posuere
fla.*

*Radix deartica
laciona.*

*Radius curvatus
invenit.*

*Radius Cr. vlna,
quod pertinet
ad figuram Cr.
distinctionem,
discrimina.*

*Cornea.
Vina extenua-
tata figura.
Brachij epiphy-
sin.*

*Radius
brachij.*

Brachij capia.

*Brachij os
figura.*

articulus natura velut auctarij circumposuit, se-
curitatis gratia. Iam uero ex quatuor tendoni-
bus extendentibus & flectentibus carpum, qui
quidem extrorsum sunt, manifeste apparet obli-
qui, & perueniunt, hic quidē magis ad externas
partes aciei, quæ est ante parvū digitum: ille autē
ad internas aciei, quæ est ante magiū. Ad interni,
obliquiores quodammodo sunt, ut non solum
extendant, & flectant, sed etiam circumdu-
cant manū ad latera. Ad hęc positio radij,
obliqua merito fuit, quemadmodum ulnæ posi-
tio recta: hæc siquidē extensionibus & flexioni-
bus, ille uero cōversionibus ad latera subseruit.
Ob eam causam ad brachij utriusq; ossis dearti-
culario, dissimilis fuit. Porro superiore extre-
mitatem radij, ad caput brachij externum pro-
duxit natura: inferiore ad magnū extendens
digitum, quod uidelicet talis obliquitas multo
paratior sit, ut motibus ad proum obediat, qui
ad plures ac magis necessarias actiones sunt uti-
les. Cur autem incumbit ulnæ radius? quia hoc
illa longior est, & plurimum articulationis ad
brachium ipsa obtinet. Sed cur utriusq; partes,
quæ in medio quidem sunt, tenuiores: quæ in cu-
bito autem & carpo, multo crassiores existunt?
quia illas musculi locū præbere oportebat, has
crassescere per epiphyseas. Cur ex ipsis finibus,
ille quidem ulnæ, qui in cubito est, crassior: ra-
dij uero, is qui ad carpum consistit? an quid utri-
usq; est ad carpum dearticulatio? In ea uero
dearticulatione quæ est ad brachium, tantum su-
peret ulna radium necesse est, quanto ulnæ dear-
ticulatio cunctis manus actionibus cōmodior
existit. Sunt sane hoc loco quidam processus ip-
sius ulnæ duples, gibberosij quidem foris, caui
autem intus: unus ex posterioribus & infernis
ipsum partibus, qui certē & maior est: alter ex an-
terioribus & supernis, multo minor priore. Con-
uersis autem ad seinuicem corū cōcauitatibus,
una ex ambabus conficitur magna cauitas, si-
milis literæ græcæ S. quos quidem exortus uo-
cant *aspinae*: atq; hæc ulnæ extremitas talem ha-
bet figuram. Brachij uero extremitas hoc mo-
do secundum laterales partes capitis epiphyisin
habet: hanc quidem foris, illam autē intus: quar-
um in medio cauitas quædam est, ipsius & rotun-
da, similis rotularum uocatis cauitatibus, circa
quam ulnæ corneæ mouentur. Vbi autem ipsa
definit, utriusq; *balneus*, hoc est, brachij cauitates
constitunt, quas extendentibus totam manum, &
flectentibus, ulnæ *aspinae* ingrediuntur, suntq;
hæ extreme extensionis & flexionis terminus.
Quæ dearticulatio rursū simul & accommoda a-
ctionibus facta est. Porro brachij capitulum, alre-
rum quidem externum & minus, ob radij ad ip-
sum dearticulationem est factum: alterum uero
maius, quod intrō spectat, nullum os sibi cōiun-
ctum habet, sed nodus prominens, uasū munit
quæ illac pertrahit, in ipsiusq; annectuntur capi-
ta musculorum ulnæ interiorū, qui secundum
rectitudinem eius sunt sit. Non solum autē radiū
& ulnam brachio, sed etiam radiū ulnæ ualidis
ligamentis natura cōiunxit, ut omnia quamfir-
missimè cohererēt. Os igitur brachij rationabi-
liter quidem extrinsecus magis est gibberosum:

internis uero partibus magis simū, ut ad seinuicem
conuerterentur manus, id quod longē erat
melius. Talis etiam constructio brachia efficit
aptiora, ad comprehendendū cōuexa corpora,
preparando simul locum uasis, quæ ad rotas ma-
nus seruntur. Quum autē ulna duobus prædicta
motibus esset, extensione & flexione, necessariū
erat interna quidē ipsius brachij parte flexionis
ducem musculū, externa uero extensionis, loca-
ri, ut tum ipsam motionē ulnæ, tum brachio re-
gimentum præstarent. Ne autem regio illa quæ
inter ipsos musculos media futura erat, super-
na nempe & inferna, omnino nuda relinque-
retur, aut otiosa uetusta carne, fortiores simul ac
tutiores motus natura didicit, duplicata multi-
tudine musculorum. Ex utraq; siquidem parte
duos obliquos musculos in ipso membro pro-
duxit, figura simili X. græcæ literæ, sese mutuo
secantes, prope diuersas regiones: positione quo-
rum testis esse unūq; brachio contigit. Hoc autē
est dignū admiratione, quod binis obliquis mo-
tibus, unū rectum cōficiunt, quemadmodū car-
pum mouentes tendones. Atq; unus quidē mus-
culus flexionem ulnæ, ortū habet ab internis
partibus loci, qui ad humerū uergit: inde au-
tem perferitur ad anteriores brachij partes: alter
autem minor, explantationem quidē ab internis
brachij partibus habens, intrō illic paulatim
se se conuertit. Maiori porro musculo agen-
te, manus tangit internas regiones articuli, ad
humerum spectantis: minore uero, externas ipsi
oppositas. Eodem modo & posteriores brachij
musculos reperies factos, oppositum scilicet utri-
usq; interiorū, idēq; pari seruatā similitu-
dine. Ambo namq; inferuntur cubito, sed luvius
quidem maxima para, ad internas cubiti regio-
nes: illius autem, ad externas & prioris quidem
dictorum supernæ explantationes, in internis
brachij magis: alterius autem, in posterioribus.
Ergo musculi duo interni, secundum rectitudi-
nem quidem exactē tendunt ulnā, si ambo ten-
dantur. Sin autem alter quidem corū agat, alter
uero quiescat, parum à rectitudine uersus altera
tram partem desileat. Eadem ratio est habenda
iti extensione quam mouentur ipsi oppositi
musculi. Iam uero laxiora & cauernosiora, ma-
gisq; concava semper sunt ossa maiora cunctis
minoribus, ne maximo grauēt onere. Sed intra
cauitates eorū medulla repōita est, familiare os-
sibus nutrimentum. Enimuero in cubiti & carpi
articulis, non crassa modō, sed etiam dura quæ-
dam ligamenta utriusq; contranitentia, & prohi-
bentia, ne articulum ossa plurimum à mutuo
connexu resiliant, ac distent, sunt facta. Quapro-
pter etsi sepe uiolenter moueri cogantur, minus
tamen quā in humeris, articulum luxurio
accidit. Non enim fieri potest, ut os aliquod suo
articulo aberret, nisi plurimum à reliquis distet.
Non autem omnes articulos natura firmos con-
struxit: quoniam pugnam habebat necessariam
uarietas motuum, cum securitate constructio-
nis, nec poterant in idem cōuenire ambig. Sequi-
tur enim illa quidem laxitatem dearticulatio-
nis, hæc autem stabilitatem, & omni ex parte
constructionē. Quare cū duo sint quæ stabili-
tatem

Musculorum flexionem atque extensionem ulnam, qui sunt.

Musculi obliqui in brachio.

Rectum motum fieri à musculis obliquis in brachio, dum obliquo sinu ulna mouetur.

Musculi ulnæ flexionem ualde mouent.

Ossa maiora cur semper cauernosiora manent.

Medullam ossis familiare ossibus nutrimentum.

Motum variatum peruenire cum constructio non firmata.

Nemini autem
neculorum quæ
efficiant.
Humorum care
re quælibet con
fessionem & for
midine ligatus
tenent.

GALENI PERGAMENI
de vsu partium, lib. III.

MANUS homo omnium animalium solus
habuit, organa animali sapienti conuen
ientia. Bipes uero ipse solus inter pede 10

stria factus, & erectus, quia manus habuit. Cur
autem non habuit quatuor crura, & præterea
etiam manus, sicut centaurus? Quoniam primo
quidem impossibilis est ipsi naturæ, corporum
quodam differentium mistio. Neque enim si cotus
quidam ueneris homini cum equa fiat, perfici
ent matricis sperma. Quare quod de centau
ris fertur, omnino fabula est. Equa siquid æfina,
& æfina equæ poterit sperma recipere, perficeret
ad animalis multæ generationem. Ita & lupa ma
sculi canis, canis uero ipsa non lupi solium, sed &
uulpis, sicuti & uulpes canis. Equa autem huma
num semen forte nec receperit quidem in sinus
matricis: longiori enim pudendo opus fuerat.
Quod si quando id suscipiat, corrumpet utique ip
sum uel mox, uel non multo post. Iam uero si ho
mini quatuor adessent crura, esset ineptissimus
ad uniuersas humanas actiones, ac nec sedere
quidē posset. Etenim ut solus homo erectus sta
re, sic etiam solus sedere potest. Ad animalia cæte
ra, quæ destituta sunt manibus, oportuit hæc qui
dem anterioribus tibis cibū ad mouere ori: alia
uero, inclinata sumere. Cæteris quæ herbis uescū
tur, alia quidem foliis, alia uero bifidas habent
ungulas: carniuora autē, habitu seroci quā sunt,
nō solum habent multifidos pedes, sed etiam cur
uos ungues, firmissimosque fortissimi. Porro quæ
cumque omnino sunt timida, his neque folida un
gua, neque cornu, uel propaginaculi, inest, sed un
gula tantum tenuis bifida: atque hæc quidē incli
nata pascuntur. Carni uora autem anterioribus 40
pedibus pro manu utuntur, & ad retinendū ani
mal quod uenata fuerint, & ad cibū ori afferen
dum. Quæcūque uero animalia exanguia, ea sanē
frigidiori temperie sunt: quapropter imbecil
iora omnino, & ad motus pigriora, parus &
multis utuntur tibis. Quædam autem etiam ob
id prælonga totis corporibus facta fuerunt, sicuti
& iulus, & scolopendra, copiose tibiarum pro
ductioni natura locum suppeditante. Omnibus 50
fanguineis pedestribus, quæ maxime hominibus
assimulantur, quatuor sunt pedes tributi. Tut
ius siquid erat ipse, quatuor ambulare tibis,
quàm rectis fatis super duabus. Nam sic ambu
lantibus, uti ambulant, partes uentris, quæ sunt
offensis magis obnoxie, occultantur, & custo
diuntur à superiacentibus: expositæ autem sunt,
quæ sunt panibiles minus. Erectus autem accide
ret proflus contrarium. Neque enim manibus &
ratione utentia, quemadmodum homo, opposi
tura erant uentri externum aliquid propugna
culum. E contrario autem horum, homini melius
fuit esse bipedi, ut qui ea uelocitate, quæ ex tibia
rum multitudine habent animantia cætera, neu
tiquam indigeret, & ad multa, nisi bipes fuisset, 60

set, deterior futurus erat. At bipedes quidem &
aues sunt: rectus tamen solus animalium est ho
mo. Soli enim ipsi secundū rectitudinem crurū
spina est, ceu corporis quædam carina existens:
ad quæ crura ipsi, in auiibus quidem, ut & qua
drupedibus, angulum rectū efficiunt: solis autē
hominibus, instar rectæ lineæ extendunt. Quare
eorum animalium nullum unquam stare potest.
Sed nec federe, quod ad sedendum oporteat cru
ra coxis copulari, in femoris ad tibis dearticula
tione, retrorsum flexi, id quod fieri in illis non
potest, quum omnia nimirum antroriorum poste
riorum crurum habeant flexiones, quemadmo
dum priorū retrorsum, contrā quā in homini
bus cernimus. In eis liquidem manus ad anticā
cubiti partē flectuntur, quod melius sit eas ad se
cuberi: crura autē flexione in genu retrorsum
obnati, nam hoc solo modo pulchre licet fede
re. Vbi igitur unā rectam lineā efficiat spina cum
cruribus, ad tres differentias figurarū agi ani
mal potest: quā si ipsam quidem ipsā humi re
clinauerit, supinum omnino fiat: si uentrē, pro
num si firmetur pedibus, tum exacte stet rectū.
Si uero aliquem angulum crura ad spinam fece
rint, constat nullam earum figurarum exacte ef
fectam. Solus igitur omnium animalium ho
mo & rectus stare & sedere potest: etenim om
nes manuum in opificis actiones, duabus ijs e
gent figuris: hæc namque erecti, hæc sedentes con
fictus manibus. Nemo autem aut pronus, aut
supinus molitur quicquid. At opinari ob id rectē
stare hominem, ut promptē ad cælum suspiciat,
hominum est, qui nunquam uiderunt *æquatius*
uiscem: hic namque uel inuitus semper cælum
aspicit: quū homo, nisi collum reflexerit, cælum
nunquam uidere possit: qui reflexus etiam as
inis inest. Id autem nō est sursum aspiciere, quum
quis supinū se ipsum reclinat occisus, sed quan
do mente naturam rerum considerat. Postea igitur
quā ut manus apprehensionis, ita crura am
bulationis erat futurū organum, præstitit nō ro
tundos & duros, sed oblongos, largos, molles,
multifidosque subijci ipsi cruribus pedes: quum
uidelicet talis constructio, ad omnes locorum dis
culturares, & sicuti oporteat sublimes muros, aut
arbores, aut petras scandere, maxime opportu
na uideatur. Etenim equis & bobus, alijsque id ge
nus animalibus, quibus duri & uestiti sunt pe
des, melius fuit quouis modo ad patiendi dis
culturalē eos cōparasse, ut quæ nec manus, nec ar
tes habeant hominē uero, qui idoneū sibi calce
mentū inuenire potuit, sepe etiā nudis pedibus
uti, opus habuit præstitit esse eos tum detectos,
tum molles. Porro ambulatorio fit, altero quidem
crure in terra firmato, altero autem circumlato.
Sed firmat quidem, pedis: circumferri autem,
totius cruris est actio. Nec uero ambulantes tan
tum, sed currentibus etiam, alter quidē pedum
in terra firmus est, alter uero simul cum toto cru
re profertur. Cæterum mutare quidem loca, be
neficium cruris quod mouetur cōtingit: quod ue
rō non cadamus, hoc pēs in terram fixus efficit.
Iam stare quidem possunt, duobus martibus pedi
bus homines, moueri autem non possunt. Vidi
etenim quosdam, quorum digiti soli nūc mor

*Bipedi sunt
aues.
Bipedi est solus
homo.
Spina efficit
quandam car
inam corporis.
Crura in solu
hominibus ad
retulū lineam
subtendunt spina.
Quadrupedi
cor necesse
fideri.*

*Figurari posse
tripliciter ani
mal, si rectam
lineam efficiat
spina cum cru
ribus.*

*Stare solus
rectus homo, &
sedere potest.
Albent omnes
manuarias fi
ri, aut flectere
aut sedentibus
nobis.*

*Obporeat
piscis porpor
alijque calum.*

*Sursum affice
re, ut uenit na
turam rerum
fiderat.
Crura ambula
tionis organū.*

*Pedum consti
tū ralde op
portuna.*

*Pedi homini
prestitit esse
tum detectos,
tum molles.
Ambulatorio
quosdam fat.*

*Stare posse ho
mines duabus
martibus pedi
bus, moueri autem
non possunt.*

*Nemo solus
dare potest.*

*Animalibus
herbarum qua
uiscis.
Carni uora
qua infest.
Timida anima
liba qua ad
fuit.*

*Carni uora
autem uiscis po
dibus uiscis ma
nuarum.
Exanguia ani
malia cur par
te & numero
se ubi uiscis
inest.
Iulus
scolopendra.*

*Quadrupedi
bus qua omnia
dant alijce ut il
la corpora fa
briat.*

rificari exciderant: sed lii quidem, neq. stando, neq. ambulando, neq. item currendo, in planis saltem & laevibus, uncebantur à sanis, inutiles tamē & impotentes, ad pervadendum aliquem precipitem locum. Quibus autem non solum digiti, sed quæ ante digitos est, etiam planta composita, fallax liis gressibus est, etiam in planis locis. Si uero tardus etiam corruptus fuerit, non solum hi non possunt ambulare tuti, sed ne stare quidem constanter. Constat igitur hinc per firmam stationem amplius & oblongos pedes esse apppositos: quibus accessit multiplex illa fissura, necnon conspicua in medio cavitates, ad securitatem in gibbosis locis utraq. maximè cōgruens.

Stationi firmæ
amplius & ob-
longos pedes ef-
se appositos.

Per hominis imi-
tatur manum.

In rursu appre-
hensionis organum.

Tapis aqua-
parius carpo.
Pulvis, sine
glutina, est quod
metacarpi si-
mile.

Talus.
Calcaneum.
Nauiforme os.
Rafu intra-
mentum.

Pedum cavitates
libra.

Pedum partes
internæ, cur al-
ternæ, & magis
externæ.

Astragalus.
Talus.

Cubiforme
os.
Strapoides.

Tarsi ossa tria.

Calcaneus sub-
pendiculum co-
stituit.

eet toti membro: licet autem partibus inferioribus, firmationis stabilis gratia: nonnullum, ut non facile pateretur. Porro astragalus alius, alio nauiformi coniungitur, formæ similem perficiens figuram. His deinceps adiacent ossa tarsi, tria quidem nauiformi coniuncta: quartum uero calcaneo. Post hæc sunt plantæ ossa, terram post astragalum contingentia, & nauiforme, & continua huic tria ossa tarsi. Deinde sunt digiti, quorum maximus est non amplius ex trium ossium ordinibus, ut reliqui, constitutus, sed ex duobus. Ceterum ossi quod magno digito propositum est, duo uidentur subiecta esse inferiori parte, ueluti sustentacula quedam, & stabilimenta. Ac plantæ quidem, proportionem omnino metacarpio respondet. Verum in pede, seu uno ordine omnibus iacentibus digitis, quantus est illorum numerus, tantus merito est & ossium plantæ, quæ præponuntur illis. Sed nec carpi quidem ad tarsum proportio constructionis obicula existit. Si quidem ex quatuor ossibus tarsus conflatus est, ex duplicatis autē carpi, seu ex duobus ordinibus cōstans. Nam ex pluribus & minoribus componi particulis apprehensionis instrumentū erat expediens: ut ex maioribus, sed paucioribus, ambulatoriū. Anteriores igitur partes pedis adamusim perfimiles comprehenduntur, ex æqualibus illis numero ossibus constant. Posteriores uero, quæ instrumenta omnino sunt gressibus, nulli habent in manu proportionem respondentē particulæ. Reliqua pars media ambarum, qualis existit tarsus, utraque imitatur naturam. Os itaq. quod ab externis ipsius partibus est locatū, quod sanè & cubiforme dicitur, inarticulatum cavitati calcanei, ad finem adiacenti. Reliqua uero tria tres cubus nauiformis ossis obsequantur. Hoc autem ipsum rursus circumambit caput astragali, quicquid inter adnata tibiæ & fibulæ, supernè à lateribus, & præterea à tergo ab ipsis comprehenditur. Superiacet autem calcaneo duabus eminentiis, ibi in duabus cavitatibus eius firmatus. Atq. extendere quidem & flectere pedem, supernæ astragali dearticulationis est opus: ad latera uero circumferre, opus est dearticulationis quæ fit ad os nauiforme. At pedem & crus firmari, sicuti & sustinere uniuersum corpus, ad ipsum præcipuè calcaneum pertinet: quod os, ea de causâ non solum cætera ossa, sed ipsum etiam astragalum magnitudine superat, quod etiam habet articulationes firmissimas. Ut autem firmius dearticuletur, in medio ipsius & tibiæ astragalus est locatus, colligens illi ualidis ligamentis cartilagineis. Duxit porro calcanei naturæ, dura crura subducentia. Ad hæc, in se more quidem est unicum os, quemadmodum & in brachio duo autem in tibia tria similia, quæ in ulna cernuntur: quorum unum quidem uocatur tibia, alterum uero fibula. Maximum omnium corporis ossium femur merito fuit. Primum namque hoc, firmatum est cavitatē, primum omnem corporis molem superiacentem ueluti cursum quidem, priorē & externam partem

Astragalus nauiformis ossis.

Planta ossa.

Pedo magnus digitus ex duobus tantum articulis constat.

Planta proportionem metacarpio respondet.

Tarsus proportionem respondet carpo.

Cubiforme os.

Nauiforme os.

Astragalus.

Pedum partes à quibus dearticulationis præceduntur.

Calcaneum ossis maximum os, firmius dearticulationis.

Calcanei cavitates dorsales.

Pedo cavitates trium cernuntur gratia efformata est.

Tibia. Fibula. Femur ossis maximum.

reclum

*Blæfi ad genu
qui hant.
Femoris parvi
superiorem profe
de quibz coryle
fertur.*

*Femoris fractio
na obnoxa ad fuf
funt exiftit.
Tibia illuella-
na.*

*Digitorum pe-
do motus.*

*Tendinum vti
venit digitus
pedis, duo ten-
tium genera pre-
dicantur a ma-
iula tibia.*

*Tendinum qui
inferuntur pe-
dibus implica-
bant.*

refcitur uerò, partibus huius contrariis. Quibus enim femur fuerit natura rectius, quod conuenit, blæfi sunt omnino ad genu. Superiori ipsius femoris parti, ichn corylem præparauit natura sedem. Eius autem collum, itam ex coryle obliquum foras abscidit, ut relinqueretur locus internus femoris uasis & musculis: postea autem intro rursus reuertitur, uersus genu. Ad hæc, magis quidem sima retrorsum, antrosum uerò magis, curua quum sit structura femoris, ad fisiones idonea existit. Quin & tibiam ipsam circa suæ pernas partes magis curuam extrinsecus natura fabricata est, firmitudinis & uelocitatis ratione. Nam inferiores partes illius, quæ sunt ad malleolos, intro sese reflectunt. Quemadmodum igitur singuli in manu digiti, à duplicibus quidem maximis sectantur tendonibus: ab alijs autem simplicibus minoribus extenduntur: atque ab alijs adhuc minoribus ad paruum digitum abducuntur: ac denique ab alijs illis minoribus reliquis motus internus ad pollicem oblique agitur: ita dicamus etiam, & in unoquoque pedum digito hos quatuor motus merito inesse, quum à maximis quidē tendonibus digiti pedis sectantur, à minimis autem parte interna cōuertantur oblique. Porro media inter utroque est magnitudo extendentibus, & parte externa circumagentibus. Non tamen quæque magni sunt in pedibus sectentur, ac in manibus: quia non indidem ut manus, pedem cōstitueret oportebat instrumentum apprehensorium, sed basis firmæque organum. Quanto igitur pes manu est maior totus tota, tanto huius digiti, illius digiti, & tendonem tendonibus sunt minores. Non ergo fuit æquum, quatuor genera tendonū mouentū digitorum pedū à musculis tibiæ produci, quæadmodum in manu à musculis ulnæ: sed duo sola, nempe alterum, quod eorum extensionē efficere: alterū, quod flexionem primi & tertij eorum, qui sunt in quatuor digitis, articularum. Motus itaque cuius articulo digitorū pedis mollis est quatuor natura, & quinque principia ipsorum, ut in manu: non tamen omnia ex locis proportionē respondentibus prodeunt. Tria siquidem ab ipsis pedibus motus principia oriuntur, duo uerò deceduntur ex tibia. Etenim in ipso qui ad plantam est loco, musculos obliquo uerū interno prætoros cōstituit: in reliqua uerò ipsius parte tota usque ad calcaneū eos locuit, qui secundum articulum cuiusque quatuor digitorum sectant, magno digito excepto, qui à maioribus tendonibus germinationem inferam secundo suūspit & tertio articulo habet, ut si quis est in manibus. Pariter & ex superioribus pedis partibus alios posuit musculos, motui externo obliquo inferuent. Quare superius quidem ex tibia, duo principia motus descendunt: inferiore uerò parte prodeunt ex pedibus tria. Tendones in pedes inserti, modo quodam simillimo neruis à spinæ medulla colla in tota brachia productis, implicati, cōmiseruntur inter se, ut ostensionibus multo fortius resistant. Ob id ipsam nanque, uel ubi magnitudo interuallū magna fuerit, uel loci periculosus, ibi missionē huiusmodi machinatur natura. Musculi autē ualde parui, ab anato-

miciis non animaduerti, primum articuli cuiusque digiti sectantur, pariter in manibus, pedibusque. Iam uerò fines tibiæ, fibulæque simul inter se uniti & coniuncti, femori exacte in genu ipso adaptantur. In tibia porro tredecim capita sunt tendonum, retrorsum quidem sex, antrosum autem septem, mouentque pedem secundum omnes conuenientes eis motus. At conueniunt toti pedi abique digitis, motus quatuor, ut carpo. Etenim à musculo tibiæ superiorem antrosum, enascitur quidam tendo robustus, qui in duas partes diuisus, partibus circa magnū digitum pedis inserit. Ab eo uerò musculo qui fibulæ circumdeditur, prodens tendo alius, is inditur partibus, quæ ante paruum digitum sunt. Qui duo si utriusque tensi fuerint, attollunt, refumigique reddunt pedem uniuersum: altero uerò actionem obeunte, motus ad obliqua fiunt. Quinetiam ex posterioribus partibus, proportionē eorum qui sunt in manu, opposuit natura duas musculorum germinationes, quæ contrarios dictis motus efficiunt. Quarū minor à musculo, qui per profundum ferrur, orta, in eum, qui est ante magnū digitū, locum inferne implantatur. Altera uerò maior est, conspicuus ille tendo, qui in calcaneū, fortissimum omnium pedis osium, & principalissimum ambulationis instrumentum, retrorsum superne inferitur: qui uel si solus aliquando patiatur, pes necessarii claudicat. * Is tendo solus, ex tribus alijs in ipsum uenientibus, atque à maximis musculis ortis, consistit: ut si uel unus ipsorum, aut etiam duo afficiantur, reliqui, aut reliquos ipsam actionem obeat. Vbi enim hic tendo calcaneum ad seipsum trahit, sic membrū uniuersum obfirmat, ut si altero pede stare aliquando uelis, non possis facile euertere, neque labefactari. Meminisse autem in uniuersum conuenit, obliquos quidem in membris musculos, obliquos motus præstare: rectos autē exactam flexionem, aut extensionem moliri. Quum igitur tres furæ musculi ipsam calcaneum moueant, & depilem pedis partem constituent: post illos autem, tres alij digitos sectant, & in pede conuenientem partem edant, iure optimo posterioris tibiæ partis sex omnino musculi fuerint, unusquisque secundū rectitudinē particule quam est moturus, locatus. Quinetiam anteriores musculi tibiæ, sex aut septē censentur. Nempe unus, qui quatuor extendit digitos. Ex utraque uerò ipsius parte, rursus alius unus, qui in triplicia tendonum capita definit. Quibus tum ipsis, tum ipsorum utilitatibus, si quis intendat animum, ipsos sex, aut septem uniuersos statuet. Quid autem unguitas pedes proportionē respondeant manibus, quodque eis hoc ut apprehensorij organum inserit, uerbis nihil est opus. Cutē ipsam, non laxā, aut subtilem, aut mollem, sed cōstrictā & mediocriter durā, sensibilem, ut non facile patere, subdidit pedi sapientissimus ille conditor noster: cui commentarios hos ceu hymnos quosdam compono, in eo neram esse pietatē existimas, non si taurorum uel asinū plurimas quispian famificari, & cassas, aliaque secenta unguenta suffragari: sed si nouerim ipse primus, deinde exposuerim alijs, quæ nā sit ipsius sapien-

*Maxilli parui
in pede ab ana-
tomis ignora-
ti.*

*Tibia inesse tre-
decim tendonū
capita.*

*Pedi cōueniunt
motus quatuor*

*Calcaneum for-
tissimum omni-
um pedis osium,
& principalis-
simum ambula-
tionis organum.
Tendo in calcaneū
inferitur, ex
tribus alijs tendonibus cōstat.*

*Obliqui muscu-
li obliquos motus
præstent.
Recti musculi,
exactam flexionem
aut extensionem
moliantur.
Tibia posterioris
partis musculi
sex inesse.
Tibia anterioris
partis musculi sex,
aut septem.*

*Cutis pedis qua
substidia.*

*Commentari-
um hoc Deo, ceu
hymnos quosdam
conscriptis Cal-
lenis.
Pietas uera
qua.*

tia, quæ virtus, quæ providentia, quæ bonitas: ignorantio quorum, summa impietas est, non si à sacrificio abstineas. Quod enim calu cduenienti exornat omnia, nullig bona invidet, id per seculissimæ bonitatis specimen esse statuo. Invenisse autem quo pacto omnia adornarentur, summæ sapientiæ est: at effecisse omnia quæ voluit, virtutis est inuictæ. Ne igitur mireris, uniuersa cælestia corpora summo esse artificis disposita: nèue eorum ordo vel pulchritudo ad te attor-

rum confert. Cæterum quum tibiam portantis femoris gratia prestat esse maiorem, ut autem ipsa moueretur facili, minorem, essetq; necessarium alterum eligere, quum ambo simul conuenire uis possent: ratio quidem fuit eligere quod utilius, alterum uero non omnino negligere. Propterea igitur minorem fecit femore tibiam, non tamen usq; eo minorem, ut non possit iam tutò ipsam portare. Ad hæc, si abq; articulis fuisset constructum crus, nec extendi posset, nec flecti: in multas autem articulationes diuisum, lubricum ac fallax efficit adeo, ut nunquam constanter uno crure stare possemus, quin confectum circumuerteremur, & caderemus: Quare ipsa prudens natura, ranquam ex utroq; accepit, quantum neq; motus facilitare, neq; firmationis securitatem utrarum erat. Iam uero aduata ossis ipsius femoris, adeo congruentes in tibia carinates fortissimè, ut neq; laxus sit incessus ipsorum, neq; motu difficilis propter loci angustiam.

Tibiam esse
uicem femoris

Aduata femoris.

Ligamenta femoris tibiæ in tibiæ.

Patella ipsa

Crua regionem præter, quæ in prædictis solent.

Femoris ossis fac.

Insuperat summa quæ sit.

Bonitatis diuinitas specimen perspicuum.

Virtutis inuictæ opus.

Conditoris autem splendore etiam in uoluntate materia.

Idem reddit atomum pulchritudinis materiam.

Artificem reddit ibidem pulchritudinis artificem.

Hominis esse terram statuat. Solem esse pulcherrimum omnium quæ sunt in mundo.

Solem esse medium inter errantia sidera.

Mundi esse materiam & pulcherrimum rerum omnium.

Animal esse uolens parum midum.

Oculum esse organum lucidissimum, & quoniam simillimum soli.

Pes est uicem lumen cerebri.

Cerebrum præbet corpori sensum.

Planta pedis uide facultatē sensum suū.

Fibula extrinsecus tibiæ est attenta.

Fibula uicem.

10 nèue eorum ordo vel pulchritudo ad te attor-

15 nium reddat, ut si inferiora hæc comparaueris, parua tibi esse uideantur, & omni ornatu carere: siquidem sapientiam, uirtutē, & providentiam, hic quoq; inuenies. Nam tametsi ex sanguine menstruato & semine, immortale animal, aut imparabile, aut semper mobile, aut splendidum & pulchrum, æquæ ac sol est, non potuerit constitui, in ipsa ramē utilitate materiam, conditoris autem splendore. Antonium enim facit, idioram quidem, materiam autem, pulchritudo artificij. Etenim sol & luna, diuina quidem & cælestia sunt corpora: nos autem terre statuitur: opificis tamen industria in utroq; æqualis. Paruum & abiectum esse partem animalis pedem, quis inficietur: magnum uero & pulcherrimum omnium quæ sunt in mundo esse solem, ne hoc quidem ignoramus. Neutrum tamen corpus commodius potuisset locari, q̃ est locatum. In mundo enim medium esse solem inter errantia sidera, infimum autem in animali pedem, necesse fuit. Maximum & pulcherrimū rerum omnium esse mundum quis tandem negat? Sed & animal, ueluti paruū quendā mundū esse, aiunt ueteres naturæ periti: eandem namq; in ambobus inuenies sapientiam creatoris. Quid si solem quidem ostendere in corpore animalis non liceat, licebit certe oculum, organum lucidissimum, & quamissimū soli. Sed neq; oculo, nec cerebro deterius est pes constructus, si utraq; pars ad actiones cuius gratia fuit facta, se habeat optimè. Neq; cerebrum sine pede se probè haberet, neq; pes sine cerebro: eger enim, opinor, illud quidem uehiculo, hic autem sensu. Ve huiusmodi enim cerebri est pes, ac totum corpus reliquum: sensum autem ipsis cerebrum præbet. Etenim illius tendonis triplicis qui ad calcaneū descendit, superficialis portio ad inferiorem partem pedis prætergressa, cuti ad intrinsecum uestigium subducitur: profunditatis autem pedis, quæ est sub cute, in qua etiam duo parui musculi sunt, distribuuntur parua germina eorum neruorum, qui à spinali medulla oriuntur. Per quæ organa pars pedis inferior facultatem sentiendi suscipit. Ut autem neq; admodum sensilis sit, neq; promptè patiatur, excessus utroq; uitare natura, mediam exactè fabricata infernam pedis cutem, inter mollem & duram. Porro fibula extrinsecus tibiæ est attenta, tenuē admodū os, & multo minus quā tibia. Atq; una quidem subulsi utilitas est, & articulationis ad astragalum, à qua extenditur pes, atq; flectitur. Altera autē, quod omnia uasā & musculos tibiæ custodiat ab iniurijs extrinsecis. Tertia utilitas est in externo femoris capite, quod tibia sustinet. Ad id enim loci adfirmata, firmitudini & securitati non pa-

20 Circumposita quoq; ligamenta continent articulationem, adeo ut flectentibus nobis aliquando, aut extendentibus plurimum, femur à tibia non excidat. Patella quoq; uocata, os cartilaginofum, anteriores partes articulationis omnes coercet, prohibens quidem & ipsum femur probabi ad anteriora, atq; ne nos cadamus haud modicam præbens unitatē. Quatuor enim quum sit regiones circa articulum genu, anterior, posterior, dextra, & sinistra: anteriori quidem, ceu magis fallaci, cæterisq; magis laboraturæ, appositæ patellam: externæ, quæ periculis magis obnoxia est, quā interna, unum ligamentum rotundum, ualidūq; simul cum sine lati cuiusdā musculi applicuit: internæ aliud indidit ligamentum. At posteriori, plus nimirum laboraturæ, quā passuræ, neq; os neq; insigne ligamentum appositum, præter lata illa & tenuia, quibus omnis articulus copulatur. Omnes porro musculi in femore, senario numero ambiunt. Tres quidem maximi, qui in anteriori sunt femoris parte, recti ad genus feruntur: quorū unus quidem implantatur patellæ, duo autem reliqui, unum maximū gignunt tendonem, qui dilatatur, inhaeret etiā toti patellæ, constringens ipsam profus, & coniungens subiectis. Postea uero, præteruictus articulum, inferitur anterioribus partibus tibiæ, ipsam, si tensus fuerit, attollens sursum, & rotam extendens genu dearticulationem. Alij uero duo musculi utraq; prædictorū trium parte, hic quidem externus, ille autem internus, ad laterales tibiæ inferuntur partes, obliques mo-
30 noni utroq; præfectus. Qui namq; externus est, foras abducit: alter uero, crus intrò adducit. Enascitur autē hic quidem, ex cōmissura ossium pubis: ille, ab extimis partibus coxæ. In medio inter hos spatio, alie tres sunt musculorum implantationes, ordine posite, paruis motibus ipsum genu mouentes. Flectit enim quidam, & ad interiora adducit tibiā is, qui est interiori continus, flectit quidem totum quog; femur, cum eo autem simul & tibiam attrahit. Qui superest alit
nouem

30

40

50

60

nouem musculorū articulationem ipsius genu mouennū, strictus & longus ex osse illud ortus tollit sursum tibis, in illa maxime figura crurum stans, in qua emollescentes & iubigentes sursum ferimus pedem ad inguen alterius cruris. Præter hos omnes, est paruus musculus popliteus, qui seclit genu. Porro prima actio cruris, cuius gratia factū est, ambulatio est: ad quā tribus illis magnis musculis ipsum crus extendentibus (quibus debetur robur totius ferē motus qui fit in genu) maxime nobis est opus, quū nimirum toti cruri extensionem rectam suppeditent. Tribus autē his tres opposuit retroriorum natura, non quæ robustos ramen, neq. iu tendones, ut illi, ualidos definientes, quom non sit æqualis dignitas extendentis genu motus, & flexionis. At motus cruris ad latera, ex abundantia est. Descendunt autē musculi femoris semper ad caput tibi, per terita articulatione. Nam quæ admodum qui per quosdam funiculos lignea si mulachra mouet, ultra articulos ad caput membri mouendi, eos applicant, ita & natura multo prior quæq. articulum fabricat est. Ex dictis igitur constat liquidū, eandem cōuenientis animi moribus & potentijis uniuersas corporis particulas cunctis animalibus construxisse.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium lib. IIII.

Quandoquidē nutrirī necesse erat animalis particulas: ingressus uerō cibarijs in corpus, unus adeest per os: communis sane & maxima, primarij omnium uia est, quæ ab ore ipso fert ad uentriculū, quasi ad promptuariū quoddam, omnium particularū commune, in medio animalia positiū. Cuius uiz, nomen quidē propriū, œsophagus, seu gula est: communē autē, stomachus: at promptuariū ipsum, alimentum uniuersum excipiens, illud accutat elaboret, quod in eo quidē repenti inuitē, atq. crementum iam, infernē pellens: quod uerō benignum, utileq. per uenas quæ tum ad ipsum uentriculū, tum ad intestina peruenerūt, distribuens. Porro uenę alimentum ipsum, prius in uentriculo elaboratū, & suscipiūt auidē, & ad aliquem cōcoctionis locū communem totius animalis deferunt, quem nominamus hepar. Ingressus autē in locū hunc, multis angustis diuisum uis, unus est, quem appellamus portas. Nec uerō solum deducunt ex uentriculo nutrimentum uenę, sed attrahunt etiam illud ad hepar, preparantq. modo, quo ipsum, simillimo: quippe quæ natura sint illi similes, & primum germen ex illo ducant. Ipsum autē hepar, postquā id nutrimentum acceperit, à famulis iam preparatū, obcuramq. sanguinis speciem referens, inducit ei potestati ornatum, ad sanguinis exacti generationem. Ac uelim impræsentiarum intelligas, distributū à uentriculo ad hepar chylum, à uisceris caliditate, ueluti unum in dolio mustum, feruere, concoqui, alterari in sanguinis boni generationem: in ebullitione autē hac, ex ipsius excrementis, quod feculentum quidem ac crassum est, subdere: innatare uerō, quod tenue

a cleue existit, & ueluti spumam quandam in superficie sanguinis fluitare. Quorū excrementorum, huius quidem quod stauum & leue est, excipiendo, natura ad hepar ueniam quandam apposuit: illi autē, quod crassum & limosum existit, lienem in sinistris uentris partibus subdidit, & quendā ueluti stomachi ex sima regione ipsius splenis productum, uenosum uas, ad portas extēdit, ut nihilo minus hepar certē purget, quā si prope ipsum esset splen locatus. Postquam igitur in causis heparit ad animalia nutrimentū paratur, prædicta duo excrementa deposuit, & ab innata caliditate coctionē exactam indeptus est, ruber iam & purus sursum ad gibbas hepatis partes ascendit. Excipit autē ipsum illic uena maxima, ex gibbis hepatis orta, quæ ueluti aqua ductus sanguine plenus, ad uentrā animalis partē fert, superiorē simul & inferiorē, unde per totū corpus, in ramos scissa uarios disto seminat. At in hac quoq. uena, multo ad huc humore tenui & aquoso, qui uelutū nutrimentū existit, plenus est sanguis. Eundē, quē ille, usum præstat animalibus aqua. Si quidē ex ea uentrā nulla particula potest: distribui uerō ex uentre, quod nutriturū est, non poterat, nisi deductum fuisset à quopis ita liquido. Has igitur tenues humiditates, postquā suo officio peritūne fuerint expurgat renes, instrumēta concaua, stomachis alijs quidem trahentiā, alijs autē eas emittentiā. Adiacēt enim utrinq. ipsi uenę caue: (quæ paulo antē diximus maximā) paulū sub hepate, ut quicquid in ipsā sanguinis assumatur, confestim purget, solusq. postea is purus eat per totū corpus, pauca omino ipsi aquosa humiditate permixta. Inferitur autē ipsius uenę superior pars, ad cordis uentriculū dextrū, saltem in quibus is inest. Porro uentriculo inest facultas quædam prope qualitatē attractiuei & quædam alia receptorum retentrix: & rursus alia excretrix superfluorum: sicut & ante has omnes, alteratix quædam, propter quam illis quoq. uentriculus eguit. Sed alijs quidē omnibus animalis particulis, quancūq. easdem facultates habeant, non indidit natura sensum eorum quæ defunt: sed in plantarum modum nutriuntur hę, absidue ex uenis alimentum haurientes. Soli uerō uentriculo, & maxime eius partibus, ijs quæ ad orificiū pertinent, sensum indigentē contriūt ad sumendum cibum animal excitantem. Quam enim totius corporis partes nutrimentum ex uenis à caua prognatas trahant, ipsa rursus caua ex uenis hepatis, hæ rursus ex ijs quæ sursum ad portas feruntur, illæ rursus ex uentriculo & intestinis: certē ubi nulla iam superest amplius particula, à qua uentriculum capere oporteat, necessum est animalibus, extrinsecus ipsum replere: in eoq. differunt iam animalia à plantis. Si quidem his, etiā quammaximē illas quatuor facultates, paulo autē memoratas, habere cōtingit, eis tamen sensus eorū, quæ sibi defunt, nō inest. Non enim per os nutriendæ erāt, promptuariū copiosū alimentū subiectū habentes terram, cui coluerentibus atq. unitis semper alimenta aduoluūt. Ipsi uerō substantiæ animalij, præterquam quod multum à terra differt, insuper etiam motus uolun-

Ventriculus sibi sensum indiget
tūa cibaliq. natu-
ram.

Lienem in sinis-
tris locatū ex-
cere melanco-
licum faciem à
sanguine.

Vena caua di-
uiscata.

Serum esse ueluti
cūctū sanguinem.

Aquam band-
quædam nutri-
tre, de incru-
tatis alimenta-
tum per corpus.

Serum expor-
tant renes à san-
guine.

Vena caua in-
serta in cor-
dis uentriculū
dextrum.

Ventriculo inest
quatuor natura-
rum potentias,
sua facultates.

Ventriculo sibi
sensum indiget
tūa cibaliq. natu-
ram.

Animalia à plā-
tis quo differūt.

Plantis non in-
est sensum eorū
quæ sibi defunt.

Animalibus
ad ijs arbitra-
rium motum.

Particulam nol
lam esse habere
singulam.

Nemo un par
tium diffin
tionem ventri
culum.

Thoracem esse
inter et ventri
culum.

Fundum ventri
culi ciffere in
dextra anima
li parte, ubi
fuerit ab hepate.

Lienem finiftri
subtendo ventri
culi partibus.

Ventriculus cor
porandus.

Figura rotunda
quasi infini.

Figura omnium
in natura.

Ventriculus cor
porandus.

Ventriculus orifi
cium superius,
cum inferiore la
tum.

Gula esse par
tem ventriculi.

Tunicis ventri
culi et gula qua
libet addunt.

Intestinum am
bae tunicas ha
bere nullo tri
versis.

Intestina no in
digne sumen
ta attrahit.

Tunica ventri
culi gula qua
niam quoniam
confilii, cor
fi una cuncta.

Intestina esse
ad diffinitionem
condita.

tarius adest, & loci ex loco mutatio: unde impos
sibile fuit ipsis, plantarum ritu, fugere humo
rem ex terra. Opus igit erat unumquodq; fami
liaribus sibi nutritimenta nutriti, eaq; id tem
pus edere, quo uentriculus indigentiam perciperet.
At quum nulla animalis particula ex se sensum
habeat, affluere uentriculo huiusmodi facul
tate aliunde oportebat, veluti per canales ad
principio sensifico. Cuius rei grana ad eum par
neruorū haud mediocre superne deferret, & disse
minaret: contextiq; maxime quidem os eius, & partes
ipsi continuas, & in reliquis usq; ad ventri
culi fundum protenditur. Positus est autem
uentriculus non statim post os, sed quem vocamus
thoracem, & quae in ipso sunt viscera, praepo
sitū natura, ut ille quidem in inferioribus par
tibus effluvia habeat superfluorum: hic autem
per os attrahens, & rursus emittens aërem, uo
cis & respirationis fiat cōditor. At uero fundum
uentriculi in dextra animalis parte cōstitit, quod
iuxta in regione similiter idem superioris am
plexatur, septum transuersum contingens. Lien
autem sinistris ipsis uentriculi partibus inferio
ribusq; est protensus. Ac merito sanē rotundus
simul & longus factus est ipse uentriculus: ro
tundus quidem, quod hac figura minimē om
nium existens leuioni obnoxia, etiam capacissi
ma sit. Omnū siquidem figurā, & qualē in am
bitu mensurā habentū, planarū quidem, circ
ulus: solidarū autem sphaera, maxime sunt. Ob
longus autem, quoniam inferne quidē explanta
tio eius ad intestina est: superne autem ad es
ophagum ipse idem progredit: quā uero incumbit
uertebus, cōprimi: ob idq; ipsum uisitata est
eius conuexitas. Iam uero superius orificiū uen
triculi est inferiōre latius, quod illud quidē mo
les duras, magnas, & integras aliquando tran
sgliat: hoc autem nihil exire permittat, non in
chylum & leuore conuerfum. Atq; est quidem
gula ipsa pars quaedam praelonga uentriculi, in
testinū autem nequaquā. Quare tunicarū natu
ra, uentriculo quidem & gulae adsimilis est, inte
stinis autem dissimilis. Interna namq; tunica in
uentriculo simul & gula, membranosa, uillos
rectos superne deorsum tendentes habet: exte
rna uero, & carnosior, transuersos, quales habent
ambae intestinorū tunicae, idq; merito. Siquidem
uentriculus trahit ad seipsum per stomachū ci
bum & porum, tanquam manibus, rectis his uil
lis oportet, propellat autem transuersis. Intesti
nis uero (attractrice enim facultate non indige
bant) soli ad propellendum idonei sunt facti uil
li. Quine etiam continua est interna uentriculi,
stomachi, & omnium quae in ore consistunt, tun
ica, quum ad attractionem contentorum in
ore ciborum, tum ut lingua deorsum trahatur
cum mulsis qui sunt ad tonsillas, & quorum
omnium tensione, sublato larynge, & corrente
sursum ad epiglottida, obturorū ab ea, repen
tē ac simul humor influere in pulmonem prohi
beretur. Ac duriora quidem & densiora sunt inter
na horum, quā interniora: quia intestina san
e, ad distributionem uentriculus uero, & stom
achus, & os, ad panendi difficultatem sunt cōpa
rata, ob magnitudinem, asperitatem, atq; duri

tiem eorum quae transglutiniunt. Ob id ipsum tu
nica quae communis ori, stomacho, & uentriculo
existit, rarior & mollior fit paulatim, usq; ad
fundum uentriculi. Neq; ob aliam rem quam
plurimū quidem ad singula intestina immittun
tur uenae: paucae autem ad inferiora uentriculi,
paucae etiam ad eius oris partes: & omnino ob
scure quidā ad esophagiū: hic siquidem uia erat
ciborū tantum: uentriculus uero, coctionis or
ganū: ut intestinū, distributionis. Ambae autem
uentriculi hepar, amplexaturū quibusdam lo
bis ceu dignis, ut ille quidem ab hoc, cibaria ue
rō ab eo calefiant. Habet etiam uentriculus ut
ex sinistris longum lienem protensum, a quo si
nistris illius partes calfiunt, sic retractorū spinam
& spinales musculos: illam quidem ceu propu
gnaculum quoddam densum: hos autem uelut
substerniculum molle, a quibus eius calor fouet
ur. In reliqua uero ipsius anteriori parte, calefa
ctiois gratia, generauit natura omentum, cor
pus densum, simul & leue, ac praetera calidum:
cuius argumentum est, quod facillē in flammam
uertatur. Nihil siquidem frigidū promptē com
buritur. Id igitur corpus, ex duabus quidem tun
icis densis atq; subtilibus, sibi ipsis incumben
tibus, quamplurimis uero arterijs & uenis, pin
guitudineiq; non pauca constāt, per totum uen
trem extendit, ut illius caliditate foueat. Qua
re quibus pars huius, ob uulnere, adempta est,
omnes infeliciter concoquant, plurimiq; so
mentis egent. Est & alia membrana peritonae
dicta, quae viscera omnia, quae in regione uen
tris sub septo transuerso sunt, contegit, ab eisq;
musculis incumbentes distinguit, citatq; ex
cretionem aridorum excrementorum, ac breuiter
impedimento est, quo minus facillē sanibus (quo
rum tamen pars ructu, pars crepitu uentris so
let saepe uacuari, sicuti & halitusosior pars conco
qui, ubi uiscera sunt ualentia) discedantur inte
stina & uentriculus, singulis priuatim firmum
regumentū existens. Siquidem anterioribus ip
sorū omnium partibus est praetensum: proce
dit autem illinc ad dextram & sinistram per illa,
usq; ad lumborū uertebrae: quo fit ut singulis in
testinis ac uisceribus, praeterea tum arterijs om
nibus, uenis, & neruis circumtendatur. Quod ue
rō ad reliquas eius extremitates pertinet, super
ior quidem septo transuerso inferne adhaeret: in
ferior autem osibus pubis, & praeterea ilium.
Porro instrumentorū in illis duabus sitorū par
tibus, quae superiori quidem parte sunt (cuius
modi est uentriculus atq; hepar) ad peritonae por
tione septo transuerso inferne adnata: quae ue
rō inferiori (ut tum uesica tum intestina) ab ea
quae osibus pubis liget, ueniunt. Quod autem
a septo transuerso adnata ori uentriculi extrin
secus, unitur ijs quae utrinq; a dorso ascendunt:
estq; id principij generationis tertiz tunice uen
triculi, extrinsecus ipsum undiq; ambientis: quā
sanē operimentū quoddā ac propugnaculū se
cundae tunice carnosae circumposuit natura, eaq;
existente crassa pro ligamento unū, ad uentricu
lum totum cum corporibus quae iuxta spinam
sunt, colligandum. At uero omentum oritur ab
eis peritonae partibus, quae a dorso utrinque
ascendunt,

Ventriculi mo
sticarum deseri
bitur magnalia

Ventriculi cor
plexatur hepar.

Lien.

Spon.

Omnis natura.

Frigidum uul
praeceptū cibari.

Omnis consti
tuta & ym.

Peritonae consti
tuta & ym.

Peritonae consti
tuta.

Ventriculi con
stituta tunica.

Omnis origo.

ascendit, sibi inuicem occurrentes ad altissimam
partem uentriculi. Quum enim ex illa dextra regione
productisq; natura uenas & arterias quam
plurimas ab utroq; magno uase, simul producat
cum eis utriusq; peritonæi particulas, uasif-
iculisq; prædictorum uasorum partem ad seie at
tinentem, circumuehentes & colligantes. Medi-
am autem inter utraque regionem contem-
peritoni portiones, uelut filamenta quedam, si-

notum, neque ad sensum futuro ex usu animalis, quare enim aut non omnino in usus, aut non in totum inferunt. Eiusmodi siquidem facultatis hepar principii est, ex quo actiones sunt tum ipsi, tum iveri minus conceditur, cuiusmodi & plantis insunt. Non licet autem recte inuenire usum illum cuiusvis particulari, totius organi actione ignorata. Porro hepar facultatis nutritivae principii, copulari oportet duobus principijs alijs,

Scius et illa sibi inuicem. Prepar liquidum, pecus quoddam (ur inquit Plaro) est agreste, ipsumque nutrire colligatum necesse est, si modo lib minimum genus fit duraturum. At ratio, quae homo est, sedem in cerebro habens, ueluti famulam quandam atque adiutricem irascientiam accer sit, quae sibi diuersus hoc pecus auxilio sit. Quo fit, ut ipsa principia tria, per processus, ntputa, nervos, uenas, & arterias, communia, ceditor no

Hepas cuius sa-
cultatus prince-
ps est.

Vſae partie me-
moratae poſſunt
actione illius i-
gnorari.

Нерас агүбіле
қу рәсім.

Ratio (quæ est
hæc) in cir-
culo collocatur.

Principia ani-
malis tria cor-
asiter se sunt con-

Hepatic mass ca.

Septem transfu-
sionum infusio-
nes corda & be-
pati.

Verna causa in-
dependens.

Septimanus
 natus 1790.

• Lewis yfen.

1. Licença elaborada
para o melancólico

licus fuerit.
Lienens magister
An. co melamab
lica, à fr elabo
rato, atq mira
mudita.

Licet enim mittere
quod elaboratum
non potest ad
gratum recipi
dum.

K =

Pulmonis carni
laxissimam, na
triv ex puris
simo sanguine.
Lentem autem
tenuiorem, quam
hepar, portione
sanguinis.

Sanguis qui ad
splenem attra
hitur, crassior
est illo qui con
fluit in hepate.

Splenis caro ri
rior et levior est
illa, quam hepar
constat.

Hepar brevius
crasso nutri
tur sanguine.

Arterias contra
fluentia sua ex
pelles excrementa
splenis.

Lenis arteria
magis resistit
maioris trahen
tia.

Hepar tunc per
venit ad arteria
terti.

Alimentum co
qui etiam in in
testinis.

Sanguis coqui
etiam in vena.

Vena inesse san
guificando sum.

Intestinorum sub
stantia non multum
se differunt.

Alimentum non inesse san
guine animalis
partibus.

Intestina car
nari insolentia.

Gula et in
pibula esse co
qui vasa in
testinis esse re
ctum.

uissima, & parumlibi abest quin alba, utpote ex
spuma quadam veluti coagulata. Nutritur enim
ex purissimo sanguine, flauo, subtili, & spirituo
so, tanquam delato à corde. Splenis autem cor
pus, quò tanto rarius hepate fit, quanto est cra
sius pulmone, meritis ex tenuiori sanguinis par
te nutritur. Consensientes quippe est ex arteriis
quidem, tenuius ex uenis autem crassius nutri
mentum trahimus, quum tunc arteriarum quàm
venarum sit densior, & sanguis subtilior & ua
porosior. Atque ex tali præstita laxam carnem nu
triri, veluti ex crassiori densam. Ceterum qui at
trahitur ad splenem sanguis, crassior est eo qui
est in hepate. Quia tamen elaboratur ab arteriis
quæ illuc sunt, atque adeo uenis, multò densio
rem tunicam habentibus, quàm quæ sunt in he
pate, uou affatur, neque crassius, carni splenis, sed
subtilis, & paulatim mittitur, ob id quoque
huius uisceris rarior & leuior est, quàm hepatis,
nò tamen rubicundior aut flauior. Nam melan
cholicus erat is, quem purgavit humor, à quo
elaborato nutrita est. Hepar uero benigno tuni
ce & crasso nutrit, tum propter subtilitatem tuni
ce uenarum quæ sunt in hepate, tum propter ma
gnitudinem foraminum. In summa igitur, he
par ex rubicundo & crasso sanguine: splen ex sub
tili, sed nigro: pulmo ex elaborato ad unguem,
flauo, subtili, spualti, ac puro, alimentum capit.
Præstant enim spleni maximum usum arteriæ,
contractione sua illius expellentes excrementa
fuliginosa. Vt enim pulmo refrigeratione uelie
menti, quàm dilatata arteriis conciliant, sic splen
insigni indiget purgatione, quæ contractis illis
paratur. Quare illa arteria multe, & magne tri
butæ sunt. Hepar uero nec tali egeat purgatio
ne, nec refrigerio magno, iure optimo paruis in
dignis arteriis. Conuersa autem sunt ad hepar
atque utriusculi, ipsius lenis sima, quæ quidem
uenarum & arteriarum immixtionem, & quæ ad o
mentum pertinet, insertionem continent. Coquitur
porro ad alimentum, & in ipso per intestina tran
sit: ut in uenis omnibus, sanguis: quum tamen
neque intestinorum ullum coquen di alimentum, neque
neque sanguinis gignendi gratia exiterint. Quem
admodum igitur uenis (quæ eas instrumenta di
stributionis ipsa natura fecisset) facultatem san
guinis generatricem indidit, ne dum per illas ferre
tur, tempus ipsi alimento periret frustra: ad eundem
opinor modum & intestinis (substantia quo
rum haud multum à uentriculo differunt) distribu
tionis tantum in uenas gratia instituta, facultas
quædam concoctrix ciborum inest: quod fieri
omnino non posset, nisi singule animalis particu
læ uirtutem quandam haberent alteratricem.
Sunt autem conuoluta intestina plurimus con
uersionibus orbiculari, ne alimentum ocyus elabe
retur, inexplabilem uocandi semper necessita
tem inducens, à philosophia & Musis nos reuo
caret. Nam quæ animalia à uentriculo intestinū
simplex & rectum usque ad anum fortuntur, in
nabiles omnia & gulosi sunt, plantarumque mo
do cibo assidue inharerent. Quæ circumuoluon
es intestinorum quum innumerabilem uenarū
multitudinem ex hepate sibi ipsæ habeant infer
tam, omnem in uentriculo coctū succū sursum

mittunt. Unde fieri nequit, ut humor aliquis ani
mali nutriendi idoneus, ab animalis labat, quan
do saltem naturaliter se habent corpora. At uerò
orificia arteriarum, quæ in intestina se aperiu
nt, modicum etiam nutrimenti assument, quem ad
modum plurimum uenæ. Naturaliter quippe
continetur sanguis & in arteriis. Porro ut attra
ctrices potentius, rectorum uisum motu, sic ex
pultrices, transfusoris actione constant. Quem
admodum igitur utriusculi utroque uillos forti
to, duabus opus fuit tunicis, contrario inter se
modo habentibus: ita & intestinū quodque unam
speciem motus propultricem quum habeat, u
nam pariter tunicæ speciem, in transfusorios & cir
culares uillos disoluit, obuiuit. Habet autem
eris similem, duplicem tamen tunicam, quodque
intestinum, parum ut facultas ipsorum expul
trix ualentior sit partim ut ipsa instrumenta, ab in
iis omnibus sint tutiora. Nonnullis uero in
testinorum, præcipue in animalibus ips, quæ sub
tilis ipsorum tunicas possident, quidam uilli re
cti obtenduntur extrinsecus, ad transfusorum
tutelam. At quod peritonæum ipsum (à quo tu
nicæ omnium uiscerum sub septo transfusio
sumunt originem) hanc secundam uenarum tuni
cam intestinorum, colligitque omnia intestina, tum quæ
ad spem sunt corporibus, tum alijs, quodlibet ab
eo & septo transfusio, ueluti à duabus compres
sa manibus, superne quidē unius, inferne autem
distantibus, excrementa explodant, liquod con
stat. Ne autem assidue egerent, meierit uis à
animalia, ut humidis quidem excrementis uelica
subiacet, sic siccis intestinum, quod crassum dici
mus: principum cuius cæcum intestinum ex
istit. Vbi enim tenue intestinum definit, illuc ad
dextra quidem illa, cæcum: ad sinistra autem co
lon emergit, per sinistra prius illa sursum ductū.
Porro cæcum profusum ueluti uenter quidam est
crassus, excrementis recipiens appositus, cui
ad portionē colon respondet. Atque plurimis fa
nē aibus propter actionis robur, cæcum intes
tinum est duplex. Nam si quid in transitu per te
nue intestinum distributionem fefellerit, ad omne
durum in cæco mora, planè exegerit. Vtrius
que autem tam humidorum, quàm siccorum ex
crementorum effusio, musculi tantum in cum
bunt inor clausum cūctā, ne continerent aut
intempertū excernantur. Si quidem uelice col
lum, musculosum exiit: recti autem intestini o
ra inferior, à musculari in orbem circumfusum
stringitur. Musculi namque omnes quum sint mo
tus uoluntarij instrumenta, non sunt foras fer
ri excrementa, antequam rano iusserit. At uerò
ad perfectam intestinorum & uentriculi nutri
tionem, toti mesenterio & omento natura plu
res inirex uenas, nutriendis illis digestas, liaud
quaquā ab eas transientes ad hepar. Quamquā
reficiuntur etiam interdum ea, tremore illo quē
ex cibis efficiunt: necesse in longiori inedia, per
quas uenas prius distributio ad hepar facta est,
per easdem rursus aliquando sanguis benignus
ad eorū nutritionem retrahitur. Colligens er
go natura ut in arboribus exiguas radices, ita
in animalibus uas minorum in maiora, & illa ru
sus in alia maiora, idque semper agens usque ad hep
par

Arteriæ contin
ent naturaliter
sanguinem.

Arteriæ tamen
sunt per uillos re
ctas.

Expulsionem fe
ri uili trans
ferre.

Ventriculi hab
ent duas tuni
cas: uero se dū
trahit, ratione
duorum uil
lorum.

Intestinorum san
guis ueluti du
plex tunicam
utramque uili
transfertur con
stituit.

Peritonæum esse
arguunt tunc
tamen omnia
viscera sub se
pto transfusio.

Crassi intestini
visus.

Cæci intestini fi
gura & visus.

Visus visus.

Crassi intestini
visus.

Cæci intestini fi
gura & visus.

Crassi intestini
visus.

Cæci intestini fi
gura & visus.

Crassi intestini
visus.

Cæci intestini fi
gura & visus.

Crassi intestini
visus.

Cæci intestini fi
gura & visus.

Crassi intestini
visus.

Cæci intestini fi
gura & visus.

par ab intestinis, in unam omnia uenam coëgit, quæ ad portas est sita: à qua etiam, uena quæ tum ad uentriculū, tum ad plienē fertur, euasit. Similiter & arterias omnes in unā magnā dorso incumbētē, pari modo cōtraxit. Ne autem uenæ ipsæ longo ductu pertumescerent, à tunica colligante ac uesicula intestina, similem peritonæo membranā, hoc est, mesenterium, produxit, quæ uasorū singula induit. In spacijs uerō inter uasā inanibus, eandem hanc tunicam, sed iam duplicem, applicans, ad angulosq; uasorum, quæ in unum cōtuler, carnosam quandam naturā, quas glandulas appellamus, apponens, quod ea nimis regio inuasijs magis obnoxia sit, ualidissimum sic uinculum, præsidium, & munimentum ipsi uasīs constituit, quod sanē totum mesenterium uocatur.

GALENI PERGAMENI de vsv partium lib. V.

Longè autem fuit satius, unam uenam portæ ab hepate ipso produci, ac deinde in uarias mæsericas difcissimā, quemadmodum dictum est, in nutritoria membra disseminari, quā si statim à multis partibus hepatis multæ uenæ ortæ, in illa tandem deducerent: id quod maxime obesse, quum ipsarum uenarum, tum etiam integritati iccinoris. Vt uerō æqua quidē uenarum distributio esset omnibus nutritorijs organis, uas autem id descendens ab hepate, sedem haberet stabilem, inter uentriculum atq; intestina ipsū oportuit* ductum, incumbere ea parte subiacentibus uertebis. Cum ipsi autem uenis per totum mæsare arterias diuisi sit etiam natura, necnon neruum unū. Quum igitur oporteret uenā, arteriā, neruū, & quartū cum eis bilis meatum, peruenire eō loci, sanē ad fucicidā & roborandam regionē illam, in qua primū diuiscant & diuidunt prædicta uasā, utpote periculo expositā, glandulosum quoddā corpus, quod *uayapine* appellatur, fabricata natura, subintravit simul illud, atq; in orbem omnibus circumposuit, diuisionēq; omnino, repleuit, ut nullum ipso facile iam findatur, aut concussum possit labefactari. Quinetiam membranas fortes tum priuatis singulis uasīs, tum cōmuniter ipsi omnibus circumdedit, uasientes ac iungentes ea circumfusus omnibus instrumentis. Ad hæc autem peragenda capax spatium requirebat: quare primū omnī intestinū, quod uentriculo coniunctū est, exortusq; dicitur, naturā quidē minimē in circumuolutiones ressexit. Quod autem hoc consequitur, circumuolutur atq; flexit: uocaturq; icunum, quod semper reperitur inane, nec tantillum quidem in seipso alimenti contineat. Tertium autem est in testinum quod uocant tenue: quartum cecum: quintum *mixer*: sextum deniq; rectum, in cuius fine sunt musculi, quæ cōstringunt ac retinent eā corpora. Porro exortus ipse uentriculi fundus descendens, per dextram partem ad spinam educitur, atq; supra illam firmatur. At uerō in sinistro icuni ex ijs est, quæ nullum præstant usum, sed alia necessariō sequuntur, quæ propter ali-

quam utilitatē sunt facta. Siquidem & quod primum omnium intestinorum icunum, ipsum chylum excipiat, & quod situm iuxta hepate sit, uasorum in sese multorū orificia continens, & quod etiam bilis meatus paulō supra implantetur ad ipsum uentriculi exortū: ob has inquam causas, inane semper ac uacuum cernitur. Nam præter cetera quæ citissimum ex ipso distributionem faciunt, etiam bilis ipsa nondum excrementis permista, sed syncera & pura in id intestinum confluens, sua mordacitate illius tunicas ad celerem excretionem excitat. Oportuit autem hic insinuari talem bilis meatum, quia breuior illi uia erat commodior, ceu eorum etiam futuro participi, quæ natura ad tutelam uasorum eō pertinentium construxerat: & quia talis etiam eius positio expediebat excepturi bilem omnibus instrumentis, in quibus necessariō ac naturaliter in dies maxima pituitosorum excrementorum copia colligitur: quam diuidere, incidere, comminuere, atque abstergere est opus. Merito itaq; natura excrementis id genus præsidium maximum esse molita, acrem atq; absterforium hunc succum, quem omnino oportebat uacuari e corpore, non in intestinum aliquid ano proximum, sed in primum exortum demittens, ne quod inferiorum intestinorum, externo aliquam do indigeret auxilio: quam certē ubi ex prauo corporis habitu, copiosius pituitosum excrementum colligitur, ileos, lienterias, tinesimosq; omnium qui uentri contingunt morborum grauissimos, in ducere solet. At uerō nullam bilis portionem in uentriculum immisit natura, quamuis & ipse non pauca gignat pituitosū excrementa: quia uitium quidem id adeo est exile, ut præsidio externo abundē corrigi possit: mala uerō quæ in uentriculo confluens bilis induceret, essent tanta, ut functiones ipsius funditus derubarent. Flaua siquidem bilis, acrem, mordentem, atq; omnia abradentem, obtinet facultatē. Cuius succi uomitum copiosius, morbus intestinorum, cardiacusq; solent semper præcedere. Ventriculum itaq; uas icunum, sensu exactiori præditum, bilis in ipsum confluens, cogeret alimentum prius deorsum trudere, quā planē concoctum esset. Siquidē uentriculi propria actio est cōcoctio: postulant autem quæ concoquuntur, temporis diuturnitatem, quam sanē biliosus liumor non parit. Rectē igitur ueteres medici, uomitus à cibis in singulos menses repeti præcipiebant, alij quidem semel, alij uerō bis: omnes tamen ij, qualitates ipsas comedendorū in eum usum acres & absterforias deligere cōsueles, ut pinura omnis e corpore purgaret. Nam quæ mordent & abstergit abara, biliosa omnia sunt & cacochyma. Quod autem bilis ab intestinis in corpus naturaliter sese habens non transmutatur, ipsa indicat excrementorum uarietas. Si quidem in icterico, comestorū colore referunt, bile uidelicet minimē deorsum subeunte, sed sursum in totū corpus perita. In sanis uerō, quod humor eis biliosus in intestina cōfluat, flauo colore sunt tincta. At melancholicum excrementum in uentriculum excreuit natura, ceu nullam

Mentem bilis implantari in uentriculo exortum.

Bilis trasis excrementum exortum apertum.

Primū, sem excrementum densit natura in uentriculum.

Bilis nullā portionem densit natura in uentriculum.

Bilis flaua facultas.

Bilis rutilam quæ præcedere solet.

Ventriculi propria actio est cōcoctio.

Concoquenda egent calore.

Vomitus quæ naturæ alim singulis mensibus ueteres præcipiebant.

Mordentia & absterforia icteria, ipsi bilis facta, cacochyma; Hic uerō excrementa cur referant colorē ciborum.

Excrementa, flaua, nora, flaua, Melancholicum excrementum in uentriculum excreuit natura.

*Atra bilis quali
tas, facultasq.
Atra bilis sanat
aliquem ven-
triculi.*

*Renis expurgat
latum.
Vesicam esse sub
dolum renibus,
veluti quandoq.
cystitiam.
Vesica muscu-
losa.
Ventriculi me-
m.*

*Arteria infera
in renes.
Arteria sangui-
nem continet.*

*Ren dexter, et
superior finis-
ter Hepar in de-
xtro locum.*

*Trahens omne
expeditus ex de-
recte oppositus
trahere.
Vrina purgan-
do ut natura
dus instrumenta
dus construat:
singulis aliorum
excrementis,
viciis.*

*Renem spiritibus
dus causa dno*

*Renis vna cum
bile attrahere
bilen ex sangui-
ne.*

*Sanguinem a-
perit reni sub-
stantia.*

noxam illi allaturum. Acerba siquidem, acidula
quum sit atra bilis, contrahere ipsum, constri-
gereq., non ut flaua, subvertere, est nata. Quare
non modo non induit, sed actionem ipsius etiam
iuuat. Nam ventricululum intendit, contrahitq.
in seipsum, ut cibos ad ungum circumplectat
retineatq., quousq. fuerint percocti. Porro ad se
cerendum urinam, natura etiam renes prope
hepar construxit: quibus ueluti quandam cister-
nam, ipsam uesicam subdidit, ad cuius finem mu-
sculum fabricata est, eisdem, ne superfluis in-
tempestiuè effluerent. Res aures ipsi uesice
connectunt meatus quidam praelongis, ualidisq.,
quos & perierat Graeci, nos urinarios uocamus. Sic
igitur urina ut renem segregatur à sanguine, &
illuc per ureteras ad uesicam demittit, indeq. ex-
cernitur, quo tempore ratio iussit. Ceterum
quum arteria, pari magnitudine qua & ipse uen-
na, inserantur etiam in renes, indicum certe est
sanguinem similiter in eis contineri, qui uim-
rum purgari possit. Atq. alter quidem renem
superiorem, alter inferiorem positionem fortis-
simam. Nam quum serum trahendum, ita demum pur-
gant sanguinem, certe si aduersum haberent fi-
tum, alter tractu suo in contrarium, alterius tra-
ctum moram adferret. Nunc autem uterq. agit li-
bere, solutusq. attrahit, quum nihil sibi è regione
habeat oppositum. Est itaq. dexter quidem ren, su-
perior ac primus, sinister uero inferior ac secun-
dus: quia uiscus ipsum quod purgat, in dextris
locatum erat, & plurima causæ uenæ germina in
dextram partem suis orificiis defluunt, ex ghe-
ba hepatis ad eam uenam sanguinè deriuantia.
Omne autem trahens, expeditus ex directè op-
positis attrahit. Sed neq. locus pariter uacuus in
sinistris erat sinistro reni, ob splenem hepate infe-
rius locatum. At uero serosa humiditas expur-
ganda, natura duo instrumenta construxit: alio-
rum autem excrementorum singulis, urinum tan-
tum: nam paucissimum quidem est melancholi-
cum excrementum: copiosius autem ipso, bi-
liofum: utroq. aquosius, multo cumulatius. Sed
& crassissimum quidem melancholicum: tenuis-
simum uero serosum: atq. amborum medium,
biliosum exstitit. Iam uero ipsius reni spirititudi-
nis sunt causæ duæ: facilis scilicet huiusmodi hu-
midi attractio, atq. ex ipso necessaria renum nu-
tritio. Si quidem orificiorum angustia, stipatioq.
in causa est, ut familiaris succus, syncerus, imper-
mixtusq. ad partes, quibus talia officia insunt,
trahatur. Quanquam nec lien, nec renes, accom-
modatè sibi duntaxat eliciunt succum: uerum
splen quidem, cum illo trahit etiam aliquod san-
guinis: renum uero uterq. sibi plurimum bilis
concliat: multum etiam tenuioris & humidioris
sanguinis. At biliosi quidè excrementi, quic-
quid non ad modum crassum fuerit, cum urinis
permeat: sanguis uero, carni ipsi renum aspergi-
tur, instat fecis cuiusdam. Inde iam uapores mo-
do paulatim in totam ipsam dispergitur, adhæ-
rescitq., atq. demum alimentum fit renibus. Ne
igitur cum urinis, per aliquod foraminum que
habentur in renibus, quomododum tenue bi-
liofum, ita & sanguis elaboretur, densum esse eo-
rum corpus præstiterat. Eis autem ad sui nutri-

tionem tertio quopiam aliud uasè opus non fuit,
præter duo magna, quorum alterum oritur ab
arteria que ipse incubat, alteru à uena caua. Ve-
rum utraq. bilis & urinx uesica, purum atq. ab
alijs fecerum quum attrahant sibi familiare ex-
crementu, uasa alia, alimentu sibi suppeditantia,
iure optimo flagitantur. Quum autem copio-
sius multo serosum excrementu, quum ipsum bi-
liofum, esset, maiori certe receptaculo indiguit,
cui ob id uenis, arterijs, & neruis, multo maiori
bus haud inuria fuit opus. Vesicæ igit. quæ uri-
nam excipit, neruus à spinali medulla, quæ par-
situm laui os est, inferit natura: uenasq. & arte-
rias, à propinquis ipsi uasibus. Alteri uero uesicæ,
quæ ad iecur positionem habet, arteriam quidè
& neruū, ab his quæ in uiscus ipsum inferunt, de-
ducens, parulū uerumq. admodū, ac uix conspi-
cium: at sensilem atq. conspicuū uenā ab ipsa quæ
sunt ad portas, producens, hæc tria iuxta collū
eius infixit: unde usq. ad fundū perueniunt. Pari
modo & in uesicā aliam maiore, ad collū ipsum
uasa sex, utruq. uidelicet tria inferunt: quæ quidè
tutelæ gratia membranis quibudā tenuibus ob-
uoluit, ac per easdē ita sibi mutuū coniunxit. Eo-
rum autem in ipso statim primo ingressu diuisio-
rum bifaria, pars quidem in totam uesicam disse-
minatur: pars uero aucta fertur deorsum, secun-
dum collum, exiguum quidem in feminis, mag-
nū uero in masculis, quod hi particula quadā
insigni, ad extremū collum uesicæ sita, expura-
bant, quæ dicitur coles. Alia itaque per ea uasa,
quæ excrementa secerunt, nutriuntur, ut lien
& renes: alia alijs quibus alerunt, egueunt, ut
ipsa uesica. Habent autem & renes ipsi, neruum,
quantum lepar, lien, & bilem excipientia:
quibus omnibus exules omnino sunt nerui, in
suis ipsorum tunicis conspicui extrinsecus, sen-
tiendi gratia. Tres namq. scopi naturæ ipsi in ner-
uorum distributione extiterunt: primus quidè,
ut sensorijs instrumentis sensum impertiret: se-
cundus, ut motorijs motū: tertius, ut omnibus
alijs facultatem daret, qua sibi insecta dignosce-
rent. Porro sensus causa, lingux, oculis, auribus,
maximè sunt nerui tribus: necnon partibus ma-
nuum internis, atque adeo ipsius orificio uentri-
culi. Sunt enim quodammodo & hæc sensoria.
Si quidè per manus ex tactu est dignonio certissi-
ma. Orificiū autem uentriculi sensum habet ali-
menti deficientis ipsi animali, quæ fames nuncu-
patur. Secundo autem loco, in musculis, motus
uoluntarij instrumentis, reperire est neruos ma-
ximos. Ad discernenda uero quæ dolorem adfe-
rent, nutritorios organos alijs quidè liberalius,
alijs autem parcius, pro cuiusq. naturæ constitu-
tione neruos largita est natura. Nam si quibus
afflictione iniurias, eas non sentient particule,
animalia utiq. breuissimum euerterentur tempo-
re, facile ab acerbis excrementis exesa. Ob id in
singulas circumsolutiones intestinorum, singu-
la diffeminantur nerui, perinde ac uena, & arte-
ria. In hepar aut, ueruus insertus est minimus, ut
quod musculari ritu haudquaquā moueatur,
neque ut intestina, sensu exaltiore egeat: hæc
quippe acrimonia rememtorum exasperant:
unde dysenteria, si ab atra bile incoeperit, letalis
est,

*Renis ad sui nu-
tritionem ab e-
gere alijs uasis,
præterquam a
uena caua.
Vesicæ utraq.
cor ad suum nu-
tritionem alia
uasa, præter po-
rta, indigent.*

*Vesicæ uerumq.
uasa, unde exo-
mantur.*

*Vesicæ uenæ
sua uasa.*

Colat.

*Nerui cæcibus
quæ sit præbi-
ta.*

*Scopi natura
propositi circa
neruorum distri-
butionem, sunt
tres.*

*Nerui quibus
gratia singulis
tribuit.*

*Tactū fieri per
uolam manus
expugnatissimū,
tactu singulis.*

*Nerui ad præ-
uolam inflexam
ita.*

*Dysenteria inci-
piens ab atra
bile, letalis
est.*

Hepar a qua-
tor instrumentis
comparari.

Trahi excre-
menta non possit
ab organo aliq-
uo, nisi a familia
natura.

Vesica urina-
ria ad maiora
sunt, plures
et maiores nec
sua natura tri-
but.

Vesica urina-
ria incocta.

Tunica instru-
mentorum interna
et externa.

Fibrarum disti-
nctio et usus.

Intestini mag-
is attrahere, nec
retinere neces-
saria esse.

Vesica variisq-
ue tunicis compo-
nita esse, forti-
sime enim dis-
tinctam fibra-
rum.

Ventriculi tuni-
ca cum grana-
tis duplici.

Meatuum cum
viscibus in qua-
tuor instrumentis
latens.

Ventriculorum
meatuum infor-
tis admodum.

Instrumenta a-
liumque princi-
palium.

Instrumenta a-
liumque secunda-
ria.

Instrumenta a-
liumque tertia.

est, ut inquit Hippocrates: hepar uero a qua-
tuor instrumentis purgatur, duobus quidem re-
nibus, tertio autem splene, atque adeo quarta ip-
si inhærente vesica. Quæ instrumenta quatuor,
quod a propriis excrementis nihil acceptura es-
sent incommode, sensum maiorem non postula-
runt. Nec enim trahere huiusmodi excrementa
potuissent, nisi qualiter communis quædam
cum excrementis ipsis intercessisset. Nihil autē
ab eo quod cognatum & familiare est, dolore a-
liquo afficitur. At maiori vesicæ, quæ loti recepta-
culum est, nisi loti id, quod biliosius acriusq-
est, repente excernatur, magnas sepe noxas adfe-
ret. Quare ut sensu prædita esset maiore, plures,
& eos quidē maiores nervos, ipsi natura tribuit
sicuti & ualidiorē quā alijs tunicis, quod pas-
sim distendenda & euacuanda esset. Porro tuni-
cæ quæ prædictis omnibus instrumentis extrin-
secus sunt circumiectæ, nonnullæ quidem ten-
uitate ipsa, omnes tamen simul figura existunt
araneæ similes: quandoquidem earum nulla in
fibras instat internarum dissolutur, quæ ipso-
rum instrumentorum sunt propria. At internæ, quæ
corpora ipsa particularum constituunt, in ven-
triculo quidem ac stomacho due, fibras quide-
m orbicularas externa, expellendi uidelicet
gratia, & obliquas interna, gratia attrahendi re-
tinentiq-, habuerūt. Intestina autem (ut quibus
nec attrahere, nec retinere necessum erat, sed cō-
tractis uolendi prosum pellere) quum simplici
egeret motu, simplices quoq- fibras sortita sunt.
Cæterum uescicarum tuni-
cæ, rectos, & circula-
res, & obliquos possident uillos. Vna enim quā
sit utriusq- uescicæ tunica, ut omnes species mo-
tus consequeretur, omne genus fibrarum ob-
tinuit. At uero in uentriculo tuni-
cæ due constructæ sunt, triplicis usus gratia: uariarum scilicet
actionum, patendi difficultatis, & crassitudinis.
Quippe ad concoctionem ciborum, oportuit
crasum esse atque carnosum uentriculum. Quæ
causa sane est, cur quibus corpus uentriculi
est gracile, ij deterius cōcoquant, quā quibus
corpulentum. Ergo utriq- uescicæ, durities aduer-
sus iniurias data est, quæ tunicarum tenuitatem
pensaret: coquendi uero instrumentis, crassities,
quæ molliorem emendaret, ac cibos calore foue-
ret suo, obtigit. Iam ut meatus bilis, eam susci-
pienti uescicæ, sic pori ureteres, substantia corpo-
ris, maiori uescicæ sunt similes. Et quemadmo-
dum ille quidem in intestinum, ita hic oblique
intrō in laxiorē suam uescicæ inferi, ueluti mem-
branam quandam ab interna parte succidunt,
quæ ab excrementorū quidem intrō irruptionem
impetu euerit, ac patenti: reliquo uero
tempore omni concidit, ac cōtrahitur, meatu
operculum tam exquisitum efficitur, ut non so-
lum humoribus, sed etiam statibus, reditus om-
nis sit interclusus. Etenim prima & principalis
ma nutrimenti instrumenta sunt, quæ conco-
quunt, utriq- alimentum alijs transmittunt. Se-
cunda uero quæ purgant, quæ deducunt, & ex-
crementum excipiunt. Tertia, quæ excrementis
excrementis sunt destinata: quorum alia quide-
m effluuium intempestiuū ipsorum cohibent,
ut musculi sedem constituentes: alia uero tem-

pestuum incitant, ut musculi epigastrici omnes.
Eorum igitur qui sunt ad anum, unus quidem
est sine pari, transuersus extremæ ipsius oræ cir-
cumfusus, ut rectum intestinum ad a musum
ac fortiter claudat. Cuius musculi substantia est in-
ter cutem ac musculum media. At reliqui duo
musculi obliqui, utring unus, supra ipsum ro-
tundū sibi, sedem sursum reuolunt, ubi in conari
bus ipsa magnis prolabitur. Cæterum octo ab-
dominis musculorū, recti quidem duo, sibi ipsi
similissimi, per medium omnem uentrem rectas
fibras ferentes, ab osibus pectoris ad pubis os-
sa extenduntur, ibiq- sese mutuo contingunt.
Alij uero duo transuersi, & ipsi per omnia simi-
les, uniuersum peritonæum circumtegentes, re-
ctum cum antedictis efficiunt angulum. Reliqui
quatuor sunt obliqui, super hos incedentes: quo-
rum duo quidem, fibras ab hypocondrijs ad
ilium ossa extensas habent: alij autem duo, hos
in speciem X græcæ literæ interfecantes, ab ili-
bus ad hypocondriorum partes descendunt.
Omnes tamē in rectos ac medios musculos desin-
unt, suis tenuitatibus nervis, productæ sem-
per æquales ac similes fibras. Ergo quum fibra-
rum positiones omnino sint quatuor, musculi
quoq- utring totidem merito fuerunt, i quibus
operantibus simul, alui excrementa, seu manibus
quibusdam cōpressā, fortiter expelluntur, conse-
rente ad id plurimum septo transuerso, musculo
magno, & rotundo, qui spiritus instrumenta, a
naturalibus membris distinguit. Siquidē hic su-
perior est omnibus: illis aut subijcitur, existens
etiam respirationis organū. Hic musculus, ab ip-
sius pectoris ora inferiori (unde etiā capta mus-
culorum rectorū abdominis pendunt) superio-
ris exortus initium ducens, atq- hinc ad fines co-
starum notariū utring descendens, posteriori
parte ac inferiore obliquus admodum fit. Sine
hoc igitur musculo, aliorū octo, qui in abdomi-
ne sunt, cōpressio, nō magis ad inferiora, quā
ad superiora uentris excrementa propelleret.
Eius aut contractione illorū compressioni acce-
dente, necessum est retinenda ipsa, ueluti duas
cōpressā manibus, applicans quidē sibi ipsi
ad carpum, distantibus uero inferne plurimū, ita
deorsum trudi, ut ne tantillum quidem ipsorum
sursum ad stomachum remeet. Ne autem unus
existens hic musculus ab octo abdominis mul-
tis & magnis in thoracem sinum magnū euertere-
tur, natura in subsidium eius, musculos interco-
stales construxit, qui thoracem ipsum contende-
re, atq- intrō contrahere possent. Ne uero inter
comprimendum, efflationes contingerent, uim
tum laryngis aperto, musculis non paucos cir-
cumposuit laryngi, quorum alios quidem clau-
dere ipsum, alios uero aperire instituit. Abutitur
autē natura ipsis abdominis musculis (quos, ut
propugnaculum subiectarū partium existens,
excrementisq- instrumenta, construxit) tum ad
magis efflationis ac uocis generationem, tum
ad partē ædendam, atque adeo ad spiritus co-
hibitionem. Porro musculi qui extrinsecus in ue-
sicæ collo consistit, priori quidem ratione, ubi
constringitur, pellic quicquid in meatu conti-
netur: posteriori autem, eum claudit: quanquam

Seda mastu-
tri.

Octo abdomi-
ni musculi.
Recti abdomi-
ni musculi.

Transuersi abdo-
mini musculi.
Obliqui abdo-
mini musculi.

Excrementa al-
ui a quibus ex-
terminantur mu-
sculis.

Septem trans-
uersum distor-
gere thoraci-
bus instrumen-
ta a naturalibus
membris, ex-
stent respirationis
organum.

Musculorum
intercostalium
usus.

Laryngis muscu-
li.

Abdominis mu-
sculorum vari-
us.

Musculi ad col-
lum vesicæ loca-
ti, usus duplex.

Vesicam claudi posse alijs, manifestum.

Vretorum obliqua infertio uisum.

Fibrae quae quibus actionibus seruiant.

uesica ipsa claudi etiam sine musculo possit, quum praeterquam quod mirari habet angustum, omnis etiam ei fibrarum species inest, ut uentriculo atque matri. At uero, ne quid denuo à uesica sursum ad renes remeet, facit ipsorum ureterum obliqua in uesicam infertio: ne uero continua fiat uirtus excretio, praestat fibrarum ipsius nexae uarietas, sed obliquoque praecipue. Quum enim omnes intendit, undiq; circum ra quae continet, vehementer attingitur, donec supra modum referta, grauetur pondere. Quum uero excretioni accingitur, ceteras quidem fibras laxas, solas autem intendit transuerfas. Quo tempore muscoli quoque suppetias in quidem qui ad meatum est urinarium, suum ipsius principium, quo uesicae adnectitur, laxans: tunc uero omnes abdominis muscoli, ut intro propellant uesicam, & compriment: contra huius postremo undiq; ille idem qui circum collum est, premens foras id lotij quod in miratum subierit, atque ipsam denique excretionem accelerans. Subest autem uesicae collum, ipsius pubis ossibus: subiacenti ei inferne, rectum intestinum, os sacrum, atque in foemina collum similiter uteri: quo loco omni, secundum animalis longitudinem fertur dorsum, quousque extra ossa emicuerit. Inde autem secundum peritonaeum fertur sursum, usque ad uirgae utrilus exortum: post, hinc rursus per ipsam uirgam, iuxta S. Romae littere, obliquo. Sed in mulieribus amica libet mirari hic in collo uesicae flexionem: in uiris autem secunda, ueluti auctarium, accessit. Ne quid igitur in ipso subisteret, musculus ille multis transuersis praeditus fibris, circumfus est, qui simul urinam à uesica ad pudendum usque deducit.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium lib. VI.

Quod à colibus utriusque describitur, pertinetque anteriore quidem parte ad pectus, ac septum transversum, decumbit uero posteriore ad spinam, ut omne spatium medici appellant thoracem. In cuius amplo sinu, piscibus quidem cor solum continetur: ob eamque causam genus ipsorum uniuersum est mutum, quod pulmone ad uocis generationem necessario instrumento caret. Nam omnibus, quae aëre inspirant, animalibus, ac rursus ipsum ore expirat, pulmo impleuit thoracis capacitate, ut qui uocis simul ac respirationis instrumentum exiit. Ceterum à thorace illi motus initium accedit. Porro usus respirationis in animalibus, cordis causa est inuentus, & quod ipsum aëris instantiam requirat, & quod simul etiam calore effervescent, un refrigerio desideret. Ac refrigerat ipsum inspiratio quidem, frigida ei qualitate affundens: expiratio uero, quod in ipso feruet & quasi combustum & fuliginosum est, ex eo profligans. Atque attrahit quidem dilatum, in anitum uero, contractum ipsum autem quod ex inuitae expandum erat, materia uocis efficitur. Trahit igitur cor aërem externum, non protinus per fauces de utriusque medium pulmonem, quasi spiritus promptuarium quoddam statuit natura, qui ambabus si-

mul actionibus seruire possit. Nam si cor dilatatum ex faucibus traheret, rursusque astrictum in illas aërem emitteret, eundem esse concentum respirationis, & pulsus cordis, esset necesse: id quod certe non solum ad perfecte uiuendum, sed ad uiuendum etiam incommodaret. Nam nec uerba diu continuare possemus, nec mergi in aquam, mentis suffocationis, nec denique sine inspirationis fumum, aut puluerem, aut pestiferam aliquam aëris qualitatem percurrere. Unde necessarium esset, uel aërem pestilentem in tempestiue inspirare, uel omnino nihil inspirantes, suffocari contentum. Quo circa natura cor ipsum, non tantummodo respirandi instrumentum fecit, sed ipsi extrinsecus pulmonem ac thoracem circumdedit, qui spiritum illi simul apparerent, & uocem animanti efficere. Quum autem ex pulmone cor spiritum ducat, eumque rursus in pulmonem reddat, licitum est nobis alius uoce uti, & quidem diutissime: alius etiam nihil omnino spirare, cor de nihil impedire. At uero pulmonem quidem, ueluti subsilium cordis mollitudine sua excepturum, thoracem autem, tanquam septum praeculibus tutela gratia, non cordis modo, sed pulmonibus circumdedit natura. Cor autem in medio omnino thoracis sinu, secundum omnes dimensiones ad aequilibrium constitit, loco quum ad securitatem apertissimo, tum ad aequalem extero pulmone refrigerationem opportunissimo. Exultimam tamen id ad suam regionem situm, ob sinistri uentriculi pulsationem, quae circa sinistram mammam sentitur. Verum ad eius dextram, uentriculus etiam alius exiit, ad neminem cauam atque hepatis conuersus. Totus autem thorax secundum medium sui longitudinem, à ualidis quibusdam membranarum (quae anteriori quidem parte, osi pectoris: posteriore uero, spinam uertebrae inferuntur) in duos uentres distinctus: ut si forte magno uulnere in alterutrum eius partem accepto, respirationis munus eius partitis perierit, reliqua uenter in columis, dimidius saltem actionis retineat. Nam si uterque uenter confossus fuerit, uoce simul & respiratione plane destituerit animal. Ad huc nerui, arteriae quae in ipso thorace sunt, & uenae, & nerui, & aërioplasma, ac denique totus pulmo colligantur toti thoraci, tegunturque omnia, luscis membranarum obducta. Ne autem uena caua (quam necesse erat per medium septum transversum sursum ad cor ascendere, atque inde rursus ad nuncupatum ingulum) à respirationis organis, quae in assiduo motu uersantur, quicquam collideretur, ductae etiam tunicae praestant, quae tum illam, tum germina illius, adiacentibus particulis colligant, ac totam tunicae molem robustiorum efficiunt, ipsam uenam sursum ueluti manum ducentes. Auxilium autem eius uenae partibus singularem paratum, est triplex. Nam in medio quidem thorace, cor porrigit illi fortem productionem atque neruofam, tanquam dextram quandam. Parte uero inferna quintus pulmonis lobus (qui in dextra parte constitit, quippe, propter ram duntaxat uenam, quae per dextrum latus ascendit, excogitatus est) sensum illi exciuitur subiicitur. Suprema denique maximum & mollissimum adena, quem uocant thymon,

Respirationis et pulsus non feruari eundem contentum.

Cor respirandi instrumentum.

Cor trahere ex pulmone spiritum.

Thorax ueluti motus est cordis & pulmonis portus.

Cor in thorace modo ad aequilibrium locum.

Corda uentris eius sunt.

Thorax cor in duos uentres distinctum.

Vena caua fecerat.

Pulmonis quintus lobus rursus grata coudum.

Thorax quid.

Piscis esse amens motus: quid eorum pulmonem.

Pulmo uocis & respirationis est instrumentum.

Respiratio, cor du causa est inuenta.

Inspiratio uisum.

Expiratio uisum.

Cor dilatatum trahit.

Vacuamateria.

Pulmonis uisum.

Thymus.

thymon, ipsi natura subdidit. Porro duo magni lobi in utraq; pulmonis parte existunt: quoniam ille parvus, in dextris, vixit cauz graria, à transverso septo usq; ad cordis aurem pertingit. Hinc autem altera quidem pars vixit cauz in ipsum cor inferitur: altera vero, eademq; maior, rectè à iugulum fertur, deducta quadratenus à productionibus cordis, deinceps adene, quem thymon vocant, inuicta. Id vero naturæ est perpetuū, ut quonies sublime vas aliquod diuidit, ibi mediam glandulam, diuisione oppleturam, interferat. Sunt autem hoc in loco venarum germina maximarum, ad scapulas, & brachia, & mammae pertinentium: quibus ad munimentum & firmitudinem, ex prædictis glandulis natura commodat maximam conciliat. Cauter autem vixit, opposita ductus uia, cōspiciat descendit, per quem ad ventriculum cubus ab ore delabitur. Ipse igitur spinæ uertebri iunctus & colligatus, totum ita permeat thoracem, quodammodo obliquè politus, rursus amplexum sedem forsitur, ut neque ipse spiritus instrumentis aliquo negotio faceat, neq; ab illis etiam quicquam lædatur. Per medias enim ad perpendicularum quatuor uertebas dorso extensus, ubi ad quintam pertingit, deerrat quidem à recto cursu, digrediturq; ad dexteram, ut sedem præbeat meliorem, ac cedat instrumento magis præcipuo, maximæ omnium arterie: quæ ut firmitudinem nanciscatur, per uiam omnium breuissimam, à thorace illum spinæ locum ferecipit. Hanc enim ex sinistro cordis uentriculo exortam, in totum autem animantis corpus distribuendam, æquum fuit primum quidem in duas partes impares diuidi, carumq; esse multo maiorem, quæ deorsum fertur, quod totius animalis partes, quæ subijciuntur cordi, multo plures superioribus sint, ac maiores: deinde per optimam uertebri partem ferri. Atq; inuoluatur quidem ipsa arteria medijs uertebri: non tamen impetiosè admodum, nec superflue stomachum deprimit, sed paululū quidem & ipsa cedens, ipsum recipit & admittit so cium uertebrarum sedis. Ventrículo itaq; stomachus, quatuor quidem thoracis primis spondylis præteritis, propter reliquos octo, ad dexteram fertur. Cum primum uero septem transversum contigerit (quod est sanè ora inferior thoracis) membranæ fortibus admodum sublimè elatus, supra magnam rursus arteriam transit in alteram partem: quo loco præter lapsus septem transversum, ori uentriculi inferitur: sublimis quidem, ne in asperiorum ciborum transitu arteriam comprimat: in læuam uero declinans, quod eo in loco satis fuit constitui os uentriculi. Adde huc, quod neruis, qui à cerebro in uentriculum iuxta stomachum deferuntur, obliqua uia multo ruitur futura erat, quàm recta. Molles enim quæ sint hi, & tenues, si longo intervallo secundum rectitudinem tendentur, habentes uentriculum à seipsis suspensum, quæ subinde impleri cibo oportebat, utiq; distumperent facit. Cōstat igitur iam ex dictis, cor in medio thorace oportuisse locari, pulmonesq; ei undiq; circumfundī, suis lobis, cum digitis quibuscūq; in orbem id cōplectentes: utriq; ue-

rò extrinsecus circumdatū esse thoracem. Est autem cor non rotundum, sed turbinatum, ex basi cuius, ceu parte altissimum omnium principalissima simul atq; rutilissima, ipsa uasa exoritur. Quæ uerò ex utraq; parte cōsequuntur ad inferiorem finem, quasi latera quædam, uentriculorum generationi sunt destinata. At ipse finis inferior, processus quidam est foris & densus, qui ueluti operculum uentriculorum, propugnaculumq; rotius cordis existit. Atque hæc quidem cordis pars, si cum alijs eam conferas, longè abiectionissima est. Etenim quum triplex sit partium utilitas: aut enim refertur ad uitā ipsam, aut ad commodiorem uitam, aut ad horum duorum conseruationem: quæ sanè ad uitam ipsam particulæ conferunt, ex principes sunt habendæ: reliquorum uerò duorum generum, à primi generis præstantia discedentium, ex minus alijs dicere sunt putandæ, quibus hæc principes facillè

compariuntur. Quum igitur cor caloris natui, quo animal regitur, quasi fons quidam ac domiciliū sit, omnis eo modo ipsius pars princeps dicenda fuerit: at magis hæc, quæ uis totū animalis uitam conseruat: id quod faciūt duorū uasorum orificia in sinistro ipsius uentriculo, quæ medici spirituosum appellant. Horū enim duorum orificiorum, per minus quidem cor rīs, quæ in pulmone sunt, arterijs: per maius autem, omnibus quæ in toto animali habentur, continuū est. Minus autem his præcipua sunt ea quæ in altero ipsius uentriculo, quem * sanguificum uocant, insunt. Sunt tamen quæ alia hæc quoq; præstantiora: quorum alterum quidem, sanguinem in ipsum cor intromittit: alterum autem, ex ipso in pulmone ducit. Atq; ob magnitudinem duorum uasorum, cor ea parte fuit admodum magnum, & in media regione thoracis situm. Cor autem ipsum est caro dura, & ægrè patibilis, multiplicitibus fibris constata: quo nomine à musculo differt. Musculus siquidem unū tantum inest fibrarum genus, rectarū scilicet aut transversarum. Vtriusq; autem cor, & præter illas, etiam obliquas fortitur, duritie, contentione, & panendi difficultate plurimū ab alijs omnibus differens, ob actionis conniuitatem, & uehementiam, in qua semper cor ipsum uersatur. Porro singuli musculi, singulos habent ac simplices motus, ob idq; multiplici fibrarum uarietate nō egent, quemadmodum cor, uentriculus, maxilla, atq; uelica utraq;. Quippe liorum singula, rectis quidem fibris attrahunt, excurrunt transversis, retinent autem simul omnibus cooperantibus. Quorum omnium actiones in corde ipso, uel iam iam ab animali aulso, ac pulsante adhuc, uel detecto per anteriore regionem pectoris, contemplari licebit. Nam quō rectis quidem fibris contrahentibus se, reliquis aut diductis & laxis, contractio sanè fuerit facta longitudine, laxior uerò uniuersa ipsius latitudo, hoc statu cor totū uidebit dilatari. Contrā autem relaxantibus se rīs quæ sunt secundum longitudinē, contractis autem quæ sunt secundum latitudinem, eo casu rursus contrahi ipsum perspicies, ac deprimi. Medio porro inter has motiones intervallo, exigua quædam quies intercedit, corde qui-

Corde figura.
Corde uelica ori
ri ab illis hest
aliter partem
principali
fina.
Corde parte.

Vitæ partium
triplex.

Particulæ prin
cipi quæ dicant
tur.

Cor esse caloris
fons.

Sinister cordis
uentriculi arifi
cia duo.

Dexteri cordis
uentriculi arifi
cia duo.

Corde caro
qualis.

Musculus inesse
rum tantum
fibrarū genus.
Cor fuit omni
uibrarū genera.

Musculi singuli
in esse singuli
et simplices
motu.

Fibrarū actio
non uaria.

Corde dilatari
quando fuit

Corde contracto
quando fuit.

Corde quies
accidit, obliqua
operantibus fibris.

Vixit cauz pro
gressu ad super
iora.

Glandula ad
qua uixit natu
ra.

Cōspiciat spinæ
et spinæ.

Arteria magna
progreffus.

Arteriam maxi
mā ori à sinist
ro cordis uen
triculo.

Arteria magna
inferiorem tra
nsitum est supe
riorem maiorem.

Stomachi, si
necephali de
pressionis.

Cōspiciat im
plantatum in
uentrulam.

Ori uentriculi
fina.

Cor in medio
thorace, à pul
monibus cum
probatu.

Cordis contrahunt quæ adiuvent, vel ita possunt effici.

Pulmo et dexter cordis ventriculus, quibus adfuit.

Pulmonis interuentio, interius vocem, et dexter cordis ventriculus.

Dextrum cordis ventriculus gratia pulmonis: pulmonem gratia vocis et respirationis ei dicitur esse.

Piscis respirare perbranchias.

Piscis frigida res esse, quoniam magna refrigeratione est ipse indiget.

Piscis altem insipientia.

Cordis cum pulmone commercium.

Vasorum tunicarum in pulmone communis affectus natura.

Pulmo ex se motu expulsi, moventur ad motum thoracis.

Pulmonis vasorum natura alterari.

Inter materiam sanguinem crassum et tenuem.

dem circa ea quæ continent, undiq; ad unguè astric-
to, fibris autem nunc agentibus omnibus, & ea-
rum maxime obliquis. Adiuuant autem, imò to-
tam ferè contractionem efficiunt, quæ in inti-
mis ipsis cordis ventriculis nitidissima liga-
mentâ teiudantur, desinentia in illud, quod in-
teriacet inter ipsos ventriculos, septum. Ob eam
igitur causam, tum fortia ligamenta, tum omne
fibrarum genus cor habuit, ut facile dilateretur,
quando quod nature suæ est accommodatur, tra-
here appetit: astringatur uerò undiq; quan-
do ijs quæ traxerit, frui tempestiuum fuerit: con-
trahatur deniq; quando superfluis excernendis
se se accinxerit. His ergo quæ aërem per fauces,
nares, & os inspirant, pulmo, & dexter cordis
ventriculus inest. Reliquis uerò omnibus neq;
pulmo est, neq; ad dextram cordis partem lar-
tudo illa. Duo enim hæc necessarii unâ cû pul-
mone intereunt, animalis uox, & cordis dexter
ventriculus. Nam dexter quidem ventriculus,
gratia pulmonis est factus: pulmo uerò, respi-
rationis simul & uocis est instrumentum. At uo-
ciferas uocis piscibus rectè nulla est, ut qui in
aqua degant: sed nec respirare ipsis quidem licet
per fauces, quomodo ne nobis quidem ipsis, si
in eam mergamur: respirant tamè per branchias
a tri & uapori peruias, constructio quarum ipsis
uice pulmonis est. Natura etiam frigidiores sunt
pisces, quàm ut ipsorum cor magna refrigeratio-
ne indigeat: utpote exiguo sanguine præditi. Cæ-
terum quæ aquatilia multum sanguinis possi-
dent, ut delphinus, uirtulus, balæna, hæc omnia
aërè inspirant quodam incredibili modo, quem
aliquando exponemus. Iam uerò pro eo spiri-
tu quem cor à pulmone recipit, in illum per ar-
teriosam uenam à suo dextro uentriculo etiam
sanguinem mittit, mutuam ei gratiam referens.
Commutat autem in pulmone natura ipso-
rum uasorum tunicarum, uenam quidem faciens ar-
teriosam, uenosam autem arteriam. Siquidem
in solo pulmone arteria quidem uenæ, uena au-
tem arteriæ habuit tunicas. Et enim in toto ani-
malis corpore sarius fuit sanguinem quidem, ut-
pote crassum & grauem, tenui ac rara: spiritum
autem, nimirum enuem & leuem, densâ & cras-
sa concludi tunica: ut uidelicet hic quidem facili-
ter efflueret, ille autè æquè distribueretur. In pul-
mone autem diuersâ ratione construxit uasa na-
tura. Quum enim pulmo ex se omnino motus
expers, moueatur ad ipsius motum thoracis: ac
uenas quidem ipsas, quod sint ueluti promptuari-
um cibi, non conueniat eo motu moueri, sed
pulmoni largiri purissimum sanguinem: arte-
rias autem, cum receptacula spiritus, omnino ne-
cessum sit, facile quidem repleri, inspirantibus
nobis: celeriter uerò uacuari, expirantibus, & lo-
quentibus: ob id sanè cõmodum fuit, his quidè
molle, illis uerò durum corpus efficere: siquidem
has promptè obsequi utriusq; thoracis actioni-
bus, illas uerò prius nihil eis obediæ, præstare
rat. Quæ ex constructione contingit, ut quod pul-
monis corpus leue acrarum existens, sanguine
uaporoso & tenui nutriti indigeat (non autem,
quomodo iecur, limoso & crasso) fouerit exu-
berantissimo spiritu: per angusta quidem ora ip-

fius uenæ arteriosæ, quam tenuissimum sangui-
nem: per laxa uerò uenosæ arteriæ, copiosissi-
mum recipiat spiritum. Quare nutriendi ratio
pulmoni planè cõtraria est, ac cæteris omnibus
partibus, quæ madidum & substantia corporis.
Maximas autem uenas in eo natura construxit,
ut quantum propter tunicæ crassitudinē iustæ
nutritionis detrahatur, id magnitudine ipsarum
expleatur. Arripit autem uiolenter pulmo dilata-
tione sua, uel ex densissimis instrumentis, etiâ
aliquid nutrimenti, quod uehementi calore suo
in minimas partes comminuit. Porro quam uen-
nâ illæ arteriosæ, ob tunicarum diuersitatem à
causa omni non possent, sicuti neq; ipsarum ad na-
ta: reliqua sunt, ut à dextro cordis specu orirentur,
unde sanguinem elaboratum à corde ad ip-
sos pulmones transfunderent. Enumero ut à tho-
racis motu non uinceretur uena arteriosa, con-
sonū fuit illius ori membranas quasdam adiun-
ctas esse, quor, & quales nunc sunt: sine quarum
præsidio, in contractione pulmonis, ille sangui-
semel ad ipsum missus, rursus festiuere ad cor,
nec liceret hæc arterijs & uenis esse inuicem san-
guinem spiritumq; transire per anastomoses
ac osculorum ad apertiones, quæ lex in corpore
uniuerso obseruatur. Nunc autem rediit ip-
sius sanguinis, per os magnum uenę interciulo,
dum undiq; ipsa uena cõprimatur, destillat quip-
pam per exigua illa orificia in arterias. Quanto
igitur thorax conrendit uehementem, sanguinē
per contractionem uelut cor exprimens, tantò
membranæ exactius os ipsius uenæ claudunt.
Quippe ab interiore parte extrâ emergentes, to-
tūq; orificiū in orbem ita obfidentes, ut si ten-
se omnes atq; erectæ simul fuerint, unus mag-
næ totius orificiū obturantis speciem referant,
ab ijs quidem quæ ab internis extra erumpunt,
eueris, & extoriosis ad tunicas ipsius uenę decen-
dentes, transitum ipsis, ad aptero ac plurimum
diducto orificio, facile dant. Quod si quod ex-
trinsecus intro seratur, hoc ipsum cogit ita mem-
branas in unū, ut ex eis quandam ueluti portam
ad amissum clausam cõstituat. In omnibus itaq;
uasorum à corde proficentium orificijs membranæ
aliæ alias ascendentes existūt, ut ea, si fuerint
tense, obstruentes, materias remigrare prohibe-
ant. Propriū autem ipsarum est, educentium
quidem è corde materias, ne amplius ad ipsum
remeant: inducentiū uerò, ne contrâ ex ipso ef-
fluant. Cæterum quā sint omnino orificia qua-
ruor, bina in utroq; uentriculo: alterum quidem
inducit, alterum uerò educit. Quum igitur uena
caua simul & arteriosa, in dextrum cordis uen-
triculum definant (qui pulmonis gratia fuit factus)
per illam quidè trahitur sanguis, per hanc
autem emittitur. At uerò quæ animalia pulmo-
ne carent, ijs solus ille uentriculus inest, qui mo-
tum arterijs largitur. Nam ut nenq; ab hepate, ita
arteriæ à corde originem ducunt. Porro prima
agendorum causa, corpus actionis existit. Nam
quum plura causarum sint genera, primum quid-
em ac potissimum illud est, cuius causa aliquid
sit: secundum uerò, à quo fit: tertium, ex quo:
quartum, per quod: & quintū, si uis, à secundo
quod. Quibus quidem utem opus, ad opti-
mam

Pulmoni cur maxima penam infert.

Venas arteriosas esse uerò à dextro cordis specu.

Venas arteriosas et membranas quæ illa aduocant.

Venas arteriosas aduocant membranas tres, ut sit foras vergentes.

Vasorum omnium proficentium à corde orificijs, quæ illarum membranas obfident.

Cordis orificia quatuor.

Cordis ventriculum dextrum, fuisse gratia pulmonis factum.

Pulmone carentia animalia, habere suū trahunt sanguinem cordis ventriculo.

Cuncta causarum quatuor.

nam speciei singula quæ fiunt, effingit: arterias quidem pulmonis, raras venas ante densas efficiens, propter eam quam diximus causam. Quorum vasorum efformationi, seu materiam quandam subiecit humidis & sicci miscellam, usus calido & frigido iniuncte temperans, tanquam instrumentis efficiendis circa ipsam materiam. Quam in missione, partim quidem materiz exsiccare à calido constituit, partem autem frigido con crescere, atque ex horum denig mixtura, spiritum optimè temperatū gigni: quem postea statim in larum extendens, diducensq; materiam, cavum vas ac prælongum efficit, copiosiores quidem materiam affundens, cui melius erat esse crassior: parciorem autē, cui tenuiori. Noster siquidem conditor in efformandis particulis, hunc perpetuo scopum sequitur, nempe ut quod melius est, semper eligat. Quum igitur quatuor in corde sint orificia, tres quidem singulis alijs insunt membranz, quæ autem duntaxat arteriz venosæ. Oriuntur sane omnes ex orificijs ipsis: unde profectæ, alig quidem intro progrediuntur in cordis ventriculos, ad quos etiam ligamenti fortibus annectuntur: aliæ uerò foras uergunt, quæ primū utrumq; vas ē corde emergit. Sunt itaq; in uena arteriosa, quæ alit pulmonem, membranz tres intras foras spectantes, quas à figura literæ *sigma*, sigmo=des appellant. In ea autem uena quæ sanguinem introduct, tres quoq; foris intro pertinentes insunt membranz, sed quæ multum crassitie, robore, ac magnitudine illas antecant. Præterea etiam orificio illius maxime arteriz, quæ à sinistro ventriculo orta, principium est arteriarum omnium, tria quoq; membranarum *expansæ* intras foras uergunt in adnata insunt. Reliquum uerò arteriz uenosæ, quæ in pulmone distribuitur, orificium, duarum membranarum foris intro pertinentiū, habet adnata. Corde igitur dilatato, omnia ipsius ligamenta pertensa, trahunt ad seipsa, & uelut resciunt in membranas ad corpus cordis: membranas inquam uasorum inducentium materias. Quibus membranis reflexis, uasorum orificia patefiunt, ut facillimè possint cor materias ipsas attrahere, nimium causis omnibus, à quibus celerrima sit materiarum attractio, eodem aspirantibus. Nam quod suo loco transfertur, aut trahi ipsum oportet, aut mitti ab aliquo, aut deduci. Quæ omnia simul adfunt materijs, si cor dilatetur. Cor siquidem trahit: mittunt præpositæ ad aures cauitates, atq; ipsa uasa deducunt. Quorū omnium unum est motiois principij, cordis ipsius dilatatio. At aures (quæ sunt adnata quedam nervosa, & caua, ante orificia) laxæ quidē reliquo tempore sunt, & idcirco concave: quum uerò cor dilatatur, eodem quo membranz modo tendunt, & contrahuntur, ob idq; materias ex seipsis expressas præmittunt cordi, spiritum nempe ad refrigerationem, sanguinem ad nutritionē illius. Etenim quia uasa quæ materiam cordi suppeditant, si dilatato eo tracta uiolentius fuissent, quā tenues ac molles habeant tunicas, facili negotio diuellerentur: ob id aurium concavitates extrinsecus ad orificia singula excogitauit natura, ut ex illis, uelut ex promptuarijs quibuldam,

cor ipsum traheret, citra ullum uasorum discrimen. Vtiusq; autem auris substantia tenuis facta est, & nervosa, ut & contrahantur facilius, & etiam tutiores sint ab iniurijs extrinsecis. At uerò membranarum ipsarum, eas quæ uasus adiacent materias introducennbus, tantō fortiores & maiores oportuit esse q̃s, quæ inducennbus insunt, quanto maior in dilatando, quā in contrahendo uis est. Vt autē pauciores membranz tribus, minus exacte ac tardius orificia uasorum clauderent sic etiam si plures fuissent, imbecillio rem actionē exderent. In solo tamen arteriz uenose orificio, merito sunt duarum tantū membranz adnata. Solius siquidem huius orificij intererat, ne ad amissum clauderetur, propterea quod solū ipsum oportebat esse transitū à corde ad pulmones, extremis fuliginosis, quæ in illo ob copiam innati caloris necessariū gignuntur: quantū etiam & per reliqua trium uasorū orificia, aliquid retrō fertur & effluit. Nam quæ admodū in ipsa aspera arteria fieri non potest quominus transludentibus nobis exiguum quiddam humidum transcoleatur, sic membranz illæ non possunt adeo accuratè occludere illorū orificia uasorum, quin ultro citroq; aliquid sanguinis & spiritus permeet. Sunt enim omnia in omnibus, atque arteriz quidem tenuem & purum & uaporosum continent sanguinem: uenæ autem paucum, eundemq; caliginosum æcrem. Simili ratione per stomachum spiritus transludentibus atq; inspirantibus nobis ad uentriculum permeat: nihilq; est syncerum in corpore, sed omnia commercium habent cum omnibus. Etenim ipse cordis uentriculus pulsare quidem uterq; uidentur, non tamen pari mensura utriq; sanguis & spiritus adfit. Copiosior quippe est, in dextro quidem sanguinis, in sinistro autem spiritus substantia: uacuatur tamen sanguis per uulneratas arterias, quem à uenis per communionem orificiorū exagunt: adaptatio quorum hic etiam efficit, ut respirationis atq; pulsus unitas, uenis communicetur. Porro cordis sinistra pars à dmodū crassa est & dura, ut quæ uentriculi spirituosius tegumentū esset futura. Dextra uerò tenuis & mollis, simul quidem ut materijs utrobique esset consentaneus locus, simul autem ne cor in alterutram partem propenderet. Quare cor ipsum, in medio illius dux tunice (quam *pericardij* appellant) rectē firmiterque libratur. Quæ tunica ex capite ipsius amplissima exorietur, postea secundum figuram eius paulatim in mucronem contrahitur, uelut uallum quoddam ac domicilium ei circumiecta, tantumq; inter se ipsam & cor spatij circumscribens, quantum cordi dilatato suscipiendo erat satis. Est autem substantia ipsius tunice mediocriter crassa & robusta, ut neq; collidatur, neq; etiam pulmones lædat. Cæterum quo tempore cor dilatatur, membranarum radices trahens, aperit quidem orificia uasorum intro mittentū materias, claudit autem educentiū. In uniuersum autem leuiora omnia expeditius obsequuntur trahentibus. Imò uerò quæ in corde apparent foramina, pertinentia potissimum ad medium ipsius septum, prædictæ communionis gratia existunt, Est autem ani-

Aurium cordis subtile.

Arteria uenosa orificio, cor duarum tantū membranz adnata.

Omnia orificia uenarum.

Syncerum nihil in corpore.

Cordis uentriculus uterq; pulsus uidetur.

Veni communis cor pulsum et respirationem et pulsus.

Pericardij tunica.

Pericardij subleuata.

Leuiora expeditius obsequuntur trahentibus.

Vasorum generum.

Arteria uenosa orificio, cor duarum tantū membranz adnata.

Expansæ membranz intras foras uergunt in adnata insunt.

Arteria uenosa orificio, cor duarum tantū membranz adnata.

Translucens materiam quod respicitur.

Arteriam cordis uenalem.

Animalis spiritus est exhalatio benignissima sanguinis.

Arterij car tunica duplex.

Corde vasa quæ maiora sunt vasa.

Cor quod est crassum alimentum, quoniam sit spiritum.

Semilibus vasa quodque nutrit.

Cor à qua venas alatur.

Nervus nullus videtur in cor de tribus, neque in hepate, rene, testibus.

Cor nullam actionem animalem fovit.

Hepar animæ appetitus fovet.

Cor principium irascibilis facultatis.

Corde quale est infus.

Corde et ad quod vasa.

Vasa in vtero dispensant.

malis spiritus, exhalatio quædam benignissimi sanguinis. Quare merito sanguis purus & tenuis continetur in ipsis arterijs, utpote qui animalis spiritui sit alimentum futurus. Ob cuius tenuitatem spiritus, necnon propter motum perpetuum, utilis & duplici tunica fuit ipsis arterijs opus. Ad hæc, quæ venarum in cor infligitur, maior ea est, quæ ab eodem in pulmones inferitur, quum nimium velat sanguinem, qui per hanc defertur in illos, & qui in finitrum cordis specum ad ingnendos spiritus vitales transmutatur. Ad eundem autem modum arteria etiam, quæ ex pulmone ad cor perducit spiritum, multo minor est magna arteria, quod hæc quidem à dextro ventriculo aliquam sanguinis portionem assumat, omniumque arteriarum, quæ toto animali insunt, sit futurum principium. Quia vero corpus ipsius cordis crassum erat ac densum, alimentumque egebat crassioris, ob id sanguinem ducit à venâ causa, quo nutriatur, priusquam ea ad cor immigret. Cor itaque pulmonum alimentum præparat, sibi autem nequaquam. Quum enim quale est unumquodque, tali ipsum nutrum alimentum oporteat, iure optimo cor quidem crasso, pulmo autem uaporofo sanguine indiguit. Quæ causa est, ut cor non alatur ex seipso, sed priusquam uena causa dextro inferatur ventriculo, pars eius tanta, quanta cordi nutriendo erat satis, seu in cetera circa cordis caput, extrinsecus obvoluatur, & in omnes ipsius partes disseminetur: cum qua etiam tanta arteriarum magnæ portio dispergitur, quanta ad prædictam uenam refrigerandam, conservandamque problem temperamenti caloris innati externarum cordis partium, esse videbatur sufficiens. Nullus autem videtur nervus in cor distribui, quemadmodum necque in hepate, renibus, testibus. Solum namque pericardium propagines tenuium nervorum recipit: à quibus diffusis, sensibiles alias ac manifestas in cordis ipsius tunicae infert, in maioribus scilicet animalibus, consistat. Quemadmodum enim musculus omnibus, quod actionis animalis instrumentum essent, magnis nervis fuit opus: ita & cordi nullam actionem animalem habenti, tantis nervis opus fuit, quantis prædictorum uiscerum singulis à dextro etiam & pulmone. Communitur enim omnia hæc, ne sensu omnino carentes, nervos etiam habuerunt: privatim autem inter ea hepar & cor, quod illud quidem animæ appetitorius, hoc autem irascibilis esset principium. Ad hæc, in magnorum quidem animalium corde, os quoddam reperitur cartilagineum: in exiguis uero à modo, corpus ex cartilagine & nervo consistat: quod quidem tum ad ligamentorum principia tutius colliganda, tum ad totius cordis firmitatem, est constitutum. Hæc igitur sunt in perfectis iam animalibus cordis particularia. In istis autem quæ adhuc formantur in utero, animalia uerens natura pulmonem, qui necque absolutus est, necque motus præditus, non eandem postulare dispositionem, atque is qui perfectus quum sit, mouetur etiam, unum quidem uas ualidum, crassum & densum, ad arteriam magnam: alterum uero, imbecillum, & tenue, & rarum, ad uenam causam anastomosi applicuit. Quum igitur arteriam magnam, ad

crassum illud ac densum pulmonis uas, ad tenue uero & rarum uenam cauam per anastomoses * aperuisset, pulmonis quidem utraqque materias iuste largita est, & cor nihilominus à pulmonis seruitute liberauit. Quocirca non oportet mirari, si quum in illis nec sanguinem, nec spiritum mittat pulmonibus cor: necnotius corporis arterijs suppeditet, ut in perfectis: ad solam propriam uitæ quam paucissimo iudigerit spiritu, quem maxime etiam, ut opinor, ex ipsa magna arteria ducere poterat. Quinetiam licet cordi per id officium, cui soli tunicae duas foras intro pertinentes diximus adhærescere, ex pulmone sanguinem ac spiritum sibi multa attrahere. Vas siquidem hoc in scrobibus ex causa quidem uena sanguinem per quamdam memorandæ magnitudinis anastomosin recipit: quum sanguis alius in perfectis quidem, ex sanguineis: in scrobibus uero, ex spiritibus instrumentis sumatur. Etenim si facta adhuc utero matris lucente, per ipsius matricem penetrando, arteria quæ in umbilico sunt, uinculo exceperis, quæ in secundis sunt arteria omnes, pulsus destituerent, quum tamen quæ ipsi embryo insunt, adhuc pulsent. Quod si uenas etiam quæ sunt in umbilico laqueis complexus fueris, haudquaquam quæ in embryo sunt arterij amplius pulsauerint: quod uidelicet uis illa quæ mouet secundarias arterias, à corde ipsius factus proficiatur: à uenis autem per anastomoses arterij recipiant spiritum: à quo calor natiuus, saltem aliquantisper, seruari potest. Fieri igitur potest in corde, ut ex uase sanguinem continente, commodo aliquod calori, qui in finitro eius uentriculo est, accedat, cuius causa animalia & respirant, & pulsbibus egent. Cor itaque non modo in perfectis animalibus, sed in scrobibus etiam, unum illam arterijs suppeditat, quæ mouetur. Non tamen ipsa ceu utres statim replet aut inflat. Non quidem ob id dilatantur quod implentur arteria, sed quia dilatantur, implentur. Porro natura, quemadmodum uenam illam quæ ab umbilico pertinet ad iecur, & arterias quæ sunt ad spinam, tandem excicat, & ueluti funiculos quosdam tenues efficit: eundem modum & prædictas, quæ ad cor pertinent, uasorum anastomoses, in animalia iam nato abolet: quæ usui animalibus in lucem æditi futura non sunt, ea uel esse quidem permittens.

50 GALENI PERGAMENI de vsv partium lib. VII.

Ceterum quemadmodum hepar, sic etiam pulmo, quod plurimis est uasis contextus: quorum interualla molli carne replentur. Vasorum porro ipsius proficiunt, hoc quidem ex sinistro cordis uentriculo, illud autem ex dextro: tertium denique ex faucibus. Deinde illinc progressa uia duntur in quatuor lobos pulmonis. In quintum autem lobum (quum parvus sit, ac ueluti subnuculicum uenæ causæ, in dextra thoracis regione) propagines quædam exiguae, à uasis in lobum magnum illi propinquè distributis, disseminantur. Ambit autem lobos omnes extrinsecus tenuis quædam membrana, portiones quasdam eorum

Cor in vtero ac opere spiritum à magna attrahit.

Secundarias arterias moueri à corde factis debetis videri. Arterias foras per anastomoses recipere à venis spiritum.

Arteria implentur, quæ dilatantur, non dilatantur quæ implentur.

Instillia animalia natura ut effici quidem permittens.

Pulmonis vasa vnde oriuntur.

Pulmonis quatuor lobos.

Pulmonis tenuis.

eorum nervorū, qui iuxta stomachum infernē ad ventriculum tendunt, accipiens. Porro tertium illud vas, quod a faucibus in pulmonem descendit, quodvis aspera arteria, necnon bronchus dicitur, ex corporculis quibusdam cartilagineis circularibusque conficitur, per totam longitudinem colli optimē inter se ordinē singulariter compactis. At quod, qua parte contactura subiectum erit stomachū humilicem corpora, amplius habens secundum longitudinem rectas: ac breviter, continua illi, quæ ab ore in ventriculum ducit. Qyare per hanc membranā dum animalia deglutiunt, cartilagineas cum larynge ad ipsas fauces trahunt. Extrinsecus etiam alia circumducit tunica, veluti totius asperæ arteriæ non vulgare indumentū. Per hanc igitur arteriā asperam, quæ in omnes pulmonis partes est distributa cum uasis quæ a corde proficiunt, inspiratio & expiratio, uox & efflatio perficitur. Atque hoc solum in pulmone uas omnino uacuum est sanguine, quando animal secundum naturā se habet. Fuit autem instrumentum uocis omnino cartilagine opus, quum molliora quàm pro ipsius naturā prae imbecillitate aërem remissius percussit: duriora autem, faciliē ipsum evertant, sic ut fluere potius, quàm percussit aër ipse uideatur. At cartilago est simplex quædam particula, ut aliarum omnium durissima, sic ossē duntaxat mollior, ob idque ad eludendam uocem instrumentum aptissimum. Non est autem ex una simplici cartilagine & sola, constituta aspera arteria, sed membranosa quoque assumptis substantiis, quæ circulares eius annulos colligat, ut per animalis inspirationes, expirationesque, faciliē possit tum dilatarī, tum contrahi, quæ etiam longior, & brevior reddi. Siquidē mutationes pulmonis in longitudinem ac breuitatē, a ligamenti cartilagine inter se connectentibus, tensis quidē per inspirationes, per expirationes autem laxis, atque in se coincidentibus, proficiuntur: incrementum uero in latitudinem & coincidentiam, ab iis quæ interrupta annulorū complent, gibbis quidem factis extrorsum per ipsas inspirationes, laxis autē per expirationes, procedit. Ac proinde cartilagine ipsæ, uocis sunt instrumenta: quæ uero eas ligamenta coniungunt, respiratio nis. At pars illa quæ cum faucibus asperæ arteriæ connectit, & quæ sursum nobis transglutientibus fertur, cuius uocem aspera arteria præparat, larynx uocatur: qui rotus cartilagineus exiit, primum & principalissimum uocis est instrumentum. Quamquam uocē ab ipso æditam, palatum, ueluti refractoriū quoddam, & columella, tanquam plectrum, adaugent. Porro ipsius uocis materia expiratio est, a thoracis musculis facta. Pulmonis itaque propria particula est lux arteria, qua meritis pilæ caruētis, atque etiam pulmone, quod nō uocē quæuerit egerent, utpote in aquis degentes. Erit igitur ipsa aspera arteria respiratoris simul & uocis organum. Artifi-

ciōse autem natura cartilaginosa quidem partem arteriæ, ad anteriora colli: carnosam uero, quæ stomachum contactura erat, ad posteriora conuerit, ut faciliē asficeretur, stomachus quidem ab ipsa arteria, hæc autē rursus ab iniurijs extrinsecis. Qyare quum alio quidem tempore respiratio, alio autē transglutino fiat (nunquam enim simul contingunt) mutus uicifim capactibus arteria stomachusque utunt: ad eū tempore exiguo plurima, per utroque meatus, feratur propria materia. Ob idque constructum est rotundum utroque organum, ut per locum minimum plurima peruadat materia, utque utroque ab iniurijs sit tutius. Enam uero tunica illa (quam diximus) obtendit internæ parti ipsius asperæ arteriæ, ut destitilationes tum cibi tum porus, necnon fuliginosi spiritus, atque etiam humorum acrimiarum (quorum omnium delapsus prohiberi interdū non potest) excipiens, cartilagineas eius tueatur. Quarum quidem affectus aut inanimabiles sunt, aut sanari quamdifficillimi. At ipsius tunice incommoda faciliē resarciuntur: nisi forte illa quando à magna putredine, ipsius porro quædam erosa, cartilagineum penitus destituerit nudam. Exterius tenuis simul & densa facta est illa tunica, ut neque fistulæ capacitate sua mole angustiores redderet, nec faciliē defluentes succos imbibberet, uocemque sic efficeret raucam. Melius enim sonant fissa, quàm madida. Quia uero si

extremē sunt fissa, ipsæ quæ talia sunt moderatē, uocem deteriorē elidunt, ob id tunicæ quæ cartilaginibus subest, natura mediocriter fissa efficit, utroque excessum declinans. Verū nec aspera arteria habet sanguinis copiam quo alatur, antequam uenæ quædam a corde ipsi fuerint connectæ: neque ipsum constructum ullum ex respiratore percipit, priusquam per alas arterias lues, quæ tenuem, purum, & uaporosum continent sanguinem, nec solius spiritus instrumenta sunt, coniunctum & colligatum huic fuerit. Quarum leuium arteriarum oscula, à natura nihil agente temerē, eō commoderationis adducta sunt, ut uapori quidē ac spiritui sit peruius sanguini uero, & crassius similiter substantijs, inuis. Quod si forte aliquo tempore paritela, naturalem commoderationē amiserint, portio aliqua sanguinis ex leuibis in asperas arterias effunditur, quem casum repentinē cōsequitur, & sanguinis per os profusio. Ipsa porro caro pulmonum non solum diuisionem uaporū longē rutilissimā reddit, sed etiam quemadmodū hepatis caro ad cibī, sic ad aëris cōtinentē ea fuit comparata: ob idque mollis, foemulenta, & spiritus uola existit. Non enim cōsternerit nec repente aër quidē inspiramus, nutrimentum spiritus animalis eua dit, sed paulatim eum immutari est necesse, diuturnioreque tempore spiritui innato familiarem qualitatem acquirere. Cuius alterationis pulmonis caro primum est instrumentum. Spiritus igitur qui trahitur ab asperis arterijs extrinsecus, primum in pulmonis carne conficitur, dein autem in corde atque uniuersis arterijs, sed in eis precipue, quæ in plexu reniformi consistunt: at uicissim ac perfectissimē in uentriculis cerebri, ubi ubique efficit animalis. Cur autē nos ignorantes

Aspera arteria cartilaginosa fit.

Deglutitionem respirationemque nunquam eodē tempore fieri.

Aspera arteria membranosa interna non est.

Cartilagineum aspera arteria afflicto sonato dignissimum esse.

Aspera arteria tunica interna est tenuis, densa & moderatē fissa.

Cor efficit colligatū pulmonis per leues arterias.

Arteriarum cor de in pulmonē oscula.

Talis quando excutitur.

Pulmonis caro qualem, & quomodo respiciat.

Pulmonis carne conficitur spiritus animalis. Plurimum respiratur.

Aspera arteria constructa, breuissima.

Cartilagineum aspera arteria figura.

Aspera arteria membranosa interna.

Aspera arteria tunica exterior.

Aspera arteria quarum affectionum sit instrumentum.

Cartilago cur ad eludendam uocem sit instrumentum eam aptissimū.

Aspera arteria moueri uide pro ficiantur.

Cartilagine sunt instrumenta uocis.

Larynx primum & principalissimum instrumentum uocis.

Palatum, columella.

Vocis materia expiratio est. Vici carnis aspera arteria est pulmonis.

Spiritus animalis fieri in uterulo cerebri.
Aspera arteria sicut inter venas et laeves arteriam.

Venas arteriasque eorum una dicitur tribuere sicut.

Arteria venasque eorum una dicitur tribuere sicut.
Respirationis visus.

Arteria laevae inferas esse cordis sinistro ventriculo.
Respirationis visus.
Arteria laevae inferas esse cordis sinistro ventriculo.
Respirationis visus.

Pulmonis visus.
Arteria laevae inferas esse cordis sinistro ventriculo.

Spiritus trahi a corde in diafragma, expelli in systole.
Corde motus a natura.
Thoracis motus ab anima.
Respirationem esse arbitrarium.

planè substantiam animæ, eum animale uocamus, non est dicendi nunc locus. Fuit autè aspera arteria in medio laevis & uenæ locata, quod per mediam quidem laeuam, respirationis utilitatem cordi exhibitura erat: à uena autem, necessario debebat nutrirî. Ad hæc, à dorso quidè habet aspera arteria longam: ab anteriori autem parte, arteriam: quia longam à corde producere ipsam artèriam, quæ tenuè atq; imbecillè fortitur tunicâ, non erat tutum. Quare illam natura subitò à corde ortam, in pulmonem disseminauit. Alterum uerò uas quod fortius erat, abduxit longius. Facta est uenarum tunica dura, tum quod eas comprimi faciliè ac dilatari in respirationibus non oporteret (ut uidelicet ipsa thoracis capacitas spiritus instrumentis esset perpetuò patens: & ne sanguis ad cor ex eis uiolenter recurreret) tum etiâ quod sanguine uaporofo & tenui quàm crasso, pulmone ali erat melius. Arteriâ contrâ tunica est rara, ut liberalius pulmones fouerit suo tenuissimo sanguine, cordisq; trahenti spiritus, longè facilius cedant. Quum igitur usus respirationis primus & maximus sit, ut caloris symmetriâ conferuet: secundus autè, nec minor, ut nutrit animales spiritus, tum ad hæc, tum ad uocis generationem, pulmone accommodauit natura. Applicuit autem omnes arterias laeues sinistro cordis uentriculo, in quo calor natus est principî, perennè illi refrigeratione hinc cõparans. At uerò quod fuliginosum ac fumidû in ipso corde est, in illius cõpressionibus per has ipsas laeues arterias expuldit, multoq; adhuc magis per magnam arteriam ad alias. Pulmo igitur totam implens thoracis capacitatè, ad ipsiusmet thoracis motus mouet. Cõsequutione autè ad id quod uacual, prius semper leue quàm graue, attrahentia instrumeta sequit: quæ per ampla orificia multò facilius implent. At asperarum arteriarû omnium unum est maximum os, pertinens ad pharyngem: liguum autem aliud unum ad sinistram cordis uentriculû, ut uenarû etiam ad dextrum. Sed ex pharynge quidem, aer solus ad arterias asperas: ex dextro uentriculo sanguis solus ad uenas: ex sinistro, mixtû quid ex amboobus peruenit. Pulmone igitur dilataro, primò quidem externus aer asperas arterias implebit: secundò autem, quod ex sinistro cordis uentriculo effertur, laeues: postè modò denicq; a tertio horum omnium, sanguis implebit uenas. Antè uerò quàm asperæ arteriæ repleantur aère, ad quoduis aliorum nihil transmutatur. Fuerunt enim asperæ arteriæ à natura institutæ, ut pulmonem in maximam distensionè agerent. Ac proinde in inspirationibus aer exer nus in has solas necessario ingreditur. At spiritus in cor ipsum attrahitur, dilatato eo quemadmodum rursus compresso, excernitur. At laeues quidem arteriæ, cordis motibus: asperæ uerò pulmonis, insensuiunt. Verum ut cordis motus à natura, sic thoracis ab anima proficiscit: melius siquidem fuit ipsam respirationè uoluntariè insensui animalis. Jam pulmo neruis minimis præditus, ut rotus faciliè dilatetur & comprimat, in lobos dissectus est, quibus tanquam quibusdam digitis cor accuratè complectitur. Larynx

poterò ex tribus magnis cartilaginibus constat. Mouetur autem à musculis, propria quidem sua compositione, duodecim: quatenus uerò commercium habet cum uicinis particulis, ab alijs octo. Harum igitur laryngis cartilaginum, anterior est maxima, extrinsecus quidem conuexa, intus autem concava, prælongo scuto periformis: quare scutiformis uocatur. Secunda uerò cartilago, quanto minor est prima, tanto maior quàm tertia est: internis partibus, quæ consistit stomachus, positionè habens. Ceterum quantû maxima deficit à perfectâ figura circuli, hoc ipsa perficit. Etenim ubi definit ultima cartilago asperæ arteriæ, ibi primû quidem hæc secunda incipit, omnibus partibus totam illam contingens: hoc est, anteriore, posteriore, & obliqua. Paulo uerò supra anteriores ipsius partes cartilago scutiformis incipit: secunda uidelicet retrorsum cedente. Articulantur autem & committuntur inter se partibus obliquis. Atq; etiam paulò superius ligamenta quædam membranosa & neruosa, ex prima pertinent ad secundam. Verum ubi minor quæ intus est, definit, dux quidam superiorem paræ conuexitates. Incipit autem illinc tertia cartilago, quam arytenoidem appellant ob formam uasis, conuenientes ad amussim eminentijs illius cavitates habens, ad eam commissio harum duarum cartilaginum, duplicem articulationem efficit. Est autem strictior, quàm inferior basis, secunda cartilago: ob eamque causam totius laryngis ora infima, quæ asperam arteriam attingit, amplior est superiori orificio, quod in pharyngem definit. Atque etiam tertia cartilago in angustum ualde & ipsa definit. Conuersa autem est laeuis quopq; cartilaginis cavitates ad meum spiritus, ut ueluti fistula quædam fiat, quod ex tribus his est compositum. Parte uerò interpa, in ipso meatu laryngis, corpus quoddâ incumbit membranofum, a diposum & glandulosum, figurâ linguæ fittu le referens. Quod igitur primû in larynge uox efficiatur, quodq; dilatetur plurimû, & cõprimatur ad unguem supernum eius orificiû, alibi demonstramus: ob quas nimirû motiones necessum fuit laryngem nò ex simplici una, sed ex pluribus simul cõmissis cartilaginibus consisti, motumq; ipsius non naturalem, ut arteriarum, sed uoluntariè existerè, ad quem perficiendû musculi instituti fuerunt. In animalibus igitur magna uoce præditis, in quibus homo etiâ annumeratur, quatuor sunt musculi, qui cum secunda, cartilagine primam connectunt. Alij uerò quatuor in omnibus animalibus sunt, qui secundâ tertie: & alij duo, qui primam tertie cõmittunt. Deriuantur autè ex prima cartilagine scutiformi ad secundam, hoc pacto. Secundum finem inferiorem utriusq; cartilaginum, ubi tracheam artèriam, & seinuicem tangunt, ex magna cartilagine perueniunt ad secundam, extrorsum quidem duo musculi, intorsum autè duo, utraq; parte externi externis, & interni internis omnino æquales. Hi igitur exactè cõcitant, angustij efficiunt oram laryngis infernam, primam cartilagine secundæ simul applicantes. Alij uerò quatuor, qui secundam cum tertia iungunt, finem

Larynx ex tribus cartilaginibus constitutus: huius constitutus a natura: à prius duodecim musculis.
Scutiformis & prima cartilago laryngis, quæ positionem habet.

Laryngis cartilago secunda.

Laryngis tertia cartilago arytenoides.

Ligula cõsiderata.

Vocem primò in larynge formatam.

Larynx cor non ex simplicis cartilagine consistit.

Laryngis cartilaginum connectentes musculi.

finem laryngis superiorem aperiant. Quorum
qui parte sunt posteriore, cartilaginem aryte-
noideam retrō ſectant: ad obliqua uerō pluri-
mum diducūt, qui ſtrum ibi habent obliquum.
Porro reſqui duo, iis quatuor actionem & po-
ſitionem contrariam habentes, claudunt ad un-
guem os ſuperum laryngis, ad internam ca-
pacitatem, primam cartilaginem adducentes.
Decem igitur dicti muſculi, trium cartilaginum
ſunt cōmunes: alij uerō duo ſunt in baſi aryte-
noidis. Cæterum alij ſunt his multo maiores, ſo-
liſq; ſcutiformis proprij: quorum duo quidem,
ex inferioribus oſis hyoidis lateribus habent
originē, indeq; ſecundū longitudinē omnē pri-
mæ cartilaginis produciunt parte anteriore. Alj
uerō duo, ab ipſa quidem cartilagine exorti, ſed
ad pectus tendentes, alijs duobus miſcent. Re-
liqui duo tranſuerſi muſculi, ex obliquis ſtom-
achiformis partibus enati, deinde in orbem ſtom-
achum cōplectentes, ſimul inter ſe cōiungunt. Quo-
niam igitur duplices genere oportebat ipſis car-
tilaginibus inefſe articulationes & motus, alios
quidem, qui eas dilatarent, & comprimerent:
alios autem, qui clauderent & aperirent: ad prio-
rum quidem morum conſtitutionem, primæ
ad ſecundam facta eſt articulatione: ad ſecundo-
rum uerō, ſecundæ ad tertiam. At motus alio ter-
tio genere præterea quā minimè egeret larynx,
neque articulatione tertia, & proinde neq; par-
ticula quarta indiguit. Illi igitur primi muſculi
decem, in larynge ipſo cōſiſtunt, cum nullo adia-
centium inſtrumentorū connexi. Alj uerō octo
muſculi, colligantes ipſum cum circunſuſi cor-
poribus, alterius motus ſunt duces, quo nimi-
um totius ſpiracionis meatus ampliſcat, con-
ſtringiturq;. Quorū qui ab oſſe hyoide ad par-
tes anteriores ac ſuperiores pertinet, cartilaginē
primam trahentes, à poſterioribus eam car-
tilaginibus abducunt, meatumq; ampliſcant. Mu-
ſculi uerō obliqui, contrariam huius actionem ha-
bentes, ac poſicionem, qui ex ſcutiformi car-
tilagine deorſum feruntur, partes cartilaginis in-
feriores contrahunt, trahuntq; inſrā, cum hio-
leniter aſperam arteriam contrahentes, & con-
ſtringentes. Reſqui autem, qui ex obliquis ſcu-
tiformis partibus prodeunt, huius partes primæ
cartilaginis protrahunt, ſecundæq; applicant,
quo meatus conſtringatur. At pharynx, ſubſtan-
tia & figura ab alijs corporis partibus differēs,
principaliffimum uocis eſt inſtrumentum, lin-
guam alieuſius ſiſtule referens. Mebus autem ſit
corpus hoc ſiſtularum linguæ minimè aſimilare,
ſed eaſe huius porius: quandoquidē natura &
prior tempore, & in operibus ſapiens magis
quā art ipſa exiſtit. Quare ſi corpus hoc natu-
ræ eſt opus, illud autem quod in ſiſtulis eſt, art
inueniūt, nimirū hoc ad illius imitationem ab ali-
quo ſapienti uiro excogitātū fuerit, qui intelli-
geat ac imitari naturę opera potuit. Cæterū quod
abſq; lingua inuſitū ſit ſiſtula, res ipſa indicat: ſi-
cuti enī uocē fieri nō poſſe, niſi trāſitus ſit angu-
ſtior. Etenim ad pden dā uocē, opus eſt motione
ſpiritus, quæ ab infernis repente ſimul erumpat:
necnon anguſtiori tranſitu, eoſq; non ſimplici-
ter, ſed qui paulatim quidē ex amplo adſtrictius

tendat, paulatim ruriſus ex ſtrictiori ampliſce-
tur: ad quod penitus eſſicac ipſius laryngis ligu-
la, quam epiglottida uocant: quæ non nō dō
ad uocem eſt neceſſaria, ſed etiam ad colubi-
tationem ſpiritus. Nam particule ipſius tum dex-
træ, tum ſiniſtræ, adeo in idem cōeunt, ut ſubſpi-
ſis incidant, claudantq; exactē meatū. In utraq;
autem ipſius ligulæ parte dextra & ſiniſtra, natu-
ra foramen unum, uel potius rimam ac ſiſtulam
quandā eſſicac, qui parte interna uentriculū enī
unū minimè paruum appoſuit. Quare à dextris
ac ſiniſtris ſpiritus intro præterfluens, nullam
habet cauſam, cur aut rimam ipſam aperiat, aut
etiam uentriculum oppleat. At quum pulſus
ab internis quidē uiolenter ſpiritus fuerit, ſed ſu-
perne, quo minus rectā ſeruat, inlubetur, ibi re-
ſractus, & factio uelut uertigine, ad latera me-
atus conuertit, quibus magna ui incidens, mem-
branas utriuſq; ſiſſuræ, ad ſubiectas uſq; cauſa-
tes diducit: totam autem opplet ligulam, atque
inſrā, quam rem ſubſequitur neceſſario exactā
meatus ipſius obſtruit. Porro corpus ipſius
epiglottidos membranofum quidem exiſtit, ut
ne ab ſpiritu impletum, aut à motibus laryngis
commotum, rumpatur. Humidum autem ſimul
& uſcidum, & quoddammodo pingue eſt, ut pro-
pria humiditate, eaſq; non facile diſſolubilis (qua-
lis eſt unctuoſa & uſcoſa) madet perpetuō: id
quod maximè ad uocem deſideratur. Vnde ne-
que n qui ex ardentiſſimis reſſicac ſunt febrili-
bus, nec qui per magnos æſtus ſecerunt iter, lo-
qui prius poſſunt, quā perſuſus larynx eis fue-
rit. Quum igit muſculi laryngē claudentes, qui
ipſam quoq; ligulam comprehendunt, quicq;
reſiſtunt muſculus uniuerſis thoracem ipſum con-
trahentibus, ex media baſi ſcutiformis emer-
gant, rectū uerō protrudent, tantum ſpatij par-
te poſteriori atque obliqua circunſcribentes, ut
proxime tertiæ cartilaginis articulationē perti-
neant, neceſſariū ſit ut partes eius inferiores ali-
quot neruos inferi. Siquidē muſculus omnibus,
aut in ipſum caput neruus inſigunt, à cerebro,
uel ſpinali medulla facultatem ſenſicam ac mo-
tricem ad ipſos perferens: aut omnino in partij
abſquam, quæ ſub caput ſunt, aut certè non infra
mediū corpus, ad caudam uerō nunquā: alioqui
principium ea eſſet muſculi, nō ſinis. Omnibus
autem commune eſt muſculus, ut ad eam partē
dūſi extendant, ad quā uergunt ipſorū ſibræ.
Neceſſariū eſt etiam, reliquis quoq; duabus ner-
uorum coniugationibus, à quibus larynx os
ceſſatur, ex parte inferna neruos immitte. Non
tamen aequales magnitudine, aut æque pollen-
tes robore neruos poſtulant duo muſculi aper-
ientes laryngē, & alij duo qui eundē claudunt
huiſquidē omnibus thoracis muſculus, in ſpiri-
tus cohibitione obſiſtunt: illi autem per expira-
tiones eſſe obſequij præſtant. At uerō quum
ſatis conſtiterit neruū omnē manare uel à cerebro,
uel à ſpinali medulla, cæteris quidem muſculis
omnibus, qui ad caput ſunt & collum, motus eſt
facilis. Siquidē in eos qui ſuperne ſeruntur deor-
ſum, à cerebro neruus manifeſte inferitur: in
obliquis uerō, à ſpinali medulla colli, ex ſepti-
ma coniugatione, quod & ipſa exortum habet

Epiglottis ad vo-
cem et colubum
ut ſpiritus ma-
nare neceſſaria

Ligula ſiſſura
& uentriculi.

Epiglottis cor-
poris quale.

Voci neceſſariū
eſſe madet ſan-
ctum.

Muſculus emai-
bus inferi ner-
uorum aut in ip-
ſum caput, aut
in partem ali-
quā qua circa
mediū ſunt.

Muſculi ad eam
partem trahunt
tur dūſi, ad
quam uergunt
ipſorum ſibræ.

Neruus emai-
bus à cerebro
uel à ſpinali
medulla or-
tur.

Laryngis muscu-
la vnde suis ner-
vis recipiant.

Recurrentium
nervorum laryn-
gis consideratio.

Natura opera
offe longi lyra-
na maiora.

Nervi qui ma-
gis deperitescere
a cerebro, eo ma-
gis deperitescere.
Epiglottidis su-
perioris.

Epiglottidis sub-
stantia, magis
rotunda sit.

obliquum. Videndum igitur est, unde nam sex illi prædicti musculi, qui recti secundum laryngis longitudinem, à partibus inferioribus sursum tendunt, suos nervos fortiantur. Enimvero à cerebro posteriori nervorum est recta productio per totum collum deorsum, & utraq; alperere arterie procedens: cui parva quædam alia se iungit. Ab hac productione ceteri laryngis musculi (præter sex illos) atq; etiam eorum nonnulli qui in collo sunt recti, distributiones accipiunt. Verum quum sexta hæc nervorum coniugatio sit maxima, non parva etiam eius propago totum collum præterlapsa, decidit in thoracem: & primam quidem nervorum coniugationem producit ad thoracem ipsum, & radicem costarum pertinentem. Alias autem præter has multas, partim ad cor, partim ad pulmonem, ac stomachum, partim denique ad omnia viscera inferiora, delegat. Dum igitur nervi hi per thoracem deferuntur, propago quædam utringue fertur, per eandem reuertitur viam, qua prius prius descenderat, seu cursum reciprocans. Siquid ubi uterq; nervus usq; ad regionem cordis processit, finister quidē longius progressus, circum maximam arteriam, veluti cicca rotulam aut metā, quicquidā fortem atq; transversam obvolvitur, postissimū ea in parte, qua primū à corde emergens, sese ad spinam inflectit. Dexter uero, quum nullū haberet in ea thoracis parte, per quam fertur, ascensum similem, circa illam arteriam partem, quæ obliqua à corde sursum ad dextrā axillam fertur, obducitur. Sed quia flexio hæc erat multo deterior, quā illa sinistra ad cor, utpote obliqua, partim multitudine productionum nervi in utraq; partem, ab eadem regione emissi, partim etiā ligamentorum vi corroborauit ipsam naturā, cuius opera non modō laudibus, sed sunt etiam hymnis maiora. Nervus itaq; uterq; (quatenus dictū est) circumductus sursum ad alperere arterie caput recurrit, idem quidē iter conficiens, ac prius: nulli uero amplius musculo, ne minimam quidem sui portionem distribuens, quod nullum alium musculum principium motionis suæ ex partibus inferioribus necesse erat accipere. Dispergitur autem eorum uterq; in laryngis musculis sibi corespondentes: qui dextra quidē est parte, in tres illi ē directi politos: qui autem sinistra, in reliquos tres, ambō uero in sex, à quibus aperiri & claudi laryngis contingit. Conciliantur autem sibi prædicti nervi, robore non mediocri, ex interiori longitudine: quum in productionibus primis, nervi omnes sint molles, & cerebro ipsi ad similes: progredientes uero, magis magisque seipsos diuiores eua dant. Iam inter espirantem, in meatum spiritus nō pono modō, sed eibus etiā repente incidere, nisi natura providē orificio laryngis epiglottida, velut operculū, admoisset: rectam quidem alio tempore omni quo animal espirat stantem: quum autem quidvis transglutitur, laryngi ipsi assidentem. Siquidē ipsum quod transglutitur, seu primū ipsius radici incidens, post autem dorso inuectum, inclinari ipsam cogit, ac collabi, ut cuius substantia cartilago sit, eaq; prætenus. Figura autem epiglottidis rotunda est: at magnitudine, paulo maior orifi-

cio laryngis. Vergit porro ad stomachum, positionemq; habet tertie cartilagini *aperturam* contrariam, utpote ex aduersa illi regione exorta. Verum quemadmodum à cibariis epiglottidis in laryngis meatum compellitur, ita ab ipsa quoq; muni, cartilago *aperturam* ostendit. Spectat enim & illa in laryngis capacitatem: quo fit, ut eorum impetus quæ sursum à stomacho suggeruntur, deo iō ipsius incidens, totam cartilaginem facile in locum cedentem euerat. Nec tamen ita claudunt meatum laryngis huiusmodi cartilagines, ut nihil prius transfluere possit, sed ne multum, neue confertim. Siquidem exiguum quiddam pononis semper in alperam arteriam delabitur, non per mediam laxitatem iter suum faciens, sed in orbem secundum tunicas eius inuictum, quo nimirum madescit atq; fouetur pulmo. Quin & glandule ipsæ quæ laryngi adiacent, laxiores & fungosiores quum sint, portionem eius humoris excipiunt, ut eo uideatur partes omnes circumstantes perfundat. Quod aut transglutientibus nobis cibis, atrophagus à larynge toto cartilaginoso minimē coarctetur, ob id fit, quia tunc commutatur posnō eorum: quippe stomachi initium, ad alperam descendit arteriam, larynx uero sursum ad fauces ecurrit. Porro bona pars musculorum linguæ, necnon musculorum laryngis coniugatio anterior, alijq; nonnulli qui ad omoplatas feruntur, præterea robustius alius geminus, qui ad os pectoris fertur, postremo alij duo musculi pertinentes ad genas, sicuti & ceteri quæ parui, qui sunt ad radices propaginis, quos columbares appellat, sui inquit omnes musculi, ab osse hyoide ob similitudinem literæ sic appellato, oriuntur. At musculi ultimi omnium dicti, & qui ante illos sunt, generis ipsius sunt proprii, quum mouent obliquis motibus sibi oppositis. Qui autem ab osse hyoide inferuntur linguæ, illius gratia extiterunt: quibus oppositis simul est it, qui duplex ad pectoris os descendit, ut deorsum hyoides detrahat, si forte à superioribus musculis violentius sursum tendat: existens etiā cartilagini scutiformi propugnaculū quoddā, quemadmodū & ipsum hyoides. Huc addē, quod id osculus tracheæ arteriæ simul coercet ac dirigit. Quin etiā & qui ad omoplatas feruntur musculi, tum laryngis, tum osis hyoidis motum uersus collum efficiunt. Inuictū igitur gibbis ipsius laryngis hoc os, à multis musculis oppositis sibi inuicem & equipollentibus communiter, atq; in medio firmatur. Verum ad maiorem securitatem, non solum duobus ipsius osis lateribus applicuit natura ligamenta quædam robusta, sed etiam cartilaginosa quædam alia & rotunda proquens, ea utriq; lateri inseruit. Connectit autem nihilominus per membranas quædā, non modō ad laryngē & epiglottidem, uerum etiam ad stomachum, à quibus firmiter continet annexum capiti, his quidem osseum magis, alij cartilagineū, pro ratione musculorum qui ab eo exoriuntur. Quod pertinet ad thoracem, alibi demonstrauimus, multa esse illi motus principia: respirationemq; aliam omni carere ui, aliam uolentiam existere: atque utriq; proprios inesse musculos.

Arystoteles
cartilago.

Afferat in ar-
teriam illam sem-
per mensuram po-
tionis.

Glandula adia-
cent laryngi.

Laryngis recur-
rent ad fauces
transglutientibus
nobis.
Musculi ab osse
hyoide producti

Hyoides in em-
bryone propugnaculum
cartilagineum scutiforme.

Hyoidis osse
ligamentum dupli-
ce.

Respiratio du-
plex.

Porro

Musculorum in
terofalium fi-
bra qualem uer-
te re possunt
habere.

Septi transversi
substantia et co-
nice.

Diaphragma
in vfu.
Costa mendofo-
sa ad finem car-
tilaginea.

Pectoris os.
Cartilago en-
siformis.

Capitulum, se-
ptem uocis effe,
et quing. men-
dofis.
Principia ani-
malis trita.

Erronem non
quosque musculus
cum sensum adhi-
erere motui.
Craniū immo-
bile, propugnato-
rium cerebri.

Thorax cor ex
qñbus formatur
et musculi dñt.

Lac esse recem-
tum vitis ali-
mentum.
Lac, quibus ani-
malibus colligitur in
pectore nequeat.

Mammæ inesse
plures numero-
sas una parte
prolem edenti-
bus.

Mamma quib-
us in pectore dua.
Mammæ repro-
ducere esse cor-
di.

Lac quibus, seu
gummi elaborato,
Mammæ va-
le vnde excor-
ti.

Porro muscularum, qui inter costas sunt, fibræ, ab una costa ad aliam perueniunt, cum parua ad obliqui declinatione: quin etiam interius si longi, externis situm contrarium habent: necnon illæ quæ ad os pectoris in partibus costarum cartilaginosis consistunt, contrariæ sunt ipsæ, quæ in ossibus sunt, usque ad uertebra. Propria septi transversi substantia, musculus est: tunica uero ipsi duæ infans: inferior quidem, peritonæi tunice summæ: superior aut, basis tunice succingentis costas. Consert aut diaphragma, non solum ad pellenda extrinsecus alui, sed etiam ad ipsum respirationem. At cartilago multa notari costarum extremitatibus circumfusa est, quod tumoris sint ipsæ ab iniurijs extrinsecis, ac per eas subiecta corpora. Nā pulsata cartilago minimè cōmuni, aut frangit. Iam uero pectorale os (cuius ultima pars est cartilago ensiformis, oris ventriculi, septi transversi, cordisq. similiter propugnaculum) ex septem ossibus constat, quod septem in ipsum costæ ueræ articulare sint: nam reliquæ mendosæ sunt quing. Quum enim tria essent principia, quæ animal ipsum dispensant, os quidem immo- bile sine musculis primo principio circumiecit natura. Solos autem musculos tertio clargita est. At medio inter utrumq. posito, & ossa & musculus. Cerebrum namque in nullos usus indiguit musculis, cœu fons motus uoluntarij & principium. Quo fit, ut craniū immobile, quasi murus, ipsi fit circumdant. Quod si hepar aut uentriculo septum eius generis aliquod circumfusus fuisset, ubi cubus & potus exciperetur: ubi fœtus moles cresceretur: Quæ deniq. excernerent superflua, si nullus illis præesset musculus. At thorax motu penitus amississet, si ex solis constaret ossibus. Sin uero contræ ex solis musculis, inciderent hi pulmōni & cordi, nemine eos exploderent. Vigitur simul quiddam spatium intus esset, simul autem totum instrumentum moueretur, musculi alternatim fuerunt ossibus interpositi. Quod uero ad mammam spectat, quum lac utilis alimentis superfluum sit, iure optimo quibus animalibus in cornua & alia id genus, in partibus superioribus copia superfluum absumebatur, in his quidem ad thoracem non poterat aceruari aliud utile incrementum. Vnde ad uentrem eorum, ex thorace natura mammas deduxit: atq. illic numerosam quidem uno partu prolem edentibus, multas: contrarijs autem binas tantum apposuit. Porro quibus animalibus in partibus superioribus superflui nihil absumit, his in pectore eas collocauit. Et si unū aut duo concipiant, duas. Sin uero plures, duas quidem in pectore, alias uero inferius adhibet. At in homine merito mammas pectori adhaerent, ubi & cordi tegumēto esse possunt, utpote glandulose existentes, crassius indumentis per similes, & multo melius quam alibi, eis sanguine in uenis elaborato, copiam optimi lactis consilcere. Siquid ex uena caua, ubi iam prope clauas peruenit, natura duas uenarū cōmemorabilem, ac duas item cum eis arteriarū propagines, quatuor simul eas infra per totū pectus deduxit: eorū modo binas demū utriusq. mammæ inseruit, in tam longo itinere et molire, ut plu-

rimū in uasis esset sanguis percoctus. Qui quī fertur sursum, per cor sanè iter facit: rursusq. deorsum tendens, occurrat: exagitatq. semper quidem à motu thoracis, & in his eiusmodi uagationibus incalecit, parti perpetuo motu prædixit ad immoratus: quæ omnia simul ad perfectam ipsi coctionem conferunt. Porro quibus animalibus mammarum in pectore sunt, seruantur & in musculis: quibus uero in uentre solū infans, non adiacet seruatur, nisi parua similitudinem corporis cum matre potius quam cum patre obtineat. In uniuersum autem constat, omnem feminam esse masculo frigidiorē.

GALENI PERGAMENI de vfu partium lib. VIII.

At collum fuit constitutum unius asperæ arteriæ gratia, uidereturq. ob id semper unū cum pulmone interire. Quam obrem pifces omnes, quod pulmōnem non habent, collo carent: contrā autē, quibus animalibus inest pulmo, ea & collo prædixit sunt, & spiritū attrahunt in pulmōnem per arteriā asperā, rursusq. eiciunt per eandē. Ad hæc effatio, quæ uocis materia est, eiusdem arteriæ est actio, citra quam nec uox efficitur. Etyq. primum & principalissimū uocis instrumentum (cui larynx nomen est) finis superior asperæ arteriæ, quæ etiam pharyngæ nominant, quemadmodū & liguli, quæ laryngi incumbit. Idcirco, si pulmōni asperæ arteriæ affinis, tantosq. animalis usus præstat, eius sanè gratia collum formatum extitit: ob idq. prius nata collo animalia, sunt muta. Etenim quum in thorace continetur pulmo, asperæ arteriæ ex ipso emergens, ad os, magno interuallō semotū, necessariō pertinet, spatiū sanè quod ori & thoraci interiacet, quum asperæ arteriæ sit transitus, eorum etiam exiit uia, quæ tum supernè deorsum, tum infernè sursum feruntur. Ac supernè quidem feruntur deorsum nerui, stomachus, musculi, & (spinalis medulla: infernè uero sursum uenæ, arteriæ, atq. ipsa pharynx. At spinalis medulla munimento sunt circumpositæ uertebra: uasorū uero diuisiones glandulæ replent: membranz item ac ligamenta quædam, muniunt simul prædicta & colligant. Quibus omnibus cutis commune operimentum exiit. Animalia quæ alimentum sibi à terra ore suppeditant, collum habent longitudine cruribus simile. At homo, & quæ similia et animalia sunt, quum propter pharyngē collū, & illam uocis & respirationis grana possideret, magnitudinē etiam collū fortissimè tantū, quanta pharyngi necessaria ad prædictas actiones erat. Ad hæc etiā, quō oportet partes eas quæ ad lumerum, brachiū, ulnam, extremū manū, ac deniq. septum transuersum spectant, à spinali medulla collū neruū accipere, horum neruorū gratia, in spatio inter caput atq. thoracē medio, alij generati sunt spondyli, ex quibus collum constat. Caput autem plurimū usum effe propter cerebrum factum fuisse, ob eamq. causam sensus omnes in se continere, tanquam seruos quosdam & magni regis stipendios. At cancri & alij mollī crusta in

Collū elaborata
non quæ conser-
uant.

Mamma quæ
ad hanc uocem
ad pectus masculi

Feminas omnes
esse masculo si-
gificiores.

Collum fuisse fa-
ctum gratia as-
peræ arteriæ.
Collum uocis in-
strumentum, cum pul-
mone.

Effatio exiit
uocis materia.
Larynx est pri-
cipalissimū in-
strumentum uo-
cis.
Pharynx.
Ligula.

Collū prius
fuit muta.

Spinalis medul-
la munimēto
uertebra.
Glandulæ re-
plent diuisiones
uasorum.
Cutis operimen-
tum commune.
Collū longitudo
in uarijs ani-
malibus varia.

Collū uertebra
quibus parti-
bus nerui lar-
guatur.

Cancri canere
capite.

rectus, caput quidem non est: particula tamen quæ sensum dux est, ac motus voluntarij, omnino certè eis in thorace consistit, ubi omnia ipsi sensui instrumenta insunt. Itaq; quod in nobis est cerebrum, id in illis sanè animalibus erit pars ea, ad quam prædictorum quodq; refertur. Ceterum existimare, caloris qui cordi inest refrigerandi gratia, cerebrum fuisse constructum (quas fuit sententia Aristotelis) omnino absurdum videtur, nec admissible, ac si quis dicat, calcaneum cordis causa existisse. Nam qui obsecro fieri potest, ut cor assiduâ respiracione acris commodissime refrigeratum (utpote refertum arterijs & venis, quibus nulla est calidior in corpore ani mali particula) à cerebro quod remotissimum est, crassissimiq; interceptum obsibus, ac semper ipso aëre calidius, aliquod refrigerium desideret? Etenim ubi cranium est fractum, id curam præcipue, ut quancitissime ossa fracta excidamus, ne videret ipsam cerebrum occursum aëris refrigeretur: id quod certè esset malorum ultimum, illi cui fractum est caput. Atqui si aër cerebro esset calidior, haudquaquam refrigeraretur ab eo. Nunc autem vel si ætas fuerit, refrigeratur facile, indigetq; etiam rursu foveri citissime, tanquam non solum id non sit frigidum, sed ne citra molestia quidem occursum substantiæ frigide toleret. Aut quo modo satis cordi re frigendo esse potest, cor autem non multo magis cerebrum supra se positum possit excalfacere, quom calor omnis feratur sublimè? Cur etiâ, ad cor quidem obscura quædâ apophysis ab ipso pertinet, sensum vero instrumenta à cerebro portione immensa recipiunt? Etenim in utraq; aurem insignis nervus una cum meningibus inseratur. In utraq; etiam vases portio cerebri pertinet, multo maior ea, quæ ad aures peruenit. Similiter in utroq; oculus, unus quidè molli nervus in radicem ipsius, unus autem durus, in musculos mouentes inseritur. Ad linguâ verò, nonne quatuor, duo quidem molles per palatum tendunt: duo autem duri, secus utroq; aurem ferunt? In uniuersum autem omnia cum ipso cerebro communionem habent. Quod quidem quom longinqua quidem refrigeret, proxima autem non afficiat similiter, monstru quoddam esse mihi videtur. Fieri autem non potest, ut particulæ alicuius utilitatè ritè exponamus, nisi totus instrumenti actionem prius inuenerimus. Cerebrum igitur principium exitit nervorum, sensusq; & voluntarij motus. Cor autem, arteriarum atq; valvularum insit. Porro etsi cerebrum (quod ipsi prædicant, hoc est, in capite situm, dicitur) in animalibus capitis expertibus iuxta pectus collocatum cernatur, non ob id tamen aliud quippiam cerebro proportionale, dicemus illis inesse, sed idem ipsum, licet vetus nomen id non conueniat. Siquidè quod sensus ac motus principium est, unum atq; idem est in omnibus animalibus, etiam si in locis diuersis inueniantur. Quum igitur in animalibus capite destitutus, cerebrum atq; etiam os sint ad pectus, sicuti & aures & nares, manifestum utiq; est, propter nullam earum particularum caput conditum fuisse à natura. Ceterum eisdem animalibus capite

destitutus, ut cancri, balani, scarabeisq; oculi sublimis, ut qui duri & robusti futuri erant, condati prælongis ceruicibus insunt, quod illorum aërio locum aditum postulare. Quæ causa etiâ fuit, ut qui hostiâ aut prædonum longe iunctas in cursoribus speculantur, muros aut turres altas, aut montes quosdam conficiant. Homini autem, ceterisq; animalibus ei similibus, toros oculos molles necessariò habiturus, prælongis ceruicibus oculos imponere erat periculosus. Quum igitur neq; in imo confusus eos, è re ipsâ esset, natura inuenit quæ faceret ipsis partem, quæ alta simul esset, & eos tueri facis posset: supra quidem supercilia continens: infra uerò quas malas appellamus, attollens: inter nis præterea partibus nasum applicans: ut exterius, olus processum, quod iugale appellamus, lam uerò sensoria omnia neruum postulat mollem: nerui quidè, quia is sensui est instrumentum: mollem autem, quia sensorium, ut sentiat, pati & affici debet: uerum quod molle est, ad patiendum: quod durum, ad agendum est aptius. Proinde sensoria quæ motu voluntarij aguntur, ut oculus ipse & lingua, duplex habuerunt neruorum genus, non unum duntaxat molle, perinde ac aures & nares. Quod si quando aliter eorum lesum fuerit, ea facultas utilitatem quam ipsi neruus præstabat. Videre namq; sapere est linguam, aliâ quidem ad motû, aliâ autè ad saporû dignotionè, esse impediram. Oriunt autem nerui molles, ex mollibus cerebri partibus: duri autè, ex duris. Rursus illi quidè recta ad sensoria, illi uerò per circuitû tendunt. Neruorû itaq; descendendum ad linguam, illi quidem ex inferioribus & anterioribus orti, statim insiguntur in ipsam: hi autè ex posterioribus, obliquisq; emergentes, circum collum prius obvoluunt. Ceterum molles quidem, in extremam linguæ su perficiem ad saporès diiudicandos, in musculos uerò ad motum duri disseminant. Eadem porro ratio est & in oculorum neruis: duri quippe in ipsorum musculos inseruntur: alij uerò in primum & principalissimum usus instrumentum, humorem scilicet crystallinum. Quorum mollium neruorum nullus ultra sensoria progredit: alioqui faciliè perirentur progressi. Ob hanc igitur causam sensoria omnia prope cerebrum esse oportebat. Quod quidem si uerum est, constat utiq; cerebrum propter oculos in capite collocatum esse: reliqua autem sensoria omnia, propter cerebrum. Similiter etiam de ore liquet, quod hoc quoq; adiacere capiti erat necesse: aut potius in se continere linguâ, ut quæ ad iudicandos saporès, concinnandum sermonem, ac denique ad masticandos & transiguitendos cibos, neque quam alibi quidem in ore commodius collocari potuisset. Est autem cerebrum substantia quidè neruis simillimum (quorum ipsum principium erat futurû) nisi quod illas est mollius. Nam id etiam illi expediebat, ut quod sensus quidem omnes recipit, omnesq; imaginationes, & intellectus completit. Quia uerò neruorû oportebat duplicem esse materiâ, duplex etiam cerebrum exstitit, mollius quidè anterius, ad producendos molles: posterius autem durius, quod ueryan-

Animalibus in
parte destituta
quales oculi in
sunt.

Oculorum firmi
liggi iustissimum.

Sensoria postula
rent nerui mol
les.

Sensorium dum
sensit, partem
mollem ad pa
tiendum oportet.
Dura, ad agendum
aptiora.

Sensory quæ
voluntarij mo
uentur, duplex
neruorû genus
iustis.

Neruum mol
lem, duriorisq;
ortu atq; pro
gressu.
Lingua nerui
rati de oratione.

Oculorû nerui.

Crystallinum hu
mor. principa
lissimum visus
organum.

Cerebrum pro
pter oculos in ca
pite collocatur,
propter cerebrum
autem sensoria
reliqua.

Lingua visus.
Cerebrum ner
uis est similli
mum, mollius ta
men.

Cerebrum reci
pit sensum, im
aginationesq; &
intellectum com
plet.

Cerebri parti an
terior est molli
or molli, postie
rior durior, du
rius nerui signu
da.

Aristoteles opi
nari refertur.

Cerebrum firmi
per esse calidius
aëre.

Cranii fractu
quid agendum
procapit.
Cerebri refrige
rationem in cra
ni fractu, esse
malorum reli
quorum.

Cerebrum facili
ter ab aëre refri
gerari.

Calor omnis sub
limi feratur.
Cerebri cordi
exigua, sensum
equum inuoca
sam neruorum
apophysis mat
ter.

Aurium nerui.
Nerui denuti
ati partem ce
rebrum.

Oculorû nerui.
Lingua nerui.

Cerebriq; ner
uorum, sensusq;
& motus volun
tarij prius capi
tur.

Cerebri arteria
rum insit, cal
latu argu.

garida

partes nominant, ad duriorum nervorum generationem. Quum autem mollis cum duro non admodum conveniens futurus esset contactus, dicitur cerebri partes duplicata dura meninge, quæ cõplexura erat totum cerebrũ, dirimuntur, & per meatũ solum, qui sub capite uestitur est, & corpora meatum ipsũ ambientia, coniunguntur. Ad hæc, ipsius anterioris cerebri, quæ partes duntaxat meningem contingunt, medijs duriores sunt, quum ad patiendi difficultatem, tum ad productionem durorum nervorũ: quales sunt qui oculos movent: nam à medijs cõmodè molles oriuntur. At ex ea parte cerebri posteriori, mollis nervus penitus nullus producitur. Igitur nervi omnes cõsistentia cerebro sunt duriores, opacis tantum exceptis, qui cerebro densiores quum sint, duriores eo non apparent, seu soli ex cerebri substantia veluti concreta, non tamen exsiccata, conflant. Qui soli etiam sensibiles quodam poros in seipsis habere videntur. Quò igitur in capite quatuor sint instrumenta sensoria, quæ à cerebro sensus principij habent, etsi hac ratione similia appareant, inest tamen eis secundum speciem dissimilitudo, non modò in ipsis sentiendi facultatibus, verumetiam in corporibus, per quæ facultates ipsæ feruntur. Quandoquidem facultatum alia odorum, alia saporum, alia sonorum, alia est colorum dijudicatrix. Viarum autem, quæ quidem quæ fert ab utroque ventriculo ad nares, productio est prælonga, nihil ab ipsis ventriculis discrepans. Quæ uero ad oculos ducit, variat iam quodammodo & dilatat, non tamen planè certus est nervus. Quæ ad linguam descendit, perfectè quidem est nervus, sed mollis. Quæ denique ad aures, nec similiter quidem mollis, nec tamen certè est durus. Quanta uero uiaium facultatis à cerebro descendentes, fortis simul ac durus est nervus, ad motus quidem, & ad ea quæ crassiarum sunt partium sensu tactus dignoscenda, optimè accommodatus: ad exquisitiorem autem aliquam dignotionem, cuiusmodi alijs sensorijs inest, admodum ineptus atque impotens. Quandoquidem omnia hæc, ut sensus fiat, immutentur omnino esse necesse. Immutatur autem non à quouis sensibili omne sensorium: sed splendidum quidem ac luminosum, à coloribus aëreũ, à sonis: uaporosum, alijs odoribus: atque (ut in summa dicam) simile simili est notum & familiare. Igitur nullum sensorij, præterquam uisus, à coloribus immutabitur. Solus etiam uisus sensorium habet immutabile, & perurum, splendidumque, humorem uidelicet crystallinũ. At nullum præstaret usum ipsius sensorij alteratio, nisi eam imaginario, ratiocinatio, & memoria (quæ ad principem animæ pertinent facultatem) perciperent. Producit itaque cerebrum ad humorem crystallinum quandam à sefe portionem, ut affectus eius humoris agnoscat quæ productio fuit meritis merum habuit sensibile, ut per eam, ad lucidum splendidumque sensorium, maxima copia spiritus à principio ipso transmitteretur. Cæterum ea ipsa productio, usque ad uiam quidem quæ fert ad oculum, mollis, rara, pura, & sincera extenditur: ubi uero iam elapsura est crasso, securitatis gratia, durior & compactior efficitur.

Quum autem in cavitates quæ supercilij subijuncti inciderit, amplificatur plurimum, pristinaque naturam recipit, sic ut cerebrum esse uideatur. Postea uero ad pupillam coalescit, eadem ipsa propago quæ oculis inest: ad quam mirari propaginem corneæ tunicae (cui humor crystallinus incumbit) tenuis, alba, & pura quum sit, facile colorum externorum alterationem transmittit. Quia uero etiam ad aures propaginè quandoque à cerebro erat necessum descendere, excuturam occursum sensibile (quod erat sonus & uox, aut repercussio aëris) os durum ac densum auribus oppositũ, flexibus obliquis instar labyrinthi natura ipsa pertendit, quod frigidi quidem aëris uires integras, flexuum uarietate, sensum exoluere: aliorum autem corporum exiguiorũ impetũ propulsiore. Igitur propter patiendi difficultatem ita constructi sunt auditorij meatus: necnò uterque auditorius nervus, durior effectus est, quam ut ipsi actioni cõueniat. Lingua autem nervus (est quatuor locis sensorij dixerimus esse) est mollior, & qualem esse oportebat: quia natura illi poterat oris tegumento ad maximè securitatem cõsulere. Auditorius uero, ad patiendi difficultatē, potius quam ad sentiendi promptitudinem, fuit comparatus. At solum sensorij olfactus intra craniũ consistit, nempe in ipsis uentriculis anterioribus cerebri, qui etiam uaporosum quandam spiritũ continent. Ad cuius quidem sensibile transmittendum liberè, & conservandum, oportebat reperire uiam tantò rariore atque latiore auditorio meatu, quanto sensibile huius, quod auditus, crassioris erat partium. Ferè enim, quantum aër partium tenuitate à luce relinquit, tantum uapor etiam ab aëre. Quum igitur cerebri uentriculo loco inferiori sint finis, ex partibusque libi propinquius necessariis etiam excrementa affluuntia excipiant, ne melior quidem illa uia excogitari ea potuit, quæ ampla simul atque decliuus esset. At talis quidem est narium meatus, per quem intus foras excrementa excernuntur: foris autem intro, penetrant sensibilia olfaciendi. Quorum utilitatem, altera ad uitam necessaria est, altera ad commodiorem uitam. Sunt tamen & alij canales duo, qui per palatum in os, totius cerebri excrementa eruant: qui duo soli purgant do sufficient cerebri, quando animal omnino rectè habet. Quare propter odorem dignotionem potissimum, atque hac adhuc antequorem, & necessariam ad uitam inspirationem in cerebrum, facta sunt illa in nares foramina. Ex abundanti uero cerebri malè affecti excrementa repurgant. Oppositum autem natura ipsi olfaciendi sensorio, os quoddam uariè pertusum, uelut spongiam quandam, simul ne aliud corpus durè extrinsecus incidat, simul ne uiribus integris aër frigidus inspirantibus nobis recta in cerebri irumpat uentriculos. Quia ratione etiam, quæ sunt ante meningis ossa, illiusque à cribri similitudine ducti, spongiarum instar admodum foraminulenta uident, meatibus tortuosius distincta. Quinetiam & dura meninx, quæ cerebrum cõtegit, similiter perforata est. Cæterum non facile per foramina illius expurgarentur pituitosiora excrementa cerebri, nec sine magno negotio ipse

Cornua iuuicæ quædam.

Auditorij frons leuissimè & tenuis.

Auditorij meatus uisitas.

Lingua nervosa.

Olfactus sensorij solum consistit in uentriculis cerebri.

Olfactus sensibile est crassiorum partium, quoniam sensibile auditus.

Narium meatus uisitas.

Palati foramina uisitas.

Inspiratio in cerebrum esse necessariam ad uitam.

Ossis uelut spongiæ.

Meninx dura esse iuuicæ uisitas.

Cerebri anterior à posteriori ribus dirimi, non tercedente dura meninge. Oculorum materiam nervi uideat exstantes.

Opticus nervus solum cerebri non est partem duriorum.

Opticus nervus solum sensibiles meatus feruntur. Sensus in capite quatuor.

Facultas sensorij quatuor plenè. Productio autem à cerebro ad sensoria distincta.

Nervi durus & fortis præstare uiam, confertur ad ea quæ crassiarum sunt partium, tam ad dignoscenda.

Sensum non immutari à quouis sensibili.

Simile simili notum & familiare.

Uisus sensorium quale.

Sensorij alterationem, ut fiat sensus ab imaginatione, ratio, cõsuetudo, memoria, debere percipi.

Uisus quo modo fiat.

Opticorum nervorum promptus.

uapor ascenderet, qui est sensibile olfactus, nisi utrumque opus inspiratione simul & expiratione, cerebri natura promoueret. Quare illapsus quidē inspiracionis, quæ fit in cerebro, promouetur odorum dignotio: expirationis uero impetu, superfluorum excretio: nempe ueluentia spiritus, una cum fecum excrementa peritinaia trahente. At quæ in meatu nimis impacta sunt, ea efflano ne expurgantur. Ipsa uero rursus odorū dignotio, non parum iuuat totam respirationem: non finens uapores prauos, qui alioqui nos latent, una cum puro spiritu ingredit. Porro unicuique sepe instrumentum multis actionibus sufficit: ut uidelicet tenuis meninx, quæ secundæ perissimis cerebrum stabilis ac regis, uasibus ipsius omnia colligat. Sed in omnes etiam cerebri partes hæc membrana se infinuat, totum ipsum contentens, extendensque se usque ad uentriculorum capacitatem. Est tamen & tegumentū cerebri crassa meninx, aut potius propugnaculum quoddam, propulsandis oppressiōibus cranij oppositū. Tenuis autem meninx, naturale operimentum eius existit. Nam crassa certē ab ipso est seiuncta, exidentibus autem uasis coherens. Quod si tenuem illam meningem non interposuisset natura, cerebrum cum crassa meninge uicinas non uacaret dolore. Sola autem si fuisset illa, adhæsisset haud citra noxam cranio. Quū igitur id natura descendum sit medium, quod eadem proportione ab extremis distat, neutra uero meninx ad portionem alii cranio & cerebro distet, merito certe, ne cerebrum aut eius operimentū quicquam afficeretur, prior quidem tenuis meninx, postquam autem, crassa locata est, quæ quantum ossi est mollior, tantō tenui membrana est durior: quantum autem hac tenuis est mollior, tantō tenui cerebrum mollius enata existit. Duobus igitur medijs & uinculis natura ipsa tutō inter cranium & cerebrum necessitudinē conciliat. Quæmodum igitur cerebrum tenuis meninx, sic illam crassa, atque hanc denique cranium ambit, & cōprehendit, citꝫ per multa uincula annectitur: quæ quidem ab ipsa meninge, membranarū instar exorta, extenduntur singula uersus partem cranij sibi ē directō correspondentem: inde per futuras progreffa, sibi murō occurrunt, coaptantur, & coalescunt, cōmunemque ex seipsis omnibus pericranium procreant membranā, quæ cum cranio duram meningem connectit. Iam uero duo anteriores uentriculi cerebri (qui cerebro spiritum animale prius & consuecunt, & præparant) inspirationem, & expirationem, ipsamque efflationē efficiunt. Eos autem præstat esse duos quā unum, quod esset inferius canalis duplex, & sensoriū omne, cerebrumque ipsum sit geminum. Prima tamen, maximeque communis geminorum instrumentorum utilitas est, ut si alterum eorum lesum fuerit, subsueuat reliquum. In Ionia siquidem uidimus quendā a dolente uulnere in alterum anteriorū cerebri

non licuit, quare nec duas spinales medullas: ac proinde nec duplex esse cerebri posteriores uentriculus poterat, quum ex ipso spinalis medulla oriarur. Sed quoniam nerui omnes qui sub capite in totum sparguntur corpus, aut ex posteriori cerebro, aut ex medulla spinali oriuntur, uentriculum hunc oportuit maximum esse, & uentriculisque anterioribus per meatum insignē, animalem spiritum antea in illis elaboratum, excipere: per quem nimirum meatum, procedentem ab extremitate communi anteriorum uentriculorum, quem nonnulli quartum uentriculum uocant, cum cerebro, hoc est, anteriori cerebri parte (quæ postica maior est) parencephalis, hoc est, cerebellum cōmittitur. Pars autem cerebri quæ supra cōmunem illam cauitatem est sita, uelutidomus tectum, in sphaeræ superficiem cōcauam circumducta, haud ab re appellatur *napirpus*, & *flaccidioris*, quod tenuitudo aut fornicis instar sit fabrefacta. Quæ quidem partem omnem cerebri incumbentem, sine labore sustinet. Vndique enim sibi ipsi simillimum est, quod rotundū est, atque orbiculare: ob idque omnium figurarum ad patendum est difficillimum, omniumque etiam est capacissimū, eamque æqualem dimensionem sortiuntur. Est autem commodum id minime contemnendū in organis uniuersis, quæ ad continentendū substantias quasdam fuerunt comparata: id quod re ipsa constat, enī in illo meatu, qui ad uentriculum, quem cameratum diximus, ducit ad parencephalidā. Omnes etenim meatus corporis, quæmodum & uniuersi uentriculi, secundum iporum mediū, omnino sphaerici sunt, quod sic capaciores existant, ac difficilior etiam patiantur. Quum autem uentriculos qui materiales magis substantias recipiunt, expedit esse maiores: minores uero, qui materiales maiorum uirium ac facularis, hoc est, elaboratas magis & absolutas, continent: sanē uentriculus posterioris cerebri, minor merito fuit anterioribus. Iam cerebellum ipsum minime quidem ex magnis flexibus tenui meninge interceptis, ut cerebrum, sed ex multis quidem, & his admodum paruis, alioque modo structis, consistat. Quia uero nō in solis uentriculis, sed in toto cerebri corpore continetur multus animalis spiritus, exitimandum est plurimum etiam in posteriori cerebro contineri, ut quod omnium qui in totum corpus distribuuntur neruorum principium futurū sit: medijs illa intervalla, quæ partes eius connectunt, spiritus esse uas. At intellectus sequitur non compositionis uarietatem, sed corporis cogitantis, intelligentis, bonam temperiem. Neque enim bonitas ac perfectio intellectus multitudini spiritus animalis potius attribuenda uidetur, quàm qualitati. Ad principium aut illius meatus qui uentriculos anteriores cū cerebello cōiungit, appositū est glandulosum corpus, si figura conuexius dictum: quod quidem cerebri pars nō existens, diuisione illius magnæ uenę expiet ac firmat, & quæ omnes ferē anteriorū uentriculorum plexus *periplexus* constanter. Exenditur præterea secundum totum meatū inter ambas eminentias cerebri, quæ *paries*, hoc est, paruas nates, appellant, epiphysis quædam uermi similis,

Odorū dignotio promouetur ab inspiratione cerebri.

Excretionē superfluoꝝ a cerebro expulsiōis naturā.

Odorū dignotio totius plurimum totius respirationis instrumentum unicum pluribus actionibus sufficit.

Meningis tenuis uis.

Crassa meninx uis.

Meningis breuius inter cerebrum & crassam consistit: crassam, inter tenuem & crassam.

Medium natura quod sit.

Pericranium a crassa meninge ortum, cranio aliū annectit.

Cerebri anterior uis uentriculorum inspirationem, expirationem, atque efflationem efficit.

Sensorium omnino esse geminum.

Geminorum utilitas.

Cerebri alteri uentriculo ualens, fuisse quendam uersum.

Ventriculus cerebri posterior omnium uerum, ab anterioribus per ueniam meatu, animalis spiritum recipit.

Parencephalis.

Capirpus.

Figuram circulaꝝ esse difficillimam ad patendum, capacissimamque.

Ventriculus cerebri posterioris maior.

Animalem spiritum contineri non in uentriculo modo, sed in toto cerebro.

Intellectus temperantia iugatur.

Kardprop corpus.

Paries, epiphysis uermi similis.

similis, ex particulis quamplurimis, cōnexis per membranas tenues, composita: quæ quidem cerebri pars existens, altera parte sui, posteriori cerebri ventriculo annectitur. Inde aut paulatim adanctæ, ac secundū meatum porrecta, ipsum totum planè obstruit. Ceterū ubi contracta reflescit, idēq; transuersis flexibus, meatum totum in tantum aperit, in quantum retrorsum cesserit. Etenim cum hic in seipsum cōfident rotundetur, quantum minuitur longitudo, tantum tantū eius augetur. Quare constat ea sic paulo magis amplificata, in solas meatus partes, quæ ad latus sunt, stricissimas, nequaquam ingredi posse fines ipsius inferiores. Semper autem tantum de meatu aperitur, quantum de illius conuexitate, in ipsam in gressura, minuitur. Quibus quidem mononibus hoc ipsum corpus transitu ipirium præbit, do minatur. Alligatur autē emicnens cerebri, ligamentis quibuldam, a quibus utringue constructa & cōcicta, cōtinetur, ne diuagari possit: cuius quidem epiphyxis cōstructione, alia nulla melior potuit excogitari. Nullam siquidem inuenias cōstructionis bonitatem ad actionis perfectionem, meliorem ea, quæ ad eodē exquisita existit, ut si uel tantillum immutes, tota confestim uideatur.

GALENI PERGAMENI de vsu partium lib. IX.

Quum autem succi eius quod ad partē cōfluit, hoc quidem, ceu uti, alisimiletur illi hoc uerō, tanquam alienum, omnino externi conueniat. certē ad hanc excretionē natura meatus opportuno desiderat. Quos nisi nacta fuerit, acruatum ibi excrementum, primum quidem inītar oneris grauat, deinde prohibet quo minus succi benigni illuc cōfluant, illorū uias preoccupans: quo fit ut membrū nutrirī nō sinat: sed quemadmodū animalia esurientia, lutum, aut aliud quiduis simile uorant, ita partes accommodato sibi alimento carentes, cogantur aliquid uel ex ipsis prauis succis attrahere. Vnde postea in ipsis collecta excrementa, putrescent tandem, ac sic acriora simul & calidiora reddunt, inflammationes, erysipelata, herpetas, carbunculos, febres, innumerabilesq; aliorum morborū turbam exuscitant. Quare magnam semper curam natura adhibuit, ut excrenentur superficialia. Quæ cum genere sint duplicia (alia enim uaporosa & fumosa, naturaliter ad sublimia feruntur: alia autem aquosa & limosa, motu suo deorsum decumbūt) uacuandis quidem his quæ ad superficiem uolant, meatus quosdam tenues in altū duxit: decubies autē & amplos eis subdidit, quæ suo pondere delabuntur ad inferiora. Ceterū decubies cerebri meatus, tum per palatum in os, tum per corpus nariū, sensibilia excrementa eructant. At uaporosæ excretionēs, præ tenuitate sensum nostrum effugiunt. Porro in humidis quidem & mollibus corporis partibus, nulla est prescripta recta quædam tali excretioni uia, quæ humidum omne ac molle corpus, cedere quidem expediat: his quæ impetu concitatore per ipsum feruntur: transmissis uerō his, rursus coire

atq; coalescere solet. At in duris corporibus, nisi uia quædam prius parata sit, transire per eam nihil potest. Idcirco in cranio, quod cerebri ceu galea quædam exiit, cōspiciat ac sensiles uias natura uaporosis his fuliginosisq; excrementis aperuit: simul quidem ipsum cauernosum efficiens, simul & uariis futuris coarctatū. Alioqui nec potuisset caput ipsum purgari, quod quidem quum a subiectis partibus omnia quæ sursum feruntur fuliginosa excrementa excipiat, largiori eger euacuatione. Osium autem quæ ad primum ad future generationem, utringue eminentiam habet & cauitatem, non una serie, sed situ alternantes, ut duarum ferrarum sese inuicem ingredientium inītar, mutuo inter se coherescant, utroq; nimirum osse cauitatibus suis excipiente eminentias alterius. Quæ structura maxime ad securitatē & firmitudinē uidetur habere momentum, præter id, quod etiam per futuras fit transpiratio. Non sunt autem foraminibus pertusa capitis ossa, sed intus cauernulas cōplures sortiuntur, quod oportet utraq; eorum superficiem lauem & æqualem exiit, ne uel licet alpedine sua, quam utiq; foratē obtinuisent, colliderēt tum pericranium, tum ipsas meningēs cerebri. Craliōra igitur fuliginosorum excrementorū per futuras solas uacuatur: nam tenuioribus, uel cranium ipsum est peruiū. Nec uerō ad transpiratum duntaxat, sed ad exidentia etiam uia tenuia sutura ipsius natura est abusa. Non est factum capitis os tenue simul & densum, sicuti neq; densum & crassum, sed rarum, cauernosum, & crassum, quod sic neq; grauaturum esset, nec uiam in cerebrum breuem, uulnerans se, daturum. Meatum porro quæ ad palatum descendunt, alter quidē profectus ex fundo medijs uentriculi cerebri, fertur deorsum: reliquos uerō emergit a meatu qui cerebrum cerebello connectit. Fertur autem obliquus deorsum, uersus alterum. Quum uerō primum simul in idem conuenerint, locus quidam cōmunis, constitutus a tenui meninge, utrosque excipit, cauius ac decliuius, ueluti quædam lacuna, cuius labrū superiū abolutus est circulus. Inde magis ac magis arctatus descendens in subiectū adenē, manifestat cauitatem habentem, excrementisq; transcolantem, immititur. Excipit autem hunc, os cribro simile in palatum desinens. Quum igitur locorum omnium quæ in toto sint corpore, longē turisissimū sit, qui circa adenem predictum uersatur, inter cerebrum & os palari cōstitens, merito retiformis plexus, omnium quæ illic uisuntur maxime admiranda particula, inibi collocatus est, completēs quidem in orbem & ipsum adenem, perringens autem retrō longissimē. Toti quidem cerebri basi propemodum hic plexus subhincitur, ex maxima portione earum arteriarum quæ a corde sursum ad caput feruntur, contextus. Est autem non simplex rete, sed cuiusmodi uulgaria lux piscatorum retia, si plura alia alijs cumulata superinijciat. Reliqua porro arteriarum pars, quæ rectā ad caput ascendit, ubi cranium sunt prætergressa, medio inter hoc & crassam meningem loco, primum quidem diuiduntur in crebras, casiq; ad modum

*Craniū in se
meatus suos
per quos fuliginosa
excrementa
tor.*

*Sutura crani
quæ ossa de
solidatur.*

*Cerebri excrementa crassiora, quæ per futuras
expiit.*

*Craniū crassum, rarum, &
cauernosum.*

*Cerebri meatum ad palatum
descendens.*

*Lacuna cerebri.
Aden subiectus
cerebri.*

*Os celerissimum.
Locus omnium
turbissimus.*

Retiformis plexus ubi locatus

*Retiformis plexus ex plurimis
arterijs contextus.*

*Ventriculorum
corpus transitu
ipirium præbit.*

*Partes destitutas
famulari alimentis
expiit
Excrementa putrescentia
qua mala uisuntur.*

*Excrementorum
duo genera.*

*Cerebri meatum
decliuiū
osium.*

*Excretionēs uaporosas sensum
effugient
Excrementa humida
moderata natu
ra.*

60

tenuis arterias: quarum alix in capitis anteriora, alix in posteriora, alix ad laeam, alix ad dextram feruntur, inter se muru cōplexæ. Postea uerò ex ipsa, ueluti radicibus in truncum suum coalescentibus, coniugatio alia arteriarū enascitur, ei quæ initio à corde sursum ferebatur, æqua bilis: eòq; modo iam per crassie meningis foramina subit ad cerebrū. Etenim ubi natura uult exactè materiā conficere, diuturnā ei moram in coctionis instrumentis comparat: id quod licet planè uidere in flexibus illis uariciformibus, qui ad testiculos pertinet. Venæ liquidæ & arteriæ in primis flexu partibus sanguinem syncerū continent, qui certè in ultimis flexibus ad ipsos testiculos, nō amplius ruber est, sed iam quodāmodo albicat, exiguū adhuc requirēs ad substantiæ seminis generationē, quod ei à testiculis cōstat. At quanto spiritus animalis cerebri exactio rem semine concoctionem desiderabat, tanto plexus retiformis flexuosior uariciformi existit, ut in eo immoratus diutius, pro dignitate coquatur. Generatio aut̃ animalis spiritus, materiā propriam spiritū habet uitalem. Quū igitur animatiō ratiocinatrix residet in cerebro, per quod quidem nos ipsi ratiocinamur, necesse fuit in eo contineri plurimū animale spiritū, qualitatē proprietatē ex sumptis cōcoctione adeptū.

Quare totū cerebrū q̃s arteriis multipliciter diuisis contextum est, multiq; ipsarū diuisiones, à basi in ipsius uentriculos definit, quemadmodum & uenarū, ex eius uertice descendunt. Verūm ut hæ quidem in illos excurrunt superflua, sic arteriæ largitur spiritum ipsam respirant. Fruitur autem uniuersum cerebri corpus, tum ipso uenarum sanguine, tum arteriarum spiritu. Siquidem partes omnes facultatem habent, propriam sibi materiā trahendi. Porro in cæteris corporis partibus adeo propinquæ sunt semper uenæ & arteriæ, ut mutuū scilicet contingant, ac uenæ semper arteriæ incumbant. At in cerebro, quod sanus esset ex locis diuersis, aut potius omnino contrariis, uasā in ipsum inseri, à corde sursum per collum uenæ atq; arteriæ ad ipsum usq; caput simul producat, inde hæ quidem ad plexum retiformem, illæ autem ad summum capitis uerticem diuerterunt, cōmunire crassā meningē, quæ quidem duplicata, uenas in seipsum mediam recipit: idq; uasū tenuissimā præbens uiam, simulq; utraq; sui parte, altera quidem cerebrum, altera uerò cerebellum complectens: ac deniq; ex sumptis duplicatione hac, ualida ligamenta producēs, quibus caluarii annectitur. Quia uerò ligamenta ea emergere per suturas erat necesse, natura illis suturas à specie A græcæ literæ labdo=dem dictam, adhibuit. Postquam aut̃ facta hæc fuerunt, quamplurimis, in transitu sanguinis per crassam meningē, foraminibus factis, per ea uenas, alias quidem magnas, alias uerò paruas produxit: sursum quidem, ad cranii duplicationem, quæq; ex ea oritur, pericranii membranam: inferne autem, ad subiectam tenuem meningem. Cōueniunt autem in uertice capitis, quæ sanguinem deducunt meningis duplicationes, in locum quemdam uacuū, quasi lacunam, quem torcular appellat Herophilus,

ibilib; relinquentes bonam portionē sanguinis, inde ueluti ab arce quadam, omnibus subiectis partibus, quæ innumera sunt, riuos numerosissimos mittunt. Reliquū uerò sanguinis, riuulus ex ipsius crassie meningis confectus partibus, in regionem anteriore deducit, à quo quidem medium accedente uentriculū, magnæ exoriuntur uenæ, quæ in plexus tenuis meningis disseminantur: cum quibus etiā securitatis gratia aden semper glandulosus extenditur. Quod reliquū est, rectā secundum longitudinem, ut initio capebat, prorsum longissimè fertur, multas producens uenas, quæ in totum cerebrū disperguntur. Atq; huic quidem crassie meningis porioni, quæ prædictum sanguinis riuum efficit, cerebri uenæ in binas partes dispescit, aliam quoq; futurā naturā addidit, quæ à uertice ad frontem rectā per caput medium fertur. Ipsius autem ad frontem pertinentis meningis, pars illa quæ meatui distinguenti anteriori cerebrum à cerebello, necnō epiphyi uermiculari incumbit, cū sursum ad seipsam tendit propinqua corpora, impedit quo minus ab eis productio meatus premuntur. Pari modo & duplicatio illa quæ inest futuræ labdo=di, corpora posteriora incumbētia uentriculo, sursum trahit. Nec minus tertia & coronalis sutura, quæ per medium anteriorum uentriculorum transuersa fertur, ab omni compressione subiectos uentriculos liberat, incumbētia corpora in sublime reuellens. Igitur ex productionibus cerebri, maxime quidē sunt quæ ad nares pertinent: quarū parte utraq; pori sunt oculorum, iuxta quos sunt nerui, qui eorum mûculos mouent. At poris optici cōbuntibus prius quā ex crassa meningē excidant, * ac separatis rursum post eam, quā parte quidem uniuntur, est peluis, quam arteriæ utrinq; tangunt. Cæterim lingua duplex quæ sit, quemadmodū & reliqua omnia sensoria, partemq; omnem dextrā sinistraq; habeat æqualem (quæ ambe tam molendi trans glutin digi cibi, quāq; etiā loquendi grana coaduerant) merito in utraq; eius partē, à posteriori basi ipsius cerebri, natura propriū neruum deduxit. Quum aut̃ omnibus quodq; oris partibus ab ipsē locis sensum gustatoriū esset melius tribuere, & ad has etiā neruos illinc produxit, uicinitatis atq; situs ratione obseruata: quibus etiā adiunxit comitem, ipsam tenuem meningem, ut simul illos nutrire ac tegere. Ut uerò crassā meningē has productiones admitteret, in modū fistulæ dilatauit ipsam usq; ad ossa anteriora, quæ illic perforauit, & cum utraq; meningē, partem quidem ipsorum neruorum in ipsam linguam, partem in superiorem, partem in inferiorem maxillam infixit. Ante quorum distributionem, obiter quendam neruum utraq; productū musculo temporali inseruit, diuiores certē illis omnibus, quod non ad gustum, sed delectatū ad motum esset. Verūm quod nerui maxillæ inferiori, necnō * lingui infixi, decliues ducantur, earum partū posino fecit. Quæ autem in superiorem maxillam feruntur, eos naturā uersus anteriora deducēs, nō per oculorū foramina (sic enim offēdidisset mollissimos opticos neruos, propter quos totus factus est oculus, ut in quibus præcipua

Sutura tella.

Cornalis sutura, per medium uentriculorum uenæ ferre trāuersa.
Cerebri apud frontem sunt maxime, quæ ad nares pertinent.

Peluis iuxta cōgressum epiphyi uermiculari ueruos confusa.

Lingua duplex. Lingue utraq; parti à posteriori basi ipsius cerebri uerui infixi.

Utrūq; partes uerui nerui ad ossa partū diuorandū recipiunt.

Temporales nerui sunt quales: ut uerui formantur.

Maxilla superior nerui, quæ parte in eam inferiatur.
Oculus nō factus propter opticos neruos.

Concoquendi exacte humoribus procurat natura mora disturnatatem in uasū.
Varioformis te flexu flexus.

Animale spiritus signatur ex testibus.
Animæ rationem habet sedem in cerebro.

Arterias effundere animalium spiritum in uentriculos cerebri.

Partium sanguinis inest facultatem propriam materiam trahendi.

Crassie meningis usus.

Labdo=di sutura.

Torcular.

cipua pars consistat) sed per aliud tertium prælongum, nec ulquædè rotundum, quod iuxta magnum oculi canthion est, per quod nervi oculorum multifidis inferuntur, traiecit. Plura namque fecisse foramina, firmitudini ofisium non expediebat. Vbi igitur prædicti nervi ad oculorum cavitatem perveniunt, uterque corum ad nuncuparum malum fertur, perforatis rursus illic, quæ sub oculis sunt, ofisibus, transiuntque ei prædentibus, nec contingens multos, aut offendat illos, aut ab eis collidatur: ac sic denique in regionem sibi è directo correspondente dispergitur. Ego si exortus illos, qui ad nares feruntur, non numeremus, ceteri quibus nullæ nervorum productiones oriuntur. Prima coniugatio erit, mollium nervorum qui ad oculos tendunt. Secunda, eorum qui oculorum multos movent. Tertia, de qua nuper discebamus, quæ illic oritur, ubi pars cerebri anterior, cum posteriori connectitur. Quarta nervorum coniugatio, paulo posterior his est locata, magis quidem quam priores à basi emergit. Propagines autem eius omnes sunt sibi ipsi propinquæ. Ac cõmiscetur quidem statim nervis tertie coniugationis, cum quibus fertur longissimè: postea tamen seingitur, tōnig palati tunice inseritur. Exigui porrò admodum sunt hi nervi, nervusque tertie coniugationis paulo durior, quia nimica quæ os uertit, durior est, non lingua modo, sed etiam alijs propemodum omnibus faciei partibus. Ob id etiã producuntur ex paulo duriori regione cerebri, quàm nervi tertie coniugationis. Quanto enim magis retrò progredimur, tanto sepius durior effectus cerebri certimus. Atque etiam partes quæ ad basim ipsius pertinent, alijs duriores existunt. Quinta mollium nervorum coniugatio, productiones eas continet, quæ à lateribus capitis, versus ossa lapidea extenduntur. Earum autem utraq; dividitur in ipso per ossa trāsita, in duas partes: quarum maior quidem in meatu auditorium inferitur minor uerò extra craniū in cecum nuncupatum foramen, quod tamen cecum non est, licet existimetur tale, ob suam flexuosam obliquitatem. Est & sexta alia nervorum coniugatio, à basi cerebri productorū, qui nondum etiam sunt duri: omnibus tamen prædictis tanto duriores sunt, quanto spinali medullæ propiores. Itæ enim durorum nervorum principium est, & idipsum cerebro est multo durior: & quo magis deorsum progreditur, eo durior semper seipsa euadit. Descendunt autem hi nervi usque ad os latum, quæ spinæ extremitas est, in omnia ferè intestina & viscera distribuiti, quod nimirum eas, molliæ quum sint, uoluntarioque motu priuata, molles nervos desiderent, ne omnino sensus maneant experientia. Ventriculo tamen præcipue tales erant ex usu, ut cui adesse exactissimū sensum deficientis cibi, & potionis, maximè conueniebat. Quare horum nervorum pars maxima in ipsum distribuitur, & postmodum in partes ori eius circumiacentes, quæ ob id sensu acutissimo præditæ sunt, atque ipsi quæ uementer esuriunt, contrahunt & conuelli sentiunt. Ne autem nervi hi, molles quum sint, per longum iter deducti, periclitentur atque in discrimen uenirent, membranæ for-

tibus ipsos obduxit natura, corporibusque propinquis connexit, quæ multa descendens illis occurrunt. Quæ connexio plerumque illis etiam corporibus cõmodum adfert non contentendum: quemadmodum & septimæ coniugationis nervi, quos quidem copulatos illic qui à sexta coniugatione oriuntur, similitate capitis effe ex.cesserūt, membranæ fortibus circumdedit natura, ad unguemque undique cõmanuit, utrisque cõmune hoc cõmodum machinatur. Quippe nervi coniuncti, copulatiq; quàm simpliciores, multo tutiores ab iniurijs existūt. Postea uerò quæ in nervos septimæ coniugationis ab ipsis (ubi paululum erant unæ cum illis progressi) seingere ad linguas esse necesse, rursus eos cū arterijs carotidibus iunxit, per torumque cum illis collum traiecit, cõmibus colligatos membranæ. At in thorace, quum arteriæ ad sinistram cordis uentriculum tenderent, rursus eos separauit, ac dextrum quidem in leuam, sinistram autem in dextram uentriculi partem, utrisque oblique ductu inferat, id quod longè erat tutius, quàm si recti descenderent, postea in uentre diuisi fuissent. Porro illic nervi septimæ coniugationis oriuntur, ubi & cerebrum desinit, & spinali medullæ est initium, progressi quadantenus unā cum nervis sextæ coniugationis. Põit autem ab ipsis seingenti, parte quadam sui, eademque minima, rectos laryngis contextant multos: maiori uerò, in totam linguam disseminantur. * In uniuersum autem, ex nervis hi existit primi, qui exquisiti sunt duri. Nam prædictorum omnium nervorum, nullus similiter durus est, ac hi nervi. Iam uerò in multos oculorum, est profus minimos, magni tamen nervi inferuntur, quod consistentia ipsi sunt mollores, quàm motorij conueniat. Vtrig; etiã musculo temporali, tres insiguntur nervi: duo quidem à terna coniugatione (de quibus loquimur sumus) tertius autem durior, de quo mox uerbafacemus. Musculi quoque genarum, uariarum, ac labiorum, ut mole, sic etiam durtia, mediciores nervorum productiones recipiunt. Quum enim per ossa longius ferantur, ex uis longitudine ipsi durties accedit. Nervi igitur qui linguam movent, neque produci aliunde cõmodius potuissent, nec ita uñ opportuniore, quàm qua nunc ununtur. Etenim sensifici nervi, similitateq; inferuntur, amplificati, tunicæ lingue externæ contextant, subiectos musculos ne attingentes quidem. * Hi autem motorij, qui ad septimam coniugationem pertinent, tennes quidem, sed ualidi, atque in multas fibras solui, omnes lingue musculos texunt, idipso mento. Illis quippe fasciæ diuidunt, hi autem lingua monetur: quæ actiones suas nõ poterat altero genere nervorum præstare. Quum igitur quinta illa (quam memorauimus) nervorum copula, ex obliquis capitis partibus in ossa lapidea emergens, à duobus foraminibus inaequalibus duplex facta exipiat, eiusque grandior portio per foramen latius recti ad aures feratur: minor uerò, in angustus, quod cecum uocant, allapsa per foramen quoddam, quod iuxta aures est, penetret, usque omnis media inter huius nervi principium internum, atque finem externum, uariè instat labyrinthi tor-

Septimæ coniugationis nervi, cum illis qui à frons oriuntur, copulatos natura.

Arteriæ carotides.

Nervus qui à sexta coniugatione ori in ventriculorum obliqua non plantatio.

Septimæ coniugationis nervi, unde exortantur, ex in quatuor partes diffusi, neuræ.

Septima copula nervi, sunt primi exquisiti duri.

Temporali musculo vtrig; tres nervus insigunt.

Lingua nervi sensifici.

Lingua motorij à septima a uenit uerò coniugatione.

Prima copula mollium nervorum.

Secunda. Tertia.

Quarta.

Orbita trunca duri est omniui ferè faciei partibus.

Cerebri quæ partes duriores sunt.

Quinta mollium nervorum copula.

Cecum foramen.

Sexta mollium nervorum copula.

Spinali medullæ est origo durtiorum nervorum.

Os latum spinæ extremitas. Sexta copula nervi molli, in quatuor partes distribuitur.

Oris uentriculi partibus, que sensu acutissimo prædita.

queatur, sanè per hunc labyrinthum, durum il-
lum nervum produxit, qui maxima quidem sui
parte larum buccarum aperit musculum: exigua
uero, quæ reliqua est, nervus à tercia coniugatio-
ne, ad temporales musculos pertinentibus, opi-
tatur. Ad cuius quidem generationem & deduc-
tionem, os illud lapidei fuit maximè & opor-
tunum, & aptum. Duos porro mihi nervos
côspicias, unum quidem omnium durissimum,
alterû contrâ mollissimû, ac deniq; tertium in-
ter utrumq; medium ad æquilibrium. Qui igitur
inter medium hunc sunt & durissimum, omnes
simul duros: reliqui os uero alios, qui ab eodem
medio sunt usq; ad mollissimû, appelles molles.

*Lapidem ut
Nervorum mol-
les ac durissimû
ad istamanda me-
thodem.*

*Nervus durus,
ad motum mol-
les ad sensum
esse optimè com-
paratus.*

*Cerebrum est
nervorum om-
nium mollis-
simum.*

*Laborum ner-
vi vult.*

*Dentes omnes à
tercia nervorû
coniugatione ac-
cipiunt propa-
nes.*

Gingiva.

*Latus mu-
sculû.*

Frontis cutis.

Ac duros quidem ad motû esse optimè compa-
ratos, ad sensum contrâ ineptissimos, iudices.
Rursus mollioribus esse ad sensum aptitudinè ex-
actioribus: sicuti imbecillitatè ad robur actioribus.
Nervorum igitur omnium durorû principium
est spinalis medulla: durissimorû autem, eius fi-
nis inferior. Cerebrum uero est omnium nervo-
rum mollium origo: ut mollissimorum, quod in
medio anteriorum eius partiû consistit. At sub-
stantiæ mediolorum nervorum principium ea re-
gio est, quæ cerebrû & spinalis medulla iungun-
tur. Ceterû mollium nervorum, alij quidem
procedentes siccificant, alij idem motorij eua-
dunt: alij uero perpetuè propriam naturâ reti-
nent, ut qui ad uentriculû deferuntur, quos sen-
sificos semper manere oportere. Rursus, ner-
vorum tertis coniugationis, qui ad ossa quidem
maxillæ inferioris * descendunt, magnosq; den-
tes * prætergrediuntur, ij exarcti, & duriores
effectû, iuxtaq; dentes caninos elapsi, in labiorû
musculos disperguntur. Qui uero per oculorum
cavitates ad malarum ossa pertinet, ad eod. etiam
duri sunt redditi in transitu, ut eos musculos mo-
ueant, qui in superiori maxilla, & in narium alis
consistunt. At gingivæ, dentesq; omnes, nec non
tota cutis faciei, cum tunica narium interna, à
tercia nervorum coniugatione recipiunt propa-
gines, * sed molæ quidem còspicuas & magnas,
per eam viam, quæ per genam deducitur: gingi-
væ autem & reliqui dentes, tenues & vix conspi-
cuas. Ab his uero nervis, qui ex regione oculo-
rum ad musculos temporales ascendunt, palpe-
bræ, & quæ circa supercilja sunt omnia, & frontis
tota nervos recipit. A nervo autem qui ex cæcis
foraminibus excidens, temporalibus obscuram
mittit distributionem, feruntur quedam propa-
gines ad glandulas & partes illas quæ iuxta au-
res sunt, atque adeo ad partes maxillarû tenues.
Maxima tamè eius nervi pars maxillarû morum
ad latera efficit per latum musculum, de quo pos-
tea dicendum est. Ipsa uero cutis pilosa, sensus
grana duntaxat, propagines paucas & tenues,
instar araneæ filorum, ex omnibus subiectis re-
cepit partibus. At cutis frontis, quod motus vo-
luntarij sit particeps, còstat cum subiecta illi
musculosa natura, eodemq; cum illa motu mo-
ueatur, fibras nervorum conspicuas adepta est.
Porro labiorû cutis ad eod. coalescit cum muscu-
lis, ut nec musculum, nec cutem vocare queas,
quod ex utrisq; constatum est: quæ constructio
ad illorum exactam consensientiam & diductio-

nem requirebatur. Iam uero per foramen illud
quod cernitur in maiori oculi angulo, nervus
haudquaquam exiguus ab oculorû cavitatè ena-
tus, in internam narium membranam, atq; in pala-
tum etiam (cuius tunica à crassa meninge prola-
ta, per foramina oris & narium orta quum sit,
ori ac narium membranz esse còmunis) diffemi-
natur. Porro crassa meninx, tum futuris, tum for-
tissimis ligamentis, cum superius cranij parti-
bus atq; obliquis connectitur, ut minimè cere-
brum comprimat. Partibus uero anterioribus
per exigua quædam ligamenta, atq; imbecilla co-
hæret: ubi nullam membranam producit, qualis
partibus superioribus est pericranialis tunica.
Ad basim autem, ubi crassior est, paucis etiam il-
lis & imbecillis ligamentis fuit opus, quum sus-
supte nutu deorûm semper feratur. Ceterû in
eodem basi porrone quedam à se productam,
retiformi plexus subtrahit, ne scilicet à subiectis
ossibus comprimeretur. Constat autè ex mul-
tis ossibus cranium, ut si quando contractum
fuerit, rapturæ eius per totum non progredian-
tur. Verû cum caput velut prolongata quedam
sphaera sit, iure una quidem futura recta per me-
dium ipsius à posterioribus ad anteriora est ex-
tensa: duæ autè transversæ hanc excipiunt: quar-
um posterior quidem labdo * des, anterior cor-
onalis vocatur. Fitq; ex illis tribus futuris figu-
ra † † litteræ similes. In acutis tamè & turbinatis
capitibus, non omnes ex futuris cernuntur. Sunt
autem in uniuersum tres capitum acutorum figu-
ræ. Prima est, ubi caput anteriorem simul &
posteriorem eminentiam amisit. Duæ uero alie
figure sunt, quarû altera quidem in fronte, alte-
ra rursus in occipiti nullam eminentiam habet.
At futuræ capitû rotundi & sphaerici, X græcè
litteræ sunt persimiles. Vbi caput in occipiti nul-
lum habet tumorem, perit labdo * des futura, re-
cta & coronalis manente, ex quibus constat fu-
tura instar litteræ T. Similiter cum frontis emi-
nentia perierit, dispungitur coronalis, relictâ re-
cta & labdo * de, quæ litteram Y reuerstam con-
stituunt. At uero quæ à media futura æquidi-
stant, & ad utraq; aurem constitutæ, secundum
capitû longitudinem deferuntur, rectè squamo-
se agglutinationes vocantur: quum non hic ut
in futuris ossa sese mutuò ingrediantur, sed ex-
ternuata in subtiles quasdam squamas, ad maiorem
firmitudinem earum partium, supra ossa descen-
dentia applicentur. Ossium autem in temporis
bus compositiones atq; structuræ, sicuti & quæ
in superiori maxilla cernuntur, futuræ mihi pla-
nè esse videntur.

GAL. DE VSV PARTIVM LIB. X.

Quod autem in parte corporis anteriore,
in quam mouetur, præstitit oculos col-
locari, eosq; geminos esse, nemini obcu-
rum existimo. Ceterum non insunt oculi poste-
rioribus etiam capitû partibus, quia ab illis ori-
ri nervi molles non poterant, quales in utraq;
mittuntur oculi: ad quos quidem dum per os-
sa contendunt, densantur & compinguntur. Vbi
uero

*Crasam mo-
menta esse con-
stans crassa.*

*Retiformis ple-
xum recipere
productum
quoddam à
crassa menin-
ge.*

*Cranium cur
ex pluribus os-
sibus constet.*

*Structura cerebri.
† †*

*Capitum acu-
tiorum figura.*

*Squamosa ap-
plications.*

*Opticorum ner-
vorum progressus.*

uerò ad illos peruenerint, amplificati denuò, in orbemq; humorè uitreum complexi, se in crystallinum humorem inserunt, qui existit primū uidentis organum. Id quod planè sussuslione ostendunt, quæ inter humorem crystallinū & corneam interiacentes, impediūt uisum, quoad deprimant. Humor autem crystallinus, qui albus est atq; splendens (hæc enim sola ratione, à coloribus immutatur) ab humore uitreo nutritur,

qui quanto crassior & candidior est sanguine, rāto à crystallino humore relinquunt humiditate & albedine. Hæc enim albus est planissimè, ac mediocriter durus: uitreus uerò, humidus quidem est, instar uitri cuiusdam fusi: albus autem, albedine quadam adulterata. Quum igitur in neutro horum humorum sit uena, uersimile est utrumq; per transfusionē nutriti: crystallinū quidem à uitreo, uitreum autem ab amplificata illa retiformisq; productione, quæ ipsum ambiens, duos usus præstat: primum, ut crystalli-

ni alterationem persentiat: secundum, ut plurimis arterijs & uenis (quas ducit portio tenuis meningis) relecta, uitreo humori alimentum adferat. Ipse autē pro ductio cō choroides tunica, non solum corpus illud reforme alit, sed quibuscūq; filamentis tenuibus à se pro ductis enam texit & colligat. Cæterum ubi primū nersus in oculum ipsum inferitur, natura ab eo utraq; productiones membranarū adducens (quod uisquā in alijs neruis mollita est) easq; crassas ac duras efficiens, duram quidē meningē osibus alligat, choroidem autem solum diuagari permittit.

Quæ quidem tunc destituta suis uasis, ac paulò post à supernis omnibus locis, quamplurimas uasorum immisiones recipiens, reuertitur tandem, immensam quandā uasorū tenuium, sibi ipsi propinquorū, copiam, ueluti ex foro adferens: cum quibus omnibus rursus in superiori productione inferitur. Vbi autem pro ductio ipsius nerui in humorem crystallinum se inferuit (cuius nimirum gratia descendit) ne utquam amplius progreditur: quandoquidē illic ligetis, affectu illius uerax cerebro esse nunciis potest. Verumenimuerò quum ipsa insertio in medium crystallinū humorem (qui sphericus est) undiq; facta sit, necessariò maximus in crystallino circulus describet, illū in duas partes diuidens. Omnī siquidē quæ rotundis corporibus connectuntur, ad maximum in ipsis circulum connexio est tutissima. Ad hunc igitur circulum consentaneum erat humorē uitreum motu uterlore inludere. Quocirca mediū * in ipso uelutur crystallinus humor, quasi similita quæpiam sphaera in aqua. Ab altera etiā interna parte ipsius crystallini humoris, quæ illius ueluti lemiphærii existit, firmitatis gratia * humores ipsos circulus unus maximus omnium coniungit: qui quidem utrique terminus existens communis, ligamentū his ipsis efficit, & præterea corpori reformi, & quartò ipsi choroidi tunica: quæ etiam ut ægrius afficeretur, à crassie meningis tunica, ut in cerebro, ita hic quoq; circumuehitur. Nam quid hæc ab ea in alijs omnibus partibus, præterquam in uasorum productionibus, distet, cum illa tamen in hoc memorato circulo

iungitur. Quæ quidē quinta coniunctio, præter illas quatuor in uno loco prædictas, subiectas partes munis, regit, & roborat. Dura igitur membranæ tunc choroidi est applicata: hæc uerò retiformis: retiformis deniq; uitreo & crystallino humoribus: illi quidem, per totum ipsum: huic autem per solam iridem. Itaque per corpora media humor uitreus illi tunice omnium extimæ, durissimæq; est unitus. Propè ad illum eundem circulū extrinsecus alia quedam tunica accedit, quæ se in duram illam membrā infinuans, sextam insertionē facit, *dura dioptra* (hoc est, dissolutio nerue) musculorū oculos mouentium, existens. Septima autē præter has omnino est alia, scilicet periosii insertio, quæ totum sanè oculum cum osibus colligat, simulq; mouentes ipsum musculos operit. Ac cernitur quidem membrana hæc, candida definit uerò in circulum qui alig omnes subiecit sunt, ubi albi nigro coniungitur: qui locus turris, tum corona appellatur. Quod si lux discueris probe, circulos uidebis hic septem, sibiipsis deinceps mutuo insidentes, crassitie tam en & colore discrepites: ut ne si uelis quidem, locum hunc aliter quā irim appellare queas. Ac primum quidem circulū circa mediū crystallinū, uitreus humor facit. Secundum, retiformis membrana. Tertiū, choroides tunica. Quartus circulus est, qui illa simul comprehendit & colligat. Quintum ædit tunica orta ex crassa meningē. Sextū, quam diximus aponeurosim esse. Septimū deniq; circulum componit scribit tunica quæ à periosio deducit. Iam uerò ipsam meningem duriorē, quæ choroidem (ut dixi) comprehendit, ad anteriorem crystallini humoris regionem ipsa natura pro ducens, partem eius maximè mediam, longè tenuissimā & densissimam fecit, cornibus extenuari perferunt: unde ea ceratoides, hoc est, corniformis uocatur, existens instrumētū uisori fortissimū propugnaculum. Tenuis igitur, dura, & densa cū esset facta huiusmodi ceratoides tunica, pro tinus utique erat futura splendida, ad splendoremq; transmittendū opportunissima, perinde ut cornua ad amulsiū polita & derasa. Quod summum artificium naturæ, ut cunctis admirari licet, sic imitari nemini. Quanquam multo facilius est inuenire aliquid, quod animaduersum nou fuerat, in ijs quæ facta iam sunt, cauillari, quā inculpatæ omnia à principio construere.

Quia uerò periculum erat, ne ipsa tunica cornea laboraret alimentū penuria, aut durite sua humorē crystallinū collideret: aut deniq; immixtum oculis supernè uisoriū facultatē (cuius substantia est splendida) suo splendore discueret, his incommodis omnibus natura præsidio unico occurrit, quod declarabimus postea. Quod autem uehementi splendore oculi nostri offendant, docuerunt id quidē milites Xenophontis, qui per multā niuem iter facientes, uehementer lesi oculis fuerunt. Experti sunt etiam id illi miseri, qui ex obcurissimò carcere in splendidissimum domum, calcetq; illarum, & læuigatam, à Dionysio tyranno repente ducti subito occubabant, misimè repentinum illum occursum splendide lucis ferentes. Quare merito sanè pictores, quum

Oculi humoribus quæ produciuntur inueniunt.

Aura est pars muscularū mouentium oculos. Periosii insertio.

Iris.

Cornali ad irim oculi, septi, quæ feruntur iridini, & à quibus oriuntur.

Ceratoides tunica est crassa membrana transuere polita.

Natura arificum oculi aduenari, ut mutari possint.

Oculi ofundantur à uisum in splendore. Xenophontis milites. Dionysii tyranni inuoluntaria.

*Palpebre fufus et
ceruleas coloris
in recurre as-
pectu reperi-
unt.*

*Ophthalmia la-
borantem affen-
dit lux & cor-
rumpit.*

*Altera videtur à
nubis per defec-
tum solis rati-
onari quia etiam
ceruinus capro
fufussum po-
tuit.*

*Flammula sub
ardore sole mar-
cescit, extingui-
turque prope ma-
iorem flammam.*

*Choroidis tuni-
ca virgo & co-
loris.*

*Choroidis tuni-
ca rufa.*

*Palpebras cur-
claudamus, ubi
fplendat ut la-
bit.*

*Rogides tuni-
ca.*

*Choroidis tuni-
ca foramen.*

*Splendorem non
li interius, quo
exteriori miffi.*

*Albuginæ hu-
more rufa.*

*Suffufione pur-
gandam ratem.*

*Oculo vno cla-
so, amplificare
alterum pupillam.
Mortuo animali
cor fit laxa pu-
pilla.*

pingunt in coriis albis, à quibus uisus offendit, colores fufcos ac ceruleos opponunt, in quos fubinde intruentes, recreant atq; reficiunt oculos. Similiter ophthalmia laborantes offendit lux & redarguit: qui tamen lux à cerulea fine dolore intruunt. Percipere etiam clara nos à longinquo cupientes, ad fupercilia manus obrendimus. Quare in magnis folis defectibus stelle nobis apparent, quas ceruinus etiam ex profundissimis purcis, potissimum quando non est sol in meridie. Quod si solem ipsum explicatis oculis intueri uelis, illos celeriter perdes: quemadmodum contigit multis, qui post eclipfem folis, fixis oculis ipsum quum intruerentur, nosse affectum eius cupientes, profus sunt occæcati. Etenim si flammulam quandam exiguum in sole fulcuto constitutas, marcescet: imò extinguitur etiam, si eam prope aliam maiorem flammam locaueris: quum minor lux à maiori uincatur semper, ac dissipetur. Ne igitur crystallini & uitrei humoris splendor, à splendore cornæ discerneretur, natura ipsam choroidem tunicam, à tenui meninge ortam, ex iride unà cum cornica promouens, multis paribus illam tum nigris, tum fuscis, tum ceruleis, extrinsecus autem densam effecit, quò uidelicet tres prædictos usus præstaret: nimirum corneam sibi uicinam alens, eandem ne humori crystallino incidere, prohibens: ac uisui deniq; affecto spectaculum medicamentofum exiftens. Quæ causa est, ut omnes natura duce, quum lucis splendore offendimur, palpebras repente claudamus, propterantes ad naturale remedium. Cæterum humida & mollis infar spongiæ quum fit, qua parte humorẽ crystallinũ cõtingit, ipsa choroides tunica impedimento est quo minus asperitas reformationis membranæ, aliqua ex parte illi nocet. His omnibus admirabilior est tunica huius ceruleæ (quæ ragoidea etiam, hoc est, uisiformis appellat, idipsum uisum leuiter eius externam, & asperitatẽ in ternam, haud perperam comparantes) pupillam uersus, foramen. Ea siquidem in centro sui est pertusa: & quæ hoc duntaxat foramen constituit, nulla tunica alia est inter corneam & crystallinam media: sed ueluti pertene admodum & candidum cornu, splendor internus cum externo cõmunicat, commisseturq;. Vt autem quæ foramẽ, hoc est, cornea tunica nequiquam humorem crystallinum contingeret, portionem ipsius natura longius foras abduxit: simul autem humorem quandam syncerum & tenue m (cuiusmodi inest ovis) crystallino ipso obdixit: spiritusq; ætereo & splendo, omnem pupillæ locum occupauit. Id quod ex fuffufione compunctionibus dices. Nam quum fuffufiones omnes loco inter corneam & crystallinũ medio cõstant, instrumentum quod deducitur eam per externum angulum oculi immittitur, in orbem & quoquoersum circumactum, neutrum illorum corporum tangit, ranquã magna à se inuicẽ distent intercedunt. Porro si alterũ oculorũ clauderimus, alterũ aperientes, amplificare & dilatarem, ac ueluti inuicem pupillam ceruinus, quòd illuc maior copia spiritus cõduat. At in mortuo animali, uel si humor tenuis euacuatus non sit, laxa tamen

pupilla uidet, quòd nimirum spiritus quidẽ ipse leuior & tenuior exiftens, facili ante anaromem euacuatur. humor autem adhuc remanet, sensibilem euacuationem postulans. His præterea qui maxime sunt ætate proeucti, ob spiritus fupernẽ affluentis inopiam, adeo cornica tunica corrugatur, ut aliq; quidem profus nihil, aliq; uerò malè, ac uix adhuc uideant. Affectus autẽ quẽ pũpũ appellat, quib; alteri oculorum quẽ pluri mum accidit, solius est imminutæ pupillæ, nihil cornicæ priuatiu affecta. Spiritus igitur ipse, lucidus omnino quũ sit, ad oculorum etiam actiõ nem confert: humor uerò, præter dictum à nobis usum, hoc etiam præstat, ne crystallinus humor ac portio uix interna excideret. Siquidem crystallini excicatio pũpũpũ morbum inducit, à quo cecitas uel maxime oritur. Propria ipsius crystallini humoris tunica, & quæ partem illius anteriorem uelit, araneis tenuibus est subtilior & albor: in qua quidem ipsius pupillæ imago, ueluti in speculo quodam conspiciunt: quandoquidem leuius est hæc tunica & fulgens, supra omnia specula. Quod uerò naturali huic crystallini operimento est proximum, uenofum, molle, nigrum, atq; pertusum est. Venosum quidem, quò cornæ abunde nutritur. Molle autẽ, ne contactu suo humorem crystallinum afflicteret. Nigrum, ut splendorem colligat, atq; ad pupillam transfinit. Pertusum deniq; ut quem transmissit splendorem, foras emittat. Quod autem omnium est extremum operimentum ac propugnaculum, tenue, album, ac durum est, quasi cornu. Tenue quidem & album, ut splendorem promp- tẽ transmittat: durum, ut tutò conseruet. Porro crystallinus humor nõ fuit factus omnino sphaericus, ut & circulos coalescentes in iride facili admitteret, & per uiolentas plagas aut motus, minime exturbaret à uitreo. Connexiones quippe ac sedes in absolutè rotundis, sunt fallaciores, quàm in planioribus. Quia uerò cornea tunica maxime expofita erat iniurijs extrinsecis, quò id illam natura, quam uis ex se robustissimã, palpebris, cilij, circumiacentibus ofsisbus, atq; etiam cute munivit. At cilia quidẽ, quasi uallum quoddã pelorum propulsandis exiguis corporibus, ne faciliè oculis apertis inciderent, primo loco constituit. Palpebras uerò ipsas, ranquam scuta quædã, ut simul corret atq; complicaret, oculumq; clauderent, si quid forte maiorũ corporũ in ipsum illaberetur, apposuit. Porro aduerfus maiorũ ad hoc molli incurrus, fupernẽ quidem fupercilia locauit, infernẽ autẽ malas: ad maiorem angulum, nasum à minorem deniq; productionẽ ofsis iugalis. A quibus omnibus oculi in medio comprehenditur, atq; illius feruatur, curis motu ad patiendi difficultatẽ non medioeriter conferente. Quum igitur ex dura quidẽ omnino substantia, sed quæ moueri facili, & cum cornu uerfari sine eius noxa posset, palpebras fieri esset consonũ, atq; etiam connecti ofsisbus: membrani quam uisum uocant, à fuperciliorũ labij natura abducens, in longitudinẽ tantam producit, in quantũ palpebras extendi oportebat, rursus eam per partes palpebrarũ infernas, internasue reduxit, illamq; non ad principium

Plachys oculi.

Spiritus oculi.

Flauitudo, Arachnoidea tunica.

Choroides tunica natura & rufa.

Cornæ tunica rufa.

Crystallini humor cor non fit fufus omnino sphaericus.

Connexiones in rotundis reuoluta esse fallaciores quàm in planioribus.

Ciliorum rufa.

Palpebrarum tunica.

Superciliorum rufa.

Mala. Nasum.

Os iugale.

Palpebrarum connectio.

Uisum.

principium unde emerit, sed ad subiectos tali principio musculos, qui unius oculos movent, applicuit: indeq; ad iridem usq; pròduxit, ubi ipsam in corneam tuicam insertavit. Spatium uero inter duas portiones periosij corporis medii, uiscosa atque unctiosa occuparunt, cum membranis quibuscumq; a musculis ipsis extensio quo loco quæ uocant *idest* gigni contingit.

V. d. d. d. d.

Ad portione autem huius constructionis, palpebræ inferiores constant, à malaris periosio, quædantenus quidem extenso, recurrentes autè rursus ad corneam. Quia parte uero hæc periosio remeare incipit, substantia quædam membrana durior adnata est, quam *vix* nomen, constringens quidem & comprehendens quod conuexus efficitur ex eius duplicatione: sedem autem atq; extensionis rectitudinem palpebrarum pilis suppedians, propter innatam sibi duritiem. Nam quemadmodum superciliorum pilos, utpote excepturos quod à fronte atque à capite defluit, sibiipsis incidere multo præstiterat, ita hos & rectos, & tensores, paritq; & conuenienti in uersallo dispositos, necnon aurtorum uergentes, semper conseruari expediebat, ut qui puluerem, & animalicula uolitantia, ut minus illaberent oculis, essent prohiberi. At quæ oculi non ex quauis positione uisibilia omnia cernere possunt, sed illud duntaxat cernant, quod ipsi pupillæ est directum, ob id natura sic disposuit eos, ut possent plurimum circumbagi: & cum ipsis totum collum ad motum habile fecit. Quia de causa etiã, non unã, sed geminos oculos cõdedit. Postquam igitur oculorum motus uoluntarij sunt quatuor: unus quidem quo sursum, alius autem quo deorsum, ac duo etiam quibus adducuntur ad latera: consentaneu fuit, & musculos qui motum illorum duces essent, totidem esse numero: duos quidè à lateribus, nempe unum utriusq; consistentem: alios autem duos, quorum unus est infernus, alter supernus. * Dissolui namq; hi omnes in nervosa filamenta, circulum unum efficiunt lati tendonis, in iridem desinentis. Quia uero oculi circumagi esset melius, natura duos alios musculos, positione obliquos effecit: singulos in singulis palpebris, uersus minorè angulum supra atq; infra extensos: quorum beneficio oculum, quoquo uersus torquemus. Est & alius quidam musculus magnus circa eorū radices: constringens quidè ac munis nervi illius molis immisionem, ne disrumpatur: oculum autè attollens sursum, ac deorsum cõtrahens, nonnullisq; etiam conuertens. Cæterum quem partes omnes quæ motu uoluntario sunt præditæ, duos ut minimum egeant musculis sibiipsis oppositis, altero scilicet extendente, atq; sicente altero (nō potest enim ab uno uterq; motus præstari) superiores autè palpebræ motu uoluntario mouentur: inferiores quippe ne mouentur quidè? natura duos exiguos musculos singulis eorū applicuit, sub membrana quæ cuti subiacet, atq; à nervosis tenuioribus tarsis extenditur, delitescentes. Quorum sanè musculari, alter quidem in maiori angulo apud nasum constitutus obliquè, ad tarsum partem dimidiæ, quæ illis est, pertingit: alter uero totus & ipse obliquus, & ad mi-

T. d. p. d.

Oculorum proda
duo & r. y. s. s.Oculus cernere
terram quæ pa
pilla è directo
opposita. sunt
ob idq; uisibi
li effi.
Oculi quatuor ge
minos.Oculorū uolun
tarij motus sunt
quatuor: toti
dumq; illi prædi
ti sunt.Oculorum mus
culos obliquos.Oculi musculus
magnus.Palpebræ infer
iores hanc qua
m moueri.
Palpebrarū su
periarum mus
culi.

norem extensus angulum, ad reliquam tarsis partem dimidiam sibi propinquè pròrumpit. Dum igitur prior musculus agit, quem caput eius ad maiorem angulum consistit, partem palpebræ sibi continuam deorsum trahit. Dum uero alter, reliquæ sursum attollit: ut cuius caput ad supercilium spectet. Trahunt enim musculus uersus propriam principii. Quod si uterq; eodem tempore tendant, oculus nō magis erit apertus, quam clausus: quæ euerfionem palpebrarū in morbis,

Palpebrarum
motus.Musculi semper
trahunt uersus
proprium prin
cipium.Inuicem quo pa
tis fiat.

Hippocrates *duos* nominat, illam dicens esse signum perniciosissimū. Fit autem affectus is utriusq; musculorum conuulsio, partemq; tarsis continuæ ad se ipsam trahente. Cæterum si alter quidem musculus agat, altero per osius cessante, aperiri & claudi totam contingit palpebram, quem pars altera tarsis, quæ mouetur, semper unā secum trahit & reliquam. Cuius causa est durities quam illi dedit natura, durū ipsum & cartilaginofum efficiens, in omnib; utriusq; musculi finem inferens. At palpebra inferior minor superioris est constructa: nam si maior fuisset, compleretur, atq; in seipsam recideret, plurimiq; excrementa colligeret. Non indiget autem motu, quia pusilla & exigua est. Porro ad utrumq; foramen, quod iuxta magnū angulū est, per quod oculorū excrementa expurgantur in nares, natura carunculam quandam ueluti operimentū apposuit, cuius beneficio contingit, ut excrementa oculorū minimè quidem uacuantur per angulos, ad proprias autem impellantur meatus. Cōfluunt siquidem per foramina illa, in ipsum os atq; in nares ab oculis excrementa. Vnde medicamenta ocularia, nō multo post inunctio nem, alij quidem expuerunt, alij uero emanterunt. Quam ob rem qui carunculam illam neruofam, quæ iuxta utrumq; angulū est, pharmacis acerbis colligauant, aut resciderunt, ij chirurgi effluxū excrementis ea parte aperuerunt,

Palpebra infer
rior eurfopari
m minor, uicini
quo exerti.Oculorū excre
menta quæ par
te expurgantur
in nares.

quem affectum uocamus *judas*. Sunt in palpebris paulo extra maiorem angulum, tenuia quædam alia foramina, pertinencia usq; ad nasum: quæ quidem tenuem humorem dant uicissim, accipiuntq; ad symmetriam naturalem seruandam, quæ monum præstat agilitatem: ad quam similiter perficiendam, glandulæ etiam duæ in utroq; extiterunt oculo, altera infernis, altera superius partibus hærens: quæ meatibus non obfcuris, humidū in illos effundit, perinde ut glandulæ, quæ linguae radici adiunctæ, galium in os deriuant. Humescit autem etiam os grana, pinguitudo est oculis circumsufa. Iam ipsi nervi sensitiui (quibus solis uix spiritus conspicitur ac sensibiles infunt) ex diuersis quidem locis cerebri proficiuntur: progressi uero (essent enim in diuinissimū quidè instrumentū iniquus, impius autè in conditorum ipsius, ij hæc prædictis non adderem) sibi mutuo coherent: ac postea rursus à se inuicem digrediantur, & instar literæ X separantur, idij minimè cõmuntur, aut interfecti à se inuicem, sed coherentes primò, ac post uterq; ad regionem propriam ducti, sic, ut ob aliud nihil cõueniens uideant, quàm ut meatus suos cõiungerent. Ut autè mo dū quo fit uisio percipias, intelligito circulum ab uno tantum oculorū cer-

Palas.

Glandularum
oculorum r. y. s. s.Glandula lin
gua a diacem
Opicis neru
soli inuicem me
tus singulis.
Opicorum ner
uorum cõfusa
tio in r. y. s. s. d. d. s. s.

Visiōis modus.

Circulus quid. ni. Est enim circulus figura quæ à medio undiq[ue] distat æqualiter. Ab eius autem puncto medio (quod centrum dicitur) usq[ue] ad pupillam videntem id, rectam duci lineam existima, quemadmodum plures alias & similes duci à pupilla ad ipsam circumferentiâ. At figurâ quæ ab his omnibus rectis lineis circuli circûscribitur, cõnum nomina: cuius verticè pupillâ: basim esse circuli tene. Lineam uerò rectam quæ à pupilla ad centrum circuli extensa est, totius figuræ axem appellâ. Dum autem intelligis conuexum & concavum, intelligis etiam amborum medium, uidelicet læuæ ac planum, cui nihil nec cavitatis, nec cõuexitatis inest: cuius superna pars, plana superficies existit. Quemadmodum igitur si ex

Canis. axe ipsius conu, qui à pupilla ad centrum circuli per ætrem protenditur, milij granû aliquid pendat, conspectû centri pupillæ eripiet, ita quoduis corpus, quod in medio uisus & rei uidendæ positi fuerit, prohibetur est, quo minus id qd ante oculos est, amplius cernatur. Quandoquidem ut aliquid conspiciatur, opus est id careat omni caligine, nullumq[ue] inter se & pupillam habet impedimentû. Siquidè per rectas lineas fit uisio: quæ haud dubiè ipsius folius radijs excidentibus per angustum foramè, prorsusq[ue] semper rectâ & citra flexionem tendentibus, a similitur.

Asin. Sciendû autem est, unûquodq[ue] corporû quæ videntur, nec uideri soli nec nudû, esse quippâ circum ipsum etiam omnino cerni: quoniam uisionis quæ corpus id complectuntur, accidunt interdum ips, quæ ultra corpus uidendum sunt. Secundo etiam discè, corpus quod à solo dextro oculo cernitur, si propius sit in sinistris magis partibus esse potari: sin lûgius ab sit, magis quodammodo in dextris. Quod uerò à sinistro solo conspiciatur, in dextris situm uidetur esse, id est propinquius: magis autem in sinistris, si est remotius. Quod autem ab utroq[ue], in medio. Tertium præter hæc tibi descendendum uenit, alterius oculorû pupilla compressâ, sursumue aut deorsum adductâ, apparere duplicia, quæ antea simplicitate apparebant. Ceterum si deorsum quidem fuerit pupilla detractâ, humilior ad apparebit, quod intruere: contrariû autè, si sursum sublata fuerit. At dum pupillâ ad maiore aut minore cantû adducimus, facimus ut quod cernit, sinistrum magis, aut dextrum appareat, non tamen duplex. Est autè necesse axes conorû uisiorû in uno eodemq[ue] plano positionem habere, ne quod est unum, duplex appareat. Verû prædicta axiomata tamen si ranonibus philosophicis, mathematicisq[ue] facillimè comprobari possint, quia tamen experientia ea omnia constant, breuitatis graniâ ab illorû accurata demonstratione supersedebo, lam uerò q[ui] pori illi opici intra cranij quidem iunguntur, atq[ue] in unum conspirent, postea autem diuiscunt, utilitates duæ in causâ extenter: quarum prima ac maxima necessaria est, ne quod quid intruemur, appareat duplex. Secunda, ut si quando alter oculorû sit clausus, aut omnino mutus, in alterum, per illum porum cõmunem, uniuersus spiritus confluat. Quippe facultate uisionis duplicata eo modo, longè acutior futurus est uisus. Quum igitur

quæ videntur, secundû rectas lineas uideantur: ante humorem autem crystallinum, foramen uerè sit situm, per quod cum suis obiectis erat habiturus commercium: perspicuum certè iam est, quod figura exactè rotûda, paucioribus sui partibus, plana antè pluribus, cum suis obiectis communicaui. Quo circa diuinus ille archi rectus, rotundû ipsum, fed paulo oblongius, crystallini corpus compegit, ut tuior ab ipsis iniurijs esset, ac simul pluribus sui partibus, species rerum uidendarum exciperet.

Crystallum huiusmodi rotundum est, sed paulo oblongius, ut sit situm.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium lib. XI.

Porro musculi temporales, quum gratia inferioris maxillæ à natura sint constituti, secundum magnitudinem cuius, atq[ue] in mordendo robur, suam magnitudinè atq[ue] structurâ contrahit: merito in animalibus quidè ips, quæ serratos dentes sortiuntur, maximi simul & fortissimi habent: quandoquidè nō solum magnâ, sed ualidam etiam maxillam obtinent. Maximi autem, fed nec neruosi, nec in agendo præpotentes, in asinus, bubus, & subus, ac breuiter in ips omnibus, quibus magna quidem inferior maxilla inest, minimè tamen robusta ad mordendum. Homini uerò, cui genam parua habent, dentes ad solum esum idoneos (non enim in mori, hominis fortitudo consistit, nec dentibus domiturus est animantia cetera, sed ratione & manibus) musculus temporalis, haud iniuria, debilis simul & minimus existit: nimirum ipsa natura non modò inueniente quæ oportet, sed ea etiâ cuiq[ue] pro dignitate tribuere: id quod diuinx iustitiz est propriû. Lycenes etiâ, sicuti & cæbi, & simiz, similiter habent musculos temporales exiles simul & imbecillos. Est autem simia homini quamissimilima, illiusq[ue] elutri imitatio quædam ridicula: ut quæ rotundissimam habet faciè, dentes caninos paruos, latum pectus, clauas longiores, minimè hirsuta, quæ recta etiâ stat bellè, ut & gradi sine errore, & currere celeriter possit. Lam uerò quæ animalia pro na ore cibum assumit, ea ut collû maius, sic proxiorem habent inferiore maxillam. Verum enim uero quò inter omnes musculos, si temporales potissimum læsi fuerint, conuulsiones, febres, sopores, deliria, symptomataq[ue] letalia inducant, utpote cerebro existentes proximi (neg enim reperitur ipsi quicquam propinquius cerebro, sicuti neq[ue] ullus musculus, qui per plures neruos ipsi cerebro hæreat) merito natura eos propèdum totos, ne facile afficerentur ab iniurijs extrinsecis, in capitis ossibus abdidit, ossa quidem ea quibus ipsi incumbant, excauatis admodû, exculpensq[ue] alia autè dura, ac præcipuè quæ illis præposita, *sympara* nominantur, rigida, & medullæ expertia, in orbè quasi sepe quoddam eis circumcincta: ita ut exigua quedam eorum pars tantûm, ad sinem frontis emineat. Vterq[ue] autè musculus temporalis in unum tendonem definens, curuo maxillæ inferioris acumini infigitur: qui si tensus fuerit, sursum eam trahit: ac sic os animalis claudat. Sunt tamen aliq[ui] duo mus-

Temporales non solum grana inferioris maxillæ sunt cavitatis.

Temporales non solum quibus sunt maxillæ.

Homini fortitudo non consistit in dentibus sed in ratione & manibus.

Homini debilis & minimus temporalis musculus inest. Iustitia diuina quæ proprium, simia est homini imitatio ridicula.

Collum quæ proxiore habet.

Temporales non solum læsi, quæ symptomata inducant.

Temporales musculus inest propinquius cerebro.

Temporalis muscularis inest tui securitatis.

Sympara.

Os quæ ratione claudatur.

Visionis fieri per rectas lineas.

Visionem soli radijs a similitur.

Videri nihil solum, aut nudû.

Visus huiusmodi naturæ.

Pupilla alterius oculorum compressa, apparere duplicia, quæ antea simplicitate erant.

Optici nerui qui intra cranium quidè iunguntur, postea autem diuiscuntur.

*Maxilla inferior
in musculus.*

*Colluvies pro-
cessus.*

*Os quæ ratione
aperatur.*

*Maxilla in-
ferior circum-
agitur musculus.*

*Masticatorum
musculus.*

*Temporales mus-
culi in crura
etiam masticato-
rum.*

*Lingua con-
fertur plurimus
ad ipsam masticato-
rum.*

*Buccarum fines
inferius.*

*Ori mœvenda,
quia musculorum
genera distincta
sunt, ut patet
ex eo, quod claudu-*

sculi in inferiori maxilla, utrinque unus, ambo uerò nuper dictis oppositi. Qui quidem ex posterioribus oriuntur capitis partibus, quo loco sunt quos vocant columnares processus. Maxilla autem in inferiori insignitur statim post flexionem, ad eum usque perueniens locum, qui est ad mentum: unus utrinque ex internis partibus adhærens. Qui certe si tenui fuerint, os recludit, quæ admodum temporales claudunt. Alii autem quidam duo musculus, ad mandibulæ in masticationibus circumducendæ à natura fuerit comparati, qui carnosam quoque generat partem constituent. Quorum utrumque nonnulli non simpliciter musculus, sed tripliciter esse existimant, quod tres ipsorum in maxillam sunt insertiones, iuxta principiorum quorundam. Vterque enim triangularis existit, habens uerticem iuxta uocatam malam, ubi nervosus est: atque ex lateribus hinc, hoc quidem ad zygomaticum extremumque linæ exportectum, illud autem uersus inferiori mandibulæ: tertium namque, ueluti basis quædam, prædicta latera partibus inferioris genæ coniungens, secundum longitudinem ipsius extenditur. Mouet autem ac circumagitur maxillam, aliæ alijs fibræ & insertionibus, ut moribus alijs alijs uicissim excipientibus, multiplices fiant actiones in masticationibus. Quare haud ineptè hi musculus masticatores uocant: tamen ad musculorum temporales hæc quoque appellatio pertinet, quod dentes inter se nehementer committant, ut si quid inter eos fuerit, comminuat. Ceterum cibum leuigari, atque in partes minimas redigi à molaribus, quasi à molis, masticatorum musculorum est actio: ad quam etiam lingua non minimum confert, in ore cibos assidue uoluens, & transferens, quod pars ipsorum omnis idem conseruat. Maximo etiam ad eam rem ei sunt auxilio fines buccarum inferiores, qui curacæ sunt, spectantes ad labia, ad quos perueniunt tenues ac lati musculus, utraque parte unus, totum collo circumiecti. Mouent enim ab his buccæ, cum labijs, etiam si genæ immobilis omnino fuerit. Temporales porro musculus, quibus eis infra oppositi sunt, os aperientes, omnibus alijs musculis hac ratione sunt dissimiles, quod ex ipsis quidem temporalibus medijs, tenet ille nascatur, qui in coronam sublimem inferioris maxillæ inseritur: oppositorum autem illis musculorum partes, carnosæ in principio ac sine existentes, nervosæ in medio cœuant: quod in nullis alijs reperias musculis. Etiam quæ modum temporalium musculorum, coronæ quæ motu indiget, effecti dicitur, tendone iam hinc emergere fuit necesse. At quod pertinet ad os aperientes musculis, quum ab eo loco produci deberent, qui multis instrumentis refectus esset, eorum utroque tendo excarnis circa tonsillas est factus. Quandoquidem si crassiores essent, penetrare præ locorum angustia non possent. Vbi uerò natura eos extra angustias deduxit, tunc iam paulatim ipsos carne circumuectiens, musculus rursus efficit. Tria itaque hæc musculorum genera, natura ad os mouendū adhibuit: quorum alij quidē aperiri, alij claudere, alij uicem circumagunt. Suntque claudentes quidē, maximi omnium: aperientes autē, minimi: magnitudine uerò

medij, qui mediam etiam positionē fortuntur. Alij musculi duo ex internis genæ inferioris partibus, quia ipsa est maxime caua, situm habentes, sursum extensi uersus os capitis, musculi temporales adiutores sunt dati, ut qui etiam genam sursum trahere queant. Ceterum nervosū principij omnibus faciei musculis, aliquis propemodum omnibus ipsius partibus, tertia neruorum est coniugatio, qui à cerebro proficiunt. Quorum sane distributio tam recta, sicut & aliorum omnium æquissima dispensatio, non fortunæ aut casui, sed arti ac providentiæ debetur. Quod uerò ad dentes pertinet, duos & triginta in unum habemus, uno ordine, in utraque maxilla sexdecim collocatos: parte quidem anteriore, quos incisores appellat, ceteros ac lateros, qui molari possunt incidere. Proximos autem quæ caninos, inferiori quidem basi lateros, parte autem superiores acutos: ut si quid propter duritiem ab incisores minus scindi possit, id possint ipsi confringere. Hos maxillares sequuntur (quos etiam molares appellant) aperi & lati, duri ac magni: ut incisus ab incisores, ac fractus à caninis, laxigare plane ac terere queant. Ad hæc inter eos, parui quidem una, duæ autem aut tres maioribus, quatuor uerò maximis insunt radices. Quorum omnium si unumquodvis mente immutaueris, utilitatē repente eorum cernes labefactam. Præterea ipsorum molariū dentium, medij quidem maximi sunt: qui autem utraque ipsorum parte locantur, minores existunt: quod minime congruū uideatur, angustis quidem oris partibus magnos, amplius uerò dentes exiguos inferi. Quinetiam quam linguam ad radicem esse oportet ampliorē, magnos illic dentes minime locari præstitit. Habet autem utraque genæ tenues quosdam processus, quorum singuli cavitantibus suis, singulos dentes excipiūt, eosque ualidis ligamentis ad eodē constringunt & continent, præcipue circa illorum radices, quibus etiam nerui inseruntur, ut non facile concutiant. Porro quod inferni supernis dentibus omnino æquabiles sint, quodque dextri sinistris, ac cavitates quidē cavitantibus, quodque numerus utrorumque sit idem dextris ac sinistris utriusque maxillæ partibus, nonne id est etiam æquitatis cuiusdam speciem, artusque potius quæ fortunæ opus? Ad hæc, quod fortibus animalibus acuti multi dentes, ac fortes sint comparati, quemadmodum etiam ungues: nihil autem in timidis sit huiusmodi, sed ut fragiles dētes, ira lati, molles atque obtusi ungues, hoc est magis adhuc admittant. Verum quum leones, canes, & lupi, utrinque multos habent caninos dentes, homo certe unicuique parte utraque caninum dentem produxit: cogitante nimirum natura, fe animal cuius arte mansuetum effingere, cui robur ac uires essent ex sapientia, non ex corporis fortitudine. Quantū igitur ad frangendum quippiam diuturnum uidebatur necesse, id ipsum duo satis erant præstituri: proinde incisores plures numero duplo efficit, quod ipsorum unius lateris patebat: & his adhuc plures molares, ipsorum usus præterit laniandis. Horum tamen dentium numerus definit non est: sed qui longiores quidem habent genas, quæ quingis insunt

*sium & circum-
agitur.*

*Faciei muscu-
li omnes respe-
tu nerui à cere-
bro coniugati-
on.*

*Dentes in unum
seriem iuncti
sunt triginta, in
utroque ma-
xilla sexdecim.
Incisores dentes.
Canini dentes.*

Molare dentes.

*Dentium radi-
ces.*

*Molarium den-
tium magnitu-
dines.*

*Generum pro-
cessus.*

*Dentes inferiori
superioribus
esse per omnia
æquabiles.*

*Fortibus anima-
libus iuncti den-
tes sunt ac mol-
tes, quemadmo-
dum autem uigui:
timidis autem
tenuis.*

*Caninus denti
homini utrinque
unicuique, in
utroque maxilla.*

*Homini ani-
malis mansueti-
tudine, uires com-
parari ex sapientia.*

*Incisores dentes
esse plures do-
plo causam.*

Mulierum den-
tium numerum
definit non. non
esse ut plurimū
tanti haberi vo-
lunt: in latere
quing.

Lingua divisa
superioribus, ut
cuius homini-
bus.

Lingua in om-
nem partē mo-
ventur: obli-
quā, geminā,
et inferiā re-
cta.

Lingua arteria
vnde, atq. ner-
vus.

Musculi vni-
us si tractantur par-
tes vni-
us principii.

Glandularum
longa a adhe-
sione vni-
us.

Lingua vni-
us inferi vni-
us.

Naturam fieri
ut errorē et vi-
tia curam, quo
non procedat.

Cervicula prin-
cipium vni-
us generis in
temperantiam.

Generatorem
primam negli-
gere malari
ab vni-
us.

utringue: qui uero minores, quatuor. Maximā ta-
men ex parte, sunt utroque latere quing. inferio-
res superioribus semper magnitudine & nume-
ro æquales. Porro lingua, quam animalū non
nullus, utputa serpentibus, sit diuisa, in homine
partes eius coeherunt, quod tum ad sermonem,
tum ad comestione, id esset longè commodius.
Mouetur autem in omnem partem, idē liberè:
quod requiritur ad perficiendā oris actiones
liberas. Quod si ipsa est gemina, quemadmodū
& reliqua instrumenta sensum, non alienū fuit
utragi ipsius partē numero ac magnitudine mus-
culos esse æquales. Pari modo enim & duas
habuit in seipsum in fectas arterias, utringue uide-
licet unam: duas itidem uenas, ac nervorū con-
iugationes duas: unam quidem mollem, alteram
uero durā: atque illam sanē in extremam
ipsius pelliculā distributam, hanc autem disper-
sam in musculos: quandoquidem illa coniuga-
tione sapores discernere, hac motu uoluntario
moueri ipsam oportebat. Porro quod sedis ac
firmitudinis gratia, magna ac fortis ad basim
fuit: ceteris uero moris causa, ad extremitatem
tenuis: quod ut ab alijs quidē musculorū sursum,
ab alijs deorsum, ab alijs deniq. trahatur ad late-
ra, musculis uniuersis partes ipsas uersus pro-
priū principii trahentibus, mihi certè hęc quoq.
cuiuspiam esse prouidentie uidentur. Sed ne ip-
sa forte aliquando exaricata, ad morus tardior effi-
ceretur, quemadmodum ad laryngem, sic natu-
ra illi glandulas spongijis similes, unam utringue
apposuit. A quibus meatus ducti per obliquas
atq. inferiores partes, in eam humorem pitui-
tum eructant, nō ipsam modò, sed omnia etiam
quę infra illam, in eiusq. lateribus sunt, humec-
tantes. Superiora siquidē à meatu descendente
à cerebro perfluunt. Jam illius ligamenti quod
partib. eius infernis innēdit, quodq. ipsam linguā,
ueluti quoddam frenū, coarctet & temperat, ne
aut nimis conuallat, à musculis, aut plus quā
par sit soluta diuagat, quos non admiret symme-
trici, atq. commodi rationē? Adeo enim mensu-
rata est, & certa ipsius connexionis cōmodera-
tio, ut si uel tantillū a dieceris, aut ademeris, to-
tius instrumenti actionē uitiaueris. Est uero &
hoc summè in natura admirandū, quod peccata
& uitia eorū qui nos procreant, ipsa sua indu-
stria refarciat. Ebei siquidē cum ebrijs coeunt:
& qui prę crapula, ubi terrarum sint, nesciunt,
cum mulieribus ita affectis consuecunt. Quo
fit ut generetur principium, statim ea ratione ui-
tiosum sit: postea uero ob omnimodā intem-
perantiam illius que concepit mulieris, in uero
longè deterius reddatur. Atramen aduer-
sus tot errores natura obstitit, eoq. plerumque
corrigit, sic ut partus mentis compos redatur.
Etenim quum uniuersis agricolarū primū quidē
uium, cuiusmodi terrę sua committant semina,
diu multumq. prouideant: postea autem ad mo-
dum etiam cauant, ne multo humore demerita
putrefeāt, aut extraneā frigore, nullus sanē ex
hominibus eam in ferendo diligentiā adhibuit,
neq. in eo quod conceptū iam est, educido, sed
quemadmodum in omni uita alijs rebus omni-
bus seipso ducit posteriores, aliq. quidē infaria-

bilibus uoluptatibus, ab dominis inferuentem:
aliq. diuitias, aut magistratus, aut deniq. poten-
tiam ambientes: ad eundem modum & ipsam
posthabuerunt primam generationem. Tunc
cam quę omnis oris partes subiungit, à cerebro
etiam recipere neruorum molliū momentanē
portionē, ut quo modo lingua ipsa sit etiā diu-
dicatrix saporū, iam diximus. At uero uia, quā
gurgulione & columnellā uocant, ad magnitu-
dinem atq. elegantiam uoci auxiliatur. A qua
quidē aer ingreditens, inciditur prius, impetust
ipsius uolentia, & frigiditas frangitur. Vnde
nonnulli quibus ad basim usq. illa fuit amputa-
ta, non modò deterius loquuti sunt, uerum etiam
frigidiores senserunt respirationē. Pleriq. eius-
modi, pulmone & thorace nimis refrigerato, pe-
rierūt. Ac prouide nuncq. illa temere abscon-
da est, ut pars quędā basis nō relinquat. Scrip-
simus autem prius & de foraminibus nariū, quo
pacto misceat ea os quoddam excipit, uentricu-
lis cerebri prælocatum: tum & de ipsorum in os
perforatione, quę est in palato. Quę quidem ex-
istit, ne inspirationis initium sit secundum rectū
tubum tracheę arterię, sed quędam deflexio
habeat, ac ueluti ambages, priusquā spiritus
ad arteriā perueniat. Proinde fit, ut spiritus qui-
dem obiter per hunc flexum contempatus, ul-
terius tandem feratur: hinc autem corpuscu-
la exiunt, aut si quid forte ad os usq. permearit,
sistatur etiam circa palati columnas: sic nanque
uiam ipsam appellant. Hinc fit, ut qui in multo
puluerē colluctati fuerint, hi paulò post emun-
gant puluerem, expuantq. At nisi prius quidem
nafi pori recti ad caput sursum ferrent, postea
autem obliqui ad palatum reuerterent, uamq.
ibi sese excipientē haberent, quid obstaret quo
minus in arteriā hęc omnia delaberentur? Na-
m etiam accidit, si quis per os inspirat, magna
indigens inspiratione. Ceterum ubi sanī homi-
nes sunt, ore ad respirandum nihil est opus, ni-
si quis astimate multo ac uehementi urgeatur.
Quare nasus, primum ordine respirandi instru-
mentum est: os uero, si nullus affectus infestet
animal, nullo pacto respirandi instrumentum
existit. Quum autem nudæ ac eminentes particu-
lę, quęq. externis iniurijs exposite sunt, ex
ea oporteret esse substantia conditas, quę neq.
contundi, neq. frangi facili posset, merito qui-
dem aures ipsas natura cartilaginofas effecit.
Nam si durę penitus ut ossa extitissent, facile
frangerentur: si molles ut carnes, contunderen-
tur paruo negotio. Nunc uero mediocriter mol-
les quum sint, eoq. facili incidentibus cedant,
uim illorum exoluant. Ceterò prominēt aures,
ut meatui auditorio operimentū ac murus ex-
istant, simulq. & ipse aliquem sonum resun-
dant. Quippe Hadrianus Romanus consul,
quum haberet læsum audium, manus causas,
quod audiret facilius, à posterioribus ad an-
teriora spectantibus, auribus obtendebat. Aristote-
les etiā dicebat, a animalia grandes aures habenti-
as, semper eas agitare, ac circumuolare ad sonos
& uoces, uisum partū à natura edocta. At in
hominibus, quō paruas eas esse oportere, nihil
aut certè parū iuuare poterant si mobiles ac ut
sanis

Oris uicidit
dicat, sapores,
quodammodo
lingua dyd-
cas.

Vacuū confert
ad uici carnis
nitentem.

Corpusculis si-
ne columnella
vni.

Corpusculis nō
esse absconden-
dam radiorum.

Narū forami-
na, ut obliqua
in os detorque-
antur.

Sanis ad respi-
randum ore nō
esse opus.

Aures cur sint
cartilaginę.

Aures cur pro-
minent.

Hadrianus Ro-
manus consul,
quod audiret fa-
cilius manus ca-
usas à posteriori-
bus ad anteriora
spectantibus au-
ribus obtendebat.

Aures hominū,
cur immobiles,
sanis

*Auris curio-
triformis quod-
cana, retroflexa
cane autem con-
vexa.*

*Artificum boni
manus.*

Natu carnem.

*Particularum
ornamenta ob-
servata appen-
dendi vultu
tatu.*

*Pulchritudo ve-
ra ad quid refe-
ratur.*

*Scopas primus
construendus
particularis est
vultus.*

*Pilosum menti
vultus.*

*Mulieris gla-
bra.*

*Mulieris non fusi-
si opus venen-
da facie, quan-
doquidem nec
maribus ven-
dendo est prode-
la.*

*Membris dari
carporem ferunt
congruentem.*

*Capillorum ge-
neratim.*

*Viri adesse ma-
gis conveni-
entem fulgore
fieri excremen-
tum.*

*Feminae pilis na-
da.*

*Pili palpebra-
rum atque super-
ciliorum car-
nem magni-
tudine sequi-
antur.*

sanles fuissent: ac proinde immobiles sunt, aut obsecrū motum mouentur. Porro quod extrinsecus quidem conuexus, intrinsecus autem caue extiterint, factum id propterea est, ne quid meatui incideret, necne ipsae facile afficerentur. Vtraque autem est flexuosa, ut complicari, ac in seipsas recipere facilius possint. Tam uero quemadmodum boni artifices, praepter opus institutum, artem suam ostentant, sic natura ex abundanti tum aures ipsas, tum omnia humana membra exornauit, ita ut primò quidem actionibus, utilitatibus partium incumbere: postea uero cohonestaret illas, in eisq; ueluti operis aditamentis, ac ludicra quaedam faceret, ut in ipsis nanum carnis consistat. Evidenter quippe parvis ipsis turpitudinem, si nulla carnis fuisset, sumam conspicuatur agnosces. Obcurantur tamen ornamenta particularum, à splendore ipsius unitatis. Pro nihilo siquidem ducitur oculi pulchritudo, sicuti & nasi, & labiorum ornatus, quod ipso-
rum utilitas ualde sit admiranda. Ceterum par-
tis actio, ut constructione ac generatione prior est, sic dignitate quàm ipsa utilitas est posterior. At uera pulchritudo, ad utilitatis successum, & bonitatem refertur: primusq; partium omnium constructionis scopus, unitas est. At pili qui in mento oriuntur, non modo genas operiunt, ue-
rumetiam decus maris, ornamentum, & severitatem cōciliant. Male autem & nasus desituntur palis, pulchritudinis gratia. Etenim mulieri, totum corpus molle atq; depile, puerorum instar habenti, ipsius faciei glabris ex plurimū ad pulchritudinem addit. Nam quomodo mores non habeat aequè uenerandos ut masculus, nec forma quidē ei ueneranda opus erat. Semper quippe natura, moribus animae, formam corporis aptam & congruentem effingit. Praeterea quum ex humoribus ipsis balisus semper quidam sursum ad caput feratur, transioribus excrementis illius, ad pilorum alimentū praeipue natura ab-
utitur, pilorum inquam, ornatum & tegumentum capiti cōciliantium. In uiris autem, quāto hi mulieribus sunt calidiores, tantò hec quoq; excrementa sunt plura: proinde duplicem hā natura inuenit euacuationem, alteram ex capitis, alteram ex genarum pilis. Pilos nō habet frons, quod tegi possit à pilis capitis, quantum uoluit: quodq; si eos produxisset, tondere ipsam non obis assidue fuisset necesse, q̃ oculis nimirū incumbat, propter quos etiam motu uoluntario mouetur. Morus siquidē cutis undiq; oculis circumfusq; ad oculos exactē aperiendos & concludendos, maxime opitularur. Porro quum pili capitis & maxillarum augeri ac minui plurimum possint, secundum sexus, ætatis, temporum, & locorum naturam: qui supercilij & palpebrarum infunt, eandem semper magnitudinem seruant: utpote quorum hi quidem, ne quod corporum exiguum oculis patefactis inciderat, ueluti uallum quoddam, ipsis appositi sint: hos autem instar muri cuiusdam, propulsare oporteat, ac primos omnia quae à capite desiliunt, excipere. Si igitur eos aut minores, aut rariore, aut longiores, aut densiores effeceris, tantumdem eorū utilitate uitrueris. Postea uero quādam cuiusmodi

facere pilos constituit Deus, his quidem durum corpus subiecit, illis autem cutem duram, cartilagini per superiorem connexam. Non enim far-
eant, eos duraxat uelle tales esse. Neq; enim si lapidem repente uelit facere hominem, efficere id poterit. Atq; in hoc opinio nostra & Platonis à Mose dissidet. Omnia enim ipse Deus facere posse arbitrat, etiam ex cineribus equum aut bouem facere uelit. Nos autem non ita sentimus, sed confirmamus quaedam naturam neutiq; facere posse, eaq; Deum ne aggredi quidem omnino: sed ex his quae facere poterit, quod melius est eligere. Etenim quum pilos in palpebris satius esse æquales semper esse magnitudine ac numero, non ipsum id quidem uoluisse affirmamus: illos autem mox factos fuisse (neq; enim id facere potuisset) sed cōtendimus potius eos, etiam si milles uoluisse, nunquam tamen tales futuros, si ex cute molli producti fuissent: quum nec rectū quidem hanc possent, nisi in duro fixi essent. Vtraque itaque attribuiamus Deo: tum eius quod est melius, in ipsis opificis electionem, tum etiam materiam electam. Quod si substantia cuiuspiam molli & carnosae pilos eos infixisset, non Mose modo, uerumenam aliquo malo ducere uideretur interior, qui murum in palade, aut uallum iaceret. Nam quemadmodum herbae ac plantae, quae ex terra humida & pingui proueniunt, aliusmodū crescunt: quae uero ex petrosa, squalentēq; paruae ac durae, nullasq; incrementi permanent: ad eundem, opinor, modum & pili, qui ex humidis ac mollibus emergunt partibus, plurimi sunt incrementi, cuiusmodi apparent in capite, axillis, pudendisq; qui uero ex duris & aridis, exiles atq; incrementi nullius. Quocirca duplex ipsis origo existit, quemadmodum herbae ac plantae: alia quidem à conditoris prouidentia, alia uero à loci natura. Ordo autem equalitatisq; ortus ipsorum, discrimen facit. Atq; à loci quidem natura oriuntur pili tum axillarum, tum alborum membrorum, nullis certis lineis descripti: quaedam modum sunt hi, qui in palpebris sunt, supercilij, & capite) sed inaequales habentes terminos, nullisq; proiecti ordine: quādoquidem à loci humore proueniunt, neq; sunt ipsius opificis opera. Quo fit ut calidis quidem naturis sint plurimi, frigidis autem nulli omnino, aut perpauci gignantur. Quorum autem opifex curā habet, hi in omnibus naturis insunt, calidis, frigidis, humidis, siccis, nisi quidē potius fuerint intemperatae, cuiusmodi est petrosa aut arenosa terra. Nō desiliunt aut palpebrarū, aut superciliorum pili, nisi in magnis partū affectibus. Sed neq; à capite desiliūt, nisi etiā in eius affectibus quidē, uerū quādam praedictorū, minoribus. Nam plantae quae in terra dura aridāq; proueniūt, ut generationem habent difficilem, multatq; prouidentiam requirunt, ita non facile intereunt. Ad eundem unig modum & Acrothiopum capita, paruos quidem, nulliusq; incrementi habent capillos, propter siccitatem cutis: uerū caluescent ægrē. Quae omnia quum opifex prouideret, in palpebris quidem & supercilij satius esse ratas exiguas quidem & nullius incrementi pilos, uerū stabiles, gignere, in cute dura &

*Maisia sunt in
tas uelut Galenus.*

*Natura non est
se passibilis ar-
tia.*

*Deo qua attri-
buit Galenus.*

*Pilosum origo
duplex, quod-
dammodo herbae ex
placuit.*

*Pili orti à loci
natura.*

*Pili naturae ca-
lido plures, frigi-
do nulli, aut
perpauci gignantur.*

*Pili à condito-
ris prouidentia
ortus, singulis
naturae assig-
nati.*

*Alapica quādo-
dam accidit.*

*Acrothiopii ob
siccitatem cutis
habent pilos par-
uos, et incrementi
in molli, calidius
sunt tantum a-
gredi.*

*Palpebrarū cu-
tis car dura car
duraque.*

*Paludendum pu-
li cum gratia
viti.*

Frontis cutis.

*Cutis totius
animalis.*

Labiorum cutis.

*Periostion est
membrana cra-
sio adhaerens.*

*Labiorum sub-
stantia.*

*Labiorum mo-
tus rectus fieri
debet obliquus.*

*Labiorum mo-
tus in rursus
fieri debet.*

*Nasali alarum
vitiata.*

*Nasali alarum
vitiata.*

cartilaginosa radices eorum, quasi in lapidosa qua-
dam argillacea terra, defixit. Lam vero & cir-
cum pudenta pili quoque necessario proveniunt,
(calida enim & humida sunt hae loca) operimen-
tumque ac ornamentum eius loci partibus prebent,
ut nates ano, atque praeputium pudendo. Frontis cu-
tis cum muculosa quadam & tenui substantia, quae
illi subdita est, unitur: ut partes manuum internae,
& plantae pedum, cum tendone coalescunt. Tertia
vero praeter has differentia cutis est, quae in toto
animali videtur, substantia quidem subiecta hae-
rens, non autem coalescens cum illa. Quarta deinde
est labiorum, cui musculi per totum miscuntur.
Quod autem frons a subiecta quidem ossibus per
membranam periostion distincta sit, solae ex dua-
bus cutibus mobilibus constans, ac breviter to-
ta in se laxa, ob id certe motu voluntario mouetur.
Ceterum labiorum substantia, quam moveri
etiam motu voluntario oportebat, eiusmodi exi-
sit, ut eam, aut musculi pro cute, aut cutis muscu-
losam merito vero eas. Quatuor autem sunt muscu-
lorum, ad labia perveniunt principia: peripicia
quidem antequam cuti miscantur: obscura vero,
& quae a substantia illius separari non possunt, ubi
semel in unum coeunt. Quare totidem etiam
erunt musculi, utriusque scilicet duo: unus quidem,
qui ad laevam: alter autem, qui ad dextram, ipsa
circumagat. Capita autem sunt appenda, aliis qui-
dem supernae, versus malas, ut qui motus obli-
quos utriusque labii parti essent praebitur. Inferio-
rum rursus obliquos quoque positio est, quoniam &
obliqui sunt motus. Ac per hos quidem quatuor
musculos opifex octo motus instituit: quatuor
sancti obliquos, in utroque labio duos: ac totidem
etiam rectos: duos quidem omnino rectos, quia
labia plurimum a se tunc distant, tum etiam in se
coeunt. Nam quemadmodum in carpo &
brachio ostendimus ex obliquis motibus rectos
fieri, sic & in labiis accidit. Quare si musculus
solus utriusvisque labii agat, motus sit ad obliquum.
Sin vero tensi utriusque fuerint, eo modo iam totum
simul labrum sursum quidem a musculis superio-
ribus trahitur: deorsum autem ab inferioribus.
Atque etiam tensis fibris externis, labia foras de-
flectere: intro autem credere & complicari, ab in-
ternis accidit: ut si duos hos motus, ipsis qui plani
sunt recti, adnumeret, octo omnino labiorum mo-
tus reperias. Ut autem maximi non solum laevi, sed
cum eis etiam illi qui in genis sunt, motus effice-
rentur, musculus latus a tene naturae extrinsecus
subdidit, unum in parte utraque usque ad colli
spinam pertinentem, ex omnibusque ferè colli par-
tibus nervorum maximam vim recipientem. Qui
musculus ad sermone & masticationem valde
conferat. At vero quum ad inspirationes paulo
maiores & subitas, item ad efflationes, nasi
ale non parum conducant, oportuit certe eas
mobiles esse, idque pro voluntatis imperio. Carti-
laginosa autem fuerunt, quod ea substantia non
facile contundi nec rumpi posset. Verum mus-
culi in illas inserti, subitas malas oritur exigui,
iuxta principia musculorum qui ad labia deflec-
tunt. Cum quibus quidam nervi coniuncti mu-
sculis, semper magis magisque obliqui digredien-
tur ad nasum, recipientesque a nervis qui per maxil-

lam superiorem feruntur, exiguas quasdam pro-
pagines. Interea autem ipsius nasi tunica fuit con-
structa, tum ut illam intrus succingeret, tum ut
illi sensum tribueret: quod si quidem neque eo
eius, nec cartilago, sensum habere poterat. Porro
constructa ossium, aut motus gratia, aut per-
spiratus, aut transitus cuiusdam, aut partium dis-
criminis, aut securitatis, & patiens difficultatis,
extitit, ut liquet in ipsarum particularum propo-
sitis nobis exemplis. Vbi ossi medullam habet in
se, eius finibus utrinque caput insit operculi
cuiusdam, ut plurimum videmus adnata. Nul-
lum tamen parum eo habet medullam, quod
sinum nullum habet commemorabilem, sed caue-
nulas angustas & flexiles. Nam si exigui & caue-
nulas fuisset, caretet robore: quemadmodum si quodvis
magnum densum fuisset ac sine sinu, gra-
vissimum foret, ac gestatu difficile. Omnibus au-
tem imbecillioribus animalibus ossa sunt laxiora
& concava magis: fortioribus vero densiora,
magisque compacta. Quin & leo, qui omnium est
ferocissimus, ac fortissimus, ossa omnia medul-
lae experta habere creditur. Natura quippe, mu-
sculorum imbecillitatem atque robur intuita, ad ip-
sorum portionem, ossium pondere effecit. Quum
igitur ad propriam securitatem, durities ad ani-
malis vero motum levis ossium requireretur,
(nec adesse simul duo haec esset facile) id opor-
tebat eligere, quod erat commodius. Commo-
dior porro animalibus motus est, ut qui sit ex
ipsorum substantia. Non enim quatenus est ani-
mal, omnino ab iniurijs est tutum: at ex seipso
mouetur. In quibus tamen propter musculorum
robur, ac totius corporis fortitudinem, utrumque
comparare erat licitum, his omnibus densa ac
dura, insit lapidum quorundam, ossa compe-
git, ut in leone. Quia vero homo non est aequè
fortis ac leo, iure optimo, quae ossa in eo sunt ma-
xima, ea non causa modo, verum etiam laxa exi-
terunt, plena tamen medulla, quae propriam ala-
mentum est ossibus. Nam quibus cautius nula
inest, ipsis ossibus tale quid in eorum caavernu-
lis continetur. At caput processus (quos Graeci
vocat *inapophyses*) non protinus omnia quae me-
dullam habent fortuntur. Quandoquidem ma-
xilla inferior medullae quippiam in seipsis conti-
net, at processum nullum sortitur, quum sit den-
sior, quum ut processum indigeat, atque ita facile
possit medullam sibi sine ulla externa epiphyssi
claudere. Causa autem cur sit hoc os brachio & se-
more densius, est nuditas. Vbi vero laxitas simul
& cautitas adfuit ossibus, eorum capitibus ossa
densa ac dura, cartilagines glutinosae interueniunt,
adeo fuerunt accurate appositae, ut commissa eor-
um non facile cerni queat, nisi ossa ipsa conco-
cta, aut exiccata fuerint. At superior maxilla om-
nino medullae fuit experta, quod propter usum
moveretur, ob idque illi necessaria non esset levi-
tas, quemadmodum inferiori. Quare ad solem
patendi difficultate, ex ossium multitudine fuit
copata. Nam quia utilitates haberet diversas,
ex diversis quoque substantia ossibus manifestè
constatur. Maxillae reliquae ossa, crassissima sunt:
nasi tenuissima: quibus vero durissima. Quum
enim ossa nasi, si laeva fuerint, minimam animum ali-

*Nasi tunica in-
terna, in qua
sensum facit.*

*Ossium structu-
ra, cum gratia*

*Ossibus medul-
lae insit, ut
trunc capiti.*

*Leoni ossa om-
nia medulla ex-
perta.*

*Ossa sunt di-
stincta in
musculorum im-
becillitatem et
robur.*

*Motus esse
substantia
animalis.*

*Ossa humana
qualia.*

*Ossium nutri-
mentum, me-
dulla.*

Inapophyses

*Maxilla inferi-
or nullum pro-
cessum sortitur,
tamen medul-
lam in seipsis co-
noscit.*

*Maxilla superi-
or cur sit den-
tata medulla.*

*Maxillae superi-
orae crassissimae.
Nasi ossa tenuis-
sima.*

adferant noxi, multum ab alijs principalioribus duritie & crassitie vincuntur. Repertur autem futura una secundum longitudinem in utraque maxilla, quodd nimirum utraq; corpus sit geminum. Obscura tamē ea in densissimis ossibus. est: cuiusmodi est occipitis, frontis, palati, & summæ maxillæ. Quum igitur ossa quæ ad verticem capitis pertinent, nec plagis similiter essent obnoxia, ut ossa frontis & occipiti, nec non quæ in lateribus sunt, evacuatione indigerent copiosa: hæc autem usinera sæpenumero exceptura essent, uacuacionem non postularunt: natura recte illa quidem rara simul & cauernosa, hæc uerò dura & densa cõstruxit. Palati autem os durum etiam ac densum extitit, quod ad basim capitis sit: quodq; ab extremis quæ per ipsum transiunt, breui exarabisset, si fuisset laxum. Ossium porro alius similitum productio, ex ipso facta est, sedem simul atq; operimentum muscularis oris à lateribus exhibitura. At ossa bregmatica (quæ duo laxa sunt capiti desuper incumbentia, ac undique à duris ac densis ossibus circumdata) parte quidem posteriore ab osse occipiti, anteriore uerò frontis, utring uerò ab ossibus temporū, meritò lineis fuerunt distincta. Septimum est os palati, quod nonnulli superiori maxillæ, nonnulli capiti attri buunt. Reliqua omnia maxillæ superioris nouē sunt numero: duo nasi, tertium, cui hærent incisores dentes: utring autem duo, quæ molares ac reliquos dentes excipiunt: supra quæ alia duo sunt, quæ ad anteriorem zygomaticam productionem, atq; internā oculorum cautatem spectant. Reliqua duo sunt iuxta nasi in os meatus. Porro articulum inferioris maxillæ, alteri quidem, qui *apophis* dicitur, zygoma circumposuit natura, maximumq; musculi temporalis tendonem, à quo nimirum os clauditur: alteri uerò amillares capitis productiones apposuit, ne quando in uolentibus moribus, à subiecta cautate elaboratur. Aperiunt autem os ipsum rum posterior articulus, qui est ad mamillares eas productiones: tum musculi articulum mouentes, oppositi temporalibus muscularibus.

GALENI PERGAMENI de vsu partium lib. XII.

Sunt autem partes collo & capiti cõmunes, per quas caput in omnē partem mouemas: id quod fine articulis, ligamentis, ac muscularibus agere nobis non licet. Porro articulatorio, ossium est cõpositio, propter motum uoluntariū comparata. Ceterum quæ componuntur, pauciora duobus esse non possunt: oportetq; ut musculi ab uno osse producti, inserantur in alterū. Motus autem fieri non potest, nisi ossa articulen tur simul, ac per musculos cõnectantur. At ligamenta, quæ ossa in suis articulationibus exacte contineant ne excidant, ad recte etiam mouendum conferunt: adeo quidem dura existentia, ut in moribus uehementioribus minime disrumpantur: in tantū autem mollia, ratione cuiusdam huiusmodi uiscidæ, quæ articulis innutritur, ut tra ctus ossibus facili & obsecundet, & cedant. Quū igitur cartilagine, ligamento, & neruo, corpo-

ris machina indigeat: ac cartilago quidem sit durior, neruus autem mollior: medium uerò sit ligamentum: mirabiliter finē naturæ singulis utitur in omnibus animalis partibus, nunquam loco unius constitutus alterum. At uerò cartilago subiungit quodammodo articulos: neruus, quantum habet mollietie, tantum & sensus habet. Verū imbecillior est, quam ut totos artus mouere & transferre queat. Ligamentū autem ualde colligare potest, nec impedit quo pinus membra moueantur: motorium tamen instrumentum esse non potuit, quum nec sensum nec motū habear, nec ex principio animal mouente, sed ex osse exoriatur. Conuenienter igitur, ubi membrum solo uinculo indiget, ibi solum est ligamentū: ubi uerò sensu solo, neruus: ubi motu uoluntario est opus, utringq; ibi reperias: neruū quidem, qui missum à ratione imperium perferat, motusq; principium præbeat: ligamentum uerò, quod robur ad ea quæ à neruis mouentur gestanda suppediet. Proinde missum quoddam instrumentum motus ex ambobus, primum quidem in tenues fibras solutus, postea uerò coalescentibus, interapedinesq; medias molli carne repletas habentibus, efficere oportuit, quod omnino neruo quidem durius, ligamento autem mollius existens, reliquarū etiam contrariarum affectionum quæ illis insunt, medium locum teneret. Atq; hoc quidem instrumentum est tendo, quod ex ipse illis fibris inter se committis consistat. Tendo igitur primum instrumentum est motus. Musculus autem, ad constituendum ipsum fuit comparatus, carnibus coagmentatæ & composite animalis contra iniurias extrinsecas præbet unitates. Porro articulus capitæ adeo magni est momēti animalibus, ut omnium solum, non dico luxationē magnam, sed ne deflexionē quidem, uel temporis momento ferre queat. Repente siquidē respiratione ac uoce, motusq; simul & sensu, totum priuatur animal, ipsa nimirum neruorum radice affecta. Est enim principium omnium neruorum cerebrum, in ipsumq; ueluti in aruum quoddam anima rationis semen mittit: germen uerò inde, ueluti truncus quidam in arbore exurgens, medulla spinalis existit: à quo trunco per totam spinam extenso, deducti nerui quamplurimi, insunt ramorum quorundā, in sexcentas propaggines distribuntur. Corpus autē uniuersum, per eos sumit primum quidem & maxime motum: dein uerò, sensum. Ceterum articulus capitæ tutissimū omnium constructionem sortitur, quod in seipso radicem neruorū omnium, partes inferiores mouentium, continet. Accedit ei hæc securitas à ligamentorum crassitie, muscularum multitudine, & ossium exacta compositione. Fortissima enim ligamenta ossa ipsa connectunt: quorum unum maximum ac latum, in orbem totam articulationem completitur. Alia autem sunt duo mediocriter, insunt neruorū, rotunda: quorum alterum quidem, finem productionis prælongæ, uertebæ secundæ, cum capitis osse connectitur: alter uerò transversum, ueluti angulum rectum efficiens, à partibus primi spondyli dextris, ad leuam pertingit. Octo autem musculi

Corporis machina qua ligantur.

Cartilaginei uerū. Neruus quā antē mollior, tantū & sensus habet. Verū imbecillior est, quam ut totos artus mouere & transferre queat.

Ligamentū nec sensum nec motum potest: oportet autem ab osse.

Tendens generatim, ex ligamento est neruus.

Tendo primum est instrumentum motus. Musculus uerū. Articuli capitæ leuati, quæ in se firmitate.

Cerebrum ossis motum neruorum principium.

Spinalis medulla ueluti truncus arboris.

Nerui longiori corpori motum & sensum. Articuli capitæ contriti & securati.

Capitū articulus ossis inuenitur musculi.

Maxillærum futura.

Verticis ossa uerū. Frontis ossa uerū. Palati os cur da rum & densum.

Ossium alio similitum vsus.

Bregmatica ossa.

Maxilla superioris ossa nouem.

Apophis. Zygoma.

Mamillares productiones.

Os à quibus aperiuntur articuli.

Articulatorio quod.

Componenda quibus qua requirantur.

Motus quæ requirantur.

Ligamentorum vsus et cõstitutio.

ex ipsis duntaxat partibus posterioribus, articulationi incumbunt, ipsam regentes simul atque moventes. Quum igitur capitis rotius motus duos genere esse oportere: unum quidem, dum deorsum inclinamus, ac sursum attollimus ipsum: alterum vero, dum ad latera circumagimus: nec ex duobus simplicibus motibus rectus unus illic effici posset, utrique proutim præstitit musculos atque articulationes efficere. Quocirca de articulationibus ipse, duplices, musculorum autem moventium ipsas, genera duplicia extiterunt, quatuor differentiis comprehensa. Alij enim caput attollunt, alij depriment: alij ad dextram, alij ad sinistram circumagunt. Igitur motum in utraque partem gratia, primo spondylo natura duas cavitates inducit, alteram in sinistris, alteram in dextris, capitis convexitatem, quæ ibidem sunt, profus æquales. Nam tametsi potuisset natura unum maximum processum, atque rotundum undique, in primi spondyli maximam cavitatem inferens (quemadmodum in humeri articulo fecit) capiri omnes motuum differentias præstare, quia tamen sine laxa articulatione & fallaci fieri id non poterat (ob quam nimirum omnium maxime articulorum, luxationis humerus est obnoxius) maluit paucissimos capiti motus, eosque tuto tribuere, quam varios simul, atque periculosos. At vero secundo spondylo utrinque unus dentiformis processus inest, acclivis atque prælongus, qui robustissimo ligamento capiti connexus est. Atque eius quidem beneficio caput attollitur, deprimiturque, quemadmodum per articulos cum primo spondylo ad obliqua movetur. Quum autem ex partibus anterioribus secundæ vertebrae, ille dentiformis processus exortus, inveli deberet secundum supremam sui oram partibus primæ vertebrae anterioribus atque internis, merito natura, vertebrae partem eam excavavit, dentemque ipsum ibi indidit, validum ligamentum atque transversum extrinsecus ei circumdedit, quod simul ipsum à spinali medulla abduceret (ne videlicet illam collideret) simul autem ad primæ vertebrae cavitatem alligaret. Quinetiam supernis primæ vertebrae cavitatibus, quæ capitis eminentias excipiunt, aliæ quædam cavitates parte inferna confimiles subiacent, quæ eiusdem primæ vertebrae complexantur conuexitates. Quarum beneficio neque vertebrae secundæ cum capite connexio (cuius actio erat caput sursum attollere, deprimeretque) à prima quicquam habet negotij: neque reliquus motus ad latera, propter articulationem cum prima, impeditur quicquam à secundâ. Verum quæ quatuor & vigintri rotus spinæ sint vertebrae, quod in nulla quiddam alia eiusmodi ligamenta, qualia in prima, cernantur, neque in hac etiam secundum aliam partem, quæ sit expediente, sint facta, nemo opinor audebit dicere id accidisse fortuito. Musculi qui caput movent sunt octo & vigintri, aut plures, ipsum in orbem circumvehentes: quorum alius aliam habet actionem. Sunt autem ipsorum, octo quidem partibus anterioribus, quatuordecim autem posterioribus, ex diametro sibi ipsi oppositi. Alij vero, utraque parte duo, quorum hi quidem ex dextris, illi autem ex sinistris, oppositi & ipsi inter se, primum

quidem & maxime collum ad scripsos trahunt, cum illo autem & totum caput: natura semper singulari motu præditis musculis opponente alios contrarij motus auctores. Musculorum caput attollentium & inclinantium, octo quidem, itemque parvi, retrorsum, circum articulum ipsum sunt sitiquibus maiores alij in toto collo extensi, per primas quidem fibras, solius capitis motibus in servientes, eos obeunt, qui ad primam funt atque secundam vertebrae: per proximam vero, movent quinq; vertebrae colli vertebrae. Ceterum ex octo musculis, quos paruos esse diximus, quatuor sunt recti motus auctores, qui ex ossibus occipitis exoriuntur, paulo superius articulationem: inferuntur autem in secundi spondyli posteriori processum, atque in partem primi proximam. Reliquorum vero quatuor, duo quidem, quo modo prædicti, hi autem occipitis nati, foras tamen et obliqui digredientes, obliquis primi spondyli processibus inferuntur, motum rotius capitis obliquum præstantes. Reliqui autem duo, primum spondylum secundo coniungentes, obliqui, positionem habent duobus prædictis contrariam, ac motum oppositum. Illi enim caput habentes obliquum, una cum eo secundam vertebrae ad primam adducunt: hi autem in rectum & naturalem statum, in clinatam caput reducant. At tres musculorum magnorum coniugationes, eundem cum dorsilibus musculis habent motum, quem paulo post explicabo. Movent autem per primas quidem fibras (quæ in primâ & secundum spondylum inferuntur) solum caput: per reliquas vero, primum quidem reliquos colli spondylos: simul autem cum eis, caput retrorsum agunt. Obliqui tamen, sensum motus obliquos efficiunt. Anteriorum vero, qui stomacho quidem subiacent, per primas fibras (quæ in primâ ac secundum spondylum defixæ sunt) caput duntaxat flectunt, ac simul obliquæ fibræ, ad obliqua deducunt: per quas musculorum etiam parvorum propriam habent circumscriptionem: per reliquas vero collum flectentes, simul cum eo caput cogunt nutare. At reliqui sex, non rectum, ut hi, capitis nutum, sed sensim obliquum efficiunt: cum quo etiam caput in anteriora conuertunt. Quatuor autem alij musculi robusti & magni, utraque parte duo, dextra & sinistra, locati, collum ad latera cum parva declinatione movent: atque antrorum, anterior ipsorum coniugatio paululum inclinans, reliqua autem retrorsum: illa sanè ex perforata secundæ vertebrae apophysi productionem habet, hæc autem ex primæ obliqua eminentia nascitur. Fit autem omnium musculorum actio pro fibrarum positionis modo, quas ut plurimum habent secundum sui longitudinem ex porrectas: raro autem obliquas, ut spinales musculi, qui quidem recti secundum spinam extensi, fibras in obliquum producant. Securitas itaque articulis capitæ, ex his quæ diximus, accessit: motuum autem detrimentum, quod eam sequatur, musculorum multitudo, magnitudine actus vario natura ita pensavit, ut nullus capiti desit motus. Ceterum omnium musculorum sunt minimi, posteriores, ut qui soli exactè articulationem comprehendunt.

Musculorum moventium singulari natura oppositi esse alios contra motum autem.

Capitis musculorum alios motus.

Musculorum alios pro fibrarum positionis modo. Musculi majores ex parte inferiori sunt ac secundum longitudinem ex porrecti.

Capitis rotius motus duos generis esse oportere.

Spondyli primo duas cavitates inducit.

Humerus omnium maxime articulationis cur latissimus est obnoxius.

Capitis motus sursum deorsumque, & in obliquum, & inde præstatur.

Dentiformis processus.

Vertebrae spinæ rotus esse vix quatuordecim.

Musculi caput moventes octo & vigintri.

Acque

Aequè autem opportunam cum his positionem
 habet prima portio musculorū stomacho subie-
 ctorum, quæ ad flectendum caput est compa-
 rata. Verum quod ipsorum est reliquum, pro-
 greditur usq[ue] ad quintam thoracis vertebra[m],
 flexione[m] rectam efficit, nō modo vertebri[s] sub-
 ditis, sed etiam cum eis uniuerso capiti. Postquā
 uer[ò] ex musculis octo exiguis & posterioribus,
 qui caput ad obliqua inclinant, rectam quidem
 erectionem efficiunt, quum coniunctim ac bini
 agunt: obliquam autem, quando alter eorum so-
 lus agit: similiterq[ue] etiā qui maiores ipsis in-
 incumbunt, usq[ue] ad collum extēsi: ob idq[ue] necesse[m]
 erat quoddam illis parte anteriori opponere mu-
 sculos, obliquam flexionem ædentes: ideo mu-
 sculi sex qui ad clauem & pectus perueniunt, sue-
 runt comparati qui caput possunt flectere, atq[ue]
 etiam antrosum circumagere. Pari modo, &
 musculorum quatuor qui collum flectunt ad la-
 tera, si unus solus egerit, ad illum inclinatur. To-
 ta uerō anterior coniugatio, exiguum quiddam
 flectit antrosum, nūquam præterea flectens ad
 latera: quemadmodum & quam posterior a-
 git, paulatim quidem attollitur, in neutram par-
 tem se inclinans. Omnibus uerō quatuor simul
 agentibus, in nullam omnino partem propen-
 sum peritat. Quum autem nūquā alibi tantum
 alterum os, alterum superet, quantum capit[is] os
 primorum spondylorum ossa, quibus iungitur,
 magnitudine superat (præter enim inferiorem
 maxillam sedecim insunt capiti ossa) certè opus
 fuit multis ac robustissimis musculis, qui pen-
 dentes omnino à capite, infererentur, non om-
 nes quidem in primas verteb[ras], sed illi tantum
 quibus licitum esset. Erat id autem tantum lici-
 tum his, qui motum rectum ad unguem suppedi-
 tant capiti, aut alicui eorum, qui ad obliquū de-
 flectunt. Merito igitur nō omnes qui caput mo-
 uent, in primos spondylos infiguntur musculi,
 sed parte quidē posteriore, parui soli: anteriore
 uerō, prima portio musculorū stomacho subie-
 ctorum: à lateribus parui aliq[ui] musculi, qui capiti
 vertebra[m] primam coniungunt: ac proinde par-
 uas verteb[ras] nō oportuit esse maiores. At uerō
 spinam natura animalibus ueluti carinam quan-
 dam corporis ad uitam necessariam, nō ex uno
 simplici ossē molira, intus eius omnes verteb[ras]
 excavauit: uiam hanc præparans opportunam
 portioni cerebri, quæ per ipsam erat descensura.
 Non cōstruxit autem eam simplicem (quanquā
 ad sedem tutam, & parienti[um] difficultatem, talis
 structura erat longè cōmodior) quod multas ac
 uariis morbus animal esset usum, quibus spi-
 na ex unico formata ossē, minimè obsecudaret.
 Quare natura quidem rectè utruq[ue] scopum si-
 mul considerans, iudicansq[ue], priorem quidem
 dignitate, actionem: post illam autem, securita-
 tem: sicuti rursum, ad sanitatis diuturnitatem, se-
 curitate[m] esse quidem priorem, posteriorem autem
 actionē: utriusq[ue] scopi, actionis scilicet & incolu-
 mitatis, in spinæ vertebri[s] acquisitam fecit mi-
 scellam. Quod autem necesse[m] fuerit spinalem
 medullam ueluti fluuium quandam ex cerebro,
 tanquam fonte, manantem, locis omnibus quæ
 præterit, neruum semper immittere, tanquam

sensus ac motus fluuii: libet melius sic in uni-
 uersas corporis partes transmitti eas facultates,
 quam si nullius interuētus, à cerebro per tenuem
 aliquem neruum dispergerentur, neminem opi-
 nor latere. Ad hæc uerō, spina, quod sit ueluti
 quedā carina, totiusq[ue] animalis stabilimentū, ex
 duris ossibus est constata. Quod autem medul-
 la spinalis sit uia, ob id intus est caua. Quia ue-
 rō ipsi, & uisceribus instar muri est, ea de causa
 multis propugnaculis in orbem est cōmunita.
 At quia motus est instrumentum, ob id ex pluri-
 bus & paruis ossibus per articulos cōmissis in-
 ter sese cōstitit. Constat enim ex quatuor &
 uiginti ossibus, præter os latum, quod extremæ
 ipsi subiaceret. Maxime igitur partes spinæ sunt
 quatuor in uniuerso: collum, dorsum, lumbus,
 & sacrum os. Ex quibus collum quidem se-
 prem spondyli[s], dorsum duo decim, lumbi quin-
 que, os deniq[ue] sacri aut latum, quatuor ossibus
 constat. Iam uerō læso spondylo, motus simul &
 sensus omnium partium quæ illi subditæ sunt,
 læduntur. Quare, ut rectè monuit Hippocrates,
 si multi quidem spondyli ordine sese consequen-
 tes, emōn fuerint, malum id est. Sin uerō unus-
 quisq[ue] ex ceterorum harmonia & compage exi-
 berit, exiriosum: quod illa quidem pars, spi-
 nalis medullæ sit circularis, hæc autem secunda,
 angularis peruersio, qua maxime ipsa medulla
 comprimitur, sustinere magnam simultaneamq[ue]
 flexionem non potens. Quia igitur per magnos
 ac laxos articulos, multumq[ue] dissiptos, moueri
 spina sine molestia non poterat, melius fuit ex
 multis, paruis, singulis paulū conferentibus,
 totam ipsam constari, ut secundum circuli cir-
 cūferentiam, citra angularem medullæ peruer-
 sione[m], tota flecti & moueri posset. Quis itaq[ue]
 necessum sit plures esse in spina spondylos, consen-
 taneum etiam ratiōni fuerit, cuiq[ue] ipsorum motum
 inesse proprium: id quod fieri non posset, si
 duo illi musculi à capite usq[ue] ad os sacrum exten-
 si, haberent fibras secundum longitudinē expor-
 rectas, quæ nimirum omnes itidem traherent.
 Nunc uerō, quum oblique in quosq[ue] spondylo
 fibræ fuerint, tum ad latera circumagere, tum fle-
 cere, atque erigere, nunc hanc, nunc illam spi-
 næ partem possumus. Sed quum mouere ipsam
 spinam figillatim possemus, poterimus & to-
 tam simul mouere, fibrisq[ue] musculorum omni-
 bus simul agere. Quod si fibras secundum totam
 longitudinē tenderemus, simul quidem totam
 promptè moueremus, singulos tamen spondy-
 los non item. Melior igitur habenda est constru-
 ctio, quæ utruq[ue] simul probè præstare potest,
 necnon conuersiones ad latera, quæ quæ alteru-
 rum tantum. Quod autem propter instrumentum
 copiam, quæ locanda ibi omnino erant,
 primi spondyli magni esse non poterant, nō ob-
 scurum existimo. Sicuti neq[ue] etiam, quod ex-
 diebat subiacentibus quidem semper superiori-
 bus esse minores: siquidem quod gestatur, mi-
 nus esse oportet eo quod gestat. Quæ causa fuit,
 cur natura omnium spinæ ossium infimum, fe-
 cerit maximum, ipsum ueluti fundamentum
 quoddam, ossibus omnibus subdens. Secundu[m]
 magnitudinis locum habet spondyli illi secun-

Spina u[er]o con-
 sistens, ex con-
 structio.

Spina constat
 ex quatuor &
 uiginti ossibus.

Spina extremū,
 os latum.

Spina maxima
 partes quatuor:
 collum, dorsum,
 lumbi, & os sa-
 crum.

Lumbationem
 spina, quæ pos-
 sita.

Circulari per-
 uersio.
 Angulari per-
 uersio spina.

Spondyli u[er]o
 gati fibræ in-
 ter se oblique.

Cestosa ossa,
 minora esse de-
 bere u[er]o, à quo-
 bus gressantur.

Os latum, cur
 omnium spina
 infimum sit maxi-
 mum.

Capitis ossa
 sedecim, præ-
 ter inferiorem ma-
 xillam.

Spina, quæ cor-
 poris ueluti quan-
 dam carinam est,
 constructio.

Spina cur ex
 pluribus sit con-
 structa.

Dignitate[m] qui-
 dē actionis, pri-
 mam esse secun-
 dam autem se-
 curitatem.

due coniectas. Reliqui autem, quantum situ ad infimo discedunt, tantum & magnitudine distant. Veruntamen quum spinalis medulla transiens per primas uerthebras, longè corpulentior exsistat, quàm ubi ulterius progreditur: consono fuit rationi, eorum spondylorū latitudinem esse omnium maximam. Quod si laxes etiam debebant esse, ut omnibus alijs incumbere, perspicuum est, quod eas tenues etiam esse par erat. In hoc tamen uerebatur natura summè admiranda,

Verthebrarum prima: si cur la- tendo sit omni- um maxima.

Spinalem me- dullā distribui in nervos quin- quaginta octo.

quod tantā à cerebro produxerit spinalem medullam, quanta maximè partibus omnibus infernis suffectura esset. Siquidem quū in nervos octo & quinquaginta spinalis medulla diuidenda esset, tantam ex cerebro produxit, ut distribu- tionem in nervos plane esset æqualis, neq; in ipsa quicquam deficeret, nec redundaret. Cæterum loca unde emergūt, adeo omni ex parte sunt tu- ta, ut neq; lædantur quicquā, nec in tot, ac eius- modi spinæ moribus, afficiantur. Moles uerò cuiusquam est tanta, quantam pars recipiens po- stulat. At uia omnis quæ est inter primam produ- ctionem, & infertionem ipsius, mirabiliter ad cuiusque securitatem est comparata. Quum igitur spinalis medulla ueluti alterum quoddam ce- rebrum, partibus sub capite sitis futura esset: & spina ipsi uia simul indiueribilis, necnon firmū præsidium, destinaretur: ob eam causam tum ala multa in spondyliis est machinata, tum quam

Alasque

duas, hoc est, spinam uocant, ex medijs postre- misq; eorum produxit partibus, quæ esset ueluti uallum quoddam ante spinam totam opposi- tum. Quantū autē os ipsum, quod hic spinā uoca- mus, uersus posteriores partes extenditur, tan- tum illi, tegumenti gratia, cartilaginis circunditur. Huic autem rursus cartilaginis ligamenta neruosa, crassa, lata, fortia, & medicoriter dura natura indidit, seruata simul, ac totam spinam colligatura. Productionum autem spinæ, quæ quidem situm supra habent, deorsum: quæ infra, sursum spectant, ut ipsarum figuræ forni- ces aut testudines referant: quarum forma figu- rarum omnium ad parandam est difficillima.

Spondylus me- dulle in tota spi- na, cur produ- ctiones postre- mæ in neutra inclinæ parti.

Non debet autem esse mirum, si soli spondylo qui in medio est spinæ, productio posterior, quæ acantham efficit, in neutra partem inclinet: hoc est, neq; in collum, neq; in lumbos, sed omnino sit recta: quandoquidem non potuisset natura similem fornicem toti spinam constituere, nisi produ- ctiones omnes tam infernas, quàm super- nas, in terminum quendam cōmunem rectum, ac nusquam inclinantē iunxisset, qui ueluti for- nicis summas quedam esset futurus. Iam uerò quum in thorace cor esset locatum, magna ar- teria spinæ incumbere, natura longissimas fecit illic productiones, quæ spinam constitu- unt: in alijs autem partibus omnibus, quæ breuissimæ mas. Quæmadmodum uerò productionē cuius- que spondyli parte posteriore, quæ spinam efficit, propugnaculi usum ostendebamus præitare: ita & alijs productiones transuersas spondyliis sunt duæ, quæ simul quidem lateralibus ipsorum par- tibus simile præbent præsidium, simul etiam ueluti sedes quedam sunt, musculis spinæ internis atq; externis subditæ. Prædictarum autem pro-

ductionū fines, quemadmodum & acanthæ totius, sunt ad mediam spinam conuersi. Cur au- tem crassæ sunt productiones laterales spondy- lorum thoracis, tenues autem in spondyliis lum- bi & magni ossis, in colli uerò spondyliis crassæ & bifidæ? An quod in thorace quidem, quum costæ non solum eis essent articulatæ, uerum etiam per totum incumbere, consentaneum fuit, firmas atque stabiles facere productiones? Lumbi autē & ossis magni productionibus, quæ uasā solum ac musculi incumbere, nihil erat ro- bore opus? Quæ uerò sunt in collo, merissimè extiterunt bifidæ & crassæ, ut quod securitatis, propter acantharum breuitatem eius spondyliis deerat, id ex transuersis compensaretur? Porro spondyli omnes, præter duos primos, partibus quidem anterioribus tuto inter se colligati, pos- teriori uerò articulat, firmitudinem simul sunt atq; ad motum facilitatem indepti. Atq; ob eam causam anteriorum quidem plurimū flecti pos- sumus, retrorsum uerò non item: quemadmo- dum certè expediebat ad omnes humanas actio- nes. Siquidem facili rumpere tur multa & præ- stantia uasā, si extensa plurimū ac retracts, dum spinam totam retorqueremus, essent.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium lib. XIII.

Quum autem spondylorum locus posterior, in tres diuidatur partes: primam, quæ ex- celsè posterior est, quo loco sunt spinæ duæ, quæ utraque huius parte sunt, quas productionum transuersarum radices terminant, merito ex utroque harum duarum posteriori loco, in- ter se articulatæ ipsi spondyli: quandoquidem aliunde id fieri nec licebat, nec erat expediens. Cæterum quum ipsorum spondylorum quicquid, parte superna, & inferna, ipsi qui utrinque & regio- ne sunt, cōmittitur, merito duæ quidem accliu- es, rotundæ autem decliuēs productiones eis extiterunt: hæc siquidem omnibus sunt cōmu- nes. Ex abundanti autem, ueluti cumulus, ma- gnis spondyliis aliæ duæ decliuēs insunt. Quum enim ex decliuis productionibus, accliuibus inuectis, spondylii articulantur, ad securita- tem maiorem naturā alteram decliuem totam articulationi subiecit, ligamentumq; ualidum ex ipsius sine productum, sub accliuem totam sub- misit. Verum si prædictis tribus productionibus: quarum una est omnium maxima, quæ spi- nam constituit, ac duæ transuersæ: duas quidem accliuēs, quatuor autem decliuēs adiunxeris, non uem omnino ipsas reperies, quot sanè & qua- les in lumbi spondyliis cernuntur: quemadmo- dum in collo undecim, præter mediā illam quæ antrorsum consistit. Porro dorso spondyliis sin- gulis, productiones septem extiterunt, tametsi non omnes formā habent similem, quod spon- dylorum eius, nouem superni, productionem superiorem habent maximam, transuersas uerò crassissimas, rum accliuēs ac decliuēs, crassas simul ac largas. Decimus autem qui hos seque- tur, cætera quidem est similis, non tamen produ- ctionem posteriorem, ut illi, habet longam, de- cliuem

Spondylii qui parte anteriori- bus sunt.

Productiones spondylorum quæ habent tan-

Lumbi spondy- lorum produ- ctiones maxime.

Colli spondylo- rum production- um radices.

Dorso spondylii singulis septem productiones in- esse.

Productiones spondylorum transuersæ.

clivum & tenuem: neq; etiam ipsas quatuor, per quas cum alijs utringq; spondylis articulatur, habet similes: sed superne quidem dicit, prælocato rum novem spondylorum productionibus acclivibus: reliquæ uerò duæ declivæ, reliquæ sunt declivibus similes. Huic enim soli spondylorum omnium id est eximium, quod utraque articulatione propinquo sibi spondylo utrique ineluitur. Reliquis uerò omnibus qui sub hoc decimo sunt locati, id inest, quod acclivæ quidē productiones sint causæ, declivæ uerò conuexæ. Ob id conuexis quidem, subiectis spondylis inuehantur: acclivibus autem, superiores excipiunt. Qui uerò supra hunc in dorso sunt & collo, hi omnes recipiunt simul, ac declivibus productionibus ambigunt acclivæ, quæ sensim fiunt conuexæ. Postremi autem duo dorsi spondyli, productiones duas reliquas declivæ ex partib; infernis ad turandos articulos summifas, atq; ab alijs seuñctas habent: qui soli spondylorū omnium obliquas utringq; productiones, quas appellauimus transuerfas, non possident: pro quibus declivæ illas habuerunt. Per decimum igitur illi dorsi spondyli, qui immotus in medio manet, natura totū spinā in partes omnino quales diuisit, mole spondylorum æstimata, nō numero. At uerò superioribus ipso medio spondylis fecit productiones natura, cōuexas quidem acclivæ, causas uerò sensim declivæ: in inferioribus autem contrā, causas quidem effecit acclivæ, conuexas autem declivæ. Quæ structura tum ad flectendam spinam, tum ad erigendam requirebatur. Est autem utriusq; figuræ terminus, ut quā flectimur, spondyli, quā possunt longissimæ, à seinuicem digrediantur, perinde ac si spinā tum longior esse deberet. Quum uerò erigimur, contrā, ut cuncti cōeant, ad medium spondylorum accedentes, ac si spinam ex pediat esse breuiorem. Quodd autem cavitates quæ circū osium inter se dearticulorū conuexitates utroq; uertunt, sint ad motus obliquos aptissimæ: quodq; motus ex duobus obliquis, parum à motu medio partem utroq; simul circū agentibus constitutus, necessariō unus rectus fiat: necnon quod in spinā satius fuerit, ex obliquis rectos efficeret motus, ex dictis facile constat. Porro primus colli spondylus posteriorem productionem non habet, quod recti musculi & breues, qui caput totum erigunt, omnem ipsius regionem occupent. Cui soli primo spondylo non insunt obliqua foramina, per quæ nerui à spinali medulla excidunt, & qualia omnibus alijs colli spondyli natura insculpsit, qua parte inter se coniunguntur, sic ut ex ambobus unum foramen insit semicirculi, neruo aptum, oriatur: ita enim non modō foramiū a ipsa, sed nerui etiam, qui per ea emergunt, sub productionum accliuum ac decliuum radicibus (ubi primū ipsorū spondylorū latera desinūt) sita, adeo communiunt undiq; ut alibi melius ea minime collocari poterint. In lumbis autem, si alteram productionū decliuum accuratus consideres, non ad ligamenti firmandi duntaxat usum reperiēs uniem, sed multo etiam magis, primæ nerui productionis gratia compararam. Si quidem

exporrecta post neruū, murus reuera efficitur, & propugnaculum aduersus ea quæ illi quoquo modo incident. Hanc igitur productionem in lumbi spondylis uideas magnam (quod ipsi maximi sint) & duobus postremis thoracis similem. In alijs uerò spondylis decem, eandem utilitatem neruis præstant productiones laterales, quibus costarum ossa inuehantur, atq; inarticulantur. Reliqui etiam, præter primū, colli spondyli, neruorū productiones ab utriusq; spondyli finibus laterales prominentes, habet à transuerfis productionibus (quas basidas esse diximus) tectas atq; stipatas. Etenim in lumbi spondylis, apertè neruus lateribus partium infernarum inuehitur. In spondylis autem dorsi, inuehitur etiam hic quidem finis superius spondyli euidenter, sic tamen ut infernum attingere spondylum uideatur. In colli uerò spondylis, quod omnīu minimi essent, uterq; spondylus x qualē portionem ad uitam nerui constat. Quum autem spondyli singuli, primum constructionis scopum haberēt duplicem, sedem scilicet tutam spinæ rotas, atq; etiam motum, aliorum quidē omnium qui sunt sub collo spondylorum usus in securitate est maior: superiorum uerò, in motione. At quia nec inferni spondyli, alijs alijs incumbere tutō poterant sine lara basi, ac forti ligamento: nec superius moueri facile, sine longo processu, aut ligamento laxiori, utrique spinæ parti natura congruente structura consuluit, prælongas quidē infernæ, causas uerò superne colli uertebras faciens, nō modō ad motū facilem, sed ad tutum etiam obeundum: alias aut omnes in planum, squem, atq; undiq; æqualem, solidumq; circulum, terminans. Quæ ubi primus spondylus crassissimus est, ibi ipsum prope supernas articulationes foraminibus pertudit tenuissimis, quibus omnibus rebus ponuit, patiendi difficultatem tum ipsi spondylo, tum neruo producendo comparat. Cui spondylo crassities illa ob tutam perforationem fuit comparata, & ut parte quidem inferna, secundi spondyli conuexitates, superna uerò, capitis emanentia excideret. Quæ enim ipsius spondyli partes maximè erant laboratoris, has præter cæteras, satius fuit fortes efficeret. Vtrunq; autem excidentium neruorū, in musculos ipsi primo spondylo incumbētes, natura distribuit. Verū quā prima coniugatio sit tenuis, ob idq; ipsa porio capiti distribui nequeat, ex secunda coniugatione natura id effecit. Nam per supernos musculos neruus uterq; perlabitur, qui obliquus quidem primō in partem posteriorem ac superioriorem tendit: obliquus autem rursus post hæc, prorsum ac sursum progressus, in caput totum demum dispergitur. Quod autem ex secunda ipsa coniugatione infra superaret, in propinquo omnes musculos est distributum, à quibus primorum spondylorum motus, tum inter se, tum cum capite fiunt. Cæterum egreditur secunda hæc coniugatio, ab utraq; ipsius acanthæ parte, ex regione inter primū & secundum spondyli media. Tertia uerò neruorum, qui à spinali medulla oriunt, coniugatio, ex cōmuni foramine secundi & tertij spondyli emergit, muscularisq;

Colli utrunque spondyli, æqualē portionem ad uitam nerui conferre.

Natura insculpsit circa forandas uertebras.

Prima coniugatio neruorum à spinali medulla oritur.

Secunda.

Tertia.

Spinam totam esse diuisam in partes omnino æquales, per de cimus spondyli. Vertebras superiores decima, habere acclivæ quidem productiones, conuexas: declivæ autem, concavas: inferiores autē decima, circū.

Colli spondyli primam posteriorem productionem non habere, foraminibus obliquis.

genas mouentibus, & illis qui collū totum cum capite retrō erigant, distribuitur. Pars uerō ipsius quę profundum fertur, secundæ & quartę coniugationi miscetur. Nam tertiā & quartā coniugatio, nervos communibus collis & capitis musculis suppeditat, ac præterea musculis genas mouentibus, quemadmodum certē & paribus omnibus quę sunt post aures. Quinta coniugatio productionem habet, quā quartus spondylus cum quinto coniungit. Distribuitur autem quemadmodum & prædictæ. Pars tamen ipsius quedam retrō per profundum fertur in communes collis & capitis musculos: alia uerō pars antrosum in musculos genas mouentes, & caput inclinautes: sicuti alia & tertiā, in medio prædictarū partium, sursum, uersus scapule summam, fertur. Iuxta radicē autem ueruorū, pars eius utriusque uicinarum coniugationum, sextæ uidelicet & quartę, miscetur: & qui nervus à quarta ad ipsam descendit tenuis, is manifestō cernitur parti eius misceri, quā maximam portionem ex eius loci spondyli, nervus diaphragmatis colligit, utriusque unus, qui sub membranas thoracis septem fertur. Sextæ post hanc coniugationis, sub quinto spondylo exidentis, mistio fit magna cum propinquis utriusque, sed plurima eius pars ad sima scapularum extenditur. Auger autem quodammodo partibus anterioribus & diaphragmatis neruum, quemadmodum & alijs omnibus eius loci spondyli propaggines quasdam exiguas mittit. Septimę coniugationis, quę ex communi sexti & septimi spondyli oritur foramine, magna fit permissio cum proximis. Ea tamen partem sui maximam extendit ad brachium: quemadmodum certē & ab octaua coniugatione, quę post septimū spondylum oritur, maxima pars in uenam peruenit. Sic à nona coniugatione, quę post octauū spondylum præcedenti miscetur, pars non exigua ad manus extremas peruenit: qui nervi circa primum intercostale spatium minimum locum occupant, quod primę etiam costę sint minimę. Ob idque post septimum spondylum natura cepit thoracem effingere, quod ea coniugatione, quę est post octauum spondylum, ad utraq; uti poterat, ad primum solum inter costas spatium & manum. Ad diaphragma etiam mirabiliter admodum neruosa ex spinali medulla collis, & ad musculos intercostales ex singulis propinquis spondyli, deduxit. Est autem septi transversę si gura rotunda, situs uerō obliquus, partibusque anterioribus ac superioribus ad pectus pertinet: inde retrō semper ad dorsum fertur, donec spinam contingat, cui adhærescit ad lumbum. Caput autem eius, ad quod annectuntur fibrę, & in quod ipsi nervi descendunt, in medio eius consistit. Quam obrem diaphragma solum, earum partium quę sunt sub clauibus, neruos ab spinali medulla collis recipit, membranis thoracem dissepcentibus, stabilitos: aliarum uerō inferiorum nulla. Melius quidem fuit spinalem medullam thoracis, neruorum propaggines ex propinquo omnibus quę illic sunt, suggerere. Ob eamque causam à nervis qui singulis insunt spatij intercostalibus, portio nō exigua per mu-

sculos ad externa excidit.* Iuxta radices autem costarum, in instrumenta quę sunt ad spinam, dispergitur. Post uerō, prope conuexa maximē singularum costarum, in corpora thoracis circumfusa, ueluti & prope pectus, paribus quę illic sunt, disseminantur. Homini igitur, ac similibus, collum ex septem spondyli iurē est compactū: quum eiusmodi magnitudo laryngi, primo instrumento uocis, conueniat, ex eoq; partes omnes, quę à spinali medulla collis præstiterat neruos recipere, recipiat quod satis est. Quum autē nec respiratio, nec uox possit sine thorace fieri, cuius præsidio indigent cor ipsum atq; pulmones, in illius certē structura hos quatuor scopos sibi natura proposuit, uocem scilicet, respirationem, ac tum cordis, tum pulmonis magnitudinem. Sequitur quippe ut arteriam asperam generatio pulmonis, sic magnitudinem huius, magnitudo thoracis. Quin & cor positionē & magnitudinem in thorace sibi congruentē sortitur. Nec minus thorax, qui quidem ex duodecim uertebis constat: quę uerō has denecpę quęuntur quinq; spinę uertebę, eadem ratione sunt factę, quā illę quę sunt in collo. Nam quili nervi qui à spinali medulla proficiuntur, in spinales atq; lypocondrii musculos diuidantur, primas quidem productiones oportuit ad eas partes mitti: post autem, & ad crura: ac tum os sacrum oriri, quod simul quidem ueluti fundamentum quoddam spine futurum esset, simul autem ossa coxendicum atq; ilium incumbientia sibi, excepturum: sine quibus nec pubis ossa constare poterant, crurib; ad inclusionē dearticulano omnino non fuisset. Horum enim primorum gratia, tum autem uteri, uelut, atq; intestini recti os latum, siue sacrum molta est natura. Per cuius quidem foramen primum qui nervus excidit, is qui ad crura feruntur, miscetur. Proinde coniugationes quę sunt sub diaphragmate, neruorum à spinali medulla proficiuntū, qui ad musculos prædictos & crura feruntur, quinque quidem spondyli egerūt: sexta uerō quę eas excipit coniugatio, primis ossis magni foraminibus. Sunt autem & alix tres in eo coniugatione, quę in partes superiores distribuunt. Constat itaq; collum meritō ex septem spondyli compingi, thoracē ex duodecim, lumbum ex quinq;. Porro os sacrum cum ultimo articulatū lumbi spondylo, ad finem cartilaginis habet quandam epiphysem, ut multo difficilior patiatur. At uerō ualidum ligamentum anteriores omnium spondylorū partes ualidissimē colligans, desinit posteriore quidem parte in tunicam meningas spinales medullę ambientem: anteriore uerō, paulum progressum, utraq; sui parte inseritur in cartilaginem, quę spondyli iungit. Ceterum spondyli omnes ab ea connexione, quam parte anteriore habent, retrō progressi, paulatim à se diducunt, locum omnem medium referunt habentes humiditate crassa & uiscosa, quę ad motionis facilitatem conducit. Meninges autem uestientes spinalem medullam, cerebri inuolucra similitudinem referunt, nisi quod crassa medullę spinalis meninx, undique tenuem tangit & cōprehendit. Sunt enim cōmunia spinali medul-

Collum ex septem spondyli constituta.
Larynx primū instrumentū est uocis.
Thoracem esse necessarium uti atq; respirationi.
Scopi quos proposuit sibi natura thoracem facere.
Tubercula ex duodecim uertebis constat.

Ossa sacri ipsi.

Pubis ossa.

Lumbi ex quinq; quę spondyli cōstantur.

Vertebæ cum ligamentis.

Humiditas per tubercula.

Costa prima sunt maxime.

Septi transversę figura, et situs.

spinalis medulla
le que sunt con
mista cum ce
rebro, quæ o
mnia vterq; pro
pria.

Cerebrum pul
sare.

Spinalis med
ullam non pul
sare.

Spinalis medulla
le versus cran
cium.

Spina infirma
rejo, quæ non
resistit.

Spondylii sui
gula emittit
virescentes
opalam.

Scapulari vfu

Thorax respira
tionis organum.
Cui vna pro
cipua.

Capitulum,

Claviculæ
vfu.

medullæ cum cerebro, quod corporis substantia sit illi hæc similis, & nervorum etiam principium existat. Propria autem, quæ cerebrum pulset ac moveatur, quamquam ossis immobili delitescens, ipsa tamen non moveatur, tamen si a mobilibus vertebrae continetur. Non ab re igitur dux meninges ipsas similiter fuerunt datæ: altera quidem ad usum quæ ipsis infunditur, suscipienda, totamque eorum substantiam, quæ mollis est admodum, constringendam: altera vero quæ tegat, & aduersus ossa circumfusa muniat. Ossia etiam ipsa extrinsecus sunt attributa, veluti propugnaculū atque murus, contra iniurias extrinsecas. Priuatim vero utriusque, quod cerebrum quidem pullabatur, crassa meninx tantum ab eo discessit, quoad ipsi, dum dilataretur, suscipiendo esset satis. Quod vero spinalis medulla non pulsaret, crassa meninx cum tenui undique se conuenit. Quod etiam capitis ossibus conspicuus nullus motus inest, ipsalis autem medullæ ossibus vehemens, cerebro quidem nullum extra crassam meningem aliud opus inventum fuit circumdatum: ipsalis autem medullæ, tertia illa fortis atque nervosa tunica: cui etiam viscidus ille humor est circumfusus, ne assidue motu excitteretur. Singulis autem spinæ partibus ab adiacentibus vasibus, per foramina quæ nervos ipsos deducunt, propagines natura suppeditavit, unam singulis spondyliis coniugationem tantæ magnitudinis, ut in corpora omnia spondylo circumiacentia, diuidi planè queat. Sed quoniam coniugatio nervorum una ex singulis spondyliis nascēbatur, planum est, quod ipsum numerus, venarum & arteriarum numerus aequalis erat futurus. Ceterum parvis quidem spondyliis prædicta duo foramina satis esse possunt, per quæ intro quidem venæ & arteriæ, foras vero nervi rantur. Magnis autem, non hæc modò, utrumque etiam quæ vasibus nutritiis servient, natura decenter est machinata. At vero scapulas ipsas, primo quidem propter humeri articulationem, deinde autem ex abundantia, propter partium thoracis, quæ illic sunt, custodiam, excogitavit natura. Thorax siquidem respirationis est instrumentum, non minus quam pulmo: cor autem vitæ principium. Quia igitur thoracis partibus posterioribus non aderant nobis oculi, quibus præsens videre nocitura liceret: ne omnino negligenter, natura regionem illam ulla quodam spondylorum, atque productionum spinæ, muniuit, quibus sursum porrectis, primum quidem scapulas utriusque applicuit, dein carnis copiam apposuit. Ad hæc leviter superiorem spinæ finem adaugens, rectum illum attollens, atque ibi clavi coniungens, *capitulum*, quod vocant, effecit, tum humeri articulationi, tum brachij, capiti, atque adeo scapulae ipsi præsidium & firmamentum futurum. Quod si inter os pectoris & spinæ finem, non fuisset scapulae est, connexa clavis non fuisset, nihil utique prohiberet, quo minus os latum scapularum, nusquam stabilum, thoraci incideret, coarctaretque ibi humeri articulum, multo sty motus brachij impediret. Non temerè autem natura in homine quidem, humeri articulum longissimè à thorace ab

duxit: in quadrupedibus vero, proximè collocauit: quod in illo quidem manus ad varios usus servientes, spatiosum locum desiderent: in brutis autem nequaquam, quod in eis anteriores artus tantum ambulationi subserviant. Merito itaque homo, ne si vellet quidem ambulare quatuor artibus queat, quod in ipso scapularum articulo longè sint à thorace abduci. Merito etiam simia, ut in cæteris est hominis imitatio ridicula, ita & in artibus. Ceterum quemadmodum simia, quod animam habet ridiculam, corpus ob id habuit ridiculum: ita homo, quod animam rationalem haberet, ob id etiam corpus solum inter ea quæ sunt super terram, habuit diuinum. Porro iuxta iugulum ipsum est clavis, connexa quidem foris, intus vero causa: quod uidelicet locum ipsi instrumentis præbeat, quæ per illas partes ferantur. Vbi vero à iugulo caput discedere, tantum paululum antrosum redit, usque ad humeri summitatem, quantum finis particulae ipsius clavis intumescens, retrò cecesserat. Colligat autem ibi ipsam spinæ, os paruum & carnaginosum scapulae. Quum autem manus tota ad multos ac varios motus comparata esset, caput quidem brachij rotundum habere ipsam oportuit, cavitate vero ei subditam, nec magno pere profundam, nec in magna supercilia finientem. Quia quidem structura ad varias motiones apta, quum constet humeri articulus, parum abest quin assidue brachij caput luxet, quippe quod cavitate adeo exigua uehat, ut pars ipsius magna extra sit, nulloque innixa sublimis pendeat. Cui discrimini occurrentes natura, tria ligamenta valida, os brachij cum scapulae ceruice iungentia, præter commune omnium articulorum, rotundum est machinata: duos præterea scapulae processus recurvos, qui articulo muniunt, atque ex utraque horum parte, musculos ipsum maximum consistentes. Quorum trium ligamentorum duo quidem priores sunt rotunda, tertium vero leviter latum. Enascitur autem, primum quidem ex fine apophyseos, quæ anchoram refert, internisq; brachij attenditur partibus. Alterum vero, quod hoc est maius, ex ceruice scapulae, quæ parte supercilium cavitaris illius est altissimum: atque hinc caput brachij sedem præbet firmissimam, sua lata fissura. Reliquum denique & tertium, ex eodem loco, quo secundum, oritur: obliquum autem sub eo inferitur & ipsum in primum capitis brachij initium, quo modo latum ligamentum, quod in orbem articulum rotundum complectitur. Quæ ligamenta duo, ad musculum brachio incumbens perueniunt, quem roborant. Munire humeri articulus, à scapulae etiam processibus superioribus, nempe ab illo qui est ad summitatem humeri (quæ corniformem appellant) & ab externo, qui anchoræ est similis: necnon à maximis musculis tendonibusque, qui totam movent articulationem, constringitur undique: quorum musculorum fines ossi brachij infiguntur. Ceterum ad pectus brachium adducit, leviterque trahit deorsum, is musculus qui iuxta mammam oritur, magnitudine mediocris. Alius autem ceteris, ex auditis enatus pectoris partibus, adductionis sursum est

Humeri articulus cur in homine quamlongè sine à thorace abduci.

Simia est hominis imitatio ridicula. Simia, quod animam habet ridiculam, corpus fortiter est ridiculum.

Hominis solis inter animalia torrefacti, cur diuini corpori tribuunt.

Clavicula collis gatio.

Humeri articulationi cor luctationis alvearia.

Humeri ligamentum tria.

Scapulae processus recurvi.

Brachij motus à quibus oritur musculus.

autor. Tertius præter hos geminus, aut ex duobus coalescens, à toto pectoris offe exortus, æquabiliter ad illud totum brachiū adducit, si uterq; tendat. Nam altero solidum agente, ut deorsum, aut sursum, modicæ motus brachij inclinabit. Porro musculus ille, qui à sublimi pectoris parte iuxta clauas oritur, duo habet capita, inter nia quidem partibus epomidi insertus, externis autem adhærens infemum scapulæ partibus. Ac solius musculi huius tensi actio, brachiū extrorsum extendit: alterius uero, qui ad clauæ peruenit, uersus interiora conuertit. Tensio autem æque fortiter ambobus capitibus, brachium rectam planè ac mediam extensionem assumit. At quæ alij etiam duo musculi, utraq; sping, quæ est ad scapulam, parte, si similem prædicto habent actionem. Octauus uero alius ultra prædictos est musculus, qui ortus à maxima parte inferioris, qui in scapula est, lateris, brachium extrorsum abducit, is qui sunt ad pectus, oppositus, qui brachiū sursum attollunt. Dux sunt post hanc musculorū motiones, brachium extrorsum ac deorsum circumagentes: uerū amplius quidem extra abducit musculus, qui ab inferiori ora lateris, quod in scapula est, proficiscitur. Nam qui scapulæ partem summam complectitur, minus qui dem extra, sed deorsum magis brachium circumagat. Reliquus uero alius unus est musculus, qui deprimat, ipsūq; retrō agit: cui prædictus musculus paruus succedit, qui efficit ne brachiū dum deprimatur, ullam in partem inclinet. Contra autem fuit hoc natura, rametis omniū minime, propter naturalem manus ad inferiora impetum. At qui musculi brachium attollunt, actione indigent uehementiori, ob idq; tum ipsi, tum qui brachia circumagunt (est enim hic motus uolentissimus omnium) in omnibus articulis robustissimi sunt, ac tendones maxime neruofos sortiuntur. Verū scapulam deorsum trahit musculus, ex inferiori quidem thoracis spondylo enatus, inferioribus autem partibus scapulæ insertus. Trahit autem eam sursum musculus latus ac magnus, qui à spina enatus, sursum ad os occipitis peruenit. Trahit etiam sursum & musculus tenuis, qui ab ipsius capitis ossibus ortus, ipsi ad spinæ basim inseritur. Retrō autem alij duo musculi abducunt ad totam animalis spinam: quorū edior ipsam inflectit sursum, ad colli spondylos: reliquus autem abducit ad spondylos dorfi. Tensio uero ambobus simul secundū proprii situs rectitudinem, fertur ad dorsum. Quum autem tensus est ille musculus, qui ex laterali primi spondyli apophysi exoritur, scapulæq; finibus, qui sunt ad summam partem humeri, inseritur, maxime quidem ipsum humerum trahit: cum eo autem & scapulam totam, ad partes colli laterales, ut ad anteriores musculus tenuis, qui à laddoide oritur, conuertit. Quinetia ex musculis qui à pectore ad eam sursum feruntur, qui est edior, non solidum mihi uidetur caput brachij trahere, sed etiam scapulam, ut qui ligamento articulationem totam continet inseratur.

GALENI PERGAMENTI de vfu partium lib. XIII.

Quum ipsarum animalis partium, nonnullarum quidem ad uiuendum sint necessariz, ut cerebrum, cor, & hepar: aliz ad uiuendum commodius, ut oculi, nares, & manus: atq; aliz deniq; ad instaurationē generis, ut pudenda, testes, atq; matricēs: de his quidem ultimis hoc libro agendum est, quandoquidem superiores illas iam explicimus. Ergo natura, si fieri potuisset, maxime optasset suum opificium esse immortale. Quod quum per materiam minimè illi liceret, subsidium quod potuit ipsi ad immortalitatem esse fabricata, sapientis cuiusdam urbis conditoris exemplo. Quianquam nulla ciuitas comperitur adeo floruisse, ut non ipsa excedens uetustas, memoriam conditoris deleuerit. Naturæ uero opificium iam multis annorum millibus constitit, atq; statit perpetuū. Nam mirabilem quandam rationē inuenit, qua in demortui animalis locum, nouum aliud sufficiat. Omnibus si quidem animalibus natura concipiendi instrumenta congruentia tribuit: ipsiq; instrumentis eximiam quandam uim uoluptatis efficitricem: antitæ uero ipsis usuz, incredibilem utendi cupiditatem cōmixit: qua animalia incitata, stimularaq; etiā si rationis expertia, uetateq; tenera sint, prouident tamen non secus, ac si prudentissima essent, ut genus suum sit superstes. Porro in facmine sexu matricēs uentri subiecit, qui locus est tum ad usum ueneriorū, tum ad recipiendum spermā, nec non ad incrementū fetus, & perfectū enixum, opportunissimus. Et tenim collum matricis, in pendendum muliebre definit: quod quum animal concepit, adeo ad unguem clauditur, ut ne minimum quidem aut intus foras laxet, aut foris intro recipiat. In coltu autem eousq; parat ac tenditur, ut semen per laram uiam progrediens, facile in matricis sinu perueniat. Plurimum etiam & in partu distenditur, sic ut totum embryonem facile ea uia expellatur. Quare meritō à natura factum est neruofum simul ac mediocriter durū, ut citra noxam plurimum contrahatur & dilatetur, dirigaturq; ad excipiendum semen. Nam si præ molliē in seipsum concidens, plexus quosdam efficeret, ab his semen prohiberetur, quo minus ad sinus matricis perueniret celeriter, ac si humor spiritusq; à se muruo separarentur, quos tamen coire est necesse, hunc quidem ut motus principij, illum autem ut materiam ad fertum generatorem appofitam. Ceterum sanguis menstruus neutiquam prima est materia, atq; gignendi animalis propria: sed quum feminis humiditas à calore infuso ducta, tunicis matricum incidit, non secus ac pinguitudo facile agglutinatur. Atq; inde uno temporis momento multa fiunt, eaq; admirabilia nature, circa animalis generationis principij, opera. Nam matrix ipsa quā celerimē undique semini adhæret: collum autem totum conuiuet, & eius maxime orificium internum. Qui igitur humor matricis asperitates illinit, toti superficies internæ salustifus, membrana tenuis efficitur. Interea autem spiri-

Particularum
tra genera.

Natura opificiū
perpetuum.

Concipiendi in
strumenta.

Generandi in
pitiæ ueneris
animalibus in
fita.

Matricem suam
opportunitissimam.

Matricis collū.

Matricis collum
cur neruofum,
ac mediocriter
durum.

Spiritus esse
motus principium
in ipso genera-
tione.

Sanguis men-
struus non est pri-
ma materia, ge-
nandique ani-
malis propria.

Generatio
oris.

tus

Brachium attol-
lens & circum-
agens muscu-
lus esse robustis-
simus omnium.

Scapulæ motus
ad quibus pro-
ficiantur mus-
culi.

tus undiq; ad unguem retentus, non elabitur, sed motus naturales pñius orditur. At uerò quo tempore nec semen intrò, nec factus extrà fertur, matricis collum in flexus & contorfio- nes concidit: quæ ne matricis regio perfrigeretur, plurimum habent momenti.

Purpure, aut quibus mensis fluxus, cur facile refrigerantur.

Matricis plures sinus numerosos partes adueniunt.

Matricis sinus esse homini duplicem.

Constitutionis faciliat qui bene natura con- cessit.

Matricis receptaculum non merum mamillarum esse numero aequalem.

Lac quo tempo- re accidat.

Lac cur gene- ri natura.

Amor in pro- creata.

Utrius duo, ut matricis duo, mulieribus in sunt.

Absterge quan- do accidat.

Mares in do- utro, summas in sinistris ma- trices partibus, maiori ex par- te locati.

Matricis manus.

Mammarum mu- nus.

Femina ma- re imperfectior, quia frigidi- or.

Calidus esse ma- ri altum fri- gida.

Nec enim alia ratione in mensibus purgationibus partibusq; mulieres refrigerantur, quàm quòd tunc matricis collum sit rectum, referanturq;. Porro in animalibus numerosos factus gestantibus, natura fecit sinus matricis plures: in homine uerò, ac eiusmodi, quemadmodum corpus totū est geminum, ita & matricis sinus est duplex, alter qui dem in dextris, alter uerò in sinistris locatus. * Si quidem quæ ob corporis imbecillitatem, brevioris uitæ futura erant, aut etiā præda fortioribus, ijs animalibus omnibus assiduū interitus re- medium excogitauit natura, facundam scilicet generationem: semper receptaculorū matricis numerum, æqualem numero mamillarum præscribens. Mammis autem lac tunc accedit, quo tempore iam absolutus est factus. Nam quum tenera adhuc sint atq; imbecilla recens nata animalia, nec possint solidos obos conficere, alimentū ob id natura eis comparauit, perinde ac si utero adhuc gestarentur. Quibus uerò anima libus propter corporis siccitatem superfluis lu- mor subnutriri non poterat, ut uolucibus omni- bus, ijs natura præcipuum quandam amorē in ea quæ procreant, ingenerauit: quo impulsu, bellū pro pallsi cum ferocibus animalibus, quæ antea declinabant, suscipiunt in tripidē, ut- etumq; illis conuenientem superdiderat. Vt igitur matricis duæ mulieribus in unum collum desinentes sunt factæ, ita & ubera duo, utrunq; suæ matrici, instar ministri boni, subseruiens. Vn- de Hippocrates ait: Si mulieri geminos gerenti, mammarū altera gracilescat, ijs dextra quidem, masculi: sin sinistra, feminæ abortum faciet. Si- quidē mares in dextris, feminæ in sinistris maio- ri ex parte locantur. Etenim exiguæ, dum factus augentur, sunt mammarū, quo modo etiam matricis. Quum autem perfecti fuerint, & pa- riendi tempus inuenerit, simul cum matricibus, quod satis est intumescent. Matricis itaq; partes sunt, sperma recipere, atque factum absolue- re: mammarum uerò, quod iam natum est educa- re. Quòd si animalia attentius discueris, repe- rieris in ijs quidem quæ adhuc augentur, uescas matricibus multo maiores: in perfectis autem, 30 matricis uescis. Vesica namq; ad portionē om- nium aliarum partium augetur, ut quæ omni- bus ætatibus æqualiter seruiat: matrix uerò, nec dum augentur adhuc animalia, nec quum iam conuelescunt, ritē actionem suam potest obire. Siquidem alimento benigno abundantiq; facti- bus opus est, cuiusmodi in solis florentibus a- bundare potest: quum in declinantibus quidē, alimentum non ritē coquatur: in ijs autem quæ augentur, quamuis rectē concoctum sit, in nu- tritionem & auctiōem totum id adsumatur. Est autem femina mare imperfectior, una quidem & prima ratione, quia frigidiior. Siqui- dem in animalibus calidum est magis actiū fri- gido. Ceterū omnes quæ uiris insunt partes,

in mulieribus etiam reperias, eo discrepantes dumtaxat, quòd in mulieribus quidem ipse in- tus sunt conditæ, in uiris autem extrà pendentes, iuxta nuncupatum perinæum. Quòd si mulie- bres quidē partes eueras exteriorum, uiriles autē intrò reueras, repleasq;, inuenies omnes inter se similes: cuiusmodi & in talparum oculis sume- re licet exemplum. Hæ enim utrumq; & crystal- lum humorem, & præterea tunicas his circū- 10 datas, nō minus habent, quàm animalia quæ u- tuntur oculis. At nec eis aperti fuerunt oculi, nec foras prodierunt, sed imperfecti fuerunt re- lecti. Sunt enim animalia naturæ uarij. Alia qui- pe non longè recesserunt à plantis, suntq; ea ani- malium omnium imperfectissima, sensu unico tactus prædita: ut ostrorum plurima. His re- cesserūt amplius, quibus gustus inest. His ad huc amplius, quæ odoratus instrumentum sortiuntur. Quibus adhuc multò magis, quæ instrumen- 20 to audiendi sunt prædita. At perfecti proxima sunt, quibus præter litem odorem, adest uisus. Solis autem hominibus ratio inest, quæ diui- nus nihil mortali animali est concessum. Sicut igitur homo animal est perfectissimum omnium, sic tantò est femina imperfectior mare, quanto frigidiior. Genitalia autem eius, formata intus fuerunt, dum ipsa utero adhuc gestaret. Quum enim extare & foras propulsari præ calore im- becillitate non possent, ipsum quidem animal 30 quod cōformabatur, imperfectius eo, quod undiq; est absolutum, reddi derunt: quum imperfec- tionem ramen consequatū est utilitas nō asper- nanda, ad instaurandū humanum genus. Nam quum factus ipse materiam copiosam posset, tam ad primam sui constitutionem, quàm ad omne incrementum, ijs calidissima quidem ipsa formosa esset, utiq; discuteret talem materiam, nec sinneret coaceruari eam: quæ modo dum ijs im- penitē frigida, nec humorem quidem ipsum con- 40 querebat. Frigidiorem igitur eam eousq; fieri fa- tius fuit, quoad alimentum quod cōcoxisset & confecisset, discutere totum nō posset. Hæc ita- que est frigiditatis feminæ utilitas, quum mox sequutura erat partium imperfectio, quum ip- sæ præ caloris imbecillitate prorumpere foras non possent. Quod commodum ad instauran- dum genus, est secundum ac maximum. Nam si extrà prodixissent, scrotorum utiq; extriisset: quod quum intus iam delitescat, marium substantia est factum instrumentum femini recipiendo, 50 ac retinendo, facturi præterea alendo, ac perficien- do, aptissimi. Stram autem & testiculos femi- na erat habitura minores, imperfectioresq;: ac sperma in ipsa, rariū, rariū, quæ frigidiū, humi- diusq;. Sequuntur enim hæc quodq; necessariū ca- loris penuriam. Non igitur semen eiusmodi, gene- rando animalia satis esse poterat, licet in eam rem fuerit & ipsum utile. Mas uerò quandò est cali- dior, tantò ipsius testiculi extiterūt maiores. Se- 60 men autē quod in ipsis gignitur, quum sit sum- mē coctum, principium effectuum est anima- lis. Ex uno itaq; principio, ab opifice sapienter inuenito, iuxta quod femina mare fuit imper- fectior, nata sunt omnia, quæ ad animalis gene- rationem pertinent: tum quòd muliebres par-

Mulieribus par- tes pudide, uiri lib. esse similes, nisi quod sunt interior.

Talparum oculi uisus, imper- fecti.

Natura anima- lium varia.

Animalia omni- um imperfectis- sima.

Ratio inest soli homini, quæ di- uinus nihil a- nimali mortali est concessum.

Genitalia femi- nae sunt intus formata, quæ in uero præ- masticulato celo- ri foras propul- sari non possent.

Frigiditatis fe- minæ utilitas.

Testiculi femi- nae sunt minores & imperfectiores.

Testiculi femi- nae sunt minores & imperfectiores.

Testiculi femi- nae sunt minores & imperfectiores.

Testiculi femi- nae sunt minores & imperfectiores.

Testiculi femi- nae sunt minores & imperfectiores.

*Pudendum viri
le quale.*

*Semen virile
quale.*

*Semen quod im-
perfectum esse
dicitur, si femi-
nae quod perfec-
tum, masculinum.*

*Semen utrumque
necesse est ad
fecundationem
esse. Quia suborita
neque animalia ex
claudis incepta.*

*Animalia abhy-
peremotibus ma-
tris, non genera-
ntur.*

*Molam abhy-
peremotibus ma-
tris non possit
generare.*

*Semen masculi
esse motum prin-
cipium.*

Vena caua.

*Uter sinister de-
stra sinister.*

Vasa conuulsa.

*Spermatice va-
sa dextra, vena
a magna dorsi
vena et arte-
ria, raro aorta
ab omni gen-
tibus dextra.*

*Spermatice va-
sa sinistra, a fi-
nistris vena et
arteria.*

*Testiculum fini-
strum in viris,
et matricem fi-
nistrum in femi-
nis, recipere im-
purissimum san-
guinem.*

*Partes matricis
dextrae et sinistrae
calidiores fini-
strae.*

tes intus reconditae sint, quatenus dictum est: tum quod virile pudendum, extrā oblongum promineat, ad uenerem, atque ad semen excernendum aptissimum, quodque semen ipsum virile sit multum, & crassum & calidum. Quod quidem non alia quadam ratione ad maris, alia ad foeminae procreationem mouetur (sic enim principium animalis non esset simplex, si motus omnino repugnantes haberet) utrumque quod imperfectius quidem mouetur semen, sit femina: quod perfectius autem, masculus. Ipsam autem motum perfectum aut imperfectum, inaequalitati quae in calido & frigido est, iure tribueris, ad quod unum principium, particulares omnes reuocabas actiones. Iam ipsum foemineum semen gignere per se factum non potest, sed maris semen omni non flagitat, cum quo oportet miscetur, ita ut utrumque semen in unum motum conspiret. Nam tamen si gallinae circa gallinaceam operam, oua sub uentanea concipiant, ex illis tamen animalia excludere nequeunt: quandoquidem ut ea perficerentur, masculi caliditatem desiderabant. Sed neid quidem in gressibus animalibus inquam potest contingere. Solum namque si quod animalis est genus temperatura eousque sicum, ut humores frigidi redundant in foemineo semine quadantenus possint absorbere, id factum eiusmodi, qualia in gallinis sunt ea oua, sine mare potest elicere. At mulierem nequam uidit sine uiro uel molam, uel eiusmodi quippiam concepisse. Quamobrem sanius fuerit maris semen motus principium existimare. feminae uero, ad animalis generationem aliquid etiam ipsi conferre. Porro uena caua, quae primum adhuc ex hepate emergens, sublimis ad spinam deflectit, dextrum habet renem, ad dextram ipsi adiacentem: tum deinceps paulo infra ad lreum, sinistrum. Producitur autem ex ipsa uas uenulosum maximū in utrumque renem, sicuti & arteriosum, ex maxima arteria quae dorso incumbit. Quoniam uero genitalia organa his uasis subiacent, hinc iugū uenarū & arteriarū ad ea proficisci erat necesse. Quocirca uasorum quae ad ipsa feruntur, quae ad dextram quidem matricem atque ipsius testiculum progrediuntur, a magnis ipsis uasis, quae sunt ad spinam, proficiuntur, uena quidem a caua uena, arteria autem ab arteria magna: et si eorū a uasis quae in dextrum procedunt renem, oriāntur, ubi dexter reni sinistro propinquus fuerit. Quae uero ad sinistrum testiculum in masculis, aut ad matricem sinistram in foeminis tendunt (sunt autem haec etiam duo, arteria scilicet una, atque alia uena) non amplius a magnis uasis, sed ab eis quae in renes ferunt, emergunt. Ex quo intelligi potest, testiculum sinistrum in masculis, & matricem sinistram in foeminis, sanguinem impurum adhuc, excrementosum, humidum, ac serosum recipere. Quae ex re accidit, ut ipsa quoque recipientia instrumenta, temperamentum habeant diuersum. Quemadmodum enim sanguis purus excrementosus est calidior, ita & partes dexterae quae ex ipso nutriuntur, sinistres sunt calidiores: id quod principium etiam erat, uel ratione hac, quod secundū hepatis restructuram locarentur. Quod quidem si uerum

est, ac praeterea masculis esse calidior forma, probabile utique fuerit, partes quidem dexteras, masculorum: sinistras autem, foeminarum esse generatrices. Eodem pertinent & quae ab Hippocrate dicta sunt: Si dexter quidem testiculum attollatur, hoc est, si ualentior sit, masculum gignet: sin uero sinistrum, foeminam. Ceterum pars aliqua dicitur fortior aut imbecillior altera, forsitan: uno quidem modo, simpliciter: atque ita cor hepate, arteriae uenis, nervi carnis, ac denique omnia dextra sinistris in omni animalium genere sunt fortiora: alio autem, secundū huius individui constitutionem. Leoni siquidem potest esse sinister testiculum fortior, si praecipue in prima compactione, dextro aliquis affectus acciderit: quum nimirū quelibet pars, morbida magis atque imbecillior in omnem uitam reddatur, si quod uitium uel exiguum, in prima cōformatione contraxerit. Cuius uirga culpa, tum in primum maris cum femina coitum intempestiuū, tum in grauidae uictus rationem sequenti, est referenda. Quum igitur duplex sit masculorum generationis principium, in foeminis quidem dextra matris, in masculis uero dexter testiculus: consentaneum est masculum in dextra matrice, foeminā in sinistra maiori ex parte inueniri. Fieri tamen potest, licet raterent, ut sinistra matris a calore seminis uicta, pro foemina masculum in seipsa gigni permittat. Quemadmodum contingit etiam interdum, ut semen quod foeminā erat generaturum, calefactum a dextra matrice factum efficiat masculum: contra, quod masculum erat generitum, a sinistra refrigeratum, in contrarium mutetur. Ipsorum autem factū causā, existit principium uenarum, matricis ipsas nutriendum, ac mammae cum eis colligantium. Sola enim hic instrumenta per uasa cōiungi expedire debet, ut quando in matricibus augeret factus, atque conformaretur, illi soli uenae communes, ex utroque partibus alimentum affunderent: quando uero in lucem erit datus esset, mammae rursum totum alimentum susceperet. Quae causa est, cur eodē tempore menstrua bellē procedere nequeant, & femina ipsa lactare. Postea ante conceptum in muliere aetate florente, quicquid sanguinis superflui colligitur, natura singulis mensibus per uenas ad uterum pertinentis excernit. Quum autem iam conceperit, ex ipsō uasis factus trahit alimentum copiosum. Quod uero reliquum est, ad pectoris regionem suggerit. Itaque merito dixit Hippocrates, lac germani esse sanguini menstruū. Ceterum quum factus imbecillior effectus, sufficiens alimentū non trahit, ante tempus lactis intumescit ubera: gracilescunt autem, quum matricem alimentū penuria laborant: quam constitutionem abortus sequitur. Iam uero non ob id tantum, quod diu uoluerint genitalibus quidem uoluptate maximam esse cum usu ueneris coniunctam, foeminas autē insanā quandoque immensam ueneris cupiditatem ingenitam, protinus uoluptas atque cupiditas animalibus accesserit: sed ex materia atque instrumentis ad ea ipsa cōparatis, utraque affectu exoritur. Siquidem arteriae & uenae praedictae, quae ad partes genitales feruntur, matri-

Dextra pars, masculorum sinistras foeminae esse generatrices.

Fortius uero altera, infans datur.

Principium generationis masculi dexter testiculus duplex.

Vena alio matris, mammae cum colligantibus pro uia constituta.

Lactans femina non potest probē non lactare.

Menstrua masculina.

Lac germani esse sanguini menstruū.

Abortus quam constitutionem sequatur.

Veneris uoluptas protinus uoluptas atque cupiditas animalibus accesserit: sed ex materia atque instrumentis ad ea ipsa cōparatis, utraque affectu exoritur.

CUM

cum quidem fundum præterehuntur: laterali-
bus uerò ipsarum partibus postea inuectæ, in
duo diuariantur. Tum autem pars alia illinc à
lateralibus ad foemine testes secedit, qui & ipsi ma-
trix adiacent. Altera uerò in fundi progressu,
multipliciter tota in ipsum distribuitur. Com-
mittuntur autem hic fines uasorum, quæ in sinu
strâ sinu matricis diuisa sunt, cum finibus eorû,
quæ in dextrum eiusdem sinum sunt distributa.

Quo fit ut dextra etiam matrix assumat serosam
humiditatem, quam uis exiguiam. Siquidem nõ
solum augeat in sinistris partibus frigiditatem ea
ipsa humiditas, sed etiam cum spiritu iuncta, ubi
incalecit, atque euacuati postulat, acrimonia &
mordacitate sua, omnium maxime potest partes
ipsas excitare ad agendum, uoluptatemque incre-
dibilem interitum dum agunt, præbere, acrium
humorum exemplo, qui delitescunt sub cute,
maximum enim pruritus inferunt, ac suo mo-
tu uoluptatem non exiguiam inducunt. Sunt au-
tem genitales particule longæ, quàm cutis ipsa,
sensibiles, ac proinde maiori uoluptate affi-
ciuntur. Semen igitur (cuius humiditas crassa,
uiscosa, spumosa, ac uitali spiritu plena existit)
quando in propriû locum incidit, principium
fit animalis generationis. Quum autem in alie-
num, excutitur & contabescit: nimirum expiran-
te quidem repente spiritu, confidente autem hu-
miditate uiscosa. Causa generationis femineæ

femineæ, est huiusmodi. Ex his uasis quæ ad ma-
trices accedunt, pars illa quæ fertur deorsum,
inuiolunt, modo permixta his uasis, quæ in testicu-
los masculorum perueniunt. Itaque superiacens
quidem uena, subiacens autem arteria, utraq; in
flexus numerosos, atque æquales torquetur: in
quibus plexibus sanguis & spiritus qui ad testes
descendunt, diutissime cõcoquantur. Testes uerò
quâ sunt laxi, cauernosi, excipientes humo-
rem qui in uasis ceptus erat concoquit, rursus
cum & ipsi percoquit: perfectus quidem ad for-
tus procreationem, uiriles testes, maiores & cali-
diores quum sint, genituramque magis elabora-
tam excipiant: imperfectius autem muliebres,
utpote minores, & frigidiores, excipientesque lu-
morem non usque adeo concoctû. Quum igitur
omnes particulas alimentum sibi ipsas assimilant,
mirum esse non debet, si tuncque uasorum albæ
existentes, sanguinem in formam sibi ipsis simi-
lem, propter longam moram, immutent. Quum
autem matrem quidem semen foras eiaculari, for-
minam uerò in seipsam, oporteret: ob eam cau-
sam & uasa quæ à testibus semen exciperent, in
maribus quidem ad pudendum exporrexerit natu-
ra, & ad meatû per quem etiam lorium emitti-
tur, orificio adaptauit: in feminis autem tum in
ipsas matricis inseruit, tum constituit, ut in ca-
paciorem internam semen excernerent. Ad hæc et-
iam, uirile uas spermaticum, latum ac longum exi-
stens, quum iam prope pudendum accesserit,
contrahit ueluti quosdam sinus: at muliebres, si-
militer aut angustum ac breue, quod nec multû,
nec crassum semen deducitur, ut illud, esset. Ad
excernenda ea que continentur in uasis, ipsa par-
tem genitalium ueluti consulsio quædam, quæ
in coitu uenero accidit, haud exiguum habet

momentum. Nam quod in morbo comitiali, &
gonorrhæa, contrahitur uasa testiculorû, ob
id enim cognatur semen ipsum exprimere. Iam
uerò muliebres semen, præterquam quod con-
fert animalis generationi, etiam ad uoluptatem
in coitu excitandum conducit. Est autem uirile
semen membranarum atque uasorum omnium
origo. Ipsum quippe statim concoquitur, atque
inino ex muliebri nutrit semine, tanquàm natu-
ra sit familiare magis quàm sanguis. Quisquid
enim nutritur, à similibus augeri facilius potest.

Porrò qui humor in illis corporibus glandulo-
sis gignitur, quæ utraq; parte uelice locata
sunt, is in meatum urinarium effunditur: atque in
malesculis quidem, una cum semine in matricem
delabatur: in feminis autem, & foras, & in mulie-
bre pudendum erumpit. Virilitates autem eius
in sexu utroque sunt, quod ad uenerem excite-
rit, in coituque defleat, ac denique meatum urina-
rium maiore suo perfundat, habilioremque ad u-
rinæ transitum reddat. Cuius humoris uirtute
etiam ipsi spades uoluptate inter coitum dum
fruuntur. Effluit autem tunc feminis, quum ue-
hementer oblectantur in coitu. Quo tempore
qui concumbunt, circa pudendum sibi eum ef-
fundi percipiunt. In malesculis autem propria &
pæcipua eius utilitas est, qualis seminis existit in
feminis. Sunt enim inter se specie simillima, mu-
liebre semen, & humor qui glandulosis marium
corporibus inest: quum & robur & calor ma-
sculorum, detentum in his partibus humorẽ ira
concoquat, ut nihil ei ad feminariam semen de-
sit. Vnde & meatus qui ex his corporibus profi-
ciscuntur, non dubitant nonnulli uasa sperma-
tica nuncupare, & astres glandulosos: sicuti &
uasicosos astres, eos qui à testiculis explantur.

At in feminis ille humor, tenuis atque crudus
existit, ineptusque ad gignendum. Verum enim ue-
rò quum semen matricibus sit succus familiarissi-
mus (cuius recipiendi gratia extenterunt) idem di-
plex habeatur, ad uirile quidem trahendum, ma-
trix collum est destinatum: ad semen autem à
proprijs trahendum testiculis, comparata ipsa
cornua fuerunt: quæ propterea sursum ad illa
spectant, paulatimque arcata definit in angustis-
simos fines, testiculos qui è directo sunt, coniun-
cti. Quod autem eo pertingit uas, marium sper-
maticis uasis quadam proportionem respondet.

Cui insunt etiam & musculosa corpora, quæ ad
testiculos ipsos descendunt, qualia in malesculis à
musculis hypogastri oriuntur. Quum autem ut testicu-
los, sic uasa spermatica, in maribus oporteret
esse maiora, ac testes ipsi utring; pudendi radici
adhærent, longum quendam uix circuitû ip-
sis uasis excogitauit natura: ea primò ducta sur-
sum ad illa: rursus autem per interna deducens,
ad cum usque locum unde pudendum enascitur,
ubi semen erant cruciatura. Quo loco multis fle-
xibus ea contorquens, uiricositate efficiens, plu-
rimumque amplificans atque dilatans undique, pro-
uentui feminis sic præparauit quamplurima re-
ceptacula. At feminariam testiculis, quum parui
penitus existentes, uasa etiam exigua productu-
ri essent, loco, quæ nunc possident, opportunisti-
mo sunt locati. utraq; quidem matricis parte po-

Sem. uirile et
membranarum
& uasorum om-
nium origo.
Semen uirile à
muliebri alio.

Humor gigni-
tus in glandulosis
corporibus, utraq;
ad adherenti-
bus uasis uiscis,
rursum.

Spades in co-
itum quæ ratio-
ne uolupta-
te fruuntur.

Astres glande-
losi.
Astres uiricosi

Semen esse suc-
cum matricis sa-
miliarissimum.

Collum matricis.
Cornua ma-
tricis rursus, ad fo-
rum.

Spermaticos
uasorum sicut
& proprijs
in masculis.

Testiculos fo-
minarum possi-
dere.

Testium femi-
narum sum.

Serosam humi-
ditatem quæ in
matricem con-
fluit, ubi luca-
luerit, partes re-
citare ad agen-
dum, uolupta-
temque maximam
conducit.

Semini sub-
stantia.

Semen femi-
næ quæ patris
generatur.

Testes uiriles,
quum mulie-
bri, cum semine
excitatus con-
coquant.

Partes omnes al-
imentum sibi ip-
sis assimilant.
Semen per cau-
dam.

Forma in seip-
sam euacula-
tur semen.
Meatuum exci-
pientium à tes-
ticulis sicut in
plantarum.

Conuulsio orga-
norum sperma-
ticorû ad semi-
ni excernendum
conducit.

Matris ad peritonaeum descendit
et vsum.

Vesicae sunt.

Matricem loca
re inter vesicam
& intestinum
rectum.

Genitalia ner-
vi, vasa, ar-
teriae, quales.
Vesicam in ve-
stri implantan-
tiam.

Scopi in nervis
distribuentur
tres.

Nervi paucissi-
mi sunt opus
matricibus, &
partibus, quae ad
matris testicu-
los pertinent.
Vagina miris, &
talis matricis,
et plures ner-
vi inferantur.
Matris cui vasa
ca tunica con-
fles.

Intestini cur
duplex tunica
est.
Vesica utriusque
tunica tunica
est data.

Matricis tuni-
ca cui consistit om-
ne genus fibra-
rum.

Matricis connec-
tiones ad vasa
corpora.

firi: paulo autem supra cornua, abducti. Prate-
rea quo meatu deficiente ad peritonaeum, veluti
fistula quadam, nutrientia viriles testes uasa de-
duxit natura, eodē est ad spermaticis uasis ascen-
sum abusa, cōmune tribus uasorū generibus
securitatem, unum hunc meatum inueniens. Il-
lic autem rursus deducens, cōcendū quidem
omnibus, à lateribus: pubis uerō, ex anterioribus:
osse deniq; lato, ex posterioribus, ipsum muni-
uit. Ceterum uesica prima pubis ossibus subia-
cet. Post hanc autem, sunt matricēs in feminis.
Post matricēs intestinum rectum, tanquam sub-
sterniculum molle. Quum autem masculorū uasa
spermatica, tendi contrahiq; magis quam fecu-
minarum in ipso coitu oporteat, ob id ea enī
robustiori tunica constant. Porro ad genitales
particulas, nerui quidem mediocres, uenae uerō
& arteriae maximae, duplicesq; feruntur. Siqui-
dem alterum iugum earum, ex locis propinquis
renibus in testiculos & matricis fundum (ut di-
ximus) proficiscitur: alterum autem ex uasis,
quae sunt ad os sacrum, sanctum, infernis par-
tibus inferantur, ubi primū in feminis quidem
matricis collum, in masculis autem uirga, exori-
tur. Quandoquidē ex hac copula, inferiores illae
partes nutriuntur. Sed neruorum enī iugum
quoddā mediocre, ab illa ossis magni regione,
simul cum uasis ipsius natura ad partes easdē de-
duxit. Quum enim tres sint scopi in nervis
partibus singulis distribuentis: sensus quidē in in-
strumentis sensifidis: morsonis, in motorij: di-
gnotionis doloris in reliquis omnibus matrici-
bus quidem tonis, & partibus quae ad mariū te-
sticulos pertinent, paucissimis opus fuit nervis,
qui in ipsas distribuerentur, ut quae neq; ad sen-
sum exactiorē, neq; ad motum aliquē uoluntari-
um inferuissēt, nec sint item excrementorū me-
tus. At uirga maris, & collum matricis, ceteraq;
quae ad pudendum spectant, quod sensum absolu-
torem potulent, ueneretorū ratione, meritis
sanē sunt plures neruosi indepra. Constat autem
matricē una duntaxat tunica, quod sanguine pu-
ro atq; benigno alatur, nec periculum fuit, ne exul-
ceretur ab acerbis succis, quemadmodū uentri-
culus & intestina, quibus nimirum ob id est tuni-
ca duplex tributa. Quin enī uesicę utriusq; unica
tunica est data, dura tamen & robustissima, ze-
greq; patibilis, quum uidelicet ea instrumenta,
ad excipiendā tantū excrementa sint destina-
ta. Verū genus omne fibrarum rutilicę matricis
est in ditū, quod rectis quidem fibris ad sese tra-
here, transuerfis excernere, retinere aut simul om-
nibus possit. Quae uerō membrana intrinsecus
circundata est matrici, utriusq; illius sinū in
idem iungit. Alligantur aut matricēs corporib;
circumiacentibus per quaedam ligamenta ita so-
luta & laxa, ut tensioni quidem ipsarū & conciden-
tiae facili cedant & obsequantur, eas tamen
minimē auelli aut deturbari permittant. Iam ue-
rō quum collum quidem matricis, deorsum in
pudendum inclinet, reliquū tantum capacitatē in
uentre esse sitam oportuit. Quia autem laxi ad-
modum testes & carnosī & molles, cum sperma-
ticis uasis, densis, duris, & fortibus, coalescere
tuto non poterant, ob id natura, non in ipsos te-

stes, sed in uocaram *uasis duplex*, mediam ambou-
rum, spermaticum uas inseruit. Epididymides
tamen in feminarū testiculis maximē sunt ob-
scurae: quia & testiculi earum, & etiam uasa sper-
matica, admodum sunt exigua: substantiae quo-
rum inter se nō magno discrimine dissident. Por-
rō marium testes humidiores sunt ac molliores
feminarum testibus, & uasa feminaria duriora.

10 GALENI PERGAMENI de vsv partium lib. XV.

Quum igitur duo facere animalia quae pro-
crearent, esset melius, quā unum, pul-
chrē mea quidem sententia, ipsarum par-
ticularum alias quidem ad recipiendū, alias
autem ad excernendū semen, natura fecit ac com-
modatas: quarum nulla aut perfectius consti-
tut, aut melius usquam locari potuit. Ipsius au-
tem transmutationis tam subitae, quae pudendū
uile in cōtrarias dispositiones muratur, quum
ueniat in causa esse non possent (sanguinis enī
substantia uon potuisset tam celeriter aut reple-
re, aut uacuare, sed aëreū spiritus) nec arteriae
etiam, ob perpetuam illam dilationis & conciden-
tiae necessitatem: nec nerui qui à cerebro
aut spinali medulla oriuntur (nullam enī ha-
bent hic cauitatem conspicuam, nec dilatari aut
contrahi naturaliter possunt) nec denique liga-
menta, aut tendones, aut carnes, aut ossa, aut
cartilagineas: necessarium unque fuit illud cor-
pus neruosum, quod à pubis ossibus nascitur,
cauum simul & omni uacuum humore (id quod
exteris ligamentis nō contingit) ut uicissim tam
intumesceret, tum mole deprimeretur. Quo pa-
cto autem id corpus talem constructionē sit na-
ctum, si nimis anxie scruteris, conuincetur qui-
dem non intelligere, neq; tuam imbecillitatem,
nec tui facultatem creatoris. Oportuit autem ip-
sum ex medij superioribusq; bisiū, quae in pu-
be sunt, partibus, exoriri. Nam sic plurimum ab
ano erit ipsum pudendum dissiū, ad coitumq;
locum opportuniorē habebit. Etenim quan-
docunq; pars aliqua caret coniuge, maiori ex
parte positiōe mediam requirit. Vbi uerō dua-
rum partium coniugium adest, utraque pars a-
equabiliter uult à media recedere. Porro non so-
lum ipsius coitus causa, per uenerem oportet es-
se exactē tensionem pudendū, sed etiam quod meatu
diducto si directo, semet uibraret longissimē.
Siquidem si concideret aut flecteretur ipse me-
atus, haeretet semē. Quam ob rem quibus ob uin-
culum quod ad uirga glandem habetur, meatus
contortus est, hī generare non possunt. For-
cundū autem redduntur, uinculo à bescisso. Cete-
rū extenditur penis, atq; in rumore artollit-
ur, dum spiritu neruus ille cauus repletur. Iam
uerō in partibus pudendi inferioribus, feminis
meatus secundū longirudinē exorrectus, me-
dius est constitutus. Incubat autem hūc neruus
cauus. Vtraq; uerō horum parte, musculi duo,
quod meatus ceu à manibus quibusdā in utran-
que partem distractus, quammaximē dilatetur,
toto pudendo stabili permanente. At quum ue-
sica etiam propē constituta esset, non erat opus
ad ex-

Epididymida.

Testis mari-
um humidior
fuit ac mollior
feminis.

Nervi ad uesicā
caui autem con-
spicui.

Etenim de
profundis pu-
dendi ueniam
efferturam fuisse
generatorem il-
lus neruus qui
pube, quod à pu-
be ossibus nasci-
tur.

Caniū cor-
pum partem
requirit mediam.

Trifidū pudendi
causa.

Generare qui
non possunt.

Penis quando
introducitur.

Semini erigendi
tuo pignus.
Pudendo ner-
uus cauus.

Pudendi angus-
tia duo.

Collis vesice
posita.

Pudendi molle-
bra posita.

Pudendi veri-
ty. apophysis
vulve grana cō-
struere.

Nymphæ.

Agnina mem-
brana.

Pericrinata
membrana.

Secundarum
vulvæ.

Vulvæ quæ intra
matricem sita
dicitur agnina
membrana.

Venam præter-
gressam umbi-
licis in fovea hep-
atidis inseritur.
Arteriam præter-
gressam umbi-
licis, in lam-
bri arteriam
inferi.

ad excernendum lotiū alium meatum cōstruere,
sed seminis uti meatu. Quare merito collis vesice
torum peritonæum occupat, utpote sursum ab
ano (cui incubabat primū) usq; ad pudendi exor-
tum se extendens. In mulieribus autem, puden-
dum quidem ipsum ano incumbit: in finem autem
cuius superiorem, collum vesicæ definit, unde
lotium profunditur. Quod uerō ad cutis epi-
phytes, quæ sunt in finibus utriusque pudendi,
pertinet, in mulieribus quidem tum ornamenti
gratia existerunt, tum ne matricis refrigeraren-
tur: viris autem, præterquam quod ornamenti
adferunt, carere ipsi omnino ijs non poterant.
Cuiusmodi autem pharyngis uia est propugna-
culum, tale est matricibus, quam nympham ap-
pellant. At forui delitescenti in utero, tenuis
quædam membrana, quam agnina vocant, un-
diq; est circumiecta, ipsius veluti sudorem ex-
cipiens. Huic autē extrinsecus alia tenuior in cum-
bit, farcinalis dicta, ad vesicæ usq; factus per-
tusa, quæ usq; ad horam partus in seipsa lotium
illius colligit. His rursus in orbem chorion, hoc
est, secundæ, sunt circumfusa, matricē totam in-
trinsecus subungentes, ut per eas medias foris
matrici annexæ. In singulis porō orificijs uas-
orum, quæ intrinsecus ad matricem pertinent,
(per quæ etiam sanguis mensuris in ipsam dese-
ratur) quo tēpore utero geritur, aliud vas gi-
gnitur, arteria quidem in arteriæ, uena uerō in
venæ orificio: ut sint ea quæ generantur, nume-
ro equalia ijs orificijs, quæ intro in matricē desi-
nunt. Colligat autem ea inter se tenuis quidem,
sed fortis membrana, quæ extrinsecus uasis om-
nibus circumliaret, partibus uerō matricis in-
ternis inseritur. Exiguū sanē est illorum uasorū
quodq;, quum primū a matrice exoritur, cuius-
modi sunt arboris radices extremæ, in ter-
ram defixæ. Ea tamen progressa paululum, per
coniugationem coalescunt, ex duobusq; unum
procreatur, rursusq; illorum singula cum singu-
lis eiusdem generis coeunt, sicut id perpetuū, do-
nec parua omnia in duo magna coalescant, quæ
veluti stipites quidam, forui per umbilicū inseren-
tū. Quatuor itaq; omnia sunt iam hic uasa,
duæ scilicet arteriæ, & vesicæ totidē, nullis diuersi
generis inter se cōmixtis, sed uenis semper cum
uenis, arterijs cum arterijs in idem cōiungentibus.
Quod autem uenæ ipsæ umbilicū prætergressæ,
in partes hepatis simas, arteriæ uerō in partem
arteriæ magnæ, quæ ad lumbos est, inserantur,
quomodo non sit dignum admiratione? Siqui-
dem uenas uidere est, statim ut umbilicū supersa-
riant, inter sese mutuo coire, unāq; effici, quæ po-
tēst membranis fortibus cōstituta, uiscinulis cor-
poribus colligata, rectā ad uiscus usq; progredi-
tur. Oporebat enim ipsam prius ad uenarū prin-
cipium in actu accedere, postea illinc in omnes
partes distribui. Arterias autem expediebat & ip-
sas sanē in arteriarum principium, sinistrum ui-
delicet cordis uentriculum inferi. Verū quam
hic uentriculus à locis umbilici sit distans quā
longissime, nō erat tutum eas ueluti pendentes,
tanto itinere sursum ducere. Quare grana maio-
ris securitatis, primū quidem ad propinquē ues-
icam produxit illas: dein uerō per totam ipsam

(cui uinculis alligantur) tutū ad magnam us-
que arteriam, quæ à corde fuit exorta, deduxit.
Quatuor itaq; sunt prædicta in umbilico uasa,
duæ scilicet arteriæ, & totidem uenæ, in medio
sui habentes quosdā, hoc est, urinarium meatum,
qui ex fundo uesicæ exortus, lotium in farcinalē
membranam deriuat. Ceterum superio-
ribus ipsius meatus partibus, uenæ: inferio-
ribus arteriæ adhiærescunt. Per quæ uasa, ueluti
per truncos quosdā, ex matrice trahit foris san-
guinem & spiritū. Inter hæc uerū omnia, & uasa
illa exigua, quæ in matricem seruantur, media est
quædam seu trunci radicatio, quam chorion ap-
pellant, cōstans prodigiosa multitudine uasorū,
quæ à membrana tenui quidem, sed forti & du-
plici, amicumur, connectuntur, & colligantur.
Est autem utilitas minimē cōtemnenda illius hu-
moris, qui intra amiculum, hoc est, agnina cō-
tinetur membrana. Fœtus siquidem in eo qua-
si innatus, sursum tollitur ac uelitur, ut minus
sit grauis ijs uinculis, per quæ matrici cohzere-
scit. Ad hæc etiam cū partus instat, eo humore
perflus, facilius collo matricis elabirur. Verū
tamen si acetabula, quæ sunt ad matricem perue-
nientium orificia uasorum, mucore repleta fue-
rint, nequeunt partum gestare. At uerō ut matricis
capacitas rota forui cederet, ipsaq; grauida
ponderē premeretur minus, atq; in partu etiam
facile rumpereur, iurē natura membranas om-
nes, quæ ad factum spectant, efficiendo pertē-
nues, ex mutua inter se connexionē securitatem
eis comparauit. Quum autem fiat excretio urinæ,
dum uesica motu naturali circum humores
quos in seipsa continet, undique rota contrahitur:
adit uerō infansq; delitescens in utero ad
ipsum collum uesicæ urinaris meatus: quid po-
tēst in causa esse, cur per eum nihil lotij reddat-
ur, sed totum sursum ad urinaculum dictum a-
scendat? In causa certē sunt, tum latitudo urina-
culi, multis numeris maior ea quæ collo ine-
ritum rectitudo maxima eiusdem, quæ ad edu-
cendam urinis, colli obliquitate est præstantior. Ta-
ceo nullum musculū esse extrinsecus urinaculo
appositum, qui effluxum excrementorum prohi-
beat, cuiusmodi reperitur ad collum uesicæ. At
uerō maior mensura, quā pro aliarum par-
tium portione, quæ in primo conformationis
tempore excedit: excedit etiam non mediocriter
usq; ad partum. Secundum ipsum, cerebrum,
& cor, excellunt magis quā pro aliarum ratio-
ne particularum. Causa autem eius rei est, quod
hepar quidem uenarum principij exiit, quod
igitur factus eo formatur, atq; augetur in ute-
ro, magis eo usu indiget, quem uenæ prestant
(ut qui distissime plantarū more regatur) prin-
cipium harum mox à prima generatione natura
robustissimum fecit. Cerebro quippe & cordi,
& instrumentis quæ ab illis emergunt, utilitas
quæ à uenis proficiscitur, necessaria erat, quod
ea sine sanguine, nec generari, nec augeri pos-
sint. Hepan uerō ac uenis, arteriarum quidem uisus
erat exiguus: neruorum autem nullus, ante-
quā absoluta esset. At cur pulmo in ijs qui ge-
runtur utero, est ruber: nō autē ut in perfectis ani-
malibus, albicet? Quia tunc nutrit per uasa uni-

Umbilici uasa
quatuor.
Cipariæ.
Ventriculi uisus.

Chorion.

Homeri con-
tenti in agnina
membrana, uisus.

Acetabula.

Urina excretio
quo fiat modo.

Urina factus cur
per vesicæ collū
nō ascendat.

Hepar ac uenis
rum principij.
Venarum uisus
sunt necessarii
ad corpus ex
cordi generandum.

Hepar ac uenis
nō sunt sufficien-
tes ad corpus
generandum.
Pulmo cur in ijs
qui gēstāt utero
admodum
ruber sit.

cam tunica, & eam tenuem habentia, ad quæ quidem ex uena caua fluit sanguis: in natis uerò, occurrat quidem usorum resecratio: atq; autem copiosissimus tunc incidit, sanguisq; parcissimus, atq; idem tenuissimus. Quinetiam pulmo tunc motu perpetuo agitur, animali nimirum tunc respirante. Quo fit ut sanguis à spiritu incisus, motuq; agitur duplici, altero quem ex arterijs habet, altero quæ ex toto pulmone acquiritur, tenuior adhuc seipso & mollior, ac ueluti spu mosus reddatur, pulmonisq; carnè sibi similem reddat. In fortibus itaq; uena caua est in arterijs uenofam pertusa. Quum aut id uas, nempe arteria uenosa, uenæ officij pulmoni præstaret, necessum fuit uas alterum in arteriæ usum accõmmodari: quo circa natura id quoq; in magnam arteriam pertudit. Verum quum hic uas aliquantum inter se distaret, aliud tenuius uas exiguum, quod utrumq; coniungeret, effecit. In reliquis uerò duobus, quum hæc quoq; mutuo se contingere, ueluti foramen quoddam utriq; comune aperuit: tum membranam quandam in eo, instar operculi, est machinata, quæ ad pulmonis uas facile resupinaretur, quò sanguinem à uena caua impetu affluenti cederet quidem: prohiberet aut, ne sanguis rursus in uenam cauam reuenteretur. Quod foramen, quamprimùm animans est in lucem emissum, aut certè non multò post, coalescente membrana, conglutinitur. Pari modo id uas, quod magnam arteriam uenæ, quæ fertur ad pulmonem, connectit, quum alie omnes animalis particule augeantur, non modò non augeatur, uerum et tenuius semper efficitur, adeò ut tẽpore procedente penitus tabescat, atq; excidetur. Quid igitur hæc omnia natura affabreficiat, declarat singulorum usus. Inuenire autem facultatè qua talia efficiat, humani ingenij non est. Iam uerò quòd os matricis, quo tempore foemina in utero gerit, adeò constructum sit, ut ne specilli quidem cuspide in matricis collum immittere queas: quum tempus autem pariendi appetit (nempe quum fetus iam ita perfectus est, ut possit per os nutrir) adeò aperiatur & dilaretur, ut integrum animal reddat: quonam pacto id accidat, mirari quidem possumus, intelligere autem non item. Caput autem fetus in ipso partu natura primò collo matricis indidit, tum per alij ipsius partibus uiam muniuit, intelligens nimirum contrarias huic alias pariendi formas longè periculosissimas esse. Ceterum hoc omnem admirationè superat, quòd natura animalia quæ in lucem eduntur, actiones omnium partium docuerit, facultatem quandam sapientij ipsis à sese doctam ingenerans, qua instructa, subito ad alimentum bis ipsij familiari festinant. At homini recens ædiproprium alimentu est lac in mamillis contentum, ad quæ suapte conari mouetur. Producentur autem postea dentes infantulo, ne is semper matri molestus sit. At quòd dentibus mandendi actio accedat, quæ & ipsa à nemine docta est, reliquæ deinceps actiones omnes sequuntur. Sed de musculis articulũ ischij mouentibus, pauca impræsentari dicamus. Natura solis hominibus inter peditria omnia, duo crura tribuit, quæ essent ambulationis organa.

Similiter quatuor, sed talia dedit, qualia adfunt infanti, nunc primò eis uti conari. Etenim quatuor artubus, quadrupedũ instar, graditur: & præterea anterioribus tanquam manibus utitur. At ubi homo increuit, non amplius anterioribus artubus, tanquam pedibus, utitur. Simia uerò perpetuò inter utraq; ambigit. Ad hæc, quos musculos natiui ridiculos ac decurtatos finia foritur, eosdẽ homo habet sitos bellissimè, tum ad decus partium necessariarum, tum ne anus contundatur sedendo. Quò igitur articulum coxæ flexu quidem oporteret crure sublatu, extendi uerò eodem depresso, in ipsy actio eius præcipua constaret, musculos crum extendentes atq; flexcentes, fecit natura tum maximos, tum plurimos: secundum illos, magnitudine ac numero, eos fecit qui crum circumagunt. Prima itaq; musculorum differentia est triplex, quarum singule in alias duas diuiduntur. Nam flexcentes, exten dentibus magnitudine & numero sunt minores: sicuti adducentes intro, foras abducentes. Porro qui femur in orbem circumagunt, quodammodo sunt aequales. Est autem crurũ actio, ambulatio, cursus, & statio. Verum ambulationem & cursus, cruribus ipsis contrario inter se modo affectis: statio uerò, itidẽ habentibus, hoc est, fixis in terrã perficitur. Flexitur autem crus ad inguen, quum ipsum artollimus: extenditur, quò id ad terram deprimimus. Summi uerò extensionem & statum ultimum habet, quum stamus. Proinde natura fortibus, multis, ac magnis musculis hanc actionem cõmisit. Primùm quidem ei, qui totũ articulum ex posterioribus partibus tegit. Post autem illi, qui ipsum excipit, quicq; ab osse illum exortus, in altissimã magni trochanteris partẽ inferitur. Tertiò ei, qui post hunc ab externis & inferioribus ossis illum emergens partibus, in primas internas magni trochanteris partes insigil. Quartò præter hos ei, qui ab osse lato profectus, inferitur omnibus posterioribus partibus, usq; ad summitatẽ, magno trochanteri. Sed primus omnium cõmemoratus, inclinabilem extensionẽ fortem efficit, dum femur duobus finibus sursum trahit. Nam si altero tantum agat, paululum deducet ad latera. Secundus extendit simul, & femoris caput intro retrahit. Reliquorũ uterq; sursum quidem tendit paululum, sed alter quidem femur extracircumagit, alter autem intro paulò magis tendit, quàm sursum. Alius præter hos est quintus muscularis, omnĩ qui sunt in corpore, maximus, internus & posterioribus partibus usque ad genũ, toti ossi femoris circumhærens. Cuius musculi posteriores fibre, quæ à coxendice emanant, crum firmum stabiliunt, extendentes articulationem. Porro qui prædictis quinque muscularis sunt oppositi, ipsam articulationem flexcenti, illis sunt inferiores, tum numero, tum magnitudine. Quorum supernus est rectus, unicoq; tendone, ex duplici exortu, confuso, in summitatem ipsius trochanteris inferitur. Sed qui cum eo in partem quoq; trochanterẽ descendit, inferatur inferior. Musculus item alius, ex partibus anterioribus ossis pubis enatus, obliquus attenditur, similem actionẽ cum eo habens. Tum quartus, qui

Infantis quatuor artubus tanquam quadrupedũ instar q; adiri.

Simia graditur.

Natiui muscoli esse sitos & ridiculos, & de decurtatos, hominibus autem belle constitutis.

Musculi crum extendentes atq; flexcentes: quos natura modis ac maximis.

Crurum affectus: quæ. Ambulatio, cursus, statio, quomodo fiant.

Crus flexio: extendens: quòd accidat.

Magni crum extendentes.

Musculus omni in corpore, maximus, qui natus sit.

Venam cauam in fortibus in arteria uenofam pertusa, atq; li esse aut magnam arteriam.

Facultatẽ inuenire, quæ natura singula efficiat, humani ingenij nõ esse.

Caput fetus in ipso partu primò collo matricis indidit: tum per alij ipsius partibus uiam muniuit: intelligens nimirum contrarias huic alias pariendi formas longè periculosissimas esse.

Animalia aditum in lucem, ita ut omnia illa esse alimur: omni uero particularum.

Lac esse alimentum proprium hominibus recti in lacem editis.

Alimentum reliquum supini in lacem editis: postea aditum in lacem editis.

Crura duo sunt hominibus data: esse inter pedes: terra amata.

qui articulationem quæ genu inest extendit per aponeurosin, quæ patellam genu supergreditur. Verum hic quod per accidens femur flectit, ut potius monendæ ribis gratia productus: alij uerò tres, prima actione. Qui nerò intrò femur adducunt (sunt enim duo, à partibus ossis pubis anterioribus orti) nò modo crus intrus trahere, sed flectere etiam mediocriter possunt. Cui etiam actioni inseruit tertius alius prælongus musculus, qui productus ex pubis ossis anterioribus partibus, in caput internū genu insertat. Quam etiam actionē præstat, primi quem diximus musculi pars interna. Extrorsum aut femur adducit, tum pars altera huius eiusdē musculi qui primus omnium fuit numeratus: tum etiam musculus ille, qui ab offe lato emergens, paululum circumagitur femur. Reliqui autem alij sunt duo musculi, qui femur mouent, unus quidem ex internis, alter uerò ab externis ossis pubis partibus ortus: qui ambo circa articulum coxæ obvoluti coalescunt. Atque hi omnium prædictorum musculorum soli, uterq; uersus seipsum trahens, femur in uertit, ac circumagitur. Nam quemadmodum ex superioribus quidem partibus oportet musculis in descendat, qui crura sursum trahit: eorum uerò qui ad latera mouent, intrinsecus quidem exoriri est necesse eos qui ustrò crura adducunt, extrinsecus autem qui foras: sic etiam qui musculi femur torquent & circumducunt, ij in orbem conuoluantur est necessarium.

GALENI PERGAMENI de vsu partium lib. XVI.

QUAM autem cerebrum principium neruorum, cor arteriarum, ac deniq; hepar ueneramus esse futurū, atq; hæc quidem instrumenta, æquissime simul & tutissime in singulas corporis partes distribui oportere, sanus existimauit natura, nec tot numero producere, quot ipse existit particula: nec prorsus multa, sed ubi maximū unum organum, seu truncū, ab unoquoq; produxisset principio, tum demū ab eo progrediente, ueluti ramos quosdam dispertere in partes propinquas, secundum dignitatē cuiusq; quemadmodum aquam potabilem, qui huius rei sunt periti, in totam urbem distribuūt. Merito igitur uena caua, quæ ex gibbis partibus hepatis sursum ac deorsum procedit, trunco bifido est similis, propterea quod corporis nostri, alia quidem pars hepate est altior, alia uerò humilior. Ad eundem modum arteriæ, quæ ex corde enascitur, cernes protinus imparibus sectionibus bifariam esse diuisam: altera maiore, quæ fertur deorsum, quod ibi corpus sit maius: altera minore, altioribus corporis partibus distributa. Simile quippiam prædictis, à cerebro enā producitur spinalis medulla, quæ partibus omnibus quæ sunt sub capite, neruos immittit. Nullus tamen neruus neq; in ossa, neq; in cartilagine, neq; in ligamēta, neq; in quasuis glandulas, quarū duplex natura existit, inseruit: quando quidem supersuacaneū erat illis morum uoluntarium, aut sensum tribuere. Nec uerò adeps quo-

que ulla in re neruos desiderat, quæ ex parte pinguiore sanguinis per tennes uenas affusa, partibus animantis membranosis, tenuibus atq; sicis, instat olei pinguis, adheret, * ut eas uideat per diuturnas medias, exercitationes uelocitantes, atque calores improbos, occyissimè reficatas, naturæ suæ pinguitudine humectet. Glandulæ uerò, quæ sunt ueluti stabilitè diuisis uasorum, nullis sanè ad id neruis indigent, quum nec sensum, nec motum uoluntarium ad id desiderent. Quæ autem ad succos animantis utiles fuerunt comparatæ, quemadmodum uenas & arterias nonnunquam periscipuas, ita & neruos habuerūt, unius sensus gratia. Si quidem ad uoluntarium morum obeundum, natura in animalibus unū genus instrumentorū construxit, quos musculos uocat. Proinde quanquam nerui omnes motū haliunt & sensum, nulla tamen pars alia, quæ neruos recipit, motu uoluntarij est prædita, sed sentit duntaxat: ut cutis, membrana, tunica, arteria, uena, intestina, matris, uentriculus, ac uiscera omnia, & glandularum species altera. Quod uerò & sensum organa, neruos ad sensum flagitabant, quod opus est commemorare. Ceterum quibus sensu exaltiori erat opus, ijs neruos molles natura tribuit: ut illis quæ morum uoluntarium postulabant, duros omnes: quibus autem utraq; actione erat opus, neruorum genus utruq; inferuit: ad sensum quidem, neruū qui pateretur facilius, accommodans: ad motum autem, qui ualentius ageret. At neruus mollis semper in ipsa sensoria inseruit: durus autem, in musculos qui ea mouent. Porro inest mollis neruus uentriculo, hepati, intestinis omnibus, ac uisceribus, quemadmodum & ex ossibus omnibus, solis dentibus, tum quod hi, ijs qui sibi occurrūt, nudi sint expositi, tum & ipsos unā cum lingua sentire oportet: atq; diiudicare, nō aliter quam cæteras oris particulas. At uerò in cutem ipsam à subiectis partibus fibræ quædam neruorū perueniunt, quæ simul ipsam cum subditis corporibus colligant, simul etiam ei sentien di facultatē suppediant. Soli autem oculi, propter utilitatis dignitatem, maiores & molliores, quam ulla alia pars, sunt neruos sortiti, & uidelicet eorū sensus sit aliorum omnium certissimus. Quum igitur sensus quidem in patiendo sit: motus autē quo nerui & musculi mouent, in agendo: optimo sanè in re ipsi quidem primo uidendi instrumento in oculo neruus mollis, mouentibus uerò ipsam musculis, durus inferuit. Ad eundem modum & lingue ipsi natura duo neruorum genera tribuit: alterum quidem molle, quo sapores diiudicat: alterum uerò durum, quo multiformiter moueretur. Ad aurem etiam utraq; neruum mollem induxit, alio: q; duros auribus ijs immiscuit, quæ habituræ morum aliquem erant. Mollem quoque neruorum nasus etiam fuit participes, & dentes, & totum palatū: nam hæc quoq; sensu exactiori indigebant. Rursum nerui optici meatus habent sensibiles, per quos ad cerebrū uentriculum pertinentes, ad oculos spiritus sensibilis desinit: quæ etiā causa fuit, cur crassifit extiriet. Etenim ubi uterq; anterior uentri-

Adeps quid ad hanc.

Adipū vsu.

Glandulae solum diuisiones uasorum.

Glandulae non prædicæ.

Musculi, uoluntarij sunt motus autem.

Musculi solis uoluntariis motu esse præditi.

Neruos molles quibus tribueretur natura, Nerui duri qui bus tribuit.

Neruus mollis semper in ipsa sensoria inferuit: ut durus, in musculis illa mouent.

Dentibus cutis inter ossa cætera, sicut sit molli neruus tribuit.

Dentes dignitate care, sapores.

Oculi sortiti maiores & molliores neruos, quoniam uia alia pars.

Oculorum sensus est aliorum omnium certissimus.

Sensus in palato non consistit.

Motus in alio non uisatur.

Lingua duo neruorum genera miscet.

Optici nerui meatus iussu sensibiles.

Femur intrò ab duobus musculis

Femur extrorsum agitur per se.

Femur circumagitur musculis.

Cerebrum per se optima esse neruorum, Cor esse arteriarum principium, Hepar esse ueneramus principium.

Venam cauam esse truncum bifidum similem.

Arteria magnam bifariam diuisam.

Spinalis medulla ueluti rami quodam neruorum trunco esse.

Nerui partes carotides, Glandularum natura capillaria.

*Opticorum ner-
vorum termin.
Nervi duri qui
has tribuuntur
partibus à spi-
nali medulla.*

*Vox principa-
lissima est om-
nium animæ ac-
tionum.*

*Vox cogitati-
onis mentis est
muta.*

*Laryngis mu-
sculorum & compo-
siti.*

*Laryngis mu-
sculorum situs
& positio.*

culus ad latera definit, illinc optici nervi exor-
iuntur, ipsi in ventriculū cœli thalamus, pro-
pter illos nervos existit. Ob uehementiam aut
actionis, consistentis duritie, atq; situm remo-
tum, cæteris omnibus partibus, quæ sub facie
constitunt, sugg. videntur nervi duri à spinali me-
dulla, præterquam intestinis, visceribus atq; in-
strumentis uocis. Quorum nōnulla quidem, ut
cor atq; os uentriculū, cum cerebro colligari o-
portebat: alia uerō, q; prope ipsum sita essent, so-
loq; sensu indigerēt, nervos molles habuerunt.
Porro quodd uox principalissima sit omnium a-
nimæ actionum (nam cogitationum mentis est
nuncia) oportuit eam quoq; fieri per instrumenta
quæ nervos à cerebro assumerent. Quum igitur
larynx sit primum & principalissimum in-
strumentum uocis, ex tribus quidem constatum
cartilaginibus, habens autem in medio sui epi-
piglotidem, ac musculos circiter uiginti, si se-
re usui seruientes, quorum musculorum nōnulli
transuersam magis quodammodo, alij obliquū
habent positionem, alij deniq; rectam: sic tamen
ut eorum quidam superne ori, finibus suis in
his partes quasdam laryngis moueant: alij con-
trā, oriuntur quidem inferne, ac superioribus fi-
nibus agant: æquum certē fuit, nō qui superne
deorsum ferantur, neruum superne immitti: eis
uero qui sursum ex inferioribus partibus, inde-
m esse neruorū principium, quemadmodum
obliquis atq; transuersis, etiam secundum posi-
tionis figuram. Ac superne quidem deorsum fe-
runtur, tum h; qui ab osse hyoide ad cartilagi-
nem seu uniformem perueniunt musculi, tum qui
ab ambobus ad pectus proficiuntur. Ab infer-
nis autem partibus sursum se attollunt, qui ary-
tenoideum cartilagine mouent. Recti itaque
sunt prorsus quatuor, duo ad obliquum incli-
nant. Quāquam lruiter etiam obliqui sunt, qui
fines inferiores cartilaginis dependit, siue scuti-
formis, cum cartilagine, quæ nomine caret, con-
nectunt. Quin & h; musculi qui trium cartilagi-
num maximam connectunt stomacho, fibras
transuersas, sed in obliquum spectantes, sortiun-
tur. Atq; his certē natura, à sexta coniugatione
nervos immittit, quorum alter quidem ad uerti-
cem cartilaginis dependit, intro in ipsum laryn-
gem pertinet, alter autem ad transuersos accedit
musculos: à quo etiam ad musculos ad pectus
porrectos, fines quidam pertempunt. Dux ita-
que sunt hæ coniugationes neruorum, ad posi-
tionem obliquam spectantium. Tertia uerō est
alia eorum, qui ad musculos cartilagine sur-
sum tollentes perueniunt: quæ quum alius prin-
cipium postulare, nō potuit à sexta coniugatio-
ne produci. Quare à cerebro per totum laryn-
gem utraq; parte duo nervi recti extenduntur,
unus ad ipsam, alter ad dextram. Quū uerō tres
superfint in larynge musculorū coniugationes,
maximè quidem necessariorum ad uocis genera-
tionem, rectam autem positionem habentis, ita
ut capra sint inferne, fines autem ipsorum su-
perne, quibus necessum erat à cerebro per par-
tes inferiores nervos ipsos immitti: natura ex
sexta coniugatione, à qua oportuit cordi & ven-
triculo & hepati nervos etiam distribui, nervos

quosdam carotidibus arterijs stabilitos, ad infer-
nam thoracis partē deduxit. Vbi uerō peruen-
erunt illuc, unde germina arterij magnæ exoriri-
tur, quum aliqui ipsorum partem ruerit ad laryn-
gem esset necesse, duo ab alijs atq; à finimis
separati & diducti, sinister quidē paulō lon-
gius progressus, ad radicem maximæ arteriæ se
inflexit, ueluti circa aliquam rotulam, atq; illinc
denuō ad laryngem ruerit est. Dextrum au-
tem dorso illius arteriæ impositum, quæ in dex-
tra thoracis parte obliquam positionem tue-
tur, & à qua acclius carotis oritur, circa rura an-
gulum natura inflexit, qui fit in ipsius carotidis
productione, ac rursus uersus laryngem produ-
xit. Quia uerō talis inflexio erat lubrica, natura
apophysim quandam à sexta coniugatione, ei
tanquam manum porrexit. Quæ quidem cum
magno neruo eam colligans, flexione simul &
reditum quamtutissimum illi effecit. Portio e-
nam neruorū quedam à cerebro ad uiscera mit-
titur, exigua quidem ad partes cæteras, magna
autem ad os uentriculū, quodd natura partē hanc
fecit instrumentū appetitus ciborum, ad por-
tam (ut sic dicam) situm, omnium organorum
quæ ad alimentī dispensationem fuerunt com-
parata. Quare natura in id neruum quandam
syncerum, & cum nullo duro mistum deduxit.
Ex quo portione exiguum in ipso transitu de-
cidens, stomacho, pulmōni, & alperæ arteriæ il-
lam communicauit. Ex eadem etiam coniuga-
tione syncerum neruum cordi & hepati indidit.
Ad alia uerō omnia quæ sunt huius diaphragmate,
intra petitonæū, ab his quoq; neruis pars que-
dam accedit, non amplius syncera, sed h; neruis
qui à spinali medulla oriuntur, permixta. Quare
partes in quas deferuntur, robur quidem ac ui-
res, ex spinalis medulle: sensum autem cæteris
exactiorem, à cerebri miscella recipiunt. Porro
ubi natura per longum iter neruum est ductura,
aut motus musculi uehementi ministraturū, ibi
substantiam eius corpore crassiorē quidem, cæ-
tera autem simili intercipit: beneficio cuius con-
tingit neruo ipsi crassescere atq; corroborari. In
primos autem eosdemq; latos scapularum mu-
sculos, qui ab occipito oriuntur, ac definiunt in
dorsum osium scapularum (quod sursum tra-
hant) à cerebro magnus neruus inseritur, emer-
gens unā cum alijs, quos diximus oriri à sexta
coniugatione. Maximo enim neruo erat opus
h; musculis, nō modō propter magnitudinem,
uerum etiam propter actionis uehementiam, ut
qui totam scapulam sursum trahant. Post hos
autem nervi commemorabiles, musculi à pri-
mo quidem spondylo oris, in sublimem au-
tem scapulæ partem inferiā, à natura sunt dati.
Primæ uerō productioni musculorum circum-
agentium caput, à neruis ad magnos musculos
utiusque scapulæ pertinentibus, copioso que-
dam inseritur: deinceps autem à colli spondy-
lis, ut quodque principium ad seipsum trahens
musculum uicini motum efficiat. Quin & mu-
sculis duobus qui sunt ad tonsillas, & h; qui ad
imam partem hyoidis perueniunt, nervus à ce-
rebro datur. Alia præterea neruorum tenuium
coniugatio, quæ à sexta oritur, ad linguæ radi-
cem

*Os uentriculū est
instrumentum
appetitus cibi
nam, ab alijs, à ce-
rebro neruū syn-
cerissimum re-
cipit.*

*Lati scapula-
rē musculi vo-
de nerui rui-
pant.*

*Reuerentium
neruorū setas,
progreſſus atq;
dura.*

cem pervenit. Nullus autem alius à cerebro infra faciem descendit. At à secundà copula eorū qui à collo oriuntur, nervi ad caput ascendunt, duo quidem ex partibus posterioribus, duo autem à lateribus in cutem faciei distributi, atque aures utranq. Quum autem in scapulas latus, qui buccas & oris latera movet, multa principia formatur, definitiq. in buccas ipsas & labia, os aperiens ad latera, idcirco fibras omnes etiam à colli spondyli recipit, ad eas partes tendens, & cum eis nervos transverfos, maximosq. plurimos. Fibris uero quæ in scapulas & claviū sursum ferunt, nervi minores insunt, qui etiā cum fibris procedūt. Quæ uero ipsius lateri musculi partes ab radice auris per buccas, super musculū manfort nate, nervi unus per foramen exidentibus cecum, positionē habent fibris, quæ ei parti insunt, similem, & principii propinquius. Quemadmodum autem ad musculōs colli nervi ab inferioribus partibus sursum ferunt, quod n̄ caput anteriorum moveant: ita & duobus musculis qui retrō ad dorsum totam scapulam contrahunt, iuxta posticam apophyisim, quam acanthum vocant, nervorū principium est constituit. Pari modo & reliquos scapularū nervos, & eos qui ad costas perveniunt, reperias secundū ipsas musculorū fibras dissimilatos. Nam ipsi musculi qui sursum feruntur, ex partibus thoracis intercostalibus nervi exdentes distribuntur. Qui uero à collo deorsum ad thoracem descendunt, ipsi spinalis medulla colli nervos demittit. Quum autem musculi qui ad epomida sunt, totam brachium sursum tollentes, validum nervum desiderarent, à regione inter quartum & quintum colli spondylum sira, ex ipsa spinali medulla duplicem nervum produxit, quem ad partem epomidis externam simul & superioriorem extendit, ita profundum utrūq. ut ne appareat t quidem. Solet etenim securitatis gratia non solum copulare nervos naturā, sed etiā per interna deducere, quemadmodum arterias & uenas. Sic etiam nervi qui ad extremas manus perveniunt, per internam brachij partem, huius ad ulnam vehuntur, prope ulnæ articulationem prætereuntes. Deinde uterq. muscularis internis ulnæ occulatus ad carpum extenditur, ac sic tandem in digitos distribuitur. Tertium præter hos nervum ad externam ulnæ partem deduxit natura, musculō carnosissimo, qui illic est, usā vice, ppugnacula. Maiores enim nervos merito internis partibus manuum distribuit, quod manuum actiones omnes, per eas nimium obeat. Differunt autem nervi manuum à nervis crurum, itineris quo ferunt ratione, eō quod nervi omnes ad manus per internum brachii accedunt: ad crura uero, omnes, præter paucissimos, per partes femoris posteriores deorsum feruntur, à sacro offe, lumborumq. vertebra, propagati: in ipso autem eorum descensu ad popliteū, obiter distribuent nervum naturā singulis musculis femoris, prout cuiusq. ratio postulat. A poplite autem, per suram, quæ tota est carnosā, alios quidem in externā tibiā, alios in internam duxit, alios per mediam ipsam porrexit, musculis qui illic sunt, ipsos distribuens.

Eos igitur qui per internam suram feruntur, ad talum ac tibiā occultant, ad inferiorē pedis partem deduxit: illos uero qui per externā, ad talum & fibulam abdenta, ad anteriora simul & superiora pedis porrexit. Nullum itaq. nervū nec ad curvaturam cubiti, nec ad genu & tibiā anteriorē reperias: sed ubiq. omnes, in profundū, inter ossium propugnacula, aut cartilaginū, aut ligamentorum, aut deniq. carnium, delescentes. At uero per magnum ossis pubis foramen, cum alijs basi, nervi quædam propagō penetrans, in internos eos femoris musculōs, qui ab eodem offe pubis oriuntur, ad ipsorum capita inferitur, atq. ad ipsum usq. genu descendit. Ab illa eadem propagine, cūta tota quæ illic est, productiones recipit: quemadmodū certe & à foraminibus quæ sunt ad os latum, parvi musculi qui iuxta os ipsum consistunt: tum qui ad anum, uelcū, atq. pudendum pertinet: ad hæc etiam membranz quæ illic sunt, uelcū, uelcū matris, & peritonæum, nervos sortiuntur. Semper quippe solet natura, nervos, uenas, arterias, à partibus propinquis immittere, modō nihil aliud prohibeat. Quum autem de nervis abunde dixerimus, tempestivū iam est ad arteriarum atq. uenarum distributionem transire. Est igitur uas quoddam maximum, quod à sinistro cordis uentriculo, ueluti stipes enatum, in totum corpus distribuitur. Carterū ubi primum à corde emergit, statim in duas partes diuiditur: quarum altera quæ maior est, ad spinā descendit, partibus omnibus inferioribus arterias dispensatur: altera uero sursum ad caput fert, & ipsa omnibus quæ sunt supra cor, ualiorū propagine præbitura. Porro pars illa quæ fertur deorsum, ad locum productioni suæ è directo oppositum, fertur: à quo nusq. declinans tramine, sed rectissima & cōpendiosissima uia progrediens, quintū thoracis spondylum cōscendit: altera uero pars statim post productionem primā, portionem quandā à se mittit sursum, ad sinistram scapulam & axillā: quæ p. ulmoni inuecta, & membranā sulca, sursum usq. ad primā costā producitur, nusquam diuisa. Illuc autem iam quandam à sese partem mittit ad primā intercostalia spacia, dein ad hypocondrion ac mammā mittit alteram, quæ toto pectore est subdita: tum tertiam ad spinalem medullā colli, quæ per sex spondylorum foramina penetrat, mittit etiam obiter musculis propinquis propagine. Reliquum autem huius arteriæ, in totam manum sinistram, & scapulam distribuit. Altera uero maior pars totius arteriæ, maxime mollissimè glandulæ præsidio firmata, ubi in dextrum brachium germē emittit, sursum ad iugulum tendit, quæ & ipsa celerrimè ossi medio pectoris iungitur. Per quam regionem uena cava & stomachus transuehens, hic quidem spinæ spondyliis adheret, illa autem pectori subditur. Ex quo etiam arteriæ postico cōparatur opportunissima: ut quum per collum diuisæ feruntur, arteriæ quidem in profundū sint, uenæ autem ipsi incumbant. Quum autem arteria magna trāsit per thoracis partes infernas, obiter mittit portionem maximā in eos qui illic sunt siri, mu-

Latus musculū
fibras omnes re-
cipere à collo spon-
dylis.

Musculi retrō
ad dorsum totā
scapulam con-
trahentes unde
recipiunt nervi.

Epomida mus-
culi.

Nervi manuum
O crurum, quo
differt.

Arteria magna
artus, distribu-
tio.

sculos intercostales: uon exiguum tamen in musculos thoracis externos, quemadmodum & in septum transversum. Sed nec uentriculum, nec lienem, nec hepar, nec intestina, nec renes, præsterat arterias aliunde recipere, quam ab hac sola maxima, quum primū ad loca, quæ sub prebibus sunt, peruenierit. Productio tamen arteriarum, quæ in dextrum renem prorumpit, superiorem habet exortum, quam ea quæ ad sinistram tendit, quod renem posito sit inæqualis. Arteriarum autem quæ ad testiculos deferuntur, eas ordine consequuntur, quæ accedunt ad renes. Nam quæ à partibus sinistris proficiunt, omnino aliquid perpetuū ex ea quæ fertur ad renem affluit: quæ uero à dextris procedit, semper quidem ab ipsa magna arteria exoritur: interdum autem aliam etiam aliquid ab ea quæ ad renem fertur. Quum autem lac & semen ex sanguine exacte cocto gignant, quæ absoluta concoctio fieri citra moram sanguinis in uasis ipsis non potest: ob eam causam, non solum à longinquo natura uenas & arterias ad testiculos atque mammæ potexit, sed præterea multipliciter eas, prius quam in scrotum, inuoluit: datur nam, opinor, ex eo, cum uase ferente, consuetudinem ipsi materię comparans. Sed uenæ quidem in hoc solo loco inuoluuntur: arteriæ autem, etiam in testiformi plexu. Nutriunt enim hæc spiritum animale cerebri, qui certè multum ab alijs spiritibus distans, elaboratissimo alimentum indiget. A magna item arteria, aliz sunt, post prædictas apophyses, ad musculos epigastrici: aliz etiam minorum uasorum propagines, in spinalem prorumpentes medullam. Quarum pars quidem non contemnenda, per commissuras spondylorum penetrat in dextros spinæ musculos, pars autem in sinistros diffunditur. Quæ germina sunt ueniis qui ab ipsa spinali medulla oriuntur, numero æqualis, obducunturq; tenui meninge, quæ spinalem medullam ambit. Ob hæc igitur productiones crassitudo semper minuitur arteriæ. Porro ad ultimum spinæ spondylum arteriæ subiacet uena, quæ antea supra eam ferebatur. Postea uero quam petronum prætergressa, in crura diuidenda erant, rursus uenæ incubuerunt arteriis, quod tutior esset ipsarum per crura delatio. A quibus uasis transiuntibus, uesica quidem exigua, magnas uero duplicesq; propagines acceperit matricis, ut quæ non eas solas, sed factum in ipsis matricibus concipiendum, nutriturq; essent. Quæ igitur à regione renum in testiculos perueniunt, usq; ad matricem fundum diffeminantur. Quæ uero tum ad partes, quæ ad collum pertinent, tum ad eas quæ sunt infri, post testiculos, perueniunt, à uasis quæ ad crura feruntur, productæ sunt, eodem loco, unde in masculis ad uirgam accedunt. Ex his autem locis rursus uasis uenosa sursum feruntur, quæ propter commercium, cum his copulantur uasis, quæ deorsum à mammis descendunt. Ab eisdem locis una coniugatio exiguorum uasorum, ad ea quæ ad pudendum pertinent, accedit. Ad inguen autem natura magnas glandulas diuisiōibus uasorum ueluti fulcumentum, & aduersus inu-

rias externas operimentū, indidit. Vbi igitur arteria magna quæ ad supernas partes perrepat, his quæ in thorace sunt, distribuit propagines, quæ ex ea reliquum est, una scilicet utrinque arteria, sursum ad caput fertur. Quorum productiones uasorum, omnes faciei & colli partes contextit. Ex eis autem quæ in scapulis diuiduntur, dorsales musculi suas recipiunt propagines. Ab his etiam ipsis, quas primū ad collum extra thoracem iam emicauerint, feruntur germina per foramina cuiusq; sex primarium uentrebrum, quæ sunt ad latera, usque ad caput. Verum quas parte nequis qui à spinali medulla proficiuntur, exortus est, eadem certè ab arteria & uena, quædam exigua propago in spinalem medullam inseritur. Finis autem uasorum, quæ sursum ad caput usque feruntur, postquam egressæ primum est spondylū, bifariam diuiduntur: atq; altera quidem parte ad cerebrum posterius intro fertur: reliqua uero ad musculos articulo capitis circumfusus diffeminatur, finibus uasorum quæ in tenui meninge sunt locata, seipsum conuolgens. Nam musculos qui sunt in superficie, & cutem, uasorum propagines quæ in scapulis sunt, contextunt. Nulquam enim in corpore ullum reperias musculū, qui uena & arteria careat. Iam uero arterias quæ in axillis ad manus diuariantur, ualidis quibusdam glandulis natura (ut non facile rumperentur) iuxta diuisiones corroborauit. Est præterea iugum arteriarum carotidum, quod fertur sursum rectum ad caput, in profundissimis colli partibus abditum. Cuius quidem utraq; arteria quam diuidatur bifariam, & altera sine pars retrorsum, altera uero magis antrosum uergat, rursus hæc utraq; que in duas alias diuiditur. Deinde altera pars eius quam antrosum tendere diximus, ad linguam accedit, & internas maxillæ inferioris musculos. Altera uero magis quidem in superficie, quam illa, est locata: magnis tamen & ipsa glandulis tecta, sursum ad interiora aurium, usque ad temporalem musculum, fertur: ibiq; diuiditur, atque à posterioribus sursum usque ad uentrem tollitur. Reliqua uero arteriæ carotidos pars, quam retrò magis ferri dicebam, diuiditur & ipsa in duas partes maximas. Quarum minor, retrò magis ad basim cerebelli ascendit, magno ac prælongo ipsam excipiente foramine, quod est in fine futuræ labiodialis. Reliqua uero, anterioribus partibus per foramen quod osi lapideo inest, sursum fertur & ipsa, ad plexum retiformem, qui toti basi cerebri subiacet, & ex memoratis arterijs textitur. In cerebri autem ipsum, arteriarum haud exiguum iugum ascendit, ex quo plexus *choroideus*, qui est in illius uentriculus, gignitur. Vt uero summam dicam, natura in facie & toto capite, arterias quidem quamplurimas cum arterijs, uenas autem cum uenis, tum à dextris ad sinistram, tum ex sinistris ad dextra, tum à posteriore parte ad anteriorem, & rursus ab anteriore ad posteriorem, & ab externis intro, & ab internis foras ducentes, committit. Commiscetur autem arterijs uenis, & uenæ arterijs, & utraq; lix nervis, & his ambobus nervi in toto animalis corpore. Etenim cuiusq;

Renem posito
sit inæqualis
lenem.

Lac & semē ex
sanguine exacte
cocto gignantur.
Venas rursus
circa testes &
mammæ, cum
grauia sit
chus.

Testiformi plexu.
Arteria nutrit
animalem spiritum
tamen cerebri.

Arteria subiacet
vena circa
ultimum spinæ
spondylum.

Matricis uas.

Supinum glandule quorū
productæ sunt.

Musculos ualidis
debentur ar
terias, nec uena.
Glandularum
rima.

Ceruidem arteriarum
duas
se præterit.

Retiformem plexum
esse ueni hæc
si cerebri subiacet.
Venas *choroideas*.

Complicari inter se uenas in
feruntur in corpore.

*Uenis defunctas
esse arterias &
venas.*

*Alimentum omni
bus partibus in
greditur.*

*Arteriam nulli
reparari sine sua
venâ.*

*Alimentum do-
bit aequali esse
copiâ materiæ
defunctæ.*

*Elæphantum quæ-
dam corpora ma-
iores, quæ mi-
norem patiun-
tur.*

*Frigitur opera.
Calore operis.*

*Pulmoni omnia
invenit, quæ ad
colorem vacua-
tionis pertinent.*

*Quoniam substanti-
am non solui
facile.*

*Venam nonquid
ab arteria re-
linquitur.*

*Vena ab alijs ar-
terijs.*

cuiusque partis arteriæ & venæ sunt omnino sen-
sus expertæ, sine illas frangere uelis, siue utere,
siue incidere: id quod cognoscere, uerius eiusdē
partis uinculo excepta. Inferunt autem ea uasa
in partes sibi circumscissas, tenues quasdam pro-
pagines: uenæ quidem in numero interdū quam-
plurimas, & magnitudine insignes: arteriæ au-
tem, tum pauciores, tum mole inferiores: mit-
tunt tamen & ipsæ. Causa huius est, quod partes
tenues omnes alimento indigent, calidæ, frigida, du-
ræ, & molles. Vt autem caloris naturæ modus ad
unguem seruetur, non amplius similiter omnes
postulant. Nam partes naturali temperamento
frigidæ, uel si ad ultimum aliquando frigiditatis
peruenierint, sustinent tamen & uiuunt, & rur-
ius sine dolore, pristino calori restituitur. Quæ
sine arteriis uenas quasdam reperire licebit:
sed arteriam nullam sine sua cōiungere uenâ. Con-
iugem autem intelligo, quæ propter eundem
usum existerit. Quam igitur nutriti corpora sit
necesse, quod ea uacuatur, alimentum sit æqua-
le est necesse, copię substantiæ effluentis. Desinit
aliter plurimū à calidis, mollibusque corporibus, &
his quæ assidue aut uelociter mouent. Minimu-
m uerò à frigidis, aut duris, & quæ modera-
tas obeunt actiones. Frigus enim corpora den-
sat, cogit, confringitque, ac prohibet substantiæ
defluuium. Calor autem contrā, corpora rarefa-
cit, liquat, tenuat, & digerit. Rursus, quod ad ip-
sum substantiam attinet, quæ durior quidem est
& lapidea, permansens est, nec facile dissipatur:
quæ uerò humida & mollis, celeriter quidem à
calore in halitus soluitur, eoip citò exhalat, ac
perit. Pulmoni igitur omnia insunt, quæ ad ce-
lerem uacuacionem pertinent: nam & mollissi-
mus, & calidissimus est, motuque agitur per-
petuo. Omnis uerò insunt, ueluti ex diamet-
ro, cum eo pugnantia: etenim frigida sunt & dura,
bonamque rotius uitæ partem quiescunt: ob
quæ nimirum causas perdurat ipsorum substan-
tia, neque soluitur facile. Ne igitur mireris, si quæ
natura iustissima exiguas adeo tribuit uenas, ut
ne clare quidem cernantur: pulmōni uerò, ue-
nâ maxima fit à corde implantata. Duas itaque
partes inter se comparauit, quarum altera quæ-
dam plurimo, altera uerò paucissimo alimen-
to indiget. In medio autem harum sunt reliquæ
omnes, quarum alix quidem magis, alix uerò
minus uacuatur, nutriti postulant. Nusquam
autem uenâ ab arteria relinquitur: sed ubi
uas arteriosum uideris, ibi necessum est uen-
nam etiam adesse: paucis tamen uenis in corpo-
ra, quæ ad quoniam pertinent, sine arteriæ di-
uisa. Porro quia uenâ caua primis fertur sursum
à gibbis hepatis, iam inde propagines magnas
ad septum transuersum mittit. Vbi uerò ipsum
cor artingit, ibi eam quæ octo costas utrinque
alit, producit. Quædam uero in cruri-
bus, ita etiam in extremis & anterioribus bra-
chij partibus, natura sine arterijs proprias dis-
seminauit uenas per superficiem. Et quemadmo-
dum ipsum brachium & crus uenâ una alundat,
ita in pericne colli altera uenâ iugu-
laris siue coniuge
cernitur.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium lib. XVII.

At uerò partis actio, ab eiusdē usu differt:
quod actio quidem motus actuum sit:
usus uerò nihil aliud exiit, quam apti-
tudo ad utendum. Porro dixi actionem esse mo-
tum actuum, quod plerique moniti sicut patien-
do, quos sanè passiuos nuncupat: qui tunc par-
tibus seipsam accidunt, quam ab alijs mouen-
tur. Atque motus sanè inest oisibus, ita in
brachijs & cruribus sunt, sit in musculis illa mo-
uentibus. * Ceterum si ad primū moueus (quod
est principis animæ facultas) ipsos musculos cō-
pares, rationem instrumenti habebunt: si uerò
ad id os quod mouent, non modo hanc, sed opi-
ficis etiam rationem sortientur. Idcirco prima
utilitas animalibus ab actionibus ipsis accedit,
secunda à partibus. Nullam siquidem partem
propter seipsam habere cupimus. Superuaca-
na quippe esset, si actione esset orbata, & ab-
scindenda potius, quam optanda. In omnibus
autem animalium partibus, unā cum actione ip-
sorum, usus etiam adesse consuetus: quemadmo-
dum, exempli gratia, uidere est in elephantis pro-
boside, quæ parte, etiam aliquando ea mihi uisā
fuerit ociosa, animal tamen ipsum, ceru manibus
quæ maxime insunt, utitur, ac per eam etiam, perso-
rata quā sit, uelut per nares quasdam respirat.
Sunt igitur in uniuersum opera naturæ admi-
randa, quæ præter partium omnium æqualita-
tem, actiones etiam exhibuit, ac præterea statim
ut fuit genitum animal, ipsum earum usum edo-
cuit: ac breuiter, nō solum proportionē omniū
membrorum extrinsecus, more statutoriorū, sed in
profundo etiam seruauit. Siquidē Polycretus ca-
nonem illum suum tam celebrē affabre faciens,
naturā esse imitatus, in quibus porcum esse imi-
tari. Potuit autem in solis externis partibus, in qui-
bus artem considerauit. Sunt itaque opera natu-
ræ digna quæ suspiciantur: cuius nimirum arte
& industria, ex multis omnia ferē optime fiunt:
quæ tamen à fortuna ipsa, ex innumeris con-
tingat fortē fieri rectē unum tantum, aut alterū.
Quis igitur ex ortu & structura animalium non
statim concipit animo, mentem quandam esse,
quæ uim habeat admirabilem, quæque terras om-
nes peruadens, in omnes orbis partes extendit-
ur? Vbiq; certē animalia procreari uideas, quæ
construccionem habent dignam admiratione.
Quænam quænam uniuersi pars ignobilior
est terra? Attamen mentis quædam cernit ad ip-
sam à corporibus superioribus peruenisse: quæ
si quoniam contemplatus fuerit, statim substantiæ
pulchritudinem admirabit: primum ac maxi-
mè solis: post ipsum, lune: dein de syderum: in
quibus par est, quantō corporis substantia eis est
purior, tantō etiam mentē inhabitare, quā in
corporibus his terrestribus, & meliorē & perfe-
ctiorem. Quam enim in limo, in colluue, in pa-
ludibus, in plantis denique ac fructibus putrescen-
tibus, à animalia gignantur, quæ mirificas condi-
toris uires ostendunt, quid de corporibus supe-
rioribus est putandum? Licet autem * ratiocina-
torem quandam naturam, etiam uim uel in

*Actio parit, et
motus actuum.
Vius partis, et
aptitudo ad uten-
dum.
Motus passiuus
par.*

*Utilitatem pri-
mam animalibus
ab actionibus
accidere, secun-
dā à partibus.*

*Partes nullas pro
per seipsam ha-
bere cupimus.*

*Partium actio-
nis semper etiam
usum esse consu-
tum.*

*Elephantus uti
proboside tan-
quam manum
et per eam res-
pirare.*

*Polycretum in
canonem suum il-
ludens, fuisse imi-
tationem natu-
ræ.*

*Fortunam reperi
quædam recte
operari.*

*Terra infusam
esse uim superio-
rum corporum.*

*Mentem habi-
tare in syderi-
bus tanto melio-
rem et perfectio-
rem, quā in
corporibus his ter-
restribus, quā
in substantia il-
lorum est parit.*

Ratiocinatri-
cium maxime in-
fje bonum.

Divina me-
tem esse exco-
lam per athen-
arbitrat Gal-
gram.

Opus de v-
partum effici-
tibus nam per
felicem elen-
tem veru prin-
cipium qua lau-
ge medicina est
maior.

Opus de v-
partum effici-
tibus nam per
felicem elen-
tem veru prin-
cipium qua lau-
ge medicina est
maior.

ipſis hominibus cernere, ſi Platonem, Ariſto-
tem, Hipparchum, Archimedeſem, & complures
alios cõtemporis accuratiſſimè. Stigetur in ran-
ta collaue (quo enim alio nomine quis appellet
id quod ex carne, ſanguine, pituita, ac bile utra-
que eſt conſtitutum) mens gignatur ad eõ eximia
& excellens, quantam eiſdem putandum eſt
eſſe excellentiam, in ſole, luna, alijsq; etiam ſyde-
ribus? Mihi quidem dum hæc mecum uoluro,
non exigua quiddã mens talis, per ipſum etiam
nos a tẽrem ambientem, eſſe extenſa uideretur. Fieri
enim non poteſt, quum lucis ipſius Solis ſit
particeps, quin uim etiam ab ipſo aſſumat. Quæ
omnia qui exquisitè perpendit, tum ſapien-
tiam opificis, tum humanæ mentis prerogati-
uam intelligit: ac deniq; hoc opus de uſu par-
ticularum, quod prius deſpiciebar, tanquã exi-
guum, perfectiſſimæ theologiæ uerum princi-
pium conſtituit, quæ theologia multo eſt maior
atq; præſtantior tota medicina. Idcirco non ſoli
medico, opus de uſu partium eſt utile, ſed multo
certè magis philoſopho, qui totius naturæ ſcien-
tiam ſibi cõparare ſtudet, *circa cuius in daga-
nonè nos conſeſcere oportet. Nec uero in ſo-
lo homine uidere eſt ipſam ſummã artem na-
turæ, ſed quocunq; animal diſſecare uelis, parẽ
in eo inductũ opificis, & ſapienſiã repenes. Et
quãto ipſum minus fuerit, tantò maiorem tibi
excitabit admirationem. Quod declarant opifi-
ces, quum in corporibus paruis, aliquid magnũ
ſculpunt quemadmodũ is, qui nuper in annulo
exiguo Phædonia quatuor inuectum equis ſcul-
pſit, ſpectaculum retè incredibile. Quanquam
horum nihil ſtructuram eruris pulcric ſupera-
bat. Quum igitur tanta opificis ars uelut aucta-
rium atq; pãrergon quoddam in ram abiectis
animalibus eluceſcat, quantũ eius uim ac ſapien-
tiam, in præſtantiorib. in eſſe putabimus? Vnum
igitur ex hoc opere ac maximũ, non ut medicina,

ſed ut naturæ ſtudioſis, hoc nobis accedit com-
modũ, nempe facultatis (quæ in eĩ conditori) co-
gnitio. Secunda autẽ utilitas eſt, ad affectus par-
tium, quæ intus in alio corpore deſiſcunt, co-
gnoscendos: quã ad rem, actionis cognitio ma-
gnum habet momentum. Quandoquidem qui
iam exploratũ habet, quod actio erurum eſt a
mbulatio, ſi quem uidet qui ambulare nõ poſſit,
ſtatim iudicat partem eruris aliquam eſſe affe-
ctam. Sed quemadmodum in actionibus, ita &
in utilitatibus res ſe habet. Vt enim ambulatio
tolitur, ſi nerui ac muſculi qui eruribus inſunt,
affecti fuerint: ita tollitur, ſi os aliquod fuerit
fractum, aut ſua ſede dimortum. Si uerò neſci-
mus, quod per offa eruribus innitatur, haud-
quaquã ſcire poſſumus, quod offibus læſis ani-
mal etiam lædatur. Eoq; modo ſit, ut ad cogno-
ſcendum quẽnam pars ſit affecta, non minus con-
ſerat utilitatem quãnam actionũ cognitiõ. Eadem
eſt ratio & de futurorum præcognitione. Nam
qui affectus inſunt eruribus incurabiles (ut luxa-
tiones quæ cum ulcere incident, aut peruſſio-
nes coxendicum) inſanabilem in futurum tem-
pus ſignificat ambulatiois noxam. Tertia, præ-
ter prædictas, huius operis utilitas eſt aduerſus
ſopliſtas, qui nobis nõ cõcedunt crifes morbo-
rum à natura fieri, quig; ipſam ullam animarũ
habere rationem quẽnam pernegant. Iam uerò in parti-
bus quibũdam ſcõdendis, aut circũdendis,
aut abſcõdendis, quemadmodum & in eximen-
dis ſagittis, uel iaculis, qui partũ utilitates pro-
bè caluerit, præſcribet quæ nam audacter & ſe-
cure, quã uel trepidè & cauè incidere oporteat.
Hæc igitur tot ac tanta huius, quod ad umbilicum
iam perduximus, operis cõmoda, libere iſte, uelut
ti bonus quidam ſagittarũ, explicat.

Commoda qua
partum effici-
tibus nobis
accedit.

Atheni regni-
tibus placitũ con-
ſert ad cogni-
tione affectus
partum, quæ in
alio corpore de-
ſiſcunt.

Utilitatem non
minus quã a-
ctionum cogno-
ſcendi ad co-
gnitiõem af-
fectus ſeruat.

Oris morboſi
fieri à natura.
Utilitatem par-
tium cognitiõ,
diuturni facit
intrepidus.

GAL. LIBRORVM DE VSV PAR-
TIVM FINIS.

ILLVSTRI AC GENEROSISSIMO

VIRO, D. D. FERDINANDO, COGNOMENTO A MEN-
dozza, literarum patrono, Andreas Lacuna, Sec. Doc.
M. Miles Sancti Petri, S.



Ommensarios Galeni de placitis Hippocratis & Platonis à me haud ita pridem elabo-
ratos, atq; (ut ita dixerim) ad meliorem frugem redactos, multis de cauſis adductus
ſum, tibi dicatrem, Ferd. generoſiſſi. Primum, quod rationi eſſe conſonum ducerem,
ut aliquantulus ad te rediret mearum meditationũ fruſtus, qui ſouere indies illas atq;
prouehere non deſiui. Den, quod te conſpicerẽ diuino quodam affectu præditũ, ſapienſiãq; arden-
tiſſimo amore inſtigmatũ, diu noctũq; ipſe philoſophiæ incumbere, eiũ, nauare haud inſtrenuũ ope-
ram: ac prouide corũ philoſophorum dogmata ſore tibi non minus accepta, quã tu ſtudijs apta,
ſperarem. Quocirca ut officiũ meum obſeruantiamq; erga T. Dignationẽ reſtiter, ſimulq; lucubra-
tionibus meſis conciliare patronum optimũ (qualem hæc virulentiffima ætate omnes in genere ar-
tes & diſcipline deſiderant) non alia fieri poſſeratione apud me exiſtimau, quã ſi nominis tui
preſtatione illuſtratũ, id ipſum laboris quod eſt, ederetur in lucem. Tuum igitur eſt, Vir clarĩſſi, hæc
ſce noſtras nentigam præmiſſendas, vultu hilari in tuos ſenſus excipere, exceptaq; cõtra vi-
ros maleſeruiatos defendere: ut verè ſis id quod ducis, Philanthropos, φιλανθρω-
πος, philanthes, φιλάνθρωπος. Vale. Venetijs,

XII. Cal. April.

GALENI PERGAMENI
de Hippocratis & Platonis placitis, lib. II.

Non primus desideratur etiam in graeco exemplari.

Animam delitescere in corde, quibus Chrysippus per rationem autatur probatur.



RORO Chrysippus his friuolis assumptionibus, animi rationalem delitescere in corde persuadere conatur, quod dum animi sententiam exprimimus, atque indicantes nos ipsos, hanc uocem, Ego, proferimus, in priori syllaba, E, os & mentum inferius ueluti ad pectora deducamus: quodque etiam manu interdum admo-
neamus pectori, similiter indicantes nos ipsos: ut cum dicimus, mihi hoc conuenit. Ceterum quod etiam nasum similiter homines quandoque attingunt, ad quem hoc da, tamen in eo anima non resideat, omnino esse oblitus uidetur. Cur autem, dum obcedimus aliquid annuentes capite, in quam partem ipsum flecimus, in illa principium animi esse potius ostendimus, quam in ea quae mouet? Et enim quae primum in nobis mouetur particula, quam annuimus, cum nimis probabilius est animi principium in se continere, quam aliarum ullam, ad quam motu perferatur: ut interim illos homines non commemorem, qui capite reuoluunt, cum assentuntur. Oportebat itaque ab ipsa rei substantia, quam tractabat, Chrysippus orsum, tum per conuenientes, tum per proprias assumptiones inuestigare. Nam quae demonstrationes ab ea rei substantia recedunt, ut minimè scientificae sunt, sic eas aut exercitatorias probabiles uel, siue dialecticas, aut rhetoricas, aut denique philosophicas nominaueris. Ac traditum sanè à ueteribus de singulari est: de philosophicis quidem, in e-
lenchiis de rhetoricis aut, in rhetoriciis artibus: in topicis, de dialecticis: sicut in libris de demonstratione (quae dicuntur secunda analytica) de scientificis: in quibus omnibus, qui rectè demonstraturus est, sese oportet exerceat. Quia igitur propositum est nobis considerare, num animae principatus in corde consistat, omnia quae cordi insunt, & à quibus demonstrationes desumi possunt, dinumeremus. Cordi sanè insunt, situs, magnitudo, plexus, conformatio, dispositio, & motus. Situs autem est cor, thoracis quidem ratione, quodammodo mediū magis: totius uero animantis respectu, tantò superius medijs partibus eius, quantò ab umbilici regionibus (quae à tamulism sunt mediae) distat. Versus ipsam etiam arteriam asperam, per quam respiramus, ita quodammodo situm est: ut per medium pulmonē ei cōmittatur. Nam ex sinistro cordis uentriculo arteria quaedam uenosa in pulmonē fibras disseminat, ad cuius quidem numerosas propagines, siue asperae arteriae perueniunt, quae & ipsa in totum uiscus simili distribuitur modo, quo arteria uenosa. Quin etiam iuxta pulmonē ita locatū est cor, ut extrinsecus ab eo undique cōtegitur. Verum neque ex situ, neque ex cōmune cordis cum illis partibus, licet eius quod petimus scientificum ullum argumentum discere: quandoquidem nondum per ea colligitur, cor

Secunda analytica.

Cordi quae insunt.

Cordi situm, positum.

Umbilici regione in toto corpore sita ad amplexum mediastini. Arteria arteria uenosa cordis pulmo.

sentis motus uoluntarij principium esse: quod admodum neque etiam quod cor uocis opifex sit, qualis est quorundam sententia. Et enim uocis instrumentum & primum & peculiare, est summa pars gutturis, quae Graeci larynx uocant. Si igitur intra ipsum alperā arteriam incideris, non amplius animal uociferari audies, et si respirare ipsum sine impedimento, etiam uideas. Iam uero thoracis musculos, unā cum his qui in abdomine sunt, quum animal uocem molitur arde re, uehementer extendi cōspicis, corde nullam nouam insuper actionem interim acquirente. Nō itaque spiritus qui ab imo sursum effertur, priusquam ab ipso concinnetur larynge, uocis habet specimen, sed solius tantum sibi. Ista autem & supremi asperae arteriae finis cartilaginibus, ueluti plectris quibusdam, efflatio haec, uox efficitur. Ceterum composita est summa gutturis regio, larynx dicta, ex tribus cartilaginibus, quas complures muscoli mouent, tanquam motus uoluntarij instrumenta. At muscoli, ut ipsi moueantur, neruos à cerebro orientes requirunt. Ex quibus si aliquem fune interceperis, diffecue risue, itatim immobile illam musculū reddes, in quem insertur neruus: immobile etiam animantis membrū, quod prius à musculo mouebatur, quum neruus esset incisus. Ac fit quidem ab alijs instrumentis, musculis & neruis, inspiratio libera, qualis sanis adest nullo forti motu agitante: ab alijs autem uolenta, quam efflationem appellare solemus: ad quam perficiendam uidebis omnes scapularū particulas simul attolli. Est tamen proprium uocis instrumentum larynx, ac tum eius motores muscoli, neruū à cerebro in musculos ipsos demissū: deinde lingua, quae non uocis modo, sed loquelae etiam instrumentum existit. At uero pulmo, à thorace motus, distentus quidem, exterius aërem, id quod est inspiratio, attrahit: contractus autem, eundem in asperam arteriam, atque in os ipsum, extrudit: quod opus est expiratio. Atqui, si uox ab eo, qui in corde est spiritus, fieret, non aboleretur situm, neruis quibusdam uel in collo, uel in capite sitis: multo minus aut contracto aut uulntrato cerebro, aut spinali medulla dissecta: sed potius oblatio corde, id quod non accidit. Et enim si nudaueris cor, contuderisq; ipsum atque deprefferis, nec uoce, nec spiratione, nec ulla prorsus uoluntaria actione impediri animal cernes. Quod si minimè perforaueris concuitaliter thoracis, licet tibi etiam uniuersum ac semel cor ipsum eximere, illius uoluntarij actionibus: id quod in nonnullis sacrificijs cōtingit, in quibus animantia cernuntur, corde iam aris imposito, non respirare tantum, aut clamare fortiter, sed etiam fugere, quousque perfusio ne sanguinis cōmorian- tur. Cerebrum autem obitibus si detexeris, aut quencunq; ipsius sinum compresseris, nō mutum duntaxat, ac protinus spirationis expertus efficies, sed etiam omnino sensu, omnibusq; arbitrarijs actionibus animal ipsum priuabis. Porro tauris, quibus spinalis medullae origo iuxta primam uertebrae diffecatur quodidē, simul cum sectione ipsa, motus, respiratio, & uox exoluntur, illa quoque motu cordis & arteriarum: quod ipsa

Larynx est primum instrumentum uocis.

Thoracis muscoli. Abdominis musculi.

Vox quae ratio ne efficitur.

Larynx ex tribus cartilaginibus consistit.

Musculi mouent uoluntarij instrumenta.

Nerui produciuntur à cerebro, largiri sibi musculi motum.

Inspiratio libera.

Inspiratio uolenta.

Lingua, uocis & loquelae instrumentum existit.

Inspiratio quid.

Expiratio quid.

Corde nudato & contracto, uel le pressu uoluntaria actio animalis.

Corde iam aris imposito, animantia respirare, clamare, & fugere. Cerebro detecto obitibus aut compressis, non uoluntaria, quand accidunt.

pulsandi uis, à cerebro non descendat. Vt enim pulsatio ipsa motus alterius generis est, sic etiam principiorum alterum non indiget altero. Quare neque respiratio, neque uocis, cor existit principium: tamen propter illud maiori ex parte contingat fieri respiracionem. Argumenta autem Zenonis, Diogenis Babylonij, & Chrysippi, quibus freti, in corde rationalem animam habitare, ab eodem emitti uocem contendunt, in hoc unum ferè conspirant omnia: Vnde uox ac sermo eliditur, illic necessum est fiat ratiocinatio, intelligentia, & meditatio omnis, ibidemque etiam mens delitescat. (Est enim sermo ueluti mentis nuncijs, qui ex ea procedit: nec alia existit uocis origo, alia animæ pars præcipua) Atqui uox & sermo, qui uox articulata est, à pectore proficiuntur, cum per asperam emittantur arteriam, id quod non fieret si à cerebro emitterentur.

Mens igitur & omnes eius actiones, in pectore, ac præcipue circa cor, non in capite, delitescunt. Quæ quidem argumentaria facile redargui potest. Primum si quidem, dum sinus obseruantur propinquitatem, aiunt, si ex cerebro sermo oriretur, non per asperam arteriam procederet, perperam hallucinantur: cum nimirum mens ipsa, aut uoluntas (siue eam in cerebro, siue in corde posueris) quælibet instrumenta, nihil longissime sita, actum mouere possit, nihil ex intervallo, ad celeritatem, impedimenti recipiens. Vt enim nullum sensibile tempus est, interea dum particula uulneratur, & ipsum animal sentit: ita nec interim dum homo respirare aut loqui uult, atque ipsam actionem obit. Quare nihil prohibet, quod minus uoce per asperam arteriam emissâ, cerebrum motus asperæ arteriæ sit causa. Falluntur etiam secundum, sermonem procedere ex mente dicentes. Sermo quippe, aut uox significatiua, à mente (quemadmodum uoluntaria omnia) non tamen ex mente, sed ex summo guttore, quod larynx dicitur, proficiuntur. Prius autem nondum uox, id quod effertur, existit: sed materia quædam uocis (quam efflacionem aut subulum uocamus) ex asperis arterijs profecta, quarum nulla cor attingit: id quod certe sensui manifestum cum sit, fidem ex seipso facit. Ergo non dicemus, ut illi, unde sermo emittitur, illic etiam ratiocinationem fieri: sed, à qua parte sermo emittitur, secundum illam quoque, & in illa fieri ipsam ratiocinationem, quæ principis animæ est actio. Licet namque pro mente, principem animæ partem diceret, sicut & dominantem, imperantem, præsentem, ratiocinantem, atque intelligentem. Iam uerò cum tria uerborum genera, uenæ scilicet, arteriæ, & nerui, cerebro cor connectant: si primum quidem ea in superiori & inferiore ceruicis regione funiculari exceptis ualidis, ne sanguinis perfusio magna sequatur: dein autem, unculorum medium secueris: uidebis planè, ipsa quidem neruis qui iuxta arterias consistunt in cuneis, statim obmutescere animal, illis alijs uniuersis actionibus arterijs autem solis aut festis, ut interceptis, minime reddi animal mutum, priuari tamen pulsus omnes quæ supra uulnus aut unculum sunt, eius particulas: ipsæ quæ infra consistunt, semper eodè

modo pulsantibus: uenis denique aut incisis aut interceptis, nullam manifestè aboleri functionem. Vnde liquidè cõstat, neq. cor, ad pulsus motum cerebro egeret: neq. cerebrum corde, ut sentiat animal, operetur pro uoluntatis imperio. Porro si intelligèd, dicens, docèdoue, nullus insignis motus in corde apparet: in omnibus aut perurbationibus si manifestè innotescit (quod etiam Chrysippus confirmat) clarum utiq. euadit, ratiocinacionem animæ facultatem nò esse in corde: irrationalem autem, & affectibus obnoxiam, in ipso comprehendi. Ceterum qui per cardiogram cor dolere autumant, uocis æquiuocationem nò sentiunt, qui nimirum os uentriculi neteres cor appellabant. Quæ pars cum ab acris humoribus irritatur, tali sensu tristitia afficitur: id quod maxime ipsi contingere solet, qui impendit diutius à cibo abstinentur, præcipue post exercitationes uelimentes. Nam exercitatus ualentius, in uentriculo flaua bilis colligitur, à qua morsus, cardiagia laborant. Ad hæc autem, etiam si concesserimus, cor primum omnium particularum formari, nò ob id tamen inferre oportebit, cor initium facultate existere, sed secundum generationem. Quid autem cor primum omnium particularum moueri incipiat, atque ultimum cesserit, ostendit quidem, id motus initium esse, nò tamen omnis, sed solius qui in pulsibus est: qui genere à uoluntario differt, cuius cerebrum origo existit. Quid si nobis obijciat, in corde copiam nervorum conspice: respondebimus, non nervos, sed nervosa quædam esse corpora in corde, quæ specie solium neruis respondent, nò aciuoue & usu. Dicunt præterea, in corde consistere nutritionis animalium originem, ac prouide in eo uim ratiocinatricem esse debere. Verum in utroque mentuntur lemmata. Nam primum nutrimenti principium fuit os, stomachus, & uentriculus: alterum, medulla: uenæ, in quibus primis fit sanguis: tertium iecur ipsum: quartum post iecur, uena caua, in qua prima purus à recrementis sanguis relinquitur: ab hac enim, quemadmodum alix omnes animalis particular, cor alimentum accipit. Sed nec si cor nutritionis esse principium admittimus, consequens esset, in qua parte id genus principium est, in eadem ratiocinatricem facultatem haberi. Præterea ubi aiunt, unde spiritus suggeritur, ibi dem esse animæ principatum: cogimur id concedere, si quidem de animalis spiritu intelligit. Vbi uerò postea subdunt, ex corde spiritum iuppeditari, ueralem quidem fatebimur, animale autem nò item. Quid si neutrum horum spirituum intelligere se fatcantur, sed naturalem, qui sicco humidoq. alimento proportionè respondet, aduent dicentem Hippocratem: Principium alimenti spiritus, os est, natus, aspera arteria, pulmo, ac reliqua perspiratio: quibus sanè instrumentis initium motus à capite nos transmitti fatemur. An uerò animæ substantia sit euaporatio siue ex alimento, siue ex spiritu, hac de re nihil ad præsens in dubium uertimus, ne per omnia Diogeni uideamur infestis esse, qui sanguinem esse animam, ut Empedocles &

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Critias, existimauit.

Cor uox, respiratio, non, neq. uox principium est. Anima sedem in corde esse, quibus argumenta probantur uerum.

Mens, ubi, cor, ea sit, qua libet instrumenta, ut longissime sita, sublimè sita, sublimè mouere possit.

Sermo à mente, nò ex mente, sed ex summo guttore proficiuntur.

Ratiocinatio, esse principium animæ alibi. Mens uoluntaria.

Cor per qua uia cerebro caua clauit.

Cor ad pulsus motum non est cerebrum. Cerebrum nò est cor, ut sentiat animal.

Animæ irrationalem, affectibus obnoxiam, in ipso comprehendi.

Os nutrimenti ueteres cor appellabant.

Os nutrimenti quibus præcipue nutritur.

Cardiagia.

Cardiagia.

Nutrimenti principium.

Medulla uenarum prima in quibus fit sanguis.

Canalis uenarum per quem sanguis transiit.

Spiritus ueralem à corde nascitur.

Spiritus naturalis.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

Primum nutrimenti principium.

GALENI PERGAMENI
de placitu Hippocrati & Plato-
nis lib. I. II.

Quod sane necessarium existat, non solum medicis, sed philosophis etiam, nosse, quod genere sint, & quales secundum speciem singula, quamvis potissimum animantis particulam occupent, facultates corpus nostrum regentes, primo libro demonstratum a nobis est. Secundo autem, de sompniis differentiam sermonem habui: quae quidem in numerum sunt quatuor. Nonnullae quippe ipsarum, ab istis quae particulae insunt, iuxta problemata substantiam sumunt: aliae uero ab istis sane quae insunt, non tamen secundum id quod propositum est, ac de quo quaestio habetur: aliae ab externis rebus, ut rhetoricae: aliae denique a principibus sophistici, uocularum ambiguitate & impostura obaerant. De quibus cum iam differenter (id est illorum qui eis utuntur, exemplis propositis) operae pretium uidetur nunc in tertio hoc commentario, numerum & substantias facultatum docere, numerumque etiam atque discrimina eorum quae illis accidunt. Satis autem mirari non possum, uidens Chrysippum, qui debet ostendere, animam rationalem in corde domicilium habere (est enim hoc illius dogma) sese nimis anxie torquentem, ut tum rationibus, tum innumeris poetarum exemplis (quae breuitatis gratia praetero) irascibilem facultatem, perturbantibusque obnoxiam, in thorace habitare demonstraret: id quod iam pridem est a ueteribus demonstratum: qui quidem feruorem innati caloris aliquem in corde per iracundiam oriri dicunt: cuius ratione accidit, ut tota facies infestior, corpus uniuersum rubefcat, in calefactis, & uehementer cor una cum animantis arteriis subsistat: quae omnia pulchre describit Plato in Timaeo. Ad haec uero, cum debuisset Chrysippus, quae suam quidem fonsententiam, ea tantum testimonia poetarum eligeret: quae euerunt autem, & labefaciunt, explodere: ille sane ex quo omnium meminit: imo uero maxime praecipua, & quae ipsi patrocinabantur, omisit. Quae sunt illa:

*Iuppiter exiit tunc ipsi ex pectore mentem. &
Consilium Neptunus meum, hoc in pectore nostri.*
Non mihi stat talis sententia pectore.

Haec igitur testimonia sola, & similia alia, quae rationalem uim in corde sitam esse portendunt, seligere conueniebat Chrysippum, si omnino testibus litteris dirimere statueret. Nam numerosa illa quae adduxit, tametsi uera sint, eius tamen prorsus opinionem deiciunt, praesertim quae iracundiae manifestò aduersantem faciunt rationem: ueluti & haec sonant:

*Petrus sed ferens ipsum cor increpat ira:
Sufficit & hoc cor, nam grauiora aliquidde tollit.*

Haec siquidem Vlysem ad se dicentem introduxit Homerus, cum ob ea quae ab ancillis domi agi uideret, calor in corde ipsius efflueret: & animus, siue iracundia, ratione deuicta, ad inemptum militum punitionem, ipsum iam ut praecipitem actura esset. Nam quam equus ad equum, aut uenator etiam ad canem, rationem

obtinere, hanc ratio ad animum, siue iracundiam. Etenim imperare in omnibus & praualere iustus est, id quod natura praecellit: equitem sane equo, uenatorem autem cani, necnon iracundiae rationem. At non semper accidit, ut tale coniugium, lege administratur naturae. Verum quemadmodum equus, nonnumquam refractarius & conuulxus, non pro decoro clarus, infestorem uirum imbecillitate, aut equestris scientiae ignorantia uictum, simul secum rapit, trahitque longius: sic iracundia effrenata, & ad praecipitem undictam erumpens, rationem interdum imbecillam, ignaramque, unum secum solet praecipitare. Si igitur robur scientiamque habeat, uincet nimirum & rationem (quale exemplum in Vlyse proponitur) & auriga equum. Sin autem aut alterutro, aut utroque priuerat, periculum ibi est, ne id quod praestantius est, a deteriore uincatur: id quod certe in Medea contigit. In qua quidem, priusquam filius occidendis ad moliret impietas manus, diu multumque ratio reluctata cum iracundia est. Nouerat enim quum impium facinus perpetraret. Ceterum postea tandem a perturbacione deuicta, ipsi iracundiae concessit, dicens:

*Noua equidem cuiusmodi faciam mala,
Sed fortior iracundia consilii meo.*

Nouit itaque magnitudinem malorum, quae erat perpetratura, a ratione edocta. Verum iracundiam longe fortorem esse ratione aut, ac propterea se ab illa uiolenter ad scelus perpetrandum adduci. Vlysses autem contra, ratione iracundiam coërcuit. Saepe igitur in alio irascibilem animae partem ratio adeo superat, ut ne pugna quidem euadem ipsis inter se oritur, sed hoc dominatur, illa obtemperat: id quod sane ista adest, quod ad summum philosophiae peruenerunt. Rursus iracundia subinde irae rationem uincit, ut imperet, ac ducat perpetrare: quod admodum in multis barbaris, & pueris nauia iracundis, necnon in ferarum non paucis, & hominibus belluinis uidere licet. Est quum ne alterum quidem insequendo ualens sit, ut statim alterum trahat: sed aduersantur inuicem, pugnantque, & temporis spacio alterum uincit: ut in Vlyse quidem ratio, in Medea autem iracundia. Quas animae aut partes aut facultates maxime inter se differentes, Chrysippus quum in unum confundat, carminum tamen Vlyssae & Medae meminit, quae eundem ipsius opinionem subuertunt. Taceo etiam Chrysippum, qui leonibus iracundiam ademit, carmen illud Tyrtaei inter alia adducere, Leonis animum continens in pectore: quod leonibus maximam inesse iracundiam suadet. Et quom pronunciet, ideo nonnullos uocari excordes, quod uniuersi homines animae principatum in corde itant: miror sane quod non intelligat, nullum stolidum aut imprudentem, excordem dici si illos quidem omnes, uacuos cerebro: mentulosos autem, excordes: sicuti & euisceratos eos, qui nullo affectu mouentur: omnibus nimirum putantibus, in cerebro quidem rationem, in corde iracundiam consistere. At quia tertium quoque uiscus iecur existit, in quo appetitoria animae uis consistit, huic etiam

Rationis praestantius animae, ut equi praestantius uenatoris equum.

Medea facinorosa.

Medea iracundiam, superasse rationem.

Vlysses coërcuisse iracundiam ratione.

Rationi semper iracundia obsequi debet, ut in quo ad summum philosophiae peruenerunt.

Cerebro uacuo. Excordes. Euiscerati.

Iecur inest animae appetitoria uis.

commodationem quandam propriorum motuum ineffe oportet, si homo in totum ornari anima debet. Quia si quidem tres animæ facultates Euripides in Medea uehementissimas esse describens (appetitivæ enim ardentissimus ille amor quo Iasonem ardebat: irascibilis, immanis eius furor in liberos: rationalis denique, sua dela qua se ipsam à tanto scelere dehortabatur, satis abunde declarant) eam magnis uicibus donatam fuisse ait. * Quamquam neque Euripides, neque uilius

Hippocrati Platonemque memora

Rationalis facultas, quæ cerebrum inest, operatur. Irascibilis facultas, quæ cordi inest, quid præcipiat.

Cerebrum esse originem uiciorum, quæ motus voluntatis et sensus sunt instrumenta.

Cerebri affectus symptomatici.

Cordis affectus symptomatici. Aristoteles placitum animæ facultati diuersas in una corde consistunt.

Chrysippi de perenni animæ opinio. Appetitiuæ animæ inest uiciorum.

Tyrus apud infirmos hepatis uiciorum.

Minerva ex Iouis cerebro facta esse, sicuti poeta.

re conatur, hinc figmentum illud habuisse originem dicens, * quod artem quidem uniuersæ concipiantur & consistant in corde: à ratione autem per caput, hoc est, per os (quæ capitis particula exiit) emittantur sermone. Cæterum (ut figmentum secus interpretetur) quemadmodum cordis corpus uirtute sua diftentum & contractum uiciis, proprias materias attrahit, expellitq; pari modo cerebrum, ubi statuerit spiritum animale, in suis contentum uentriculis, particule cuiuspiam transmittit, motu ad idoneo incitatum, distribuit ipsum. Hunc autem spiritum qui in uentriculis ipsius est, fortassis quidem paucum, etiam uenæ ad ipsos pertinentes generant: copiosissimum uerò & principalissimum arteriæ, plexum reticulatæ, qui ad cerebri basim est, præterpantes, suppeditant, quæ à corde sursum feruntur. Quare si quis fabulam ueris uelit connectere, in partibus inferioribus prudentiam conceptam (hoc est, animale spiritum) in capite natura perfici * dixerit, præsertim in uertice: quandoquidem in eo medius & principalissimus cerebri sinus habetur. Verum si scientificas demonstrationes sequamur, omisit Chrysippus fabulas, etymologias, reclinatones, declinationesq; capitis, inanium motiones, laborumq; figuras, unâ cum mulierculis, & alijs idiotis, utique uentratem ipse inuenisset, nec nobis perisset tembus, ostenditibus ipsum nihil ex his quæ adducit, inuari.

GALENI PERGAMENI de placitis Hippocratis & Platonis lib. III.

T uerò ubi Chrysippus affectum definiens, cum esse ait irrationalem, & præter naturam animi motum, hoc est, relictantem mori: rectè sanè ipsum qui in affectu est motus, ab inanims irrationabilibusq; distinxit. Mouetur siquidem laps & lignum, sic tamen ut nō relictentur rationi. Cuius enim neuitquam interest ut obtemperet, sequaturq; rationem, hoc quomodo repugnare rationi poterit? Merito itaq; id nō unā ratione dicitur: ficitur relictari rationi, quod naturæ quidem habet sequendi, obtemperandi, sed interim præter sui naturæ, alio modo fertur. Vnde liquet, nec inanimato cuiuspiam, neq; irrationali animanti, affectū innasci posse animale. Perdecenter etiam ab erroribus affectus ipsos distinguit. Quisdoquidem errores, praua sunt iudicia, & ratio ueritatem mentis, implicatq; errori. Affectus contra, nullum quidem erratū, neq; prætermisum in ratiocinatione: sed est animi motus rationi inobediens. Nam qui ut patiam ferret, liberorū uirā cōtemnit, uel iugulandos tradit, honesti imaginatione id facit, ac ratiocinio usus. Medea autem, quæ sciebat qualia perpetraret flagitia, non errore, ut ille, sed perturbatione ducta, trahebatur. Quintem, ubi celeriter currentium, qui ne si sistere quidem uelint, statim id possunt, Chrysippus meminit, aptè illo exemplo aliam uim præter rationalem, nobis posuit ob oculos, à qua affectiones ipsæ absoluntur. Etenim eorum qui per accliuia currunt, nulli a dea difficultas

Cordis motus duplex.

Spiritus animale contentum in uentriculo cerebri.

Cerebri motus. Spiritus animale partem à uena cogens, partem cypri partem ab arteria.

Ratiocinatio platonis consistit ad basim cerebri.

Ventriculum cerebri præcipue uoluntatis, ueritatis inest caput.

Rationis relictari, quæ sine dicitur.

Affectus animalis non possit in nasci inanimato alio, sicuti neq; irrationale animal.

Erroris sunt præter naturam iudicia.

Affectus autem motus animi, ratio inobediens.

Curriculum per accliuia, declina, & plana, considerat.

*Curritur per
declina, decli-
na, et plana,
consideratio.*

sistendi: sed ipsi rannum, qui per planam quandā aut declinem feruntur uiam. Quippe composita inest ipsorum lationis causa: una, tanquam animalium, quæ animæ impetu mouentur: altera, tanquam inanimatorum corporum quæ corpore inclinant. Cæterum qui in plana regione retrorsum corporis inclinationem inter currendum molitur, sistendi potens est, & sui iuris: qui uero in anteriorem partem, utiq; ab illa impeditur. Quia de causa hoc pacto omnes currunt, ab

*Inclinationem
corpora in ante-
riorem, retrorsum
uiam conferre.*

ipsa rei natura edocet, corporis inclinationem in anteriora, celeritatem motus conferre. Quemadmodum igitur ipsi, qui nihil à corporis pondere ad motus celeritatem inuauant, in promptu est ut fiant: illis uero qui ex duplici causa celeritatem generant, non amplius uoluntas est satis: eodem modo in animi impetu, quem rationa- tio sola causam habuerit, promptum est propter ipsam cessare impetum: ubi uero aut iracun- dia ei, aut cupiditas quædam accesserit, quæ sunt

*Impetum possit
et rationem, et
ab iracundia mo-
uere.*

uires irrationales, & corporis grauitati persimiles, statim quidem necitatem posse consistere, uersimile est: etsi temporis spatio forte hoc quo- que fiet, quemadmodum in currentibus. Nam

*Ratio quædam
mouet affectum.*

quum ratio cinatio, & iracundia, mouere ipsum impetum possint, si quidem à sola ratione fiat, & compescere ipsum, & rursus excitare sola uolun- tate licebit. Sin ab iracundia quadam & cupidi- rate, quum illæ cessauerint. Sin ab utriusque o- perantibus fiat, rationem simul, & facultate qua- dam irrationali: ratione quidē renitente, quod

*Ratio quædam
mouet affectum.*

ualentius est, præcellet: simul autem concurren- te, nunquam cessabit. Concurrat affectui ratio, quum quæ ille facit, etiam ratio opinatur: quemadmodum in imperantibus & proteruis homi- nibus, qui summum bonum in uoluptatum fru- itione collocant, ultro ratio ipsam cupidita- tem sequitur. At renin ac repugnare affectui ra- tionem dico, quum homo non opinatur propo- sitæ uoluptatis fruitionem, honestum aut bo- num esse: trahitur autē quodammodo ad eam, propter ualentem appetitorie uirtutis motum.

*Cautius qui
dicatur.*

Verum si ratio superauerit, talis homo tum sui, tum suorum affectuum continens, & est, & di- citur. Sin autem cupiditas, contrariam huic ap- pellationem fortius, incontinens nominatur. Quum uero à ratione sola ad suum uisum du- citur, talis uocatur temperans, si hoc consilio ea deliquit, non ut fruatur, sed ut inueter: quemadmodum etiam proteruis, sed ut sola cupiditas

*Imperans qui
mouet.*

te ducitur, ratione tanquam famulo quodam eam subiequentem. Eiusmodi ergo casuum, im- petus animi excitantium, complexu, attestatur etiam Chrysippi exemplum. Etenim aduersus acclue currētes, sola uirationali ducuntur. Qui autem inuiri feruntur ad precipitium, irrationa- li: quam sanè corporis esse pondus diximus: in decliue currentes, utriusq; perinde ut qui in plano currunt, si prorsum tendant. Nam si re- nuntiant retrorsum, current quidem alius mu- nus, sed ubi uoluerint, sistēt. Quare nihil Chry- sippus usq; ad definitionis expositionem ueteri- bus contrarium pronunciat. Maxime autem ab eis recedit, ac sibi aduersatur, dum affectus esse iudicia existimat. In summa uero, Chrysip-
50

*Irrationalis a-
nima uis corpo-
re pondus cau-
petatur.*

pūs semper ueluti in unda fluctuat: nunc quidē sine omni ratione fieri dicens affectus, nunc ad solā rationalē pertinere animæ facultatē: ac pro- inde eos, iudicia quum sint, irrationabilibus ani- malibus non inesse. Oblitus autem esse uidetur interim, quod à uiriis oppidoquam decenter af- fectus ipsos distinxerit. Ratio siquidem, etiam ex Chrysippi sententia, siue sana & uera, siue pra- ua & mendax extiterit, is qui secundum ipsam mouetur, nunquam in affectum incidit. Quan- doquidem secundum ueram, rectē & uenustē mo- uetur: secundum falsam, prauē & uitiosā. Vbi e- nim ratio dux est, aut uirtus sequitur, aut utriusq; affectus nunquam. Itaq; putare uoluptatem bo- num existere, quemadmodum Epicurus existi- mabat, peccat, uitiosa & falsa ratio est: omnesq; actiones & particulars animi motus, qui uolup- tatem, tanquā finem respiciunt prauē, prauos sanè necessariō, & aberrantes facit, ac uitiosos:

*Affectus distin-
guis à uitijs.*

*Ratione dux,
uirtutis aut
uicium sequi affe-
ctum nunquam.*

*Voluptas non
esse in bono po-
nendum.*

non tamen iam affectus quoque. Quippe pro- prium affectus hoc ipsum est, ut anima citra ra- tionem moueatur: id quod pulchrē etiam scripsit Chrysippus. Quum autē nihil sine causa oriatur, ratio uero minime præsit affectibus, iustum est iam nobis Chrysippus respondere, quidnam af- fectus ipsos producat. Nos siquidē affirmamus, interim quidem ab irascibili, interim ab appeti- toria animæ facultate illos ducere originem. At Chrysippus nulli firmiter hærens sententiæ, modo eos præter rationem oriri ait, modō secun- dum rationem, modō temerē atq; à casu proce- dere: quocirca reprehensionem ullo pacto effu- gere nequit. Nam si dicat affectum insultus, ut ipsa ratione oriri, discernere iam uitium ab af- fectū non potest. Si uero rationem adimat, in mo- tum quandam causæ expertem incidit: quum li- ceat illi ex facili ambas absurditates uitare, si cō- fireatur irrationales quasdam facultates in ani- ma, affectum ipsius causas existere. Quanquā

ubi ea quæ nō rectē homines faciunt, partim qui- dem ad prauū iudiciū refert, partim ad infirmita- tem animi, imbecillitatemq; quemadmodū ubi rursus ipsæ quæ rectē administrant, rectum iudi- cium cum bono animi robore præse aut illi fa- nē diueriam à rationatrice uim quandē esse in animis hominum, causam talium affectuum fa- teri, uelit nolir, compellit. Si quidem ut iudiciū, facultatis rationalis est opus: ita firmitas, robur uirtutisq; facultatis est diuerse à rationatione.

*Affectus pro-
prium.*

*Nihil sine cau-
sa uirtus.*

*Ratio non præ-
sit affectibus.*

*Affectus uide
prophicitur.*

Porro ut scientiam habere (secundum quam, ex Platonis sententia, nemo ulla in re potest halluci- nari) non est affectus: ita neque obliuio illius affectus dicenda est, sed infirmitas potius, aut igno- rantia. At si quum iracundia, aut uoluptate deceptus, ab ipse inino statueret recesserit, imbecillis quidem huic anima & infirma est: mo- tus autem ipsius, est affectus dicendus: ut con- stat in Menelao, qui quum Helenē occidere de- creuisset, eamq; distincto gladio inuasisset, propius accedens, ac mammam illius candidissimam confpicatus, attonitusq; ob pulchritudinē eius, propter infirmitatē imbecillitatemq; animi, nō solum gladium abiicit, sed mulierem etiam est osculatus, eiq; seipsum mancipium obtulit, ci- tra iudicium, citraq; rationem, impetu ad con-
50

*Facultates quas-
dam irrationa-
les in anima, af-
fectum causas
existere.*

*Scientiam ha-
bere, uita in re
potest halluci-
nari.*

*Menelao im-
becillit ut, multi-
tudinis animi.*

ria ductus, eorū quæ initio decreuerat. Quem admodum igitur in Medea iracundia oppressit rationem, cūq; ad perpetrandum scelus pertraxit: sic animam Menelai ipsa decipiens cupiditas, reuocauit illam ab insituto. Quæ quidem exempli ab ipso Chryippo adducta, maxime illi aduersantur, quum ex eis consistit, tres facultates diuersas inesse hominibus: nec esse affectus ipsos iudicia, ut qui præter iudicium oriuntur. Nec uero à ueteri placito illa carmina abhorrent, quæ, ut suam opinionem tueatur, citat etiam de animalibus.

*Veni siquidem admonita lætari noli,
Si namq; cægas, amplius intendere appetit.
Admonuit anctor, angor, magis premit.*

Quibus potesta subdit, affectus ipsos amantium declinare semper rationem, tanquam intempestiuum increpatorum. Repetis & alia innumera in libro de affectibus, ab eo prodita, pugnantia quidem ipse dogmatizans, quæ ipse statuit: consentanea autem & manifestò apparentibus, & opinio Platonis. Quum autem Chryippus dixisset, tristitiam esse opinionem recentem præ-

Tristitia quid.

*Tristitia cur infertur animi
reus præsentium ma-
li: inueterata autem,
nequaquam, aut non
perinde, inueteratum o-
mnino irruens sub-
leis, permutat
animam cunctis
tutum vero, ut
quædam.
Inueterata ab af-
fectu esse, qui
non præsentibus
solum rebus v-
tuntur.
Anaxagora di-
ctum heri.*

sens mali: ab eo Posidonius exigit causam, cur mali quidem opinio, si recens sit, tristitiam inferat: inueterata autem, neutquam, aut non perinde angat animum. Quam causam, quod eam ignoraret Chryippus, ipsemet Posidonius reddens, ait, omne immodicum & peregrinum subitò irruens, animum permutare: usitatum uero & consuetū, inueteratumq; aut minime affectum mouere, aut parum admodum. Quare domesticū & familiare sibi facere dicit, rebus non præsentibus, tanquā præsentibus uti. Ac proinde sapientes complures, etiam si existiment se in maximis bonis, aut etiam malis uersari, esse tamen ab affectu omni immunissimos. Quocirca dictum Anaxagoræ assumptis, qui quidem, quā aliquid filium mortuum esse renouisset, admodum constanter respondit, Noui me mortalem: 40

*A sapiente diuina prodigia ego,
In curas actumq; calamitates indoli.
Atq; exanim me propoli à patri mea ad mortis
Inueterata, & uas males alios:
Vt si quid patitur ex ipi que putantem
Aliquando, omnino non morientur recedat.*

Eodē pertinent & illa:

*Si hic primus esset malorum dies mihi,
Et non diu uicarer in laboribus,
Eosq; remittere, ac pulvis super recentem
Subdus, exancti fratrum suspirio nupte.
At meum malis obdormi, & occidui.
Hæc interim emollescent longo tempore,
Malum pubescit me.*

Tempore itaq; affectus cessant, etiam si opinio eorum & iudicia permaneant. Vt enim pars animæ obnoxia affectibus, peculiaris quædam concupiscit appenibilia etiam ipsi, quum accidit, repletur & saturatur, atque in hoc ipsum ipsius motum sistit, qui animalis impetu præerat. Nilul autem tam clarū est, quā uires quædam in nostris animis inesse natura concupiscentes, hanc uoluptatis, illam dominæ & uictorie,

Iam uero sunt qui nolentes plorant, lacrymas cohibere impotentes. Sunt contrā, qui plorare cupientes, protinus cessant, ob motiones affectibus subditas, uelementer ita iulzentes, ut non eumcantur à uoluntate. aut ita omnino cessantes, ut ab ipsis excitari nequeant. Quorum causas inuestigantes, inueniemus quo pacto ratio cum affectu pugnet, atque ab eo differat, si-mulq; seruibimus animæ facultates. Consuetudines itaque & tempus, ad affectuum moris plurimum posse uidentur. Consuetudine quippe mollescit animæ irrationabilitas, in quocunque educetur. Tempore autē affectus conquiescunt, repleti irrationabilibus potentius animæ, q̃s quæ antea desiderabant. At rationales cognitiones, iudicia, & summam scientiæ omnes, & artes, neq; difficiles ad dissolutionem fieri queant propter solum tempus nudum (quem admodum consuetudines secundum affectum) neq; transponi & cessare, sicuti tristitia, alij affectus id genus.

*Consuetudine mollescit anima irrationabilis.
Tempore affectus conquiescunt.*

GALENI PERGAMENTI de placitu Hippocrati & Plato- ni lib. V.

Quum igitur sectatores Chryippi ostenderint, quænam modò ipsi quidem existimant, uniuerfos affectus in corde consistere: ut autem ueritas habet, solos eos, qui circa irascibilem facultatem uersantur: ac denique assumptis, ubique animi affectiones sunt, ibidem quoque ratiocinatricem ipsius facultatem haberi: ita demum concludunt, in corde ratiocinatricem existere. Nos uero, quod inde irascibile nascatur, unū cum ipsis fatemur: quod autem in loco eodem delitescat uis irascibilis & ratiocinatrix, non item: neq; quod uniuerſa opera facultatis exstant. Porro affectum animi, motionem quandam esse præter naturam, rationis expertem, quæ cuiuslibet animis non innascatur, nō ueteres tantum, sed Chryippus quoque fatetur. Est autem inter animi constitutionem, & eam quæ corpori inest, quædam similitudo & proportio. Quare Posidonium laudo, quod prauorum animas, quum extra affectus constituerint, sanis corporibus similiter se habere prædicat: non probo autem, quod cuiusmodi constitutionem morbum nomen. Oportebat nanque, si recte sapientium animas uellet assimilare, dicere, quæ similes esse corporibus iis, quæ ab affectibus sunt immunia. At prouidendum, bono habitu præditi. Mediocrum uerò uisum, sanis sine bona habitudine. Vulgarū & iniquorum, iis qui uel ex occasione leuissimum in morbos incidunt. Irascientium deniq; aut furibundorum, aut ingenium, amantissimum, aut obfessorū aliquo affectu, iis quæ iam ægrotant. Siquidem quocunque tempore uel dormiunt, uel ad aliud mentem ita transferunt, extra affectum feruntur. Paulo post ubi ipsorum meminerint, in constitutionem perueniunt febrium insulubris similem. Quænam admodum autem sanas corporis, est comoderatio simplicissimarum eius particularum, quæ iam elementa nota

*Chryippi secta-
tori de ratione.*

Affectus quid.

*Animi constitutio
similis corporis
constitutiui est
si similes.*

*Animarum cum
corporibus com-
parationis de-
uota.*

*Sanitas corpo-
ris quæ.*

FINIS;

*Affectus febrium
tempore, etiam
si opinio ipsorum
permaneat.*

*Affectus quomodo
de significatur.*

Sanitas animi,

Morbus animi.

Anima partes

sunt, irascibilis,

rationalis, &

appetitiva.

Chrysippi error

duplex.

Anima et ratio

non sunt idem,

quoniam ratio ex

anima citius tra-

hitur.

Nihil ex pro-

prie consistit a-

liamibus.

Pulchritudo cor-

poris non par-

tem commo-

datione consti-

titur.

Sanitas est ele-

mentorum com-

moderatio.

Pulchritudo a-

nimae ad decen-

tem ratio re-

fertur: ut tur-

pido, ad im-

modum & offi-

cium excedit.

Anima nostra

constat ex di-

versis animis in-

ter se differenti-

bus.

Pueri roborem

necesse est differ-

entiam, quoniam

adulescentia, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

senectus, &

mus: eodem modo etiam erit animi sanitas, com-
moderatio quaedam simplicium particularium ip-
sius. Quin etiam morbus animi similiter im-
moderatio quaedam est, & discordia ipsarum harum
particularium inter se, quarum comoderatio e-
rat animi sanitas. Sunt autem hae particulae iux-
ta Platonis sententiam, irascibilis, rationalis, &
praeter has etiam appetitiva. Etenim concor-
des inuicem, & in nullo dissonantes lux tres, fan-
niratem animi efficiunt: discordes autem & con-
tendentes, morbum. Vbi autem Chrysippus ait,
animae partes esse, per quas ratio in ea consistit:
intelligens animam, non omnem & praesumptio-
nem quandam collectionem existere, duplici-
ter errat. Primum enim non animi, sed rationis
has dicendum erat esse particulas. Quippe non
idem est anima & ratio, quum haec in ea con-
tineatur. Quod si hoc etiam aliquis irreprehensu-
sum permiserit, certe non omnes & praesumptio-
nes, non particulas animae, sed actiones animae
dicere oportet. Nihil autem ex propriis functio-
nibus constat. Ad haec etiam Chrysippus sanita-
tem animae & pulchritudinem in unum atque idem
confundit. Porro corporis pulchritudo, an parti-
cularum comoderatione (qualis in Polydori
regula cernitur) secundum omnes medicos phi-
losophosque, consistit. Sanitas uero, elementorum,
quocumque illa sint, inter se est comoderatio. Cae-
terum animae pulchritudo, ad moderatos ac de-
centes ipsius animae motus (qualis est Platonis
sententia) refertur: ad immodicos autem & effe-
ratos, turpitudine eiusdem. Siquidem in comode-
ratione motionum particularium, pulchritudo
actionum est cognita: sicuti turpido in im-
moderatione. Quod autem anima nostra composita
ex particulis diversis generis, & substantia &
sede inter se differens sit, quodque innumeras
vires fortiaur, Hippocratis est atque Platonis pla-
citum. Quare neque in una particula animae, neque in
una ipsius facultate, tum iudicia, tum etiam asse-
ctus fient, ut Chrysippus existimauit. Iam uero
pueris multo plures & uelimentiores quam ad-
ultis oboriuntur affectus: quum & nullo docti
magistro, sed naturali ductu illi omnes ad uolu-
ptates flectantur, aut ferantur autem labores. Vi-
demus enim ipsos & irascere, & calcitrantes,
& mordentes, & praevalere cupientes, ut nonnulla
animantia, nullo praemio proposito, praeter
ipsam uictoriam. Neque uero & ratione impetus
eorum cohercere dicere possumus, ut qui rationem
necum habeant: neque quod non innumeris af-
fectibus implicentur. At ubi processerint, quo-
niam ad honestum, naturalem quandam pro-
pensionem habent, & erubescunt peccantes, &
iustitiam, aliasque uirtutes amplectuntur, facientes
plurima secundum earum notionem: est prius,
quum essent parui, ex affectu uiuerent, nullamque
praecceptorum ex ratione curam haberent. Cae-
terum animae constitutiones, ex diuersis corporis
temperamentis oriuntur: quomodo uideamus a-
nimalium, quae lani pectoris & calidiora sunt, omnia
fortiori naturam iracundiorē: ut timidiorem,
quae lani coxis, & frigidiora. Ac secundum
uarietatem regionum, haud parum etiam mo-
ribus homines ad timorem & audaciam, uel uo-

luptatis laborisque studium, differunt. Quare, mea
sententia, curatio animi affectuum, in nonnullis
quidem prompta & facilis est, eo quod neque
affectuum motus ipsis insint ualidi, neque ratio-
cinatrix pars, imbecilla natura & imprudens,
sed propter infirmam prauitatem consuetudines, id
genus hominum uiuere ex affectu cogantur.
Nonnulli uero difficultes, quum motus affectus,
qui ex corporis constitutione necessarii obue-
niunt, magni & uehementes extiterint: ratio-
cinatrix autem facultas imbecillis, imprudensque.
Hunc quippe ueri scientiam indispici oportet, ac
affectuum motus renuere, probis institutio-
nibus assuescentem. Sic itaque & ab initio homi-
nem ad optimum conformare oportet, ante om-
nia quidem, ipsorum seminum, deinde uicium quo
grauida utatur, ac praeter ea cibi, potus, exercitio-
rum, atque adeo quietis & omni ratione habita.
Oportet autem (ut inquit Plato) pueros iam edo-
citos, ita educari & institui, ut reddant partem a-
nimae affectibus opportunam & irrationalem,
motibus comoderatam, ac rationis iussis audien-
tem. In pueritia tamen exiguum & imbecillum
hanc ipsam rationem esse uerisimile est: ma-
gnam uero & ualentem euadere, circa quartum
decimum aetatis annum: quando iam dominari
& imperare ipsam consuevit, tanquam aurigam
quendam pari conuictorum equorum, nempe
cupiderati, iracunditatis, dum non ualentes ni-
mium sunt, neque imbecillae, nec pigrae, nec effe-
rentes, nec contumaces omnino, aut indecorae, aut
contameliosae, sed in omne promptae, tum se-
qui, tum obsecrare rationi. Huus autem insti-
tutionem, uirtutemque, scientiam esse oportet re-
rum naturae: quemadmodum aurigae, speculatio-
num artis aurigam dicit. Nam in irrationabilibus
animae uiribus, scientiae non solent innasci, sicuti
neque equis: sed his sane propria uirtus, ex con-
suetudine quadam irrationali proficiunt, au-
rigis autem ex disciplina rationali. Quemadmo-
dum igitur irrationalem animae partem necesse
est irrationales quoque uirtutes esse, ita rationa-
lem, solius rationis. Quapropter merito
illarum uirtutum, facultates dicenda sunt: solius
autem rationis, scientia. Quum itaque in
nobis alia potior sit animae pars, alia deterio-
rior: qui potior sequitur, consentaneam naturae ui-
tam dicetur agere: qui deterio-rem, repugnan-
tem. Hic enim ex affectu, ille secundum ratio-
nem, uiuit. Quum igitur hae tres propensiones
nobis natura insint: ad uoluptatem sane, pro-
pter appetitum: ad uictoriam uero, propter
irascibilem: ad honestum denique, propter ratio-
cinatricem animae facultatem: Epicurus quidem
infirmis animae partem tantam proportionem con-
spexit: Chrysippus autem, optime, quum dixerit
peculiariter nos affici erga solum honestum. At
uniuersas tres proprietates perspicere solis ue-
teribus philosophis licuit. Porro qui ex affectu
uiuit, hic irrationalem & atque animae par-
tem: qui uero sine affectu, rationalem atque di-
uinam sequitur. Quare affectuum causa cognita,
plurimum ad remedium inueniendum confert. Id-
circo Damon musicus quum esset apud bibi-
nam Phrygiam modulantem, ebrijs quibusdam

Hominem ab
instinctu, qui po-
tente sciendi vi-
tute formare
atque instituire
oportet.

Pueri rationem
ipsam esse imbe-
cillam: ualentem
autem euadere,
circa quartum
decimum aetatis
annum.

Scientiam non
innasci irratio-
nibus animae
facultatibus.

Irrationalem
animae partem,
irrationalem uir-
tutem esse, ratio-
nalem autem, solius
rationis.

Uirtutes quae ex
affectu, & qui
secundum ratio-
nem dicuntur.
Propensiones
quibus natura,
iussu sunt.

Affectuum cau-
sa cognita, plu-
rimum ad reme-
dij inueniendum
confert.

Anima constituitur
ex diuersis
corporeis tem-
peramentis: namque
calidiora esse
animalia, quae
lani pectoris, &
calidiora es-
sunt.

Regionum va-
rietatem, differe-
ntiam in moribus, facit.

adolecentibus, & infans quædam peragentibus, Dorici canere insit: illi uero statim à motu insulso cessant: non quod opinionis ratiocinatrice facultatis doceretur à cantionibus tribuere, sed quod affectibus obnoxia pars animæ, quæ esset irrationalis, excitaretur, mitigareturque motibus irrationabilibus. Siquidem irrationali, ab irrationabilibus & cōmodum & noxa obuenit: rationali uero, à scientia bonæ disciplina. Verum pars animæ affectibus obnoxia, temporis spatio partem repletur propriæ cupiditatibus, partem diuturni laboris motibus. Quapropter amborum nomine ea conquiescente, & mediocriter mora, superior esse ratio iam potest: quemadmodum & equo effreni insensorem uiolenter excurrente, dein de laborate simul cursu, & præterea saturato hīs que concipiunt, rursus auriga superior euadit. At Chrysippus neque diuerfam animæ partem affectibus deditam, à rationali arbitrat: & affectus tollit à bruta animalibus, quum tamen libidine & iracundia regantur. Posidonius autem rectius, que animam à ægrè mouentur, & stirpium modo adherescunt petris, ea cupiditate sola gubernari pronunciat. Reliqua uero bruta uniuersa, utrisque facultatibus uti, & appetitoria, & irascibili. Hominem autem solum, tribus: qui operationale principium, hunc sumere. Quod igitur pars animæ appetitoria, diuersa sit à ratiocinatrice, hunc colligere licet, quod pueri dum sumus, instar brutorum animalium promptè ad repletionem ferimur, neque an id conducatur, aut oblit, considerantes. Aetate uero & ratione prouecti, sepe ne bibimus quidem omnino, ubi persuasum habuerimus, ex potu noxam subsecuturā: sepe minus quam appetimus, & si licet copia obfutura est. Interim aquam bibimus, unum concupiscentes. Rationis autem expertes homines, similiter infanibus atque feris, neque tempus expectant, neque quantitatē, qualitatēque corporis inspicere solent. Quod ergo nec feræ, nec infantes, ratione utantur, etiam apud Chrysippum in confesso est. At quod uia alia præter rationē ad fruendum ipsæ que concupiscunt, alliciuntur, modò ait, modò negat. Etenim irrationalis in nobis facultas, ad singula que desiderantur, requirentem allicit: ratio retrahit, & inopportuna cōmotionem continet, ac pugna frequenter utrisque ualida inter se obonitur, euidenter indicans duplicem esse in nobis naturam facultatū inuicem discordantium. Si enim una esset sola, quemadmodum in pueris, nihil sanè prohiberet intempestiue non frui appetitibus. Quemadmodum etiam si sola esset ratio, nullum esset negotium, sitientem non bibere, aut euertentem non esse: neque conueniens, neque sobrius, qui non bibit, nominaretur: sicut nec qui non uidit, nisi uelit. Si uentis itaque, nolentis autem bibere, anima, una quidem facultate, aut parte, potum concupiscit: altera uero, fugit, & auertitur. Vni enim & eidem arripere aliquid fugere, non licet. At uero rationi iracundia, ut subferatur & auxilietur illi, perinde ac uenatori canis, contra tertiam animæ speciem, à natura tributa est. Quare ubi ultro sequitur ratio appetentiam, consequitur & iracundia

rationem. Vbi autem aduerfatur illi, atque renititur, iracundia à ratione stat, atque illi fert opem, præcipue cum ratio ipsa ab aliquo uidetur intus, uel extrinsecus se affici iniuria, & ui compelli, autumat. Siquidem autem se iniuria affici, rationalis est facultatis: eam autem uictricem, animosè proprium exultat. Quum igitur appetitoria facultas, immoderate ad aliquid irruens, in uitam rationem eodè secum attraxerit, irascibilis contra illam rationi suppetas fert. At ubi à nullo affici iniuria putatur ratio, minime sanè iracundia efferscit, etiam quāmaximè tunc corpus iuste puniatur ab aliquo, uel algere, uel famelicere, uel sitire coactum. Unde liquet, iracundiam naturam, à ratione præditam, opinionis rationis sequi. Fieri tamen quandoque potest, ut hæc quoque præuē affecta, immorigera rationi moueatur. Quod autem iracundia à ratione diuersa sit, hunc docet Plato, quod pueri, perinde ut feræ quāmaximè iracundi existentes, ratione careant. Eodem siquidem modo irascuntur pueri, quo & ætate prouecti: hoc interiecto discrimine, quod hi sanè in multis, ratione conueniunt iracundiam, quemadmodum generosum canem, ferocius proximis insistentem aliquis pastor: in pueris autem, nihil eiusmodi accidit, quemadmodum neque in bestijs: quod in illis quidem, nondum, in his autē nunquam, ratio impetus animi inhibeat.

Iracundia si naturaliter habet opinionem rationis sequitur.

Pueri carere ratione.

GAL. DE PLAC. HIP. ET PLAT. LIB. VI.

de placitis Hippocratis & Platonis lib. VI.

Est autem actio, motus quidam efficiens, hoc est, qui ex se exiit: a quibus uero, motus in altero, ab altero, ut necessarii spe in unum subiectum cum affectu actio conueniat. Nam à secante facta diuisio in eo quod secatur, una & eadem res quum sit, secantis quidem actio: eius autem quod secatur, affectus est. Ita sanè & iracundia, actio quidem est irascibilis animæ: affectus autem, reliquarum ipsius duarum partium, & præterea totius nostri corporis, quum ab iracundia uiolenter ad actiones ducitur. Atque hoc unum est significarum utriusque nominis. Alterum autem, si actionem quidem, motum quandam naturalem intelligamus: idque primaria ratione: affectum autem, præter naturam. Etenim primaria ratio illa fieri à natura dicimus, que ueluti scopos naturæ amplectitur: nec ex aliqua consequentia, alia necessario sequitur. Vt autem res magis innotescat exemplis, cordis motus, qui in pulsibus quidem sit, actio dicitur: qui uero in palpitacionibus, affectus: pro secunda huius dictionis (affectus) significacione. Atque ira non omnis pulsus est actio, sed est tantum, qui naturalis exiit. Iracundia igitur & omnes animi affectus, actiones quædam sunt, secundum primum significatum. Quatenus autem effrenes & immoderati existunt, neque secundum naturam, affectus esse dicuntur, ex significacione secunda. Qualis enim res in arteriarum motu magis est pulsus, talis in irascibilis animæ motu, iracundia. Qualis rursus paruus pulsus, talis timidas. Porro iracundiam ipsam frequenter alia duo

Actio quid. Affectus quid.

Iracundiam esse actionem & affectum, secundum duas animæ partes.

Actiois affectus duplex si significatur.

Primaria ratio nō, que fieri à natura dicitur.

Bruta, libidine & iracundia reguntur.

Animalia que à quibus animæ facultatibus disponuntur.

Animæ partem appetitoriam, diuersam à ratiocinatrice existit.

Naturam facultatū nobis inesse duplicem.

Iracundiam esse si à natura tributam rationi contra appetitum, eam uenatori canem.

duo sequuntur: sepe uero concupiscentiam, tanquam abstracta, compulsiuè iugulum equorum instat, quorum alter ualentem impellens, alteri secum trahit, una cum auriga & curru. Tunc enim in effreni equo motus, actio & affectus eius dicitur: priori quidem significato, actio (motus enim ex seipso est) secundum autem, non actio, cum sit motus ex prater naturam, sed iam affectus. Aurigae uero motus, ne secundum alteri quidem significatum actio est, sed secundum utrunque affectus: cum neque ex seipso, neque secundum naturam ei ad sit motus. Iam uero facultates illas tres corpus nostrum regentes, rationalem, irascibilem, & appetitoriam, tum species, tum partes animae rectè aliquis nominat. Quarum appetitoria quidem, beluae uariè, multiplicitèque irascibile autem, leoni homini denique rationalem Plato interdum comparat. Quibus idem in Placido, priores quidem illas equinam quandam formam referre ait: aurigam uero, tertiam. Quamobrem Plato locis eas esse distinctas, & substantiè permixtè variare abstrahit, merito illas tum species, tum partes appellat. Aristoteles autem & Posidonius, facultates eas esse unius substantiæ ex corde proficiscentias, affirmant. At Chrysippus, tanquam ad unam substantiam, ita & ad unam facultatem rationem atque ducit tum iracundiam, tum ipsam concupiscentiam. Porro in stirpibus solam speciem appetitoriam habentem, profectus est Plato: in duos autem rationatrici. Irascibile uero in hominibus creatam esse ait, rationali animae auxiliatricem, tanquam canem quendam, contra multipicitem illam & agrestem terræ cupiditatem. Plato item nos docuit, quod quousque fuerit species, hæc, pars nominari etiam possit: non tamen quilibet pars, statim species erit. Cum igitur ex his quae superius a nobis sunt tradita, cõstet iam rationatricem quidem animae partem, fontemque uoluntariarum actionum consistere in cerebro: in corde autem irascibilem, tum pulcherrimam facultatem (etenim si

hum: quod itaque rumpitur quidem primū, modo re seminis in aërem conuertere: deinde protenditur iuxta rupturam germinem quoddam tenue, & utrobique molle: ac superior seminis portio ceu ad aërem, inferior in terrā uergit. Atque hæc quidem continuè uidentur augescere, ac semper ferri in quæ ab initio inclinabant. Processu temporis, si arboris cuiusdam magnæ sit seminis, pars quæ in aërem fertur, caudex ipsius euadit: quæ in imā terræ declinat, radix: & utraque portio uariis scissuris diuiscitur, si multitudine arboris ipsius semen existerit. Vnum itaque principium generationis & incrementi omnibus stirpibus est locus ille, unde sursum quidem caudex, initium uero radix nascitur: ac apparet uelut ex loco quoddam, uirtus dispensans arborem, illinc procedere. Quale autem est animantium, tale stirpibus extremæ radicationis uidetur, oculis pluribus ex terra alimentum trahentibus, fabricatum. In hunc igitur arboris modum licet magnæ arteriam cer nere, quæ caudicis instat ex corde procedens diuiscitur, altera quidem parte minore ad caput perreptans, altera uero maioræ per spinas sese detorquens: à quibus propagines omniū corporis arteriarum oriuntur. Cõtemplare rursus alterā arteriam ex ipso cordis sinu profectam, quæ in pulmones, non secus ac radices pars in terram, diffunditur. Quemadmodum enim ex terra per radices totū alimentum trahit arbor, ita ex pulmone cor per dictam arteriam haurit. Quare arteria quæ uelut caudex apparet, maxima est omniū quæ in toto animali habentur: quæ in pulmone inferitur, omniū maxima est, quæ intus existunt: ipsam uero cor, medium ambarū est, & origo facultatum eas gubernantium. Constat namque maiora minorum semper esse principia, sicut & fontem, riuorum in quos dispensat: quibus nonnulli eo ueniūt absurdians, ut principio ea quæ post ipsum sunt, esse maiora existiment, decepti ob lumina, quæ exigua planè cum prope fontes exsistūt, progressu augentur. Non uident tamen id sic accidere, quod in se alios decursus aquarū exceperint. Quippe nullum flumen ex uno procedens fonte, minus caput obtinet quæ quæ subsequuntur. Esset autem summa impudentia, aliud uiscus à corde statuere arteriarum principium, cum hoc solū uiscus animalis corpore exemptū, diuisum sine naturali functione retineat, ceu initium motus tum sibi, tum quæ ab ipso proficiscentur, arteriis. Hæc autem ab eo segregatæ, aut funibus interceptæ, aut diuisæ non uidentur, cum ab affectu ipso, motum etiam amittant. Porro uenæ quæ à iecore ad uentrem pertinent, similes sunt radicibus. Nam ut arboribus terra, sic est animantibus uenter. Cæterò uena causa truncus quidam existens, atque à gibbis fractionibus hepatis orta, in superiorem & inferiorem corporis regionem excurret. Cuius latissima portio est, quæ infra iecur de scendit: minus autem lata, quæ sursum per septum transuerfum adit: huius uero duabus maior, quæ in cor inferuntur: quansquæ si esset cor uenæ caue, sicut arteriæ magnæ, principii, maxima esset (opinor) portio uenæ ei cõtinaua. Est itaque tum uenarum, tum sanguinis, tum nutritiæ facultatis initium hepatis: quod uiscus in uniuersas corporis par

Anima partu
singulas, quibus
animalibus co
parari Plato.

Aristoteles & Po
sidonius sententia
de speciebus ani
mæ.

Stirpibus esse
solam appetito
riam vim, ait
Plato.

Species omniū
inferuari parti
bus tam animæ
partes, sicut sta
tim erit.
Rationatrici
facultatis assidue
in cerebro.

Nervus solus, par
ti supra, infra,
inter, uenas, cer
ebro, solus resi
stere motus ex
pulmone.

Irascibilem fa
cultatem assidue
in corde.

Uenter esse cin
dem facultatis
nutritiæ, quales
stirpibus uenter.

Stirpes quæ ra
tionem gignunt.

Arteria magna
extrema diuiscitur
in duas.

Arteria uenosa.

Cor haurit spi
ritum à pulmo
ne per arteriam
truncalem.

Materia minor
semper esse prin
cipia.

Venter anima
lis est, quod
arboribus terra
vena causa, quæ
ab hepate na
scitur, diuisa,
prociua.

Hæc est sum
ma portio, tum
sanguinis, tum
nutritiæ facul
tatis initium.

tes benignum alimentum distribuit. Quod autē sanguis perficitur in hepate, argumētū sunt recrementorum purgatoria instrumenta, quae natura illi fabricata est, renes uidelicet, lien, ac repta bilis uesica. Nam quartū aliud alimentū excrementū, uel materiam quālibet a calore mutatur, ne cogitare quidem licet. At in corde, neq aliud quoddam purgans instrumentum natura fecit, neq alium machinara est humorē. Similis namq sanguis est, & qui in dextro cordis sinu, & qui in omnibus uenis per totum animal cōtinetur: quemadmodū & qui in arteriis habetur, ei respondet, qui in sinu sinistro exiit. Maximā facit fidem, iecur nullū humorē preparare ipsi cordi, ad particularem nutritionē (quemadmodum nonnulli putabāt) sed ipsū uniuersam eius speciem abfoluere, quod cum una sit uena quae ex iecore in cor procedit, alia nulla feratur ex altera ipsius cordis parte, quae elaboratum humorem in totum corpus deducat: etsi alia quidem arteria inferat, alia educat spiritū. Videtur quippe natura non eisdem uti uasis, & ad semelaboratas materias, & ad omnino confectas: imō ne eisdem quidem uis. Taceo complura animālia, dextro cordis sinu carere. Vnde existimari nō potest, causam uenam ex hoc ortū uenientem, cum in permixtis animalū generibus, iecur quidem exiit, & causa uena: sinus autem dexter nequaquam. Etenim quae non respirant ex aere animalia, ea neque pulmonem habent, neque cordis uentriculum dextrum: qui sanē simul cum pulmone perit, & generatur. Igitur quemadmodū arteria magna ex corde, sic semper uena causa ex iecore sinu gibbo oritur, uel si dexter cordis sinus non addit. Quis quidem ubi scriptum transferunt subter cor penetrauerit, in duos magnos ramos diuisari. Quinetiam ex cauis hepatis, alia tertia uena (quam portas, aut portis uicinam appellant) producta, in partes uentris uarias demittit propagines. Quarum omnium cum nulla cordi cōtinua sit, meritō dicitur est, uenarū omnium esse radicationem hepatis, arteriarum cor: sicuti & arboris, partem illam, quam occupauit semen proiecūm. At Pelops uenarū principium cerebrum esse existimans, cōfectionem ipsarum a iecore est asseruit: affirmans hoc uisum, ad disciplinam fieri initium sermoni: cum tamē initium a natura cōstitutum, etiam disciplinam cogat a seipso fieri. Quare inquirendum non est aliud rei naturae principium, aliud ipsius disciplinae. Iam uerō, cum in corde reperiantur tantūm quatuor ora uasorum: duo in sinistro uentriculo, quorum unum quidem ex pulmone spiritum introducit, alterum educit a corde in uniuersas arterias: atq in dextro similiter duo, quorum alterum sanguinem uehit in pulmones, alterum in dextrū sinum cordis introducit ad hepatis: habetq hoc orificium quartum, tres quaidam in se membranas foris intrō uergentes, quae ad orificium id concident, impediuntque sunt, quod minus contracto corde, sanguis semel in cor ingressus, reuertatur rursus ad uenā causam: nec reperitur quintū aliud ab his orificium, quo sanguinem ex iecore ad ipsū cor peruenientē, in totū corpus transmittat: sanē liquidō cōstat, cor

neq esse initium sanguinis totū corpus nutritis opifex, neq instrumentū ipsius. Quā uerō necessaria sit animantū uix, ipsa sanguificatio, hinc discas licet, quod cum possimus uiuere, etiam si cibos uenter nō conterat (interdum enim succos taurū, aut ipsū lac propinamus) necessariū moriendū sit nobis, sanguinis generatione pereunte. Quod autem ipse uenae non procedant a corde, uel in ipsa in utero cōtenua conformatione, facile percipere est. Omnes siquidē secundarum uenarū, quae utero conceptum auuncunt, propagines sunt uenis uenae maximae, prodeuntis ab hepate. Siquidē ostensum est, maximā uas uiscinorum esse principia. Quarum uenarū extrema, uelut radicata in utero, sanguine ex eo ad iecur, tanquam totius stirpis principia, sursum uidentur transmittere. Vnde itaq procedens ex iecore, uenarū omnium quae secundas perreptant, initium exiit sicuti & arteriarum, arteria quae a corde trahit ortum. Etenim haec quoq omnibus, quae in secundis sunt, propriam facultatem suppeditat, non illarū huius. Quippe ex semine infantibus prouenit initium facultatum eos gubernantium, nō ex utero. Porro si fune interceptis, aut tuismet dignis umbilicis arterias compelleris: omnes qui in secundis habentur, itam pulsū delituras uidebis: culus contrarium cerneris, si motus intrū ipsis praestaret uterus. In quod igitur omnes defluunt secundarum uenarū, inde uenae necesse est procedunt. Atqui (ut manifeste ex cōfectionibus uideat) uniuersae in unum cōiunt uenam ex iecore enatam: sicuti & arteriae omnes, in duas magnas degenerant, quae cōcidentes uescam, atq in decliue pergentes, illas terminantur arterias, quae a magna lumbarum arteria ortae, in crura factae feruntur. Quare multo magis hepatis uenarum principium dicendum est, quā cor arteriarum. Sed neq illud te oportet lateat, quod omnino pulsant uenae, si ex corde originem ducunt. Pulsat namq totum ipsius cordis corpus, sublatum, contractumq ex seipso: quam quidem eandem uiam a se ortis elargitur arteriis. Quod si cor operimētis uenaueris, dextris ipsius uentriculi pulsū uidentur contuere. Nec te latebit etiam, ei uas insertū, quod cauz uenae est propago, similiter arteriis pulsare: quāuis etiam pulsatio minime eōmuniatur ceteris quae per uniuersum corpus feruntur uenis: ut motus arteriarū magnae. At uerō non quia implentur arteriae, ob id dilantantur: sed quia dilantantur, implentur. Vt igitur denuō sermonem repetam, si requiris exordii primae generationis uenarū, id iecur est: si materis dispensationis, quia uniuersum corpus nutritur, & uirtutis, aliud nullū uisus reperitur, quod aptius initii censetur. Ad haec uerō, si id quod mutatur, in similem speciem cum eo quod mutat, peruenit, iecoris ipsius carne nihil ad sanguinis generationem reperiri possit accommodatus. Nam sanguis si incassatus fuerit, tum colore, tum consistētia, exacta iecoris caro efficiet. Ac proinde si humor qui ex uentriculo in iecur distribuitur, fieri sanguis debeat, necessum est ut ipsius a propria hepatis substantia fiat mutatio: quandoquidem ipse uenarum tunicae, ex sua ipsarum natura generare sanguinem nequeunt.

Cor neq esse initium ipsius sanguinis, neq instrumentum ipsius. Vnde itaq procedens ex iecore, uenarū omnium quae secundas perreptant, initium exiit sicuti & arteriarum, arteria quae a corde trahit ortum. Etenim haec quoq omnibus, quae in secundis sunt, propriam facultatem suppeditat, non illarū huius. Quippe ex semine infantibus prouenit initium facultatum eos gubernantium, nō ex utero.

Secundarum uenarū, quae utero conceptum auuncunt, propagines sunt uenis uenae maximae, prodeuntis ab hepate.

Umbilicis arteriis, quae a corde trahit ortum. Etenim haec quoq omnibus, quae in secundis sunt, propriam facultatem suppeditat, non illarū huius. Quippe ex semine infantibus prouenit initium facultatum eos gubernantium, nō ex utero.

Hepatis uenarū principium dicendum est, quā cor arteriarum. Sed neq illud te oportet lateat, quod omnino pulsant uenae, si ex corde originem ducunt.

Cordis uentriculi pulsū uidentur contuere. Nec te latebit etiam, ei uas insertū, quod cauz uenae est propago, similiter arteriis pulsare: quāuis etiam pulsatio minime eōmuniatur ceteris quae per uniuersum corpus feruntur uenis: ut motus arteriarū magnae.

Arteriae non dilantantur quia implentur: sed quia dilantantur, implentur. Vt igitur denuō sermonem repetam, si requiris exordii primae generationis uenarū, id iecur est: si materis dispensationis, quia uniuersum corpus nutritur, & uirtutis, aliud nullū uisus reperitur, quod aptius initii censetur.

Care hepatis.

Sanguinem fieri a propria hepatis substantia fiat mutatio: quandoquidem ipse uenarum tunicae, ex sua ipsarum natura generare sanguinem nequeunt.

Non

Hepatis recrementa, purgatoria instrumenta, quae natura illi fabricata est, renes uidelicet, lien, ac repta bilis uesica.

Vas nō igitur uti naturā ad semelaboratas materias, & ad omnino confectas.

Animalia non respirant ex aere, neque pulmonem habent, neque cordis uentriculum dextrum: qui sanē simul cum pulmone perit, & generatur. Vnde existimari nō potest, causam uenam ex hoc ortū uenientem, cum in permixtis animalū generibus, iecur quidem exiit, & causa uena: sinus autem dexter nequaquam.

Venarum radicationis est hepatis. Cor est radicationis arteriarum.

Initium a natura cōstitutum, etiam disciplinam cogat a seipso fieri.

Cordis in seipso quatuor sunt ora uasorum.

Vena et atri-
no rade.

Ventriculus, for-
ipsum tantum gra-
na cibos coque-
re.

Iecur nullius
partis gratia a-
liumque permutat.
Distribuitur ali-
menti.

Instrumentaria
partes.

Vasorum actio-
ne utitur quod im-
mutat ratione
corporum quod
hinc inferunt sunt

Singulis easque
proprium actio-
ne, propter pro-
prietatem sub-
stantie.

Iecur est reboli-
tissima quidam
magna.

Grana gene-
ratur.

Cor est ficius
atque calidius in
parte.

Sanguis huius-
modi et rubri,
prima in iecore
generatio consi-
git.

Sanguis flavi
floridior, prae-
ma in sinistro
cordis sinu est
origo, ubi a mem-
bris subitibus tra-
hitur.

Arteria.

Vena.

Arteria cubi-
tatur motus
quid indolent.

Non enim rubrum illum humorem, sed album & viscosum reddere idoneae sunt, unde & genera-
tio ipsa est, & incrementum, & nutritio. Porro
ventriculus circa cibos sui tantum ipsius gratia co-
tractus, peculiariter sibi ex ipsis humorem sugit:
quo quidem ubi fuerit expletus, superfluum to-
tum ad ieiunum intestinum propellit. Inde rursus
secur trahit ipsum, atque elaborat. Sicut autem
ventris reliqua iecinoris sui idoneum, ita huius
rursus ipsius superfluum, quod post iterum habent om-
nibus, cum neque iecur ipsum, eorum causa alimentum
permutet. Quemadmodum igitur secur per ve-
nas ex ventriculo & intestinis alimentum attra-
xit, quod subsipit, hoc est, suae carni assimilata, ita
quae post illud constituta sunt partes, per alias
ad se venas alliciunt, deinde rursus alit, donec
in omnem animantis particulam alimentum sit
distributum: ac preparat semper praecognitis una-
queque particulae ei quae sequitur, secundum distri-
butionis continuitatem. Singulae autem anima-
lis instrumentariae partes cum ex alijs simplicio-
ribus constent, omnino peculiari quadam eiusmodi
substantia sunt praeditae, qualem non aliud totius
animantis corpus. Arteriae vero, nervi, atque ve-
nae, instrumentis inseruntur communis usus gratia:
quorum actio nequaquam ex corporis loco immu-
tatur, sed ubicunque sint, semper illi usum commu-
nem praestant. Quinetiam proprium cuiusque cor-
poris, sine his ipsis existit: ac proinde actionem
propriam, eximieque diuersam ab alijs, singula pos-
sident, propter proprietatem substantiae. Nihil
itaque mirum est, iecoris proprium corpus secun-
dum ipsius naturam esse gignendo sanguini aptis-
simum, ut quod ruberrimum sit, tanquam sanguis,
& solum hoc, quod coagularum sit, ab eo differens.
Grumi siquidem coagulatione, ab ambiente
sit, extingente quidem calore ipsius: denigrante
autem substantia, propter refrigerationem. At
non ita etiam in hepate accidit, sed ab insita cali-
ditate, quae exornet illi magis, quam corruptat.
Alteratur enim utroque modo sanguis, siue grum-
mus euaserit, siue iecoris caro. Verum alteratio
in grumum, via ad corruptionem est: in iecoris au-
tem substantiam, actio naturae. Cor etiam rubei
coloris est participes, at non quantum iecur: quippe
hoc viscosum, corde est humidius, eoque rubrius, mol-
liusque: cor autem ficius, calidiusque iecore existit.
Ita enim futurum est simul durius, & duplici mo-
tu, arterijs similiter, agitabitur: ut eiusmodi agi-
tatione, confectur cor caloris naturae symmetria.
Igitur sanguinis humidi & rubei, prima in iecore
generatio consistit. Rursum autem venae eam in to-
tum corpus distribuant. At sanguinis flauis, tenuis,
subtilis, spirituosus, calidissimusque, & qui rapidi-
ter per omnia membra fertur, ut inquit Plato, prima
in sinistro cordis sinu est origo: id eo quod irascibilis
anima ibidem habitare ostenditur. Sanguinem autem
hunc arteriae in uniuersum corpus dispen-
sant: quas ututissimum medicorum similiter
appellatur venas: etsi ab alijs, quod quidem uas
pulsat, arteria: quod autem pulsus est ex parte, uena
communiter appellatur. Porro cum moris arterijs
quae cubitum, ac praeteritum sinistrum, excurrit,
ex generatione est citatus, & magnus, ualidusque,
robustus in corde uim irascibilem innuit: calo-

rem uero in eo uigentem, & feruidum, quem non o-
minare furiosum iracundumque mos est. Eam au-
tem arteriam appellans uenam Hippocrates, ait:
Cui celeriter uena in cubito pulsata, irascibilis &
iracundus erit: cui autem lente, torpidus. Quod
autem in iecore collocat Plato eam animae par-
tem, quae esculenta potulentaque expetit, illic ma-
ximè significare uidetur, ubi ait: Verum eam ani-
mi partem, quae cibum potumque, & reliqua omni-
tino quibus corpus indiget conspicit, media
regione inter septum transversum, & umbilici
terminum collocat: quoddam quasi praesep-
pe ad totius corporis alimentum fabricari, ac ibi-
dem illam animi uim, ceu feram agrestem illa-
runt: quam sane corpus suum alere necessarium
est, si mortalium genus aliquandiu sit perman-
surum. Et paulo post: Quod, inquit, Deus perpen-
dens, hanc ipsius iecoris speciem constituit, &c.
Nihil autem refert, uenam principium dicas iecur,
aut sanguinem, aut appetitoriae animae: fami-
liarius tamen est medico, de corporis instrumen-
tis: philosopho, de animae facultatibus discipli-
nam instituire: id quod facit Hippocrates, di-
cens: Venarum radicatione, iecur, arteriarum cor
est. Etenim de corde Plato sic differt: Cor, & ue-
narum, & sanguinis, qui per omnes partes uehe-
menter circumferritur, fontem, in domicilium mu-
nitum constituerit: ut cum iracundiae uehemen-
tia ferueret, ratione hoerente, sit inquit in eis
fiat extrinsecus, uel etiam ab internis cupiditati-
bus, itatim per omnes angustos meatus, quic-
quid sensus est participes in corpore, iussa mi-
nasque sentiens, fiat morigerum, & unde quaque obse-
quatur, praestantissimique in ipsis omnibus prin-
cipatum gerere ualuit. At Hippocrates, dum prae-
uocolori corporis, gratulanti in habitu perfri-
gerato medetur, iracundiam dicit studiosae exci-
tandam esse, tum coloris recipiendi gratia, tum
effusionis humorum. Iracundiam porro esse defi-
nitur philosophi, caloris effectum esse in corde.
Quod autem uel testimonio Homeri posuimus co-
firmare appetitoriam uim in hepate delitescere,
facile cognoscunt, qui apud illum Tyri fabuli
legunt: cui nimirum finxit a uulturibus hepar
exedi, quod Latonem coepellasset stupri. Quem-
admodum nunc faciliare solent, qui peccantes fa-
mulos puniunt: eorum sane qui fugitiui sunt, crura
exurentes, scarificantes, atque ferientes: eorum qui
sunt in furo deprehensi, manus: gulosorum, uen-
trem: gartiennum, linguam: summam uero eas
plectentes particulas, quibus illi prauas obeunt
actiones.

GAL. DE PLAC. HIPP. ET PLAT. LIB. VII.

Quemadmodum autem affectus ab ipsa tol-
luntur anima, si sit sola ratiocinatrix facul-
tas, nulla neque appetitoria, neque irascibili,
prae-ter eam, existeret: sic & uirtutes omnes, prae-
ter prudentiam, exterminantur. Quia uero (ut
prius est demonstratum) alia uis ratiocinatrix, alia
irascibilis, alia denique appetitoria existit, una
quedam in singulis earum existit uirtus: quan-

Hippocrates.

Appetitoria ani-
mam Plato in
hepate collocat.

Venarum radi-
catione hepar.
Cor radicatione
arteriarum.
Plato de cor-
de sententia.

Iracundia qui-
bus si excidit

Iracundia
quid.
Homerus.

Particulas nos-
trorum solent
qui prae-
uocolori
ab huius.

Anima facultat-
ibus singulis,
venae, uirtus
eaeque.

Viri esse, quod
prostantissimum
est.
Ratiocinatrix
anima virtus,
prudens.

Invisibilis ani-
ma virtus, viri-
litas.

Appetitiva ani-
ma virtus, est
temperantia.

Invisibilis nasci-
tur ex fructu-
aria materia tri-
a anima particu-
larum.

Habitus quae
virtutes dicuntur

Scientia componi
dicitur sola rati-
ocinatrix animae

Platonem de vir-
tute sententia.

Philosophia
reddetis a pecca-
to immunes.

Principia tria
diffinita ani-
mal.

Rationalis prin-
cipia opera.

Invisibilis prin-
cipia opera.

Appetitiva prin-
cipia opera.

Nervus non est de
partem motu, non
sensu, prout quid
est aliquem viri
reclatorem ipsa
sensu percipere
rit.

doquidem quod prestantissimum est in singu-
lis, unum tantum exiit: sicut & perfectio una,
quam virtutem vocamus. Eam igitur quae in ra-
tiocinatrice est, sapientiam, aut prudentiam, aut
scientiam appellare licebit: eam quae in irascibili
rursus habetur, fortitudinem, aut virilitatem: si-
cuti & eam quae in appetitiva oritur, appellare
poteris temperantiam. Ex quarum quidem ani-
mae trium particularum mutua comoderatione,
ac uenustate decente, quarta virtus iustitia nasci-
tur: ac proinde merito totam animam dixeris ius-
tam. Ceterum virtutes ipsae in partibus animae
irrationalibus, habitus quidam sunt, & facul-
tates solummodo. In rationali autem, non habi-
tus modò, sed etiam scientia, aut virtus. Sola enim
haec animae pars, scientiae compos est: aliae autem,
facultates sanè quasdam, habitusque, aut melio-
res, aut peiores comparare possunt: scientiae au-
tem fieri participes, non item, quatenus neque etiam
rationis. At Plato scientias omnes rectè, mea quide-
m sententia, unam esse virtutem ait, cognitio-
nem videlicet bonorum atque malorum: hoc est,
eligibilium, & eorum quae declinare debent. Cuius
autem in omnibus vitae actionibus, deligamus
id quod videtur bonum: quod autem apparet ma-
lum, vitemus: habebamusque naturam impetum hos
ad horum utrumque: philosophia, quae verè bonum
malum docet, & peccatis immunes reddit. Ostem-
dimus igitur dispensationem animalem in lucem
addidit, tribus administrari principijs: uno in ca-
pite collocato, cuius opera per se quidem, imagi-
natio, memoria, intellectus, cogitatio: in re-
latione autem ad aliud, sensum partibus animalis
sensibilibus impartiri, motumque arbitrium ipsae
quae moventur: secundo autem in corde consis-
tente, cuius opera per se quidem, robur est ani-
mi, firmitudoque in re, quae cum ipsa ratio iusse-
rit: atque etiam in visceribus animis: secundum affec-
tum autem, veluti servorum nativi caloris, anima
tunc cum qui iniuriis inferre est visus, punire de-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ueniat. Maxime autem ventriculus posterior of-
fendit animal: deinde medius: minorè uerò an-
teriorum uterque noxam adfert. Cum igitur con-
iunctio ventriculorum cerebri (divisio quorundam abstru-
lerat motum & sensum) paulò post rursus sentiat
ac moveatur animal, descendit est in ipsius quae
autem cerebri corpore animam habitare: primum
eius organum, tum ad universos animan-
tis sensus, tum ad motus voluntarios, esse ani-
malem spiritum: qui quidem si animae substantia
est (quod aliquis posset existimare) simul cum
eo, dum evacuatur, periret anima: cuius contra-
rium contingit. Nam evacuat, donec recolligatur,
sensu, motuque, non uita destituit animal.
Merito igitur generatur hic spiritus: iuxta ven-
triculos cerebri, atque illic ille definit arteriarum
venarumque non exigua copia, ex qua sunt plexus
choroidei formati. Nam ex arterijs conscenden-
tibus caput, ac postea sese ad cerebri basim tor-
quentibus, consciscit plexus reticularis, in quo
elaboratur ipse animalis spiritus. Etenim arteria-
rum spiritus, vitalis & est, & dicitur: si cuti & an-
imalis, qui consistit in cerebro: non tanquam ani-
mae substantia in sit, sed veluti primum ipsius
organum, habitantis in cerebro, qualescunque illa
substantia existat. Quemadmodum autem vitalis
spiritus in arterijs & corde gignitur, ex inspira-
tione & humorum vapore, ita animalis ex vitali
accuratius elaborato ducit originem: ad quae
quidem elaboratione retiformis ille plexus fuit fa-
brefactus. Nam si exactè semen ipsum & lac na-
tura elaborare desideras, fecit ut diutius ea in co-
elationis instrumentis immorarentur: ac propterea
semini quiddam anfractu quendam ante testiculos
preparavit, lacti uerò longitudine vasorum ad
mammas tendentium: merito etiam ad consensum
animale spiritum ex vitali, veluti labyrinthum
varium, praedictum illum plexum construxit.
At uerò cum nervi ipsi ex cerebro & mem-
branis id ambiens contrahantur, per eam
ipsorum partem quae ex cerebro oritur, sensus
omnibus membris atque motus suppeditatur. Quare
autè utriusque membranae propagatio est, eundem
nervus usum praebet, quem cerebro ille exhibebat.
Quare uel si ambas exeres, nihil laedetur
particula, in quam nervus inferebatur: quemad-
modum neque si ipsi cerebro exteriores mem-
branae absterueris, in praesenti quicquam offen-
des, etsi processu temporis aliquid sequi possit
in commodo. Quòd autem ad facultatem, quae
ad cerebro descendit, spectat, non licet nobis promp-
te affirmare, an quemadmodum ex solari splen-
dore qualitas quaedam profecta, in omnem aeris
ambientes partem disseminatur, ipsa Solis
substantia in loco suo permanente: sic etiam ex
cerebro virtus quae dum nobis per nervos in-
fluat: an potius substantia spiritus usque ad sensibi-
les mobilesque particulas proficiat: aut aliqua
ex parte in nervos incidens, ita ipsos immutet,
ut alteratio eorum in mobilia membra distribuatur:
cuiusmodi quippià fieri in sensu visorio con-
tingit. Si quidem per opticos nervos, qui ab an-
terioribus ventriculis cerebri (qua parte nervus
medius ventriculum in obliquum & angustum se
contrahunt) oriuntur, & manifestè cōcui sunt,

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Cerebri virtutes
li quatuor.

Animam habi-
tare in ipso cere-
bri corpore, primum
autem abstru-
ere instrumentum
esse animae
hunc spiritum.

Animalis spiritus
non est substantia
anima.

Choroidei
plexus.

Reticularis
plexus.

Spiritus vitalis,
Spiritus animalis.

Semini et lacti
elaboratio.

Sensus omnibus
membris quae uia
suppeditatur.

Cerebro unda-
to si subterras,
animal nihil est
fuerit.

Facilius ad cere-
bro descendens
per nervos, sit in
corpore, ac in-
corpore, Galen-
us ambigit.

Opticorum ner-
vos non ex-
tremum ex-
tremum.

splen-

Oculus uno clauso
si, dilatari alio
non pupillam.

Opticorum ner-
vorum in vitiis
locum ciliarium.

Infusio laque
raret, quoniam
errare possent.

Nervi omnibus
non infuse me-
tus.

Spinalis medulla
in cunctis vitiis
si periret, singulis
litis.

Distributio vir-
tutum quid.

Visionem fieri
extra mittere.

Visu si per pu-
pillam foret.

Aër ambiens ta-
le nobis instru-
mentum inter vi-
dendum efficitur,
quale existit ner-
vus in corpore.

Visu quæ fiat
ratio.

splendidus spiritus ad oculos fertur: id quod ipsa
structura docet: & præterea quod uno quidam oculo
clauso, dilatatur alterius pupilla: aperto autem,
statim rursus in naturalem magnitudinem redeat.
Cæterum quod inanitionis repletionisque celeritas,
non humoris cuiusdam influentia, sed solius
spiritalis substantie sit opus, haud negotiosum
est cõstare. Quoniam verò in idem utriusque meatus
perueniunt, verisimile est cõmunem regionem ex
utroque meatibus spiritum recipientem, dum alter
oculus claudatur, alteri totum ipsum transmittitur.
Quare si quis quæ suffusione laborant, dilatetur pu-
pille foramen, clauso altero oculo, in oculis uis
uisionis seruetur: sin autem hoc eis non eueniat, pe-
rierit omnino: ac proinde licet probe suffusio cu-
rata sit, ipsi non cerent. Alijs uero quibusdam
accidit, ut non uideant, uel citra suffusionem, ob
uisionis obstructionem meatuum. Verum im-
mo minime quidem arbitror nervus omnibus
in esse meatus, sed ipsi tantum qui corpulentio-
res existunt: quemadmodum est processus ille spi-
nalis medullæ, cui porus ita sensibilis inest ut uisio-
nis nervus, ad uelamentosioris uirtutis distribu-
tionem. At uero quod ab omnibus uocatur dis-
tributio uis uirtutis, alteratio nis quædam est impar-
titio: qualis etiam in aère à solari splendore acci-
dit. Sic utique consentaneum est, etiam spiritui qui
in oculis proficiscitur, primo illapsu uniri cum
aère ambiente, & simul ipsum in suam ipsius na-
turam inalterare, non tamen extendi plurimum.
Corpus siquidem quod uidetur, aut mittens de
se aliquid ad nos, cum illo etiam propriam indi-
cat dignotionem: aut si ipsum nihil mittit, expec-
tat aliquæ à nobis ad se uenire facultatem sensi-
ficam. Verum igitur ipsorum sit nervus, hoc iudica-
bitur modo. Per pupillæ foramen sit uisio, quod
quidem si expectaret portionem aliquam, aut fa-
cultatem, aut imaginem, aut qualitatē corporis
extrinsecus subiecti, ad se proficisci, nunquam
eius quod uidetur, magnitudinem cognoscere-
mus: ut montis, exempli gratia, maximi: alioqui
tanta imago eius oculis nostris incideret, quæ
tanta est ipse mons: quod omnino ratione caret:
quemadmodum & si quis dicat, eam una tempo-
ris occasione, ad singulos uidentes, etiam si fue-
rint mille, permeare posse: cum uisionis etiam
spiritus nequeat fluere suo tantum extendi, ut to-
to corpori quod uidetur, circumfundatur. Re-
linquitur itaque adhuc, aërem ambientem tale no-
bis instrumentum fieri, quod tempore uidemus, qua-
le in corpore nervus perpetuo existit. Eiusmodi
autem quippiam accidere uidetur ambientem nos
aëri, ab excidente spiritu, cuiusmodi etiam ab
splendore solis. Ille siquidem supernum aëris extre-
mum attingens, in totum uirtutem cõmunicat.
Visus autem per nervos uisionis exilens, cum
substantia habeat spiritalē, ubi in ambiente in-
cidit, primo incursum alterationem efficiens, ac se
quæ longissimè extendens, illuminat quod
illi continui est, nempe quod ambit corpus, sic
ut in momento temporis alterationē in totum ip-
sum transmittat. Apparet autem similis quidam affe-
ctus utriusque accidere, & nervo, & ambientis aëri.
Nam quemadmodum si interponatur aliquod soli-
dum corpus in medio subiectionis aëris, statim

uidemus eius splendorem perire, eum qui dum im-
mutatur euadat lucidus, non autem quod permuta-
tus fuerit (sic enim lumine perpetuo seruetur, uel
si ablatus id quod illuminat esset) ita & nervo in-
fecto, quantum sectio à cõnuitate cerebri separaue-
rit, tantum in insensibilis statim reddetur. Sed in ar-
terijs etiam eadem natura, quæ in nervis, cernit.

Difflēctæ siquidem, intercepit uel luniculo, non
pulsant, desinunt, non ut Erasistratus putat, eo
quod à corde mittitur, sed facultate illa quam tu-
nica ipsarum, corpori cordis cõtinuat, influentē ab
eo semper obuenit. Cõmune igitur omnium est
sensus facultas, quæ à cerebro originem ducit,
per nervos usque ad propria instrumenta deseri-
t. Item quod nervus subitanea cerebro est similis,
nisi quod quantum, ne esset ad patiendū facilior,
statim condensatus est, tantum à cerebri natura re-
cescit. Quantum igitur singuli nervi propriè dicti
sensorij, à cerebri natura recedunt, tantum etiā ab
ipsius facultate. Vocantur autem propriè sensorij
nervi, qui instrumentis immittunt sensorijs, molli-
ores alij, qui particulas mouent: idij merito.
Sensus quippe non sit, absque hoc quod quoque
modo afficiatur nervi: motus autem, in agendo so-
lum actionē obinet: ac proinde non ab re sensorij
nervi mollior, durior autem motorius nervus est fa-
ctus. At motorij omnes, sunt sensus tactus parti-
cipēs, quoniam huius sensibile crassior est partitio.

Porro uisionis nervus, omnium nervorum maxi-
mus, inter cerebrum & oculum totus medius consi-
stet: interiorē quidem sui partē, molliorē habet,
externā uero duriorē, ut & facile per ipsum multa
ex cerebro spiritalis substantia in oculi regio-
nem perueniat, & etiam agrè afficiatur. Quantum
autem oculi primū sensibile exactius est, & tenuius,
quā sensoriorum aliorum, tantum etiam oculus ma-
gis quā illa, cerebri naturæ est participēs. Quar-
e cum sub tunicis colorum duo cõnneantur hu-
mores orbiculares, unus qui utrum, alter qui re-
fert crystallum, ubi primū uisusque nervus exter-
riorē oculi tunicam permeat, spiritus quidem
per eius porum illapsus, humoribus illis miscetur,
ut substantia eorum fiat tota sensibilis: spiritus
autem nervi substantia soluta, dilatataque, ample-
ctitur uitreum humorem, in maximum crystalli-
loidis circumulum desinens. At plexus quæ efficiunt
fibræ ipsius nervi optici dilatari, uocatur tunica
amphiblastroides, ac si dicas reticularis: quā si
uclis rursus in unā cogere, coacervareque, cerebrum
tibi esse apparebit. Ac merito sanè sic cõstructus
is nervus fuit, instrumentum usus aëre circum-
fluus. Tale autem instrumentum nervus sit aër, ad pro-
priam sensibilibus explorationem, quale existit
ipsi cerebro nervus. Proinde quā cerebrum ra-
tionem habet ad neruum, talem habet ad aërem
oculus. At propriū uisus sensibile (quod primū
antea appellauimus) colorum est genus. Illud si qui-
dem primū, & per se, & solus inter alios sentit,
quemadmodum gustus: sapores: quāque & colo-
ratum corpus simul cum eo cognoscit, perinde
ut gustus: id quod sapores dicit. Cæteri ut gu-
stus atque alij sensus sūt, opus est ut ad animantis
corpus ipsum perueniat sensibile. Visus autem per
mediū aërem ad coloratum est extendi, unde ipse so-
lus unā cum colore illius quod uidet, cognoscit

Nervus quan-
do reddatur in-
sensibilis.

Arteria quan-
do non pulsant.

Arteriarum tan-
quam affuerit pul-
sationem tam à
corde.

Amphiblastroides
tacti defendere
per nervos à ce-
rebro, uisusque
ad propria instru-
menta.

Nervi sensorij
sunt molliores
quam mouent
particulas.

Sensus alioque
nervi afficiat non
sunt.

Motus in aëre
non consistit.

Nervi motorij
omnes sensu ta-
cti sunt prelo-
ri.

Optici nervi
sunt in oculis
etiam cõnstruc-
ti.

Oculi fabrica.

Vitæ humanæ.

Crystallinus hu-
mor.

Amphiblastroides
tacti.

Colorum genus
est proprium vi-
sui sensibile.

Gustus sapores
percipit.

Visus quæ per-
cipit.

& magnitudinem, & figuram, & situm, & intervallum, id quod sensibus alijs non licet, nisi per accidens nonnunquam tactui. Si igitur usus solus percipit sensibile quod ipsum mouet per medium aërem, non seu per baculum quendam, sed particula cōsimilem specie, & cognati ipsi, ac soli hoc illi exitium est darum, simul quod per reflexum uidet, merito opus habuit spiritus desuper influente pellucidi, qui ambiens aëri incidens (qualis est Platonis, Empedocleus sententia) & ueluti cōuerberans ipsum, facit illum assimilari. Usus igitur necessarii dicitur esse instrumentū pellucidum, splendidumque: auditus, aëre: olfactus, uaporosum: gustus, liquidum: tactus denique terreū. Neque enim aliter consistere possent, ut quæ ex similibus alterationem requirant. Sedenim instrumentū olfactus, minimè in nariū meatibus, sed in extremitatibus anteriorum cerebri uentriculorum consistit: in quas unguis nariū meatus perueniunt. Ceterū cōmuniū quædam facultas (de qua etiam differuit Plato) ex cerebro per nervos in singula sensoria perueniens, alterationes quæ in ipsis sunt, percipit. Porro quæmodum tactus sensus instrumenta per renium, sic gustusque per humiditatem & succos in sensus cognitionem perueniunt. Unde si inatæ facta uehementer sit lingua, corruptumque ipsa saporū dignotio. At obstructus narium meatibus, odorū sensus labefactus: non secus quàm auditorius, si aures obstructæ fuerint. Eiusmodi obstructiones, respon-

tionem ipsa anima habet. Alteratur itaque sensus instrumentum: dignotio autem ipsius alteracionis, fit ex una facultate omnibus sensorijs cōmuta, quæ à principio influir. Ceterū in istū ipsorum, siue cōmuniem sensum, siue princeps sensorium nuncupare uoles, nihil interest. Atque hoc prior disputatio iudicari esse cerebrum, à quo omnes particulae sensum & motū obtinent, descendentes alijs nervis in sensum instrumentum, ut sensibilia dignoscantur: alijs mouentibus ea quæ moueri desiderant. Etenim à cerebro oriatur & ipsa spinalis medulla, à qua nervi sexaginta procedūt. Quæ sanè ut cerebrum, duas etiam sortitur membranas: quas si quando iuxta singulos nervos à demeritis, nulla pars offendetur, in quam nervus demissus fuerit, cum uidelicet membrana ipsarū, regmina tantum sint & cerebri & spinalis medullæ: sensus autem & motus uis, in medulla, quam comprehendūt, existit. Quod si uerū partem medullarē secueris, statim membrum in quod nervus deferbatur, sensus motusque omnino expers reddetur. Quod autem spinalis medulla à cerebro suscipiat facultatem originis, hinc licet perpendere, quod secta ipsa quæcumque in parte, quæ regio supra sectionem habetur, conseruet incoluntia: ipsa quæ infra eam sunt, cōstituit motu simul & sensu.

GALENI PERGAMENI de Hippocrati & Platoni placitis lib. VIII.

Diximus igitur animæ principatum id esse, quod sensui à uoluntario præest motui. Voluntario enim dico, nam cordis & arteriarum motus, non pro arbitrio nostro perficitur: sicuti nec tertium morionis genus, quod circa alimentum dispensationem uersatur. Iam uero, ubi principium nervorum est, ibi animæ principatum existit. Atque principium nervorum in cerebro est: illic igitur animæ principatus est nobis statuentum. Omnes porro animantium particulae, nervorum compotes sunt: hæc manifestè ex cerebro descendunt in ipsas, illæ per mediam spinæ medullam. At iecur uirtutis vegetatricis, quemadmodum & uenarum, origo existit: nec repentur alia in animante particula, cui omnes uenæ connate sint. Si enim uena causa oriretur ex dextro cordis uentriculo, quod nonnulli existimant, omnino hæc, ut arteria, bifariam scissâ, altera parte ita à iugulum, altera ad iecur ferretur. Quod quum non appareat, clarum est, neque ex corde ipsarum originem ducere. Quod autem cor tum arteriarum, tum irascibilis animæ principium existat, abundè à nobis est demonstratum. Deinceps uero de naturalibus elementis, secundum Hippocratis & Platonis doctrinam, similiter differamus. Elementum est minima illius quod constituit portio. Quare ex neque quæ aliqd sunt, uox hæc elementum dicitur: quemadmodum etiam pars. Ve igitur ferimus nostri quatuor & uiginti sunt elementa, eodem modo omnium generabilium & corruptibilium corporum, terra, aer, aqua, & ignis, minimæ particulae existunt. At minimum dicitur, quod neuiquam sectionem

Sensus instrumentum alterari debet sensum.

Sensorium instrumentum esse cōmuniem sensum. Cerebrum esse princeps sensorium.

Nervi sexaginta ori à spina medulla.

Spinalis medulla membrana.

Spinalis medulla secta, quid æt edat.

Placitis de vi sensu sententia.

Olfactoris instrumenti sedes.

Tactus organum, quibus intercedendis sit.

Respiratio qua accendit.

Sensus est non alterari, sed alterari dignotio.

Hippocratis. Nam quibus accendit.

Partes motus sensu a sensum.

Visus instrumentum, cuius considerandum.

Aër purus à colore mutatur.

Aër quale visus instrumentum sit nolo.

Animæ substantia quæ sit.

Animæ principatum quid.

Cordis & arteriarum motus, voluntariū non est.

Animæ principatum cerebro.

Partes omnes corporis, esse neruorum compotes.

Iecur esse uirtutis vegetatricis, uenarumque origo.

Cor esse arteriarum principium, atque irascibilis animæ facultas.

Elementum est minima illius quod constituit portio. Elementa omnium generabilium & corruptibilium quæ.

Minimum quid dicatur.

fectionem admittit. Quom autem nullum corpus tam paruum sit, quod secundum magnitudinem per sectionem reddi minus non possit, certe quæ in diversam aliam speciem amplius diuidi nequeunt, ea corpora & minima, & insectilia, & elementa uocamus. Et enim pro cõfesso habetur, in unoquoque rerum genere reperiri indiuiduam quandam speciem talem, qualis est in naturalibus corporibus terra, aqua, ær, & ignis. Hæc enim elementa naturalium rerum, Hippocratem

Indiuiduam speciem reperiri in singulis rerum generibus.

Platonis de elementis sententia.

Sanctitatem primorum corporum in bona temperie consistere.

Medici quid sentiant.

Sanguinem ex quatuor constitui re humeribus.

Lux ignis ex sanguine.

Morbos similes in partem in antempe re consistere. Prima corpora quæ.

Generatio prima na uide.

Partes primarie quæ.

Partes instrumentariae.

Quatuor humores qui.

tum flaua, tum atra. Igni siquidem flaua bilis respondet: atra, terra: pituita, aqua. Ideoq; calida & sicca ipsa flaua bilis exsistit, quæ admodum ignis: atra, frigida & licca, consimiliter terra: pituita uero frigida & humida, quæ admodum aqua. At solum acreum elementum in animalium corporibus, propinquum suæ ipsius nature uidetur, & in respiratoriis & in pulsibus. Moderata ex omnibus quatuor elementis temperies, exactum produxit sanguinem. Sanum igitur maximè est corpus (ut Hippocrates nobis est autor) cum mediocriter & uirtute & copia hæc inter se habeant. Dolet autè, cum aliquid horum minus aut maius fuerit, aut dum ab alijs semotum, in aliam sedem transcurrit. Et enim hi quatuor humores, ad quamcumq; partem transibunt, in ea morbos efficiunt: erysipelara & herpes, flaua bilis: cancri, atra: erdemara, pituita. At sanguis cum in pulmone, & spacio inter pulmonem & costas medio, ex proprijs instrumentis effusus consistit, purescens tempore, tabem efficit. In uentre etiam, & per magna uulnera in grum coalescens, extrema pericula inducit. Terræ uero nullibi per se uidere est: solum in corpore coacturam: quemadmodum neq; ignem nisi per se solū, neq; aquam elementū. Porro Hippocrates multo accuratius quàm Plato, demonstrauit quatuor esse in corpore humores, & lege & natura distinctos: uidelicet sanguinè, pituitam, bilem flauam, & atram: illorum si mel opinionem conuelleret, qui nunc tantū humorem elementum hominis constituebant. Cum igitur affluxisset quatuor humores in se nobis secundum naturam, eosq; ut quantitate excedentes, sic qualitate alteratos, morborum autores fieri: postea ostendit, hunc quidem redundare pituitam, uere sanguinem, ætate flauam bilem, autumnò denique nigram. Ceterū de anni temporibus discretis, uirtute etiam, de ætatibus, regionibus differunt: cum uimurum alas semper iubeat cum autem tempore, regionè & ætate considerari. Ex regionibus, temperata quidè, ueri respondet: calida ætati: inæqualis calore & frigidityte, sed frigore & siccitate redundans, autumnò: humida deniq; et frigida, hyemi. Hæc itaq; ubi docuit Hippocrates, & præterea quod contraria contrariorum remedia existant, artis methodo elementa tradidit. Postea uero, traditis ijs quæ ad aphorismos pertinent, de exuperantibus in unoquoque anni tempore & ætate, morbis, ætuli syllabas his adiunxit. At uero Plato, æris quidem excessus, quotidianas: quæ autè exuberant, febres tertianas tribuens, hallucinatus est. Primū quidem, quod in cõmunia omnium corporū, nō in sanguinèrū animantium elementa, febrium circuitu temerarium, causam retulit: deinde, quoniam ad ueram earum febrium causam, ne propè quidem accessit. Apparet enim euidenter, in quotidianis pituitosius superare humor, qui humidus est & frigidus: in tertianis flaua bilis, quæ sicca & calida existit. Gignuntur tamen acutissimæ & ardentissimæ febres à flaua bile: atque ex genere ardentium febrium ipsa quoq; tertiana existit. Et enim de ipsius flauæ bilis natura, sic Plato scribit: Quæ autè corporis partes incendi dicunt, à bilis æstu

Thucydidi singulis, quales nam sint, quibusq; elementis propriè ratione respondet.

Sanguinem pro ditiorem fuisse à moderata quatuor elementis temperie.

Sana esse quando decurrit corpus.

Doler quando accidit.

Morbi ob humorum affluxum.

Sanguinem potest esse in uentre, aut in grum coactum, extrema pericula inducere.

Humores qui in quibus reducantur temporibus.

Exuperant cum temporibus corpora.

Contraria contrariis remediis esse.

Platonis de febribus sententia.

Quotidianas febres ueri à pituitosius humore.

Tertianas febres à flaua bile produci.

Tertianam febrem ex genere ardentium existere.

& flamma omnes infestantur: & post hæc deinceps. Quæ quò respirat extrinsecus, omnigenas tuberculorum species feruens emittit: intus autem cohibita, igneos, plurimòque morbos procreat. Verùm dum Hippocrates tradit, semper insitum calidum, omnium naturæ operum esse quammaximè causam, Plato non calidum dicit, sed ignem: quoniam tamen si ab igne ciborum còcoctio fieret, necnon distributio, sanguificatio, & nutritio, mediis utiq; in acutè febricitantibus hæc pernici uiderentur. At insitus calor temperatus existens, substantia quidem in sanguine & pituita consistit: qualitate autem, mixtus est temperatè, ex caliditate atq; frigiditate. Tutus igitur dixit Hippocrates, qui crescent, plurimum habent calidi innati atq; illud: Vires hyeme & vere natura calidissimi sunt: & sic etiam calore insito intelligens. Falsus etiam est Plato, dum attractionem pulmonis inter respirandum è medio tollit, inspirationemq; ipsam successione ad id quod uacuatur, nempe succedente uno spiritu atq; subingrediente per cutis poros, in locum alterius, qui expulsi-
us est, necessariò fieri contendit. Quippe nervi ab spinali medulla orti, arbitrarium motum maxime sculis thoracis largiuntur: à quibus eleuatus quidem, externum aërem per fauces & asperam arteriam, in pulmone attrahit: contractus autem, per eadem expellit. Pulsus autem à corde & arterijs fit: atque in eleuatione quidem, per arteriam cum orâ in cutem pertinentia, externus aër intra corpus attrahitur, triplicis usus gratia: refrigerij, euacuationis, & spiritus animalis generationis: in contractione uerò, arteriæ explodunt quicquid fuliginosum fumosissimè in ipsis procreatum est. Sermo itaque Platonis coarguitur: primò quidem, quòd inspirationem affectum su peruenientem, non àctionem uoluntariam consistat: cùm tamen in nostro firmè sit arbitratum, citius, tardius, minus, magis, & frequentius inspirare, quemadmodum expirare. Secundo autem, quia post arteriacum contractionem, oportet statim inspirationem fieri: sicut & post expirationem, protinus arteriarum eleuationem. Cæterum licet nobis longiori tempore respirationem cohibere, nec ob id tamen desinunt moueri arteriæ cum corde. Quinetiam eleuantur nõnnumquam hæ inspirantibus nobis: sicut & expirantibus contrahuntur: & in unius respirationis tempore, septies, aut octies, cum arterijs attollitur, deprimiturq;. At qui Platonem credunt fuisse aded imperitum & rudem, ut cùm dixit, spiritum potè tamq; pulmones ipsos excipere, exultant: porum omnem in pulmones deferri, ij finè manifestè falluntur: quando quidem non fuit talis eius uiri sententia, sed nonnihil ex ipsa portione, per fauces, pèrque asperam arteriam in subditum pulmone desluere, non per mediam instrumenti laxitate delatam, sed circâ tunicam, ceu lenimentu quoddam, aëris modo descendens: id quod uerissimum est, atque rationi cõsonum. Quòd si aliquis accepta, dum stat, copiosa aqua intra os, dein supinus decumbat, eiusmodi percipiet defluxu, si aperuerit modicè gutturis orificium. Verùm cum uulata portio & copiosa, tantaq; ut spiritus usui interceptat, ani-

mal ad rufim irritat: modo citè autè, nec omnino sensum sui, cùm per arteriam delabitur, exhibet. Ad hæc, si sribundo animali coloratur aquam propines, ac dem statim iugulat id disseces, pulmonem eius similiter coloratò inuenies. Liqueat itaq; manifestè, aliquid ex portione ipsos pulmones allabi.

GALENI PERGAMENI de placitis Hippocratis & Platonis lib. IX.

Cum autem facultatem discernendi rerum similitudines plurimi fecerint tum Hippocrates, tum etiam Plato, atq; ad discretionem huiusmodi necessaria sit reritatis cognitio, equidem ueritatem eorum que inquiris inuenturum te assumo, si primum initium uie que ad ea ducit, cognoueris: à qua aberrat, in perperam uerbocum captionem, errorèque decides. Est autem principium, dimidium, & (ut Plato ait) totius operis maximum. Si igitur nullum nobis insit naturale iudicij instrumentum, neq; artificiosum, nihil poterimus inuenire. At cùm naturalia & cõmunia omnes habemus, inueniemus etiam aliquod artificiosum. Quæ autem sunt illa naturalia iudicij instrumenta, quæ nobis cõmunia adsunt? Oculi secundum naturam habentes, qui uisibilia conspiciunt: aures naturali modo disposiæ, quæ audibilia percipiunt: lingua saporem diiudicat: nares odorem: & tota cutis tactum. Ad hæc intellectus, uel notio, uel mens, uel ratio, quæ consequentiam repugnantiamq; interuiscimus: atque alia præterea quæ has incidunt, in quibus est diuisio, & compositio, similitudo, & dissimilitudo. Vt enim sensibilibus iudex est sensus, ita & intelligibilibus alia quædam facultas, quæ ut quique appellare uoluerit, illi permittimus. Rectè itaq; dixit Hippocrates, rerum naturam inueniri, si à maximis quidem usu, facillimis autem cogniti, inceperimus. Etenim natura ambo nobis hæc dedit, & ipsa iudicij instrumenta, & quòd ipsi à nullo docti præceptore credamus. Ea igitur quibus iudicamus, & instrumenta sensuum sunt, & facultates instrumentis nentes. At fides ipsorum, citra disciplinam, & natura, non hominibus tantum, sed alijs etiam animantibus inest. Quum igitur appareant artium opera uirè hominum conducibilia, unque naturalibus iudicij fide accomodantes homines, de ipsis iudicium fecerunt: ac nos illis eò feliciores sumus, quòd quæ illi longo tempore, laboreq; improbo adinuenerunt, uelut breui condidimus tempore, futuri etiam præstantiores prioribus, si pari ac illi studio, similibus dissimilibusq; dignotioni in deesse insitamus, idq; semper auspiciantes à facillimis cogniti. Enimvero Plato, cū prius nos in ciuitate exercuisset, iudicassetq; alijs populi partem dominari, aliam propugnare, tertiam aliam opificem esse in ea: digestus tandem ad animam, etiam in ea ostendit aliam partem esse quæ dominetur, cùm bene habet: alterà quæ ipsi ministret, quemadmodu in uribus ministrare militaris consuevit: ac reliquam deniq;

Facultatem discernendi rerum similitudines plurimi fecerint tum Hippocrates, tum etiam Plato, atq; ad discretionem huiusmodi necessaria sit reritatis cognitio, equidem ueritatem eorum que inquiris inuenturum te assumo, si primum initium uie que ad ea ducit, cognoueris: à qua aberrat, in perperam uerbocum captionem, errorèque decides.

Principium autem totius operis maximum.

Iudicij naturalia instrumenta, quæ cõmunia adsunt.

Sensibilibus iudex est sensus, intelligibilibus alia quædam facultas, quæ ut quique appellare uoluerit, illi permittimus.

Natura uerum quæ pascit conueniat.

Iudicij fides per instrumenta uoluntatis, & facultates instrumentis nentes.

Feliciores quæ ratione finem reperiunt.

Partem meam animi facientem, rationis regebat, partem compage.

Calorem insitum consistere in pituita & in sanguine, mixtum temperatè esse, ex caliditate atq; frigiditate.

Respiratio quemadmodum fiat.

Pulsus fieri à corde & arterijs. Dilatationis arteriæ triplicis usus.

Platonis opinio de inspiratione & respiratione consistit. Inspirationem esse uoluntariam actionem.

Portionem partem aliquam in pulmone semper de fluere, per ipsam arteriam asperam.

Tussis uideri uarietatem.

tertil, quam alendi corporis gratia opifices nostri apposuerunt: et si discernendi similium dines imperiti, unam esse omnes sentiant, non tres cum memoratas particulas. Similiter etiam Plato in Phædro nos docet, ne unam quidem in se dubitationem habere, quæ naturalibus iudicii instrumentis manifestò subdunt: in cæteris uerò ambiguitatem fieri. Laborandum autem est in una quaque artis exercitatione circa materias, quarum actiones, uixit utiles, expetimus. Atqui uno mulierum proposito exemplo in quinto de Republica. nos Plato exercuit, quo modo inuenire discernere ipsi possumus, in quo similia naturis, & in quo dissimilia, quæ conferunt, existant. Aut enim illic, mulierem omnium studiorum natura composita esse: ac proinde non esse præter naturam, si uxores custodum muscen, gymnasticenq; exercant: in omnibus tamen feminâ uiro imbecilliorē existere. Mulieres porro uiris similes sunt, quatenus hæ rationalia animalia existūt, hoc est, scientiæ capacia. Quatenus autem uirorum genus est forius, & ad omne opus & disciplinam præstantius, mulieres autem imbecilliores, deterioresq; dissimiles in hoc fuerint. Differunt præterea à nobis mulieres, quatenus hæ quidem sunt feminæ, eiq; ad concipiendum idoneæ. Mulieri bus siquidem certæ quædam corpora particule insunt, quibus masculi carēt. Quare uerē aliquis dixerit, in aliquo mulier esse uiris respondere structura simili, in aliquo ab illis differre. Hippocrates autem faciem ægri nos inspicere iubet, utrū similes sit, an dissimiles sanis: præsertim an ipse sibi respondeat. Est quidō elapsum articuli sano Hippoc. cōparat, collatione in ipso affecto homine facta: nam deceptio plerumq; accidit, si alienis articulis ipsum confusas. Consecuerunt autem Græci similia nonnunquam uocare quæ idem aliquid obtinēt. Ad hæc, exempla secundū idem, in quæ conferuntur, Plato nos facere iussit: qui quidem in Phlebo & Phædro, diuisionem compositariam speculationē maximē necessariam esse ad artium constitutionem ostendit: in qua sanē duplici modo exerceri non uoluit, à primo quidem & generalissimo descendētē, ad ea quæ non amplius diuisa deorū per differentias in medio consistēt: quibus & distinctiones specierum confituit, in Sophistâ & Politicō monstrat. Contrā uerō, à specialissimis, quæ multa sunt, ad primum genus, per compositionē ascendētēs. Viam namq; esse utriusq; unam, sed iter duplex, ab altero primorum, ad alterum uicissim eunti. Nequit autem rationalis artium constitutio fieri, nisi in diuisione & compositione exercitatio accesserit. Porro speculationem circa medicorum dissidia, magnam uim obtinere, non tægris tantū ad sanitatem recuperandam, sed ualentibus etiam, ad tuendam eandem, auctor est nobis Hippocrates. Muri autē licet, cur artem medici petrantētes, in qua ea quæ offeruntur remedia, usu possunt diiudicare, utrū profint, an noceant, maximē cōtraria de his quæ profint aut nocent, intrepidē pronunciant. Siquidē in philosophia non sedatas esse plurimas differentiones, nihil miri est, cum res experientia iudicari perinde nequeat, ut ea de quibus medici digladiant.

Cæteri hinc nascit hæc controuersia, quod medicis quidem illis qui experientia sola artē constituerūt, illud solum uisum est utile, quod fortunata ipsis frequenter profuisse apparuit: neq; etiā ad contrariū uicibus rationē transire audent, ut illam quog; experiantur, nimirū ueriti successum improperū. Solus autē qui naturā ægrotantis nouit, & morbi dispositionē, & uim auxilij qd adhibebitur, præterea tempus quo utendū ipso est, audere possit, usus auxilio iam ratione explorato, spem confirmare experientia. Quare hic solus inueniet dissidij causam, & distinctiones, quibus animum adhibens, ad id quod ægrotanti cōducit, perueniet. Aliorū uerō nullus hoc ipsum cognoscat. Nam qui cognitis per experientiam a diueris, immoriturisq; illa sola assumunt, causantes naturam, aut artem, aut eiusmodi aliquid causam offensæ extinsit: id quod etiam in opere de fracturis ostendit luculenter Hippocrates, qui de uino, mulsâ, melle, aqua, oxymelle, pituita, & balneis, distinctiones conscripsit, accusans eos, qui in omnibus laborantibus grauiter, uel iubent, uel prohibet, singulis cōmemoratis uti. Nam interroganti an unū febrienti sit exhibendum, respondere debet, quod huic alicui dandum est. Idem uerō hoc de uoluptate Plato factitasse uidetur, quādam ipsarum, nempe ab honestis rebus profectas, appetere nos præcipiens: quāddā uerō fugere, quales sunt quæ ad uentrem spectant: quæ autem nihil ab his secretum obtinent, illas neq; fugere, neq; persequi. Inueniuntur porro generis uoluptatum differentie ex methodo diuisionis: quare quæ huius uia inueniuntur, affinitas & communia sunt ipsi, quæ ex similibus cognitione intelligi solent. At uoluptates ita bene similitudinem quidem inter se inuicem: cōmunitatem autem secundum genus. Elegantissimē itaque omnium Hippocrates atq; Plato tractarūt eas duas speculationes, dico illam quæ discretionē similibus & dissimilibus consistit, & eam quæ uia iuxta diuisionem generum usq; ad diuisionem tendit, & rursum à particularibus ad primum genus per differentias intercedentes reditum reciprocum facit. In uniuersum autem, rei de qua disputatur in primis oportet habere substantiam cognitā. Nam qui nouit, non simplicem unam animam in nobis speciem esse, sicuti in stirpibus appetitoriam, in dijs rationalem, sed in homine ambas cōsistere, & tertiam præterea irascibilem, nouit cum hoc etiam uirtutum numerū, uim, & possessionem: quemadmodum qui naturalem corporis nostri structuram habet perfectam, atque in similibus quidem, secundum elementorum cōmodationem: in instrumentariis autem, ex similiarum quantitate & qualitate, item uniuersusq; conformatione & situ, didicerit naturalem habitum effici, is morborū curationis cuique conuenientis, & præseruationis copiam habebit. Merito igit nonnulli exactam similibus & dissimilibus cōgnitionē sufficere ad methodicā cuiuslibet artis constitutionē existimant. Siquidē etiam ad iudicandum de his quæ in ambiguo sunt, dux hæc est abundē faciēs. Speculari porro, num huc mūdus generatus sit, an ingentis: sicuti etiam, an genti ipsius deus aliquis opifex fuerit: an deus nullus

Experiri uel
quo possit meli
ora.

Hippocrati,

Voluptates
nobis frequen
tissimas
aut Plato, quæ
ab honestis re
bus profectas
appetere nos
præcipiens, quā
ddā uerō fugere,
quales sunt quæ
ad uentrem spec
tant, quæ a iur
pibus.

Voluptates ha
bent similitud
inem quidem in
ter se inuicem, cō
munitatem autem
secundum genus.

Rei de qua di
sputatur, in pri
mis oportet ha
bere substantiam
cognitam.

Autem nos
stram esse tripli
cem.

Homines habent
similariū cras
similariū par
ticularem, in
quo consistit.

Cognitionē si
milium & dis
similium suffi
cere ad methodicā
cuiuslibet ar
tis constitutionē.
Quæstio in
uicem hominis: an
genitus sit, an
genitus sit.

Mulierem om
nium studiorū na
tura composita
esse.

Feminæ uiris
imbecilliores es
sere.

Feminæ uiris
longè deteriores
existere.

Mulierū simili
tudo, dissimili
tudoq; ad uiris.

Faciem ægri in
spiciendam esse.

Plato.
Diuisiōem, cum
posicionemq; spe
culationē, ma
ximē necessariā
esse ad artium cō
stitutionem.

Philosophia circa
medicorum dis
sidia, quid pro
fic.

40

50

60

quidem, sed causâ quâdam irrationalis & inartificiosa, fortuito ipsum adeo pulchrum effecerit: an etiâ Deus præsit mundi structuræ, sapientissimus simul & potentissimus: humilcemodî iniqua questiones nihil conferunt ad honestè rem familiarem administrandâ, aut ciuitatis negotijs cōmodè consulendum, aut deniq; ad morales uirtutes ac ciuiles adipsendâs. Carterû tñon sicuti mundus genitus ne an non genitus sit, querere inutile est, ita etiâ de providentiâ & de dñs. Nam quod sit aliquid homine præstantius, uirtute & sapientia in mundo, omnibus nobis inuestigare præstat: nō tamen quales dā sint substantiæ, utrū incorporei omnino, atq; corporei existât, necessarium est cōsiderare. Sunt autē multa falsâ, quam-simillima ueris: imō etiâ ipsâ sôphismata, ex similitudine quam cum ueris sermonibus habēt, cōstituantur. Sed inuoloscere ea, & inuicem discernere possunt, in illa materia, circa quam ars uersatur, exercitati, & præditi naturali industria: quam oportebat potissimū in puerili ætate, à cuiusq; ciuitatis senioribus prudentissimis iudicari, ac dein unumquemq; artem suæ naturæ congruam doceri: quandoquidem permultos uidemus hodie artes rationales exercentes, qui ne ea sanè quæ ipsi dicūt, assequunt. Cū igitur quod in omnibus rectè sit, omnes ad artem referant: quod autem in uno aut duobus, non ad artem, sed ad fortunam: merito ex nostri structura corporis, licet admirari summam artem, equitatem, & uim naturæ, quæ nos cōstruxit. Constat siquidem corpus nostrum ex ossibus pluribus q̃ ductis. Ad singula uerò ossa peruenit uentris uena, sicuti ad musculos: cum hac, etiâ arteria, & nervi: pariaq; ad muscū sunt & omnino similia in dextra animantis parte sita, q̃s quæ in altera sunt, os ossi, musculus musculo, uena uenæ, arteria arteriæ, ac uerus nervo: idq; exceptis uisceribus, atq; nōnullis particulis, quæ habere propriam descriptionē uidentur. Duplices itaq; nostri corporis partes, omnino inter se sunt similes, & magnitudine, & conformatione, sicuti & consentiunt, quam uoco iuxta mollitiem duri-tudinis differentiam. Quæ admodum igitur de humanis affectibus iudicium facimus, ex naui summa arte cōstructa cognoscentes peritiā ar-

tificis, ita etiâ de diuinis facere cōuenit, corporisq; nostri opificem admirari, quicumq; tandem is deorum existat, etiâ si eum uon uideamus. Vocat autē ipsum naturam cōmutari nōmine Hippocrates, cuius ministrū medicū esse ait. Plato etiâ, Deum causam quæ nos construxit, mundi opificem pronunciauit, qui suis filijs iussit humanum genus compingere, à se quidem accepta substantiâ immortalis animæ: in ea autē apposito eo quod generatur. Carterû quæ de animi substantiâ & de dñs à diuinissimo Platone traduntur, probabilia tantū & uerisimilia cū sint, quomodo possum de ipsis audaciter pronunciare, non uideo. Contrā autem, quod plures animæ sint species, quodq; sede triplici collocat: & quod diuina ex ipsis sit, quæ ratiocinamur: reliquæ autē dux affectibus obnoxie: hæc quæ irascimur, illa quæ corporis uoluptates experimus: quincitū quod alia in cerebro, alia in corde, alia in iecinore delitescat, me scientificas habere demonstrationes assero. Iustum tamen est admirari Platōnem, qui non solum methodos cōpendiose exposuit, sed etiâ oos exercuerit in singulis. Sunt enim tria capita. Primum, quod diuisione & compositione constat: secundum, quod sequentium, & pugnantium cognitione: tertium deniq; rerū inter se mutatione, in maioris & minoris, æqualis & similis ratione. Itaq; scopi secū dum quos singula rectè aliquis aggrediatur, omnino pauci sunt: * secundum autem ipsos exercitatio, non parum temporis postulat: id quod Plato quarto de Repub. ostendit, ubi conatur animam nostram triō simplicem, neq; uniformem substantiâ, sed ex tribus partibus cōpositam demonstrare, quæ singulæ propriam habent speciem, non unam autem uim, sed plures. Vnum enim appellat, quod cūq; subiectum cū sit, peculiarē obtinet substantiam, aut accidens. Porro substantia dicitur, quæ nō potest contraria circa idem eodem tempore pariter facere ac pati. At uerò hæc uox diuisio dicitur propriè, cū tum aliquod cōtinuum, in particulas scinditur. Sed metaphoricè dicitur, cū in differentias, aut species diuiditur: ut tertio modo, cū uox diuiditur in significata.

Sophismata cōstruuntur quæ cum ueris sermonibus habent.

Sophismata à quibus p̃sunt discerni. Inuolens q̃ naturam cuiusq; explorandam in puerili ætate offit: ac dein uin-gens, arti natura sue apta, docendum.

Arts quæ tribuuntur.

Fortuna quæ tribuuntur.

Natura cōmenda.

Ossa plura ducunt iuxta humani corporis.

Dextræ partes sinistru esse nomen partes.

Consentiunt quid.

Deum vocat autem Hippocrates, in alium eum mutatur, nō dicitur.

Animæ species, sedes, & delitescunt.

Scopi secundum quos singula rectè quæ aggrediatur.

Vnum quid.

Substantia quid. Diuisio quid.

EPITOMES GALIENI OPERVM
sectionis primæ finis.

EPITOMES OMNIUM GALENI

OPERV M SECTIO SECVNDA.

SANCTISSIMO D. N. P. III. P. M. ANDREAS
LACVNA SECOTBIENSIS, MILES

S. PETRI, S. P. D.



Vi Medicam artem exterminant, eamq; non esse ex vsu mortalibus persuadendi, summum diem ita hominibus esse à Deo praefinitum contendunt, ut non modo non produci, sed ne quidem ante illam metâ illo pacto vita intercipi queat, ij. Beatiss. Pater, praeterquam quòd falsa & inania loquuntur, omnem serè humanam providentiam è medio tollunt. Quocirca tamen si scrophanta id genus, insectissimi sunt Medicina ipsius hostes, eamq; assiduè saucient vulneribus, eius tamen sunt ope & praesidio curandi, cum gravissimo laborent animi morbo, correptiq; phrenitide, aut alia quavis animi alienatione, talia insanire cogantur. Infixit autem hanc opinionem complurium mentibus, quod legitur apud prophetam aut Iob, Deū constituisse terminos hominì, qui praeteriri non possent: id quod sane est verissimū. Deus quippe naturā nō hominibus tantum, sed etiam animalibus uniuersis (sub quibus comprehendit stirpes) constituerunt ceu quendam suā durationis atq; periodi apicem, ad quem singula peruenire possent, si omnes occasiones effugerent, quæ interitū precocem accersunt. Cum autem hic vita cursus in singulis animalibus, ab insito vitali humore proficiatur, portionem cuius in prima generatione nō omnia fuerit parem sortita, merito, mea quidem sententia, illa durabilior erunt, quibus eius copia largior obtigerit: vita verò brevior, quibus humor is insit parcior. Quem admodū igitur si cōseruemus oleū purissimū, semper illi inardebit flammula, quandiu oleū ipsum durauerit: extinguetur autem, ipso oleo absumpto: pariteriam ratione, si humore natiui caloris somite, immunit ab omni corruptela tueamur, nō defungemur vita, donec ipse prorsus nos deserat: quod ubi acciderit, produci amplius dies nostri nō possunt: ac proinde is erit verè ultimus vita terminus, quem nimirū transferendi nulla homo industria, aut ratione potest. Quòd si quisquam Dei donum ac beneficium contemnit, aut vitam exofans habens, prius quàm ad finem sibi designatum adueniet, der seipsum precipitem, disrupitque crupula & viro: prauidit quidem huic talem Deus exitum, non praefinit autē, cum ipsum suo in consilio atque imperio voluntatis reliquerit. Est itaq; singulis iam sua extrema dies, ad quam vitam peruenire, si optima mens ratione, possunt, à Parci ipsis praefixa: quam quidem ut praeterire nemini ab illis est datum, sic etiam ut eam consequantur, solus continet illis, qui praecipit Medecorū audientes, & temperantissimè viuunt, & fouere rapidum illum humore, vita autors, omnibus modis conantur: ad quam rem plurimum confert cum exquisitissimo victu, exercitijsq; modicis, etiam regio vel admodum temperata, vel ad frigens magis quàm ad calorem declinans. Pro varijs siquidem ipsius cæli constitutionibus, constat hominum temperamenta, adeoq; aetates ipsas variari. Aethiopes quippe (id quod tradit ex Asclepiade Galenus libro de philosophica historia) circa tricesimum annum senescunt, quòd sub ardentissimo sole, eorū calor geniuus quàm citissime vna cum subiecto humore euascescat. Angli verò Daniq; ob contrariam causam, ad necessimum supra centesimum annum, nisi propria pereant intemperantia, solent vitam ipsam protrahere. At Hispani, ut situ sunt medijs inter hos, sic vitam illis quidem longiorem, his autem longè breuiorem sortiuntur. Inter omnes porro temperies atq; constitutiones ambientis, quas minè expectari contingit, nullam hac tenus adeò propitiam reperi tum hominibus, tum fructibus uniuersis, atq; est hec qua persruuntur Veneti: apud quos, fructus quidem ipsi quam diutissime incorrupti & succulentissimi seruantur: homines autem, vegeti, floridq;, raro nisi extremo senio absumentur. Id quòd sane est in causa, ut Veneti passim tot senes, tamq; reuerendi, cernantur. Romæ verò contrà, perpassim inueniuntur veri atq; genuini ciues sexagenarij. Quòd si qui exteri illuc aetate ingrauescentes conflāt, intercipiuntur breui: quod certè argumentū efficacissimū est, te, Beatissime Pater, singulari modestia & temperantia tua, peruicisse malignitatē syderis: quippe qui sensibus uniuersis integris, absolutissimq;, tam venerandam canitiem indeptus atq; assensus fueris: ad quam quidem nobis feliciter cōseruandam, producendamq;, in multa annorū curricula, quaecunq; de tuenda valetudine Galenus Pergamenus conscripsit, ea omnia nuper insigatione Excellentissimi Viri Ioan. Aquileij, iuu medici longè vniuersissimi, à me et castigata, et in enchiridion coacta, dicere Tuae Beatitudinis statu sperā fore, ut hoc eras T. S. officij meū pijs omnib. quæratissimū esset, ac præcipue illis, ut reue vendiss. D. D. Frāscō à Bonadilla et Mendozza, Cardināli Cauriensi, Patronoq; meo singulari: qui

Beatitudinis Tuae amantissimus, nihil tam habet in votis, quam ut eam dum CHRISTVS feruet superstitem. Quare Vnicè T. S. oro, Beatissime Pater, ut quemadmodum superioribus ductus periochen illam de victus & exercitij ratione à nobis oblatam, vultu hilari suscepisti, sic salutes hos commentarios, quos offerimus denuò, suscipias: exiguos quidem, sed ea imbutos eruditione & doctrina, quae possit mirè tuum oblectare animum, teq; manu placidissima ducere ad extremum illud senectutis fastidium, quod omnes cupimus, quodq; prius quam assequari, tibi longum adhuc iter est conficiendum: cum non dubitem quin, si Galeni institutus & documentis vsus, pro soluta etiam sapientia tua, constantiaq; & animi magnitudine insuperabili, fausta omnia & aduersa, breuiterq; vniuersas humanarum rerum vicissitudines, eodem animo tuleris, adhuc sis victurus nobis diutissimi. Quod quidem Ecclesiae suae largiri dignetur Deus Opt. Max. Vale. Venetijs, ex aedibus illius tristissimi D. D. Joannis Furtadi à Mendoza, in hac Repub. Caesari Oratoris longè dignissimi, quarto Idus Aprilis, M. D. XLVIII.

REVERENDISSIMO IN CHRISTO PATRI,

D. D. NICOLAO VINICIO, EPISCOPO BALNEOREGIENSI, ac S. D. N. P. III. Datario uigilantissimo, sapientissimolq; dirigetur liber de fanitate tuenda, ad Pontificem maximum.

*I liber, & quam fers, domino impartire salutem,
Vinat ut admonitu tempora longa tuo.
Sis licet exiguus, tecum sed Nestoris annos,
Multaq; conciso corpore secla geris.
Verùm ne nimium timidus videare, vel audax
Materie pecces utilitate tua:
Scis cui magnarum Paulus molimina rerum,
Eius ut arbitrio stentq; cadantq;, dedit:
Qui sacras dispensat opes, qui ne quid ab illo
Tentetur contra iusq; piumq;, cauet:
Hinc vni te crede liber: si duxerit iurò,
Et patrocinio iuuerit ille suo,
Res tunc facta tibi fuerit, nihil amplius optes.
Sed propterea ad sacros oscula ferre pedes.*

GALENI PER

GAMENI AD THRASYBV-
lum, num ratio tuenda sanitatis, ad medica-
lem artem, an ad exercitatoriam
spectet, liber vnus.

Inueniunt inueniunt optimum
quod sit.
Rationalem co-
templationem per
uenerunt ad
inueniunt effi.



N omni cōtemplatione optimā
inuentio inueniunt inueniunt
ex acē cognoscere quidnam sit id
de quo disputetur. Qui autem ra-
tionalem cōtemplationem satis
diligenter tractat, is quodlibet

Medicinam effe
artem ager-
tem, et san-
guinem.

Exercitatoria.

sanē quicquid aequo discutere poterit: sine qua
quidem commentariis euoluere, nihil aliud est,
quam oleū & operam ludere. Cū igitur in con-
trouersiam uertatur, num ars sanitatis tuenda
ad medicalem artem spectet, an ad exercitatori-
am: qui medicinā esse curatiuam agerit, & sa-
norum cōseruatricem, definitum, et certē medi-
cinæ partem, salubrem esse confirmant. Qui uē-
rō medicinam laborantiū tantū curam habere
aiunt, ab ea sanitatis cōseruatricem abstrahunt.

Ira & exercitatoriam si quispiam sanitatis seruati-
tricem statuat, quæritum pro comperto habue-
rit: quemadmodum & qui solum boni habitus
eam opificem tradat, diuerso modo & ille ambiguum
pro certo assumet. Nunquid igitur sic medi-
cinam definire præstiterit, eam esse cuius finis
est sanitas? Gymnasticam uerō, cuius finis est bo-
nus habitus? At sic etiam gymnasticæ salubrem,
tanquam nihil sit dubium, detrahemus: medicinae
autem adhuc obscurū attribuemus, quæ cum-
que enim definitiones constituuntur à fine, non
exiguas ambiguitates pariant. At qui salubrium
scientiam medicinam esse affirmauerit, is etiam
nimis audacter salubre, tanquā medicinæ partē,
accepisse uidebitur. Non deerunt siquidem con-
trariæ factionis nonnulli, qui agrotabiliū tan-
tū scientiam esse medicinā contendunt: hi ta-
men primū ignorant, contrariorū omnium unam
esse scientiā: & qui cūq; agrotabilia norit, hunc
& salubria non latere necesse esse. Dein uerō ne-
siciunt, quod & salubre dicimus signū, quod æ-
groto adueniens, futuram sanitatem portendit:

Definitio cō-
finita à fine,
nō corpus am-
biguitate pars
it.

Contrariarum
nam esse scien-
tias.

Salubre signū.

Causa salubris.
Salubre corpus.

nec non causam salubrem, quæ sanitatis est pro-
creatrix: sicut & salubre corpus, quod est sanita-
tis prædium: quorum omnium medicus scientiam
habet. Periculum autem fuerit, ne si unam tran-
seamus, septem circa humanū corpus artes con-
stituiamus: primam & manifestissimā, & penē so-
lam controuersia carentem, eam scilicet quæ ex-
pellit morbos: duas alias, unam à sanitate secu-
ndum affectionē, & lubricā, ad eam quæ est in ha-
bitu, ducentem: alteram, in ea cōferuentē: duas
item alias circa bonum simpliciter habitum, esse
stricem unam, alteram quæ cōseruat: præter has
etiam duas alias, circa bonum habitum Athletarum
uerfantēs, qui non simpliciter bonus est, sed
cum adfectionē, atq; periculosus. Ab his autē se-
ptem, alias possemus etiam numerare artes, cu-
suis modi est & compnata, quæ corpori pulchritu-
dinem quandam adulterinā conciliat, uiriosa &
adulatrix euentis. Huic etenim est cōtraria, quæ

Adulterum ha-
bitu pericula-
tu.

Compnata ars
uirtus & adu-
latrix euentis.

circa legitimā, uerāq; pulchritudinē (quæ in ue-
gero colore, carnis moderata copia, membro-
rum congrua coagmentatione consistit) uersa-
tur. Porro sanitas & bonus habitus nō idem no-
bis significat: cū sanitas quidem, salubre quan-
dam affectionē: bonus autem habitus, non affec-
tionem simpliciter, sed fixam & permanentem
significet, quam nimirum omnes desideramus.

Cū autem omnes actiue artes proponant sibi
quod in materia circa quam uersantur, est ualde
optimū, ac maxime duraturum: earumq; finis sit
unus, nempe ipsius propoliti cōsecutio: urique
manifestum euadit, artis circa corpus nostrum
uersantis, finem etiam unum, ut propoliti unū,
existere, siue id quispiam integritatem, siue bonū
habitum, siue sanitatem, siue naturalem corpo-
ris structuram, siue naturalem actionē, aut affec-
tionem nominare uoluerit. Vt enim corpus hu-
manū una res est, sic huius quoq; una perfectio
habetur, quam & præsentem custodire, & abien-
tem reuocare, alicuius artis officium est. Quare
nec multa corporis bona ponenda sunt, neque
ipsius boni, quod est, aliam opificem, aliam con-
seruatricem artē statuere oportet. Ita uerō cū
unum sit corporis bonū primariē ac propriē di-
ctum, ut puta sanitas, ad quod cetera referuntur,
ut actio integra, pulchritudoq; , certē nō per alia
exquisite sanescit corpus, per alia robustum atq;
pulchrum euadet: unde una circa corpus esse ars
concluditur. Quemadmodum igitur animi, sic
etiam corporis bona multiplices dici solent:

unū quidem ratione primariā, ut sanitas: aliud,
tanquā fructus illius, ut actio: tertium denique
necessariō consequens, ut uidelicet pulchritudo:
nec licet alicui horum prodesse, aut obesse, quin
omnibus tribus aut prois, aut nocere. Ars itaq;
in primis efficere sanitatē uidetur, quam necesse
est actio naturalis pulchritudine sequi. Quod
enim primū artifex cum fecerit, acquiescit, id e-
ius planē finis existit: at naturali affectione per
quam agimus (hoc est, sanitatē) resistit, cōquies-
cit: finis igitur medicinæ sanitas est, quam cū
induxit, nihil circa actionem pulchritudinemque
laborat, ut quæ uel inuito artificis sanitatē sequan-
tur. Sed neque in ulla materia ars una finis effe-
ctio, altera cōseruatrix habetur. Qui autem sa-
nitatem propriā ratione tuetur, circa illa, iudicio
meo, uersatur, quibus, uelimus nō nimis, corpus
nostrū utitur: qualia sunt, ipse nos ambiens aer,
somnia, uigilia, quies, motus, ac deniq; cibis &
potus. Hæc siquidem quæ per se habent in uian-
dip potestatem habent, sanitatis custos specula-
tur, id semper ante oculos habens, ut in corpore
exacte sano, ualidoq; , nihil inuare audeat: cū
uero aliquantulum moderationē transierit, con-
tinuō quod deficit, priusquā latius id malum fer-
pat, resarciat. Siue enim plenitudine, siue inani-
tione laboret corpus, utriq; utrumq; ars una uno
modo emendat, quod deficit nimis instaurans.

Ceterū in quanto, nō in quali, correctionis dif-
ferentia uersatur. Atqui secundum quantū in his
quæ sunt differentia, ad unam artem pertinet:
quod si alterius artis esse debeat, oportet pro-
prietate etiam differat. Porro cū multæ ac
uariæ sint medendi rationes, quarum alix ferro,

unicuique esse
artem, quæ circa
humanum cor-
pus uersatur,
bona autem &
corpora multo-
plicantur diu.

Sanitati affectio
natura reus, pul-
chritudoq; cōsequi-
tur.
Sicque ars quod
sit.
Medicina san-
itatis.

Res expendenda
i. medicina.

Notandum ni-
hil in san-
corpora.

Moderatio-
nis uaria.

Pulchritudo uo-
na in quibus ob-
sistat.

Sanitas quid.
Bonus habitus
quid.

Artem amari
sopit.

Artem cuiusq; fi-
nis, est cōsequen-
tia scopi.

Artem medica
sana.

Perfectio huma-
ni corporis, una
tantum existit.

Unicuique esse
artem, quæ circa
humanum cor-
pus uersatur,
bona autem &
corpora multo-
plicantur diu.

Sanitati affectio
natura reus, pul-
chritudoq; cōsequi-
tur.
Sicque ars quod
sit.
Medicina san-
itatis.

Res expendenda
i. medicina.

Notandum ni-
hil in san-
corpora.

Moderatio-
nis uaria.

Artes distinguenda non esse, per actiones singulas.

Scopus omnium meditationum omnium, est sanitas.

Artes omnes in subiecta subiecta bona versantur
Medicina unius variae species, sunt partes sunt, omnem sanam rem emendat.
Artes esse distinctas quidem scopus.

Medicinam artis laceras vestes fecerit, esse finem.
Finis artis quid sit.
Artes officinae ab aliis, quo differant.

Sanitas est medicina finis.
Artem non esse ex materia quid cadens.

Medicina in finem materiam habet.

Artem iudicandam esse finem esse.

Artem cuiusque ratione, a fine sumitur.

alix igni, alix medicamentis, alix viis ratione curatur, hallucinantur sane qui per singulas actiones, artes esse distinguendas putant. Nam qui adeo sanus atque stupidus est, ut in medicina modis propositis actiones deducat, atque aliam quamprimum arte pro unaquaque ipsam statuat? Etenim ob commune propositum, quod sanitas est, omnes qui quocumque modo medentur, medici vocantur: sed propter actiones, aut materia, aut membrum diversitatem, hic manualis, hic medicamentarius, alter ocularius, & est, & dicitur: manualis ab actione, medicamentarius a materia, sicuti ocularius a membro: & cum omnes sanitatis gratia operentur (artes enim omnes in subiecta substantia bono versantur, atque illi operam navant) sequuntur operationis modos diversos. Erit itaque medicina unica, sed ipsius variae species ac partes, omnes ad eundem scopum tendentes, ad sanitatem videlicet. Ac proinde non multitudinem agentium, sed propositis exploratis, artes sunt distinguendae. Si quidem singulata innumera sunt, sed generale quoddam opus omnibus est commune. Nam & corpori aliquid ut superuacuum detrahens, aut aliquid quod deficit adiciens, unum uterque opus praestat, corpori naturalem modum, hoc est, sanitatem conservans: proinde utroque & calefaciens, & refrigerans, sicuti & madefaciens & siccans. Non est autem unius artis, opus facere: alterius, vitium corrigere: sed eundem. Quod si non eundem, ad certam medicinam nihil quod prius non esset, procrearet, sed arti laceras ac tritas vestes sarcienti oppido similis est: sanitatisque conservatio, parum labefacta corrigi, minimè exiis diversum genus a curatio. Est porro id artis finis, quod quiete artifice, demonstrare valeamus, ut sanitas: quae ratione effectusque artes ab actibus, quam finis ipsa actio est, tantum differant. Nam quamprimum actus ab agendo desierit, finis quoque unus desit. Nihil siquidem in saluatoria praeter ipsam actionem ostendere possumus, ut in fabrici grabatum, in edificatoria domus, sanitatem in medicina. Quare nec sanitatem custodire, aut vitiatam emendare, aut prorsus amissam recuperare, finis est: sed omnia haec actiones sunt, finis autem est sanitas. Sed neque ex materiis ipsis artes diiudicandae sunt: quandoquidem materiae unam consistat pluribus artibus subijci (ut lignum, exempli gratia, vasum artificii, carpentarii, machinarum structori) sicuti & unam eandemque artem, per multis rei materiis. Quippe medicæ arti, una cum sit, infinitae materiae subijciunt: corpus nempe sanitatem suscipiens, tibi, ac potus, & medicamenta omnia, sicuti & vocata diætemata. Haec igitur materiam sunt causam vim obinentes: corpus autem, tanquam id ex quo finis, aut in quo. Itaque ad finem properare omni ex parte, ab eo ipso aites iudicare, praecipit ratio. Propter hunc enim & communibus actionibus, & propriis praecipitis atque principijs differunt: nam haec & secundum artis fines curant: & cuiusque artis constitutio a fine (quae regula omnium artis praeceptorum existit) sumit initium. Igitur unum tantum cum sit humani corporis bonum, sicuti & aliarum omnium substantiarum, atque una similiter ars, quae circa illud versatur, huius artis iam omnes particulas spe-

culamus: cuius quidem finis cum non in sola contemplatione sit finis, sicuti Aristotelis, Astrologia, ac Physica: nec simul cum actione ipsa desinat, quod contingit in saluatoria: manifestum utique est, neque inter actus, neque contemplationes, sed inter effectus autem acquisitiones, quales sunt quae ex parte vitiatum corrigunt, eam esse consummandam: sic ut natura quidem & corpus salubretur, & ipsum imbecillum confirmetur: eius autem sinistra sit ars, quae imbecillitatem investigat. Appelletur igitur correctiva: quae quidem aut multum subito corrigat, aut paulillum. Etenim quae ipsius pars multum semel corrigat, eam medicatam aut curativam dicamus: cuius sanæ, quemadmodum quantitas, differentia permagna existit: quae utroque paulillum, conservativam. Atque haec quidem insignibus differentijs tripartito distingui videntur. Aut enim exactè valentem accipiens, in hoc ipsum gradu conservat, diciturque euectice, hoc est, boni habitus conservatrix: aut eos qui iam evaserunt morbum, ac secundum habitudinem sani existunt, reficit, appellatur analeptice, hoc est, instauratrix: nam quae inter utranque pars collocatur, versaturque circa corpora in habitu non in bono habitu, sanæ, ac conservativae simul & salubris nuncupatur. Tres igitur haec partes conservativae, analeptice, salubris, & euectice, sunt quidem omnes sub ea medicinae parte, quae exigua tollit uria: inter se autem ratione maioris minorisque differunt. Minora enim castigat euectice: paulo his maiora salubris: adhuc maiora analeptice. Quidam utroque & quartam hanc particulam prophylacticam, hoc est, praeservatricem addunt, facultatem ei habentem oppositam, quae a morbo reficit liberatorem. Curativa igitur, magna vitia: euectice autem atque salubris, parva tollit in medio utroque harum interstitio analeptice & prophylactice posita sunt, si ad salubrem atque euecticam comparantur, haud exigua vitia emendantes: si ad curativam, non magna. Quocirca non immerito neutrae appellari possunt. Ergo ut totum sermonem repeterem, circa corpus humanum unam quædam artem constituo, eiusque duas has esse partes, efficientem naturam, corrigentem alteram: ambabus haec prius natura inesse, sed ipsarum alteri, emendatrici scilicet, humanam artem optulari. quæ & ipsa bipartito diuiditur, in curatricem partem, seu medicatricem, atque in alteram conservatricem, quæ & salubris vocatur. Huius rursus tres partes sunt, analeptice, euectice, ac toti generi cognominis, salubris. Cum autem omnis questio sub definitionem cadat, sanæ si quid tum medicina, tum gymnastica sit, didicerimus, nec amplius difficile fuerit iovenire ad utram ipsarum salubris referatur. Cum ergo una tantum ars circa corpus versetur, poterit qui voluerit, medicam eam appellare: sin hoc non placeat, exercitatoriam. Sin id quoque displiceat, totam artem nomine carere dicemus, unam eius partem, medicam, alteram exercitatoriam appellet. Si neque id probas, salubrem quandam artem curati ex ea diversio distinctam, eumque partes diætericem, gymnasticamque dicito. Singula enim nomina si interpretabere, ita uniuersum quod quaerebas indeptus fueris. Quod autem ut arte corpora male

Medicinam esse inter salubrem et curativam dant.

Medicinam esse ministram naturae.

Medicatrix medicinae pars.

Conservatrix medicinae partis triplicis.

Euectice.

Analeptice.

Salubris.

Prophylactice.

Correctivae artis partes, humana non artem esse solent.

Quod bonum omnium sub definitionem cadere.

Iam.

malè affecta curantem, iatricem, hoc est, medicinam, sic artificem etiam ipsum, Medicum appellat Homerus, perinde atque alij Græci, uerba illius in dicant ubi ait:

*Vix medicus multis alijs tibi dignior esto,
Dixit uerum trahens, et pharmaca misit fonsdens,
Multa salubria misens, et letalia molis.*
* Vnicuique crassius, sed tamen omnia collens.

Medicina quæ
sunt partes præ-
cipuæ.

Gymnasticarum
in quando fuerit
exercitia.

Athletarum ha-
bitum esse uisum
probandum.
Iam habitus
qui laudandus

Materia altera-
ris corpus, sunt
quatuor in uis
uicibus.

Agræ exercitio
non opus.
Sani exquisiti,
qui negligant.

Salubris artis
pari esse gym-
nasticam.

Sani uisio in mo-
deratione consi-
stet.

Athletarum gym-
nastica uicem
potius excoquit,
molitur.

Uicem crassius
salubrem mentis
non gerunt.
Athletæ esse
motus obno-
tios.

Gymnasticæ le-
gimus autores.

Præcipuas porro medicinæ partes esse phar-
maaceuticam, chirurgicam, & dieteticam, nemo ferè in
ficiatur. At gymnasticæ artis nomen, Homeri se-
culo nondum reperit erat. Nam paulò ante
Platonis tempora gymnasticarum ars exorta est:
quo etiam tempore Athletarum exercitio emer-
sit: quorum quidem bonus habitus ut uisuperan-
dus est, sic etiam ipsos instructus gymnasticæ, cõ-
tumelia nõ caret. Eum autem habitum bonũ lau-
damus, qui & tutissimus est, & ad obediens na-
turales actiones maxime idoneus: cuius materiæ
effectus simul & conseruantur, dux sunt, & salu-
bris uocata uictus ratio, & exercitio. Nam cum
quatuor sint genete omnes materiæ, à quib. nõ-
strum alteratur corpus, manuarum functio, medi-
catio, exercitium, ac uictus ratio: una quidem est
ægotis inutilis, dux uerò secundum naturam se-
habentibus. Aeger quippe in multis medicamina,
manuum operam, uictus rationem posu-
lans, nulla ex parte exercitatione eger: exquisitè
autè sanus, corpus exerceat, & certa quadam ui-
ctus ratione utatur necesse est, sed medicamenta,
aut manus ministrat, non postulat. Salubris
igitur artis cõstat partem quandam esse gymnasti-
cam. Siquidem enim Plato in Gorgia, aliam
gymnasticam esse ait, ut artis corpus regentis par-
tem: atque aliam qua utuntur Athletæ: quam
nimirum ceu omnium flagitiosissimam crimina-
tur plurimis modis: huius quidem finem, uirum
esse incrementum, quo aduersarij proferant:
illius autem, usum ad naturales actiones, confir-
mans. Cum igitur in quadam moderatione sani
tas sita sit, Athletarum autem gymnastica item
perius excessumq. molitur, multè ac solidam
carnem procreans, sanguinis copiam quam te-
naciissimi adaugens: haud difficile inuentu fue-
rit, artem hanc omnibus naturalibus animalibus
actionibus prorsus inuilem esse (crassius enim
uenter subtilem mentem nõ parit) atq. ob-
noxiam periculis. Quare Athletarum nonnulli re-
pentè obmutuerunt: alij sensum motumq. amiserunt,
ac penitus attoniti facti sunt, mole illa præ-
ter naturam, ac multitudine, insitum extinguente
calorem, liberumq. spiritum transitum interclu-
dente. Quicunq. autem ex ipsis mitiora mala pa-
tiuntur, rupto uasè sanguinem uomunt, aut ex-
puunt. Ceterum legitimæ gymnasticæ autores
sunt, Hippocrates, Diodes, Praxagoras, Philoti-
mus, Erasistratus, atq. Herophilus, & quicumque
alij notam artem ad corpus pertinentem optimè
diderunt: quorũ sanè dogmatibus congruit illud
Platonis: Vna cum sit corporis curatio, duas e-
ius partes appello, unam gymnasticam, alteram
raticam. Licebit etiam in ipsa arte corporis præ-
sides, si quis inuenire partes eius desiderat, ægros
curantè, medicatui: sanis cõsulentem, salubrem
appellare. Vel melius sic ut diximus antea: Ars

corporis curam habens emendatrix cum sit, qua
parte magna uita corrigat, medicatrix dicetur:
qua uerò exiguas noxas tollit, uocabitur conser-
uatix. Quinetiam aptius à materij has partes,
morbidam unam, salubrem alteram appellau-
ris: quæ ut antè à nobis est dictum, in reſectricè,
salubrem secundum habitum, & euicticem, siue
boni habitus effectricem, dicitur. Nam deſta-
rum partũ singulis propria materia subiicitur:
primæ quidem, secundum habitudinẽ siue affec-
tionem ualens corpus: secundæ, secundum ha-
bitum: tertie deniq. bono habitu præditum. Ete-
nim corpus secundum affectionẽ sanum appel-
lo, quod iam extra morbum cum sit, leui tamen
noxa pulsatum, facili in morbum relabitur: im-
becillum etiam ad actiones exiens. Secundum
habitum autem, quod iam periculis obnoxium
non est, absoluit tamen actionũ robur nondum
est cõsecutum. At bono habitu præditum, quod
extra omne uiciale periculum, ac præſert etiam
insigne quoddam omnium actionum robur. De
sanitate etiam similiter iudicandum. Sanitas nan-
que secundum habitum, iuxta sanitatem secundum
affectionem & bonum habitũ, actionibus
media est. Nam sanitas in affectione, debiles a-
ctiones producit: bonus habitus firmiores. Sa-
nitas autem in habitu, nondum quidem firmas,
non amplius tamen debiles. Quod si secundum
auxiliorũ materias artem hanc salutarem, cõser-
uatricemq. distribuas, in quatuor partes ſecabis.
Vna quidem in assumptis, altera in ijs quæ ſiunt,
tertia in his quæ euacuantur, quarta in forinſe-
cis occurrentibus, prorsus uerſari uidebitur: per
hæc enim sanitas custoditur. Pars igitur quæ in
his quæ assumuntur uerſatur, ciborũ potionumq.
quæ uicioris custodiam pertinentem efficitur.
Quæ uerò in ijs quæ euacuantur, excrementorũ
omnium est exploratrix. Quæ exterius incidentium
est, æterem, aquam, oleum, & cetera id genus
ſpeculatur. At quarta pars artis quæ ſuperest, in
ijs quæ aguntur poſita, studijs exercitiorũ
busq. cõtinetur. In omnietas namq. uigilia, ſom-
nus, uentus, ira, lauatio, ex hoc genere ſunt. Ce-
terum ſingularũ enumeratõrũ ſalubrium quan-
titas, qualitas, & occasio, dignoſcenda eſt. Mini-
ma igitur ſalubris artis pars eſt de exercitiorũ
bus ſcientia: rectius enim puto gymnastica ars
appellabitur, quæ omnium exercitiorũ facultas
cognitio eſt. Nam quæ ad palæſtram ſolũ pe-
tinent, cognoscere, per quæm exiguum eſt, om-
nibusq. mortalibus miſum eſt. Vnde tibi iam
intuere licet, non modò ſalubris artis quora ſit
portio gymnastica, ſed etiam gymnasticæ mi-
nimam eſſe particulam lætandi ſtudiũ, & luiti co-
gnatorum Athletarum exercitium, affectionis cu-
iufdam non naturalis effectiũ. Idcirco eos malè
ſentire cõſtat, qui in diuidenda rora arte, gym-
nasticam medicatiuæ opponunt: illa namq. à ma-
teria, hæc à generali cõmuniſ actione appellatio-
nem habet. Similiter etiã quiſquis per diuſionẽ,
medicatiuo conſeruantium opponit, cognatorũ
opponitionem facit. Porro cum uniuerſe artes
mechanicæ mutua ope indigeant, perfectiori-
busq. materijs ex quibus ſine ſuum conſequen-
tur, ſuppeditent: instrumentaliſ optima, per quæ

Correctrix art.
Medicatrix.
Conſeruatix.

Corpus ſecundum
affectionẽ
ſanum, quod
eſt dicatur.
Corpus ſani ſe-
cundũ habitũ.

Corpus bono ha-
bitu præditum.

Sanitatem tri-
plex eſt.

Cõſeruatricem
artem, ſecundum
auxiliorum ma-
terias eſſe qua-
druplicem.

Exercitiorum
eſſe minimã ar-
tis ſalubris par-
tem.

Artes omnes me-
chanicæ, uo-
ta ſua ope indige-
re.

Artem melius
proficere vni-
uersis mechanici-
ci artibus.

Salubris medici-
na pars.

Gymnastica.

Palaestra.

Gymnasia.

Panisc.

Canis.

Palastrum of-
ficii multis gymn-
asticis.

Gymnasticam
dicimus artem
instruere duci-
fis.

Luctatoria.

Cabalis.

Luctatorium ar-
tem vicia robur
proleuare.

Curatio aut ar-
tem partem primi
omnis fuisse in-
finitam.
Medicina.
Medica.

Medicina prae-
parata.

illis adornent, conficiant: eis omnibus, ceu quae
dam architectonica, ars corporis curatur, quae
una est, praefidet. Si quidem edificatoris, ut tales
quasdam aedes extruat, praecipit: calcet, ut cal-
ceum: panifici, ut panem: culinariae, ut obsonii:
alijque singulis, ut quaeque apta est, imperat. Sed
huiusce artis corpus nostrum curantia, salubris
appellata pars est, cuius quadripartitis diuisae,
partis unius gymnastica particula existit. Cauen-
dum tam est ne praedictam, aut palaestrae prae-
fectus, cum gymnasia confundamus. Nam qui la-
ctas omnes & frictionum sigillatim omnes actio-
nes ritè obire uolet, iste panifici & coquo propor-
tione respondet, facere quidem panem & obso-
nia scientibus, minimè tamen quid in ipsis opti-
mum sit, quid nõ optimũ, intelligentibus: quàm
ue facultatè ipsoꝝ unumquodq; ad sanitatè ha-
beat, nõ dignoscuntibus. Vt igitur miles artis im-
peratoris, sic praedicta gymnastica minitè est.
Vocant tamen nõ solum palastras eos qui ex-
ercent athletas, sed etiã gymnastas. * Quare gy-
mnastica duabus artibus maximè separatis inier-
uit: quænammodũ culinaria, quæ salutare obso-
nium medico salubritus concinnat: gustui uerò in-
cundum, ac uoluptuosum, nõ amplius id arti cui-
piam, sed adulationi potius: cuiusdam, finè sibi nõ
sanitatem, sed uoluptatem cõsueti. Similiter &
luctatoria, id quod ad sanitatem bonũ est, salu-
bribus & gymnasticis ductis cõducit. Quod au-
tem ad affectionem athleticam pertinet, illi uir-
tiosæ parti comparat, quæ se gymnasticam uo-
cat, cum rationis profligatoria ponis, aut cabalis
appellari mereatur. Verũ omnis bene instituta
reipublica hoc genus artis odit ac detestatur, ut
quæ omne uiræ robur prosterat, haud in bonũ
affectionem traducens corpora. Iam uerò cum
prima rotius artis pars curatur, quod sic expedit
maximè, constituta sit: deinde per multũ oculi
consuetudine salubritus uocata, et adiecta fuerit:
totam artem à pæcipua magis parte medicinam
denominari cõtingit, sicuti & medicũ illius pro-
fessorum. Idcirco nõ ab re nunc quispiam inter
rogatus, cuiusnam artis pars sit illa faculas, quæ
tuendæ sanitatis notitiam tradit, medicinæ re-
spondere poterit, latius fuso & amplificatio uoca-
bulo, neq; adliuc partem, sed integram humani
corporis artem significante. Cuius sanè duas ma-
ximas partes esse curatricem & salubrem, sicuti
& huius salubris, gymnasticam membrum exis-
tere constat.

GALENI PERGAMENI de exercitatione parue sphaerae libellus.



Læ mihi sanè uidentur inutilissime
omnium exercitiorum, quæ non
corpus solum exercere, uerum etiam
animũ oblectare possunt. Vnde &
sapientes, & naturæ humanæ illos
probe fuisse peritos iudico, quicquid uenationes,
& alias animalium capturas, primi omnium ad-
inuenierũt, laborem qui in illis est, noluipate, ob-
lectatione, laudisq; cupiditate lenientes & tem-
perantes. Ad eod enim potentes sunt, quæ in id ge-
nus exercitijs contingunt motiones animi, ut

multi morbis saepe liberati ex delectatione fue-
rint: multi rursus ex nimia cõturbatione, in mor-
bos inciderint. Nullus est autem corporis affec-
tus tantus, ut uehementior animæ affectioni-
bus esse possit. Quamobrem diligenter istarũ,
quim corporis passionũ habenda ratio est, tum
alijs de causis, nam quia corporis longè præstan-
tior est anima. Ceterum alijs omnibus parum
sphaeræ exercitium multis in omnibus antecellit.
Primò siquidem cum ceteræ exercitationes ma-
ximũ apparatus, hominemq; ociosè admo-
dum uiræ requirant, huic certè una tantum pila,
easq; per exigua est opus, quam neli pauperimus
quisque comparare sibi facile poterit: neq; is qui
ea se exercet, cogitur reliqua negotiorum relin-
quere. Quid igitur eo esse possit cõmodius, qd
omni fortunæ, omni item negotio cõuenit? Iam
uerò quæ ex æquo exercere partes corporis uni-
uersas, scilicet nunc in summam uehementiam in-
tendere, nunc in summam facilitatem remittere
possit, aliarum, præter hanc parum pilæ, nullam
quidem exercitacionem inuenies, quæ modò ce-
lestissima, modò tardissima, iam uehementissima,
rursusq; leuissima, utcumque sanè uolueris, cor-
pusq; toleret, fieri assolet: hac enim membra si-
mul omnia, si cõmodum tibi uideatur, aut alia
præ alijs, si id magis placeat, studiosius exercere
potes. Vbi enim inuicem sibi oppositi, alter alte-
ri pilã ipsam præcipiunt, in ea certè cõtentione
caput quidè ceruicq; colla per motionibus exer-
cetur: latera autem, pectus, & uenter, faciei suble-
uationibus, & depressionibus, omnibusq; ceterisq;
id genus prehensionibus, uehementius laborant:
uulsiq; tum lumbi tendunt, tum etiam
crura firmanur. Hæc itaq; una exercitacio omnes
corporis partes quam fidelissimè exercet. Si-
quidem progredientibus, alijs nerui multilugis:
alijs subuentibus, plus agitantur: quemadmo-
dum etiam alijs illis qui in obliquũ se transferũt,
& quotquot uno modo crura ipsi cõmouent.
Quinetiam eorum membra qui transversis seruntur,
mouentur planè inæqualiter, sicuti & illorũ
qui impariter currunt. Sed quemadmodum cru-
ribus, ita & brachijs exercitacio hæc, cuius æquũ
portionem largitur: quando quidem pilam exci-
pere in omni figura studet. Accidit autè, ut dum
necesse habent uarijs subinde modis se transfo-
uere, alijs muscularis alijs fortius tendantur: luy in
uices omnes laborent, æqualiter quiete parita,
alijs requiescentibus dum fatigatur relique: sicuti
uicissim & laborent cuncti, & requiescant, nec sine
ocioso omnes, nec laborent omnes. Quod porro
enã uisum exerceat, patebit, si reputemus quim
diligenter pila sit oculis obseruanda, ut statim
quod dissipata sit, præsentiat, ne in illius præ-
hensione aberrare necesse sit. Vnde etiã animus
intentus atq; sollicitus redditur. Et licet sola soli-
citus macerare non extennareq; soleat, exercita-
tioni tamen & gloriæ cupiditas cõiuncta, in uo-
luptate abut, plurimumq; ad corporis sanita-
tem, & ad animi prudentiam confert. Quod autem
& ad res maximas, adeoq; eas, quas subire
præstat imperatores, urbũ regnaq; leges præ-
cipiant, animum & corpus exerceat, demon-
stratũ nõ est difficile. Quandoquidem & aggre-
di in

Anima affectus
quim corporis.
Cetera uero habet
de ratione.

Parua sphaera
exercitium alijs
longè antecelle-
re.

Parua sphaera
exercitium, omni
fortunæ, omni
negotio cõuenit:
ex æquo aut
enim exercet, par-
tibusq; intendit
et remittit.

Parua pila la-
tem, etiam ex-
ercitacione.

Sollicitudine
exercitacione
oculis cõiuncta
animus, in
voluptate abut
Parua pila exer-
cium, exercere
ad res maximas
corpus simul &
animum.

Exercitationis
utilissimae,
quæ exercet
corpus, oblectat
animum.

Anima affectus
ad potestatem
& cõducendo mor-
bi quanta non
habent.

di in tempore, & insidiando latere, & occasionem praebitam momento arripere, & aut ui, aut improbitu astu, quae hostium sunt occupare, occupataque tuere, bonorum imperatorum sunt opera. Etenim egregie cautum, subdolumque esse ducem oportet. At quoque in palæstris dmicat, corporis obstatem, potius quam uirtutis exercitationem, consequuntur. Unde multi ad tantam peruenire crassitatem, ut uix etiam respirare possent. Et sane genus hoc hominū uel ad bella gerenda, uel ad regia uel ciuilia obeunda mune- ra, minimè ualent: ac suisbus propemodū potius, quam lis, rem quampiam quis possit cōmutare. Sed cursum fortasse, & cætera exercitia, quæcumque gratie reddunt corpus, laudatū me suspicaberis. At hoc nō ita se habet. Namque enim quod est, reprehendo semper: omnemque quæ exerceri uelimus artem, esse moderatā uolo: quæ si modum excedat, iam bona esse desinit. Quæ ratione ipse neque cursum cōmendo, ut qui nimium extenuent corporis habitum, ac ne tantillum uir- tibus habeant exercitationis. Non enim celeriter fugiendo, sed fortiter stando, pugnandū paratur uictoria. Iam si ad sanitatem respicias, quatenus per cursum iniquialiter exerceri tui membra, eatenus ualendo lœdunt. Necessariū namque sit, ut alia defatigetur, alia autē sit omnino ocio- sa. Horum uerō neutrum bonum, sed utrumque & morborū seminariū est, & uires in primis debilitat. Quapropter eam potissimum exercitationē probō, quæ & corpus conseruare ualendum, & membra retinere integra, composuitque, & animū præterea uegetum, alacremque reddere est potius.

Quæ quidem facilius, in ea quæ parua pila sit exercitatione, reperitur. Quod autem placidissima sit, hinc discas licet, quod pueris, senibus, atque à morbo cōualecentibus, hoc etiā nomine, alijs omnibus exercitatio hæc esse præstantior uideatur. Quippe facilius nullū est exercitium, si premissa molli ex oleo unctione, eo leniter, adeoque moderatè utaris, ut ipsius qualitas minimè à quantitate obfuretur. Illud siquidem omnium lenissimū est, quod laxatus requiritur uti- le in primis, potentissimumque ad debilitatas uires reuocandas existit, iunioribus iuxta senioribus cōducens maximè. Inter alia eius quæ recentius cōmoda, neque hoc esse prætermittendū uidetur, quod maximè omnium extra pericula sit, quæ frequenter adeo in reliquis cadunt exercitationes. Celerescenim cursus, iam multos raptu uase præcipuo perdidit. Quæmadmodū & uoces magnæ, uelimentesque & confectum emittat, maximorū nō paucis malorū causa extiterūt. Sæc equitationes etiam concitare, sæpe renes ruperunt, & pectori frequenter nocuerūt: poris quoque nōnunquam spermaticis: ut ea interim præterea in cōmoda, quæ ab ipsis equis existere solent, ita ut multi equites sellis excusui subito sint exanimati. Similes ipsi saltus, discus, & quæcumque nimis inflectunt corpus exercitia sunt. Nam de illis qui ad palæstram proficiscuntur, quid attinet dicere, cum eos uideas aut claudos, aut distortos, aut fractos, aut aliqua omnino parte mutilatos reddere? Quamobrem cum præter reliqua cōmoda, parue huic pile exercitio addit etiam securitas,

namque aliarum omnium utilissima hæc exercitatio merito censenda est.

GALENI PERGAMENI de alimentorum facultatibus, liber primus.



Acuitates alimentorū merito præstantissimorū medicorū plurimi diligenter peruestigant, quod alijs quidē prædictis minimè omni tempore utamur, sine alimento autem, & e uirtute quidem, nec fecunda nec aduersa ualitudine liceat. Porro cum demonstrationum duo genere sint principia (aut enim à sensu, aut à non one euidenti, demonstratio omnis ac fides proficitur) nos de ipsarum facultatibus conscripturi, satis esse duximus ab experientia auspicari, eoque maxime, quod à bona pars medicorū, hæc sola uires alimentorum esse pronuntiant inuen- tas: inter quos præcipue Diocles, experientia sola, facultates alimentorum nobis notas esse arbitrat, non ex indicationibus, quæ tum à temperamento, tum à saporibus desumuntur. Quod uerò experientia, ut alia plerique, ita & qui cibi facile concoquantur, aut secus, quæque stomachū lu- uent, aut offendant, aliumque laxent, aut siliant, nos doceat, nemo sane mentis ignorat. Cæterū in ipsi plerique falluntur, qui citra limitationē faciunt de rebus periculum. Etenim quibus sta- uis bilis copia in uentriculo, uel ob prauā quam- piam temperiem, uel ob peculiarem constructio- nem colligitur, in cibos corrupti difficiles, ne- cilius quam faciles, concoquunt: quando quæ fa- cile concoquantur, facile item alterantur, & cor- rumpuntur: contra quæ concoctū sunt diffici- lia, nō facile quoque tum alterantur, tum corrumpuntur. Hæc itaque si in multum calore incide- rint, coquantur magis, quam si moderato occu- rent. Atque hæc protecto ratione accidit, ut nō nulla bubulū facilius quam laxantes pisces con- ficiant. Lens autē quibusdam alium mouet ma- gis quam inhibeat: melioratum uerò magis siliat quam laxet, ob naturam ex pugnantijs cōposi- tum facultatibus. Nam solidum cuiusque corpus tardè permeat, aliumque siliat. Humor uerò, ad excretionē stimulat. Quare lentis aut brasiacæ decoctū, alium subducit: ipsa uerò corpora, inhi- bet. Si quidem brasiaca bis cocta, sunt qui ad uentris colibitionē utantur. Omnibus enim quæ in lu- more coquantur usu uenit, ut quiddam ab eis facultate in se deriuent, ac de sua uicissim portio- nem aliquam ipsi impartiantur. Quare si aut len- tem, aut brasiacam, aut aliquem marinorum pul- scium, quibus resta pro cute est, decoxeris, ac pos- tea decoctum ipsum oleo, garo, pipereque condi- tum, propinaueris cuiuspiam, uidebis planè portio- nem quidem alium dilui, eum autē solidi corporis consistari: sicut & tormina & infansiones ori- ri, si unā cum ipsorum iure, solidū etiam corpus sumas. Sic namque pugna quædam inter utrumque sit, cum solidum quidem corpus licet subinde, succus autem ad excretionem properet. At cum nōnul- lus quidem uenter ad egerendum sit natura propensius, alijs autem difficilis, utriusque pro sua natu- ra symptomatis quæ ab huiusmodi cibis sunt,

Vivere abque
alimento non li-
cet.
Demonstratio
omnis aut à sen-
su proficitur,
aut ab euidenti
ratione.

Diocles.

Experientia quæ
eugenitatur.

Religiosa ser-
uata reuerentia,
cibi corruptus
difficilis, quibus
facile, modis
melius concoque-
re.

Bubulū quædam
sanatius pisces,
quæ nōnulli mal-
ti facilius confi-
ciunt.

Lentis & brasi-
acæ decoctum, al-
ium subducere,
ipsa autem sub
stantia, siliat.
Extra omnia de
pauca in aqua
nōnulla proprie-
tas substantia, et
uicissim sibi ab-
que ab illa ac-
cipere.

Tormina fieri,
edulcorum con-
tracti facultati
cum inter se po-
guntur.

afficiuntur, quam uenter alius succi, alius solidi corporis facultati opituletur. Interdum etiam pituitosum in uentre humore, interdum biliosum acuari conningit. Atque ipsius pituitosi, alius quidem est acidus, alius salis, alius dulcis, alius denique sensibilibus qualitatibus expers. Rursus alius est liquidus, alius crassus, alius viscidus, alius dissipatu difficilis. Humores etiam biliosi, alius est flauus, alius pallidus: in quorum utroque maximū est, pro maioris minorisq; ratione, discernim. Singulū igitur memorari humores, cum aut ad alui excretionem, aut eiusdem cohibitionem plurimum habeant momenti, postquam in tegra ciborum memoratorum corpora cum suis succis in uentrem peruenerint, ut quidem qui eundem secum sunt facultatis, terunt suppetias.

Alimenta ergo cum tardius transitus esse comperturunt, alia ob naturalem nostrā ab initio constitutionem, alia ob uentris dispositionē acquisitam, nonnunquam ob peculiarem esculentorum ac potulentorum substantiam. Siquidem atriplex, blatur, malua, cucurbita, quia sunt lenta & perhumida, alijs quae talia non sunt, celerius subdunt, in ut potissimum, quae sumptis illis, leuiter in augmento obambulant. Eodem in genere aliquos ponere posuit, mora, dulcia ceratū, & ex uinis quae dulcia simul sunt atq; crassa. Pones quoque & melopepones, quod humidum sunt ac leni, uentri sunt subducendo idonei, facultatemq; medicorū abitergēda habet, ideoq; inter ea quae uinum mouent, connumerantur.

Ex numero etiam humidorum atq; aquosorum corporum sunt & illa quae praecoxia, & Persica uocant. & omnino quae nullum gustantibus aut olfactantibus qualitatē repraesentant. Quae quidem si uenter sit ad sciendum proclius, non aegre subdunt: sin minus, haerent & ipsa sublimia, medium quodammodo inter alium si sentia, & prouiantia, loco forita. At melicratum, in quibus celeriter distribui anticipat, nihil aliud ad excretionem confert: quinimō cibis secum committis, ad distributionem praet. Quod si distribui celeriter non anteuerat, excretionem, non secus ac flaua bilis, sua acrimonia & mordacitate proritat. Atque horum cibiorum potuonūq; genus, dumtaxat mordicatione sua uentris partes ad expulsionē exulciat. Alia autem sunt, quae uentrem subducunt, quod facultates in se medicamentosas habeant committas: ac proinde horum substantia ex cibo pharmacoq; consistat. Porro qui medijs temperamētis sunt, nullūq; uicenti qualitate praedita, ea solum sunt alimenta, non etiam medicamenta, quum nullam aliam dispositionē in animantis corpore ingenerent, sed quale animalis, quod nutritur, corpus assumptis, tale prius consueuerit. Ceterū si hominis quidem corpus medijs planē temperamētis sit, per alimenta medijs temperamētis eo in statu seruetur. Sin autem frigidius, calidiusue, aut siccius, aut humidius id fuerit, medijs temperamētis cibum & potum perperam exhibueris. Quippe si uisceremodi corpus, quatenus ab exacte media constitutione recebit, eatenus in diuersum statum traducatur oportet: idq; per praesentia

intemperantiae contraria, in eodem gradu adhibita. Quare ad praesentem speculationē summe necessarium esse uidetur, hominum pariter ac ciborum temperamēta considerare, ut cognoscamus quatenus quibus sit adhibenda. Etenim mel, uerbi gratia, calidis & siccis naturis est aduersissimum: frigidis uero ac humidis utilissimum, siue ea temperies sit eis naturalis, siue accessit propter aetatem, siue propter regionem, aut anni tempus, aut uitae conditionem. Neque uero satis est principalissimam cuiusque cibi temperiem nouisse, sed qualitates etiam quae hanc sequuntur, calere oportet: quarum multae quidem in saporibus, quaedam in odoribus uidentur consistere: quoad quidem cibi ipsi eandem cum his medicamentis obtinent facultatem, quibus cum sapore conueniunt. Ceterū in commentarijs de medicamentis causam explicauimus, quamobrem astringentia quaedam non eadem cum alijs astringentibus agant, ut aloē, & uisum, atramentum futorium, flos zenis, squammarū, & chalcitis. Si quidem quod in quoque istorum, astringenti facultati alia quæpiam sit mixta, euenit ut opera quae sigillatim edunt, sint diuersa, perinde ac si malo cydonio scammoniam intrinseueris: quod interdum unice facimus, partes mali quae circum semen sunt, exculpentes, deinde cauteram scammonio replentes, ac postea luto circumdantes, affantesq; atque ita malum mandendum dantes. Quod namq; hunc in modum praeparatum est, absque stomachi subuersione aluum subducit. Quare minime dubitandum est, quin saporum facultates, ad bonum suum quam a natura habent, efficiant. Porro in quo qualitas inest astringens, ipsa quantum in seipsa est, uicina corpora cogit, contrahit, refrigerat. Idem tamen corpus nonnunquam alias sui partes calefacientes, alias refrigerantes habere potest. Nos autem ex beta & lente cum sale & garo interdum edulium paramus, alui soluendae gratia. Sin minus uelis subducere, ubi lentem excorricaram bis coxeris (nempe aqua priore effusa) ac dem portunculam garī atque salis indideris, tantum aceti inijcero, quantum gustum minime offendat. Ita enim pharmacum inuicidissimum utilissimūq; reddideris, & cibum non paucis eorum qui diuturna cohsistantur diarrhoea. Ceterum alicuius cognito, existit remedium materia, non autem remedia ipsa: de quorum facultatibus differere in hisce commentarijs est animus: quanquam libri solent esse monumenta quaedam cruditorum, non rudium & indoctorum perfecta doctrina. Nec enim quicquam ex libro naucleus, aut artifex alienus artis eussit. Ac proinde rectē illud uulgo dici uidetur, optimam esse doctrinam, quae uia uoce traditur.

De Tritico.

PLURIMUM exigua mole habet et redditiuū alimentū id triticum, quod densum est, densiusq; uix diuidi potest. Quod huic contrarium existit, magna mole exiguum alimentum largitur. Est autem quod densum est, laxo longe grauius & pōderosius, coloreq; magis flauescens. Porro fursu

Temperamenta hominum & ciborum esse eandem deinde.

Mel calidis & siccis naturis est aduersissimum, humidis autem & frigidis maxime est uis.

Alimentis si fuerit qualitas in eis esse consideranda.

Saporum cōuenientiam quā uideret.

Cydonij mali cum scammonio praeparato, ad fluxum alui.

Astringentia quae laxa opera.

Edulium solutū de alio, quomodo de beta & lente paratur.

Alicuius cognito existit remedium materia.

Libri esse monumenta quae uoce traduntur.

Artifex nemo ex libro eussit.

Doctrina illa est optima, quae uoce traditur.

Triticū densius.

Pituitosi humoris quadruplex differentia.

Biliosi humoris differentia.

Alimentis color cardui, de fuscis, a quibus propius uicinas adui possit.

Olera quae ob leniorem digestiōem dant facile.

Fructus sublimi et mole alio idonei.

Pepones, melopeponesq; uini uisū demerant.

Melicratū quod excretionem excitat.

Alimentis medicamentosa.

Alimenta tantum.

Temperata corpora, temperata alimentis seruanda esse.

In temperata corpora, redunda ad modum est uis. ut, per alimentis quae citram illi uisum seruauerit.

*Furfur accipis pa-
nes & parū olei
et, & vinetum
malum excrescenti-
tu implere, ob
olij succū faci-
li.*

*Furfur nūquid
facultatem detra-
herit fieri.*

*Pancis qui sat-
isfunt deperian-
ter.*

Mytilus pa-
m.

Siliginosus panis
plurimū alimē-
ti praestat.
Similacrum pa-
nis et matriae.
Perforacum pa-
nis omniaque mi-
nima nutrit.
Panis concisus
faciliss.

Panus asbleta
commodus.
Panus feni aptus

*Pani a Zymis
offe merum com
modum.
A Zyma panis r-
fo, qui aliquid
capis receperit,
prompte omnia
lala.*

Alnus Indica fess.
fetta, cameliana
vescuntur carna
bus.

Semenes profus-
diores plurimū
conferte ad co-

*Arbitratu eius
sunt plerique vi-
cti ratione, qui
qui non exerce-
tur esse periculo-
sum.*

furfuracei panes parum quidem alunt, ventrem
furfur multum excrementis implet, ob causam
quod iam facile etiam defenduntur. Ad hæc, quod fur-
fur non nihil facultatis deterioris sortitur, me-
riori intestinis exasperatis, celeris eorum sit de-
telio. His autem contrarij sunt panes purissimi, plu-
rimum ponderis exigua mole habentes: quos om-
nium tardissime defendiunt, quare copiosiori fer-
mento egent quam furfuracei, subactione lon-
gioris: nec ita in post ipsam affari postulat. Iden-
tificationem distinetur rem, quam furfuracei, re-
quirunt. Est autem & alia panis species inter
hæc planè media, quos *mirvicijs* & *virgarijs*,
hoc est, miscellaneis ex farina & fursure, appel-
lant. At vero purissimi panis apud Romanos,
siligineus dicitur: quemadmodum qui huius est
proximus, similiculus. Inter panes igitur siligi-
neus plurimum alimenti præstat: post ipsum si-
miliculus tertio loco medius, qui & miscellaneus
dicitur: post hunc, fordi dorum est quartum ge-
nus: in quibus furfuraceus postremus est, mini-
mum omnium nutrit, fed omnium maxime per
alium * defendit. Concoctus autem furs inter pa-
nes facillimi, qui plurimum furs fermentati,
probe subacti, qui in cibano igne moderato fue-
rini affari. Iam ex panibus is atque latus quidem est
comodus, qui nec est bellissimus affatus, neque
multum fermenti recipit: prius autem & leni,
qui in cibano probe coctus cum sit, habet etiam
fermenti multum. At qui omnino caret fermento,
propterea nemini est comodus. Quod si calci etiam
aliquid illi addatur (sic enim rusticus apud nos se-
stis diebus panes quos vocant asinos confice-
re solent) eius usus promptè omnes habentur, etiam
si fortissimum sit corpus habentis: cuiusmo-
di sunt messorum ac fossorum robustissimi, qui
in Alexandria, Asinia & camedina venduntur car-
ne, ob idque gravissimum crudentis morbus tentan-
tur, atque ante senectam intereunt. Quod autem
eorum plerique, qui se consecrunt laboribus, mi-
nus à pravis cibis ledantur, in causa est, quod ipsi
somnia sunt profundiores: quæ res ad coctiones
multum ipsi addere momenti. At ille vero ali-
mentis utitur crassi & viscosi succi, & quæ per
exercitia improba, non facile aut computescant,
aut in vapores solvantur. Quibus cibis si prius
aliquis, aut ab exercitiis alienus uti voluerit,
celerissime in plenitudinem morbum incidet, copiam
crudi & crassi succi coaceruans: qualis est
ille humor qui in urinis subdest, puri quandoque
asimilis: nisi quod pus & graucolens est, &
leutrum, crudus vero succus non stem. Inter pa-
nes rusticos, optimi furs cibantur: lus proximi,
qui affantur in furno minori. At qui super cran-
culam, aut cineres calidos, aut foci pameumati,
ceum in cibano, affantur, pravi omnes sunt, ut qui
se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi
furs, quantum ad modum affandi pertinet, quos
est subcineribus nuncupant, quod cineribus te-
tu affantur.

De Placentia, quam *regiam*
appellant.

QV AZ placenta ex farina triticea laevigata
sufficiens aquae portione, atque oleo intra sarta
ginem fricta, conficitur, appellaturq; *teracina*.

ab Articis, ea quidem cohibet nentrem, & crudorum succorum est generatrix. Quapropter & a quibusdam mellis quippiam ei admiscetur. Sunt qui & salem marinum miscant.

De Interiorum compositione.

DUPLEX autem est litorum species: præstantior quidem, quam rhyemata: deterior, quæ lachana appellatur. Quæ sæpe ex his ac similibus componuntur, crassi fuci, & tardi fubfident, icterici obstruunt meatus: ad hæc lues imbecillitatem augent, calculos in renibus gignunt. Quod si cocta bellè fuerint, atque mutata in sanguinem, ad modum nutriunt. Quæ uero cum meli parantur, multum possident facultatem. Quanquam in his qui obstructionis principum habent, aut inflammatione, aut scirrho sunt aliquo obfessi, nihil minus quam illa non: nonnulli etiam grauius. Vt autem de pane fermentum repetam, in saluberrimis est homini neque iuueni, neque exercitacionibus dedito, qui num latorum fermentum habet plurimum, maxime fuerit, antequam afferat, subactus. Modus autem fermenti & falsi sit, qui gustui sensum reidem non inferat.

De Panclore.

Qvis panis abluendi rationem excogitarit,
minoris fane alimentum cibum, sed qui ab obstruc-
tionis noxa abest, quoad licet, longissime, inue-
nerunt: Si quidem panis hic, succum crassum &
lentum habet minimum, ut qui ex terræ ar-
50 reus fit factus. Caterū id edulum quod ex mi-
tra triticea farina facti permixta constat, tamen
boni succi & multo alimentum fit, ex quo tamen est,
quod obafiduum usum, hepatis obstructions,
& calculos renis procreant: ad hoc enim conse-
crescit renum temperamento ac humi & con-

De Alca, fue Chondro.

ALICA ex genere est tritici, & valenter nutrit,
succumque lentum habet. Proinde huius usum
multum uitare conuenit, idq. potissimum quibus
secur facili obstruitur, aut reues calculis qui-
gignendis sunt prompti. Quod autem ad forbi-
ones alicæ pertinet, oportet succum eius (qui
sanè magnam cociotionem desiderat) tum multa
aque admixtum super carbones coquere, plu-
rimum mouendo, quoad exactè pefcoctus fue-
rit: tum reo salis quoddam enam in oleis,
in principio, si placeat. Quod si quando sani ob
uehementem ventris mordicionem, aut bilio-
sum humoris & multi transitum, forbitione egue-
runt, ista alcam plurimum coctam, donec exa-
bueat, ac dein colatam propina.

De Trinco elixo

ELIXVM triticum uentrem, seu pondus maximum, premittit, nauisam ciborum in ducit, flatus generat, dolorem capitis, caliginemq; oculorum concitat, ac deniq; immodice alitum alit: cuius facilitas, unicum in cruditatebus est remedium. Nutrit tamen ualde corpus. & robur insignem, eo qui ipso usi fuerunt, comparat.

De Amylo, hoc est, farina citra molam ex tritico facta.

AMYLVUM ex tritico fit, partes exasperatas
laevigandum obtinens: loraq; panibus simi-
lem facultatem sortitus. Nam ut illi, minus

*typhus aliis
filiis extraneis
fratrum est ge-
neratus.*

Etrivernus cypri
Linn. 1758, p. 100.

*Panis saluberrimus hominibus nec nocuus, nec exacer-
bitur. Adde, quod
salutem esse de-
beat.*

Panis lotus ma-
ritis marenis, con-
nuentibus marenibus
obstruit,
Panis loti sub-
flavescit.
Sulcum ex lacte
et farina, bapa-
tis obstruuntur
et renium calu-
lei evanescit.

Alia.

*Alice forbitorie
quibus sit propo-
nenda.*

Trinoidi clasi in-
carnada.

*Alui facilius in
credulitate ve-
rarentur, quam e-
dicion.*

Amyli facultat.

Panes calfacere. quidam panes non loti, corpori alimentū præbet: & non calefaciunt, cum ceteri panes calefaciant.

De Hordeo.

Hordeum refrigerat.

Hordeū quomodo à tritico differt.

Prisana humida.

Prisana conficienda ratio.

Prisana detergere magis, ubi ex hordeo non pleni decorticata cistula fuerit. Prisana magis effundenda.

Hordeacei panis matris modis minus triticeis, magis subducuntur per alium.

Rogea femina, detergera affu.

Semina, quando rimanda.

Semina quædam fuerit repolia, cur vitiis habent imbecilliores.

Polenta optata cum vino auferit, ventrem faciat.

Polenta quibus plurimum alimentum largiatur.

HORDEVM, quoquomodo ipso utaris, uim quandam habere refrigerandi cernitur: qua quidem ratione à tritico differt, necnon quod triticum sanè crassum & lentum humorem gignat, hordeum autem, & tenuem, & deterforium non nihil. Cæterū polenta quæ ex friso hordeo conficitur, siccare conspicue cernitur: quum tamen ipsa prisana humectet, ubi plurimum intrinsece coctione longa, tandem in chylum degene-
rauerit. Acetum autem tunc ei admiscetur, cum planè intrinsece uero celerè fuerit excoctum, sub edendi tempus salem tenuem intijcere oportet. Oleum etiam, si in principio statim inieceris, coctioni nihil nocueris. Porro hordeum ex quo conficienda est prisana, aliquandiu in aqua præmacerandum est, postea uero in mortarium coniectum, usque eo terendum est re aliqua aspera, dum is qui in superficie est cortex, abiectus sit. Quod si non quicquid est paleaceum deciderit, elixa prisana magis quidem deterget, nullam autem aliam noxam accipiet. Sic præparata: ipsius prisanae lentior, laxius, continuus, blandus, lubricus, & moderatè humidus est: sitimij arcet, ad abluendumq; idoneus, nec attritionem habet, nec tormina pignit, nec deniq; in uentre exturgescit, cum intrinsece inter coquendum, quantum intumescere poterat.

De panibus hordeaceis.

HORDEACEI panes (quorum similes sunt differentiæ illis quas de triticeis tradidimus) multo minus triticeis alunt, magisq; subducuntur per alium, & consensum si factu ex priori hordeo fuerint. Laudatissimū autem est hordeum quod candidum, ubi pinsitum est, apparet, non nihilq; habet densitatis & pòderis. Porro quod totum plenum est, & circumscriptionem externam habet tensam, melius eo est, quod gracile est & rugosum: id quod seminum omnium tibi sit indicium còmune. Cæterum non debes uti seminibus statim post collectionem, sed ubi ea in locis repositueris, diu ab eis abstinere, quo interea pars quidem humoris superflui exhalet, pars autem etiam coquatur. Desistat enim à plantis, fructibus, & seminibus, postquam collecta & reposita fuerint, primū quidem quicquid in ipsis aquosum est, ac tenue: post autem, & nonnihil humidi naturalis. Quare quæ diuissimè fuerint reposita, uires habent imbecilliores. Verū huius terminus sit, cum ab ipsis diuissis pulvis quidam tenuis excidit.

De Polenta.

EX RECENTI hordeo mediocriter friso laudatissima sit polenta. Quum autem polenta omnis quæ rectè est facta, boni sit odoris, ea est suauolentissima, quæ ex optimo ac recenti hordeo, & quod arisam non admodum habeat siccam, confecta est. Quæ quidem si cum uino au-
stero fuerit epota, uentrem deficiat. In uniuersum autem, prauis quidem & in ocio degentibus, plurimum alimentum largitur: hinc uero qui quoquomodo exercentur, minus quàm quod sit facit.

De Maza.

A Y maza (quæ ex polenta frisa conficitur) tantum in alendo corpore, à panibus hordeaceis, quantum hi à triticeis, relinquuntur. Quippe cum hordeum initio suapte natura fursorem haberet non paucum, uel ex se ad concoctionem ineptum, fruxum iam, cum ipsum habebit tum sicciorum, tum fractu & comminutu difficiliorem: sicut & cremorem illum ex quo corpus alimentū simebat, similiter aridiorem. Qso sit ut maza panibus hordeaceis, ægrius coquatur, magisq; uentriculum flatu implicet: in quo etiam si diutius manserit, turbationem excitat. Citius autem subducitur, si còmissa diutius, atque subacta fuerit. Quod si mel quoq; addatur, citius etiam ob id uentrem excitabit ad excretionem. Porro prisana deterforia & incisoria est: quod in cute nostra indicat, ipse sordes eluens. Iam si paulo post, quum ipsam cuiuspiam sorbendam dederis, uomere ipsum compuleris, pituitam quæ in uentriculum continebatur, deterget, & omnia uomitu simul cum ea eiiciet.

De Zea, Typha, & Olyra.

ZEa (quam uulgo ipselam uocant) nutrit quidem hordeo ualentius, at impotentius tritico: ac proinde mediam inter triticum & hordeum naturam possidet. Olyra eiusdem cum Zea est generis. Quæ quidem si bona sit, panes ex ea confecti, post triticeos saltem sunt præstantissimi. Secundi ab his sunt qui ex typha parantur. Ex nobilissima autem olyra, ut decet, excorticata, sunt qui nominatim tragum conficiant: quo plerique utuntur, primū in aqua coquentes, deinde ea effusa infundentes spumam, aut uinū dulce, aut mulsum, quibus postea superinjiciunt & piceas naves aqua præmaceratas, donec plurimū intumuerint. Quod uero ad colorem nauū pertinet, in hordeo quidem & olyra est albus, in tritico & zea subflauus. At typha flauior tritico existit. In uniuersum autē, quæ semina parua mole multā reddunt substantiam, eamq; crassam & uiscidam, optimi succi sunt, ac multum alimentum: non tamen facile per alium secedunt. Quæ uero hi sunt contraria, mollem quidem & laxam habent substantiam: partes autem ipsorum fursere, citius quidem subducuntur, sed alunt minus. In his ipsis, quæ graueolenta sunt, & gustum quendam habent iniucundum, peripicuum est quod omnia & prauis sunt succi, & difficilia concocta.

De Avena, quæ Bromus dicitur.

AVENA, iumentorum, non hominū, est alimentum, nisi eos extrema fames illa nutrirī compellat. Est autem admodum calida, minusq; nutrit quàm typha: & panis inde confectus, infusus existit, non tamen aluum aut sistit, aut prororat, sed, quod ad id saltem pertinet, medium locum obinet.

De Malio & Panico.

PANIS qui ex milio sit & panico, exigui est alimentum, & frigideus ac præter id, tum præaridus, tum friabilis, cum nihil in se habeat nec lentioris, nec pinguiusculi. Quare alium humentem deficiat. Porro milium ad omnia est panico præstantius, suauissiq; edunt: ad hæc còcoquitur facile, uentrem minus sistit, ac magis nutrit.

Maza ægrius coquitur panibus hordeaceis, flatu magis uentriculum implicet.

Prisana facit.

Spelta.

Zea media inter triticum & hordeum.

Olyra.

Typha.

Tragum quomodo præparatur.

Semina optimi succi. Crassius alunt, quæ parua mole multum reddunt substantiam.

Semina prauis succo qua.

Bromus.

Avena est admodum calida.

Panico.

Milium ad omnia est panico præstantius.

DE LEGVMINIBVS, HOC EST,
SEMINIBVS CEREALIBVS, EX
quibus panis non fit: ac primum
de Oryza.

Oryza omnes ad fiftendam alium nŕitur: qđ
semen difficultus quám alica concoquitur, ac mi-
nus alit, illa infusior existens.

De Lentibus.

SUBSTANTIA lentis crassa, terra, austera &
astringens exiŕit. Succus autem qualitatē astringen-
ti contrariam possidet. Quare decoctū ipsa-
rum sale, garo, aut oleo etiam conditum, alium
deŕicit. Ceterū lens bis cocta supprimit alui pro-
fluuiā: stomachum, intestina, & totum denique
uentrē corborat. Lens poro decoritica ma-
gis nutrit quám quę cortice spoliata nō est: suc-
cum tamen crassum & prauum gignit, nec sic alui
profluuiā deficiat. Lure igitur quę largius hoc
edulio utuntur, elephanŕialium & caneros incur-
rent: ipsę tantum quę laborant cachexia, utiliter
talis cibus prębetur. Qui quidem integrū & in-
culpatū uŕium hebetat, ipsum immoderatē exici-
ans: ei uerō qui contrario modo se habet, con-
fert: retinetiq; muliebria profluuiā. Cū autem
pŕisana, in eo saltem, contrariam ipsi facultatem
possideat, ex amborum mixtionē pręstantissimū
edulium conficitur, idiq; minor portione ipsius
pŕisane iniecta, necnon satureia, aut pulegio ad-
dito. In summa uerō, lens a duersis ijs, quę crasso
melancholico ijs succo redundant. Ceterū in ipsa
uŕisus ratione, temporum ratio est habenda, si-
cuti & regionum, & anni temporum. Etenim au-
tumno melancholicis ac siccantibus cibus abŕi-
nere, hyeme autem uti oportet: quemadmodum
estare humectantibus simul & refrigerantibus.
At uerę, quod medię temperamenti iŕi, medię fa-
cultatis cibi sunt dandi.

De Fabis.

CIBVS qui ex fabis conficitur stultentus est,
etiam si coquatur diutissimē: id quod sentientes
nonnulli, cepas ipsas adiiciunt: cum quicquid sta-
lulentum cibarijs inest, corrigatur per calefacien-
tiam & tenuantia. Habent autem fabę substan-
tiam non densā nec grauē, sed fungosā ac
leuē, quę uix quandam detergendē possidet.
Quare fabacea farina mulieres faciem deungūt:
tollit enim lentes quę in facie apparēt: ob quā
sanē facultatem, uentrem non cunctanter fabę
ipsę permeant. Porro si frixę fuerint, sicuti & le-
gumina omnia, statum quidem deponunt, sed
concoctū sunt difficillime, tardēq; prętereunt,
& crassi succi alimentū exhibent. Quę fabę si ui-
rides quidem collectę sunt, postea uerō assicca-
tę, ut minus nutriti, siŕ deŕiciuntur promptius.

De Faba Aegyptia.

FABA Aegyptia ut magnitudine, sic inŕita hu-
miditate, quā nostrā, est longē superior, ma-
gisq; etiam excremētina.

De Pisā.

PISA tota substantia cum fabis sunt confimi-
lia, eodemq; modo sumuntur: non sunt tamen
stultenta usque adeo, nec fortiantur uim deter-
gendi, ideoq; magis in aluo morantur.

De Ciceribus.

CICER edulium est non minus stultentum
quām faba: sed ualentius nutrit illa. Ad uentrem
autem incitat, creditumq; etiam est semen gigne-
re. Abtergit pręterea cicer magis quām faba: sic
ut nigra & exigua cicera manifestē calculos re-
num, uel herentes, cōminuant. Sarius tamen est
succum ipsorum in aqua coctum ebibere.

De Lupinis.

ELIXVS lupinus, ac deinde maceratus in 2-
qua dulci, donec omnē infusuitatem exuerit, sic
demum manditur cum garo & oxygaro, uel so-
lū cum sale mediocri conditus. Lupini poro
substantia, dura & terreŕis exiŕit: quocirca ip-
se concoctū difficultis sit, succumq; crassum gi-
gnat, est necessarium. Ex quo nō probē in uenis
confecto, crudus propriē appellatur succus col-
ligitur. Quare lupinus ipse tardē ac difficulte de-
scendit. In uniuersum autem, ut ea quę humidio-
ra sunt consistētia, exiguum corpori dant ali-
mentum, & quod celeriter in halitus digeratur,
sic dura & terreŕia (ę quorum numero lupinus
exiŕit) perdurabile, copiosum, & quod rēgre ab-
sumatur, largiuntur.

De Fenogreco, quod vŕis dicitur.

INTUS manifestē calefacientia hoc semen
censetur, utiq; hominibus in cibo uŕium
pręstat, quem lupini. Præsumitur autem ipsum
cum garo, alui subducendę gratia. Caput, si su-
mar copiosius, ferit. Succus elixi fenigraci
sumptus ex melle, ad omnes pranos humores,
qui in intestinis habentur, subducendos est com-
modus: suo quidem lentore, leniens: calore au-
tem, dolore mitigans. Quod autem abŕiŕio-
rie qualitatē quog; sit pręterea, intestina etiam
ad excretionē instigat. Sed parcius mel ei est mi-
scendum, ne mordacitas ipsa exuperet. In diuŕ-
nis uerō thoracis citra febriū affectibus, pin-
gus cum eo quidem palmulas elixare oportet:
ubi autē succum ipsum ex pressum copioso melli
mulsueris, ac rurius super carbones ad medio-
crem crassitiem coxeris, tum demum longē an-
te cibum eo uti pręstat.

De Phaselis & Eruiā.

HÆC quoque semina homines, quo modo
& fenugræcū, prius in aqua, quoad radicem
produxerint, macerantes, uentris subducendę gra-
tia mandunt ante alios cibos, garo intingentes.
Succum autem, cum coctus est, atque in corpus
distributus, habent copiosioris alimentī, quā
fenugræcum. Inter ea tamen quę succum bo-
num ac prauum generant, inter concoctū facilia
& difficultia, tardē & celeriter transuentia, stulta-
renta & stas experta, multū ac parum nutrien-
tia, medū sibi uendicant locum.

De Cicercula.

SVECVM habet phaselis & eruiālis facul-
tate quodammodo similem, sed cōŕsistentia cra-
ŕiorem: ob eamq; ipsā causā, plus aliquan-
tulo, quām illa, nutrit.

De Aracis.

SEMEN hoc & usu & facultate semini ci-
cerule est simile, nisi quod durius est, ægriusq;
elixatur, ac prouide in uentre diffi-
cilius concoquitur.

Ciceri promouet
ventrem.

Cicera nigra,
calculos renum
frangit.

Lupinus est ten-
aculus difficultis,
crassumq; succū
producit.

Lupinus alimen-
tum copiosum,
perdurabile, quog;
largiuntur.

vŕis,

Fenugræcum
calidius, lenius,
atq; dulci melli
q; faciliatem
etiam potius
abŕiŕientem.

Fenugræci suc-
cum analari
diutius thora-
ci afficitur.

Phaselis erui-
mala faciliat.

Cicercula vi.

Aracium
faciliat.

Oryza omnis
ad fiftendam al-
ium nŕitur.

Lentis sub-
stantia,
lens, succus.

Lens bis cocta
ventrem fluui-
um supprimit,
corboratq;.

Lens si quis ea
legum vŕiat,
elephanŕium
& caneros indu-
cit.

Lens rŕisum in-
culpatū hebetat.

Lens pŕisana in
mixta aqua melle
soluitur.

Lens a duersis ijs
quę crasso me-
lancholico ijs
succo redundat.

Temporibus sin-
gulis quales cibi
conueniunt.

Ver, medię tem-
peramenti exi-
ŕit.

Fabæ cibus
est stultentus.

Patum a cibis
diuŕis per calŕia
pisā et tenuan-
tia.

Fabærum sub-
stantia.

Fabærum semina
lentes facies ex-
citant.

Legumina om-
nia frica resŕi-
dunt in diffi-
cultate.

Pisa ægrius dige-
ritur quām
faba.

De Dolichis, sine Smilace hortensi.

*Dolichus, sine
facile horrensi.*

QUYMAADMODVM frumēta cetera femina spicis, ita memorata legumina siliquis cōninentur, similitertyp ipso dolichos silique continent: qui quidem minus sunt flaralenti quāmpisā, necnō asiluentius nutriunt, ac celeriter autem descendunt. Ceterū integros ipsos atq; etiamnum uirides unā cum suis siliquis, ex oleo & garo, ut plurimum homines mandunt. Nonnulli etiam unum adiciunt. Sed eos, nisi prius reficentur, non reponunt, propter eopioiorem humiditatem, cuius occasione solent corrumpi. In summa uerō, dolichus uidetur species esse illius plantae, quam hodie phaeolium appellant.

De Orobo siue Eruo.

*Dolichus videtur
esse speciem
phaeoli.*

Eruium.

*Orobus prauis
est, succo.*

*Orobus expurgat
pellos.*

Orobo duplices.

ERVVM insuauissimum est, & prauis succi: quare homines ab eo, nisi in summa fame, abstinēt. Veimur autem orobis ipsi cum melle, ceu medicamentis humores crassos thoracis pulmonis expurgatibus. Porro inter orobos, albi minus sunt medicamentosi q̄i, qui ad flauitatem, aut pallorem recedunt. Bis coctis, insuauitatem, ac simul detergendi incidendiq; uim amittunt, ac sic citra insignē amarorē edicandū uim possident.

De Sefamo & Eryfimo.

*Sefamū subuertit
stomachum.*

*Sefamum cras-
sis est succi.*

*Sefamum cum
melle in placen-
tulas coquitur.*

Eryfimum.

Sefamū calidius

SASAMET semen pingue est, ideoq; tepositu, celerrimē fit oleosum. Quamobrem eos qui ipso uestuntur, celeriter implet, stomachumq; subuertit, ut pinguis omnia, ac tardē concoquitur, pingueq; corpori alimentum praebet. Est autem crassus succi: ideoq; non propterē peruat. Ceterū ipso solo nō usque adeo uestuntur, sed cum melle coacti in placentulas. Panibus etiam inspergitur. Eryfimum sēfamo quodammodo esse asine uidetur, sed eo omnino dēterius. Virumque tamen temperie est calidum, quamobrem sitim excitant.

De Papaueris semine.

*Papaueris semē
commodi perui
fitur panibus.*

*Papaueris facul-
tatem insignit.*

SATVTPAPAUERIS semen, panibus utiliter ceu condimentum inspergitur: est tamen album nigro praesentius. Refrigerandi autem possidet facultatem, ideoq; somniferum est. Quod si sumptum liberalius fuerit, soporem etiam inducit, atq; coquitur aegre. Inhibet praeterea quae ex pulmone ac thorace rursus expuntur. Confert uerō ijs qui catarrhis fluxu tenui ac capite defluentibus insistantur: corpori autem multum cōmemorable alimentum praestat.

De Lini semine, quod Linoispermon uocant.

*Linoispermon,
lini semen mo-
di utriusque ma-
net.*

STOMACHO noxiū est, & coctū difficile, exiguumq; alimentum corpori exhibet: modicum tamen mouendae urinae possidet facultatē: quae magis apparer, cū fruxum sumitur. Tunc autem magis quoq; alium fitit.

De Ormino, uulgō Gallitricho appellat.

*Orminum,
Gallitrichum.*

PARVM in seipso habet alimēti, ut qd̄ medice inter eryfimum & cuminum naturae existat.

De Cannabis semine.

*Cannabis semē
calidum est, ca-
pitiq; ferit.*

HOC semen concoctū est difficile, stomachoq; & capiti nocet, ac breuiter prauum succum producit. Multum autem calefacit, ideoq; sumptum paulo largius, caput ferit, uaporem suū ad ipsum mittens, calidum simul & medicamentosum,

De Viticis, siue Agni casti semine.

ID SEMEN etiam per se fruxum manditur, crediturq; appetitus inhibere uenercos. Alimentum autem corpori praebet exiguum, ideoq; succum refrigerantē. Flatus autem ualde dissipat: quorum omnium occasione, huius qui ad uenerē puros se seruare conantur, est accommodum.

De Aphace & Vicia.

HASCE legumina non insuauis modō, sed eon coctū etiā sunt difficilia, aliumq; inhihent: quare alimentum hand boni succi, et crassum, atq; ad humorem melancholicum gignendum, idoneum exhibent.

De feminibus alienigenis, quae in quocunque genere permixta reperiuntur.

IN tritico quidem frequens lolium reperitur: in hordeis etiam, sed paucum. Quam autem agri lopem uocant, ea in hordeis frequens inuenitur: sicut in lente aratum, & securinum, & planta illa, quam aparinem dicunt, quae ipsam lentem strangulat. Melampyrum autem nuncupatum ex tritici quoque mutatione gignitur, sed prauitate quamplurimum a lolio relinquatur. Non igitur oportet nos in purgandis feminibus, quae ad eum comparantur, esse negligentes: persuasos, etiam si noxam quae quotidie fit, ob exiguitatem sensu non percipimus, quod tamen longo tempore ex ipsa aceruat, tandem erupitur.

GAL. PERGAMENI de alimentorum facultate, li- ber secundus.

OMNIA edulia, quae primo libro fuerunt commemorata, plantarum erant femina, exiguum quiddam ac fructibus discrepantia: uic uerō de fructibus agere instituo, in quorum uisumq; reperiuntur & alia femina, quae ab ipsis fructibus maximē dissident: cuiusmodi sunt quae in sicubus, uuarum acinis, piris, ac denique alijs plantarum fructibus, ut cucurbitis, peponibus & melopeponibus, licet cernere femina. Ceterū in fabis, lupinis, dolichis, lente, & alijs id genus feminibus, quae siliquis obuoluuntur, quod quidem ex siliqua femineq; est cōpositum, ipse fructus existit. Plurima substantiae pars in feminibus inest. Porro aliorum propmodum omnium, quae primo memorauimus libro, semen duntaxat manditur: solina autem dolichi, dnm adhuc uirescit, fructus integer editur. Vnde ueterum nonnullus arbitror sub phaeolorum nomine dolichos comprehendisse.

De fructibus fugacibus, quos Graeci apiphas nuncupant.

HORAM anni, Graeci id tempus appellant, in cuius medio canalicum exoriri cōtingit. Tempus autem id dicitur est quae draginta: quo tempore omnes horarū (quos uocant) fructus, consistunt, ut cucurbitae, mora, pepones, melopepones, persica, & confamilia. Vocant autem ipsos horarios, quod eos ab ijs qui ad reponendū idonei sunt, distinguant. Corrupti siquidem facili, nec probē asseruari queūt, quemadmodum cerealia

Vicia.

*Agri casti semē
flatus dissipat,
quae uenerē ac-
cet uenercos.*

*Aphace,
Vicia.*

Lolium.

Agriopis.

Aracum.

Securinum.

Aparine.

Melampyrum.

*Semina quorū
rescitur, esse de
legumē purgan-
da.*

*Fructuum
femina.*

*Dolichus est si-
milis siliquae.*

*Horae quod tri-
pm anni dica-
tur.*

*Horarii fructus
corrupti facili,
et probē asser-
uari possunt.*

Cucurbita quomodo reponatur in hyemem.

cerealia omnia. Nonnulli tamen ē cucurbitis semen vacuantes, dein earum uelut carnē siccantes, in hyemem reponunt. Porro quæ corpus habent cōpactum, ea ut permanentē, sic solidam, terream, multū nutrimentū subitanitū possident. Quæ uerō cōsistentia sunt humida, eorum puntur, exiguum uig habent alimentū, & quod ex cernatur facili, potissimū cūm nitrosum quipiam ipsis inest, ac detergendū facultas. Talia sane deteriora succi esse perhibemus ijs, quæ nullam saporis qualitatem habent sensibilem, quo modo aqua optima nullam habet. Hæc igitur omnia, & nō multo magis quæ ante exactam maturitatem manducis, frutulentia quidem sunt, uerū subducuntur celerius: quemadmodū etiam quæ succum habent tenuem, citius distribuuntur. Sunt autem omnia hæc prauī succi, solutius uti liter ipsis utitur, qui artu uehementiore, & longiore itinere sese consecrerit: tunc enim iuant, corporis squalorem humectantia: & si frigida sunt miantur, moderatē refrigerantia. Ex enim humectandi quidem semper habent facultatem: refrigerandi uerō nequaquam, si calida, sic ut dixi affectus, fuerint comesta.

De Cucurbita.

CUCURBITA quidem insuauis est, concoctūq; difficillima: Romacūū lædit, nisi uominone reddatur. Hanc igitur & alia fugaciū pleraq; aut postq; elixa fuerint, aut statim certē, aut in sartagine friza, aut assa, omnes homines esse consueuerunt. Si quidem cucurbita elixa, prorsus insipida est: quocirca multos apparandi modos admittit, ut quæ in medio omnis excessus consistat, ob idq; ad quemus excessum ex æquo duci queat: ac proinde illis quibus mista fuerit, assimilata. Iam uerō cucurbita, quantum in se est, humidum frigidumq; & ob id exiguum corpori alimentum præbet: facili tamen descendit. Sed neq; coquitur: xgrē, si modō prauī corrupta non fuerit: id quod interdum et, ut alijs omnibus humidis, si multa fugacibus acciderit, si diutius in uentriculo hæreat. Assa autem uel friza in sartagine, quamplurimum quidem de propria humiditate depōnit. Ceterū ob æquam sibi qualitatem innatam, merito gaudet origano.

De Pepombus.

VNIVERSA Peponum natura frigidior est, cum humiditate copiosa. Habent autē uen quamdam abstergendi, cuius beneficio urinam crient, & deorsum expeditius quā cucurbita, melopeponesq; permeant. Semen autē potentius quā ipiorum uel in caro, deterger: adeo ut aduersus renes calculo infectatos conueniat. Succum tamen in corpore gignit uiriosum, idq; potissimū, cūm concoctum probē nō fuerit: quo casu cholera morbo obnoxio consuevit efficere. Quinetiam priusquā corruptum fuerit, ad uomitum quoq; est idoneū, præcipuē si largius sumat.

De Melopeponibus.

MELOPEPONES minus quā pepones sunt humidi, nec adeo prauī sunt succi. Minus item urinas mouent, tardiusq; deorsum descendunt. Ad uomitum præterea excirandum, non tantum, quantum pepones, habent momenti, nec adeo celeriter in uentriculo corrumpuntur, est

in iuuando eo, autumalibus fructibus longē sint inferiores.

De Cucu meribus.

VIRIAM quidem & ipsi, quomodo pepones, crient, minus tamen quā illi, quia ipiorum substantia minus humida est, ideoq; non facili, ut illi, in uentriculo corrumpuntur. Inuenias autem qui ipsos concoquant, ob naturā cum eis familiaritatem. Si quidem à totius substantiæ proprietate, suus quoq; animalium generi cibis est familiaris: ut cornucibus quidem eleborus, sturnis autem cicuta. Ceterū quibus biliosus humor, aut omnino prauum excrementū quoduis, in uentriculo sæpe congeritur, in ijs quæ natura concoctū facilia sunt, celeriter corrumpuntur. Quod si quispiam eorum aliquid, quæ ceteris concoctū sunt difficilia, concoxerit, succus tamen qui ex eo in corpus distribuetur, eandem semper retinebit naturam. Quare omnibus prauī succi edulsi censeo abstinentum, etiam si ea quibuscum esse concoctū facilia uideantur.

De fructibus qui ab arboribus colliguntur.

EX fructibus quibus uescuntur homines, humidi quidem, tenae humiditatis corpori alimentum præbent: quod ob id per corpus celeriter permeat, excerniturq; tum per cutim, tum per urinas. Consistentia autem solida, ut alimentum copiosius exhibent, sic etiam ad permeandum tardius.

De Ficibus.

FICVS quamquam prauitatem non potuerunt omnino effugere, facili tamen torum corpus peruadunt. Nam & abstergendi quoque insignem obtinent facultatem: quo fit, ut post ipsam esum, neplirici arenulas multas excernant. Nutriunt præterea uberius ceteris autumnalibus fructibus: stantibus tamen hæc quoque implent. At quæ sicut prorsus iam maturuerit, propemodum nihil omnino lædunt, quomodo nec canice, quæ multiplicem quidem præstāt utilitatem: si quis tamen largius eas elitauerit, offendetur ab ipsis, quandoquidem sanguine non admodum probum gignunt. Quo fit ut ex ipsarum esu pediculorum multitudo proueniat. Habent etiam tenuandi facultatem, & incidendi, quæ uentrem quoq; ad excrctionem irritant, renesq; expurgant. Ceterū iecori, leniq; inflammatione obiectis sunt noxi: quemadmodum & ficus, cōmuni omnium dulcium ciborum ac potuum ratione. Obstrictis tamen illis, aut scirrho affectis, ipsi se se nihil cōmodum, nec officiosum: sed medicamentis incidentibus, extenuantibus, & abstergentibus mista, nō mediocriter iuant, tum canice tum ficis.

De Uuis.

FICVS & uuis quemadmodum inter autumnales fructus principatū obtinent, ita fugacibus omnibus magis nutrunt, minimūq; prauī succi habent: laxam tamen carnē ac præhumidam gignunt, ob idq; celeriter flaccescunt. Verū uix minus alunt quā ficus, maximūq; id ipsis inest cōmodum, quod descendat uelociter. Quocirca si quid hæserint, grauiter lædūt, quam id minimē maturis ficibus inest. Ex enim

Cucurbita quomodo reponatur in hyemem.

Cucurbita quomodo reponatur in hyemem.

Ficus potest arenulas, facili ac celeriter prauitatem implere.

Caricæ herbarum simplicium præterea multum dantur.

Caricæ, sicuti aduersus inflammationem obiectis sunt noxi: quemadmodum & ficus, cōmuni omnium dulcium ciborum ac potuum ratione.

Vacuities alia quā sunt, descenduntq; uelociter.

Aqua optima nullam gustus qualitatem ostendit.

Cucurbita quomodo reponatur in hyemem.

Peponum facultas.

Peponum semen corruunt calculi reuocant.

Vacuities pro uisat.

Melo-pepones facili.

Acinorum substantia ex quibus conficitur. Acinorum semina astrigere, nihilque mutari in corpore.

Mystum nihil ventri statim replet, in portu stat velociter.

Vna quae nutrit magis, et quae deiciatur promptius.

Vna generosa quae sunt.

Vnae afferenda, indigesta de ueris.

Vuarum afferendarum de his minus.

Vna dulcis quam possideant.

Vna austera. Acida. Acrida.

Vinosa.

Mystum dulcissimum, subtile, rebus maxime.

Lara cispinea.

Lara quae ratione minus redatur.

Vuarum passivum, diuturnum et facilitatem.

Passivum quae praestantioribus beantur.

acinorum substantia, composita est ex carne, humore, seminibus, atque ambiente pellicula. Ceterum substantia a feminis siccata est, & quodammodo astrigens, omniaque intestina peradiit, nihil, quod sensu queat deprehendi, à se mutata: non secus ac in ficibus *oxypanidis*. Exiguam etiam & tegumentum acini recipit in uterulo mutationem. Quare si sola acinorum caro cum succo sit transglutina, magis alius laxabitur. Laxatur autem impenitus, cum solus ipse succus expressus (iungo multum appellanti) fuerit potius: qui ventrem, si pertranscat velociter, nonnihil stans implet. Ex hoc sane alimeni nonnihil corpori accedit: copiosius tamen ex carne substantia. Ergo quibus uis exigua est succus, et magis nutriunt. Quibus uero uberior, minus quidem nutriunt, sed promptius derijciuntur. Vocat autem uis huiusmodi generosa, quae humidam quidem substantiam habent exigua, solidior autem non paucam. Quas quidem reponentes, eas in mystum conijciunt, aut impletas eis nouas olas, sic in uinaceis, hoc est, in uuarum reliquis, recondunt, ut ne minimam quidem habeant respirationem. Atque huiusmodi sane uis, uterulo dissolutum corroborantes, hominibus appetentiam restituunt, non tamen per alium descendunt. Quod si sumitur largius, teriunt caput: minus tamen quam quae in mysto condunt. At pen silis, nihil prorsus caput laedit: ventrem autem nec sistit, nec ad descensionem irritat. Porro uis in mysto, aut in ollis recondere, aliarum omnium facillime concoquantur. Cum autem non sit parua differentia inter uias, quae sane dulces existunt, calidiores possident succu, ob idque finiculose sunt, atque alium subducunt: austere uero, acida, acerbior, frigidioresque proinde non excretioni modo, sed coctioni, distributioni, & nutritioni sunt noxae. At qualitates expertes, quas uinosa appellant, locum inter calidum & frigidum, medium obtinent. Maxime autem subducit alium, ipsum multum dulcissimum. Quod uero ab uis austera aut acida est expressum, ad omnia pessimum est. Soleut praeterea coniectis in parua dolia uinaceis, tantum aquae superaffundere, quoad omnia permadeant. Quod ubi satis factum uidetur, in dolis fundo foramen aperiunt, ut dilutis (quam nos appellamus loram) effluat: id quod postea pro uino bibunt. Capitis tamen dolorem avertit, nisi quis dilutorem loram ipsam ebibat: quam uis ocyus per urinas excernatur. Ceterum dilutum id multo uinosius efficit, si uinaceis ad uer, aut uitatem, repositus fuerit.

De Uis pafis.

VVAE pafis cum aliis uis eandem habent rationem, quam carix cum ficibus. Ceterum ut dulces temperantur sunt calidiores, ita austere frigidiore: quae quidem stomachum roborant, & uentrem conitipant, & his multo magis, acerbior inter quas medium quoddam constitutionem dulces obnunt. His enim ut uis quaedam semper inest contemperandi, ita & mediocriter deterget deinde exiguis mordicationes, quae os uterulicis infestant, obtundunt. Inter passas autem praestantiores sunt, quae tum pingues sunt, tum cunctulam habent tenuem. Quae quidem si

in ueterate sint, aqua praemacerata, purgataque à feminibus, multo praestantiores redduntur. In Cilicia tamen crescunt nonnulli solidi, minutulique, nullum semen prorsus habentes. Porro in regionibus frigidis, ne uix quidem ipse exquirat maturari queant, nedum passaru quae iam ob idque resina uinis immittunt, ne aescant celeriter. Alimeni autem passis tale qualitate in corpus distribuetur, qualis ipsarum natura fuerit: quantitate uero, copiosius ex pinguib. dulcibusque parcius ex austis & macris. Quod si pinguium dulciumque purgatarum parem molem cum pari uia rum mole contuleris, passas ualentius nutrire deprehendes.

De Sycaminiis, quae & mora appellantur.

MO R A (quorum succum recipit medicamentum diamoron, ori gratum) celerissime pertranscunt, cibusque alijs praecunt, si in uterulo purum inciderint, & iumpta in primis epulis fuerint. Quod si post alios cibos fumantur, aut prauum succum in uterulo offendunt, celerissime computrescunt cum alijs cibis, ut in cucurbitis accidit. Quare ut postiores, si cibi fumendi sunt, qui tarde permeant: sic omni primi, qui celeriter quidem permeant: corrumpuntur tamen, si in uterulo commorentur diutius. Tempus uero utendi ut peponibus, ita & moris est, cum corpus, uteruloque squalore restituit: quo tempore necesse quoddammodo est leuam quoque idem accideret. Porro moris, cum non admodum maturum erit, qualitas quaedam astringens inest, sicut & immaturioribus acidiunde nonnulli resiccat, ad diuturnam alius profluvia utuntur. Matura autem, si corrupta non fuerint, omnino quidem humectant. non tamen omnino refrigerant, nisi sumpta frigida fuerint. Alimeni uero corpori praebent minimum, quomodo pepones: uo tamen ut ij, uotumum exarant, neque stomachum laedunt.

De Cerasis.

EX CERASIS quaedam moris similia, cuiusmodi sunt quae nullam habent astringentem: alia ruborum fructus, ut quae euidentius astringunt. Quaedam autem sunt quae uel ualentius astringunt. Proinde memoratae cuiusque speciei facultatem, ex ijs quae de moris & rubi fructibus dicimus, potes colligere.

De Rubi fructibus quos *salmon* uocant.

MAGIS astringunt quomodo mora: quod si quis largius ipsis uescatur, capitis dolore leniet. Alij stomacho anguntur. Proinde ut mora, sic fructus hunc, priusquam edatur, maxime abluere oportet. Cohibet autem uentrem: atque medicamenta omnia quae ex mororum succo parant, si ex hoc rubi fructu sunt, facultate labebunt efficaciorum.

De fructibus Canabru, quos *salmon* appellant.

VLTO magis quae ruborum fructus astringunt, ac uentre colubent: parumque alimenti suggerunt.

De Iuniperi fructibus.

FRVCTVS Iuniperi, acris admodum est, cum exigua dulcedine, & minori praeterea astringente. Habet autem & aromancum quiddam: unde constat, quod calefacit. Omne enim aroma calidum. Hepar autem & renes purgat: succos crassos & lentos tenuat: unde medicamentis salubribus admiscitur. Ceterum alimeni praebet exiguum.

At

Passivum replet, in portu stat velociter.

Passivum quae, quod & quantum corpus aut mens laetatur.

Passivum ualentius nutrant quoniam tota.

Diamoron ori gratum.

Mora debet alios cibos praecedere.

Cibus qui tardus quod permittit, postea sunt datur esse qui cito ruerit auti graui.

Mora uentrem offendit, cum uentrem calidum aliat.

Mora uenit ut resiccat, ut profluvia non graui.

Maturum uisum suum uis.

Cerasorum sunt omnia & facit.

Rubina.

Rubi fructus uentri et facit.

Cynobates. Canabru fructus sunt.

Iuniperi fructus facit.

Aroma uisum calidum.

At largius sumptus mordet stomachū, caput calfacit: ob idq; ipsum nonnunquam replet infestisq; doloribus: uentremq; nec prurit, nec cohibet: urinas tamen mediocriter auuat.

De fructu Cedri.

FRUCTVS cedri, fructus iuniperi est similis, nisi quod eo est durior, siccior, exillior & acrior, tūhil, ut ille, aromaticū habens. Quare nisi quis ipsum aqua premacerauerit, nullum corpori alimētum praestat. Valde autem stomachum mordicat, capitisq; dolorem infert, nisi quis ipsum parciusimē sumperit.

De Nuce pinea, siue Strobilo.

SVCET boni est & crassi, multumq; nutrit, nō tamen facile coquitur.

De fructu Myrti.

NVTRIT tenuiter, astringitq; ualenter, atque ob id alium fitit. Ceterū astringentiā habet quamdam acrimoniam admistam.

De Persico.

CORRVMPITVR horū tum succus, tum caro: prauiq; omnino sunt. Quare nō sunt post alios cibos mandenda (alioqui corrumpunt, in superficie tantantia) sed in primis mensis, ut cetera re & mali sunt succi, & subduci facile quēst.

De Armeniacis & praecocibus.

HAC quoq; ex genere sunt persicorum, bonitate nōnihil ea superantia. Neq; enim in uentriculo corrumpuntur ut illa, neq; etiam acefunt: uulgo autem suauiora apparent, unde etiam stomacho sunt graviora. Praecoca tamen Armenia ci praestant. Porro uentriculus, quae deorsum quidem uergunt, ex molestantibus, ea per alium expellit. Quae uero supernant, per uomitus eicit.

De Malis.

MALA quidem quae astringunt, succum habent frigidū atq; terreum. Quae uero acida apparent, frigidum simul atq; tenuium partium. Medie autem temperaturae sunt dulcia, quae tamen ad calidius uergunt: ut ea quae omnis sunt qualitatē expertia, & ueluti aquosa, ad frigidius inclinant. Porro haec tria saporum nomina, astringens, austerus, acerbum, qualiterum quidem unam significant. Acerba tamen ualentius austerris astringunt. Austerris igitur potius urinis, cum uentriculus, uel propter calidam intemperiem, uel multam humiditatem, est imbecillius: acerbis autem, cum duo haec aucta admodū fuerint: acidis, quando succum crassum, qui non magno perefrigidus sit, suspicaberis esse in ipso collectum. Quandoquidem succus frigidus, non acidus, sed aquia postulat. Vtraq; certe & acida & acra, succos crassos incidunt: sed haec quidem cum calefactione, illa cum refrigeratione id praestant. Jam uero astringentia quidem alui deiectiones perpetuo colubent, acida autem cum succum crassum in uentre offenderint, incidunt ipsum, atq; deorsum trudent, ob idq; deiectiones humectant. Quod si purum uentrē inuenierint, ipsum magis fistunt. At succus dulcis, cum purus & per se fuerit, distribuitur celerius: si uero acrimonius aut crassius fuerit, citius subducitur. Est & aliud succi genus, non pomis modo, sed ceteris oranibus, aequum & qualitatē experta, quod in

medio memoratarum facultatum, quemadmodum aqua ipsa, consistit. Optima poma (quae colligi ante maturitatem non debent) saepe in morbis maximū praedictum asserunt, uel cataplasmatibus modo cum farina admota, uel in calidis ceneribus mediocriter assa, uel in aquae bullientia uapore percocta. Ceterum post cibum statim dare ipsa conueniunt, qui deiectionis uis appetentia, tardeq; concoquant, aut uomitus, diarrhoea, & dysenteria infestantur. Sed in hunc usum acerba sunt commodissima.

Qui fiat ut poma aut pira astringentia, uentrem quibuscumq; laxent.

Vas post ea quae fluida & lubrica sunt, astringentia sumunt, in iis potissimū qui stomachum imbecillum sortuntur, deiectione ipsam accelerant, uentriculū roborant, & ad expellendum deorsum, quae in sese continent, incitantia. Quod si prima omnī astringentia ingerantur, ac deinde quae pinguiora & magis fluida exsunt, os quidem subuertitur uentriculi, alui autē ipsa firmabitur: id quod in Prota Rhetore, usū & experientia explorauī. Quisobrem ubi pallida bilis, aut alui quispiā humor uentriculū turbat, si is qui sic est affectus, aliquod astringens uis gustarit, repente deorsum succum infestantem excernent.

De Cydonijs & Struthomelis.

HIS pomis eximium quiddam, quod in alijs non inuenitur, inest. Nam praeterquam quod astringentia possident copiosiore, succus etiam eorū diu permanet, si quis ipsum cum melle coctum asseruerit: cum aliorum succus si reponatur, acefcat, ob exuberantem humiditatem. Quocirca ad exsolui uentriculi robur ut succo illorum solemus, ita ut monui, confectio. Sed ex carne ipsorum & melle placenter quaedam parantur prodigiose perennitatis. Nos uero medicamini qd ex eorum succo & melle conficitur, nonnulli piperis albi, zingiberis, atq; aceni miscemus.

De Piris & Punici.

QVAT de malorū differentijs diximus, si ad pira puniciq; transuleris, nihil erit quod nos de ipsis dicere oporteat. Piro uis igitur usū, pomorum usui est similis. Punica uero, cetera quidem sunt similia: in eo tamen discrepant, quod nunquam cum hordei farina assentur, neq; in aqua aut uaporibus elixentur. Succum autem habent piris & pomis tum copiosiore, tum gustu suauiore, interdumq; etiam utiliore: ut puta dum cardialgia, hoc est, mordacitō oris uentriculi, in festat. Cum autem minimi nutrimenti sint punica, nunquam ipsis ceu alimento, sed tantum ut medicamentō egemus. At pira aliquantulum nutruunt. Quibus quidem in tenues orbes dissectis, & exiccatis, ea postea tandem elixis, hyeme & uere, uice ciborum utuntur.

De Mespilis & Sorbis.

AMBO enim astringunt, uerū mespila multo ualentius quā sorba: proinde uentri fluens cibus est cōmodissimus: sorba tamen in cibo ipsis sunt suauiora. Quamuis neutro ipsorū ut nutrimento, sed tantum ut medicamento, egemus.

De Palma fructu, quem phoenicem, datyllum, & palmulam uocant.

PALMYLARVM alie quidē sunt siccae, astringen-

Mala quādo ex quibus fieri debent.

Mala acerba quibus sint com modissima.

Astringentia si quidem sumantur post fluida, deiectionem accelerant. si uero lubrica praesumantur, alium emstringunt.

Cydonijs struthomelis, faciem, dū cum melle assentur, firmant: ex solui uentriculi firmitudinem. Dicitur uero uel qd appellatur.

Piperum, zingiber, quibus mala.

Punicorum malorum succi car dulcia esse uolunt.

Pira quomodo excutiri debent.

Mespila. Sorba.

Phoenice. Datyllum. Palmula.

Cedri hancurū facilius.

Strobilus. Nux pinea.

Myrti fructus cum astringente citi acris.

Persica cur non sint post alios cibos mandenda.

Armeniaci.

Praecocia. Uentriculus postea remanens tunc excrucians.

Malorum differentie et ipsarū saporū diuersa.

Austerris malis quando exsternant.

Acerbis malis quando res expulsi.

Austerris malis quando res expulsi.

Acra cum calore incidunt, acida cum refrigeratione.

Malorum astringentium atque acidorum differentia.

60

*Palmae ex-
pta.
hispans.*

gentes, ut Aegyptia: alix molles, humidæ, & dulces, ut quæ *haysim* appellantur. Reliquæ omnes palmæ inter hæc duo genera uidentur medix. Omnes autē difficiles concocti sunt, capitique dolore conciliant, si largius sumantur. Porro succus qui ab ipis in corpus digeritur, crassius omnino est: habet etiam & lentoris quippiā, cum palma ipsa pinguis fuerit. Cū autē dulcedo tali succo permixta sit, celerim quidem hepar ab ipsa obstruitur. Læditur autem uel maxime à palmarum esu, uel inflammatum, uel scirrho affectum. Post hepar etiam lien & obstruitur, & læditur. Quod autem dulces palmæ succum calidiorē possideant, sicuti & astringentes, magis frigidum: quod uirides, status gignant, nec in re gionibus noui admodum calidis possint maturificare exacte, perspicuum est.

De Oliu.

EXIGVVM quidem & ipse corpori alimentum præbet, potissimumque caducæ. Edunt autem homines has quidem cum pane, maiori ex parte: sine illo uerò, quas halmadas & colymbadas uocant, idq; garo perusas, & ante alios cibos, uentris subducendi grana. Porro quemadmodum caducæ, pinguitudinis habent plurimū, ita hæc succum astringentem: proinde stomachū roborant, & appetentiam excitant. In uniuersum autem, quod suauis est, facilius ipse quæ ex equo sunt salubria, concoquitur.

De Nucibus.

NVCES corpori alimentū præbent exiguum: copiosius tamen Ponticæ nuncupatæ, quas aulinas appellant, quod substantia ipsarum coactior sit, minus oleosa quàm regarij, hoc est, cōmuniū. Habet tamen & astringentis facultatis exigui ipsa nux regia, quæ procedente marcescit tempore, tota ipsius substantia, in cibum pinguem transmutatur. Coquitur autē hæc nux facilius quàm Pontica, stomachoq; est gratio, & multo magis quando manditur cum caricis. Hominem à pharmanis letalibus nihil magnopere ipsum iri, si utraq; has ante alios cibos cum ruta sumperit, proditū est. Liqueat præterea, quod humida quidem apta ad deiectionem est, sicca uerò minus. Plerique autem uentris subducendi gratia, cum garo etiā ipsam præsumunt: in quem usum uiridis est accommodatior, utpote minus astringens. Quin & siccatū quoq; in aqua fuerint præmaceratæ, facultas, uiridibus est assimilis.

De Amygdalis.

SOLA in amygdalis tenuandi facultas ac detergendi præpollit, qua tum uiscera purgant, tum humores è pulmonibus ac thorace, ipuit expectorant: sed potentius quæ amare sunt. Sunt autem omnes oleosæ & pinguis qualitates participes, minus tamen quàm nuxes: quare tardius illis oleosæ fieri cernuntur. Carterum nec uentri subducendo conferunt, nec corpus multum nutriunt.

De Pistacijs, uulgo fisticijs appellatis.

QUALITATEM obtinent aromaticam, subamaram, & subsaturnam. Quare parum quidem nutriunt, uerū ad hepar roborandum, & succosio ipsius uis infarctos purgandos, conducunt.

De Prunis.

Hæc fructus minimū quidem nutrit, sed uentrem modicoriter humectat, atq; refrigerat, ipsūq; tum humiditate sua, tum lentore, subducit. Siccatum porro esse elui potest, ut ficus. Damascena pruna perhibent præfinitissima omnium. Secūde tribuant partes næ quæ in Hispania proueniūt. Maxime illa omnium probantur, quæ cum mediocri attritione, magna simul sunt, & laxa. Cocta in melicratu, in quo plussculi sit mellis, ad modū alui deiciūt, etiā si quis sola ipsa sumperit, & multo magis, si postea melicratum biberit. Conferit etiā ad subducendam alui, post sumpta ipsa, uini dulce exhibere, temporisq; aliquid interponere, non autē statim post prandere: quod in omnibus solutiuis sit præceptum cōmune.

De fructu quem Serica appellant.

EXIGVVM quidem est alimentū, & cōcoctū difficilis, nec iuuat quicquam stomachum.

De Ceratij, hoc est, filiquis. Agartobas Hispani uocant.

EDVLEVM lignosum est, obidij prauis succi, & concoctū difficile existens, nō deicitur facile, De Cappare.

TENIVVM quidem est partū, ac proinde mīoimū alimenti exhibet. Vinum autē fructū huius plantæ magis ut medicamentum, quàm ut alimentum. Sale enim conspersus ad nos importat, propterea quod putrescit, si reponat solus. Vbi igitur saluginem deposuerit elota, collapsam appetendi uim excitat, pituitam uentris detergit, atq; subducit, purgatq; tum lienis, tum hepatis obstructions. Vni autem ad eas res oportet ante alios omnes cibos ex oxymelite, uel oxelzo. Huius etiam plantæ uiridis ac teneros surculos, nō aliter quàm terebinthi, man dunt, in aceto simul & muria, aut solo aceto condientes.

De Sycomor.

PLANTA est parua sicuti albe permissilis: cuius fructus exigue est dulcedinis particeps, in mororum atque ficuum medio consistens, unde nomen coartrat.

De Persica plantæ, quæ à Persica diuersa existit.

HVVS arboris fructū apud Persas adeo esse noxium fertur, ut perimat: cūculentum autē eua dere, in Aegyptum translata.

De Citrio, quod etiam mālum Medicum uocant.

TRIS huius fructū partes existunt: acida, quæ in medio ipsius sita est: præterea quæ ueluti fructus est caro: & tertia, quæ ut tegumentū extrinsecus circumdar, suauolens & aromatica existens. Atq; hæc sanè concoctū difficilis est, utpote dura & callosa: quāq; ut medicamentū exhibita, cōcoctiōni auxiliatur. Partem autem ipsius mālū acidam, in acetum imbecillum conijciunt, quod ipsam longè acrius reddant. Carterum pars inter dictas media, quæ neque aridam ueque acetem qualitatem sortitur, propteruritatem etiā concoctū est difficilis: quare ipsam omnes cum garo & aceto edunt.

De fructibus plantarum agrestium, inter quos sunt quercum glandes.

PLANTAE illæ uocant agrestes, quæ citra man goniū

Prunus uirga.

Damascena pruna.

Pruna Hispanica.

Pruna colla in melicratu, alui subducit.

Solutiū quod uis alui sumperit, non statim illi prandendum esse.

Serica.

Ceratia.

Siligna.

Cappari farinacea insignis.

Cappari utendum in prunis opus est: idq; ex oxymelite, uel aceto.

Sycomor.

Persica fructus.

Mālum medicū.

Citrium ex quo boni citrati parantur.

Citrij cortex cōcoctum auxilium habet.

Acetum imbecillum, cum citrij acrisse acrim.

Plantæ agrestes quæ sunt Glandes quercu na.

Palmarum esu quancelerim hepar obstruit.

Palmarum esu quancelerim hepar obstruit.

Oliu parū ut trancis largit.

Oliu halmadas & colymbadas, et ante alios cibos, uentris subducendi grana.

Sauiorum cibum, et qui ex aqua sunt salubria, concoquitur.

Nux Pontica. Aulinea.

Regia nuxi astringens non ualida.

Nuxem regiam, si cum carica & ruta sumatur, fieri alipharmacum.

Nuxem regiam uiridem, esse apud uentris subducendam.

Amygdalarum facilius.

Amygdalarum amentum diutius potiusque cernitur.

Amygdala non multum nutriunt.

Pistacia.

Pistacia.

gonij industriam proueniunt, ut fagus, quercus, ilex, cornus, comarus, rubus, cantharus, adierus, pirus, atq; agriococcy melus, cuius fructus appellatur in Italia unedo, stomacho nocet, & capitis dolorem concitat: etq; acerbus cum exi-
 ga quadam dulcedine. Porro glandes æquæ nu-
 triunt, ac frumenta ceorum eduliorum pleraq;
 Alimentum autem quod ex eis sumitur, tardiè est
 transitus, & crassus succi: ob idq; sunt concocti
 difficiles. Ceterum Comari fructus, *parisiorum*
 appellatur, glande querna ad omnia est deter-
 ior: quemadmodum hæc glande, quam uo-
 cant castaneam.

De alimento quod à plantis ipsis agre
 stibus sumitur.

NON modò plantarum semina & fructus, sed
 etiam integras ipsis sæpenumero mandimus:
 idq; aut urgente necessitate, aut etiam suauitatis
 gratia. Si quidem palmarum uerticem edimus, nec-
 non tenellas spinas, aut elixas, aut crudas, uel si
 ad id fame adacti non sumus. Ceterum omnia
 id genus & parcissime nutriunt, & prauis succi
 sunt productiua. Quædam etiam ex ipsis, no-
 xam uentriculo adferunt, præter spinas, quæ nunc
 primum è terra emerferunt.

De Lactuca.

HOC olus succi est, quàm alia omnia, lauda-
 bilioris. Nam quum reliqua omnia sanguinem
 gignant paucissimum, ac prauis succi, lactuca nõ
 multum quidem generat: id tamen nec mali suc-
 ci est, nec omnino laudabilis. Porro dum essem
 iuuenis, uentriculusq; mihi infestaretur bili, lac-
 tUCA, quod ipsum refrigeraretur, utebar: quum ue-
 rø ad ætatem declinarem perueni, hoc ipsum o-
 lus fuit mihi contra uigilias auxilio, quæ senib;-
 us esse annexæ uidentur. Habet itaque lactuca
 succum quidem frigidum atq; humidum, minimè
 tamen prauum. Quare nec concoctioni resistit,
 nec perinde ut reliqua olera, uentrem cohi-
 bet: sicuti neque etiam prurit.

De Seris, siue Intybo.

INTYBI facultatem habent lactucis similem:
 suauitate tamen & cæteris quæ lactucis insunt,
 ab eis relinquantur.

De Malua.

DISSIDENT agrestis malua & fariua, quod
 hæc quidem humiditate, illa siccitate exuperet.
 Vtraq; autem calorem habet moderatum & tep-
 idum, facileq; subducitur, non modò propter
 humiditatē, uerum etiam propter lentorem, præ-
 sertim si cum oleo & garo, copiosa ipsa ingerat-
 ur. Nutrit tamen mediocriter.

De Beta.

SVCCVS betæ abstergendi uim aded manife-
 stam sortitur, ut uentrem ad excernendum exci-
 tet, atq; stomachum mordicat, præsertim quibus
 sensu exactiori est præditus. Ob idq; edulium id
 est stomacho noxum, si largius sumatur. Corpo-
 ri autem ab ipsa, ut ab alijs oleribus, paucum ali-
 mentum accedit. Verùm obstruētū hepar magis
 quàm malua aperit, præcipuè si cum sinapi, aut
 saltem cum aceto mandatur. Lienosus item eodè
 modo sanapra, ut è medicamentum existit.

De Brasica.

BRASSICÆ quidem succus purgatricè pos-

si det facultatem, etq; non probus, ut lactuca,
 sed prauus grauiolensq; corpus, cõmuni sic-
 cantium ratione, magis siliit quàm laxat. Quare
 dum humentem alium reficere est consilium,
 brasica ipsa discicta in secunda aqua donec ex-
 tabescat, utimur. Quippe nihil quod accuratè co-
 quitur, propriū succum seruare omnino potest:
 sed necesse quidem est ut totū abiciat, si coctum
 diutius fuerit. Quin & lenticulæ diximus eodè
 quo brasicam modo, oportere parari, ut quæ
 utrumq; possit efficere, utriusq; subductionē colli-
 cet, & cohibitionem. Ceterū nihil ex his quæ
 bis coquuntur, ærem frigidum, aut frigidam aquam
 attingat, alioquin non extrahescet: sed oportet ca-
 lidam in promptu habere, ut cilm ex priori ex-
 traxeris, pronus in illam consicias. Lens itaq; &
 brasica, æquali inter se mensura siccant, ob idq;
 usum debebant. At lens quidem, non exigu-
 um corpori alimentum præstat, idq; crassum,
 & melancholicum. brasica uerò paucum habet
 alimentum, uerū quàm lens humidius.

De Atropice & Buro.

HÆC sunt alijs oleribus aquosiora, necnon
 qualitatis expertia magis quàm cucurbita, aut
 saltem non minus, cū coctā uidehcer fuerint.
 Quo fit, ut non ex solo oleo & garo ipsa man-
 dant, sed acetum etiam injiciant: alioquin sunt sto-
 macho noxia. Corpori porro alimentū præstant
 exiguum, nonnihil ad diectionem inclinant.

De Portulaca.

NYTRIMENTVM exiguum exhibet, idq; lu-
 midum, singidum, atque lentum. Quo sanè len-
 tore lo mordicationis experte, stuporem denum
 persanant.

De Lapatho, quod licet appellare be-
 tam agrestem.

NON gustu modò, sed uiribus etiam betæ hor-
 tensi est persimile. Quia tamen beta lapathio est
 suauior, idcirco uemo est, qui ipsa non liben-
 tius uescatur.

De Oxylapathio, siue Rumice, siue
 Lapatho acido.

MLVIERES rustice laborantes pica, necnon
 pueri quidam gulosis, oxylapathum crudum in-
 terdum mandunt: quod quidem olus nõ nutrit
 multò magis quàm lapathum.

De Solano, siue Solatro, siue Morella.

RARO ipso unimur ut alimento: ut medica-
 mento autem, assidue. Efficax enim est in his, in
 quibus attrictionis refrigerantis usus incidit. Mi-
 nimè autem est nutritum.

De plantis spinosis.

PLARIQVA rusticorū plautis huiuscemodii è
 terra nuper emeris, priuquam ipsarū folia desin-
 ant in spinas, uescuntur, non crudis modò, sed
 in aqua etiam elixis: crudas quidem aceto & garo
 intingentes, coctis uerò præter hæc affundeu-
 tes oleum. Mediocriter enim iuuant uentriculū.

De Cinnara, quam Romani Caccophiam,
 Galli Artichao uocant.

PRÆVI succi est edulium, maximè cū plu-
 sculum obdurerit. Tunc siquidem ea ex siccis
 melancholicus: ex ipsius autem succo, tenuis ac
 bihiolissimus gignitur. Quare longè fauor-
 rit ipsam elixam, aut frizam mandere.

R a

Vandem com-
 calare dolorem
 capitis.

Comari fructus

Castanea.

Palma vertice
 est uigini.

Spina recutit.

Olera omnia gi-
 gnat pauclissimum,
 prauisq; succi, ac-
 cepta lactuca.
 Lactucam refrigerare
 oportet. Ceterum
 feram esse.
 Vigiliæ esse co-
 gnatas febribus.

Seri.
 Intybus.

Malua rimisq;
 facultates.

Beta, succum in-
 fignu extergendi
 facultate esse
 præditum.

Brasica fuerit
 quodam purgat,
 corpus autem na-
 go siliit, quon-
 iam laxat.

Brasica dysio-
 sta.

Lenticulam al-
 uum solvere, si-
 lenter.

Lens brasicaq;
 rym bobatant

Atroplex.
 Bileum.

Portulacam fa-
 uore stuporem
 demouet.

Lapathum.

Oxylapathum.
 Rumex.
 Lapathum
 acidum.

Solanum.
 Morella.
 Morella atrim-
 refrigeratq;

Plantis spinosis.

Cinnaram pra-
 e esse uita.

Apium.
Pterisilium.
Sion.
Smyrnius.

De Apio, Hippocresino, Sio, & Smyrno.
Hæc omnia urinas ciente: inter quæ apii est
utilitissimū, & suave, atq; stomacho gratum. Pe-
terisilium autem, & Sion, infusiora. Smyrniū
uerō non est infusitum. Siquidem Romæ maxi-
ma copia manditur, acrisq; multo est quàm a-
pium, necnō calidius: præterea aromaticū etiā
nonnihil possidet. Proinde urinas valentius pro-
uocat quā apium, quāq; Hippocresinum &
Sion, mensiq; mulieribus mouet. Ceterū Hip-
pocresinum ipsū & Sion, cocta mandunt, cum
utruq; ipsorum crudum sit in suauē. Nam tam-
et si nos utilitatem quæ ex cibus provenit spec-
temus, non uoluptatem, quia tamen cibi inuasi-
tas magna ex parte causa est, quo minus ipsum
nonnulli conficiant, ob id nimirum satius fuerit
cibos condire in terdum mediocriter: non uti co-
qui faciunt, edimenta quorum plus interdum
concoctioni obstat, quā profuit.

De Eruca.

Hoc olus manifestissime calfacit, semēq; gi-
gnere creditur, & coeundi exorare appetitum.
Capiti etiā dolorem infert, præsertim si quis
ipso solo uelutur.

De Acalyphe, siue Vrtica.

TENIVM est urinum & partium: unde ne-
mo ipsa ut alimēto utitur, nisi fame extrema pre-
mat. Vtilis autem est, ut obsonium, ac medica-
mentum quod alium denotat.

De Scandere, Gingidio, quod Chy- resolūm uocant.

GINGIDIVM nō aliter q̄ scandix manditur
apud nos, stomachūq; admodum iuuat, colla-
piamq; illius appetentiam, si cum acro sumatur,
excitat, siue elixum siue crudum mandere uelis.
Elaxationē tamen diuturniorem nō tolerat. Est
porro non tam alimentū, quā medicamentū,
attributionē & amarorē nō mediocrem sortitur.

De Ocymo, quod uulgō Basilicon uocant.

Hoc olus uentriculo exilit noxium, prauisq;
succis, & concoctū difficile.

De Fœniculo.

ASSIDVX uruntur anetho quidem in condi-
mentis, fœniculo autem etiā in obsonijs. Nam
apud nos sanē reponunt ipsū, eodē modo quo
pyrethrum & terebinthum, adeo ut in totum an-
num sit utile.

De Asparagis.

OMNES propemodum Græci, teneros cau-
les, quo tempore ad fructus ac seminis produ-
ctionē augescunt, asparagos cōmuniter uocant.
Basilicū igitur germen, minus q̄ basilica ip̄a sic
cat: tamen aliōrū olerum caulis temperatura sit
ut plurimum q̄ folia ficiore: ut atriplex, lactu-
ca, bina, betæ, malagū. At radiculæ asparagus, si-
cuti & rapæ, siliapi, cardami, pyrethri, & omniū
propemodum acrum & calidorū, humidior exi-
sit. Bulbus autem, apium, sion, eruca, ocymum,
oxylapathum, lapathum, & omnes olaræci ge-
neris herbæ, antequā semen effundant, eiusmo-
di caulem quandam producant, qui post semen
effusum siccat, sitq; ad cibum hominibus uti-
lis. Hæc autē omnia aquæ incocta mandunt cum
oleo & garo, paucō acro adiecto. Alimentū ra-
men paucum dant corpori, neq; id boni succi,

De alio genere asparagorum.

QYt asparagi in oxymyrine, chamædaphne,
oxycantha, & bryonia proueniūt, ac tum in qui
regius, rum qui iam uocat, omnes inquam lu-
stomachū iuuat, urinasq; ciente, ac parū nutrit.

De germinibus.

ARBORVM ac fruticum germina, olerum
asparagi proportionē respondent. Quæ qui-
dem omnia aquæ incocta manduntur, præter in-
suauia quædam ac medicamentosa. Quibus etiā
urgente fame, homines ueloci coguntur. Omnū
tamen præstantissima sunt, terebinte, uincis, ui-
tis, uinci, rubi, & canisibi germina.

De discrimine quod partibus planta- rum effulentur inest.

NON est autē Mnesitheus audiendus, ubi ait,
radices omnes concoctū difficiles esse, longeq;
ipsis folijs crudiores. Radiculæ siquidem, radi-
ces habent caule ipso, ac folijs acriorē: simili-
ter cepa, ampeloprasum, porrū, & allium. Quod
si betæ quocq; & malux, & rapæ radice cōparare
ad folia uolueris, plus uirū in ea deprehendes:
quemadmodū & in altheæ, quæ a gressis quædā
esse malua uidetur. Nam radix ipsius, ut & betæ, cū
rumores multos pituitosos discutat, id quod fo-
lia præstare nequeūt, planē facultatē suam indi-
cat. Etenim qd in radicibus id genus probē cōse-
ctum nō fuerit, in folia & caulem ipsa natura ex-
ternat: ut facere uidet etiam in ceruis, totius sub-
stantiæ excrementa, ad gignenda cornua, minimē
necessaria transmittens. Tutius itaq; est, gustantē
prius atq; inspicientē, singulas plantarū partes
ipsas per se explorare: post autem experiri man-
dentem: quandoquidem olfactus & gustus, om-
ne ipsius plantæ temperamentum ostendunt.

De Rapæ siue Burnadæ.

DVX autem quidem est, minimē effulenta, nisi co-
quatur. In aqua autē cocta, nō nutrit minus con-
generibus alijs. Succū autē in corpus distribuit,
mediocri crassiorē, concoctionēq; diuturniorē de-
siderat: atq; illa unice cōmendatur, quæ bis cocta
fuerit. Quod si crudior sumatur, cōcoctū diffici-
lior, & sterculentū redditur, stomachoq; noxia.

De Aro.

MANDITVX & huius plantæ radix eodē mo-
do quo rapæ. Ceterū dum ipsam coquis, priore
aqua effusa, in altam calidam, cum concnere con-
uenit. Quæ autē acrior & medicamentoſior exi-
sit, (qualis in nōnullis regionib; crescit) ad eliciē-
dos tussi crassos pulmonis succos est præterda.

De Draconio.

HVVS quoq; radicē bis reuē elixantes, quo-
ad medicamentosum omne posuerit, nōnunq;
exhibebimus mandandam: quemadmodū & Ari,
quando humores crassi & lentī, qui in thorace
ac pulmonibus habentur, ui maiori indigent. In
uniuersum autē, acia quidem & amara li edant,
corpus parcius nutriunt: insipida autē, & q̄s ad-
huc magis dulcia, multū & multo magis, si com-
pactam adhuc habeant substantiam.

De Aphodelo.

RADIX aphodeli & magnitudine, & figura,
& amarorē, scilicet radicē quodāmodo est similis:
facultatēq; habet tenuandā, atq; aperienti. Si ra-
men, ut lupini, paretur, maximum sui amaroris
partem

Asparagi in-
ter viticulos,
quoniam sicut.

Arborum & fru-
ticum germina.

Maculosa.

Radices caule et
folijs acriorē et
potentiorē quā
sunt.

Radix altheæ,
et betæ, discuta-
re pituitosos hu-
mores, quod nō
datur folijs ca-
racterem.

Cervis totius
substantiæ excre-
menta ad gignen-
da cornua trans-
mittit.

Plantarum tem-
peramentū effi-
de ab assidu et
guis.
Rapæ.
Burnadæ.

Aro.

Draconij rasis.

Nutrit corpus
quo parcius, et
quā uerbis pos-
sunt.

Aphodelo radice
vitico.

Cibi inuasi-
tas magna ex parte
causa est, quā
minus nonnulli
conficiant.

Concoctio in
terdum obstat,
quā profuit.
Eruca facilius
creditur sterma-
tica.

Acalypha.

Vrtica alium
dicitur.

Gingidium.
Scandere.

Ocymum.
Basilicon.

Fœniculū uicē
ritum in totum
annum reponi-
batur.

Asparagi com-
muniter dicitur
omnes teneros cau-
les, quo tempore
ad seminis pro-
ductionē augescunt.

Asparagi diuer-
sorum olerum.

partem deponit: scilicet autem qualitas difficilime elaiur.

De Bulbis.

BULBUS quoque eiusdem cum predictis est generis: mandatur enim ipsius radix sine folijs: Vere autem, interdum & alparagus. Facilitatem habet in se amarā & austeram, eamque insignem: unde etiam stomachum exoluit, ad appetentiam quodammodo excitat. Ceterū si bulbi elixi bis fuerint, magis quidem nutrit: utrum cum amarorem omnem iam deposuerint, aduersabunturque, quae sputo sunt eicienda. Quidam ex ipso rum etiam liberaliore, semen sibi inactum, scilicet ad uenietem alacriores manifeste senserunt. Alimentum porro dant mali fucci, nisi probe coquant.

De Pastinaca, Daucio, & Caro.

Pastinaca.

HORVM quoque radices mandantur: minus tamen quam rapae & arum Cyrenalicū nutriunt. Calefaciunt autē insigniter, aromaticumque non uisibile ostentant: conficiendi tamen difficultas non inest. Vrinam porro cienti: & si quis eis copiosius utatur, mediocriter uisiosum succum producit.

Caro.

Cari tamen tamen dixit melioris est fucci, quam pastinacae. Sunt qui pastinacam agrestem appellent daucum: qui urinas quidem mouet potentius, sed medicamentosior existit.

Daucus.

De Tuberibus.

Tubera.

HAEC quoque radicibus aut bulbis annumeranda sunt, ut quae nullam qualitatē habent insignem: crassum autem alimentum largiuntur.

De Fungis.

Fungi.

Bolici.

EX fungis quidem bolici, si bellē in aqua fuerint elixi, propē accedunt ad insipidos cibos. Alimentum autem ex ipsis est pituitosum, frigidum, prauis fucci. Omnium tamen huiusmodi noxii existunt. Secunda autem post hos, sunt amarantae. Reliquos uero omnes rursus et ne attingere quidem: multi enim ex ipsisurum esse interierunt. Ceterum oxymeli per se, & cum hyssopo & origano, quibus nitri spuma fuerit inspersa, si propinetur, auxiliaturque qui ex fungorum esse habent pessimē.

De Radicula.

Radicula facul-
tates.

RADIX eius ex ipsis est quibus assidue uescimur: estque obfouium magis quam alimentum: mirum quare & ipsa cum manifesta calefactione et attenuanda facultate fortitur: nam qualitas aeris in ipsa superat. Sed caulis eius elixus magis nutrit quam cruda radícula: paucissimum tamen & ipse alimentum praestat. Mirari autem subit eos medicos & idiotas, qui non sine multorum incommodo, post cenam crudas eas estandas tradunt.

De Cepis, Allijs, Porris, & Ampeloprasia.

CORPVS calefaciunt, & qui in ipso sunt humores crassos attenuant, lentosque incidunt. Si cocta autem bis tēue fuerint, acrimoniam quidem deponunt, tenuant tamen adhuc, & alimentum corpori dant paucissimum: quod certe priusquam elixa essent, omnino non dabant. Ceterum alium quidem mandunt non ut obfouium, sed ut salubre medicamentum, quod digerendi, & obstrukciones aperienti habet facultatem: quod si elixum parum fuerit, uires quidem imbecilliores, fucci autem prauitatem non

amplius retinet: quemadmodum nec porra, nec cepe, quum elixa bis fuerint. Ampeloprasia uero tantum a porris discedit, quantum in alijs omnibus congeneribus agrestia ad domesticis. Abstinent dum autem ab assiduō uisio acrimonia est, praecipue natura biliosa. Solis enim qui uel succum pituitosum, uel crudum & crassum ac lentum acruant, eiusmodi cibi expediunt.

Porra.

Cepa.

Ampeloprasia.

Acres cibi quibus
lentum acruant.

GAL. PERG. DE ALIMENTIS LIB. III.

De alimento quod a gressilibus animalibus sumitur.



ARTES animalium omnes non eadem facultate sunt praeditae: sed carnes quidem, cum probe elixae fuerint, optimum gignunt sanguinem, & potissimum, si ex animalium boni fucci fuerint, cuiusmodi est suum genus: nam partes nervosae, iusto sunt pituitosiores. Omnium itaque ciborum, suum caro potentissimē nutrit. At bubula, alimentum quidem & ipsa corpori ingerit non mediocriter, nec dissipari facili: sanguinem tamen gignit, quem conueniat, crassiores. Quod si quis naturali temperamento melancholicus magis fuerit, affectu aliquo melancholico prehenderetur, si largius ea uescatur. Affectus melancholici sunt, cancer, elephas, scabies, lepra, febres quartanae, & quae peculiari nomine melancholia nominatur. Lien autem quibuscumque tali succo intumuit: quam rem cachexia & hydropes sunt consecuti. Ceterum quantum carnes bubulae totius suae substantiae crassitie suillam superant, tantō suillae bubulae lentore antecedunt. Ut autem huiusmodi qui bono sunt corporis habitu, suae aetate florentes magis si porcelli congerantur, sic utili perfectis bobus, hordeis caprisque sunt praefrendi, ut pote quorum carnes multo facilius atque praestantius coquantur. Porro capra temperamento minus quam bos est sicca: si tamen sui & homini comparatur, multū superat. Suillae autē carnis similitudinē cum humana ex eo poteris intelligere, quod nonnulli carnes humanas pro suillis exhibitas ab hospitibus improbis, sine ulla in gustu uel olfactu suspitione comederint. Merito igitur porcelli alimentū nobis praebent tantū magnis suisbus excrementosis, quanto ipsis sunt humidiores: ac merito etiā minus nutrant. Nam alimentum humidius ut distribuitur, ita etiam discutitur longē celerius. At agni carnem habent humidissimā, pituitosissimā: ouis uero excrementosior est, ac deterioris succi. Caprarum quoque caro, praeter succū uitiosum, acrimoniam etiam fortitur. Hircorum autē, tum ad coquendum, tum ad succum bonum gignendum, est deteriora. Hanc sequitur arietum, post taurorum. Porro in ipsis carnes castratarum sunt praestantiores: quemadmodum sensu perspicitur. Ad haec caro leporum, sanguis quidem gignit crassiores, sed melioris fucci, quam bubulae ouillae. Cervina autem non minus huiusmodi uitiosum generat, & concoctu difficilē. Huiusmodi agnorum bene habitorum, ac iuuenū, caro est propinqua. Sunt tamen qui asinorum

Carnes elixae optimum gignunt sanguinem.

Nervosae partes iusto sunt pituitosiores.

Suilla caro omnino potentissimum nutrit.

Bubulae gignit re melancholicum sanguinem.

Melancholici affectus qui sunt.

Iuuenis aetate florentibus, iusto, uitalium, ac quae hircorum carnes congerantur.

Capra temperamento minus.

Suillae carnes est hominis similes.

Porcelli quale alimentum conbucent.

Alimentum humidius distribuitur celerius.

Agrius carnes, ouilla.

Caprilla.

Arietina.

Taurina.

Castroverum carum sunt praestantiores, ut suillum primum.

Leporina.

Cervina.

Asinaria.

domesticorum, ubi senuerint, carnes mandunt, quæ pefsimi succi sunt, concoctuiq; difficillimæ, atq; stomachi lædūt, etiā infuaves inter edendū: quemadmodū equorū & camelorū carnes, quibus & ipsi homines animo & corpore asinini cameliniq; uelcunt. Sunt quæ & uris, & itæ adhuc deterioribus, leonibus ac pardis uelcātur, semel aut bis elixantes. Vulpū autem carnisbus autumno apud nos uenatores uelcuntur: tunc siqui dem uasarū usu pinguēscunt. Porro animalia omnia, quibus alimenta propria affiatim suppetunt, longē seipsum in cibo præstantiora euadunt: quæ admodum deteriora fiunt, quibus ea minus ad sunt. Ceterum quæ assantes homines mandunt, aut in fartagine ingentes, ea corpori succidant alimentum: quæ uerò in aqua præcoquunt, humidus: quæ in patinis cōdiuntur, inter hæc media sunt: quanquam & illa ipsa pro modo condituræ inter se multū discrepant. Si quidem quæ unum aut garum habent copiosum, ea sunt alia quæ ipsa non habent, sicciora. Rursum quæ exigam quidem illorū portionem, aut sapæ etiam ampliorem habent, aut in simplici & plebio, alioq; appellato iure elixa sunt, ea prædictis longē sunt humidiora. Quæ autē in sola aqua coquuntur, ita quoq; adhuc humidiora existūt. Maximā præterea in preparatione discernim accidit, pro eorum quæ iniquiatur potentia: ut cum omnia siccant quidem, sed alia magis, alia minus. Sunt porro hæc ex seminibus quidem, anethū, apium, carum, labyticum, cumini. ex plantis, porrū, cepa, anethum, satureia, rhyum, pulegium, mentha odorata, origanū, & alia id genus pertinentia ad oboliatricam commentationem.

De limacibus.

LIMACES Græci omnes quotidie mandunt, carnem quidem duram habentes, eiq; cōcoctū difficilem, sed quæ cōfecta potentissimè nutriat. Succus autem ipse iuncti qui uentrem subducit: quæma modum & ips, quibus testa pro cute est. Quapropter quidam oleo, garo, uinoq; ipsos cōdientes, eo iusculo ad alium deiciendam utuntur. Huius porro animalis caro bis teriq; elixa, conditaiq; alium sistit, alimentumq; dat corpori minime contemnendum.

De animalium pedestrum partibus ex carnisbus.

EXTREMAE corporis partes, ut pinguedinis, ita substantiæ carnosæ habent minimū. Nervosa enim, hoc est, ligamentosa, & cutacea natura in ipsis præpollent: nō tamen tales hi nervi, cuiusue sint, quales in reliquo corpore: nam in excarnibus magis exercitatoræ sunt, eiq; magis lenta. Quare merito quidem corpus minus alunt: ob lentorē tamen facilius deiciunt per alium. Meliores autē sunt pedes suum quāuis rostrū: quæma modum hoc auribus est præstantius. Porcellorum pedes pefsanæ elixæ insectū, illam meliorē efficiunt, ipsi etiam meliores redditi: quare sic in ore & uentriculo melius elaborant. Quāto autem aliorum animalium carnes alimenn bonitate suilla sunt inferiores, tantō illorum partes excarnes partibus suū excarnibus sunt deteriores. De animalium pedestrum lingua.

PECULIARIIS quedam hinc parti substantia

domesticorum, ubi senuerint, carnes mandunt, quæ pefsimi succi sunt, concoctuiq; difficillimæ, atq; stomachi lædūt, etiā infuaves inter edendū: quemadmodū equorū & camelorū carnes, quibus & ipsi homines animo & corpore asinini cameliniq; uelcunt. Sunt quæ & uris, & itæ adhuc deterioribus, leonibus ac pardis uelcātur, semel aut bis elixantes. Vulpū autem carnisbus autumno apud nos uenatores uelcuntur: tunc siqui dem uasarū usu pinguēscunt. Porro animalia omnia, quibus alimenta propria affiatim suppetunt, longē seipsum in cibo præstantiora euadunt: quæ admodum deteriora fiunt, quibus ea minus ad sunt. Ceterum quæ assantes homines mandunt, aut in fartagine ingentes, ea corpori succidant alimentum: quæ uerò in aqua præcoquunt, humidus: quæ in patinis cōdiuntur, inter hæc media sunt: quanquam & illa ipsa pro modo condituræ inter se multū discrepant. Si quidem quæ unum aut garum habent copiosum, ea sunt alia quæ ipsa non habent, sicciora. Rursum quæ exigam quidem illorū portionem, aut sapæ etiam ampliorem habent, aut in simplici & plebio, alioq; appellato iure elixa sunt, ea prædictis longē sunt humidiora. Quæ autē in sola aqua coquuntur, ita quoq; adhuc humidiora existūt. Maximā præterea in preparatione discernim accidit, pro eorum quæ iniquiatur potentia: ut cum omnia siccant quidem, sed alia magis, alia minus. Sunt porro hæc ex seminibus quidem, anethū, apium, carum, labyticum, cumini. ex plantis, porrū, cepa, anethum, satureia, rhyum, pulegium, mentha odorata, origanū, & alia id genus pertinentia ad oboliatricam commentationem.

De limacibus.

LIMACES Græci omnes quotidie mandunt, carnem quidem duram habentes, eiq; cōcoctū difficilem, sed quæ cōfecta potentissimè nutriat. Succus autem ipse iuncti qui uentrem subducit: quæma modum & ips, quibus testa pro cute est. Quapropter quidam oleo, garo, uinoq; ipsos cōdientes, eo iusculo ad alium deiciendam utuntur. Huius porro animalis caro bis teriq; elixa, conditaiq; alium sistit, alimentumq; dat corpori minime contemnendum.

De animalium pedestrum partibus ex carnisbus.

EXTREMAE corporis partes, ut pinguedinis, ita substantiæ carnosæ habent minimū. Nervosa enim, hoc est, ligamentosa, & cutacea natura in ipsis præpollent: nō tamen tales hi nervi, cuiusue sint, quales in reliquo corpore: nam in excarnibus magis exercitatoræ sunt, eiq; magis lenta. Quare merito quidem corpus minus alunt: ob lentorē tamen facilius deiciunt per alium. Meliores autē sunt pedes suum quāuis rostrū: quæma modum hoc auribus est præstantius. Porcellorum pedes pefsanæ elixæ insectū, illam meliorē efficiunt, ipsi etiam meliores redditi: quare sic in ore & uentriculo melius elaborant. Quāto autem aliorum animalium carnes alimenn bonitate suilla sunt inferiores, tantō illorum partes excarnes partibus suū excarnibus sunt deteriores. De animalium pedestrum lingua.

PECULIARIIS quedam hinc parti substantia

ineit: carnem enim habet fungosiorē, ac sanguineam magna: eam tamen haudquaquam solam, sed cum musculari, glādulis, uenis, arteriis, & nervis (quæ illi communia sunt) exemptam, solent coquere & mandere.

De Glandulis.

QUANTVM lingua & carnis substantia, tantum glandulæ a lingue substantia recesserunt. Porro glandulæ quæ iuxta linguam consistunt, ad saluam generandam comparauit natura: ad cōficiendum autem lac, mamillares: ob idiq; post factum cōcoctum laxac, atque lacte replentur. Omnibus autem glandulis illud cōmune ineit, ut suaves in cibo, tribulesq; appareant. Ceterum mamillares, cum imbuæ sunt lacte, de ipsius etiam dulcedine aliquid præ se ferunt. Alimentum autem quod ex ita probè quidem in uentriculo cōcoctus prouenit, propè sanè ad carnium alimentum accedit. Quod si minus quidam par est sint cōfectæ, succum crudum aut pituitosum generant: humidiores quidem pituitosum, duriores uerò crudum.

De testibus.

TESTES autem, cum ex genere sint glandularum, non perinde tamen sunt laudabiles succi ut mamillares: sed habent uirosam quiddam, seminis, quod in se generant, naturam referentes, ceu renes urinae. Animalium gressilium testes, concocti sunt longē difficiliores. Nam testes gallinæcorū altitium & suauissimi sunt, & laudabile corpori alimentū præbent. Renes admodū prauus sunt succi, & concocti difficiles, ut adultorū animalium testes. Iuniorū quippe sunt præstantiores. Porro raurorum, hircorum & carietum insuauis succi & mali succi, concoctuiq; difficiles. Sues quidem apud nos execat, quod uidelicet castratorum caro suauior sit, & alimentis plenioris, concoctuiq; facilior: boues autem, ut multo melius eis ad agriculaturam utantur, cum non facile tauri domentur. Capræ autem & oues, propter utrumq; usum castrantur. Ceterum omnes memoratorum animalium testes, cōcoctioni resistent, ac mali sunt succi: nutriunt tamen, si bellè cōficiantur. Quāto autem suum caro alia præstantior est, tantō horum quoque testes, aliorum animalium testibus sunt meliores. Solum autem gallorum gallinæcorum unde quæque sunt præstantissimi, & potissimum eorum qui saginati fuerint.

De cerebro.

CEREBRVM omne cibus est pituitosior, crassiusq; succi, & tardè permans, atq; ad cōctionem difficilis: nec minimū lēgit uentriculū. Excitat præterea nauisē, omninoiq; uomitori est accommodatius, si concinnatū cum incidentibus & calefactibus fuerit. Si tamen rectè concoqui possit, alimentum corpori præstat ut nō contemnendum.

De osium medulla.

HÆC cerebro est dulcior, iucundior & pinguior, nauicamq; prouocat, si liberalis sumat: nutrit tamen & ipsa, si cōficiatur probè.

De spinali medulla.

SPINALIS medulla (quæ perperam medulla appellat) cerebro cōtinua, eisdemq; cum eo nature existit: nisi quod ipso multo est durior, potissimum

Glandulae linguae, quæ maxime sunt salivæ.

Glandulae mammae, quæ lacte repleantur.

Testes esse ex genere glandularum.

Testes gallinæcorum præstantissimi corpori alimentum laudabile. Renes prauus succi sunt.

Testes autem mali sunt succi.

Capræ autem carnes suauiores, et facillime digeruntur.

Solum carum ossium præstantissimum.

Gallorū testis.

Cerebrum nauisem erorat. Cerebrum quæle alimentum præstat.

Medulla osium.

Spinalis medulla.

Equina carnis.
Camelina.
Vulpina.
Leonina.
Pardalis.
Vulpina.

Alia fructus sunt, quæ quædam elixant, alia autem alimunt corpus.

Garum.

Alumina.

Cōdiuntur in genera quatuor.

Limacis.

Limacis carnis substantia.

Limacis caro bis elixa, alium sistit.

Extrema membra minus alunt, sed deiciuntur promptius.

Porcellorum pedes pefsanæ elixæ insectū, illam meliorē efficiunt.

Lingua carnis.

tissimū in infernis spinæ finibus. Quāto enim a cerebro abscedit, tantū magis duret. Pinguitudinis præterea habet minimum, quo fit, ut nauseam non prouocet: ac si probè conficiatur, non exiguum corpori alimentum suggerit.

De pinguedine & adipe.

PINGVEDO, humida quæpiæ res est, oleo longè uetustate in crassatū assimilis: adeps uerò pinguitudine multo est ficior, idcirco fuscus concretus facit. Pauci utraq; est nutriti, potiusq; carniū non aletium sunt cōdimenta, q̃ alimenta.

De pedetibus animalium uisceribus.

OMNIVM quidē animalū iecur crassū est succi, ac ad coquendū difficile, tardè permear. Omnium autē est præstantissimū, nō modò ad uoluptatem, sed ad alia omnia, quod ex caricarū esu optimè præparatū fuerit. At lien gustū est suauissimus: in eo tamen reperit perspicua quædā acerbitas. Merito etiā prauū succi esse creditur, ut qui sanguinē melancholicū gignat. Vtrog uerò tantò pulmo facilius coquit, quāto est rarior. Multo tamen quod ad nutriendū attinet, est hepatis inferior. Pitustosius autem est alimentū quod exhibet. Cor substantia difficle caro est fibrosa ac dura, ideoq; concoctū quidē: & tardè permear. Si tamen probè conficiatur, alimentū corpori dat ut non paucum, ita nec mali succi.

De quadrupedum animalium uentriculo, iuero, & intestinis.

DVCTORES caribus sunt hæ partes: ob id, etiam si ritè conficiantur, succum tamen gignūt non planè sanguineum, sed frigidiorem, atq; crudiorē. Proinde multūm temporis postulant, priusquā sitis confici queant.

De agrestium ac domesticorum animalium differentia.

DOMESTICA animalia, temperie humidiora sunt q̃ agrestia, tum ob æris in quo degunt, humiditatem, tum ob uitæ ignauiam. Caro eorū q̃ in montibus degit, ob cōtrarias causas est durior, nullusq; propter pinguedinis, aut paucissimæ participis. Ob id pluribus diebus q̃ domesticorum, impetris seruat: alimentūq; exhibet minus excrementis, eo quod a domesticis funtut: ac proinde & nutrit ualentius, & succum gignit meliorem.

De lacte.

LACTE boum crassissimū ac pinguisimū est: liquidissimū ac minimè pingue, camelorū: mox equarum: deinde asinarū: mediz autem consistenter est caprarū: hoc crassius, ouium. Secundūm autem anni tempora, lac post partū est liquidissimum. Tempora uerò progressū, magis semper ac magis crassescit. At media ætate, ipsum etiā in lux naturæ medio consistit. Post id autē tempus, sensim iam crassescit, quoad penitus deficiat: sed Vere, ut liquidissimum, ita copiosissimū est. Porro liquidissimum lac, serum: crassissimū, caseum habet plurimum. Merito igitur liquidus quidem lac, magis: crassius autem, minus aluum subducit. Quinetiam lac quod ignitis lapillis, aut orbiculos ferreos extinxerit, & uentrem sistit, & ipsa auxiliatur, quibus uenter acrium excrementorū moria infestatur. Facile tamen sic paratum lac in uentriculo cogitur: ob idq; mel illi, & salem, adficimus: sicuti & aquam etiā, quæ feri

acrimoniam corrigit. Constat siquidem lac omnino ex contrarijs substantijs, sero scilicet, caseo, & pinguitudine, ex qua butyrum constat: quo in frigidis pleriq; regionibus, pro oleo utuntur. Cuius pinguis succi asinū lac habet minimū.

Quo circa rarū alci in uentriculo cogitur, si statim ut mammis excidit, calidum fuerit epotum. Quod si sal & mel adijciantur, fieri nō potest, ut ipsum in uentriculo coaguletur. Eandem ob causam magis per aluū deijciat, ut quod serū multum habet, a quo lac omne facultatē accipit deijciendi, un à caseosa substantia sistendi. Quare plurimo sero ad deijciendū aluum usi sunt ueteres. Cui quidem tantūm mellis optimi & salis est adijciendū, quāntū suæ circa stomachi euerfionem sentitur. Porro inter omnia quæ mandimus, lac optimū, optimi succi est. Nam quod uisiosum exiit, prauo fuceo utentium corpora replet. Quod si capræ, aut alterius animalis, scamoniū nistymalūm deapit, lac cibi loco quiescumpserit, omnino a luæ ei fuit. Lac igitur quod feri habet plurimū, etiam si semper eo utaris, nihil penitus periculi adferet. Quod uerò huiusmodi humiditatem habet exiguam, caseosam autē crassitatem multam, eos quidem offendit, qui calculis generandis sunt prompti: icterūq; obstruit ijs, qui hoc affectū facile prehensibiles possunt.

Totius autē ac pulmonis partibus lac omne est utile. Capiti uerò, nisi qui ipsum habet admodum firmum, non est accōmodum: ut neq; hypochondrijs, quæ leui de causa instantur: plurimū siquidem in uentriculo in flatus uertitur. Si uerò cum aliquo eorum cibariū, quæ crassi sunt succi, diutius elixum fuerit, statuosam quidem naturam deponit, sed iecur magis obstruit, & promptius calculos in rebus gignit. Illud igitur lac bouū fucū & multi alimenti exiit, quod ex contrarijs substantijs & facultatibus constat, subducendi scilicet, ac sistendi, obstruendi ac retinendi. Nocet autem ipsius usus asiduos tam dentibus, tum gingiuis: has quippe humiditas, dentes putrefactioni red dit obnoxios. Cæterū occurres huic malo, si aut diluto, aut mero uino, cui nōnilul mellis permixtum sit, aut primò quidem melicrato, dein uerò astringente uino, sumpto lacte, eo ipsum collueris.

De oxygala, hoc est, acido lacte.

DENTES qui secundum naturam habent, nihil offēdunt: eos autē lædunt, qui iusto frigidiore exiit. Iam uerò uentriculus quauis de causa frigidiore, oxygala non bellè cōcoquit: temperatus uerò, quamuis ægrè, conficit tamen id aliquando. Contrā, uentriculi calidiore, præter q̃ quod nihil ab huiusmodi eduljs læduntur, aliquo etiam fruuntur cōmodo. Pro diuersa autem uentriculorum natura accidit, ut lac ipsum interdum acceat. Siquidem calor is inopia, in acriorem eiusdem excessus, in nidorem & fumum uertit. Porro oxygala est in uentriculo non coquatur, nunquam tamen in nidorem conuertitur, potissimum si in feruentissimum ac biliosissimū uentriculū incidat. Est autē natura tum frigidā, tum crassi succi: quare nō facile à modice naturæ corpore concoctionē suscipit. Quinetiam cōsentaneum est trūdē succū à cibus huiusmodi gignit,

Lac ex quibus substantijs constat.

Lac asinū rariū alci in uentriculo.

Lac asinū habet plurimum substantia ferrosa.

Sero uisiosum repleat ad deijciendū aluū.

Lac optimū optimi succi est.

Lac uisiosum feruū, obstruit uentrem.

Lac admodum caseosum quibus nocet.

Lac omne est utile potiori.

Lac quibus non erat.

Lac optimū quale.

Lac nocet dentibus gingiuis.

Lactis uicem quo corrigenet.

Oxygala quibus cōueniunt, aut nocent.

Lac quibus mo-
do fundatur.

Lactis partes
que magis, &
que minores.

Cafus inco-
ratus calculus
ignit.
Calculus à quib.
causis ignitur.

Oxygalactum
causum esse om-
nium causerum
optimam.

Andris casus.
Cafurum qui
profertur.

Sanguis omnis
est conuulsio dis-
ficta.

Suilla carnis ni-
hil uicinis as-
piciat.
Volucrum car-
nes que facili-
ter et qua agrius co-
quantur.

Phasianorum
caro.

Non ab re autem edulij hoc calidissimis est uen-
triculis utile: quemadmodum frigidioribus ad-
uersissimū. At partes ipsius lactis, citra coagulū,
etiam cissio, quam uocant, discernit, cūm lacti
abundē calido oxymel frigidū instillamus. Idem
etiam multo efficacius. Interdum citra ullam li-
quoris instillationē, uase frigidissimā aquam ha-
bente, in lac demisso, ipsum scindimus. Præterea
sine coagulo id lac, quod post editum fortū emul-
sum fuerit, cōcrefcit protinus, si super cineres ca-
lidos pariter caleat. Nutrit autē uberius ex lac-
te id quod conuētit est: parcius uerō, quod se-
rosum existit. Cæterū quod lac à partu concre-
scens, nihil recipit mellis, concoctū quidē est dis-
ficilius, atq; succi crassioris: præterea per aluum
tardius secedit, corpus tamen abundē nutrit.

De Calco.

DUM caseus cōficitur, assumit ab iniecto coa-
gulo acrimoniam quandam, humiditatemq; om-
nem deponit, & potissimū si inuenterauerit: tunc
enim quā prius, longē acrior euadit, ac manife-
stē calidior, atq; ardentior redditur: ob idq; ip-
sum, siniculosior, & difficilior concoctū, & peio-
ris succi efficitur: ac proinde calculus est generan-
dis. Vbi enim succorū crassities cum ardenti ca-
lore iungitur, illic calculi generatur. Itaq; caseus
id genus, omniū ad omnia est pessimus. Deinceps
autem malius quidem, sed prædicto minus
putandus est, qui neq; est uetus, neq; acris. Om-
nium autem caseorum rectum, præstantissi-
mus is habetur, qui à nostris incolis oxygalacti-
cus dicitur, suauissimus quidem in cibo, stom-
acho autē minimē noxiū, alijq; omnibus casus
cōcoctū transiitque faciliōr: succum habens nō ni-
tiosum, neq; infusque deo crassum. Præstantissimus
etiam est is, quē Romani *Andris* appellant. In uni-
uersum autē, mollior caseus durior est præstan-
tior: rarus uerō ac laxus, densō admodum, & cō-
pacto. Tam uerō cūm glutinosus ualde, & is qui
ad asperitatem usq; est friabilis, sint uictiois, præstan-
tior est qui inter hos duos est medius. Quid au-
tem ad gustū pertinet, is omniū est præstantissi-
mus, qui nullā uehementē obtnet qualitatē, sed
dulcem habet supra alias parum emiuentē. Ru-
ctū etiā, cuius qualitas paulatim marcescit, præ-
stantior: cuius contrā perdurat, non bonus.

De pedestrilium animalium sanguine.

SANGVIS omnis concoctū est difficilis, præci-
pue crassus & melancholicus, qualis bobus &
apris inest. Leporinus autem, caprinusq;, ut su-
uissimi celebrantur.

De alimento quod à uolucris ani-
malibus sumitur.

AVIVM omniū uolucrum genus paucissi-
mum præstat alimentū, si ad genus gressuū con-
feratur: potissimū si ad suillam, qua nō aliud in-
uenias, quod copiosior sit nutrimenti. Volu-
crum tamen caro concoctū faciliōr est, præci-
pue perdix, attagenis, columbe, galli gallinacē
& gallinæ. Turdorum uerō & merulariū, minu-
torumq; passerulorum caro, quā prædictorum,
est durior. His autē ipsis, turture, palumbi, anas-
tisq; caro etiam durior existit. At phasianorum
caro, quod ad concoctionem & nutrimentū atti-
net, carni gallinarū est similis: uoluptate tamen

in edendo eam superat. His durior est pauonum
caro, & fibrosior, & difficilior concoctū. In uni-
uersum autem, augescientium ætate: media uerō
est inter utraq;, florentium. Præterea autem admo-
dum est nouellus, sed diuersa ratione ac senum.
Siquidem horum caro, dura est & sicca, ac neruo-
sa, ideoq; concoctū difficilis, & nutrimenti exi-
gui: contrā animalium ueterum ætate duriorē cor-
pora, mucosa sunt ac humida, eoq; excrementis
plena: facilius tamen per aluum descendunt. Secun-
dum etiam preparationis modos, & locos
in quibus ipsa animalia uiuunt, non mediocri
eorum est differentia.

De anseribus & struthocamelis.

CARO horum excrementaria existit, multoq;
difficilior concoctū, quā prædictorum uolu-
crum. Ipsorum tamen alæ, non sunt cæterorum
alis deteriores: quandoquidem in multis, alarū
substantia fibrosa est & dura. Quarundam autē
caro, rata est eiusmodi, cuiusmodi gruum: quas
tamen & ipsas mandunt, plurimis ante diebus
macerantes & mortificantes. Inter grues & an-
seres, caro tardarum est media.

De differentia quæ est in partibus anima-
lium uolucrum.

NON manduntur intestina uolucrum: uentri-
culi autem & uesci sunt, & nutriunt. Quidam au-
tem ipsorum ualde etiam sunt uicundi, ceu anse-
rum: secundum quos, sunt alitium gallinarum.
Ad hæc anserum quibus lac in alimentis misce-
tur, ideo est uicundissimū, atq; potenter nutrit:
& cūm sit optimi succi, dicitur facile, probeq; in
uentre conuocatur. Ad hæc alæ anserum, & his
adhuc magis gallinarum, minimo negotio co-
quuntur. Pedes autem paulo minus omniū, ci-
bo sunt iuepti. Cæterū iuniorum & probē nu-
tritiorum caro, gracilium carni atq; anserum
præstat. Gallorum testes, præcipue alitium, præ-
stantissimi sunt, & multo magis, si cibis ipsorū,
quo sunt nutriti, seroso lactē fuerit imbutus. Por-
ro uolucra, exiguum quidem habent cerebrū:
ipsum tamen taurō pedestrium cerebro præstan-
tius est, quanto durius. Ac montana sanē, quā
palustria, cerebrum habent præstantius.

De Ouis.

GALLINARVM & phasianorum oua, omni-
bus sunt præstantiora: deteriora autem anserum
& struthocamelorum. Porro quæ oua dicuntur
tremula, ad nutriendum omniū sunt præstantissi-
ma. Sorbilia autem, minus quidem nutriunt,
sed subducuntur facilius, & pharyngis asperitas
laugant. Cocta uerō, & ad coquendum suat
difficilia, & tardī transitus, corporis crassius ali-
mentum largiuntur. His autē tardius permancet,
& crassioris sunt succi, quæ in calidis affantur ci-
neribus. Quæ uerō in fartagine sunt inspissata,
pessimum habent modis omnibus alimentum.
Porro quæ suffocata appellant, sunt elixia atq;
æsis meliora. parantur autem ad hunc modum:
Vbi enim ipsa oleo & garo, & pauco uini cōspersa
fuerint, uas quo cōtinentur, cacabo aquam ca-
lidam habenti indunt. Deinde ubi ipsum rotum
superne obstruxerint, ignem subtrahit, quoad oua
mediocrem consistentiam sortiantur.

De

Pauonum caro.

Cernis differtur
traficanda etia
ten.

Anserum caro.

Struthocamelorum
caro.

Gruium caro.

Tardarum caro.

Anserum uen-
triculi esse suau-
issimos.

Anserum hepatis
uicini conuocantur.

Alæ anserum,
gallinarumq;.

Testes gallinæ.

Cerebrū anserum.

Ouorum differtur.

Oua tremula.

Oua sorbilia.

Oua cocta.

Oua affa in ci-
neribus.

Oua fixa.

Oua suffocata
parandi modum.

Sanguis gallinae

Columbarum.

Leporina.

Sanguis omnis
excrementarius.

Mugilum caro.

Piscium carnis
differentia. pro
dignitate loci
in quibus de-
gunt. & diversa
sunt quibus ve-
funtur.Piscium quae mol-
lioribus sunt
non abundat, &
qui minime.Marrinae pisces
omnes gaudere
sanguine.Mugil conditus
sale affertur.Lupus.
Laurax.Trigla.
Mullus caro.Pinguia cibaria
appropinquat acri-
tati.

Mullus hepatis.

De uolucrum animalium sanguine.
GALLINARVM & columbarū sanguine nō-
nulli uescuntur, maxime altilib: qui suum sangui-
nem hauriunt inferior est, neq^{ue} suauitate, neq^{ue}
concoctionis facilitate. Plurimū tamen à lepori-
no relinquitur. Ceterum sanguis omnis conco-
ctu est difficilis & excrementarius.

De nutrimento quod ab aquatilibus ani-
malibus sumitur: & primum
de Mugile.

MUGILIS ex squamarum piscium sunt ge-
nere. Verū eorū caro, qui in aquis limosis, for-
didis & stagnantibus degunt, excrementaria ad-
modum atq^{ue} mucosa existit. Optima autē eorum
est, qui in puro mari uiuunt, praecipue cum uen-
torum procellis ipsum mare agitur, atque ad
Boream spectat. Nam in quieto, nullisq^{ue} agitur
fluctibus, tantū piscium caro deterius sit, quan-
tū minus exercitatur. Eorum autem qui in flu-
uijs gignuntur, praestantiores sunt, qui in ip-
sīs gignuntur, in quibus aqua rapidē fluit, & copio-
sa. Qui uerō in stagnantibus, nō laudabiles. Prae-
terea penes alimenta ipsa pisces meliores peno-
reus euadit. Etenim qui in fluminibus urbem
magnam praeterfluentibus, hominum sterco-
ribus, & prauis id genus cecis uiscerant, omnī de-
terrimi sunt. Porro qui mugil in mari gignitur,
is à mari longissimē abdicendus, aduerso flumine
natar, numerosissiq^{ue} ac paruas spinas non habet.
Qui uerō à fluuijs ingreditur mare, hu-
iusmodi spinarū est plenus. Nam omnī ferē pi-
scium caro, qui in stagnis aut fluminibus crescit,
tenuibus spinis plena inuenitur, quas nullus ma-
rinorū habet. Pauci autem fluuiālū mare ingre-
duntur: at marini omnes, fluuijs gaudent. Mu-
gilis praestantioris caro est iucundior & acrior,
nec non expers pinguedinis. Nam pingues, & so-
lus saporis, & uulsi sunt succi. Quapropter eos
cum origano preparant. Hic piscis unus eorum
est, qui conditi sale affertur.

De Lupo seu Laurace.

HVC piscem natum in aquis dulcibus non
uidimus, sed ē mari in flumina aut stagna, ipsum
ascendisse cōspeximus. adeoq^{ue} paruus rarō, quē
admodum mugil sepe inuenitur. Alimentū sanē
quod tum ex hoc, tum ex alijs piscibus prouenit,
sanguinem gignit cōsistentia tenuiorem, quā
quod ex pedestribus animalibus sumitur: adeo
ut nō assuetur nutrit, & discitatur celerius.

De Mullo seu Trigla.

Hic quoq^{ue} pelagicus piscibus annumerat: ha-
betq^{ue} aliorum ferme omnī carnem durissimā,
& ualde friabilē. Ac nutrit sanē cum probē con-
fectus fuerit, copiosis omnibus alijs piscibus,
quod durior & crassiorum partium existat, ha-
beatq^{ue} substantiam alendo corpori accommoda-
ram. Quare mulla caro iucunda est: quae quidem
licet aliorum carne sit durior, mandū tamen quo
ridie potest, propterea quod friabilis est, & pin-
guedinis expers, cū quadā acrimonia. Nam pin-
guia & lenia cibaria statim ut sumpta fuerint, ce-
lester implent, & appetentiā euerit. Mulla etiā
hepar propter uoluptatē à gulosis summo pere-
peti. Opini autē mulla frūt, ut aliq^{ue} etiā omnes
pisces, cū propter mare purū, tum uel maxime
propter alimenta.

De piscibus saxatilibus.

SCARVVS, merulam, turdum, iuliam, fucam,
percam, à petrosis promotorijs maris, in quibus
competunt uersari, saxatiles appellantur. Inter
eos autē scarus excellere suauitate creditur. Se-
cundū hunc, merula, ac turdi. Terno loco iu-
lia, fux, ac perca. Porro alimentū quod ex eis
sumitur, nō modō concoctu est facile, sed homi-
num etiā corporibus saluberrimū, ut quod san-
guinem medium consistētia generet.

De Gobione.

GOBIO littoralis est piscis, ex numero etiā eo-
rum, qui parui perpetuū manent. Praestantissi-
mus autē omnū ad uoluptatē, coctionē, distri-
butionem, ac deniq^{ue} succi bonitate in est, qui in
arenosis litronibus, aut saxosis promotorijs degit.
Ceterū gobiorum caro, ut carne saxatiliū
est durior, ita mollior quā mullorū. Ipsa igitur
pro portione, uescitū corpus nutrit.

De piscibus molli carne praeditis.

SCARVVS itaque primas inter pisces saxatiles
obtinere: quibus omnibus caro inest quā alijs
piscibus mollior & friabilior. Sunt qui carnis tan-
tum durie à saxatilibus discedunt, cuiusmodi
sunt pelagicus propemodum omnes: nisi si qui
ipsorum prauo alimento propriam carnem cor-
rumpant, ut mullus, qui cancellos, animalia fluui-
colore, minimis canceris similia, mandunt. Porro
saxatiles pisces, nec loca, nec alimenta manant,
nec dulcibus aquis utuntur: ob eamq^{ue} causam
omnes perpetuū sunt inculpati. At acelli dicit, si
probo alimento urantur, & mari puro, carnis bo-
nitate contendunt cum saxatilibus. Qui uerō
prauo alimento utuntur, aut in aquis mistis, aut
in uolosis uersantur, carnis quidem uon abiciunt
molliem, sed & pinguitudinem atq^{ue} lentore con-
trahunt. Quare neque suasus petiunt, sed ali-
mentum excrementū reddunt. In uniuersum
autem, pessimi pisces gignuntur in eorum flu-
uiorū ostijs, quae purgamenta cuiusq^{ue} ciuitatis
magna recipiunt. Idcirco in eiusmodi fluuijs
ram ostijs (qualis est Romae praeterfluens Ty-
beris) murena pessima gignitur: eoq^{ue} in ea urbe
omniū ferē marinorū piscium ea minimo uendi-
tur, cum tamē meliores sint eius fluminis pisces,
priusquā is ad urbem perueniat. Quin & alius e-
tiam est fluuius, trecētis & quinquaginta stadijs
ab urbe in Tyberim profluens, Nar appellatus,
qui pisces habet longe Tyberinis meliores. Simi-
les autem quodammodo inter se sunt, passer &
solea: non tamen omnino eiusdem sunt speciei.
Solea namq^{ue} mollior est, & cibo suauior, atque in
totum praestantior quā passer. Quin & lacerti
medij quodammodo sunt inter pisces carnis mol-
lis & duri. Nullus tamen memoratorū piscium,
aceto, aut sinapi, aut origano indiget: uel nō pin-
gues, lenti, atq^{ue} duri. Quidam etiam frixis nō in
istagine aluntur. alij assant, aut in patinis con-
diunt, ut rhombos, & citharos. Optime autē om-
nium condimentum ex albo iure concoquitur,
quod in hunc modū paratur. Copiosā aquam
primum inauce: dein olei quod satis sit assun-
dito, cum panno anethi, & porri. Vbi uerō pi-
sces semicocci fuerint, salis tantum aspergitur,
quoad rotum usq^{ue} salum nōdum appareat, Hac

Saxatiles pisces
inde ducuntur.Saxatiles pisces
praeter alimen-
tum saluberrimū
sunt torpescunt.Gobiorum
caro.

Scarus.

Mullus.
Cancellos.Tyberis pessimi
ubi lacera gignit-
ur.

Tyberis.

Murenam Roma
praeterfluens Ty-
beris marinarū pi-
scium minime
uendit.Nar flumen, pro
ducere pisces lon-
ge Tyberem mel-
liores.
Passer.
Solea.
Lacerta.Albi iuri conditū
murenam

siquidem præparatio uel ægrotis ipsis est cõmo-
da. Quibus autem inculcata sanitas est, ipsi pi-
scium in sanguine frictorum, secundo loco super
craticula afforum, præparatio est conueniens.
Hæc tamen, oleum garumq; cum pauco uino ex-
ponitur. At frigus, plus uini, garum addere expedit,
minimè uerò olei. Quod si cui id subuertat sto-
machum, paratum habet acetum, modicum in
se gari, pipereq; continens. Omnium autem me-
moratorum piscium alimentum, hominibus o-
ciosis, senibus, imbecillis, & ægrotis est accõ-
modatissimum. Qui uerò corpus exercent, ci-
bos firmiores postulant.

De piscibus duræ carnis.

*Pisces dura car-
no qui sunt.*

Galecia.

Cavus piscis.

Salma.

Delphinus.
Ploca.

*Thunnus salis-
cus, eadem me-
ta recentior.*

Serda. Myli.
Pelamides.
Graculus.

*Mollia faci-
lius alterantur.*

*Durissimi om-
nium, quoniam
coquuntur, sim-
per salis eua-
dere.*

*Omnia que de-
coquuntur, pro-
pria qualita-
tem amittere, a-
quam autem, si
lam in se recipi-
re.*

Praxagoras.
Philometus.

DRACONES quidem, libellæ, cuculi, scorpius,
trachurus, nullus, cernua, glaucus, conger, pa-
ger, liamya, & aquila, inter duræ carnis pisces an-
numerantur: nonnulliq; mustelorum species.
Nam celeberrime illi apud Romanos galecia di-
citur, in eorum numero, qui dura carne con-
stant, habetur. At canis ad cetaceorum genus re-
fertur, ut qui carnem duram habeat, atque ex-
crementitiam. Quapropter ipso in partes secto
& salito, uescuntur uulgares homines. Ingrati e-
nim saporis est, ac mucosus: ideoq; cum sinapi &
oxelxo, atq; id genus acribus comidentis eum
mandunt. Ex hoc item genere sunt balæna, del-
phini, & ploce: ad quos proximè magni thuni
accedunt: quanquàm nō aequè sunt ut prædicti,
iucundi. Insuauis enim sunt hi, præsertim recen-
tes: nam salsi euadit meliores. Thunnos autè ca-
ro, qui & ætare & corporis mole sunt minores,
nō perinde dura est, ideoq; hi facilius etiã coqui-
tur: & ipsi adhuc magis pelamides, quæ fide cõdi-
tæ, laudatissimis salamentis nō cedunt. Post ha-
das autè & pelamides, myli qui ex Ponto afferun-
tur, præcipuè cõmendantur. Post ipsos sunt gra-
culi. Porro duræ carnis pisces, ægrotis quàm mol-
lis concoquantur. Siquidem quæ molliora sunt, fa-
cilius alterantur, quod facilius patitur. Durior
enim cibus crassiorè habet substantiã, ut mollior
tenuiorè: ac proinde ille succi crassiorè gignit.

An dura omnia per decoctionem salios
succos gignant, ut Praxagoras &
Philometus existimant.

EQVIVDAM omnium decoctum, quandiu coqui-
tur, falsius semper euadere, post autem, amarum,
deprehendo. Nam corpus ipsum solidum quod
in aqua elixatur, qualitates quæ initio sibi in-
erant, in ea deponit, sic ut qualitates expers eua-
dat. Clarius autem huiusce rei ueritatem intelli-
ges, si quando quod elixat, in aliam aquã trans-
fusum, secundo & tertio recoquant. Inuenies quip-
pe id quod decoquitur, propriã amisisse qualita-
tem, siue falsum, siue acrem, siue etiam acerbam:
aquam autem, eam in se recipere. Si uerò succos
ipsos solos concoxeris, primum quidem saliores,
postea autè amari etiam fient. Siquidem uel ipsa
aqua optima diutius cocta, falsam qualitatẽ ran-
dem assumit. Quamobrem, quod ad succos atti-
net, Praxagoras ac Philometus rectè sentiunt, no-
bis est concedendum: quod uerò ad solida cor-
pora pertinet, non item.

De animalibus quibus testa præ cute est.

OMNIBUS id genus piscibus cõmune est, ut

falsum in carne succum continent, qui alium
subducit: quod scorum cuiq; magis minisue in-
est, pro qualitate & quantitate ratione. Siqui-
dem ostrea, inter alia testacea, carnẽ habent mol-
lissimam: parux autem hiatule, uertebra, un-
gues, purpura, buccina, omniaq; eiusmodi, du-
ram. Non ab re igitur ostrea quidem, alium ua-
lenius subducunt, corpus autem imbecillius a-
lunt. Duriora uerò, difficilior quidem conquantur,
sed firmiora sunt nutritiõni. Verò hæc quæ om-
nia elixant. Ostrea uerò etiã citra elixationẽ mã-
duntur. Sunt qui ea in sanguine frigrant. Quem-
admodum autè ex ipsis testaceis, quæ dura sunt,
carnem habent concoctũ difficiliorẽ, sic etiam
quæ corruptatæ ægrè. Quare ipsa his recte co-
cta, eis exhibemus, quibus ob prauos succos ci-
bi in uentriculo corruptuntur: gignitur tamen
ex ipsis succus crudus plurimus, ut ex his quæ
molli sunt carne, pinuita.

De Crustatis.

ASTACI, paguri, cancri, locustæ, caridæ, gam-
mari, atque id genus alia, tenui testã concludun-
tur, duritiq; sunt testaceis similis: sed falsi humo-
ris minus quàm illa continent, quanquam cum
habent satis multum. Dura in totum carne con-
stant: ideoq; & concoctũ sunt difficilia, & firmi
alimenti, quum scilicet in aqua potulenta per-
cocta fuerint. Horum quoq; caro, ut ostreorum,
ubi percocta, ut dictum est, in aqua succum fal-
sum reliquit, alium sicut: ægrè etiam corrup-
puntur, non secus ac testacea, quæ duram car-
nem possident.

De mollibus.

MOLLIA uocantur, quæ neq; squamas, neq;
asperã cutem, aut testaceam habent, sed mollem:
ut polypi, sepiæ, loliginæ, & liis consimilia: quæ
omnia mollia tangenti apparent, duræ tamen
sunt carnis, & difficilia cõcoctũ, exiguumq; in se
succum falsum continent. Cæterũ si concoquan-
tur, alimentum exhibebunt non paucum corpo-
ri: succa tamen crudi plurimum gignent.

De Carnagineis.

HOVM animalium cuius est aspera, ac no-
tũ splendicans. Inter ea autem torpido & passi-
tata carnem habent mollem atq; iucundam, cetæ
mediocriter per uentrem subeunt, nec conco-
ctũ difficile. Nutritum item mediocriter. Rasa
autem, leuissima, squarrosa, omniaq; huiusmodi,
duriora sunt, & concoctũ difficiliora, alimentumq;
copiosioris, quàm torpido & passinaca.

De Ceraceis animalibus.

OMNIA eiusmodi duram & prauũ succi, ex-
crementitiamq; habent carnem.

De Echinis marinis.

EX multis eduntur hi & garo, alui subducen-
de gratia: pariturg in patinis, ouis, piper e, mel-
leiq; iniectis. Imbecillis sunt alimenti, ac mediũ in
ter ea quæ humores extenuant & densant.

De Melle.

MEL oritur in folijs plantarum, eiusdem cum
rore generis. Porro in monte Libano quotan-
nis persephe coria super terram extendunt, ac dein
arbores excurrentes, quod ab eis desinit, exci-
piunt, & ollas ac fictiles melle implent: uocantq;
id mel rosidum, & æreum. Proinde conitar
materiam

*Testaceis, fa-
cum alium sub-
ducere.*

Ostrea.

*Ostrea elixant
cruda.*

*Testacea dura
carum quibus
conferant.*

Crustacea.

*Mollia con-
stituta.*

Cerastagone.

Torpido.
Passinaca.

Rasa.

Cetacea.

Echini marini.

Mel.
*Macina reliq;
applicata etiam.*

Mel rosidum.
Mel æreum.

materiam ex qua mel gignitur, rori esse congere-
re. Videtur autem & ex plantis, in quarum fo-
lis colligitur, boni malive quodpiam ipsi accede-
re. Ideoq; landarissimū in locis mel gignitur, in
quibus rhythus, & alix quedam herbe & fruti-
ces temperamento calido & sicco, astatim proue-
niant. Tenuiorū enim est partium id mel: Ideoq;
in calidis corporibus promptē in bilem conuer-
titur. Frigidis uerō est accommodatissimum. Cum
autem tenuium sit partium, acrimonie quiddam
habeat etiam necesse est, qua aliud ad excretio-
nem proritet. Quam quidem adimentes per inie-
ctionem aquæ, atque coctionem, ipsum redde-
mus ad distributionem atq; concoctionem ac-
commodatius. At melicratum quod paulisper aut
nihil omnino concoctum fuerit, prius dēgitur,
quā concoctū, & in corpus distribui, & nutri-
re possit. Præterea mel nō plane coctum, in ven-
triculo & intestinis statim quosdam gignit: con-
trā quod in decoctione spumam omniē abieci-
rit, statim est expertus, & urinam mouet. Quid si
quis citra aquæ admitionē mel solum delingat,
nutrit quidem infirmum, sed alui promptus de-
hicet. Largius uerō sumptū, ventrē superiore ēdi-
tare ad uomitū solet. Coctum autē sine aqua,
neq; uomitū similiter mouet, neq; alui subducit:
nerū distribuit & nutrit magis: uerū autē mi-
nus eo quod cum aqua coctum est, mouet. Seni-
bus itaq; mel cōmodissimum est: grāte autem illo
rentibus & calidis, in bilem uertitur.

De Vino.

Si modo quicquid alit, cibis est, uinū etiam
in genere ciborum est collocandum. Ceterū ui-
norum omnium, rubra simul & crassa, sanguini
generando sunt accommodatissima, ceu quæ mi-
nima mutatione indigeant, ut fiant sanguis. Post
ipsa sunt nigra, crassiq; & dulcia: tum quæ colo-
re quidem rubra sunt & nigra, cōsistentia autem
crassa, unā cum qualitate astringente. His autem
minis sua uatura alunt, quæ alba sunt, simul &
crassa, & acerbā. Omnium autem minimum nu-
triuū, quæ colore quidem sunt alba, consisten-
tia autem tenuia, & aquæ hydromelini faciendo
appositis, similia quodāmodo. Dulcia uerō con-
fiscantur in uentriculo, & distribuntur facilius,
quā austera, ut quæ facultate sunt calidiora.
Quia autem sunt a modum crassa, tardius qui-
dem perficiuntur, atq; distribuntur. Si tamen in
uentriculum adeo robustum incidunt, ut confici
rectē ab eo possint, alimentum copiosius corpo-
ri dabunt. Constat præterea, quod quemadmodum
hæc corpori alendo tenuioribus sunt præ-
stantiora, ita ad urinam ciendam sunt deteriora.

De cibis sale conditis.

ANIMALIUM corpora, quorū carnes simul
duræ sunt & excrementitix, sunt ad salendum
accommoda. Quæ uerō aut a modū mollem, aut
ualde siccam, & minime excrementosam habent
corporis habitum, sunt ad salendum inepta. Sa-
lis namq; facultas, humores superfluos tenuat, et
digerit, corporaq; cogit atq; condensat: cū ni-
tri spina, & laxum a phronitru, tenuare quidem
& discutere possunt, cogere uerō & condensare
non possunt. Suum igitur obsequium & utrate flo-
rentiū carnes, ad salendum sunt congruentissi-

mæ, ut quæ ab utroq; extremo absint. Quemad-
modū enim corpora sicca salita, coriis euadunt
similia: sic cōtrā, quæ immodica humiditate dis-
fluunt, salis cōmercio tæbescūt. Ob eam causam
neq; pisces mollis carnis, & excrementis alia, ut
saxatiles & aselli, ad salendum sunt apti. Graci-
li uerō, pelamides, myli, sardæ, & sardenzæ, quæq;
asellus uocant, & salamenta, ad salendum ap-
positi sunt. Multi uerō, quod dura eorū sit caro,
& ab excrementis pura, non sunt ad salendum
accommodi. Ex his autem perspicuū est, ea esse cō-
coctū a modū difficile, quæ sale cōditā, dura &
neruosa eua dunt, ac uelut coriacea. Quæ uerō
cōtrā habent, tenuia quidem ipsa reddunt, man-
sa autē humores crassos & glutinosos attenuat.
At præstantissima omniū quæ misli licuit expe-
rietur cognoscere, sunt quæ i ueteribus medi-
cis Sardica salamenta appellantur.

De medicis edulij.

IN SIMILIS differentijs, quas alimentis
inesse diximus, quædam sunt media. Animalis-
bus autem naturalem temperiem atq; inculpa-
tam seruantibus, similia suis naturis cibaria con-
ueniunt: his uerō quæ prauam temperiem, aut
ab initio sunt sortita, aut post acquisuerunt, nō
similium libisipis esus, sed contrariorum est uti-
lis. Itaq; singulæ naturæ suum proprium mediū
habebunt, idq; secundum ætatem, uitæ cōditi-
onem, institutonem, & regionum, in quibus in-
diu habitant, differentias.

GALENI PERGAMENI
de euchymia & cacochymia, li-
ber primus.

Nonne caritas assidua, quæ non-
pauca abhinc annos multas na-
tiones Romano imperio subditas
affluxit, coegitq; uicis alimentis pes-
simi nutrimenti, ac promde nationis,
& maxime perniciosos morbos induxit, planē si-
gnificauit, quantam uitiosū succi ad gignendos
morbos uim habeant. Etiam ab his alimur, quæ
naturæ nostræ sunt familiaria: quæ uerō illi ad-
uersantur, nos in perneciem deducunt. Cate-
rium qui haustu letalium uenorum pereunt,
facile fecerunt ab his possunt, qui ab aliqua cor-
poris affectione extinguntur. Neque etiam
quispiam inficiā ibit, ob humorem quem uo-
cenaia animam in istam particulam in-
surgit, uel illam cederet uita priuari, uel in pu-
tredinem labi, uel doloribus uehementissi-
mis, aut phlegmone ngeri: necnon scorpio-
nem icuiui hominis spuro bis tēre asperum,
protinus interire. Nam sicuti naturæ quæ-
dam cum alijs quoque naturis conueniunt, sic
altera quoque aduersari alteri, rāque cor-
rumpit. Porro quandiu ipse patris consilium
sequutus, ab usu immodico fructuum, quos
horarios uocant, abstinui, obseruauit ab illo
traditam optimam uictus rationem, randiu im-
mūnis ab omni intemperie peristi. Quorū au-
tem eius præce pta negligēs, cum coactanc
meis ultra modū fructibus illis me impleui, sem-
per in morbos inci, qui sanguinis misionem

Non apud as-
salem.

Sardica sal-
menta.

Animalibus et
periculis natura-
lem seruatis, similia
suis cibaria con-
ueniunt: uicis
autem prauam tem-
periem, aut post
acquisuerunt, non
similium libisipis
esus, sed contrari-
orum est utilis.

Succo uicis
ad gignendos mor-
bos maximam
uim habere.

Naturæ autem
nostræ sunt fami-
liariora.

Scorpiōem homi-
nis icuiui spuro
bis tēre asperum,
protinus interire.

Calennia et alia
ab usu intem-
perato fructuum
peristunt.

Mal. Landarissi-
mum ubi gignit
mel.

Mel quibus faci-
le in bilem con-
uertatur. Quibus ut
sit maxime ex
rifa.

Mellis acrimo-
nia quomodo
corrigatur.

Melicratum.

Mal. ardens.

Mel coctum, ut
nam morit.

Mel largius sum-
ptum, uomitum
promouet.

Mel similia cō-
modissima, a-
tate seruatis in
bilem uertit-
ur.

Vinorum differ-
entia.

Vina rubra fi-
unt & crassa,
sanguini gigni-
tū ad ista accom-
modatissima.

Vina alba et
tenuia, minimum
omniū nutrire.

Vina dulcia.

Conditura quæ
animalia sunt
apta, & quæ in
apta.

Sal humore su-
perfluo digerit,
duri spina.
Aphronitru.

Suum carnis.

Galenus pater in omni disciplina rerum genere fuit versatus.

Cibi admodum expofiti non erant qui poffent exire ante o brem.

Panis optimus quafi fit.

Alica. Similis caro.

Crudos humores necelfario de bere aut concoqui, aut compotrigiri.

Calculorum generatio.

Exercitium ante cibum modice. Tragus.

Cibi confecti in medicamentis, omnium commendatiffimi funt.

desiderarent. Erat enim pater meus geometriae, architecturae, astronominæ, arithmeticae, logisticique studiis excellens, maximèq; omnibus quibus erat notus, ob ipsius iustitiam, modestiam, bonitatemq; ut quisque ex philosophis alius, admirationi. Ceterū qui potest exerceri ante cibū, is haud sane admodum exquisitos cibos desiderat: cui uerò negotia & occupationes impedire sunt, non modò huic probato innoxioq; uictu, sed salubribus quoq; medicamentis est opus. In primis igitur ut qui quædam iam etiam præcepta tradantur, qui turbulenta uitam, atq; negotia deditam agunt. Cibi itaq; succi probati sunt, ex frumentaceorū genere panes purissimi probeq; confecti, adhibita prius maceratione atque fermentatione debita, necnon sale insecto. Arcofiti in cibano præstant: post quos furnacis secū debentur pariter. Alica uerò, sicuti & suilla caro, si exactè in uentriculo concoquantur, in sanguinemq; à iecinore cōuertantur, probatissimos gignunt humores: aliquid tamen glutinosi in se habent, ob idq; in his iecur obstruunt, & renes, quibus hæc à natura strictos meatus forisruit, ac proinde distributionē impediunt. Horū quoque usus uberior, in supradictis particulis uel grauiterat, uel dolore nonnunquā facit. Quantiā in uenis que per causa iecinoris, aut per mesenterium feruntur, redundans humor periculū adfert, ne uel putredinē contrahat, uel ex ipse particulae in quibus cōgeritur, afficiantur pleurismo ne. Quippe necesse est crudos crassosq; humores, uel concoqui, uertitq; in sanguinem, uel computrescere: non secus ac quæ calidis in locis diutius manent. Quamobrem inuenta medicamenta salubria sunt, quæ tenuandi uim possident, quæ obstructionibus liberant. Quamquā horum frequentior usus, uel ferofum, uel biliosum, uel melancholicum procedente tempore sanguinē reddat. Quandoquidem id genus medicamenta, nō solum in cibus & tenuant, sed etiam immodicē calefaciunt: ob idq; & solida membra exiccant, & crassum humore reddunt, quo in renibus ascosi gignuntur calculi. Opima itaq; corporis constitutio, quæ temperatissima est, meatus, per quos humor fertur, pateiores habet: quam quidem talem conferuat ante cibos exercitiū mediocre. Tragus ex frumentacei generis alimentis, eiusdem cum alica naturæ est: ægnus tamen concoquitur. Propè etiam natura ouorū atq; uires accedunt. Tam uerò quæ glutinosos crassosq; humores gignunt, si in lepore conuertantur in sanguinem probum, potētissimè nutriunt. Ceterū qui cibi in omnis excessus medicoriarie cōsistunt, à omnib; cōmendatiffimi sunt. Eius generis panes optimi habentur: præterea gallinarum, gallinaceorumq; carnes, necnon phasianorum, perdicum, atragenarū, columbarū, merularum, turdorum, tururumq; & omnū passerulorū. Pisces item saxatiles, pelagici, littorales, gobii, murenæ, buglossi, aselli, & simpliciter pisces omnes, qui neq; in sua uie, neq; mali odoris, neq; glutinosi quicq; gustu repræsentant. Verū ad fa-

nitatem tuendam, si ante cibum corpora moderatè exerceantur, mirum in modum prodest: at contra, quies & ocium diuturnū, his maximo no cumento est. Qualiscūq; autem post cibum modico, alimentū ex uentre crudum in diuersas corporis partes distribuit. Porro panis qui nec fermenti, nec salis quod sit est continet, neq; probè maceratur nec coctus est, is glutinosum succum producit. Caseus omnis, crassus uetus, mali succi est: recens uerò, succi prauitate caret: qui quidem ex melle sumptus, alium subducit. Lac autē cūm ex triplici, dissimiliq; substantia consistit, nempe serosa, crassa, & pingui: camelina, asininūq; lac, serosi humoris plus habet: plus crassi & caseosi, ouillum: plus pinguidinis bubulum. At lac caprillū, inter cetera lactis genera moderatè se habet, ob idq; in corporibus nostris mediū etiam præstat effectum. Etenim lac quod serosum & te uue est, minus nutrit, sed aliū magis deñcit: contra crassius, minus alium subducit, ceterū magis nutrit. At lac caprillū, sine melle sumptum, periculosum exiit, quod nimirū in uentriculo concrefcens strangulat: quemadmodū ubi sanguis in grumos cōcretus, aut in uulnus aliquod, aut in uentrem, aut in aliquod intestinorū defluxerit, grauissima symptomata inducit. Lac itaq; statim ubi est emulsum, lauratur. Cui quidem ne in uentre concrefcant, mellis, aque, & salis aliqui solent non nihil miscere. Ar quod ex lactis cōcretionē defluit serum, alium egregiè mouet. Quæ ex lacte & caseo placenta conficitur, itraq; etiam, quæ ex lacte & similitudine consistit, crassus succi alimoniam præstant. Cochlex: crassi succi censetur: itemq; oua, quæ uel elixa, uel tosta, penitus sint densata. Fixa uerò, mali succi, sumofaq; in uentriculo cocturæ existunt, secum etiam corruptentes admissos cibos. Mediocriter uerò cocta, quæ ideo appellatū tremula, ad coctionem, digestionem, nutritionem, bonūq; succi generationem, sicuti & quæ forbilis dicimus, ad leniēdas gutturis asperitates, idonea sunt. In aqua tibus uerò, quæ mollia dicuntur, uidelicet lolii genes, sepiæ, polypi, aliq; id genus, crasso & tenaci sunt succo: necnon ex piscibus, quæ cetacei generis habentur, cuiusmodi sunt thynni. Sed pelamides ex his magis ad medicoriarie tendunt. Ostrea item, buccinæ, purpuræ, crassi admodū succi sunt: ac omnia breuiter, quæ dura testa integuntur, necnon chameæ, patellæ, pectines, pinnae, & alia id genus. Quorum omnium succum scire debes, nō lecus ac serum lactis, alium deicere: at solidiores ipsarum partes, serius ob crassitatem cōcoqui, crudumq; & crassum, & frigidum humorem gignere: quales uires in brasiaca & lente etiam uidere licet. Quorum tamen succus, nō glutinosus, sed nitrosus, & deiciendo alio efficax est: sicuti dracunculū acerrimus, & amarissimus. Vtrūq; etiam aron præstat, sed minus efficaciter. Bulbi autem amarog; sunt succosus: qui 60 bus lotis coctisq; sepius, quicqd; superest, crassi succi habetur. Sed fangi inter huius generis cibos, frigidissimo, tenduntissimō, & crasso succo redundant: à boletis tantum neminē interficere memoræ proditum est. Sed hi ubi concoqui nequi uerunt, in nōnullis cholera excitant. Alij om-

Exercitium ante cibum modice, exerci, offit ad fontem tunc dant.

Mutatio post cibum uoluntaria.

Panis optimus. Caprum diffinitio.

Lactis, fibrilla. Lactis diffinitio. Lac caprum.

Lac serosum.

Lac crassum.

Lac caprum aliq; melle sumptum, periculosum.

Sanguis in uentre coctus, aut in uulnus aliquod, aut in aliquod intestinorū defluxerit, grauissima symptomata inducit.

Serum lactis alium subducit. Pleuritis natura. Cochlex. Oua.

Oua tremula.

Oua forbilis.

Pisces molles.

Cetacei piscis.

Tegulae.

Dracunculus.

Aron.

Bulbi.

Fangi.

Boletis.

Tuber. nes fungi periculosissimi sunt. Tuber, leniter crasi, non mali succi est: cuius generis amyli habetur. Item dum pinæ se habet. In his quæ crasi succi censentur, iecur, renes, & testes annuere dandi sunt. Verum iecur mali succi non est: renes testibus nō boni, testibus gallinæcorū exceptis. Lien ex cæteris animalibus, fatis vitulosi est succi, melancholicusque: minus uero nocet suillus. Cordis substantia durior ac magis fibrosa est, quam quæ in alijs habetur uisceribus: quare ipsum nō nulli inter muculos collocant. Sed musculorū uerorum capita, nervosiora quoquomodo cætera carne sunt, in eais ex oisibus ligamenta orta dissecantur. In fine autē musculi tendones oriuntur: eais ob causam extremæ utrinque musculorū partes nervosiores: sicuti & medix carnosæ sunt, & uerbissime nutriūt. Porro totus musculus proprijs quibusdam lineamentis circumscriptus, seuinctusq; ab alijs partibus cernitur, obisq; functionē unam, quæ est ex moribus uoluntarijs. Extremæ animalū partes, ligamento se existunt, corporisq; alimentū lentum & glutinosum præbent. Partes etiā quæ penes labia pedestrium sunt, lentum, sed non crassum humorē gignant, coquanturq; cōmodē: itemq; uolatilium alæ, cōmuni quādam corporibus se exercentibus ratione. Nam hæc omnia excrementis carent: quæ uerō in ocio degunt, excrementosa sunt. Sulla cutis præpinguis, ubi probē fuerit eluxa, glutinosum, sed non satis quidem crassum succum præstat: nec ueluti extremæ partes, concoctionē admittit: nec bonū succum, sed excrementosiorē producit. Cerebrū quoq; pars crasi succi est, & quæ dorso medulla excipitur. Sunt glandule eiusdem naturæ, sed medio critere: necnon iuuentū uiscerū testes. In uniuersum autem, partes seniores, duræ, siccæ, & cōcoctū difficiles sunt: sicuti & iuniorum, humidæ, mollesq; atq; idcirco faciliores concoctū: his tamen exceptis, quæ ubi in lucem æditæ sunt, pronius in cibo sumunt. Sunt enim id genus omnes mucosæ. Quæ in mammis glandule habentur, si lac in sese contineant, crasi sunt succi edulia. Quod si animal ex quo sumuntur, boni haberi fuerit, abundē nutriūt, & bonū succū efficiunt. Etenim lac probatissimi succi habetur. Quare nonnulli pulmonis ulcere affectos, potionē tantū lactis curari putāt, antea scilicet quā id ipsum ulcus uastius atq; callosum fiat. Sed præ cæteris lac muliebrem, tantū naturæ eiusdem, nobisq; familiarissimum, cōmendatur cū ab alijs medicis, tum uel maximē ab Herodoto & Euriphone, qui quidem ubera ab ita affectu sugenda esse pronunciant. Lac siquidem, simulatq; est emulctum, nōnulli naturæ bonitatis amittit. Scire autē oportet, lac ex ijs animantibus quidem, quæ boni habitus fuerint, boni esse succi: ex ijs autē quæ deprauato, nō secus ac sanguis qui in illis habet, cacochymū existere. Inter crasi succi cibus annuere nratq; balanorū species, querna uidelicet, ac fructus etiam palmarū. Ex his autē quas quercus ferunt, quæ sunt castanæ & siuacæ: quæ quidem & cōcoquant cōmodum, & prauū succū nō gignant: ex enim asæ uel elixæ manduntur. At quæ figura oblonga sunt, & similes

palmulis, subus sunt certē nutriēdis, haud item hominibus congruæ. Lignæ uerō glandes duræ sunt & acerbæ, ægreq; concoctionē admittunt, atq; crassum succū largiuntur: ac proinde uitandæ sunt. Est autem in austeris quidem remissa astringendi qualitas, in acerbis autē intensā. Sed quanto lignæ glandes ualentiores astringendi potestates cæteras superant, tanto hac in re ab ipsis glandibus superantur castanæ: à quorum tamen usu uberiori cauendum, quod & crasi sint succi, ægreq; coquantur, ac tam alium astringere, tum excitare inflationes possint. Porro palmarū fructus dulcis sunt succi, crasiq; & astringentem facultatē habentes: quare facile iecur obstruit. Si quidem dulces cibi, crasiq; succi, iecino ris ac lienis obstructions faciunt: inchostemq; in uisceribus phlegmonē agent: necnon inflationes, scirrhosa uina, adeoq; abfcessū generationes proritat. Nostris autē corporibus alimentum ac cōmodatissimū est, quod ex ijs rebus cōficitur, quæ nec crasi, nec tenacis sunt succi: hæc siquidem moderatē consistit in sanguinem gignunt. Quod uerō tenue admodum est, parum nutrit. In his quoq; uitæ est cibi, qui omnino friabiles sunt, ut qui paucissimum in se habeant lentorem. Panis quippe ex panico, milioque confectus, dum est, arandum quiddam, uel quasi cinerem sapit: nisi ei aliquid indideris pinguitudinis. Quare ad bonam ualitudinē q; cibi cōmodissimi sunt, qui mediā quandam naturā inter ea quæ diximus obtinent. Cæteri quæ ex seminibus, aut omnino ex fructibus intumescunt, ueteremq; protinus siccitatem atq; duritiem depo nunt, molliorib; & humidiora redduntur, præstantiora existunt: deteriora uerō, quæ pristinam duritiem retinent, atq; etiam minime tument. Quod uerō ad pñam pertinet, quæ celeriter quidem turget, probatissima est: quæ autē post multū temporis intumuit parum, uitiosa. Porro quod præstantius est triticū, quis quidem: quod deterius, minus farinæ reddit. Si autem fructus cōmodē, iudicio meo, afferuantur, qui priusquā marcescant, siccantur. Nonnulli cucurbitas in tenues offas dissectas, arefcere sinunt. At fungi cūm siccari nequeant, uitium in se habere maximum indicant. Paucissimos tamen fructus reparias, qui siccari nō possint, præter pepones, melopepones, Armeniacæ, Persicæ, & quæ à Romanis præcocta appellantur. Ficus etiā siccare ducunt, & cucumeres ut cucurbitæ similiter reputantur. Qui cibi illi in tumorem crescent, interim dum in aqua coquantur, h; & cōficiuntur aptius, & ad bonos humores gignendos sunt præstantiores. Nihil autem in cibarijs omnibus ad boni succi generationē tam pertinet, quā si probē in uentriculo concoquant: hæc siquidem & secundam, quæ in iecore & uenis fit, & tertiā, quæ in particulis quæ nutriuntur, perficitur, facilius concoctionē admittunt. Fit enim nutritio, alimentum secundum qualitatē mutato, & particulis quæ nutriuntur assimilato. Cæteri præparata præcoctaq; cōmodius transmutantur, q; cruda, cū ad inuicem cōcoctiones succedant. Cunctis igitur corporis partibus iecur alimentum præparat, illi uentriculus, huic os, ori ars

Ligna glandes.

Castanea.

Panem facile iecur obstruit. Dolori cibi, quæ mala inducunt.

Friabiles cibi. Panem.

Seminia præstantiora quæ sunt.

Pristina quæ præstantiora.

Triticum. Fructus ad repas uendit aperari. Cucurbita. Fungi.

Fructus qui siccari nō possunt.

Ficus. Cucumeres.

Concoctio triplex.

Nutritio quomodo fiat.

Præcocta melius transmutantur quā cruda.

Concoctio os generat.

*Inter omnes ani-
malium.*

Cande.

Colla volucriū.

*Ventriculi galli
macra asperitatis.*

Asperitas carnis.

*Struthio camelorum
paries.*

Aurei.

Oculi.

Sueti.

Porcelli.

Smilla cere.

Viridula.

Agguina.

Prisana.

Fumagranum.

*Faba inflatio-
ne gignunt.*

Pyta.

Lentes.

Ochri, dolichi.

Corvula.

Olyra.

Typho.

Parvum.

Milium.

Citr.

Lapinum.

Cassanea.

*Hera: fructus si
corruptus in
vitae, similes le-
talibus venenis
redduntur.*

Ficus. Vae.

*Carica quan-
do pediculus gi-
gnatur.*

obsonatrix, quæ varijs modis concinnat cibos: quibus deniq; omnibus gubernatrix natura fructiferas plantas disponit. At ventriculi, uulux, intestiniq; animalium, quod duriori substantia q̄ caro constant, eo etiam cōcoctio difficiliora, nec adeo boni succi sunt, nec tam apta ad nutriendū. Sed caudæ sunt his quoq; duriores: reliqua uero in ipsis, quæ ad concoctionē & nutritionē spectant, duritiei proportionē respondent: hoc tamen excepto, quod motione causa minime excrementis redundat. Cum his uolarium colla, similitudinem quandam habent. Ventriculi pedestrū & uolarū, maxime inter se differunt. Namq; ex uolaribus crassius durusq; est, & concoctū difficilis: at si coquantur, uberrime nutrit. Gallinæ & anseris præstantissimus est. Ceteræ uero anserinæ partes, aliæ exceptis, sunt duræ, & excrementosæ, nec facile concoctionem admittunt. Struthio camelorum membra omnia, dura, excrementitia, & cōcoctio sunt difficilia. Aurii cartilago & sicca est, & minime nutrit: eam cutis exterior tenuis aridaq; ægrè item concoquit, & parcissime nutrit. Oculi à paucis edunt: cōstant enim ex substantia dissimili. Ceterū eorum musculi tantum facillimè concoquunt. Ex animalibus quorū natura est ad gignendos bonos humores aptissima, fues mediocrius iam ætatis habentur. Caris ex porcellis parvulis, excrementis scaturit. Itaq; ex pedestribus animalibus suilla caro cibis probatissimus est: deinde hœdina, mox uirulina. Agguina uero, humidā, tum lentorem, mucoremq; in se habere censet. A ceteris pedestris generis, meo iudicio, abstineat, quisquis boni succi generationi animū curamq; intendat. Pristana probe ex optimo hordeo confecta, inter cibaria omnia prorsus omni noxa caret: nutrit tamen quā panis minus. Fœno græcum nō boni succi est, si quis eo liberalius utatur. Prisanam uero, etsi quotidie ad satietatē sumptis, nō idcirco boni succi generationē impedit. Idē quoq; de fabis dicere, cum nec mali succi, nec ob uim illam detegendi, quam habent, obstractiones faciant, nisi inflationes parerēt. At pisum exurgendi quidē uim nō æquē habet, ac faba: sed inflatione caret. Lentes & uisiosi succi, & melancholici sunt. Ochri præterea & dolichi his quæ diximus deteriores, & cicerculus meliores habent. Post hordeum olyra annumeranda est: post hinc typhæ. A panicō prorsus abstinere. Huic milium consimilis est generis, sed minus malū. Cicer egregie nutrit, sed nec boni succi est, & instar nō minus q̄ faba, seminis auget, ac ueneris desiderium. Lupinus nō mali, sed crassi succi est, propterea nutrit egregie. Fructus quos arbores ferunt, omnes ferè mali sunt succi, castaneis tamē exceptis, quæ si in uentriculo concoquantur, efficaciter nutriūt. atq; ex crassi quidem, nunq̄ autem sunt mali succi. Ceterū qui fructus horiei appellantur, humorem utrosq; gignunt: quod si fortē in uentriculo corruptantur, similes letalius uenenis redduntur. At ficus & uex ceteris autumnalibus fructibus sunt præstantiores. Quippe maturæ ficus ferè innoxie sunt: uix deinde, & ex quidem appendix. Verū carice, si diutius immoretur in corpore, mali sunt suc-

ci, & pediculorum copiam producant. Cum na-
cibus autem sumptis, cibi præstantissimi sunt,
cum amygdalisq; similiter: sed cum his obstrac-
tiones aperiant, nō tamen ita bonum succum præ-
stant, nutriuntq; ut cum miscerentur cum nu-
cibus. Sunt qui caricas cum ruta nucibusq; præ-
sumptas, uenenis uniueris aduersari fateantur.
Reliqui arborum fructus mali succi sunt, hys po-
tissimum, quos syluestres plantæ & frutices te-
rent. Sed melle, piris, punicis, & mēspis, non
alimentorū, sed medicamentorū loco utimur, ad
uētriculi firmitudinē. Inter fructus quoq; cucu-
meres, pepones, melopeponesq; connumerant:
quorum nullus boni succi est. Quid si celeriter
perfici, digerit nō possint, in succum ferè letali-
bus uenenis similes conuertuntur. Cucurbira
duntaxat ex huiusmodi fructibus damanda
nō est. Si ramen in uentriculo corruptatur, ipsa
etiam malum succum producit. Mora itidem, si
perficiant citō, & priusquam corruptant trāsire
runt, innoxia sunt: nisi q̄ quispiam liberalius ut-
atur. Ex oleraceis nihil est quod boni succum præ-
stet. Lactuca tamen in hys quæ boni malisq;
succi sunt, mediocriter se habet. Post illam malua
habetur. Post hanc portulaca, atriplex, blitū,
rumex. Sed lactuca agrestis, chondrilla, (candix,
gingidum, seris, cichorium, aliaq; ex oleraceis
agrestibus omnia, succum utrosq; gignunt.
Radices olerum in se acrimoniam habentū, ut
alli, cepæ, porri, rapiani, & pastinacæ syluestres,
malum succū producant. Sed ar, caris, radix, &
rapi, in hys quæ boni præstant succi sunt, media ha-
betur. Ane picesq; ferè omnes, boni succi cen-
sentur, exceptis lacultribus, palustribus, & qui in
immundis soluminis atq; turbidis degunt. Mi-
nus enim lex narationibus sese exercet, uisiorūq;
aëre, & prauo uictus genere utuntur. Quæ uero
in meliores aquas se transferit, adhuc animalia
ea hys deteriora sunt, quæ puro ex mari uictit.
Omnia siquidem propemodū animifera, quæ in
ea maris parte uersant, quæ dulci aquæ se nō im-
miscet, innoxia sunt: ut pelagica, & saxatilia, quæ
tum ad bonos humores gignendos, tum ad gas-
trum ipsius uoluptatē, ceteris multo sunt præstan-
tiora. Horum itaq; frequens usus, tutissimus est.
Nōnulla præterea sunt quæ duplici ex humore
uiuūt, tum marino, tum dulci: ut lupi, capiteones,
cancri, gobi, murænæ, anguillæ. Sed quæ puro
ex mari uictū petūt, ea & boni odoris sunt, & gu-
stui suauia: pinguedinis autē aut nihil omnino, uel
paucissimū in eis cōtinet: diutiusq; a putre-
dine illa durat in quibus signis discernunt ab alijs
præsertim si in uentre obducant. Ad hunc enim
modum quæ durioris sunt carne, præstantiores
euadunt. Murenæ igitur ex aquis impuris, pessimi
sunt. Anguillæ uero boni succi sunt, uel si in pu-
ro humore uersent, medum in eo qui pingrante
turbum recipit. Secundū quoq; locorū pasto-
ras, pisces & meliores & deteriores sunt: id qd
odore & gustu explorare facili. Ceterum neq;
auxiliorū, neq; exactam salubritatem ciborū notam
consequerē, si illorū uires accuratissime no-
rit, nisi corporū quoq; atq; particularū natu-
ras, quorū causa cibi expetunt, agnoscat. Ex his
enim nonnulla sunt densa, & quæ spirare non
possunt:

*Carica corrupta
si non in aqua
sumptis, aduersari
venenis.*

*Fructus quibus
res medicamen-
torū videntur.*

Cucumeres.

Pepones.

Melopepones.

Cucurbita.

Mora.

*Oleraceis om-
nia cacochymia.*

*Olerum varia
sunt.*

*Radices olerum
acrimoniam ha-
bentium.*

Ane. Pycn.

Pelagici pisces.

Saxatiles.

*Pisces duplici ex
aqua uiuunt.*

*Pisces puro ex
mari uictum ca-
piunt.*

Murenæ.

*Anguilla in qua
neminem habet
focet.*

*Corporum
differencia.*

possunt: laxa nõ nulla, & quæ inaniuntur facili:
eamiß ob causam humidore illa alimẽto egent,
hec ficiore. Alia item glutinosius, alia tenacius,
alia parcius, alia ubertius alimentũ desiderant. Si
militet, quibus sanguis est admodũ melancholi-
cus, humidi calidij cibi sunt dandi: quibus ue-
ro biliosius, frigidi & humidij. Verũ ubi pitui-
tosus existit, cibis tunc opus est qui calefaciendi
ficcandiũ vires obtineant. Qui probo sanguine
abundant, alendi parcius quã cibis, qui natu-
ram mediam fortantur, sic ut neq; aliqua prima
rum qualitarum excellant, nec crassius aut tennes,
nec lenti aut aridi, aut deniq; friabiles sint. Por-
ro ariditas, in duris ualdeq; ficiis rebus. Friabili-
tas autem, in mollibus, medijsq; inter humida
& sicca inuenitur. Cõmune tamen utriq; est, ut
tenaci lentore careat omnino. Ex uinis quæ a-
quosa tenuialy sunt, urinas mouent, & paucissi-
mi sunt nutritimi: crassa uerõ, ut Theracum &
Scybelites, quæ absolute dulcedinis sunt, nõ le-
uiter quidem nutriunt. Calcium uinum, austerrũ
simul & dulce existit. Quæ Aegis & Perperinæ
proueniunt, medium inter dulcem & exquisitẽ
astrigentem qualiterem, saporem reddunt: ni-
graly hec omnia sunt. Nulla enim uina inuenies
crassa pariter & dulcia, quæ nigra non sint. Alba
uina haudquaquã dulcia sunt, sed alia austera &
crassa, alia aquosa & tenuia. Ex flauis autem, ru-
bisq;, nonnulla mediocriter dulcia sunt, sicuti
Hippodamantiã, Faustianum, Falernum: nõnul-
la omnino dulcedine carent. Sunt autem his ru-
bra crassiora, & ex rubris, quæ proxima colore
ipso nigris sunt. Nutriunt autẽ hæc omnia cras-
situdinis proportionẽ: eamiß ob causam, qui in-
digent refectione, ut dulce uinũ potent, suaden-
di sunt: ac tunc præcipue, cum horum iecur, lien,
& renes, uino penitus carent. Verũ cui crassius
succus per uenas redundat, tenuis substantiæ ui-
num: cui frigidus, acẽ & uetustum: cui non fri-
gidus, quod neq; acẽ neq; uetustum sit, accom-
modatum est. Ad bonos autẽ humores gigen-
dos, odoratũ præstantius: sed tamen caput ten-
tat. Tenuẽ, cõtendẽ urinx magis idoneum, capi-
ti nullam infert noxam. Vitanda quæ crassa si-
mul, malij odoris, gustuiq; ingrata & austera
sunt. Ex uinis probanissimũ succa Falernũ habet,
potissimũ id quod dulciss. Ad alui fluxiones
sistendas, austerris utitur uinis: quæ ad nullos al-
ios usus accommodatẽ solemus. Ceterũ in ipso-
rum uinorũ exhibitione, non minus regionum,
temporũ, exercitiorumq;, quã affectũ, & tem-
peraturarũ hominũ, ratio est habenda, sic ut mo-
derata conferuimus similibus, immoderata cor-
rigamus contrarijs. Temperaturis igitur frigi-
dioribus, rutilum dulcẽq; uinũ, ut pote calidum,
accommodatũ est. Contrariũ uerõ, temperamen-
tis atq; dispositionibus calidis: quod illud cale-
faciat impensẽ, capitisq; dolores, & febres faci-
le inferat, neruosisq; nonnullũ lædat. Quod autẽ
crassa uina dulcialy deiciant alium, nemini ob-
scurum est. Multum etenim, licet coquatur egre,
crassumq; succum & insulationes gignat, alium
tamen subducit: id quod si interdum efficere ne-
queat, mirum in modum no cẽt. Vitanda ergo
quæ nimis uetusta sunt, nimisue recentia. Nanq;

illa præter modum, hæc nullatenus, quandiu re-
centia fuerint, callescent: quæ tantũ abest ut
aliquem usum cibis conuoluentis afferant, ut
enam ipsamet conficiantur ægerimẽ. Præterea
nec cõmodẽ per alium transcut, nec digerun-
tur, nec urinas mouent, nec sanguinis confectio-
ni nutritiõis idonea sunt. Sæpe enam, ut aqua,
in uentre suspensã remanet: ut si paulo amplius
ex ipis hauseris, facillimẽ coalescant. Sed ex recen-
tibus uinis genus illud dantaxat totũ bibitur,
quod tenuis substantiæ est: sicuti ex Italicis, Cau-
cianum, Albanum, & ex Sabinis Thracisq; nõ-
nulla. Aminacũ quoq; quod in eo colle nascitur
qui Neapoli imminet, citò ut bibatur idoneum
redditur: quale apud nos in Asia est Tabinũ, Ar-
sinium, & Tiracacum. Quæ flumina tenuia, candi-
da, & aquosa existunt, ideoy oligopiora uocan-
tur. Et quemadmodũ rutila uina, cum calida po-
testate sint, replent proterius caput, sic illa, nem-
pe tenuia, & aquosa, leniterq; astrigentia, non
modò capiti innoxia sunt, sed etiam leues eos ca-
pitis dolores nõnunquam tollunt, qui ab hu-
moribus in uentriculo collectis proficiuntur.
Quin & aquæ potio, uinum præcipue in se ha-
bentis, nonnullis capitis doloribus infert: nam &
ipsa corripitur, & naturale robur exoluit. Quo
fit, ut ubi uentriculum inualidum reddidit, in ca-
uas uas partes ex reliquo corpore facies quæ-
dam biliosa defluere consueuerit, more eorum
quos premit inedia. Quibus uis offensia, no-
xisq;, dictum uinũ, sui temperamẽti ratione, ho-
minem acturum liberat: pauloq; post, ubi firmat
uentriculũ, quod illi noxia sunt, ad partes in-
fernas deferit. His ergo qui calido admodũ tem-
peramento sunt, aquæ potus longe accommoda-
tior est uino: quod utiq; si interdũ propinare ex-
pediat, sit quod tenue, leniterq; austerrũ. Ex ui-
nis itaq; quod uetustissimũ est, adeo ab albo &
austero, necnõ recente & crasso distinguitur, ut
illud quidem efficacissimẽ calefaciat, sensibilem
hoc refrigerandi facultatem obtineat. Dulcissi-
mum autẽ acerrimumq; mel, eximie æstimationi-
nis est. Verũ cuiuslibet generis mel calefaciendi
uires fortitur, sumptumq; à calidis corporibus
facile in balem uertitur. Idcirco pituitosis admo-
dum natura, ætateq; & senio confectis, utiliter
datur: frigidis quoq; morbis accommodatissimũ
est. Acetũ multum, hoc est, oxymel, sanuatis tuẽ-
dæ gratia ætatis naturisq; omnibus utilissi-
mum est: siquidẽ obtructiones omnes discutit,
astictorij meatus ita aperit, ut nulla in parte
crassi glutinosij succi adhaerescant. Quæ et me-
dicamenta salubria, tenuandi omnia in se po-
testatem habet, tuioraq; ad ualentiã tuendam
euenti, quàm quæ crassiores humores gignũt:
sed bonã habitudinẽ, roburq; efficere nequeunt.
Vitanda autẽ penitus quæ uitiosi sunt succi, præ-
terquã ætate, cum languentium corporũ siccitati
& calori occurrendum sit. His enim hoc ipso
tempore, mæla, pruna, cerasa, moray idonea
sunt: item cucumeres, pepones, melopepo-
nesq; sed parcius his uti cõuenit. Dantur quoq;
præcoccia, persica, & quæ à Romanis milce dici-
tur, refrigerata tamen: necnon spuma lactis, arg-
etia cibaria ex lacte confecta. Ficus item frigide,

Vina uetula
callescere im-
pon-
sum, recticia uol-
latuena.
Vinum re-
centi-
um noxia.

Aminacum
vinum.

Aqua potio quæ
male infertur.

Aqua potio quæ
bonè accommodatur.

Mel omne cal-
ciat, atq; in corpo-
ribus calida hu-
mores facit.
Mel quibus con-
ueniat.

Oxymel et alibi.
Q; naturæ esse
omnibus utilis.

Cibi ætate ad-
modum.

Naturæ diuer-
sæ, diuersa esse
aliments uicibus
rationis.

Ariditas in qui-
bus asida.
Friabiles in
quibus.
Vina alba & te-
nua, mouere vi-
ras.
Vinum diffu-
sionis.

Vinum amare
crassum & duri-
tatis uisum.

Vinum dulce
quibus sit propi-
andum.

Vinum odoratũ
caput tenet.
Vina tenue mo-
uere vitas.

Moderata esse
uicibus, immo-
derata corrigenda
contrarijs.

Multum depre-
ssum.

& cucurbita, ita affectis accommodæ sunt. Prudens tamen uir, ad refrigerandos æstus ex balneis rediis, epota prius aqua, mox uino medicriter aquoso, itaq; per uomitum redditis, lactucam edat, quæ innoxia est, simulq; uires habet refrigerandi. Sumat postea filulos pedes bene decoctos, ex aceto & garo: itemq; alas gallinæ uel anseris, & eisdem etiam uentriculum, necnon pisces nonnullos frigos, ex ijs qui molli sunt carne. Danda item ex olenibus quæ mali succi non sunt, sicuti malua cucurbitaq;. Vinum postea, ubi frigida aqua dilutum sit, potet. Mihi scapius similes æstus & calores perpeffo, pituitæ cremor bene refrigeratus fuit fans. Sunt qui nique refrigerantur. Sed hæc illis præcepta traduntur, qui assiduus occupationibus impediuntur: qui uero huiusmodi sunt soluti negotijs, si exercitatione uti solent, quam rarissime frigido potu indigent. Qui minime exercitantur, summa iustate cum uelimenti calore urgentur, aquam fontanam bibant, ab usuq; niuis abstineant. Hæc siquidem, quamuis pronus nullam corporibus iuuenum læsionem sensibilem inferat, sensim tamen, occulteq; crescente uinio, cum iam ætas progressu temporis inclinaret, articulos, uiscera, nervosq; ijs morbus uexat, qui uel difficulter admodum, uel omnino tolli nõ possunt: nimirum semper imbecilliori particula, facile quamcumq; excipiente læsionem. Quid autem uini, si humores morbos gignant, cruditas assidua maxime in causa est. Ea autem cruditas deterior est alijs, quam uiriosi succi cibaria effecerit. Quæ cum duplici modo fe habeant, si tenuem quidem succum reddant, acutos morbos cum maleficis quoq; febribus inuehant: succorumq; uinio in unam duntaxat particulam decumbente, tunc erysipelata, herpes, alijq; affectiones calidæ oriuntur. Si uero crassum luccum efficiant, articulos & renem uina, podagra, anhelationes, tum lienis iecinorisq; scirrhi affe- 40 ctus gignuntur. At quibus malus corporis humor melancholicus fuerit, affectus melancholici oriuntur. Sed ex humoribus mixtis, mixtæ affectiones proueniunt.

GALENI PERGAMENTI de attenuante victus ratione liber primus.

Tenuam victus
ratio quibus af-
fectibus cõferat.



Vm uictus ratio attenuans pleriq; diuturnis morbis, ut arthridi, dyspnceis, tumoribus lienis & hepatis, necnon morbo comitali incipienti, adeo conserat, ut sola ea, sine ullo alio medicamento, sublati speq; fuerint, operæ precium uidetur aliquid & de ipsa perscribere. Vocant autem eam attenuantem, quemadmodum incassantem, quæ illi contraria existit: pro eo humore scilicet, quem utraq; in nostris corporibus gignit. Etenim olfactus & gustus, mentem nostram ad omnes eiusmodi cibos discernendos, satis abunde instrunt. Quippe quæ sensus nostros pungunt & mordicant, ea omnia constat esse acia, & quæ succos crassos tenuare quærit. Quæ etiã, si largius equo sumpta fuerint,

uentriculũ mordicant, ciborumq; nauicam magnam inducunt, & halitus acres emittit. Plurima autem corũ urinas & sudores graucolentes & acres promouent: alia autem diuellunt, erodunt atq; perturbant. Ceteri corpora in quibus humores frigidi, crassi & lenti redundant, huiusmodi ciborũ usu maiori ex parte iuuantur. Nemo igitur est qui aliorum, cepam, nasturtium, porrum, & sinapi, in genere ignoret esse tenuantium: post illa autem, limyrnũ, pyrethrum, origanum, calaminthen, sifymbrium, pulegium, farfareiam, thymũ: quæ omnia uiridia quidem mandantur: exsiccatæ uero, iam non amplius sunt cibi, sed medicamenta. In summa, omne quod siccum est, uiridi ualennius existit. Eorũ uero quæ siccæ non sunt, maturiora minus maturis: & quæ in montibus & locis siccis proueniunt, ijs quæ in campetribus, planis, hortis, & paludibus crescunt, sunt fortiora. Prædictis autem ordine proxima est caparis, & terebinthi fructus: his autem eruca, fenum, apium, petroselinum, orminũ, rapianis, brasiica, & bera. Malua uero & blitũ, & atriplex, tametsi ijs specie sint proxima, facultatibus tamen dissident: aquea enim sunt, minimiq; acris facultatis fortiunt: quomodo cucurbitæ, citrulli, melones, melopepones, & pruna: humida siquid sunt hæc omnia, necnõ frigida, & pirituosa, potissimũ si cruda & non elixa mandantur. Omnia uiridia tenera & increscentia, facultatibus moderata existunt. Quo fit ut pleraque medicamenta, dum oriuntur & adolefcunt, non secus ac cibi mandantur: ut silphij, sinapis, pyrethri, & iringij stolones, quæ omnia ubi cõmaturuerunt, magnam habent uim incendiendi. Tenuant uero admodum, dum oriuntur, atque adolefcunt. Pari modo & urtica, priusquam exiccetur est esculentia: præterea sarniculus, ruta, coriandrum, anethum, eisdem cum illis sunt speciei, euidenter etiam calfaciunt. At uero a- 40 grestita olera, inter ea quæ diximus, naturam mediam sortiuntur. Si quid igitur olfactui, aut gustui, aut utriq; simul, acre, mordicans & calidum apparebit, scito facultatem id habere tenuandi, atq; incendiendi. Ad hæc, si quid olfactui bonũ odorem inferens, aromatis speciem repræsentet, id quoq; uiribus calidum esse oportet: sed non nequæ ac mordicantia & rodentia, & insigniter calfacientia. Incidunt præter ea & quæ saporem habent nitrosũ, aut salinũ: quorũ plurima etiã alium desiciunt, nec minus ijs amara, facultate tenuandi sunt prædita. Incidendi autẽ in illis facultas, aceto & melle intendi, oleo uero minuitur. Mixta canthus poris, mediæ quodammodo est facultatis: ab eo autem est & chamædaphne utriusq; nõ multum differunt. Stomacho autem minus prædictis cõmodant uitis alba, & uicia, & spinæ asparagi: omnium autem maxime austeri atq; astringentes, quales sunt uitis, ac rubi. Spina uero asparagus alium desicit. Iuat etiã uentriculũ, facultatisq; est mediocris, & palme germ en. Qui asparagi amaroris quippiã præferunt, quãto amarores, tantõ ijs sunt sicciores, & incidentes magis. Semina plantæ facultate suæ plantæ similia: nisi quod illis prorsus sicciora sunt, magisq; ad calorẽ propensã, eorũ magis tenuantia. Non

Acia largius
sumptis, quæ uia
la refrigerant.

Acia quibus
uicia.

Tenuantia me-
dicamenta.

Sicca esse ualens
tota uiridibus.

Mitiora esse ualens
mitiora campetribus.

Acia habere fa-
cultatẽ tenuan-
di.

Tenuandi facul-
tatem acro in-
tendit atq; melle,
remittit autem
oleo.

Palma germe.

Spinosa esse fa-
cultate suæ plan-
tæ similia.

Non

Olfactus
gustus.

Acia quæ di-
cuntur.

Non omnia tamen sunt uesca, ut nec herbe ipsę. Est itaq; papaueris semen herba ipsa præstituta, adeo ut tanq̃ iunioris panibus ipsum & placenta permisceant. Refrigerare tamen & ipsum paulim ex hoc intelligis, quid caput grauat, & soporiferum est, sed non perinde ac succus ipsius. Soporiferum est & lactuæ semen: quid quidem & olus ipsum frigidum est & humidum. Ab his igitur frigidis humidisq; seminibus ei est cauendum, qui tenuante uictus ratione uti uolet. Sefami semen, succum crassum ac lentum in corpore gignit: apq̃ uerq; petroselinum, cumini, carui, anisi, libythici, sinapi, ameo, dauci, sefeleos, & omnium deniq; odoratorum & acris, euidenterq; calfacientium semen, tenuanti dierta utentibus cõgruit. Ceteris rursus semen uehementissimè tenuandi uim possidet. Pari modo & lini & cannabæ semina: quę etiā & caput tentant. Quibus tunc præcipue utendū est, dum sanguinē per urinas purgare uolumus. Cerealia omnia generaliter appellantur legumina. Quę uerò manu leguntur, speciatim dicuntur chedropa: sicuti & frumenta, quę falce putantur. Trincū igitur firmissimi est alimentum illiusq; crassum admodum gignit ac lentū. Quare illo simpliciter elixio nō est uescendum: nam cõcoctio uis renititur, & crassum succū producit. Sola autē ea preparatio est probanda, quę sermento consistat, sale, & chibano. Paulò deterior quę minoris furio. Triticum quod graue est & densum, ac in profundum flauum, copiosissimè 10 alimēti est, crassiq; succi ac leni. Contrā quod leue est, & rarum, & allum, minus nutrit, succumq; gignit crassum minus, ac lentū. Similago autē & alica, multū alunt, crassiq; sunt succi, ac leni. Verū similaginem quidem nō conuenit eos amingere, qui extenuante uictu uiuunt. Alica uerò possunt uesci moderatē, tum sola quę incocta, tum uerò cum multo, aut uino diluta, ita uoq; ac tenui, quodq; uiribus Falerno sit proximum. Licebit etiā miscere tum betas tritas, tum anethi nō nihil, uel porri, uel pulegii, uel calaminthes, uel hyssopi, uel pipera. Psilana autem ipsa per se nō nihil absterget, ut hyssopo nō magnopere egeat. Mel psilanz immiscere opus nō est, nisi quis ea quę in thorace ac pulmonibus continentur, studeat expectorare. In hepatis uerò ac lienis affectibus ipsum admiscere nō conuenit. Hordeacei panes, quouis illi modo parentur, exigui alimentum sunt, succumq; crassum, ac flatus minimū generant. Polenta uerò, similiter ac panes, nutrit: nisi quod siccatur magis, propterea quod friza existit. At farina est utriusq; humidior, excrementosiq; magis ac flauulenta, & potissimū si cum lacte coquatur. Ex typha porro & lauena, panes similiter cõficiuntur, qui & aegre coquuntur, & succum reddunt nō probum. Inter hæc & trincum, olyra medium locum sortitur: nimirū tantò deterior trincis, quanto his melior existit. Quod uerò ad zeam pertinet, non arbitror esse aliud frumenti genus, ab olyra & typha diuersum: sed exustum, id quod nos appellamus typham, a ueteribus zeam appellari. Quod semen ubi a cornice spoliatum fuerit, trincis, hordeo, & olyra, longē tenuius atq; exilius existit. Flauum præterea est, ut trincis. nō autē album, ut hordeū.

Fabę minus quidem quā hordeū terget: uerū sunt concoctū diffuciles, atq; admodum flauulente. Fabis pisa aut omnia sunt præstauriora. Erutile uerq; & dolichis, & phascoli, multo fabis sunt deteriores. Lentēs autē tamenq; succum crassum gignant, non omnino tamen sunt aspernandę. Lupini faciles sunt lentibus, nisi quod multum siccant. Ciceribus est flauulentus, & concoctū diffucilis, atq; excrementitius: ad mouendas tamen urinas cõmodum. Erui boum magis q̃ hominum est alimentū: incidendi tamen facultate insignitur. Vnde & ex eo medicamentū paratur, quod in ijs quę in thorace laxent expectorandis, nullū est secundū. Farnogræcū nō in cõmodē alui deſcendēdę gratia, aut alios cibos sumitur. Cum melle quoq; eius succū exhibent, ut qui cal faciendi ac detergendi uim habeat. Quod tamē caput tentet, usus eius multus cauendus est. Pruna Damascena hydromelite incocta, præmendantur q̃, quibus extenuante uictus ratione est utendum. Verū his magis alui deſcunt, quę ex Iberia exportant. Ventre præterea subducūt echini marini, & concharū omniū atq; annoſorum galinaceorū uiscula. Panicū & milū prauū sunt succi, flauulenta, & diffucilia cõcocta. Nam alui suorem impense siccant. Hortenses lobi cibo adaperantur: crassi tamē, pirituosiq; sunt succi. Ex framentaceis cibis solū hordeū, tenuanti uictui est innoxii. Secundū hoc sunt panes clibanitz, qui ex trincis fiunt. A reliquis abstinent deſcēdo. Ex piscibus faxatilibus, non tanisq; auiculis, multū copiosumq; potiores alimentū ad tenuantē uictum accommodat. Animalia siquidem quę in stagnis ac locis aquosis & campestribus degunt, humidiora sunt, atq; excrementitiora: quę uerò in montibus uiuūt, omnia sunt tum sicciora, tum calidiora tēperie: eorūq; cario minimū pirituosa ac uisida existit. Quare animalia omnia in montibus nata, multo ijs quę in locis oriuū planis, sunt præstantiora. Mandēdę etiā sunt aues cę, quę in turribus uineisq; agūt uitā. Quare columbę turricolę domesticę sunt meliores: tum etiā pari modo & apri, si uisus domesticis: atq; ut in summa dicam, omnia quę exercent, ijs quę sunt ocioſa: & quę cibis siccioribus, ijs quę humidiorib; arant: & quę purū ac tenū ætrem inſpirant, ijs quę cōtrariū, ad tenuem uictū sunt præferendę. Etenim suū domesticorū cario omniū aliorum ciborū firmissimē nutrit: plurimū tamen habet lentoris. Quidd si is qui talē uictū requirit, fese multū exerceat, licebit ei & auribus, & rostris, & pedibus suis uis uentre præterea, & matrice, si modō ea elixa bellē fuerit. Qui autē uitā in maiori ocio degunt, abundē eis fuerit montanis auibus uesci, & piscibus faxatilibus, ac breuiter omnib; quę carē habent simul mollem atq; friabilem. Nam ab ijs quę aut dura habent, aut lentā, omni nō abstinendum est, nisi aliorū penuria nos aliquādo talia esse cõpellat. Porro anguilla, & molium pisciū pare maxima, tamenq; carnē mollem forſanunt, quod tamen succo leno ac pirituoso redundent, ijs qui uictū tenuante un uolūt, plurimū noxia est. Hirci autē & boues, carnē quidē habent satis friabilem, nocēt tamen propter duriciem, & in alterando diffucilem. At sola car-

Faba.

Pis. Erut. Dolich. Phascol. Lent. Lupini. Cicer.

Eruiou.

Farnogræc.

Pruna Damasc. Erut.

Pruna Iberica. Echini marini.

Panicum. Molium.

Lobi hortensis.

Hordeum.

Zevantes piscis. Bientana auicula.

Miltana anima la cæpistrum, omnia esse calidiora tēperie, atq; ob id præstantiora.

Columba turricola, domesticus præstantior.

Apri sunt meliores si uisus domesticis.

Tenuis uictui quę animalia edocui magis. Simla carnes.

Anguilla uictui tamen aspernatur.

Hircina carni. Bubala.

Torpedo.
Torror pīū.
Ariet.

Hadina carnes.
Agvina.
Equina.
Afina.
Paridū car-
net.
Vfina.
Leuina.
Cervina.
Leporina.

Sanguis in co-
lorem videtur nō
esse ficuti neque
visibilis.

Canina carnes.
Valpina carnes.

Tegre galinaci
trunc vltus nō
congruit.

Perdix nō esse
mandanda re-
centes, pīū quā
nam dicitur fa-
stidia pīū.
Palomb.

Perdix tur-
res, affertur
nam dicitur, ut
habet vltū.

Olerum omniū
radices excre-
mentitae sunt.
Rapa.
Babō.
Fuagi.

Radices gustan-
da ad tenet vi-
ctū astringen-
tes sunt.
Fructus tenui
visu ratiōis
apē.

tilagineorum torpedo & turtur laudantur: pos-
sibile nonnullū in faxatiliū penuria ē uti. Ex ter-
restribus uero animalibus, iurci & arietes, & ge-
nus omne ouis caprarū, non uiquequā sunt
alimēti laudabiles. Solus autē hōrū innoxius utē-
ris. Agnorum eius propter insignem est humidi-
tatem fugiendum. Eorum & asinorū uisus, ho-
minibus asininus: ut pardorum, & ursorū, & leo-
num, hominibus tantū feris permatro. Proxi-
mi sunt asinis cerui, eoq; ab eorū esu abstinē-
dum. Caro autem leporū, ad aliam uictus ratio-
nem siccantē est, nō ad propositā, cōmoda: san-
guine enim uehementer crasso producit. Sanguis
omniū animalium in cibo uti uidus, & mul-
to adhuc magis in tenuitate dixit. Pari modo si
uisceribus est abstinendū: sunt enim excremen-
tina, difficilia concoctū, necnon crassi succi.
Canum & uulpium carnem equidem nunq; gu-
stauit: tamen ea animalia siccō temperamen-
to. Vt autem suum extremis partibus uisci ali-
quando cōcēsimus, ita & uti gallinarū alas per-
mittimus: testes tamen & uiscera tenuanti uictui
non competunt. At corporum gallinarū esum,
si quis exerceatur, nō uero: potissimū earum,
quæ in montibus enutritæ fuerint. Qui uero nō
exercentur, mandendæ ei erunt modicæ, non mo-
do gallinæ, sed columbæ etiam ac turtures. Cæ-
terum nec recens turtur, nec perdix mandanda
est, nec alia omnia, quæ carnē habent moderatē
siccā: sed ubi unum diem ad summum suspē-
denda, ita demū edas licet. Porro palumbes, præ-
terquam quod carnem habet columbæ, perdū-
bus, nutritibusq; duriorē, etiam concoctū dis-
ficilem, excrementisq; fortitur. Perdices uero
ac turtures nec durissimā habēt carnes, sed
concoctū difficilem, nec prauo fuso referatas: nec
ipsarū durities, si mortuæ uno die asseruerit,
facile uincitur, suntq; omnino friabiles, atq; in-
culpata. Alimētū autem dant corpori laudabi-
le, sanguinemq; minime uiscidum generant, &
crassi ac tenuis medium. Proinde quibus salu-
bris cibus curæ est, eos, ut arbitror, un his con-
uenit. Olerū omniū radices excrementitæ sunt,
& concoctū difficilem: a duersis imz autē sunt ra-
pæ. His paulo minus aduerū sunt bulbi. Omniū
pīssimi fungi existunt. Itaq; eorum omniū quæ
gustū nullum morsum, nec acrimoniā, nec ca-
lorem referunt, radices suspēctas habere oportet.
Quid iam olera memorem, quorū nō solum
radices, sed etiā germina, stipitesq; ac folia, suc-
cum gignunt a modū pituitosum? Solæ itaq; hæc
radices acres & calidæ sunt gustandæ, ut allia,
cepe, & radicular, ceip pro pīssimacis potius q;
pro alimentis habendæ. Quod uero ad fructus
pertinet, rei propositæ minus sunt noxi, qui uen-
tem lubricant: ut mora, pruna, cerasia, & ficus.
Deteriores autem sunt qui tardē permeant, maxi-
mē si cōsistentia sunt duræ: in quibus prorsus est
temperandū. Mandendū autem qui ad reponē-
dum sunt apti, qualia sunt pira, cydonia, & ple-
raq; uuarū genera. In quibus molliora potius
quam duriora mandenda sunt. Nemo tamen ul-
lo horum ad sanitatē utitur: quemadmodū neq;
pomis, nec perficis, nec Armeniacis, quæ latinis
præcocia appellant: & q̄s multo adhuc minus,

sericis, quæ nocant, & myrtis, & alijs eiusmodi.
Pari modo nec mēpilis, nec forbis: quibus tamē
rectē quis ad alia utetur. Summatim uero quæ
uehementer sunt austera, & pontica, huic sunt ui-
ctus rationi adueria. Soli autem uentris fluxui,
aut uentriculo stomachoq; imbecillis, cōferunt.
Porro inter ea quæ in hyemem feruari possunt,
caricæ ac noces tum ad id sunt accommodatissi-
mæ, tum etiā nihilominus ad tenuem uictus ra-
tionem. Pistacia præterea, & amare amygdala,
handquaq; sunt improbandæ. His duriores sunt
nucis ponticæ, nullamq; abstergendi ex uisceribus
excrementa uim possident. Castaneæ uero,
siue eluxentur, siue assentur, siue etiam frigan-
tur, temper sunt prauæ: & multo magis, si cru-
dæ mandantur. Oliuæ, quod quidem ad propo-
sitam dixit attingit, medium quodammodo
sunt edulium. Quæ uix in uinacis conduntur,
uentriculi quidem imbecillitati conferunt, præ-
sentem autem scopum nō item: & his adhuc minus,
quæ in uinis seruant. Vix passæ si astringentes
nō sunt, timentibus lieni & hepan nō cōducūt:
thoracis autē ac pulmonis affectibus auxiliant.
Noxia etiam sunt malla punica, si fuerint ponti-
cæ: imbecillū tamē uentriculū iuuant. In sua
uero, duri omnes ac pontici fructus, sunt prauis:
reliquis autē moderatē uti poteris. Quod si quis
existat, qui in uarijs q̄s partibus sapores habeat
diuersos (mali enim citri cortex est acris, acida
autē pars intima: at caro, tum pituitosa, tum cras-
si succi) partibus quidem acide & acres fumenda,
ab alijs autē est temperandum. Quæ in aceto &
aliqua condunt, ea tantū a pristinis uiribus esse
immutata putanda sunt, quantū a cōditura alte-
rata fuerint. Quamobrem cum acetum & mu-
cia palam ex eorum numero sint, quæ incidunt, te-
nuantiq; certē pīces aridi exuicq; qui in illis cō-
dit fuerint, humores crassos ac lentos attenua-
bunt uehementer. Eligendū tamen sunt, qui natu-
ra carnē mollem faciunt: fugiendū uero cetacæ,
& eis adhuc magis ipsa cetæ. Præterea suilla exu-
catur adhiberi poterit: quæ utiq; alioqui esset
utanda, ut quæ succū crassum ac lentū generet.
Mel nō modō est ciborū omniū dulcissimū, sed
succū etiā cōsistentia tenuissimū gignit. At uina
quæ admodū dulcia existūt, omnia crassum san-
guinē gignūt: nigra namq; hæc sunt, & cōsisten-
tia crassa: & q̄s adhuc magis sapa, quod est mu-
stum plurimū cōtūt. Porro ficus exactē maturæ,
nec succos euidenter cōdēfant, nec tenuit. Aliq;
uero omnes hoc genere sunt inferiores. Quæ ui-
na clara sunt & pellucida, coloreq; pallida & flaua,
ea forte minimū dulcia inueniunt. Præterea nul-
lum albi dulcis cōperes: quemadmodū nec flauum
quoduis admodū dulce exiit. Quæ uero
crassa sunt, nigraq; simul & dulcia, crasso sangui-
ne uenas referunt. At alba simul atq; tenuia, hu-
mores crassos incidunt, & sanguinē per renes ex-
purgat. Quæ autē inter hæc cōsistentia sunt me-
dia, ut sunt flaua simul ac dulcia, & splēdida, ea ui-
na neq; ut crassa sanguinē crassum generat, neq;
ut alba per urinas seccat. Ceterū Ariusui unū,
Lesbiū, Falernū, & Tmolites, ubi cōmendant:
quæ quidē sanguinē bonū & cōsistentia medio-
crem gignūt, hæc quæ odores atata sunt, & ceteris na-
ludora

Tenui uictui ra-
tioni quæ sunt
adueria.

Cerica.
Noct.
Pistacia.
Amygdala.
Noci pontica.

Castaneæ cras-
si generis sue
sunt.
Oliuæ.

Vinæ.

Vinæ passæ si
astringentes ad
sint, non cōduc-
untur: & he-
pan tunc ferui-
bund præstet
thoracis affectu-
bus.
Punica malla.

Cetrum malla
est quibus cas-
sis partibus.

Arri suilla
Mora facultat.

Mel.

Vina dulcia.

Sapa est mūstū
plurimū cōtūt.
Ficus exactē ma-
turæ.

Vinum aliquod
alium nec repo-
rit dulcis.

Vina crassa, ni-
græ, & dulcia.

Vina alba & te-
nua, sanguinē
per renes expur-
gant.

Vina odorata
caput tentant.

lidiore, merito caput tentant: quocirca vitanda
ijs sunt, qui cephalæa, aut hemicrania, aut cepha-
lalgia, aut morbo cominali, aut denique mania la-
borant. Affectus uero omnes thoracis ac pulmo-
nis, qui diuturni sunt, & sine febre infestant, à ui-
nis huiusmodi iuuant mirè in modum, & potissi-
mum qui humoris per spura expectoratione pur-
gantur. Siquidem quæ uina sunt crassa & dulcia,
propterea quòd humiditatè possident crassam, &
ob id perdurant, in thoracis ac pulmonis af-
fectibus, si cum tenuioribus medicamentis su-
mantur, multum adferunt còmodi. Verum nec acer-
bam, nec austeram, nec omnino astringentè uim
eis inesse oportet: sed ad mellèam magis, odore,
gustum, & facultate, spectare ipsa expedit: ac tale
sanè est quod Timolus dicitur. Porrò uina Pon-
ticæ multum implent, ac tardè permeant, ambasq;
excretiones morantur: tum eam quæ sit per se-
dem, tum etiam quæ per uesicam: hærentiq; in hy-
pocondrijs diutissime, & facillè accedunt, nau-
seamq; prouocant. Soli autem uentri fluenti cò-
ferunt, idq; sit moderate sumantur.

Vina crassa si-
mul et dulcia,
cum profuit mor-
bi liberatio.

Vina pontica.

GALENI PERGAMENI de cognoscendis curandisq; animi affectibus, liber Vnus.



Ecce quidem hominù à falsà opo-
nitione proficiscitur affectus autè, si-
ue perturbationes, à uis quadam ra-
tionis experte, quæ minime rationi
obtemperat. Etenim cernimus cun-

ctos homines existimare seipsos aut esse omni-
no sine peccato, aut paucis exiguisq; rebus rectè
rationè offendere. cum ab alijs forte omnium sta-
gitiosissimis libeantur. Quicunq; igitur alijs per-
misit, ut de seipsis serrent sententià, ac iudica-
rent qualès nam essent, eos in paucissimis abere-
rare solutos animaduerti. At quicunq; seipsos opti-
mos existimant, nec alijs iudiciū suspensoriæ re-
re permisit, hos contrà, & in maximis rebus,
& in plurimis offendentes còspexi. Quamobrem
merito còmendatur illud præceptum Pythii, quo
iubetur unusquisq; seipsum cognoscere. Is tamè
solus qui sapientissimus est, perfecte seipsum co-
gnoscere poterit: reliquos autè omnes, perfecte
quidem nullus, alius autè alio, & magis & mi-
nus. Quod enim in uita uniuersa & uis artibus
omnibus cernimus, ut magnas quidem atq; infi-
gnes rerù eminentias discernasq;, unusquisq;
facillè possit discernere: exiguas autè ac tenues, q;
duntaxat qui & prudentes sint, & ipsarum artium pe-
ritiam quoq; in peccatis affectibusq; solet usu
uenire. Siquidem perturbationes maximas uni-
uersi facillè deprehendunt: mediocres autè & leues
& quæ etià correctionè desiderant (tamen si eas
utant, propterea quòd parue existit, magis sit
arduù) nò item omnes agnoscunt. Quisquis igitur
uelut honestus atq; probus euadere, is cogita-
bit necessu esse, ut plurima à se peccata sua igno-
rentur. Nam cum duplicè manticam (ut ille Aesop-
us azeb at) collo fuscissimè geramus, unà qui-
dem ante pectus aleniorà, alterà uerò à tergo,
nostrorù criminis plenà: aliena sanè spectamus
semper, propria autè cernere nunq; possumus;

Pecata à seipso
agnoscere nullo
modo uide
possunt. Error cernimus
hominem.

Pythium præ-
cepum.

Sapientissimus
solum seipsum per-
fècè posse cognos-
cere.

Perturbationes
maximas facile
deprehendi ab o-
mnibus, imo a
scem nequaquam.

Duplicem nos
manticam col-
lo fuscissimè ge-
rere.

Pecata ab alijs,
quodam nobis
clariora possunt
à nobis.

Etenim quicquid amat, ut inquit Plato, cecū est
erga eam rem, quam amat. Ac proinde si nostrum
quis seipsum omnium maxime diligit, unus-
quisq; nostrum erga seipsum maxime circutur
est necessarium. Quomodo igitur propria mala
inspiciet, aut se peccantem intelliget? Si ante om-
nia se ab affectibus liberarit: quidodoquidem par-
est ab ijs non derentes, semper falsà opinari. Sūt
autem animi affectus, quæ omnes nouimus, ex-
candescētia, ira, timor, meror, inuidia, uelēmētia
cupiditas, ac denique alius rei excellens amor,
aut odium. Quare probè dictum est illud, men-
suram esse optimi: tanq; nū rectè fieri possit sine
illa. Quomodo igitur quis ista unq; eijsit, nisi
prius ea se habere cognouerit? At uerò ut quis co-
gnoscat, fieri nō potest ob phantasiā. Si igitur
ratio tibi hæc nō permittit, ut de teipso iudices:
at salte ut de alio, quæ ueq; ames neq; oderis, iu-
diciū feras, tibi non admittit potestatem. Cū
ergo audieris in urbe quempiā à multis laudari,
quod nullus hominibus aduleter: tunc ipse, ubi
ad illum propius accesseris, num sit talis, qualis
unq; perhibet, huiusmodi periculū fac. Primū,
si uideas ab eo frequentari ædes magnatum, ac
principum, nō existimes illum fore ueridicum.
Obsequia quippe istiusmodi, mendacium sequi
còsueunt. Deinde, siue id genus hominū salutar-
tem, siue illi seipsum comitem exhibentem, cò-
uiniq; ue illorum ac carnis in genere còspicias,
non solum nō ueracem, sed omnis etiam nequi-
tiz alumnū illum talem esse ne dubites: quip-
pe qui ut pecuniarum, aut principum, aut glo-
rie, aut honoris cupiditate nrahatur. Quem ue-
rò nec salutare, nec comitari id genus hominū,
nec cum ualde potentibus cenitare, sed frangi ac
temperato uictu uti solum indies magisq; cò-
peteris, speraueris tibi uera dicturum, conare
hunc quoq; profundius altiusq; cognoscere, ut
scias cuiusmodi tandem sit uita, quæ cognitione
ex longiori cum eo consuetudine comparabis.
Quod si talem offenderis, qualè ipsum forte spe-
raui, seuoca aliquando liomine, rogaj, ut si quæ
tibi ex illis animi affectibus turbulentis inhæ-
re notauerit, continud admoneat, teq; illi maxi-
mam habiturū gratiam, existumaturumq; ab
ipso magis seruaturū, quàm si corpore agrotantè
sanasset. Quod si ille recipiat se facturū, compri-
mum aliquo tibi uino te laborantè insepserit, ac
deinde longo temporis intervallo interiecto, ni-
hil dixerit, accusa hominè, rogaj iterū aliquan-
tò blandus q; prius, ut quicquid talium per tur-
bationū in te residere animaduertit, ilicò tibi
significet. Qui si tibi respondeat, propterea se ni-
hil tibi dixisse, quòd tali tēpore nihil in te istius-
modi deprehendit, ne ob id quidem còtinud
illi fidem adhibeas: ne uel existimes te repente o-
mnino euasisse inculpabilem, sed diuor alterum
in causa esse, aut negligentiæ amicū fuisse, aut
illum redarguenti uerè cuncta impediri, tacui-
se, aut etiam nolle tibi in odium uenire: cum haud
ignarus sit, omnibus (ut ita dicam) hominibus
hūc morè esse, ut eos oderint, qui uera loquant.
Aut si nihil horū est, scito hominè propterea ta-
cere, quòd nolit tibi prodesse: aut ob aliud quip-
piam, nempe q; nō sibi obseruanda putauit, quæ

Amant omnes,
esse carum erga
eam rem, quam
amat.

Quisq; seipsum
omnis maxime
diligit.

Affectus animi
qui.

Mensuram esse
optimam.

Phantasia.

Veracem esse non
posse, qui mag-
natum cōm per-
sequantur.

Methodus cognos-
cendi uita d-
leuati.

à te perperam agitentur id quod certe non probro. Est autē sapiēs omnino à peccato immunis: ac proinde sapiēti, non hominē, sed Deo similem sapiētē esse dixerunt. At tu repēte Deo similis nunq̃ effici poteris. Ceterū si ci qui te reprehendit grātia egeris, post autē diligenter tecum expendēdis, uerē ne te ille, an falsō increpauerit, ex ea re senties te magnū percipere utilitatem. Si uerō idem assidue egeris, tibiq̃ animus sit ad meliōrē frugē te moresq̃ tuos componere, facile absolūtas euasies. Ceterū hac fit tibi exercitatio praecepta, ut cum alumnias & contumelias te quo animo feras: quod ubi feceris, atq̃ sedatus fueris, habuerisq̃ tuas perturbaciones perspectas, tum aggredditor rēspōdere alumnias tibi: quorū auditis ratiōnibus, q̃minutissime cum eis lites tuas cōponas: atq̃ irā rem omnē agas, ac si pēdagogis mox sis redditurus ratiōnē. Porro si quis tui uel apprimē potens, uel opulentus, qui uelit in uirū egregiū euadere, habereq̃ admonitores liberos, necessum est illā maiestatem relinquat, his praesertim temporibus, in quibus nullus adest Diogenes, qui uel opulentissimo Principi, uel alicui Monarchae sit ipsam ueritatē dicturus. Iis autē monitoriōibz duntaxat credendum est, qui & inculpatissime uixerint, & etate prouecti sunt. Cū autē nullus sine peccatis, aut sine affectibz uiuat, uel si optima quis natura sit praeditus, sed necessum sit unūquēq̃ labi & errare in aliquibus, eoy enim magis, quō iunior quispiū fuerit, haud dubie quisq̃ nostrū exercitatio

Sapiens est omnino à peccato immunus. Sapiens Deo similis.

Contumelias effo aquo ferdas animo.

Temporū furorū deplorat in felicitatem Galenus.

Exercitationem per totam uita requirit, ut quorū perfectior datur.

Iracundiam si non uincat, aut certe non possit reprimi à nobis.

Calore in feruor benignitas.

nunq̃ sibi quicquam laboris assumere. Ergo nec tuis ipsius manibus feruum credas, nec quandiu iratus fueris, alii ut id faciat imperes, sed in posterum differas. Postquā enim furor refrigeratus fuerit, prudentius, temperatius dispicies, quor uerbis, famulus plectendus sit dignus: nisi forte melius esse uideatur, initio statim concessa uenia, negociū ipsum transigere, & ubi lozum afferri iusseris, tum uerbis duntaxat corrigere, minitarisq̃, non amplius condonaturū, si rursus ille idem scelus paratit. Praestat itaq̃ te facere omnia que facis, ubi impetus ille animi deferbuit: quo tempore iam ratione opitulante, punitionis modum sis inuēturus: cū nimirum impetus irascentis nihil ab infania, uel à furore differat. Quamobrem à ueteribus haud immeritō animi affectus hac quinq̃ appellata fuerunt: mōtor uidelicet, ira, exandescētia, cupiditas, metusq̃. Singulis itaq̃ diebus atq̃ horis habere hanc in promptu opinionem oportet, quod praestet quidem unumquēq̃ scire exhibere dignum, qui egregius ac frugi ab omnibus appelletur: hoc autem fieri nō posse ut contingat nobis, nisi cum, sit singula errata indicet, censorē à monitoriōemq̃ habuerimus: quem sanē ipsum nostrorū peccatorū iudicem, & seruatore nostrum, & amicū maximū existiāre conuenit. Qui quidem & si tibi uisus fuerit aliquando falsa crimina obicere, ne ob id quidem irasci oportet: & quod multo melius quā tu, ille singula peccata tua perspicere possit. & quod licet falsum quandoq̃ tibi crimen obijciat, in eo tamen tibi sit utilis, quod te ad eorum quae agis diligenter obseruationem excitet. Curabis autem perpetuū, ut q̃ dignus sis, quantūq̃ facies, à teipso, non ab alio, accipias: habensq̃ in memoria semper, quanta sit eorum qui irascuntur, deformitas animi, quantaq̃ rursus uenustas eorum qui sine ira uiuant. Omnibus accusandi

Furore refrigerato prudentius sit modis famul.

Irascens impotens uult ab ira fama differre. Affectus animi quinq̃.

Irascendum de formitas animi.

Quisq̃ nō alios modo, sed ipsū etiam debet uereri.

Appetitoria facultas afflicta & opera.

Libido non reddis famulus bellus agrestibus.

Libido qua ratione castigari queat.

30

30

40

50

60

te ipsum potestatem facias, gratiamq̃ habeas nō adulantibus, sed obiurgantibus potius. Patente autem semper domicilij tui fores, ut liceat notis ac familiaribus omni tempore ingredi: cūm sit affecto, atq̃ omnia rē facienti, uerendum tibi non sit, ne ab ingredientibus aliquo magno scelere implicitus deprehendaris. Volo itaq̃ ut modō alios omnes, sed teipsum in primis etiam uerearis, illisq̃ auscultes qui dixit: Omnī autem maxime tuipsum te pudeat. Quod sanē si feceris, poteris quandoq̃ expertem illam rationis uim, qua exandescimus, quasi seram quandam reprimere, mansuescereq̃. Vt autem longē turpissimum est, hominem iracundia periclitum intemperanter aliquid agere, sic etiam ob amorem, uiniq̃ & crapulae cupiditatem: quae omnia facultates appetitoriae sunt affectus & opera, ob quae homo non iam equo uel cani, disciplināe capibus, euadit similis, ueluti ob illa priora, sed uel petulantī apro, uel hirco, uel cuiuspiam agrestis bellu, quae mansuesci non possit. Quocirca libido hac perducā ob obedientiam non potest, quemadmodum illa poterat: castigari autē quodammodo potest, si rebus potui ac frui prohibear, quarum appetens est. Nam si potiar, crescit, maioriq̃ ac uelientior fit. Siu castiget, tenuis

tenuis atque imbecilla redditur, ac sic imbecillitate coacta, non ultro, ipsam ratione sequitur, ueluti quoddam mancipiū. Duplex itaque in nobis est animi uis ex parte rationis: una, cuius & citò excandescere & irasci est officium: altera, quæ ad id quod ipsi iucundum, suauisq; uisum sit, præcepserunt, anteq̃ unilè ne sit atq; honestum, in noxiū & turpe, cognorū. Hanc igitur, quæ uehementissima est, cohæbere actum oportet, priusquā ubi incrementū acciperit, uiribus inuicta iuxpugnabilemq; se exubeat: tunc enim uel si uolueris, non poteris illam cōpescere, sed dices (quod audiui olim quendam amantē) uelle te quidem desinere, at nō posse. Quippe ut nulla corporis uirtus propter magnitudinē insanabilia sunt: sic uis illa, cuius est temerē cōcupiscere, plerumq; amore accendit insanabili, nō corporum modō quæ sunt formosā, aut rerū quæ pertinet ad uenerem, sed etiā crapulæ & uolentia, itemq; obscenitatū quæ præter naturam patrantur. Quæ igitur de ira & excandescētia uincenda dixi, eadē pura de alijs affectibus me dixisse. Quæ omnia tibi sæpius reuocāda in memoriā sunt, quod si nō possis tam crebrō, at saltē matutinis horis, semper anteq̃ aliquis eorū quæ acturus es aggrediaris, & expectaris anteq̃ cubitū eas. Ego siquidem cōsueui admonitiones has, primū quidem bis legere singulis diebus, post uerō etiam ore enunciare. Neq; autē fat esse putes ab ira una de raxat liberū te conseruare, nisi enī ab omni edacitate, uolentia, nequitia, curiositate, & inuidia, te purū integrumq; cōserues. Nam nec propter finem decet, forisnū inlitar, totum calicem exhaurire: nec propter famem in cōspēctu omnīū, insatiabiliter ipsum uentrē explere: sed danda opera est, ut omnibus uia cōtēnābus, minus obsequi assuamur, & ab cibis quam nimis irritantibus abstineamus: moderatē interim uiscētes ijs, quæ salubria habent. Progressū uerō tempons, ne recipere quidem te ad conuiuantes uelim * (magnū quippe nō fuerit, si in cibo & potu illis continentior esse uidearis) uerim, si hoc honore te afficere decreuisti, cura sedulū, ut continentius uiuas hodie q̃ heri. Quod si feceris, senties haud dubie te indies ab ijs, quæ dixi, multo minori negotio abstinere: maximalē perfundēris læntia, si quando uerus modestus, temperantiaq; amator existeris. Sic enim gaudet, qui quicquid in ea re promouet, cuius amore flagrat. Hanc enim si ingrediamur uis, nō sanis esse putabimus, si pliusquam dissoluti homines consecuti sumus modestus, probitans, & continentis: sed primū quidem eos qui huic student uirtutibus, superare conabimur (est enim hæc concertatio atq; æmulation pulcherrima) post uerō, etiā nos ipsos: idq; memores semper pulcherrimorū dictorū, quorū uel hoc in primis est unum: Delige optimum uitæ genus, quod reddet consuetudō iucundum. Quemadmodum igitur cūm te aduersus iracundiā exercere iniebam, tum argumēto uti poteris, te aliquid profecisse, quod nō amplius te excandescētem cerneret: ita in ijs quæ ad modestiam pertinent, hoc indicio intelliges quantū profeceris, quod nec cupiditate quidem suauissimarū rerum tangaris, Ceterū ad mo-

destiam una est uia per cōtinentiam. Hoc siquidem modestus superat continentē, quod ille nec cupit quidē amplius nitantes palatū cibos. Labonola tamē ab imino uia hæc est & aspera, quæ admodū cæteræ omnes honestiorū studiū exercitationes. Verūm si pro malitia cupis habere uirtutē, ac pro uoluptatibus corporis, tranquillitatem animi: per cōtinentiā, ratione duce, ad modestiam cōtendas oportet. At uerō & cōtentionis, & gloriæ, & principatus appetitio, animi planē est affectus, læcet illis tam diū minor. De inuidia autē quid attinet dicere, cūm omnīū sit uiniūm sociūsimū? Est enim inuidia, dolor ex alienis bonis conceptus. Sic itaq; id genus affectus omnes sunt dispungendi, ut ne radicē quidem eorū ullam in nostris animis relinquamus. Nam ex ijs quæ sic relinquunt, solet rursus aliquid pullulare, dum idipsum & nequitia & prauitate irrigatur. Porro natura in puerili etate ad uitam periclandam, in cunctis plurimū potest: secundū autē loco, studio, exercitationisq; disciplinā. Ceterū ipsa puerorū ingenia plurimū inter se differunt, cūm alia magis, alia minus uirtutes ipsas sectentur: omnia tamen sunt uel maximē ad affectus propensā. Verūm educatio puerorum, si melis quodāmodo est sedulitati, que in plantis aliendis uritur. Siquidē, uel si optimus sis plantarū sator & cultor, nunq̃ tamen efficies, ut rubus uiam producat, quod natura illius talem a principio perfectionem capere nequeat. Rursus uires, quæ, quod ad ipsas pertinet, fructū ferre paratæ sunt, si neglexera, reliqueriq; soli naturæ curandas, aut multo deteriores, aut planē nullum edere fructum animaduertes. Mali autē ingenti quadam felicitate cōgit, ut patrem ab omni iracundiā alienum, huiusimū, frugalissimū, humanissimūq; lia betem: at matrē uisq; adeo iracundū, ut interdū etiam morderet ancillas, semperiq; uociferaretur, & cū patre contenderit, idq; longē quidem odiosius, q̃ Xantippe illa cū Socrate. Inter omnia porro admonēbat me pater, ut à nulla scēta cognomen sumerem: sed illas perpetuō artes edificerē, per quas iustitiam, modestiam, animi magnitudinē, atq; prudentiam consequeretur. Laudant autē me (dicebat mihi) uirtutes has cūctis, tamen si sub ijs sint onisci, nullam se hārū habere: dantiq; operā pro uirili, ut alijs appareant fortes, modesti, iusti, & prudentes. Vt uerē autē maioris sint atq; tristitiae expertes, uel si minimē tales esse uideant, id magno studio cōtendunt. Quare enī huic à me rei in primis studendum esse, cui omnes mortales student, præ ijs omnibus alijs uirtutibus, unū hoc querendum suadebat. Quæ documenta paterna in hanc usq; diem retinens, nec ullius scēti nomen claturæ me addixi, neq; ob ullam fortunæ uicissitudinē fui perturbatus animo. Quippe assuesceci me pater gloriā & honorem cōtinnere, atque eam tantum, tamq̃ nudam ueritatem suspicere. Suadebat etiam, ne ob ullam pecuniæ iacturā maiore afficerer, quandiu quæ reliqua essent, ad curandum corpus sufficerent. Hunc enim primū finem illis quæ possiderent, statuebat, non elarere, non algere, nō sitim pati: quod si cui plura suppetere, quā horum usus

Animi uis ex parte rationis est duplex.

Concupiscētia fecundat immo durat.

Edulencia esse sibi ex salubritate.

Continentius uiuere esse hoc quod in uia.

Gaudens qui in uia promouetur, cuius amore flagrat.

Concertatio pulcherrima quæ dicitur.

Consuetudo reddi iucundā, optima uia generosa.

Viam ad modestiā esse uiam, per cōtinentiā. Modestiaque iure cōtinentem superat.

Via quæ ad uirtutem ducit, est laboriosa.

Inuidia est animi uiniūm, uel dolor ex alienis bonis conceptus.

Natura in puerili etate quantū uirtutes educere potest, ad morem formā dat.

Eueritia diffinitur, plerūq; pueri possit ad uirtutem adipsam ducere.

Puerili ingenia omnia esse ad affectus propensā. Puerorū educationem esse finem, uel cultura plātarum.

Calanus patrem suum laudat, q̃ eorūq; decemq; ab eo de uia.

Calani uerē atq; iracundi.

Calani emulatio.

Disciplinam per se finem q̃ sit.

postulat, ipsi sane a deas res agendas, quæ lionefice essent, esse utendi dē cenſebat. Nec me latet (ait bat ille) te fortunatū plus duplo quā ipſe habeam, poſſidere, in noſtraq; hac ciuitate nō mediocri honore eſſe prædiſt: ulque adeo ut quānam mororis tibi cauſa futura ſit, nullū uideam, præter inextplebilem ac ſummā quādam cupiditatem. Comparatū autem inſatiabilem illam habendi libidinē, uoracitati uentriculi, quā plus quā ſatis ſit, ciborum ingeritur. Etenim cibo, ut dicebat, nulla alia cauſa egemus, niſi ut alamus corpus. Nutrit uerō corpus, ſi bene concoctus fuerit: bene autem coquetur, ſi modicus. Nam ſi immodicus fuerit, concoctionē nō expectat, ſed uſus ipſus corrumpitur. Siquidem aut deiectus per inferiora, proſuſionē alui excitabit: aut diſtributus per uniuerſum corporis habitum, malum intra uenas humore gignet. Quę igitur in corpore diſcedit, ad animū licet transferas: cuius inedia uita cupiditas, plura perpetuō expetit. ū ipſe uſus poſtulat, unicuique omnis mororis atq; triſtitie eſt cauſa. Ea namq; accenſi nōnulli, qui præſentū rerum inextplebiles ſunt, nunq; concupiſcere deſinūt, ſed ſi duplum quāpiam habent, triplū illo ſtudent acquirere. Triplum naſti, quadruplum appetere incipiūt. Qui quidem nunq; ſibi proponunt eos, qui pauciora poſſident: ſed illos tantum, qui plura: quos etiā ſuperare conſtit. Quāq; certē multo ſatiore eſt eum in eo ceteris antecellere, quōd ipſe quæ nunc habet, ſit omnino cōtētus: id quod cer-

*Cupiditas eſt
ratiō immorata
peru aq; triſti-
tie cauſam.*

*Deuſq; præſen-
tium uirtutis,
ſed fortuna ſua
non exiſtit.
Galenus gram-
maticum.*

(dicebat pater) in tua manu eſt. Contrā, diuſitq; præſente, nō uirtutis, ſed fortunæ munus exiſtit, quę plerunq; ſeruos atq; libertos facit longe diuiores nobis, qui & generoſi, & nobiles appel- lamur. Quōd ſi tu (quo in noſtra repub. reperitū pauci diuiores) quantū opus aliquando aſſe- quaris, hoc eſt, ut plus uniuersis poſſideas ciui- bus, ne ſic quidē ſatis ſis habiturus: ſed illo cir- cumſpicias, num quis in alia ciuitate ſit ditior: quem quidem ſi ſuperaueris, tibi obſecundante fortuna, ad alias progredieris nationes, & ipſe ipſa apud illas opulentos oſtenderis, fieri opulētior cōtēdes. Quare nunq; tu ſanē omnibus ditior, ſed propter immanes cupiditates, ſemper futurus es pauper. Quōd ſi ipſo uſu rerū metieris id quod modulo tuo reſpondeat, iam teiſpum unū ex diuitibus numerabis: aut ſaltē ex ipſis, qui eo quod opus eſt abundant. eris: quatenus ad rationē pecuniarū ſpectat, beatus, cū earū cauſa minime futurus ſis triſtis. Si uerō etiā illi, quę ad honores appetendos pertinent, inſatiabilitate ex- ploſeris, hac quoq; parte iucundē ac ſine moleſta uitam ipſam traduces. Sin autem tibi non ſatis fuerit honorari ab ipſis, qui tua conſuetudine utantur, ſed uelis ab omnibus omnino qui ſunt in ciuitate laudari, etiam ab illis ſcilicet a quibus ignoraris proſus: fortaſſe primū quidem ab ipſis ipſis cognofci uoles: tum autē, ubi cognitus fue- ris, ſuſpici. At illud quidem, uelle cognofci ab om- nibus, ab immania quadam proſciſcit glorię cupiditate: hoc autē quod eſt, uelle honorari & ſuſpici, ab inani plane & ſtulta ambitione. Quo- circa tibi neceſſe erit, ut nūc pecunijs quærendis inuigilanti, ſic tunc ad glorię honorisq; ſtudiū

*Velle cognofci
ab omnibus, uo-
lo de proſciſcit.
Velle honorari
ab omnibus, a ſtulta
ambitione pro-
cedit.*

cupidinē intēdenti, ob illos qui cū plures ſunt, te neq; cognofcent, neq; honorabunt, maiori ū nunc triſtina & dolore affici. Si igitur in his ſem per nos exercuerimus, iam exploratū habentes, inſatiabilitatem unū eſt animi peſſimū, fun- damentumq; omniū cupiditatum, pecuniarū, gloriarū, honorum, principatus, & cōtētiouſis, hāud dubiē circa omnem moleſtiam uiuemus. Qui enim ſua ſorte cōtētus fuerit, in omni maxore ac triſtitia carbit. Quis autem nolit omnē atri- tem circa mororem tranſigere: aut quis nō hoc omnibus præpoſuerit? mobilibus, imō uerō ſce- leratis diuirijs. Ille igitur hæc & alia multa mihi & alijs quā uerifiſimē pronuntiabat. Turpe ſi- quidem eſt libertatem eam, quæ humanis legi- bus accepta reſertur, maximi facere: eam autem quæ & uerē, & natura ipſa eſt libertas, non omni- tatem uenari, ſed inhoneſtis, impuris, atq; tyran- nicis dominis inferuire, lucris uidelicet, minu- tiſſimisq; quibuſque pecuniarijs rationibus, ac principatus, gloriarū, honorisq; ambitioſa cupi- ditatibus. Quorū ſanē omniū matrē ego haud du- bitauerim dicere, inextplebare habendi libidi- nem. Quis igitur talem in animo peſtem habēs, poſſit unquā aut honeſtus, aut probus euadere: aut cur nō mille ſit mortui dignus, qui nō to- ro animo talem turpitudinē oderit? Porro ſūt hanc ipſam multo magis & odiſſe & fugere de- bent adoleſcent, qui ſe ſaluos eſſe uelint. Nam ſi fortē mino aſſueuerunt pecuniam inſatiabili- ter cupere, fieri iam certe non poterit, ut cū ad annum peruenerint quadrageſimū, ſenſuos re- cuperent. Ceterum tamenſi diſſicile a tō arduum uideatur, adoleſcentes ipſos in principio ſeſe li- betare ab affectibus, progreſſu tamen tempo- ris omnia faciliora reddentur. Quō enim maius rationalis noſtri animi pars in liuiſcemodi ex- ercitationibus ac ſtudijs incrementū accipiet, eō perfectiorem obedientiā habebit. Nam cū ea quæ maxima ſunt, ratio nondum exercitata peruicerit, minime dubium eſt, quin ubi dupli- cem excellentiam indepta ſpatio temporis fue- rit, ſit multo facilius ſuperatura: quippe ex eo quōd iam ſeſe exercuerit, eaſerit multo genero- ſior quā antea: proindeq; ſic abundē ſufficiet exterminandis affectibus, iam etiam imbecillo- ribus redditus.

*Inſatiabilitas u-
eſt fundamētum
omniū cupido-
tatum.
Cōtētiouſis ſua
ſorte qui fuerit,
u omni carbit
triſtitia.*

*Adoleſcentes ſi
fortē mino aſ-
ſueuerint pecu-
niam inſatiabili-
ter cupere, ſua
nō poſſit, ut cū
ad annū peru-
enerint quadrage-
ſimum, ſenſuos
recuperent.*

*Rationē per ex-
ercitationē in-
dico uel di gene-
roſiorem.*

GALENI PERGAMENTI de conſuetudine liber ſecundus.



Vod conſuetudinis ratio ad inuen- tionem eorum quę ſanitati conducunt, magnam ſibi uendicari ſcū- ratem, non modō Hippocrates, ſed Eraſiſtratus etiā poſſeſſus eſt: quā quidem negligentes medici, interdum egros ū miſerrimē iugularunt: ut in Ario Peripatetico ſactietatum fuiſſe uidetur, qui cūm gracilis natu- ra eſſet, & os uentriculi frigidiſſimum ſortire- tur, ita ut uel ex leuiſſima a refrigeratione ſingul- tu ſtiritim corripere, ob idq; nūc qui fuiſſet au- ſus aquam guſtare, tandē febris occupatus, a me- diciſq; præter conſuetudinem coactus potu fri- gidæ uni, ſubito tu quidem exanimatus. Aliq; uerō

*Ario Peripatetico
fuiſſe ſuſſe inſu-
per uel di gene-
roſiorem.*

uerò contrā, nisi audacter potus la propinet, periculum sanē est, ne exstringant. ceterum. Sunt enim quibuscūq; aliqua peculiaris ex propria natura, aliudq; alimentum aliq; corpori accommodatur. Ob idq; animalia ipsa abiq; ulla disciplina, sed tracta à natura, ad ea pabula accedunt, quæ sibi magis sunt familiaria: iumentū nimirū ad lictas, fœnum, pascas, & hordeum: ad carnes uerò, tum leones, tum lupi. Vt autem nō parua in animalibus iuxta uaria genera propriū alimentorum reperitur differentia, sic in eodem etiam genere multa intersunt atq; magna discrimina. Nam multa sunt quæ uinum (exempli gratia) ne gustare quidem possint, quod tamē ab alijs plurimum sine ulla molestia bibitur: ac de cæteris quidem pari iudicio. Solē quippe homines alia alijs audis mandere, pro lue naturæ ratione, quod uidelicet illa ipsi facilius concocta constāt, quod aliquibus rerū quarundam usus inter initia ingratis & noxiis cū sit, ubi paulatim assueuerint, iam ea illis neq; amplius ingrata, neq; noxia reddunt. Nam ut unumquodq; eorū quæ uel comedunt, uel bibunt, alteratur secundum qualitatē: ita & ipsum quoq; id à quo alterat, quoquo modo afficit. Quod autem similitudo quædā sit inter ea quæ alunt, & illa quæ aluntur, tum semina, tum plantæ, euidenti argumēto esse possunt, quæ ita eximie alterant & transmutantur, ut quæ in uno loco soleant esse exitiosa, ad aliū translata, maximē cōferentia reddantur. Iam uerò ut corpus cibo & potu immutatur, sic etiā ijs quæ extrinsecus occurrunt nobis, quæq; nō minus cōsuetudini insueuunt. Primū igitur à refrigerantib; rebus cū ipsa colligi: dein cæteræ partes quæ illi proximæ sunt, donec ad profundos alterant ipsa perueniat: idq; primò & per se. Nam per accidens, calor in alio collectus corpore, cutē densat præ frigore, intericit. At uerò sicut causā refrigerans cuiusmodi alterationes inuehit, sic calefaciens, istis contrariis. Ceterū ab una & eadem causā fixæ contraria fiunt. Sol siquidē inter initia, dum nos calfacit, fundit humores, quæ ita plantis carnemq; reddit molliorē. Si quis tamen æstiuo tempore plumbus diebus nudus sub eo sit diuersatus, illi tum cutis, tum caro, dura adq; reddetur: id quod nō est caloris solius, sed siccitatis etiam illi annexæ opus. Porro balnea dulcia aquarum aquarum calefaciunt nos & humectant, quod calori habeant humorem cōiunctum. Quare necesse est nos nouisse, aliam quidem esse rationē caloris humidi, aliam uerò siccit. Ceterū corpus rarū & molle faciliē ab extrinsecis iniurijs lenitur: durum autē multo facilius eas tolerat, ægerimēq; ab illis labefactū ad quē etiam patiēti facilitatē & dyspathiam, cōsuetudo nō eugiam uim obtinet. Quod nerō ad exercitia pertinet, exercitæ particule fortiores pariter & solidiores reddunt, ac proinde motiones suas obire ac ferre, q̄ ceteris, longē facilius possunt: quæ, quod exercitio caruerint, mol-

les atq; languidæ existunt. Eodem etiā animi exercitationes spectant, quibus exerceri solemus: primū quidem grāmanticis rudimentis, dum sumus pueri: mox rhetoricis, geometricis, arithmetis, logicisq; theorematibus. Cū enim facultates illæ, quæ ad animi principem uim spectāt, ad omnes artes pernecessariæ sint, quarū altera quidem cognoscimus quid consequens, quid repugnans est, altera uerò memores sumus: à prima sanē id habemus, ut sapientiores simus: à secunda autē, ut magis memores. Eam tamen naturam hæ facultates habent, ut exercitatione uires indispiciant & crescant: ocio autē languescant, ac minuantur: id quod differēssimē explicuit Plato in Timæo, secutus Hippocratem, qui usum robur addere, octum uerò dissoluere prouocauit. Verū ipsi exercitationibus, sicut & cibo, & potui, uigilijsq; & ueneri, mensura congrua adhibenda est, quæ rem ipsam neq; ultra quā par sit, protrahat, neq; etiam de illa adimat: quia excessus dissoluunt uires: defectus uerò tantū de utilitate detrahunt, quantum ipsi à recta mensura deficiūt. Facilitates itaq; nostræ robur sibi coparant, si moderatis congruentibusq; exercitijs foueantur. Atq; hæ quidem sunt cōsuetudines differētes, à ui materierum in quibus illæ consistunt, & à quibus sunt, desumptæ. At uacuatio uires non debentur corporibus ob cōsuetudine aliquam, quemadmodum Erasistratus existima-

uit: sed ob causam quæ illas postulat. Sunt siquidem qm ex malo uictu, sunt qui ex praua corporis affectione sanguinē plurimū, aut uiosos humores aggregant: quos plurimum iuuare solet, cū aut à natura, aut à medico, quod redundat, antequā in morbū labantur, detrahantur: quo remedio tones uruntur, quotes aut morbum præsentem uident, aut cum aduentare præsentium: adeo ut talis medendi ratio in cōsuetudinem illis esse uerā uideatur.

GALENI PERGAMENTI de tuenda sanitate liber primus.



Vm una sit ars, quæ circa humanū corpus uersatur, eius primæ ac maximæ partes sunt duæ: quarum altera sanitates tuendæ, altera morbi profligandi facultas est. Ac sunt qui dem officia earum contraria: illi quippe tuent, huic immutare statum corporis, et propoluit. Quoniam autē & dignitate & tempore sanitas morbū præcedit, unq; & nos, quemadmodū hęc seruanda sit, prius tractare conueniet: post autē, quo pacto cōmodissimē sit abigendus morbus. Verūq; facultatis inueniendæ cōmunis ratio est, ut quidnam ea corporis affectio sit, quæ sanitas dicitur, liquidū cōstet: quandoquidē nec presentē seruare, nec amissam restituere, si eam penitus ignores, licet. At similariū partū sanitas, calidi, frigidi, humidī, & siccī symmetria est. Instrumētū uerò, ex similariū ipsarū cōposicione, numero, magnitudine, & figura cōstat. Quare quisquis lux cōmodē tueri possit, is optimas sanitatis custos fuerit. Tuebitur hęc, qui modos

Exercitatio in
artium liberu
sum studijs.

Intellectus.
Memoria.

Animalia facultates
exercitatione
uires indispici
sunt, et cres
sunt: ocio lan
guescunt, & mi
nuuntur.

Exercitia debent
esse modica.

Excessus dissol
uunt uires.

Vacuationes fæ
re ob causas, quæ
illas postulant.

Medicina a pri
mā ac maximā
partes sunt duæ.

Medicina per
tinet officia con
traria.

Sanitas morbo,
dignitate & temp
ore est prior.

Sanitas simila
rium partium
quod sit.
Sanitas partium
instrumētaliū
in quibus cau
sitat.

Animalia natura
uictus ad ea pa
bula accedunt,
quæ illis magis
sunt familiaria.

Cōsuetudo est
signum natura
lis cōsuetudine
pro
prietatis, atque
etiam interdia
causa.

Naturamq; ut
alteratur, sic et
iam quocunq;
modo alterat id
quod nutritur.

Similitudo
est inter ea quæ
alunt, & illa quæ
aluntur.

Calor immutus
ex accidentibus
fieri, ante refriger
tatem.

Contraria per
sepe oriri ab una
causa: ita
fit.

Balnea dulcia
calfaciunt nos &
humectant.

Corpus rarum.
Corpus durum.

Cōsuetudo ad
dyspathiam ob
tinet uim ob
tinuat.
Exercitatio par
tibus lenit for
tiores & solidio
res.

*Ladencia currit
pennam corpus,
genere duplici
existere.*

*Primordia no-
stra generationis
esse sanguinem,
& generale se-
men illam tan-
quam materiam
huc opifici ratio-
nem abesse.*

*Semen esse ipsi
sanguinem siccum*

*Siccitas elemen-
ta sua ignis &
terra.
Ignis mater co-
pion confusio-
is ad vitruumque
nostra genera-
tionis principiu*

*Senij auctoritas
desuper.*

*Corruptela inte-
rim duplicem
intra nobis ac-
cessitatem.*

*Animalium cor-
pora in perpetuo
fluere ver-
sam.*

*Animalibus
viventibus esse in
fatu quodam vi-
tu adferentem ac
desiderantem appe-
tenti.*

omnes quibus utantur, copertos prius habue-
rit. Sanè quæ corpus nostrum lædit corruptumque,
ea sunt genere duplicia: altera nobiscum congens-
ta, & quæ exuitare nequeas, quæque ex ipsius gene-
rationis principijs oriuntur: altera, quæ & decli-
nare possis, & orta à nobis non sunt, quæ aliunde
perueniunt: quæ tamen non minus ipsi illa corpus
nostrum conficiunt. Et enim sanguis, semenq; gene-
tale, generationis nostre primordia sunt: ille,
ceu materies quædam apta: hoc opificis ratione
obtinens. Constat horum utrumque ex ipsius gene-
re elementis, nempe calido, frigido, humido, &
siccis. Cæterum in femine plus est ignis substantiæ,
& æthere: in sanguine aqueæ, terreæque: quanq; præ-
pollet in hoc quoque calidum frigidum, & humidum
siccum. Semen itaq; sanguine siccum est, et si ip-
sum quoque humidum atq; fluxile. Quare nobis
utrumque ex humida substantia genituræ origo pro-
ficiat. Hanc autem siccari oportuit ad genera-
tionem siccari particulam, elementum nempe fa-
cultate siccandi prædito confluentem illuc libera-
lissimè. Siccatur autem tum ignis, tum terra. Ex illo ta-
men ad utrumque principium maior confluit copia,
ut scilicet tum ficeret abunde, tum calore suo
ad motiones agilitatem præstaret. Ab hoc si-
quidem primum cogitur atq; concretis factus. Hoc
siccior redditus, veluti lineamenta quædam cu-
iusq; membri obtinet. Vt utrumque siccet, necesse
est, exactam uniuscuiusq; speciem ostendit: tandem
in lucem editus, magnitudine augetur, sicciorq;
& valentior usq; ad summum incrementum efficitur.
Quo tempore universa membra, non solum
robusta & integra sunt, sed vires suas etiam sum-
mas sortiunt. In eo uero quod sequitur tempore,
omnibus iam partibus supra iustum siccetien-
tibus, non solum cuiusq; officium minus probe ad-
ministratur, sed etiam corpus ipsum macilentius,
gracilius, atq; rugulosius redditur, artusq; omnes
inuadit, atq; ad motus suos pigri & inconstan-
tes cernunt. Quæ affectio appellatur senij, ipsi 40
marcori plantarum, proueniens ob siccitatis ex-
cessum, quadam proportionem respondens. Vna
igitur hæc est omni generi corpori corruptelæ,
interitusq; connota necessitas. Altera autem, quæ
precipue in ipsis animalibus cernitur, totius sub-
stantiæ fluor, quæ insituit calor excitat. Hæc itaq;
incommoda, nullum quod genitum sit corpus effu-
gere potest. Reliqua quæ hæc sequunt, & quæ ad
uictus ratione pertinent, prouidentia consilioque
certè potest. Neq; enim his aliunde origo est, si
ex ipsis iam dictis incommodis corrigendis atq;
faciendis. Nam cum tota moles animalium in
perpetuo fluere sit, nisi similis altera substantia pro
ea quæ defluxit, restituta fuerit, euaporabil cer-
tè, dissipabiturq; universa. Idcirco natura non
modo animalibus, sed stirpibus etiam, insitas
quasdam vires, deficientes ac desideratas semper
appetentes, statim ab initio indidit. Cibo igitur,
quicquid siccioris substantiæ effluxit, restitui-
mus: potione, quicquid humidioris. Ita uero & 60
æthere, igneæq; substantiæ modum, respiratu, ac
terrarumq; pulvis tuemur. Necesse autem est, ex his
omnibus colligi excrementorum prouentum, cum
nimis ipsæ quæ effluxerunt, prolixæ similia non
sint, sed uarias mutationes alterationesq; prius-

quam assimilentur, postulent. Calm igitur esse,
bibereq;, necessaria animantibus sunt, has autem
res generatio excrementorum sequatur, natura
non solum eis excrementis insinuat organa, ue-
rum etiam organis ipsis facultates insinuat, quibus
incitatur, quædam ad se trahunt, quædam ali-
unde transmittunt, quædam omnino expellunt
ipsa excrementa. Porro hæc, quod semper mun-
dum corpus ipsum seruetur, nec obstruat aliqua-
tenus, nec ad proprias functiones imbecilla esse
oportet. Atq; ita geminam iam scopum salubris ui-
ctus sermo noster exposuit: alterum eius quod ex-
haustum est reficiendi, alterum excrementa expel-
lendi. Nam tertius, qui huc spectat, ne animal
prepropere fesciat, duos iam dictos necessarij
comitatur. Ex se itaq; duplici ratione consumit
corpus: & quod uel gratis cursu, uel assiduo fluo-
re ad interitum tendat: & quod etiam excremen-
torum copia obruat. Eorum uero quæ extrin-
secus incidunt, unum certè est, quod ab eo sepa-
rari non potest, sed perpetuo illi ueluti cognatum
adheret, atq; ipse ambiens. Alia nec necessaria, et
incertis temporibus nobis accedunt. Atq; igitur
circumfusus nos lædit, calidos immodicè, uel fri-
gidos, uel humidos, uel siccis efficiens. Hæc,
quod cõfundant, diuellant, uulneret, articulosq;
aliquem sua fœde dimoueat. Est autem sanitas,
haud quidem absolute ipsorum elementorum, sed
diutaxat partium simularum temperamenti cõ-
moderatum. Quædammodum & instrumentali
sanitas, in figura, numero, magnitudine, & com-
positione simularum consistit. Porro habitus sa-
nitatis discernimus, ex functionibus secundum
naturam obiectis: in ipsaq; latitudine sanitatis, sa-
nitatis quædam optima, consummaratq; existit: quæ
dam ueluti recedens ab hac, nec ita planè abso-
luta, quæ & ipsi suam etiam nec paruum latitu-
dinem habet. Nam cum sanitas symmetria quæ-
dam existat, symmetria autem omnis duplici ra-
tione dicatur: aut enim ueluti summa & perfe-
cta, aut tanquam à perfectione hac deficientis pau-
lulum: utiq; & sanitatis symmetria similiter dup-
lex erit, hæc quidè absoluta & optima, illa pau-
lo recedens ab hac, non tamen eatenus, ut anima
li sit grauis. Quædammodum igitur corpus aliud
magis, aliud minus album cernitur: ita quod sa-
num dicimus, magis minusq; tale esse mihi uide-
tur: id quod ex mutacione artatum atq; actionum
diuersitate licet planè colligere. Si quidem cum
ipsæ actiones quæ debite respondent tempera-
turæ, corporisq; constitutioni (quæ sanitas est)
sint uariæ: necessarium profecto est, ut tempera-
ras atq; constitutiones hominū, sic sanitates etiā
uarias & diuersas existere, secundum maioris mi-
norisq; rationem. Non itaq; absoluta illa tantum,
quæ insectis est, simul est & dicitur sanitas, sed
etiā quæ ab hac deficit, & in qua nec doloribus
cruciamur, nec uix actionibus impediunt. Sed
nec functionū imbecillitas, morbi statim est no-
ta, nisi a diuicijs, quæ præter naturam cuiusq; sit.
Nam ut sanitas est naturalis affectio actionem
perficiens, sic morbus affectio præter naturam,
impediens actionem. Quare non omnis affectus
secundum naturam, cõtinuè etiam sanitas erit.
Si quidem Aegyptiorum nigritia, licet naturalis
affectus

*Excrementa pol-
lenda uaria an-
gena diuersa fa-
cultatibus præ-
dictis insinuat
naturam.*

*Salubris uictus
geminus sequitur.*

*Corpus ex se de
placit ratione cõ-
fuit.*

*Aër enim ambien-
tem efficit ueluti
cognatum corpore*

*Sanitas simula-
rium corporum
quod.*

*Sanitas instru-
mentalis in qui-
bus consistit.*

*Sanitas habi-
tus discernitur
ex functionibus
secundum natu-
ram obiecta.*

*Sanitas esse
latitudinem am-
plam.*

*Sanitas est sym-
metria.*

*Symmetriam o-
mnis duplici do-
cetur ratione.*

*Sanitatis homi-
num esse diuersa.*

*Imbecillitas seu
liuor, nisi præ-
ter naturam sit
non est indicium
morbi.*

*Sanitas quod.
Morbus est affe-
ctio præter natu-
ram, impediens
actionem.*

præstat, adhuc non desiderant. At qui iam tertium aut quartum annū agunt, his vehiculo, nauigioque modice agitari licet. Septennēs uero, iam equitare affueunt. Ac per se tum primū pueris moueri licet, cum iam repere coeperunt, magisque etiam cum ingredi. Immatūrē autem cogendi omnino nō sunt, ne pondere crura eorum uiniantur. Sanē uel hac ætate facili declaratur, quanta sit naturæ nostræ cum exercitijs societās: cum pueros, nec si cōclusis loco aliquo, prohibeas quo minus discurrāt, ac pullorum utulorumque modo lasciuiant. Quippe sua cuius animantia natura satis est ad proprias conuenientesque excitandas appetentias, quibus sanitatem tuatur. Iam uero qui optimo corporis habitu præditi sunt infantes, his animi quoque morēs citra uitū esse par est. Qui enim sunt ad iram magis procliuēs, aut animo planē demisso, * aut intelligentes magis, aut stupidi, aut appetentes ultra modum, hos parum idoneo temperamento esse nō partibus, quibus prædictorum singula administrant, necesse est. Infantis autē quem abfolutum inculpatumque proponimus, ut nullum ex animi moribus corrigere, sic eosdem seruare ne quo uterentur, oportet. Seruāt uero quod si dem planē generis, quibus corrupti. Corruptum autē animi mores praua cōsuetudine cuiusque horū, cibi, potionis, exercitationis, audiendi, audiēdi, totius denique medicus. Quare puerū horum omnī esse emēdico oportet, qui sanitatis tuendæ curā suscipiet. Etenim iracūdia, fletus, ira, cura immo dica, & multæ super his uigilæ, febres accendūt, ac grauissimæ ægritudinibus initia præbent: ueluti è diuerso, cogitationis mentisq; segnitie, ac animus omnino deses, decoloratur, atque ex atrophia graciles, ob naturalis caloris imbecillitatē, reddunt. Hunc enim calorē, præter cætera intra sanitatis fines custodire oportet. Custoditur autem cum corporis, tum animi exercitijs modicis. Si quidē qui motus nimis modū excesserint, 40 biliosum animis reddūt: si intra modum nimis subsistunt, frigidū & pituosum efficiūt. Quæ etiam priore habitudine febres, & qui calidiores affectus sunt: posteriore iecinoris & uiscerū obstructions, comitiales morbi, apoplexij, in summa dehillationū fluxionumque morbi plerūq; excipiunt. Ex nos ægros quorūnis nō paucos per sanauimus, solis animi motibus ad debirū modum reuocans. Itaq; infantes qui optimū sortiti sunt temperamentū, nō leui cura egent, ne quos animi motus immodicos incurrant. Quippe loquelæ ad iuc expertes, ploratu, clamore, iracundia, & inordinato fū moru, dolorē indicant. Nō strum igitur officiū est, cōnectantes quod optent, asidū id suppedire, priusq; auctus dolor, nō nimis atq; inordinatū morū unā cum corpore etiam animū rapiat. Si quidē dentientes, aut ab externo quopiam offēsi, ut alui exonerare, aut mēre, aut esse, biberē cupientes, aut multitudine stratorū, uinculaq; ardua nō tolerantes, aut deniq; diuturnā quietem per se, perinde ac discruciant plorant, enormiterq; mouent. Nullū enim animal ullo immo dico delectatur, sed semper medium modum expetit. At medius ipse modus non unus omnibus est, sed ex corū scē,

pet est numero, quæ in collatione ad aliud spectantur. Eum igitur qui curam infantis educandi suscipiet, acrem mediocritatis, cōuenientisq; conseruatore esse oportet. Hæc autem omnia, licet in tertium à natali annum, circa puerū peragenda censeo: in primis de nutrice ipsa nō minimam habendam esse curam, quid edat, quid bibat, quo pacto in somno, uenere, & exercitatione se habeat, ut uidelicet lac eius egregiē sit temperatū, quale certē erit, si sanguis eius quā optimus sit. Sanguis porro sit optimus, si modica exercitatio, & cibis tum boni succi, tum iusto tempore modiq; assumptis: præterea pōne temperatū, modicēq; assumpta. A uenere omnino abstinentiam esse, quæcūq; lac præbebit, moneo. Nam & menses iuri consuetudine prouocantur, & lac odoris gratiam in deterius mutat. Quin etiam aliquæ concipiunt in utero, quo alienus à puellō adhuc lac tēte nihil est: cum quicquid sanguinis optimum est, absumatur in fœtū. Quare ubi mater concepit, ad aliquo morbo est affecta, alia nutrix est inuenienda: cuius lac gustu, odoratu, uisūq; explorandum est diligenter. Si quidē quod optimum est, id gustanti, offensanti planē suæ, inuentui candorem, æquabile, ac medium liquidi crassūq; apparebit. Quod uinosum est, è diuerso aut crassum & caesiosum, aut liquidum & serosum, ac liquidum, tum consistentia ipsa, coloreq; inæquabile nobis uidebitur. Idem gustantibus amarorem, aut salēdinem, aut qualiterum quāpiam extraneam exhibebit. Tale uero nec offensanti suæ erit. Atq; lactis probi improbiq; lites sunt indicia. Puellum autem ipsum primū quidem solo lacte nutrire: at ubi primores dentes emiserit, tum solidiori quodammodo iam cibo assuefacere cōuenit. Corpus autem infantis confricare oportet oleo dulci, idq; posteaquā uniuersum lac accuratē concoctū fuerit: alioqui alimentum crudum uniuersum corpus replebit. Quare post longissimum somnū fricandū occasio capienda est. Maiorem tamen puerorū, qui parere plagis & mmis norūt, nō duplex tum fricandū, tum lauandū temporis occasio est. Prior ac cōmodior, cum à matutino somno surrexerint, deinde lauerint, ac iam cibum petant. Quod si qua occupatio, ne qui puellum alit, auocetur, modico pane præbito, ludere permittat quantum uelit. Dein cum rursus cibum petierit, tum fricat, lauet. Mini-

mè tamen bibere ei permittendum post cibum est, quem balneum excipit: quando ita præcipitator eorum que uentriculus cōtinet, distributio in corpus fieri, id quod in corporibus proflus sanis cauendum est. Præterit autē tempus, ut in nobis propolito puellō, balneum sciquatur. Nam quibus utilis est ante balneum cibum dedisse, horū planē improbandæ habitudines sunt. Cæterū nec Germanis, nec hominib; id genus alijs agrestibus, licet documēta prodimus, nō magis q; apri & ursi, sed Greci, & ipsi qui eorum æmulant studia. Nam qui obsecro nostrū tulerint, modō editū in lacem infantulum, atq; ab utero calentem, ad flumen deserti, ibiq; (sicuti fieri apud Germanos aiunt) ceu candens ferrum, in frigidum humorē submergi, ut & roboretur corpus,

Puellæ cur non sine immaturitate cogendi ad motum. Naturæ nostræ cū exercitijs habetur magna ne cogitanda.

Puellæ optimæ præditi corporis habitu, animi quoque morēs citra uitū esse par est.

Seruati quidē iussu generis, a quoque corruptio prouert.

Mores animi quæ corruptionem iuliant.

Caloris natura la culdorendu ratio.

Motus uolentem in quorum malorum exollant causa.

Motus admodum languidus quid efficiat.

Infantes ne ioculent in rebus mites aut motus, curandus.

Infantes quibus de causis plerū.

Immodico multum animal delectatur.

Medium semper expetit, consilium in relatione ad alia.

Nutricis uisus rationem quamdiu huerit: cum quid sit.

Sanguis optimus à quibus generatur.

Ventre interdendum nutritiui, quid ab ea aueretur morbi.

Nutricem gravidam esse inceptū laudando infans tale.

Lactis optimi nota.

Lactis uisus nota.

Infantulum prius quidem solo lacte nutriendū esse, postea uero assuefaciendum solidioribus cibis.

Infantis corpus fricandum oleo dulci esse, idq; post longissimum somnum.

Pueri in matrem de pueri fricando curandus totum.

Pueri post cibū quom balneum excipere cor sit tum nō sit bibendum.

Balnei cōmodioris optima habitudine pueri fricatur.

Germanorum agrestium mori Galenus docuit.

Infantulo olim apud Germanos quæpiam a ferri etiam in lacem, deinde quæpiam in frigidum.

Cuius quatenus
fu desiganda.

Pueri iam habili
lo ad ludum ro-
duta, qua priva-
ganda.

Pueri optime si
peratu cor inter-
ducendo sit vici-
num.

Vicinus cor ne
adulter quidem,
nisi modico pro-
prium sit.
Vicinus ad quid
vici.

Pueri perisio-
gida a cibo est
concedenda.

Aqua optima,
omnis qualitas
est exopta.

Aquarum diffi-
cultas.

Aër diffi-
cultas.

Aër qualitatis
temperati quide-
m naturae. Si
peratu autem
travari regimur.

Pueri si viderentur
septennio in-
gressi, tempera-
mentum.

Educatio opti-
ma probo vici-
tudo, et gra-
vibus disciplinis
paratur.

Pueri moris per
foculos esse ter-
re si possunt.

Vultus duo ex
salubriter debet
esse a negotio
omnino, solus
indulgentia cor-
pore.

corpus, & periculum de vigore illius sumat. Prae-
stat itaque nec adeo densare cutem, ut corporis
transpiratū prohibeat: nec rarefacere ita, ut faci-
le a qualibet extrinsecus incidenti occasione le-
datur. Corpus autē propofiri nobis puelli, me-
dium excoctus omnis exiit. At uero cūm mitti
iam is in ludum est habilis, non necesse erit asei-
duis praeter balneis uti, sed interim cūm lucta-
ri condiscit, modico citius inibi ante cibum exerce-
ri sāt erit, ac balneo plerumq; abstinere. Vinū sa-
ne quā diutiusmū quē ea natura puer est, ne gu-
stare quidem fuisse, quod humectet nimis, & cal-
faciat corpus, caputq; halitu repleat. Quare
nec iam aduultis unū, nisi modicē sumptū, est uti
le quod uidelicet ad iram & libidinem precipi-
tes facit, & partem animae rationalem, hebetem
atq; turbidam reddit. quāq; huius ipsi ad bilis ex-
crementa uel mitiganda uel expellenda, est sanē
nō inuile: non nimis uerō ad eam siccitatem,
quae in solida partibus aut ex immodicis labori-
bus, aut ex proprio temperamento prouenit.
Iam puellis pono frigida, ac precipue a cibo &
per calores, non immodica est. Aqua tamen fon-
tana & recens alijs est praeferenda. Quae autē o-
mnium optima est, ac penitus nō gustui modo,
uerumetiam olfactui, omnis qualitatis experta
uidebitur: eritq; incunda gustui, & celeriter per-
transibit praecordia. Porro quae aqua ex petra cō-
tra septentrionē fluit, solems auctum habet, ze-
trē quidem concoquit, ac tardi transitus est, tar-
dēq; in calefit, atq; refrigeratur. Cuius ad orien-
tem solem erumpit fons, quicq; per terram pu-
ram colatur, eadem calefit ac refrigeratur ocyfui-
mē, omnijs aeti utilissima est. Idem de aëre enī
est iudicandum: quom optimum, hoc est, puris-
simum, in pulmones trahere, omnibus iuxta sa-
lubre est. Nam impurus aër, omni aeti aduersa-
tur. At uerō quae ex calore, frigore, siccitate, hu-
miditate diuersitas aëris contingit, nō perinde
se ad omnes homines habet: sed corporibus
quae optimo temperamento sunt, etiā optimē
temperatus aër est saluberrimus. In quibus uerō
aliqua exuperans qualitas dominatur, ijs utilis-
simus aër est, qui ei qualitati pari gradu aduersa-
tur. Porro ubi puer iam est secundū septennū in-
gressus, calidum est, eo dem gradu quo prius, illi
temperamenti: humidū uerō nō eo dem, quan-
doquidem omne animans ab ipso statim ortu,
siccitas indies efficitur. Cui igitur optimi status
corpus contingit, is ad quartum decimū usq; an-
num iam traditam uictus rationē obferuet, mo-
do semper exercitū seruato. Laetetur autē calida
potius q; gelida, ut qui nondū hanc ciera noxam
pertulerit: adhuc eiq; illi educatio optima, quae
probris consuetudinibus, & grauib; disciplinis
paratur. A secundo autem septennio usq; ad ex-
plerum tertium, licebit tibi ad robustissimū cor-
poris habitum prouehere hominē, aut instrue-
re ijs animi dotibus quae ad scientiā, sapientiāq;
pertinent. Non est tamen eadem utrobq; uictus
ratio. Atq; hac maxime grāte perfici absoluūt cō-
uenit, quae spectant ad mores. Et aliquis autē in
longissimū prolata uita, etiam bona uale tudine
perpetuū uratur, is liber oportet sit ab omni ne-
gocio publico, nimirū sibi uiuens duntaxat, so-

lijs indulgens corpuloso. Et enim immortale
fieri quod genitum est, planē nō potest: ut uerō
in longum perduret tempus, id maxime fieri po-
test. Nam qui optimū fortius est corporis habi-
tum, si ab omnibus quae ad publicum in uita spe-
ctant, secedat, sibi tantū uacet, nec morbo ullo
quod fieri poterit unquam tentabitur, neq; ante
longissimū uire tempus morte occupabitur.
Ceterum cūm huic tali edendum, bibendumq;
sit, ad repandam quae ex corpore effluit, neces-
se utiq; est, excernendumq; habere rationē. In pri-
mis igitur excrementum a fyncero separat, &
paulatim impellitur per omnia intestina, usque
ad rectum uocatur: ad cuius exitum musculi qui-
dam inserti sunt, qui ipsum, ne immaturē effluat,
coercent. Postea uerō quā plurimū cōgestum
iam graue animalī fuerit, tunc foras agi sinit, ad
celeritatem emissionis etiam ab dominis muscu-
lis unā cum transuerso septo adiuuantibus. Ieci-
noris excrementum aliud est, quale quod florem
in uno appellat: aliud, quale quod fax dicitur.
Attrahitur alterum a uescula quae iecinori sub-
ditur, alterū a liene. In his collecta excernuntur,
alterum in priorem intestini tenuioris partem,
alterum in uentriculum, ab hisq; per omnia in-
testina permeant. Quod autē in uenis & arterijs
excrementū acruatur, eiusmodi planē est, quale
in lacte concreto serum. Hoc renes a sanguine
fecerunt, nec ad uesciam transmittunt. Cuius col-
lo transuersus etiam musculū inest: quo arcto
supprimatur, laxato emittitur lotiū, ad id con-
serentibus etiam ab dominis musculis. Reliquū
excrementorū genus in singulis animalis nalcū
partibus, ex ipso unde aluntur succo. Huic excre-
mento nullus certus a natura praescriptus me-
tus est: expellitur tamen partim per ipsa molli-
ora corpora, ac partim per sudorē, partim per la-
tentem transpiratū discunt. Sed in hoc persistat
insensibili, enī crassioris excrementi nō nihil ex-
cernitur, a quo tum pili, tum ipsius carnis fordes
gignuntur. Cūm igitur eici omnia excrementa
huic oportet, expedit arbitror primū nouisse,
quibus maxime causa remouetur: dein ratio-
nem iniri, qua nec in ipsas incidatur: ac si quan-
do inciditur, q̄primū error corrigatur. Atque
ne incidatur quidem, hinc licet assequamur, uti-
que si excreta abunde sint, nec ne, compertū ha-
buerimus. Porro ijs quae in uentre continentur
excrementis mora cōtingit, aut ipsius cibi po-
tionisue culpa, aut ipsius uentriculi unā cum in-
testinis. Et cibi quidem potionisq; uitio, aut pro-
pter qualitatem eorum, aut quantitatem, aut pro-
pter ordinē, utendūq; modum. Et propter quali-
tatem quidem, si a cetera, austerā, aut siccā naturā
fuerint: propter quantitatem, si iusto plura aut
pauciora sint assumpta. Ordinis culpa, si quae sic-
ca, atfringentia sunt, primō: quae humida, pin-
guia & dulcia, secundo exhibeantur loco. Modi
usus ratione, si cūm bis fuerit edendum, totum se-
mel simpliciter. Quae uentris aut intestinorū ul-
timum sequit excrementorū mora, uel ob natura-
lem eorū affectum accidit, uel certē acquisitiū.
Ac quae quidem naturae eorū uitio causae proue-
niant, ex praui corporis habitibus aliqui sunt.
Recentiū autē uentris affectionū acquisitiū,

Excrementū a syn-
cro substantia
secretis, quomodo
fac.

Maiculi ex pul-
sione excernuntur
seruati.

Bile flana in re-
ctum intestini
excernitur.
Atra bila a li-
ene in uentricu-
lum mittitur.

Vicinus secretū
a sanguine, per
reces, in resi-
tam demittit.
Celi uescia mo-
fuit.

Excrementū quod
in singulis ex-
crementis par-
tibus, excernitur
in, excernendum
nō fuisse aliq-
certum modū a
natura praescri-
ptum.
Pili namq;
necant.

Excrementa al-
ui supponit qui-
bus de causis
posuit.

*Affectio non videri
ita acquisita
non, differtur
etiam.*

*Intemperies ven-
tri a quibus ga-
uantur.*

*Flava hinc veri
veri quibus de
cansu possit.*

*Angustia vasa-
rum videri ex
tripos.*

*Astringentia sic
care.*

*Atre hinc quon-
da sibilant.*

*Excrementis sin-
gulis particulis
infusum, a quib.
supponit possit.*

*Meatus laterales
quibus partibus
sunt tribus, ad
excrementa.*

*Cerebrum enim
demulsum
plurimum canali-
bus expurgatur.*

*Oculi quia par-
te expurgantur.*

*Retentionis ex-
crementorum cau-
sa, contraria a
liis sunt attribui-
da.*

*Exercitia quan-
to praestant cibis
& medicamen-
tis tenuandis.*

oſto ſunt differentiæ: quatuor nempe ſimplices
intemperies, totidemq; cõpoſitæ: à quibus ma-
ximè inualeſcentibus, inuálida potèſt reddi ex-
pulſrix facultas cùm ventris, tum omniũ inte-
ſtinorũ. Creantur porro eiuſmodi intemperies,
aut à cibo & potione, quibus uis inſit medicina-
lis: aut à uitio aëris ambientis, aut à lauacro, aut
ab unctiõne, aut deniq; ab alia re, quæ extrinſe-
cus ventri adhaereſcens, eum alterandũ uim poſ-
ſidet. Huiusmodi de cauſis excrementum ventris
ſupprimitur. Ad fluxu bilis excrementum morat-
ur, aut propter acrioriũ expellentiũ facultatẽ
infirmiſſimam, aut propter ualorum quibus
deducitur atq; excernitur anguſtiam. Porro in-
firmiſſima tum ueſiculae totius quæ ſubijciuntur he-
pati, tum corũ meatũ qui ab ea in iecur ſubeit,
tum eorum quibus in inteſtinum euocatur bil-
lis, ex recenti prouenire poſſet intemperata. An-
guſtia uero ualoru, aut phlegmonis uitio ſit, aut
propter ſcirrhos, aut obſtructionẽ, aut circum-
ſtantiã partiũ innixã, aut oſſiclorũ cõnſueti-
nam ipſa proximarũ partium cõpreſſio, aut pro-
pter immoſſicam copiam eorum quæ in ſe cõ-
nũnent, aut propter phlegmonẽ aut ſcirrum acci-
dit. Aequè & oſſiclorum cõnſuetudinẽ, aut pro-
pter horum quicquid accitratem. Siccitãtẽ cõ-
ciliant & quæ ualenter aſſurgunt, & quæ partim
calſiſcunt & ſiccant. Ad eundem modũ atre bil-
lis excrementũ aliqũdo ſiſtitur, ſi lien quidem
proportionẽ reſpondeat bilem excipienti ueſicæ:
uena uerò quæ à porta iecoris in ipſum inſerit,
uasiſ illis quæ excrementũ biliſum attrahunt:
atq; ea deniq; uena quæ ex liene in uentriculũ fer-
tur, proportionẽ etiã reſpondeat meatui illi qui
excernit bilem. At excrementũ quod per ſingula
cõgeritur animalis particulæ, & copia ſua, &
craſſitudine, & præterea lentore remoratur. Ad
huc, ob imbecillitatẽ caloris, tranſituſ angu-
ſtiam. Sunt tamẽ partes quæ præter latẽres me-
atus, alios quõſdam patentes atq; conſpicuos ob-
tinent, ut cerebrũ, & oculus: idq; aut ob principa-
tum particulæ, aut propter acrioriũ exquisitiſ
obundantiam, aut propter cõnſuetudinẽ corporum
ſpẽſitudinẽ. Eſt namq; cerebrũ rationalis animæ
ceu domiciliũ: quod cùm oſſe ſolido undiq; ſep-
tũ ſit, plurimis maximiq; canalibus expur-
gatur: primũ per nares & palatum, ſecundò per
utraq; aurem, terciò per caluẽ cõmiſſuras. Nec
abſimile eſt etiã aliqũd ab eo cõſſuere ad o-
culos. Oculus uero ipſe per euidentẽ meatus eſſicit
quicquid in eo excrementũ gignitur, idiq; iuxta na-
res & genas. Illud autẽ cõmune omniũ excre-
mentorũ ſit documentum, ut retentionis cauſa,
contrariã ſemper cauſa admoventis. Vi, exem-
pli gratia, ſi ex comẽſtorum paucitate & ſiccitate
reſtriſta alius ſit, plura & humidiora exhibebis:
ac ſic de ceteris. Obſtructa quippe ſunt aperien-
da, intemperata reducenda per cõtrariã ad natu-
ralem temperamentiũ: quæ craſſa & uiciſſida ſunt,
incidenda, tenuatoria uelut ratione, ac præci-
pue exercitiis, quæ tam cibis q̃ medicamentis te-
nuantibus noſtri præſtatur, quantò ſatius eſt nullo
corporis noſtri habitũ in cõmodo exigi quæ
redundat, q̃ pariter & carne liquida, & ſolidis ex-
tenuandis. In his autẽ tribus primis generib. cõ-

ſiſtit ſanitati tuendæ ſtudiũ, æquè ac medendi
methodus: nempe corporibus, cauſis, & ſignis.
Corporib. quidẽ, iſs quæ & ſana iam ſunt, & eo
ſtatu ſeruari debẽt. Signis uerò, corporũ acciden-
tibus, ex quibus ipſa corpora dignoſcunt. Cauſis
ſunt, ex quibus cuſtodia ſanitatiſ perſicit. Harũ
materiã quatuor generib. in nioſi probatiſſimi
ſunt cõplexi: admoventis, educendis, faciendis,
extrinſecus incidendis. Satiũ tamẽ foreſſe ſue-
rit, admoventis, educendis, faciendis, & inciden-
tibus, alterari immutari corpus dicere. Muta-
tionẽ uerò in qualitate fieri, aut in quantitate.
In qualitate, dum aut incalceſcit, aut refrigerat-
ur, aut ſiccceſcit, aut humectũ reddit. In quanti-
tate, dum alitur aut nutritur. Immutatio nempe
ipſam duplicẽ quog; eſſe, alteram excremento-
rum, alterã naturalis ſubſtantie noſtræ, aſſidue
deſtuentis, quæ nutritioni ex aduerſo opponit.
Porro Alimenti eſt ſecundum Hippocratem, tri-
plex. Aliud enim eſt nutrens, aliud ueluti nu-
triens, aliud quod nutritur eſt. Quarũ diſſe-
rentiarum primæ, ipſius ſubſtantie uictorem op-
ponas rectẽ. Secundæ autẽ, tum hæmorrhagi-
am, tum omnem ſanguinis inanitionem. Ter-
tiæ deniq; lenteriam & uomitum. Jamq; in hoc
loco primum cõmentarium claudamus.

GAL. DE SANITATE TVENDA A LIB. II.

Proponatur nobis in hoc cõmentario ſalu-
tariſſimæ naturæ puer, qui iam terciũ ætatis
ſux ſeptenniũ ingreditur: cuius corpus eſſe
ſingere quoad fieri potẽt q̃ optime, propoſitum
ſit. Cùm autem ut corpus ipſorum numeroſa
diuerſitas eſt, ita uirtutis rationum quibus uiui-
mus, ſint ſpecies diuerſæ: fieri nequit ſanè, ut in
qualibet propoſita uita ab ſolũ optimam corpo-
ris noſtri curam exhibeas, ſed eam tantum
quæ cuius optima ſit. Quare omnibus iſs qui aut
ſeruare, aut etiã impediri negotijs, corpori cu-
rando uicacare nequeunt, optimam prout corpus
noſtrum ſcriptiſſe, ſuperuacaneum fuerit. Iſs
autem qui omni modo liberam uitam degunt,
præcepiſſe ſas eſt, quemadmodum uictiſ ſint
ſelicitery & diuiniſimè. Porro quod ſimplex in-
culpabiliſ in omni genere eſt, id ceteris omni-
bus ceu regula quardã præponi poſſulat. Ac ſim-
plex inculpabiliſ in corporibus quidem eſt, q̃d
optimo eſt habitũ in uitæ generibus, quod omni-
no liberũ eſt. Primũ igitur hoc libro duo hæc
coniuncta tractemus. Itaq; in optimæ notæ pue-
ro, qui terciũ ſeptenniũ ingreſſus eſt, ac uni cor-
poris curæ uacat, labor cibum præcedat, ſinity
medicoria omnia, labor ſcilicet, cibus, potio, ſom-
nus, & uenus, quemadmodum rectẽ monuit
Hippocrates. Quãq; certẽ uenus, quæ ſomnum
debet excipere, tantũ ſlorenũ eſt, uniũ quo tem-
porẽ etiam eius eſt uſus. Quæ autẽ hanc uel præ-
cedunt, uel ſequuntur ætates, aut planẽ ſemen
non eſtundunt, aut certẽ infecundum, aut malẽ
fecundum. Porro laboris ipſa appellatio, idẽ
mihi ſignificare uidet, cùm cõmuni exercitati-
onis appellatione. At nõ quibus motus exercita-
tio uidet, ſed tantũ qui uehementior eſt. Quoniã
autem

*Sanitati tuen-
da ſtudiũ, me-
thodũ meden-
di, conſiſtere in
corporib., cau-
ſis, & ſignis.*

*Caſus medi-
cinalium qua-
tuor genera. Al-
terari corpus
quodlibet poſſit.
Mutationem fe-
ri aut in quali-
tate, aut in qua-
ntitate. Inciden-
tiaſ.*

*Alimentum tri-
plex, ſecundum
Hippocratem.*

*Inculpabiliſ
quod in omni ge-
nere eſt, præpo-
nenda ceu re-
gula debet.*

*Labor cibum
præcedat. Medicoria
debet eſſe omnia.
Venus, quæ ſom-
num debet exci-
pare, aut ſloren-
tiũ tantum eſt
exercitium.*

*Naturæ uictorem
aut lenteriam, di-
citur exercita-
tio.*

*Exercitationes
temperatae si al-
terius respirato-
rii.*

*Exercitationes
duplex cōmo-
da.*

Coloris opera.

*Exercitari, si
alibi cruditas,
aut humoris ple-
tudo, cum ho-
mo non debeat.*

*Exercitatio cor-
poris cibum ad-
ministranda.*

*Inquiri corpora
quae magis no-
trantur magis le-
da.*

*Exercitationis
diminutionem
tempus.*

*Vrina color tem-
peratae exercitatio-
ni indicat.*

*Vrina alba in-
dicat cruditatem.*

*Vrinae quid
indican.*

*Exercitatio esse
admodum prius
alio et vesicae so-
luta, necesse soli-
dae partis molli
frictione cancella-
bitur.*

*Oleo post frictio-
nem mellea subi-
genda esse.*

Vulvis.

*Frictio qualis
ad esse debeat.*

autem eorum quae ad aliquid dicuntur, est quod uehementius dicitur, fieri potest, ut idem morus alteri fit exercitatio, alteri non sit. Terminus igitur uehementiae est alteratio respiratoris: quando in quibus nulla sit respiratoris mutatio, hos nondum exercitationis uocamus. Sunt autem exercitationis duplicia comoda: haec quidem ad excrementorum inanitionem, illa ad solidarum partium bonam habitudinem conferentia. Nam quoniam uehementior motus exercitatio est, instrumentorum duntiem, genui caloris augmentum, & spiritus ualentiores motum necessarii inducit. At ex instrumentorum duntiem ad labores robur & renitentia: ex calore, distributio ualidior, immutatio expeditionis, nutritio absolutior, omniumque corporum fusio, ob quam solida mollescunt, humida tenuantur, exigui meatus laxiores sunt. Sed ex ualentioris spiritus impetu, & purgari hos omnes meatus necesse est, & excrementa expelli. Quoniam autem exercitatio digestionem in corpus adiuvat, non debet, cum administrabitur, aut cruditas, aut multitudo succorum, uel in uentre, uel in uasis consistere. Quoniam uero & exiguos meatus expurgat, & excrementa expellit, utilis est ante cibum tam administrare. Si quidem quae im-pura corpora sunt, atque ad excrementum parum purgata, haec quod magis nutrit, magis laedat. Quare tunc ad exercitacionem comodusissimum tempus est, cum hesternus cibus duplici concoctione iam prorsus confectus fuerit, & ea quae in uentriculo, & ea quae in uasis sanguinis agitur, ac iam denuo cibandi tempus inest. Quod si prius aut posterius exercitacione utare, aut crudis humoribus hominem implueris, aut pallidae bilis prouentum auxeris. Atque huiusmodi temporis nota, color est urinae. Quae enim aquae speciem praefert, crudum adhuc in uenis esse indicat succum eum, qui in uentre submittitur. Quae uero rufa, biliosamque, tamdiu concoctum esse huiusmodi succum. Quae modice pallet, peractae modo secundae concoctionis est signum. Cum namque bili infecta urina nondum est, aquae speciem alboremque praefert: cum uero plus iusto eius bilis acceperit, rufa cernitur. Ergo cum medio critere est rufa, medio critere uel pallens, tum est exercitatio ad eam: sed expulsi prius excrementa, quae uel in uesica, uel in inferioribus intestinis continentur, ac partibus solidis molli frictione sensum conuulsae, crassiusque tenuatis humoribus, necnon reclusis per exiguis meatibus, ne uel excrementis repleatur uniuersum corpus habibus, uel rumpat aliqua pars ex solidis, uel praedicti obturentur meatus. Oportet itaque, ubi linteolo suauius perfricando sic calcereis totum corpus, ut floridus quidam rubor per totum eius cutem fundatur, oleo tandem ipsum subigere: id quod nunquam remanens est, priusquam incalcescat cutis, & laxentur eius meatus. Vulso autem ipsa fieri nudis manibus debet, ac mediis, inter mollem & durum, modis seruantiis: iusfricandumque prima cōtrectatione blandius, inde sensum paulo fortius, donec caro manifeste citra cōtusionem premat, adeoque uniuersum corpus legitime compactum esse uideat. Haudquaquam tam ualida

frictione diu utendum, sed semel aut bis in quaque parte, ne eius pueri corpus duretur, excutitur, quod seruare in medio temperamento est animus. At procedente tempore, ubi iam adolefcit, tum durior frictione utemur, ac praeterea frigida ab exercitacione lauatio. In praeparatoria uero illa ante exercendum frictione, quae huc spectat, ut corpus molliat, molli duratque mediā qualitatem dominari oportet, ac pro eiusdem qualitatis ratione, compleri singula. Variis autem maxime ex manu iniectione circumactibus frictiones esse debent, quod uniuersae musculorum fibrae, omni ex parte fricantur, nec superne modo deorsum, aut inferne sursum adhibere, sed etiam tum in subiectum, tum in obliquum, tum in transversum, tum in subtransuersum. Quas quidem differētiās frictionū, discere ex hac figura licebit

Frictionibus uariis remouenda.



Dura porro frictione ligari corpus, molli solui, multa extenuari, mediocri crassescere, auctor est nobis Hippocrates. Quae differētiis quatuor ex quadruplici omnis frictionis tum uirtute, tum usu oriuntur. Quod si mediae quocumque anni uirtutes, sex in uniuersum differētiis existant. Iam uero mollem frictionem necessariō consequitur ut corpora emolliat: sicuti duram, ut impingat induretque illa. Si igitur dura ligandi, molli soluendi uim habet: quae supra modum soluta corpora sunt, ea duriter plane fricanda sunt: contra, quae cōstricta sunt, mollior. Quae modice se habent, manifestū est ea nec mollior nec duriter, sed medio critere esse fricanda. Sicuti uero in iis differētiis quae in qualitate spectantur, non solum dura molliorū consistunt, sed etiam media, ita & in iis quae ex quantitate ducuntur non solum multa, & pauca, sed etiam media intermolecitur. Cur autem in iis differētiis quae ex qualitate trahuntur, omiserit mediam Hippocrates: in iis uero quae ex quantitate, exiguum, iam dicam. Cum enim ex contrarietatibus, aliae quidem in frictionum genere (ut dura & molli, multa & pauca) aliae in affectuum qui ab iis proueniunt, necessariō consistant, ut colligatio & solutio, grauitas & crassitudo: ac prior quidem affectuum contrarietas, ex priori frictionis contrarietate nascitur: secunda autem non item (euenit enim in hac, ut grauitas proueniat ex multa, carnis in crenentiis ex mediocri frictione: quandoquidem pauca augende carni non sufficit, sed exci-

Frictione duriter uariis remouenda.

Frictiones mediae.

Contrarietatum alia in frictionum genere, alia in affectuum qui ab iis proueniunt consistunt.

*Frictionis vis
deformatur de
sua natura Hippo-
crates, siquidem
afflictus contra
naturam.*

tando calori modico, id quod alijs commune est omnibus) ob id nimirum secundum affectuum contrarietates, seu longè utiliores ipsæ, quæ in frictionibus spectantur, ipsarum frictionum distinxit utiles differentias Hippocrates. Meminit itaque duræ, mollis, multæ, & mediocris frictionis, subiciens ceteras, quod ab his corpus in contrarias affectiones ducatur: quodvis unâ cum ipsis protinus se promant, tum mediæ earum opera, tum ea quæ per coniugationem faciunt. Media, cdm neq ligare corpus, nec soluere, nec carnem augere, nec minuire studemus. Quæ per coniugationem, cum, uerbi gratia, panter colligat, & carnem addere. Quis enim nõ uideat, cum duram carnem adicere corpori uolumus, frictionem durâ unâ cum mediocri modo petendam esse? ueluti cum mollem addere studemus, frictionem mollem & quantitate mediocrem adhibendam: & per alias coniugationes ad portio nem? Particulares porro frictionum coniugationes, sunt nouæ in uersum. Quippe si tres quæ à qualitate frictionum sunt uerè differentia, tribus quæ à quantitate ducuntur iunxeris, nouem coniugationes effeceris, ut per subiectam formulam constat.

Qualitas.	Quantitas.
Dura.	{ Pauca. Multa. Mediocris.
Mollis.	{ Pauca. Multa. Mediocris.
Mediocris.	{ Pauca. Multa. Mediocris.

*Frictionis genera omnia duri respectu collatio neque.
Dura habendi non optima qualitas frictionis conueniens.*

Doctrinam quæ per rerum elementa instituitur, est alijs omnibus utilior.

Frictionis duræ vis frangit naturalium solueret: uel tã, minuire, mediocrem augere possit.

Meminisse autem oportet, hæc omnia frictionum genera respectu collatione dici: quando quæ huius dura est, alteri mollis fuerit. ac sic intelligendum de ceteris. Igitur optimæ habitudinis nobis propositum puerum, cuius uolumus pristinam mediocritatem seruari, neq dunt, neq molliet, neq multis frictionibus, neq quantitate mediocribus, sed paucis, & qualitate mediocribus, infricabimus. nihil ultra moliri, q̃ ut ad exercitandum corpus ipsius præparem us, ac rursus, cum iam satis exercitatum sit, apothera pia cures. In traditione autè hæc differentiarum, Hippocrates usus est doctrina quæ per rerum elementa instituitur, seu alijs omnibus utiliori: quippe quæ & sub cõpendium rem omnè cogit, & memorie affigit, & reminiscentiæ facillè suggerit, ac omnium quæ singulamentum agentur, rectum usum promptè suppeditat, seu ad pauca & cetera elementa referens. Quis enim non facillè membratim frictionum differentias, usum, ac uires inueniat, si intelligat illam sensu sententiã, quæ docet, consistingere quidem frictionem duram, soluere mollem, minuire multam, augere mediocrem posse? Ex horum namq notitia ac memoria, primum sanè quæ omisit in uerborum cõtextu sunt, differentias inuenias: mox omnibus inter se cõplicita, nouem illas coniugationes efficias, quas paulo suprà descripsimus. Sed iam de affectu

nomnibus nõnihil dicendum est. Ac duri quidem & mollis uocabulis, quidam significet, planè constat: rari autè & densi, nõ uisquædeo. Est em̃ propriè rari, quod carnis magnos per totum obtinet: sicut è diuerso densum, quod eisdè paruos. Tameris per metaphorã, de laxo coactioq̃ hęc ipsa uocabula dici auidet. Quæ ratione & ætrem & tẽm aliquando raros dicimus, aquil & tẽrre dẽsas, quæ tamen & unita sunt, & ex similibus natura partibus constant, nec ullos eiusmodi carnis obtinent. Oportet autè nõ nomina inspicere nomen, sed affectuum genera duplicia in totum existimare: alteru quod in similibus, obseruari, de quo molle duriuue dicitur: alteru quod in instrumentalibus, meatuum ratione, consistit, quod densum, uel raru uocat. Hi namq corporu ipsoru proprii affectus existunt. Ceteru ad instrumẽtũ redeundo, frictione ipsa interdũ per se corporibus nostris cõmodu aliquid affert: interdũ ipsi quæ cõmodum afferunt, subministrat. Efficit autè frictione, rara densando, & mollia durando: atq̃ hæc quidẽ omnino dura esse possunt: præterea duru molliendo, & enlatu laxando: quæ contra fri mollis oportet. Pari modo & quæ carnis augendæ minuendæ uel causa suscepta est, utraq̃ per se utile aliquid corpori præstat. Quæ tamen ad exercendũ corpora præparat, item quæ post exercitacionẽ adhibet, hæc exercitacionib, subseruiut: illa modicè facilitãdo tenues carnis recludẽs, & simul extremãta carnis fluxilia reddens, & solidas emolliẽs particulas: altera, quam apothera pœutem, hoc est, recutiatricẽ appellat, cum plausulo oleo administrata, simul sua pinguitudine humectat, & solidas emollit particulas, & quæ in corporis meatibus cõtinentur, discutit. Sed preparatoria illa frictione in optimi status natura calliditudo corporis causa suscepta, friat mollis primu: mox uerò exercitacionẽ aggressiua, dura. Quod si quid erroris contingat, id potius ad durum atq̃ densum defectat, q̃ ad laxum & molle. Nam transpirandi defectu, exercitacio sarcire licet: alterius uerò affectionis uitu, quod est ad externas iniurias opportunitas, neq alias corrigi potest, facitq̃ ut nõ excrementu modũ, ueramentum corporis nutritum enitẽ euaporetur. In his autè frictionibus quæ à quantitate ducunt, in proposita natura & ætate, si quid delinquit, uerius id quid minus est id est, cum augendi eiusmodi corpus, haudquaquẽ succidendi, nobis studiũ sit. At uerò ipsa frictionu mensura, secundũ temperaturã aëris qui corpus fricandum ambiat, secundumq̃ anni aut diei tempus, atque adeo constitutionẽ regionis, debet uariari. Ceteru dum propositu hominẽ eo corporis statu de quo queri nõ possit, obiter etiam regionẽ ipsius potestate nimirum definiui: cum nec optimo temperamẽto, nec irreprehensibili omnino membroru modulo, corpus ullu in his regionibus quæ à temperamẽto modo reuellerent, gigni possit. Quippe sicci, graciles, & ueluti torrefacti, in æstiuis tractibus homines sunt. Rursus frigidiore plagæ incolæ, inæquali temperamento uisuntur, ut in quibus externa frigeant, interiora impenitẽ calcant. Itaque apud Gallos, Scythas, Aegyptios, Arabas, ne per somnium quidem uisum est midisse id corpus, quod ueluti

*Rarum quod,
Densum quod.*

*Elementa carnis proprii meatuum.
Affectu duplicia genera.*

*Frictio dura.
Frictio mollis.*

Frictionis exercitacionis, subseruiut.

Apothera pœuticæ frictionis quæ rariu præstat.

Frictio preparatoria, qualiter admodum fricanda sit.

Frictionum mensura uaria, quæ sit uarianda.

*Corpus optimu constitutum ut re quibus uisum præstat, gigni nõ possit.
Regiones interu rari quæ sunt corpora.*

ueluti Polycleri regula existit. Cui in nostro situ, non pauca similia uideas. Siquidem nostræ regionis, quæ in latitudine non parum extenditur, id quod in medio habetur, optimè sanè temperatum est, cuiusmodi patria est Hippocratis.

Eiusmodi igitur locum cum corpori proposito dederis, anni quoque tempus, veris mediū ipsum dabis: ex die autem, meridiem. Eadem exigit ratio, ut ne domus quidem in qua exercendus est, ipso præsertim die calidior frigidiorue sit, quàm publicus totius urbis aer: qui hyeme quidem calidior, æstate autem frigidior, uel arte parandus est, quò exacta temperie corpus, frictionis tem-

pore fruatur. Sunt autem rubor & tumor in aëris temperie & corporis statu temperato, mediæ frictionis notæ. Veluti enim si calidam infundas, primū quidem corpus intumescit: si largius infundas decumbit: ita frictio quoque attollit qui dem primū, postea contrahit, ac molem depo-

nit. His ergo qui carnis augendæ causā fricantur, tunc planè finiendā frictio est, cum corpus & intumuit, & ad summū ferè tumorem peruenit. Qui autem ad exercitandum iam præparantur, his minimè id tempus expectandum, sed longè prius desistendum à frictione est, potissimū cum optimi temperamenti sunt, & ætate adhuc pueri. Præparatoriæ uerò frictionis est finis, ut solidæ partes molliant, humidæ soluantur, corporis exigui meatus laxentur. Porro expedit ne-

que paulo animosiores esse, qui exercitatur, ut lais iam uiribus etiā exerceri aueat, quod conuenit ijs qui sunt calidiori temperamento: neque item ignaui, qui integris adhuc uiribus, laborē tamen detrectet, quod solent ijs qui aut laboris plethora, uel frigidum temperamentū sortiuntur. Porro natura optima, quæ hic est nobis proposita, frictionis, exercitacionisq., ac tum cibi, tum somni mensuras aptè indicat. Hæc tunc primū quodlibet horum respicit, cum eius ultra non eget. Quare ipsius quidem naturæ ad singula quæ agi debent promptitudo & alacritas, ei qui tali præficitur corpori, fuerit index mensuræ. Quippe sanū corpus ipsum, sibi ipsi omnia inuenit proprio naturæ suæ impetu directum: maxime si in ijs quæ ad animum pertinent, rectè sit educatū. Nam multi in malis moribus à pueris educati cum sint, in desidia & intemperantia uiuentes, bonitatē naturæ corrumpunt. Sicuti contra nonnulli uiriosam corporis naturā fortiter temperantia uitæ, & tempestiua exercitijs, natura uitæ cōmutant in melius. Genera exercitorum sunt, iuusta, pancratiū, pugillatus, cursus, & alia id genus: quorū nōnulla tantū sunt exercitia, ut illa ipsa quæ modo diximus: nōnulla uerò exercitia simul & opera, ut cūm aliquis, exempli gratia, fodit, aut remigat, aliudue quippiam exercet, in usum mortaliū. Atque horū etiam plerisque est, quando ueluti pro exercitacione tantū utare. Triplex autē ipsorū in uniuersum est usus: cūm interim operis tantū gratia usurpentur: interim meditationis, sed quæ ad usum futuri sit operis: interim pro exercitacione tantū. At nūllum exercitium, ut exercitium, aut perpetuum diem obitur, aut alio tempore quā ante cibū. Seruari uero modum exercitacionū in his

oportet, tum uocatam apothērapiam. Quod si etiam idonea frictione usus, ad ea quis accedat, iam omnes exercitacionis numeros impleuerit. Ac genera quidē exercitacionū sunt ea quæ diximus: qualitas uerò seu differentia, uelocitas, tarditas mouendi sunt: præterea quod aliud robur stum, aliud imbecillum est: ad hæc, uehementia & lenitas. Vtendi uerò rationes sunt huiusmodi. Nam aut perpetuus motus est, aut interciās: & si perpetuus, æquabilis, aut inæquabilis. Sin interciās, aut certo ordine, aut intra ordinē. Hæc igitur utendi rationes ab ipso negotio capiunt.

Quæ uerò ab ijs quæ extrinsecus sunt posita dicuntur, eiusmodi sunt, quod aut sub dio exercitatio sit, aut sub tecto, aut in mixta umbra, aut calenti loco, aut frigido, aut tēperato, aut sicco, aut humido, aut medio, aut cū puluere exiguo multo, aut cū exiguo aut exuberanti oleo, aut etiam sine utroque. Omnium autē exercitacionū cōmune est illud, quod earū auxilio, animalibus ex ipso corporibus, insitit calor augmētū excitatur. Ita tamen proprius exercitacionis effectus nō est, si modō & irania, & perturbatis, & pudore affectis naturalis etiam calor augetur. Quamquā ira, nō augmētū, sed ueluti seruor est calor in corde. Iam uerò ex exercitijs ipsis, aliam partem aliud alio magis fatigat: quædam lentè moris sunt, quædam oculisimè agitatæ, quædam robore & nixu adhibitis, quædam sine his: ad hæc, quædam cum robore pariter & celeritate, quædam liguidè. Fodere ergo, robusta exercitatio est. Similiter, & quatuor simul equos habentis coëctere, impense robusta exercitatio est, nō tamen celeris. Ad hæc subano maximi oneris, inambulationisq. acclius, huius quoque generis sunt. Præterea si quis per suum manibus apprehensum scandat, aut ex eo arrepto subimis pēdeat, ac diu ipsam teneat, robustū is, ualidūq. laborē exercet, citra tamē celeritatē. Ita uerò & si quis manibus in pugnū reductis, ijsdē prolatis, uel in alia subtilia, diutius in habitu eodem cōstitat. Quod si adhibeā quempiam deducere sibi manus subeat, nec tamen ipse remittat, uel impensius hic tum musculos omnes, tum nervos ad robur cōpēat, ut quorum maxime propria sunt omnia id genus exercitia. Iam si cuiuspiam iusseris ut te uiolenter detrahat, insectatq., dum toto erectus es corpore, nō leuem ad membrorum robur exercitacionem obieris. Robur autē partium & exercet & firmat, qui aut quæ complexitur mediū, absolueret se se iubeat, aut ipse se à cōpēctente soluat. Ita etiā & si quis anagonistam suum à latere aggressus, itibus apprehensum, ceu aliquod onus sublatū, itibus profectat, reductatq. Acque uerò qui pectoribus ex a duerso innixi, magno se onatu recludunt inuicē. Etiam qui à ceruicibus pendentes deorūm trahunt, ad robur præparant. Cæteri talia omnia exerceri citra palmarū aut copiosum puluerem queunt, quocumq. cōcalato loco, erectis atq. stantibus. Quæ uerò luctantes inter se molunt, cūm robori augendo student, hæc aut puluerem alium, aut palmarum desiderant. Sunt infinitæ alie in palmarū exercitaciones id genus robustæ, quarū omnī peritiū usumq. plectoribus, sic ipse à gymnasiis diuersis, ut à medico

Exercitacionū qualitas.

Exercitiorū ueniendi rationes.

Exercitacionis uniuersum quod sit commune.

Calor in quib. augetur per exercitacionem. Ira est ueluti seruor calor in corde.

Exercitiorū diuersa genera.

Exercitia robusta aut celeritatem.

Exercitia multisimilia maxime propria, quæ.

Exercitiorū quædam citra puluerem, & quæ minimi, possunt administrari.

Palmarum diuersæ à gymnasiis, ut differt à medico coque,

Hippocratis patriam esse temperatissimam.

Ver.

Domus extrinsecus de pueris, quales nam esse debeat.

Frictio mediæ a reducta fuit rubor & tumor.

Frictio terminatur, dum carnis augenda gratia præstatur, fit in genis tumor.

Frictio præparatoria fuit.

Natura optima omnium exhibens durā mensuram indicat.

Sanum corpus ipsum sibi sapienter naturæ omnia cōgruentia inuenit.

Naturam bonā quæ cōuenit, & quæ in moribus remanet, quæ uita est cōmutat.

Exercitiorum genera.

Exercitiorum triplex usus.

Exercitium nōnullum alio tempore, quā ante cibum administrari.

Exercitia que
celeritate abis-
sunt peragun-
tur.

Interdixit
uenerat

Exercitatio re-
borez robu-
stia celeris-
posita est.

Exercitia pro-
ram.
Manuum.
Lumborum.

Exercitationes
liberati sunt re-
sistat omni re-
sistat.

Motuum natu-
ralis spectu di-
uerſa.

Facilitas motu-
turalis quae
tuo gubernari
omnes partes.

Motus cordis ar-
teriarum inter-
mittitur aliqui-
Pulsus a quibus
causis mutatur.

Venerat opus
quod causis na-
turalis posit.

Motuum qui a-
liis non sunt
differentia tri-
plex.

Equitatione ob-
scuri videntur.

coquus. Peraguntur autem celeritate, citra robur & violentiam, cursus, umbrarum armorum contentio, necnon quae summis manibus fit concentratio, tum quae per corycum & pilam exercitatio a distantibus & currentibus administratur. Huius generis est & quod *uenerat* Graeci dicunt, & quod *uenerat*, necnon celeris uoluntatio & circutio in palstra. Potest & solis cruribus, manibus, idque erectus, ac uno loco consistens, celeriter exerceri. Porro exercitatio uehemens, ex robusta celeris composita est. Non in postremis uero uehementes laxae sunt, fodere, disci mittere, saltare, idque sine intermissione: similiter, graue quod uel tum iaculari, conuulsis sibi quae maxime uelibus: aut graui armatura testu, celeriter a gitari. Sed qui aliquo talis exercet, intermittere paululum solent. Quae uero remissiores exercitatio nes sunt, ex sine interposita quiete magis sunt. Ceterum incessus, cursusque, crurum exercitationes sunt: acrobaticae & sciamachiae, brachiorum ac manuum propriae. Lumborum autem, & idque in omnes partes torquere inclinare, idque aut pedus aliquod & terra tollente, aut assidue in manibus sustinente. Thoracis uero & pulmonis, maximae respirationes, propriae exercitationes sunt. Maxima autem uox praeter iam dicta, uocis quoque instrumenta omnia permouet. Porro uoluntatis actio nes, musculorum, neruorum, atque tendonum sunt omnes propriae: cum ipsis tamen ad mouendi ex accedenti & ceterae animalis partes, si motus ipse ce- 30 lerius & uehementius edatur. Reliquorum autem motuum qui uel naturales sunt, uel pro animi eduntur affectibus, alii cordis & arteriarum, alii uenarum & interiorum actiones sunt: atque horum quidem primus & maxime secundum loco, reliquae omnium partium: quandoquidem quatuor naturalibus facultatibus omnes gubernantur. Ac arteriae quidem cordis motus nunquam omnino intermittit. Ceterum magnitudine, paruitate, uelocitate, tarditate, & uehementia, uariis interdiis atque re mittitur. Vna igitur mutandi pulsus causa est, naturalis caloris auctio, diminutioque: atque hinc quidem pro anni tempore, nutrimento, ponone, balneo, frictione, somno, uigilia, itemque animi affectibus, & uoluntatis actionibus incidit. Altera causa est, secundum quantitatem animalis spiritus alteratio, quae pro motus uoluntatis differentijs uariatur. Tertia, quae ex firmitate, infirmitateque naturalis uirtutis accipitur, pro substantiae ipsius cordis & arteriarum bono contrarium temperamen to accidens. Quarta denique est, quae ex instrumenti ipsius malo affectu ueniat. At uenarum opus, una cum alijs instrumentis, quaequeque natura ad alimentum dispensationem excogitauit, pro cibo potationeque, tum uero pro distributione in corpus, & concoctionis, & nutritionis ratione uariatur. Huius uero mutationis, arteriae quoque participes sunt. Qui uero motus actiones non sunt, horum triplex intelligitur differentia. Alij namque animantium, ex se ipsis insunt, ut quae antea commemorauimus. Alij extrinsecus adueniunt, ut nauigatio. Alios medicamenta porrant. Nonnulli tamen motus plane sunt mixti, ut equestris: quae quidem qui exercetur, simul & agit & agitur. Concuti autem praecipue secundum uiscera. Quae quidem ubi quif-

piam fricare uoluerit, statuatur is qui fricat, a ter go, ac modum in dextra, modum in sinistra, manus iniiciat. Sane concutiant nonnihil ea quae sub septo uiscera sunt, & maxime tum respirationes, tum uoces, parij modo efflatus. Iam ipsi spiritus cohibiti, est musculorum thoracis ab doming exercitatio. Motuum diuerſos, forem effectum uisum. Peditum est, infirmum gymnasia. Medicamentum in omni re eligendum, ad conseruandum spiritum corporis haberi. Praeter quodque, ex ore debeat. Exercitatio quae de cubito fit. Exercitatio corpus quando lauandum fit. Lasciam quae de effluuiis a uero erit.

GAL. DE SANITATE TVENDA LIB. III.

Est autem apothera pia duplex. Vna quidem cura exercitatio nis species: altera uero cura pars, de qua impraesentiarum agendum est. Omnis igitur exercitatio nis probe peractae postrema pars, apothera pia dicitur, quae duplici consilio suscipitur, & ut excrementa expurget, & ut corpus a lassitudine rurum reddat. Proprius tamen apotherae scopus est, ut lassitudinem quae succedere immodico exercitio solet, submoueat, atque prohibeat. Ceterum optime constituto, a nobis proposito puero, cum eorum alij, qui tuenda: tantum bono ualitudinis gratia exercerent, etiam ratio la situdo succedat, quae modo dum superuenire solet athletis, ceteris quoque etiam qui corpus opere ex necessitate fatigant: eis tamen apothera pia est ex

Viscera fricandi ratio.

Viscera quae concutiant.

Spiritus cohibiti, est musculorum thoracis ab doming exercitatio.

Motuum diuerſos, forem effectum uisum.

Peditum est, infirmum gymnasia.

Medicamentum in omni re eligendum, ad conseruandum spiritum corporis haberi.

Praeter quodque, ex ore debeat.

Exercitatio quae de cubito fit. Exercitatio corpus quando lauandum fit.

Lasciam quae de effluuiis a uero erit.

Apothera pia duplex.

Apothera pia quid.

Apothera pia duplex.

Apothera pia proprium.

est ex usu, si nō lassitudinis nomine (à qua etiam nos secutiores redder) at certe excrementa purgandi gratia. Qualis autē apothērapia sit adhibenda, ipsa finis, ad quos tendimus, demonstrabit natura. Cūm igitur & excrementa digeri, & quæ tena ex exercitatione sunt, mollior expectant, duræ certè frictionses fugiendæ sunt, nec his minus ut lentis cavendū arbitror. Nam postq̃ à se corpus nō amplius dimouet, periculū est ne frigescat ac densescat, cum nulla ope externa cal-

fit: quare nō solū celeriter, sed adhibitis plurimum manibus, largioris oleo circūfuso, fricandū est. Oleū quippe ad uelocitatē frictionis cōducit, remittit tenā, simulq̃ mulcet ac mollior mēbra defatigata. Sed nimis molli frictio enī uiciā est, ut quæ neq̃ alius penetrat, neq̃ ea quæ in angustis maribus latent, discutiatur: cuius profectō causa, tum ipsā fricandū partū tensionē, tum spiritus cohibitionē iniungimus. Media igitur frictio, quæ ab utriusq̃ distat incōmodo, eligenda est. Nō exigua autē apothērapie portio spirituscolubirio uidei: cum quæ si leuiter cōtrahatur abdominis musculi, partes quæ in uentre cō-

sistunt, quicquid excrementi est in ipsis, expriment. Si uero feriat planē patiaris abdominis musculos, nullius earū partium excrementa uacuabis. Quæ tamē in thorace & pulmonibus de irescūt, ex deorsum trāsire. Expedit autē huc transferatū potius, q̃ in illis maneat, tantō profectō magis, quanto etiā eorū quæ in uentre, q̃

in pulmonib. & pectōge cōtinentur, prompior exitus patet: hæc enim uel euomūnī facili, uel deiciūnī illa cum conatu & q̃ ei incipit per tussis. Verū si quis perinde ut septum transtulerit, ita abdominis quoq̃ musculos anhelitus cohibitione intendat, exquisitius planē expurgabit ea quæ sub septo sunt uscra: nō transferet ita mēn quicq̃ à spiritus instrumentis, ad ea quæ nō trimento sunt delegata, sed totū in ipso thorace pulmonibusq̃ excrementū manebit. Quare cohibitionē anhelitus id genus impræsentari nō probō: multoq̃ minus, si quis o mino nō disten-

tio septo, ualide ac uehemēter musculos abdominis contrahat: quando ita necesse est uenas omnes, partesq̃ quæ circa collis sunt, statū ac sanguine impleri: excrementa uero sursum atq̃ ad caput, nō deorsum & ad uentrē ferri, ut in tibicibus, acutimq̃ & maximā uocē edentibus iudice uidere licet. Est autē omne huiusmodi opus, mixturæ maxima expiratione, & ex cohibitione spiritus: nimis in expiratione cōferim factū, maximo expirata edito, idq̃ cum ualidissima muscularū tum qui costis insident, tum qui in abdomine sunt, tensione. At in spiritus cohibitione, eadem utrorūq̃ muscularū facta tensione, nullo tamen spiritus elabi permisso. In ijs qui tibia sonant, aut acutū uocē edunt, musculi pari modo tenduntur: ritū tamē nē penitus colubiro, nec toto simul emisso, sed mediā ratio uē seruat. Causa autē huius actionū triū est pharynx, qui in totius quidem spiritus simul cōpulsi efflat, iansemē se expandit: in spiritus cohibitione, prius claudis: in ijs qui tibia sonant, aut uocē acutā simul & magna utunt, mediū quendā habitū seruat. Cæterū cohibitiō spiritus, quæ ad apothērapia est utilis,

attollit ea quæ ad uentrē spectant, idq̃ tenus thoracis musculis, & remissis qui ipsi in septo & abdomine: ita namq̃ deorsum excrementa terent. Secundo autē loco habenda est, quæ mediocriter eos qui in abdomine sunt musculos tendit, quod uidelicet ea quæ sub septo sunt uscra, apothērapia fructū sentiant. Atq̃ his ipsis de causis fasciarum circumactū sunt, quas frictiles ipsi dum à tergo fricandorū cōsistunt, circa totū uentrē adhibent. Aliis uero cūm à frōte se collocant, cer-

uicibus circa dorsum circūuolutiones efficiunt, duabus manibus circūducentes. Alias præterea costas, spinæ, & pectori accōmodant, idq̃ cōuerso pariter cum his quodāmodo co qui fricatur. Circa lumbos uero simili fasciarū circumiectio fiet, tendente se ad singulas eo qui fricatur, nō tamē cum omnibus pariter se reuertente: cūm ne quæ cōtinuos motus, nec uehemētes ei cōtingere ex apothērapia, sicut ex preparatoria, conueniat: sed certē aliquos, & quibus ex intervallo frictionses sunt interpositæ. Hæc enim nēl maximè ratione, & calore qui exercitandō est adauctus seruauerit, & simul exercitatio proprijs ipsis tum tensionibus, tum moribus eiecit. Ad quod sanē opus cohibitiō spiritus cōducere nō parum mihi uidetur. Quippe exilia instrumento rum foramina, uehementiori spiritus inflatu uideas etiā expurgites opifices: extruduntur siquidem quæ ante occurrūt: attrahuntur quæ ad

latum sunt posita, impetu ipsius spiritus utraque acta. Cūm autē uehementissimi materis impetus, diuersis tēporibus acranonibus, cōtrarios edere effectus possint: obstruere quidem, cūm crassum & multū fuerit, quod confertim ac præceps agitur: purgare uero, cūm exigui tenuisq̃ est, nec præpropere, nec uiolenter cogitur simul uniuersum expelli: rectè ita quidem sententia illi faciunt gymnastæ, qui inter ipsam uehementem exercitacionē interponunt cohibitionē spiritus, nec non frictionē quæ apothērapie debetur, simul hominē recreantes, paulatimq̃ ipsius cutis expurgantes meatus. Nobis autem proposito iuueni, cūm mediocri exercitio atq̃ etiam uictus ratione utatur, non est opus interpositio ne id genus, quam ob contrarias causas athletæ postulant. Ac de apothērapia quidem abundē nobis est dictum. Nunc de balneo agere temperatum uidetur, ac primū quidem de aquis dulcibus calefactis. Earū igitur, si media temperie sint, uis calida & humidā est: sin tepidiores, humidā & frigida. Quod si iusto calidiores reddantur, calida quidē, sed nō perinde humidā. Quippe horrere corpora, contrahit exiles eorū meatus cogunt, ita ut neq̃ maderet ab extrinsecus accedente humore possint, nec excreta quod intus later, quicquam emittere. Cæterum ab ijs incipiendum, quæ medium temperamētū obtinent, quæ per se semper calfaciunt & humectant, licet interdum ex accidenti aut per habitum digerant humores, aut superuacua fluxione corporis particulas implant, aut moliant, aut cōcoquant, aut uires firmant, aut soluant: ad hæc siquidem quantitas quoq̃ exrum nō minimū consistit. Huius autē balnei iuueni à nobis descripto perexiguus est usus, ut qui omnia iam ex

Spiritus colubirio, quæ ad apothērapia est utilis, quæ sit modus.

Fasciarum circumactū quæ sit modus, & quomodo faciat.

Spiritus cohibitiō cui opus conueniat.

Materia impetusa, citius uideat, citius uideat, citius uideat.

Spiritus cohibitionem incorporeandā est exercitatio uideat.

Aquæ de rebus calidiss, per se humectant, per se calidiss, per se calidiss, per se calidiss.

Aquæ moderatē calidiss, per se humectant, per se calidiss, per se calidiss.

Exercitandū utrum quod ad apothērapia sit utilis expectat.

Proctus media inter mollior & duram adhibenda, quæ sit modus.

Proctus ab abdomine ueni, cum septo transtulerit, quæ sit modus.

Spiritus cohibitionem quæ sit modus.

Pharynx quomodo sit.

Spiritus cohibitionem quomodo sit.

Pharynx quomodo sit.

mediocri exercitatione, & dicta apothera fit consequitur. Nihil fecius tamen si probè balneum adhibeas, ipsum quoque apothera parè aliqua sit. Si quidem duras tenasque partes emolliat, excrementum, liquamentum, si quod intus ad cutem hæret, euocat. Verò neutrius horum eget talis adolefcens: quare elui sibi in balneo sudorè & puluerè, si quando hoc utitur, magis postulat, quàm calefieri. Ergo transire tantum ad solutū usque, non in balneo morari is debet. Sed nec immorari liuic in piscina est opus: imò locus quatenus dictum est, festinet cõfestim ad mediocriter frigidam. Si quidem optimū corpus quoad augefcit, frigida lauandum nõ est, ne eius incrementum moretur. Vbi uerò iam abunde est augmentum, tum frigide quoque assuefaciendum, ut quæ & illud roboret, & cutem duram atque densam efficiat. Tempus autè ad id per commodum, est æstatis initium, ut ante hyemè, toto interposito tempore, cõsuetudo minimè spernenda indicatur. Est præterea dies, quo auspiciabimur, quàm maxime tranquillus, & quoad id tempus feret, calidissimus: cuius etiam calidissima pars eligenda est: sicut & gymnasteriū mediocriter temperatum. Qui uerò frigida utetur, in quarti maxime septemque medio consistat, pristinè salubritatè ad unguem seruus: sistis cum animo hilaris, tum minime abiecto: ac primum quidem linteis durioribus fricetur, quàm antea, uehemènius: dein oleo prout assueuit fricetur: ac postmodum exetice ex citationib. multitudine paribus, sed citatiorib. quàm antea. Ab his in frigidà, eamque tepidam, nec glaciale, totum simul insiliat: altera namq. repercutsum caloris non facit: altera ferit insuetos, atque impense refrigerat. Quamquam illac procedit tempore utel, si necessitas exigat. Exeunt uerò ab aqua fricari oleo, id quod pluribus, expedit, quoad cunis ipsa in calefact. Post hæc cibū plussq. cõsuetū, portionē in tra consuetudinis, capiat: quæ ultro ipse facturus est, modò sint omnia rite peracta. Nam à frigida lauatione & plus appetit, & melius cõcoquant, ac minus finit, nensitè ad exercitationes postri die planè meliori habitu: corporis quidè mole, pari ei quæ antè, ceterū cõpacta & musculosiore, ac uegetiore: cute uerò duriore ac densiore. In hoc ergo secundo præterea die, similiter omnia sunt peragenda, etià tertio & quarto. Postea uerò procedente tempore, ad eundem modū frigidam iterum ingredi iubebimus, uidelicet post eam quæ priori ingressus fuerat fricitionē: uerò tertio eam ingredi, minime laudo. Nam & secundo id fecisse est abundè, præsertim cum pro arbitrio nostro remorari ac detinere illic hominē liceat. Cæterū si egressus frigidam, coloratio ex fricitione citò reddatur, id mediocriter moratū fuisse indicat. Sin & tardius ei calor redeat, & decolor diutius maneat, plus æquo morarum docet. Quare ex nois quæ in cute sunt, discas morè mensuram. Quia uerò fieri nõ potest, quin in uenis exercitati omnes deditus, aut supspius, aut etià gymnastæ errore aliquando in lasitudinē incidat, nõnnulli de ipsa dicendum est. Porro lasitudinis in uniuersum octo sunt differentie: quarum sim plices, tondemque cõposite. Nam quod incendi tenditq. corpus uis cal, & quod mouenti

se, uel ulceris, uel phlegmonis sensus oboritur, affectiones nõ sunt, sed symptomatica. Simpliciter igitur lasitudinis differentiarū, prima est ulcerosa: quæ oritur ab excrementorū copia tenuiū simul & acriū, adeo ptingentiū ac ueluti uulnerantium tum cutem, tum carnē inter exercitandam, ut etià horror ac ceu cõsuetū uniuersū corporis interim oboriat. Secunda est lasitudo tenfua, citra ullum ulceris finem. Accidit namq. in uehemētē tensione, omnes musculorū fibras tendi, eas tamen in primis lasari, quæ per longitudinem tensionis porrigunt: quippe ubi tenfæ fuerunt immoderatus, tendi adhuc uident, etiam si nulla iam tensione urgeant. Tertia differentia dicitur cõcussoria, quæ nimis uis cõtusa aut phlegmone obfusa partes sensum: eam tum solè maxime incidere, cum musculi nimis exaltati attraxerit quippiè ex circumfusis sibi excrementis. Quod si etià tum tendonibus, tum neruis idem affectus incidat, *lystrum*, quasi oisū laborem, ob penitorem sensum, eum nocant. At differentia quarta, quæ improprie dicitur lasitudo, tum incidit, cum musculi supra iustum fiant, tum sit equalis contractumq. corpus uidetur, atq. ad motū quodammodo pigri, citatamen ullum nunc descriptorū symptomatiū. Harum autè quarum differentiarū singulis, sua remedia sunt. Cæterū lasitudo ulcerosa, maxime in ea incidit corpora, quæ & mali succi sunt, & excrementis abundant. Succedit uerò recentibus cruditatib. cum aut exercitant immoderatus, aut in sole sunt morati. Nihil tamen obstat, quo minus in corpore boni succi & citra cruditatem proueniat, namq. ob exercitationis excessum. Remediū autè huius est redundantis euaporatio, quæ fiet fricitione tum multa, tum mollis, cum oleo adhibita, à quo omnis atfringendi uis absint: quod genus maxime Sabiniū est. Aduersissimū uerò huius affectioni est, quod *lystrum*, quæ Hispaniæ & Iberia porratur: quodq. etià sit circa Aulonē. Utendum itaq. est dulcissimo oleo & copioso, primo quidem die, quod suspecta lasitudo omni no nõ sit futura. Secundo uerò, ut si quæ incidit, discutatur. Discutit porro eam apothera, in qua scilicet morus adducuntur quantitate medicorum, qualitate tardiores: idq. cum frequenter interposita his quiete, qua unig fricare hominem oportet, pluribus cõtrictantibus, quod nec frigeat pars ulla, & excrementa ocysimè digerant. Porro fricitionū plus adhibebit ipæ, qui in cute & sub cute excrementorū collectam uim habet: moruū uerò, quos ipsimet edant, in altera lasitudine, in qua plus est in ipsis congelum musculis. At lasitudo tenfua, pro remedio relaxationem postulat: ea namq. tensioni contraria est, quemadmodum & duritati mollities. Hac autè lasitudine affecti, relaxantur panca mollig ex oleo dulci eligendiq. fricitione: tum intermissione omnino, aut quiete, aut lauatione medijs temperant, atq. in calida plussq. mora: quod si bis tere laueris, plus proderis. Hi uerò & post balneum ungi desiderant, priusquam uestiant. Quinertiam posero die, cum è cubili surgunt, ungi his expedit: nūquam tamen oleo extreme digido, nec dura fricitione. Tertia lasitudo, quæ

Lasitudo ulcerosa, quæ prodest profectus.

Lasitudo tenfua, quando accidit.

Lasitudo cõcussoria, quæ, & quando fortiss.

lystrum.

Lasitudo signala.

Lasitudo ulcerosa, quæ potissimè corpora lasitudo.

Lasitudinis ulcerosa, quæ remedia.

Oleum Sabini.

Lasitudinis effecti, quæ quibus moribus ac fricitionibus sunt tractanda.

Lasitudinis tenfua, quæ curatur.

ex uer

Balnei moderati calorem refert.

Frigida lauandum nõ est, ut opus sit corpori, quod ad augefcit. Frigida lauatio nisi refert.

Frigida lauatio nisi refert, & quando noster agitur.

Frigida lauatio ut refert, medijs quæ fricitionibus adhibetur.

Aqua glaciata ferit insuetos, atque impense refrigerat.

Frigida lauatio nisi curanda.

Morbus in morbo futuro in frigida balneo, quoniam quæ in cute resurget fons.

Lasitudinis differentie, ut uerum fons est.

ex vehementissimis nascitur moribus, atque eos maxime inuadit, quæ exercitationibus assueti non sunt, ut curatione superuacua, extenti requiem, & inflammationis refrigeratione desiderat. Ergo & oleum copiosum & tepidum cum frictione mollissima, & longissima in mediæ temperamenti aqua mora, lusuusum de lasitudinibus corrigat. Quod si paulo tepidior aqua sit, præstetur. Ad eundem modum & multa quies, & unctio assidua, lireut erit omnia quæ id quod lasitudo est, quiete, lenimento recreant, ac quod superuacuum est per habitum digerant. Differētia autē quarta, quæ gracilitatem tantum, atque ariditatem inducit, primo quidem die nihil diuersum postular ab ijs quæ iam dicta sunt, præter calidiores aquam, quæ sensim contrahat, calefaciat, & roboret cutem. Secundo die apothecariæ exercitationem, quæ tum motum, tum frictionem, & paucam, & mollem, & tardam sit. Præterea solium similiter calidum: uerū protinus insilant in frigidam, quod uidelicet ipsi robur in cute unā cum calore conseruet: nam & minus sic dissilabunt, & facile in carnem & cutē nutrimentū resistent. Postular autē tō corpus nutrum simul & madefieri, id quod simul utrumque præstat humidum nutrimentū. Ceterum lasitudinē uulcerosa post legitimā apothecariam consuetum nutrimentū desiderat, aut etiam parcius, præterea humidius. At quæ tensio nem lasitudinē præfert, ea etiam magis quā uulcerosa, parce nutriri postulat. Quæ uerō phlegmonosum sensum asserit, ea supra reliquas omnes, tum humidissimam, tum minimam, tum uerō quod refrigerans quippiam habeat, requirit. Boni sicut tamen nutrimentū omnes qui lasitudinē grauantur, luxu postulant. Cauendus tamen in ulcerosa & ea quæ phlegmonosum sensum exhibet, glutinosus cibis est, ceu qui exercitanti digestiorem mouetur. At in tensionis lasitudine, etiam exhibendum eiusmodi nutrimentū est, sed minuto eius modo. Lasitudo autē interdū lasitudine soluitur, cum uidelicet læsternis exercitationibus, pares postredie adhibendas uidelicet expellens. Sicuti & lasitudinis interdū modica est quies, partim in ijs quæ ex congestis excrementis lasitudines consistunt: partim in ijs quæ tensionis & phlegmonosæ empiasim præbent: parcius tamē nutriri sunt in hac lasitudine quæ phlegmonosum sensum præfert: in ulcerosa uerō, pro consuetudine, ubi recte apothecariæ sunt usi. Sicuti & uberior cibandi, in euenientia illa quarta lasitudinis differētia. Simili ratione, & mediæ temperamētū aquis lauandū in ijs tantū differētijs lasitudinis est, quæ ex redundantia superuacua sunt nata. Porro humidū nutrimentū sic citari medetur: ipsum tamē nec remediū nec catio lasitudinū est. Sed cum mēbra siciora sunt facta, nulla tamen nec tensio subest, nec tenuis ac cretæ excrementū, nec phlegmonæ affectus similis, reficere nutrimentū lumentante expedit, quæ exhausto humore sunt sicca: aliqui gracilior & aridior ijs fuerat, postero die cernitur corpus. Porrigitur autem interdum minus ijs pro consuetudine, aut præterea quod par opus non est, aut quod cōcoqui id non possit iam uerō, in eo quidem affectu qui ex neruolam partium tensione cō-

sistit, calidiori ijs ex consuetudine lauari non conuenit: simili ratione neque in ijs quos excrementa exercitarūt. In gracilitate autē quæ citra hanc cōsistit, expedit calidior aqua, quā cum mediocriter se habeat, lauari. Siquidem hic affectus refectio, in appositione eius quod est detractū, cōsistit: id quod nequit accidere cuti exsistente laxa. Cogere ergo hanc prius, asstringere atque densare oportet, si qua plenioris nutrimentū expectanda est utilitas. Sanē cogit, clauditis tum frigida, tamen feruens aqua. Verū si frigida uis laxi hominē minus est, utpote qui iam ex multa exercitatione & laxior, & uacius est redditus. Ex feruenti, ut non certe nulla, ita secura in cute densitas paritur, ipso qui in ea detrahuntur calore nonnulli conseruente. Vnde nec immorari in frigida nimium debet qui ita est lauatus, ut quæ feruentis lauauit cōmoda frustretur. Ceterū his duntaxat corporibus quæ bona lasitudine sunt, quarta illa impropria lasitudinis differētia incidit, cuiusmodi sunt atiliterarū quæ bene sunt nutriti, nec non propositū nūc in disputatione inueniunt. Sunt itaque tres propriæ ac simplices lasitudines differētiæ, illæ primæ de quibus iam egimus. Post has ex binis copulatas alie sunt tres. Ab ijs uerō septima est, ubi in unā cōueniunt tres notæ. Remediū uerō cōmune in omnibus complicatis cōsiliū est, ut ei quod superat, sis intentus: nec tamen quod reliquum est, planè contemnas: proprium uerō, ab ijs membranis affectibus accipiendum est. Sicuti uerō lasitudines ipsæ numero tres, si inuicē illas cōiungas, quatuor cōiugationes efficiunt: ita sanē si his quatuor affectibus addas, multo plures existunt. Quod cōueniens, ex descriptōe licet claris intelligas. In ea primū locū ulcerosus habeto. Secundū, in quo tensio est. Quartum, qui phlegmonæ similis est. Quæ tum, in quo corpus gracilius est redditum. Ex his igitur, aut primus cum secundo cōiungitur, aut cum tertio, aut cum quarto: aut rursus, secundus cum tertio, uel quarto: aut denique tertius cum quarto: ita nimirum ut ex binis cōiunctis affectibus, sex in uniuersum complexionones oriuntur. Rursus, cum tres unā miscueris, quatuor alie sunt. Nam aut primus iunxeris cum secundo & tertio, aut cum secundo & quarto, aut cum tertio & quarto: aut rursus secundum cum tertio & quarto. Postrema omnium complexionum erat, ubi quatuor simul coierint, ita ut uideam numero in totum fiant. Erant uerō & simplices quatuor: efficiuntur itaque in uniuersum quindecim.

Simplices affectus.

Vlcerosus A. Tensionis B. In quo phlegmonosus sensus est, C. Gracilitatis, D.

Compositi.

A B. A C. A D. B C. B D. C D. A B C. A B D. A C D. B C D. A B C D.

Quod si præterea oculis curis aut aliorum symptomatum differētiis, tum fecum, tum cum his quindecim complicaueris, innumeras alias complexionones inuenies. Vnusquisque igitur horum affectuum, si quidem per se consistat, simplex remedium exigit. Sin alter sit cōiunctus, illi præcipua medendi ratio adhibenda est, qui dignitate

Calidior aqua quā cum mediocriter se habeat, in quo sit affectus remediū.

Cutem ergo claudis, si aqua tibi frigida, tamen feruens, frigida lenatio ubi periculosa sit, quā cum admittitur per calidam.

Lasitudines tres alias differētiæ erant ex tribus primis, dum binas inter se copulaueris: ac septimam denique dam in unum simul conueniunt.

Complicatio affectuum ita efficiuntur debemus, qui si perat: numerum non neglige gnosce alterum.

Lasitudinū con iugationes quindecim.

Affectus simplices, simplex remedium postulant.

Lasitudinis quæstiones modica.

Lasitudinis arida remedia.

Vnde ratio si quis lasitudinem generibus asserat.

Lasitudo in interdum lasitudinis soluitur.

Lasitudo in quibus soluitur sit quies.

& uiribus antecellit. Ac dignitate quidem & uiribus maior lasitudo est, quæ phlegmones sensum præfert, quam excrementosa. Est affectus iam dictus proximus, & ipsa meatuum cutis angustia, quæ obstructis illis ut de densis cōtingit.

Obstructio uide
de orator.
Densitas uide.

Ac obstructio quidem ex lentis crassissiq; excrementis oritur: densitas, tum ab ijs quæ astringunt, tum quæ refrigerant. Verum obstrui propofiri nobis corporis cutis, si ad præscriptam rationem ritè agatur, non potest: densitas certè aliquando potest, tum ex ualido frigore, tum alumi noso balneo. Fieri autè potest, ut & post balneū, sudoremue, prius laxata cute, auræ status incidens, obstructionē quampiam densationemq; efficiat. Cui remedium est calfactio: ac proinde ualentiore exercitatione, ac balneo calidiore utendum. Magis autè ad rem pertinebit, si in prima domo pinguitur oleo aliquo antiquo, relaxanteiq; (quale Sabinum est) uoluerit. Mora uero in frigido folio diuturna ne sit, sed neq; aqua frigida. Inducendi autè, ungantur aliquo, quod mediocriter calefaciat. Oleis quidem, ex ijs quæ in Aegypto habentur, cicino & raphanino: in reliquo orbe, dulci, tenui, ac modicè antiquo. Vnguentis uero, fusino, gleucino, iunio, amaricino, & cōmagino. Ex quibus sanè gleucinū, prorsus acopum est, ac relaxans. Paulo hoc calidius, magisq; relaxans, fusinum est. Irunum uero & amari cinum, & cōmagnum, etiā fusino calefacere potentiora, ijs affectibus qui propriè frigiditates dicuntur, sunt idonea. Cutis tamen densitas sanandæ, etiā anethlinū est satis, maxime si ex uiridi anetho fiat. Facit & ad tales affectus acopū quod ex abietis semine conficitur. In uniuersum autem, cum in idem uarij affectus coierint, hi, si unam medendi rationem indicunt, utq; intendi magis eam rationem conueniet, quā si singulis seorsum consistit. Sin cōtrarij sint, ijs qui uia cit affectus prius est corrigendus, ita tamen ne reliquum omnino negligas. At qui uel propter

Olea calida &
relaxantia.

Vnguenti relaxantia.

Anethinum in
questum esse ap
tum cui densitas
laxanda.
Affectus varij
si in unum con
suerint, quod ag
endum.

Venero ex ufo
imbecilliores
dnt, aut ex
latis, aut refriger
tis, qua ratione
corrigi debeant.

Venero dnt car
piu laxus, frigi
dus imbecillus
& siccus.

Apothetapia
quādo sit uisita.
Exercitandū non
esse si subitè em
ditas.

partim molli frictione ex multo olco, partim tēperato balneo sanantur: partim tarda & modica agitatione, quæq; subinde interponat quietē. Is uero apothetapeutici exercitij erat modus.

Siccitas a vi
giles & animi
afflictus orta,
quādo corri
genda.

Ad eundem modum ex quæ ab ira, uel potioris penuria siccitates fiunt, corrigendæ sunt. Cōtraria prorsus à iam dictis ratione humiditates emendare conueniet, quacumq; ex occasione proueniant: quippe studium in his ad siccationē dirigunt. Cæterū si ex longiori desidīa, & humiditatis alimentis immo dico intempeliuolq; uisū, cōtracta humiditas est, longiori remedio est opus: sin ex liberaliori potione quæ pridie sit hausta, extra ullum capitis, aut oris uentriculi affectum consistit, eam uel unico die fricandusq; ut omnino parcissimè, ita neq; duriter, nec mollior est, idig maritino tempore. Quod si etiā cutis densitatem corrigere studeas, utiq; ei quæ ex duris tum frictione, tum cōtrectatione, præterea uehementi exercitatione orta est, mollis frictio cum copioso, & dulci oleo medetur. Quæ uero cōtracta ex frigore est, eam primū frictione sicca ac celeri, deinde cum oleo adhibito calefacietes, naturæ suæ restitueris. Laxitatē uero, quæ frequens balneum, & mollem frictionem, & ueneris usum consecuta est, paucula frictione, primum quidem sicca, deinde cum oleo quopiam corum quæ astringant sanaueris. Humiditatem quæ nimis potioni succedit, sicca frictio cum lino ad administrata, uel cum manica, inter dū etiam solis manibus, corrigit. At uespertina frictio ijs utilis est, quos uale lasitudo ualida premit, uel ficitas male habet, uel atrophia macerat. Igitur in natura propofita, cum ualida lasitudo, uel immodica ficitas corpus afficit, prandium minus cito: tum ab eo ad cenam longius interponatur tempus. Præterea plurimū quiescat: modicum tamen inambulet, quō cibis per erectā agitationem concussus subsidat. Vtilius etiā sit, si & aliū exonerare possit. Hæc etenim probè peracta, securus oleo dulci frices, idig uentre prorsus intracto. Quod si in masculis ei uicinis uel lasitudinis sensus abiquis, uel ficitas appareat maior, ungi debebunt mediocriter, & blandè, & suspensā manu.

Humilitas co
ratitis densitas,
frigidam uen
tatem causat.

Cutis densa qua
modo relaxanda

Laxitas cutis
qua ratione san
anda.

Frictio uisita
a quibus uisita

Prandiu quon
do esse debet m
nus.

GAL. DE SANITATE TVENDA LIB. IIII.

Nunc autem primò de morbosis symptomatibus differre est animus, prout circa exercitationem incidunt. Secundo loco de illis quæ similitudinem quandam cum his habent. Ac quæ immodicas quidem exercitationis lasitudo excipit, sanior symptomata est: quæ uero sine his cōsistit, morbosum. Itaq; & ab Hippocrate cōmodissimè dictum esse uidetur, lasitudines spontè natas nunciare morbos. Atq; ulcerosus quidē sensus symptomata lasitudinis est. Causa uero unde ea nascitur, affectus lasitudinis

Lasitudo
spit a ca
mor
bus pronascit.

nis est. Huius rursus ipsius causa bifariam scinditur. Aut enim intra ipsum animalis continetur corpus, diciturq; antecedens interna; aut omnino non inest, ac procatrica nominat, siue primitia, siue etiā externa. Itaq; tria in uniuersum genera sunt, de quibus habendus sermo est: ipsius lasitudinis symptoma: affectus unde hoc oritur, & affectus ipsius causa. Cuiusq; igitur horum species quædam differentes sunt. Causarū, externa & interna affectus, is qui ulcers, & qui tensionis, & qui phlegmones sensum inuehit: symptomatis uerō, ipsi tres sensus. Qui igitur ulceris sensum facit, is affectus motus quidem grauem excitat sensum, seu corpus ulcrescit: idq; uel circa cutim tantū, utiq; cum est moderatior: uel circa subiectam illi carnē, cum est ualentior: uel circa utraq; eōdem adhuc est atrocior. Atq; sensus ipse est symptoma. Affectio uerō ex qua id nascitur, acrimonia est tenuis & calidi humoris, qui corpus erodit & pungit. Oritur hæc aliquando ex immo dico morte, aliquando ex uinoso succo. Ac tales lasitudines, ipsozanas appellat Hippocrates. Tensius lasitudinis genus plethoricis solet su peruenire. At tertium lasitudinis genus, quod phlegmones sensum affert, ex ambobus oritur, tum nimia boni succi abundantia, tum prædicto uinoso succo. Solus autem rodens & acris succus lasitudinē ulcerosam inducit, idq; dam ad uenis ad carnes atq; cutē transferi. Qui uerō ex abundantiā nasci hanc lasitudinem putant, falsi sunt: nam neq; ex ea copia quam plethorā dicimus, neq; ex ea quæ uires prægrauat, ulcers sensus procedit, fed grauias, uel ad motiones segnitia, uel uita quædā in pulbibus. Porro ubi erodentib; succis corpus ipsum scatur, minimus quidē morus, lasitudinis duntaxat sensum inducit: uehementior, rigorē excitat: medius inter utrunq; horror parit. Potest enim tum horror, tum rigor, à calida causa excitari. Impellit autē ipse acris humor, interdū à sensibili corpore, qd repellendi alieni uim possidet: interdum à uehementiori motione, id quod tum ab exercitādo, tum frictione, tum balneo cōquirat. Quod si calida & putria excrementa, sint, ubi uehementius mouent, nō horrore modō rigorēmus, sed etiā febriam accendunt. At quæ frigida sunt, & ex paribus tenuibus cōstant, ea horrore quidem rigorem inducūt, nō tamen febrē. Porro uim quandam utriusq; congestam esse oportet, si hæc fuerint. Oportet igitur excrementū, siue calidum id sit, siue frigidum, ipsum aut expellat, aut certē alteret. Cæterum quod prorsus alienū est, id ægrē alterari à natura potest: ac proinde educere id quiprimū tentandum est: acq; certē ut quæ in uentre corrupta prorsus sunt, ea uel uomitione, uel deiectione expelli profectū est optimū. Non tamen perinde promptū est in carne, aut alijs corporibus imbibitū uinofum succum educere. Cōmunes igitur scopos, quibus quis omnium excrementorū uires medetur, iam diximus uacuationē & alterationem esse: proprios uerō utriusq; generis adduciamus. Neq; enim una tantum ratione educendum alterandūque est: sed explorata quæ ei quod affligit, magis accommodata sit, ei est insitendum. Ea autem ex cu-

iusque contrario debet administrari. Quoniam igitur lasitudo ulcrosa, utio acrium excrementum oritur, ante omnia considerandum est, in solidis ne tantum corporibus, aut intra uenarū sinus, malus succus cōtineatur. De his uerō quæ intra uenas sunt, nullum planē nec manifestum, nec euidens signum habemus, præter solam urinam. Consequere tamen licet ex natura, cōsuetudineiq; ac breuiter ex uniuersa uictus & exercitij ratione, corporis æ lasitudinis affectū, qualis ipsius mali succi sit modus. Nec minus profectū ex uniuersis affectibus cūis, quibus aliquando tentari est solum: ac deniq; ex euacuationibus aut retentis, aut intermissis. Vbi igitur omnino exiguis, & ad cutim tantū collectus ipse utiosus est humor, medicus remedium postulat: ualentius autem, si multus & in profundo. Porro si à uobis ille boni succi antea propositus uenienis, uunc necessitate quapiam urgente, longi temporis iter confecerit, in quo praua uictus & exercitij ratione usus fuerit, nihil tamē in modo assumptorū deliquit, ac proinde neq; in cruditatem incidit, talis certē multū mali succi congestisse non potuit: quare sola apothierapia curatur, huc omni reuocato consilio, ut excrementa quæ circa cutem sunt, educantur, propterea quod affectus in hac uia consistit. Quod si præter alia etiam in cruditate incidit, sentiatq; uō cute tenus modō, uerū in alto corpore ulceranois sensum, sic ut totum id malis succis refertum suspicere, huic nec exercitatio, neq; ullum omnino inungens mortem, fed quiescere ac dormire insilium, in abstinentia totum diem exigere cogemus. Dein uespertī pinguiter unctio, & remperato balneo mediocriter lauato, pro cibo dabimus sorbitionē aliquam boni succi, sed planē quimūm. Nec tamē à uino tum abstinebimus: concoquit enim id semicrudos humores, tum sudorem, urinamq; promouet, ac somnū conciliat. Quod igitur mali succi iam planē corruptū est, nec concoqui potest, in sudore, urinamq; expellatur: quod semicructum adhuc est, concoquatur, atq; unie reddatur. Id autem quies & somnus optime præstant. Si ergo his peractis malū cōstituerit, ad consuetudinem rursum reducendus homo est. Sin in posterum etiam diem durer, de ualentiore iam remedio est cogitandū: maxime si per noctem uel lasitudo magis q̃ antea, uel fastidium infestet, uel peragilet, uel somnos turbatos, & imaginationib; inquietos habeat. His siquidem, si uires nō dissident, aut sanguis mittendus est, aut purgatio exhibenda. Nam si uires imbecilliores dehortant, sanguis mittendus nō est, sed deiectione mediocri utendum. At cōstante robore uris, si lasitudo adhuc infestet, ac uiriosus quidem humor qui ipsam gignit, cum sanguinis copia cōsistat, uena tundenda est, aut aliud quod tantumde ualeat agendū. Sane tantumde potest, luxmorrhoidū, menstruumumq; puruocatio, quibus superflua sunt. Quibus autē horū est nihil, maleolorū incisio cum scalpello. Post hæc alius eo medicamentū deſicienda est, qd malo succo maxime accommodatū sit. Quod si uitioni tantū succi circa sanguinis copiam subsint, purgatio petenda est, quæ infestatis excremento

Vinam solā in dicarnationem honoris delatationem uenit.

Apothierapia si la quādesit lasitudinis uiciorū sufficiat remedium.

Lasitudinis uiciorū, cōstante cruditate, ratio.

Balneo uisus in cruditate.

Vini opora.

Corrupta uacuatione esse.

Cruda esse cogenda.

Cruda concoqui à quæte & somno.

Sanguis quando mittendus. Docet hunc quādo esse uicendum.

Maleolorum incisio quādo mittenda.

*Cachymia no-
ta unde fimen-
da sint.*

sit etiam cōmoda. Hinc autē mali succi notē su-
mentur. Qui in ocio degunt, hi pituitosum suc-
cum solent accumulare. Quos multus labor ex-
ercet, hi biliosum, uel melancholicū, illūm exi-
t, hunc autem gignunt. Quāto autē diu-
tiores labores fuerint, tantō sunt ad atram
generandam bilem magis propinques. Præterea
qui cum multo sudore obcutur, hi crassius ex-
crementū faciunt: qui sine sudore peragunt, ma-
gis tenuē: ueluti qui hyeme, & frigido ætate
colliguntur. Ad hæc etiam, nō solum urinae mul-
tutudo & qualitas, sed ipsius etiam sudoris con-
sideranda est. Cuius in eo qualitas dignotio nō
modō ex gustu & olfactu, sed ex colore etiā faci-
lis est. Pallidus quippe cernitur sudor, pro cuius-
modi bilis ratione. Sæpe tamē post ualidissimos
labores & uehementē æstū, planē flauus conspi-
citur: aliquando mediū, atq; ex ambobus mi-
xtus. Ad eundē modū & ipse bilis hi morē se ha-
bet. Qualisq; uerō is in corpore habetur, tale
necesse est eius apparcat serum. Ac sudor qui-
dem succorū qui in uniuerso corpore abundat,
nota est: una eorū tantū qui uasis cōtinentur.
Itaq; tum consistentiā, tum colorē urinae, nec-
non quæ in ea pendet, aut sident, perpendere
oportet, utque ostendant qualis nam sanguis
sit qui in uasis habetur. Quādo si in biliosus sit,
serum quoque eius biliosum esse necesse est. Simili
modo pituitosum, si pituitosum. At ubi crudus
planē is est, utiq; tenuis aquosusq; urina cernitur,
nihil nec quod fidat, nec quod pendat in se ha-
bens. Vbi autem concoctus, licet in urina appa-
rent, desuperq; tennes quædā nubecule. Quod si
turbida sit, qualis ueterinorum uisitur, crudis
succis refertas uenas indicat, non tamen cessare
naturā, sed eos ualenter conquire. Si uerō ce-
leris separatio crassi à liquido in ea cernit, sitq;
quod subsidet album, læue, & æquale, iamiam su-
peraturā ipsi omnes succos naturā indicat. Sin
cūm emingit, pura sit, protinus uerō turbetur,
iam crudi succi concoctionē aggredi naturā do-
cet. At si interpositi tempore turbetur, nō pro-
tinus, sed post aggressuram in sinuat. Similiter si
protinus separatio fiat, & id quod subsidet, sit al-
bum, læue, & æquale, superiore longē naturā
succis quos concoquit, indicat. Sin bonum sit
quod subsidet, sed longiori tempore colligatur,
etiam naturam temporis spacio superaturā suc-
cos declarat. Si uerō uel omnino nulla separatio,
uel id quod subsidet malum sit, imbecillitas
naturæ significatur, egerit ope aliqua ad succos
percoquendos. Sic uerō urina succorū qui in
uasis sunt constitutionē prodit: ita sudor, & alia
quæ per uniuersum animalis habitū conspicia-
tur, eorum qui illis sunt affectus demonstrant.
Quippe superannus in eo caldis succis, insolu-
tus caloris sensus percipitur: frigoris uerō, cūm
frigidi dominantur. Iam albiore, pituita domi-
nante: pallidiores, bili abundare, cernunt. Siqui-
dem color à succo provenit, nō à solidis anima-
lis partibus, utq; cūm se succi in altum non rece-
perūt. Accidit uerō id illis propter frigora, rigores,
uel animi affectus: uelut timorē, uel ingen-
tem tristitiam, uel incipientē uerecundiam: quo-
rum si a diu nullum, nunquam se in altum reci-

piunt succi. Acque neq; in cutem uolentius ir-
ruentes, hanc adurent unquam, nisi animus ali-
quo modo affectus sit, aut ætū immo diu anima-
lis extrinsecus obfessus. Ergo si neq; ambi-
entis uolentia, neq; ullus animi affectus subit, cer-
tissima succi animalis cognitio ex colore datur.
Quare si ad rubicū diu q; pro natura mutari sit
corpus, sanguinis abundantia sublelle significat:
si ad nigrus, nigram superesse bilem ostendit.

10 Porro color plumbeus, quiq; mixtus ex albo &
luido est, crudos & pituitosos dominari succos
iudicat, minus tamē humidus q; sit pituita cōmu-
niter dicta: cui si addit lentor, utreus succus dici-
tur à Praxagora. Generaliter igit eiūsmodi succi
omnes albi crudisq; sunt: nomenclaturā uerō a-
liis aliam sortitur. Ipsorū autem cōsistensio foris san-
guis in medio est: hi siquidem ex eo supra uisū
percocto sunt: illi autem, ex nondum perfectō.
Ac singulorū quidem uariæ sunt differētiæ. Cæ-
terū in corpore lasitudine affecto, ubi paulu-
10 lum in citra sanguinem restitum, uel ultra pro-
cessum est succus, audacter mittendus est sanguis:
ubi plus, consideratus agendum: ubi plurimū,
in hoc nullus omnino mittendus. Inspicere uerō
& quantitatem cōueniet: uerbi gratia, si bo-
nus sanguis exiguus sit, reliquus uerō succus
plurimus, utiq; in his abstinendū à detractiōne
sanguinis est. Sin is quidem exiguus, sanguis ue-
rō copiosus, audacter incidenda uena est. Dein
20 demerere aliū oportet, ratione habita de abundan-
tantis succi copia & specie. Quod si quis detra-
hi sibi sanguinē nolit, huic deprendenda largius est
alium: aut si id quod suspectū habeat, alia ratio-
ne educum quod sit superuacuum. Iam uerō, si in
uenoso ualorū genere copia semicrudorum hu-
morū subit, in reliquo autem corpore multitu-
do horum mordaciū, cūm duo hi nobis scopi sint,
nempe semicocctorū percocto, atq; acuti & mor-
daciū educitio, abstinere eos cōuenit ab omni
ualido motu, quos lasitudo secuta fuerit. Blande
tamen unctos atq; oleo perfrectos, perquam
suauē lauare balneo expedit: inde in ocio abili-
tēnāq; habere, atq; etiā somno, si id fieri possit.
Nihil enim pque cōcoquit, aut malos succos dis-
cutit, ut somnus à balneo. Conducit autem ad
somnia non in postremis etiam & balneum ip-
sum. Quod si secunda die & tertiam, similiter gra-
uatum sentiamus hominem, iterum atq; iterum
utemur eadem medendi ratione. Sitq; nbi soma-
nus & causa & signum sperare utilitatis perco-
30 modū. Imbecilis est diuerso, non posse à balneo dor-
mire, nec causa, nec signū est cōmodum. Sed ex
somnia uigiliisq; plerūq; redundantis succi indi-
cia sumuntur. Frigidi namq; succi, * foporem
& longiores somnos inducunt: calidi & mor-
dares, uigilias. Sicuti autem in primo, ita in secundo
die, ex simplici tremore prorsus, aut ex alica,
cui paulillum aceti ad incidendum permixtum
sit, si crudis in suspicio subit, forbitionem mini-
mam eis exlabeibimus. Quippe ut largior nutri-
tio nocet, sic abstinentia omnimoda, nausē in-
ducit, uentriculū lædit, resoluū uires, ac prauū
succum accumulat. At boni quidem succi est alica.
Ceterū nisi lentor ipsius corrigatur, adie-
ctus aceti & porro modo dico, non solum obstruit,

*Color corpora
quando sit ex-
quisita nota coi-
ra, qui subsistit,
humorem.*

*Color plumbeus
quid indicet.*

Vitreus succus.

*Sanguis mittens
quid in corpore
lasitudine sit.*

*Aluum esse lan-
guine rucandū
q; qui per lasi-
tudinem uero
san carra si bi
sanguis no-
lunt.*

*Somnia à bal-
neo conquire,
ac malos succos
discutere.*

*Balneum cōdu-
cere ad somnū.*

*Frigidi quid sit
foporem, foporem:
calidi autē, uigilias
signare.*

*Cruditati qua
forbitio cōmoda
Abstinencia om-
nimoda inducit
nausā, ac prauū
succum accumulat.*

*Alica lentor cor-
rigendus aceto
Operari.*

sed

*Humores crassius
rei cyper per la-
bores qui cum su-
dore obcutur:
tenuiores autem
in illis, qui abs-
que sudore sint.*

*Sudorem esse no-
tam fieri qui
in uniuerso cor-
pore abundat.*

*Urina indicat
tantū que conti-
nentur in uasis.*

*Urina aquosa
& tenuis quid
inducat.*

*Turbiditas uri-
na quid indicet.*

*Urina permota
tenuis species va-
ria.*

*Sudor quid in-
dicet.*

*Color à succo
prospicitur, ut
à solidis anima-
lis partibus.*

*Succus à quibus
causis in corpore
solentur.*

Aceti uni parti, additur mellis duplum, & aquæ quadruplū. atq; hæc ad tertiam vel etiam quartam partem coquuntur, spuma interim detenta. Quod si ualentius id facere studes, tantundem infundes aceti, quantum mellis. Apomeli optimum aqua conficitur, bibiturq; tota æstat et refrigerantis uice. Potest uero cui uis libet, & ad quam proposuius affectionem eo commodè uti, potissimum ubi coact: id quod sæpe contingit ei, aliis magis, alijs minus, utpote ex aqua confectio non pluuijs, sicut nulla, sed qualibet. Quanquam potest qui uolet, & ex aqua pluuijs id con-

Apomeli refrigerat.

Mellijm ex pluuijs aqua conficitur.

Plumam aquam non probat Galenus.

Apomeli cum possum.

Vina que acies leuiter, esse crudas etiam commoda.

Cappari esse oxyphile facit ad cruditates.

Vinorum generis uaria.
Vina cruditates aduersionis.

Vomitum cum uena recedat per crudas etiam laesuras copulat.

Humores reuocantur ab alijs.

Humores intro pelluntur.

Vomitum quidam reuocant.

Vicinis præstitis signis, crudities humoribus ab alijs in corpora habitum distrahunt, quæ vici-

ad cutim usq; suum calorem transfundant: frigidumq; largiter oleo quod relaxandi uim habeat, ac potissimum manet, cum surgunt a somno. Nam ea tritico concoquit crudum succum, simulq; corpoream molem animantis nutrit. Quiescendū uero diu post hæc est. Cedit autē negociū felicitas, si homo exiguū cibū pridie sumptis, nec aliud a cæna bibitur, quā tenuē unū, saluberrimū. Post ipsam autem quæritur diuturnam, modicē inam bulandum esse: ac dein tum denuo multa frictio-

ne, tum balneo modicē calido, & alimentis quæ boni sint succi, utendū. Quin etiam medicamentis diacalaminthen audaciter dabis: cuius talia est compositio: Accipe calaminthen, pulegijs, petroselinis, feseleis, cuiusq; uncias ꝑ. semina apij, cacuminum thymi, singulorum unc. iij. Libyitici, unc. xvi. piperts unc. xviij. Hæc omnia ubi e-

lescissimum fuerint, tenui tundenda cribrandiq; sunt tenui cribro. Tenuia quippe medicamenta in totum corporis habitū maxime digeruntur: ueluti è diuerso, crassiora in uentre hærent. Idcirco Diopolicum medicamentum crassius facere soleo, quoniam deiciere alium per id studeo. Miscendum his ita præparatis mel optimū est, cuius oleo desumpat. Porro usus eius erit post matutinam frictionem, ante exercitationem & balneum: potestq; etiam cum aliquo cibo mixtum assumi. Post cibum autem nunquā nec hoc medicamentum, nec aliud ullum quod ad distributionem uehementior est, faciendum est. Licet & sine admixto melle siccum medicamentū responderet, eoq; salis uice uti. Ad ipsorū autem concoctionem ciborū, præstat sanè aut medicamentum diatrion pepperon simplex, aut ipsum per portioni inspergi, aut etiam qd ex succo mālī cydonij cōstat medicamentum porrigere. Verūm id ea quæ nunc agimus, optimum omnium est;

quod conilat ex calaminthe. Nam crassa lentatq; attenuat, & per huiusmodi educit, & uenas mouet, & mulebria prouocat, citiq; iucundissimū gustus. Vbi igitur circiter duos uel tres primos dies ita præparatus homo est, exercitationib; cōsuetis tradat, animaduertis prius uniuersis quas iam diximus notas. Nam si omnia cōmodè se habere uideantur, plenè exercitandum est. Sin minus, etiam autē mediocritatem desistet, prius dicta uictus & medendi ratione tractandus, donec posttridie circa exercitia omnibus ex sententia se habebundus, ad consuetum uictum reuocari iam possulet.

Quia uero & acopo qd ex alietis sit, uti expedit nō qui in carne & tota corporis mole succos congererunt, qui aut concoqui desiderant, aut per huiusmodi digeri, apponamus eius compositionem. Igitur abietis pulcherrimum semen, quale circa septembrem colligitur, contere oportet in oleum, quolibet anni tempore, ubi prius confusum fuerit. Postea uero qd spaciūm diuersū ad minimū quadraginta in ipso oleo relaxante (quale Sabinum uidetur esse) mma ducit, ipse liquor est percolandum. Conspicietur autē in quinq; & uiginti olei heminas, eius seminis modius Italicus. Excolato oleo, quatuor cere libras adiungito: resine uero abietinis tertij unius libræ partē. inficis etiam & pinæ resine tantundem. Quod si hārū copia nō sit, earū loco

tere-

tere-

duo sit ratione modulandi.

Diacalaminthei compositio.

Tenuia facili digerunt.

Crassiora in ventre hærent.

Peracta medicamenta debet crassiora relinquere.

Distributionem qd ferrius medicamentum non sit in cibis dandum.

Consuetudo ciborum quæ conseruantur.

Diacalaminthei medicamentum.

Acopi ex abietis cōpositio contra uentis laesuras ualens.

terebinthina utendum. Coctus autē cōmodius hęc in uaso duplici, aut cerę igni lento. Medicamentum enim hoc a primum ad omnē lasitudinem est. Vtile etiā est & quod ex populi floribus fit. Est autē ita tale. Ex illis enim adhuc cōueniens medicocriter ignē tritis, modius Italicus in quindēcim aut uiginti libras Sabini olei aut alterius similis, immittit, quoridieq; sub sole feruido simul torū id dmoebatur, si id fieri liceat.

Itaq; post binos aut ternos menses potes flore expressio habere oleum, quod sine ulla mordicatione, nihil minus quam abietinū, per halitum digerat. Cui tantundē cerę & resinę licebit addere, quantum illi esse adiucendum diximus. Si quidō uerō humidū id quod exprimit, crassius uidebitur, sit fuerit uel quantā partem cerę adijci. Sunt qui in duplici uase eleganter id medicamentū conficiant. Qui uerō celerius id preparare cogitur, huic necesse est aquę uniuē quartā aut quintā partem, ne torreatur, injicere. Atq; ad ea quidem de quibus nunc agit, utilior aqua est: unum uerō ad a ritulares affectus. Ergo & hęc medicamenta succos cuiusq; nō crassius nec lentius in carne cutiq; residēt, euaporant: necnō qđ ex chamęmelo fit oleum, tum ipsum solum, tum cerę quartā, resinę duodecimā parte immixta. Potest etiā & anethinum oleum, aut per se, aut cum cerā & resinā, similiter discutere in halitum. Preparatur autem in duplici uase, fiatq; ex anetho uiridi, maturōiq; iam samphychnū oleum, hyme, & regione frigida, ac tempestate simili, idoneam medicamentum est. Simili ratione ros maris herba, aut bene albę radix, aut agrestis cum cumeris, aut alrhæz, aut uris albę, efficaciter etiam discutit, ubi suas uires in oleo similis facultatis quęq; ipsarū dimiserit. Quod si eorum singulis, uel cerā solum, uel cum ea resinam inieceris, non solum pulcherrimū, sed etiam quod in loco bene hærere unguentum facies. Abundē autē omnino erit, si cerę quartam partē, resinę duodecimā addas. Si uerō abietinam simul & pineam resinā injicias, aut cum his etiā terebinthinā, aut si hęc desint, humidū pini resinā, aut resinā quę in siccilūna est, aut etiā quam fraxam appellat, sic quoc; medicamentum feceris, quod euaporandi uim habet. Porro ubi pter ulcerosum sensum, etiā copiat liumorū studorū in toto corpore abundat, concoquenda quidem ipsa cruditas primarum uenarū est, concoquendaq; simul & discutenda quę extremas obidet corporis partes: semper ipsius curationis studio in id propenso, quod asilgere magis uidetur. Nam si pari noxa ipsi insensit affectus, respectu equali curādi sunt: sed ita tamen, ut inter initia potiores medendi partes ei pręstentur, qui in primis uenis consistit: in fine uerō, ei qui in carne. Medio inter hęc tempore, ambo rationes quęuabiliter miscbunt. Ad lasitudinem, cām circa exercitationem incidit, abundantiam indicat, quę solidas animalis partes distendit. Vbi igitur sanguinis redundans grauat, optimū est uel ueniā tundere, uel scāficare malleolum. Ex ipsi autem quę in ulceroso affectu retulimus, ubi uisioso succo miscetur, licet ratiocinari & de alio quouis, cūm solus consi-

terit. Iam uerō lasitudo quę phlegmones sensum infert, si quidem spontē orisur, subito accendit uehementissimā febrem, nisi misione sanguinis malo prius sit occursum. Itaq; nec cūctari, nec parū detrabere conuenit, sed, (usi quid obiter) ad animi usq; defectum. Optimum uerō fuerit, his eodem die, si fieri possit, detrabere: ac primum quidem ita mittere expedit, ut animi defectum homo non adeat: secundo uerō, ne defectus quidem ipse est formidandus. Quippe, qui priore detractione resolutus est, secundo sustinere haud potest: in hac uerō si quid tale homini incidit, facillē recuocabitur. Qui uerō sic affectu sanguinem non miserint, hi si euaferint, utiq; fortunę beneficio id acceptum ferrent. Acfirmare autem diligenter oportet, qui sanguinem sunt missuri, in thoracē ue, dorso, & lumbis tensio, pulsantēq; dolor figatur: an in capite potius & collo. His namq; affectus, humeralem uenam diuides, maxime si repletum caput & calidum sentiant: illis uerō internam. Si uerō omnino equaliter lasitudo occupat corpus, ambazum mediam. Ac si ab inca quidem uena febre coperint, alienus est artus, nempe curatiuę, his prospicere. Sin autē tum non febricitant, primo die post incalam uenam, aut prius cremorem, aut sorbinonē ex alica solum dabis. Secundo uerō enā lauare licet cum copioso oleo, nutrire autē moderatissimē, lactuicę, uel cucurbitę, uel prius aliquid colluere. Est & alica in uuluis. Si cucurbitę copia nō sit, malua, betulaq; & lapathio, & atraplice utendum. Quod si caritē quoc; guttare uelit, laxatiles pisces, uel oniscos in alio uire (quod anetho, sale, oleo, & porri exigu in aquam coniectis consistitur) bene elixos dabis. Vno autē utiliter etiam ipso secundo die parcat. Tertiō uerō, si quidem aquę potitionem facillē toleret, tunc quoq; uim abibinebit: si non ferat, potissimum quidem apomeli dabis. Hoc si non sit, album & tenue unum offeres, aliazq; pro ratione exhibebis, quę ut boni sint succi, ita minime calefaciant. Cauendum tamen uel maxime est, ne propter & multū, sed sensim, & paulatim renurias. Alioqui minime ipse uentriculus poterit tantam ciborū colluuiem pro dignitate concoquere, ac proinde plurimū crudi succi rapietur in uniuersum corporis habitum. Venter quippe sua ipsius ca uia nutrimentū suscipit, ut eo nimirū fruatur. Vbi autem expletus fuerit, quod reliquū ciborū est, exprimit, plesumq; cū onus alienum deijcit, uidelicet ad ipsa intestina. Ab his uerō rursus ad uenas suggeritur, a quibus tandem in inuarias animas partes diffeminatur: ubi alimentū ipsum nactum iam concoctionem tertiam, alieno corpori assimilatur. Vnde multi exanati corporis habitu, nisi resiciantur lentē, plurimum excrementorum in toto eo congerunt, atq; ex his nō leuiter agitantur. Quoniam autem per lasitudinē quę phlegmonem repręsentat, uis calidi sanguinis congesta in corporis mole est, uenę autem secto succos ē uasis emittit, uile est post priorem detractionē uisum intermittere, dum aliquid eorum qui in corpore sunt humores, remigrae possit ad uenas. Quod tamen quoniam cōmittendum

Lasitudinis uis phlegmones sensum infert, uasate, per, an quous misissit rissim ad animi deliquium, aduulsiatur. Siccione uisio quande fit uide deo rependa.

Humeralis uena quado ficitur da.

Internu uena in quous tunc danda.

Medica quau de apertu de uena Lasitudinis ple gnomia uisio nate cōmittunt.

Albi uini cōpositio.

Ventriculus sua ipsu causa nutrimentum suscipit.

Nutritio modum.

Sanguis de tra libris prima & secunda ut in terpendum sit tempus.

Medicamina quod ex populi floribus fit, cum posita.

Succi carni in toq; baritis, non potentes. Chamęmeli oleum. Anethini oleū.

Samphychnum plantum.

Deficientia of ficiat quę.

Refinam siccitatis.

Vlceroso sensui si sit causa la eruditio, tam in primis uenis, quam in extremis cōstiti corpori habet, quid agendum.

Lasitudinis tunc sua sponte cōmittunt.

*Sanguis intra
duos dies
deficit.*

non est ut in ijs maneat, utpote ex dimidio corruptam, Idcirco detractionem sanguinis etiam secundum de utramus; aliquando uero & in terio, ubi uidelicet & reuelleret, & ex alijs in alia transferre usum est conducere.

GALENI PERGAMENI de sanitatē tuenda lib. V.

*Humoris natura
diversa.*

Cum hominū naturæ sint numerosæ, dicitur sim uictus & exercitij rationē postulant, quæ ex arte quæ ualitudinē tuetur perenda est. Huius enim beneficio cōtingit, ut qui ab ipso ortu imbecillum corpus nō sunt forni, sen fibus illis, ab omni prius morbo & dolore alieni, ad summam senectutem perueniant. Ego uero, tamen nec salubrem corporis statū ab ortu ipso sim nactus, nec uitam planē liberā egerim, hac tamen ipsa arte usus, post octauum & uicesimū annum ne minimo quidem laboraui morbo, nisi fortē diaria febris, ob lassitudinē aliquando contrācta: cum alioqui liceat nō modo hanc, sed bubonē etiam effugere, si quis liberam uitam sit nactus, uacatq; ab utroq; genere excrementorū, & eo quod in quiescere, & eo qd in qualitate cōsistit. Ergo corpus optimē constitutū, ad sui custodiam, tum in exercitibus, tum in potulentis & esculentis, necnon in somno, uigilijs, balneis, atq; uniuersis animi actionibus, medium utriusq; excessus, idē in qualitate, quantitate, & facultate, postulat. Quod si in aliquo sit errati, corrigendus error est, per contrarij excessus uisurpationē. Ut autē corrigendū non erres, primū corporis affectus ad utrumq; scire oportet. Deinde omnium eorū quæ priore die facta uideris, meminis. Nam affectus quidē, qd delictū sit, docebit: recordatio eorū quæ prius facta sunt acta, quantum tibi à consuetis sit recedendum, insinuat. Imō uero id quod peccatū est, memoria factorū ostendat: & prout corrigere, ex præsentium collatione docebit. Ut, exempli gratia, si mollius quā prius posttidie corpus uideatur, primū quidem frictionū meminis se contueneris, an molles, & cū pinguitudine & balneis leuiter tepidis tibi adhibere. Ab his reuocari ad memoriam debet, an exercitationes tardæ & exiguæ præcesserint. Dein, an portio uberior fuerit. Mox, an cibos plures, aut uatura humidiores acceperit. Postremū, an multum dormierit. Proximū molli corporis affectui, est humidus: hoc differens, quod mollis ipsorū corporū propria qualitas est: humidus, qui in eo continetur, humorum. Discernunt li ractu: nam humidus affectus cū madore cutis est: mollis sine hoc quantum est profectū & molle corpus humidum suis ipsius partibus: non tamen cum mollitie necessariō cōiunctus est humidus affectus. Potest namq; durata caro esse, & tamen maior sudore ē cor poris emitti. Ac siccus quidē immodicū affectus, habitū statim durum efficit: indicat autē, aut cibi potitionis penuriam, aut uigilias, aut uitæ solitudinem, aut multam frictionem, aut deniq; exercitationem immodicam. Hac itaq; considerans, corrigere quotidie errorem poteris, prorsus in inuictus, curatu difficilior euadat. Sem

*Galenus uicij
sanctum.*

*Corpus optimē
constitutū, ad
custodiā sui de
siderare uicij
excessus mediū.*

*Excessum corri
gendū esse per
contrarij ex
cessus uisurpationē.*

*Affectus cogni
tus quid mori.
Recordatio præ
teritorum quod
conferat.*

*Humidus affe
ctus à molli quo
differat.*

*Durum immodi
ci affectus quod
inducit.*

per autem meminere, excessum omnem contra rior excessu emendandum esse. Qui præcepto si corporū dignoscendorū peritiam adieceris, & singulorū remediō: facultates adiunxeris, uniuersis iam artibus quæ corpori hominis tuendo dicata est, peritus fueris: cuius opelice præsentem sanitatē tueri, & amissam recuperare. Atq; optimū quidem corpus cuiusmodi sit, dictum iam est. Quod ab huius perfectione deficit, scire licet tribus id de causis defecisse: aut quod statim in utero, uniuerso statū fuit: aut quod qualibet de causā in nō naturalem affectum possit concelsis: aut ætatis ratione. Omnia uero corrigenda per contrarium excessum sunt. Nam senium, frigidum & siccum cū sit, per ea quæ calefaciant & humectant, corrigitur. Talia sunt balneum dulcis & calidæ aquæ, uini potio: præterea ex cibis quicquid lumentate calefacereq; sunt nati. Quod peritum ad exercitationem, frictionem, atq; omnem motum (qui cibum debet præcedere) scire licet potestatem ex parte uerum dixisse.

Vi laeti, sumptus cibum, det membra sopori.
Namq; hoc iustū fuit.
Postulat autem senium, non secus quā iuuenū, corpus, dimoueri aliquando. Imo corporū quæ in florenti ætate sunt, nō desunt quæ quietem requirant. Senum uero nemo quietem ex toto postulat: sed neq; exercitiū uehementē. Cui enim uentulo quodam excitari, accendiq; calor eorū desiderat: uehementiori autē motu deijcitur. Nec igitur senum omne corpus sit frigidum, nec potens alimentū ad sese trahere, atq; id probē couficere, ex eoq; nutrirī, plurimū frictione pingui adhibita post somnū matutinū iuuatur: quippe quæ uitalis robur excitat, ac modicē calefaciat, efficiatq; ut sit distributio nutrimentī facilior, atq; nutritio promptior. Quare multos etiam laborantes atropia, eiusmodi frictione adhibita, facile paucis diebus carne impleuimus. Frictio itaq; ex oleo administrata manē, ueluti exercitatio quædā sit sensibus. Post hanc inambulatio, est itatioq;, ex senis uiribus cōsuetate. Etenim exercitatio aucta corpus tenuat: cōtraria crassius reddit: multa corpus siccit: mediocris obesum præstat. Verū exercitationis formæ quæ sensibus utiles alieniq; ue sint, tum ex corporis totius affectu, cōsuetudineq;, tum uitæ ipsi quæ insistant, intelliguntur. Ex totius corporis affectu: nam optimū statum corpus, sicuti in iuuentute ad uehementissimos quosq; labores maximē idoneū est, ita in senectate se habet ad omnes mediocres. Quod uero à mediocritate recedit corpus, ad plerūq; id exercitationū inepitū est. Quippe uniuersa figuræ thorax, in ijs quæ per uocem administrant offenditur. Per ambulationē gracilia crura leduntur: de ceterisq; pari iudicio censendum. Quicquid autem ex his parum ritē ab initio cōditum est, id exercitatio imbecillā redditur. Sensibus uero quæ præcipua ad sanitatem exercitia sunt, hæc per ualētiōres corporis partes sunt obeunda. Sed habenda consuetudinis in primis est ratio. Nam quæ consueuerunt, ut minimē lassantia quos exercet, enā defecisse: sicuti ē diuerso, quod insueta sunt, tam displicent, tum uerō lassant. Porro quibus operibus arte opus est, ea ne arri

*Excessus omnia
contraria ei cor
rigenda excessu.*

Medicina rē.

*Deficere ab opti
mā constitutio
ne, tribus de cau
sis contingit.*

*Senium frigidū &
siccum, hume
ctantibus simul
& calefacientib;
corrigendū esse.*

*Seni uero quie
tem ex toto po
stulat: sed neq;
exercitiū ueluti
mouet.*

*Senum corpus a
pluribus annis
in pingui statu
ne post senium
matutinū ad
hibita.*

*Frictionis matu
tinae post somnū
adhibita ualē
tatis.*

*Sensibus qualis
esse debet exerci
tatio.*

*Exercitationis
forma, quæ senis
bus uitalis sint,
uide finis con
suetudine.*

*Membra infirmi
bus ab initio
formata, fieri ex
ercentia imbe
cillia.*

*Consuetudinis
exercitiorum of
fi habendam ra
tionem.*

*Senes confecti
laboribus suis co-
ercendi.*

gere quidem senes debebunt. Senes igitur con-
fecti laboribus exercendi sunt, sed tamen uehementia eorum remissa. Ternū quod dirigit qui ex-
citationis formā præscribit, ab affectione sumi-
tur. Nam quos comitales morbi, uertigines, gra-
uis ophthalmia, uel aurī dolores ex leui occa-
sione male habent, hī inclinati capite, dorsū,
aut humi uolutati, exercitari non expedit: sed
tum ambulatiōe serpē, tum cursu mediocri, tum
gestatione in uelocibus circa fatigationē uti. Si-
milī modo quibus aut in fauces, aut in partes
eas quæ circa collum aut totū caput consistunt,
fluxiones procumbunt, minime quæ caput im-
pleat exercitatio sustinet: sed sunt his omni-
bus quæ per crura gerunt utilitatis: sicut ē diuersū,
qui imbecillis sunt cruribus, his superioribus par-
tibus exercitari est sanius. At quorū mediæ cru-
rum brachiorumque partes opportune offensio-
nibus sunt, hīs quoduis exercitatio genus ido-
neum fuerit, modō ne reliquarū considerationū
ulla prohibeat. Quæ tamen circa thoracem par-
tes sunt, magis inferiorū exercitatio iuuant:
quæ circa uellicū & renes, superiorū. Leni, uen-
triculū, iecur, & intestina, ut in medio superio-
rum & inferiorū sunt, ita se ad exercitationes lia-
bent. Frictiones tamen partibus inferiis, quo
tempore laborant, ad mouere non conuenit. Vbi
sanæ sunt, conuenit ut magis quam aliis, & po-
tissimū siccis. Quinetiam qui certa periodo re-
deunt quibusdam partibus dolores, hi ne fiant,
nō exigua ex eiusmodi frictione cauēo est, præci-
pueque si duas uel tres horas ante accessiōem
adhibita sūt: firmantur enim ex partes, & cōue-
niens fluxiones minus admittūt. Atque hæc quidem
omnibus extraneis cōmunia existunt. Non exer-
citari uero imbecillis partibus, solis sensibus sua-
deo: ex cæteris, quantum quicquæ remotior & se-
nio fuerit, tantō illi magis exercitari pars de-
bet. Cæterū si crura gracilia sortatur, ea sanè
picari, modicèque fricari, & cursu uti potius quam
alio exercitio conducer. Si igitur nec lassitudo,
nec calor præter modum sentiatur, augeri ambu-
lacionem & cursum oportet, nec noui alternis
diebus picari. Si uero lectio eorum cernitur, crura
sursum habitā in lecto collocare cōueniet, & cōpiam
exercitationis minuere, atque infernæ sursum
uti frictione. Vbi uero, his obitis, consecuta
fuerint naturalem habiū crura, ad eum quem
corporei remediōrū usum redibis: adhibitis & ro-
tundis frictionibus, quæ durarum ac mollium
sunt medix. Aliquando etiam & pingui puluere
prius inspersis cruribus, oleū infundes, & mox
fricabis. Si cui uero crassiora quidem crura sunt,
brachia uero cubitiū gracilia, huic omnia quæ
per manus sunt exercitia, sunt petenda: siugenda
uero quæ cruribus obueniunt. Frictiones ta-
men & picationes similī modo fiant. Porro qui
imbecilliores sunt, lios gestatio potius quam
inambulatione dimoueas: ualidiores utroque ge-
nere exercitabis, agēsque ad secundam frictionem
utroque, sed semper imbecillior citius. Nam ubi
imbecillie sunt uires, crebra exiguique frictione
urendum: ubi ualidior, rara multaque. Scire autē li-
cet, sensilis statum corporis, quoniam ex leui mo-
mento in morbum incidit, similī ratione hī qui

*Exerceri qui fa-
perioribus. Et qui
inferius partibus
debent.*

*Inferius partibus
dum laborant,
non sunt fricanda.
Frictio prohibet
dolores per cir-
cuitum reuoluen-
tes, si duas uel
tres horas ante
accessiōem ad
habita sit.*

*Crura gracilia
petenda est, et
cursu exercenda.*

*Brachia gra-
cilia & petenda,
& cū uiui modo
exercenda.*

*Gestatione in
quibus uiuenda.*

*Senibus eadem
qua cunctis. Com-
mune expedit ut
omni ratio.*

ex morbo cōualecant, in uictu esse curandum.
Tutius ergo est imbecillo seni exiguum dare ter-
die, sicut Antiochus medicus solutus est se ciba-
re, qui circa terram uel ad summū quartam ho-
ram, panē cum stico melle fumebat. Post sextā
autem, iam exercitatus & loris, prandebat me-
diocriter, primūque sumptis quæ alium desiciūt:
post hæc maximè piscibus, uel quos laxantes uo-
cant, uel qui in alto mari degunt. Rursum in co-
na a piscium usu abstinent: sumptis autem aut
far cum melle, aut aut ex iure simplici: quæ qui-
dem uictus ratione sensibus & membris omni-
bus integris ad extremū durauit. Sciendum au-
tem est, ut pueris uinū est aduersissimū, ita esse
quampisissimū sensibus. Eto autē id ex his quæ
calidioris naturæ existunt, qualia sunt in Gre-
cia quidem Ariusium, & Lesbium, & Mytili: ex
Italici uero Falernū & Surrentinū. Proxima his
sunt in Italia quidem Tiburnum & Signinum,
ambo uetera: quidō nouella diu sicut in uen-
tre. Secundo ab his loco sunt Adrianum & Sapi-
num, & Albanum, & Gabrianum, & Triphilmū:
præterea omnia Amineæ quæ in Italia nascun-
tur, & circa Neapolim & in Tuscia. Ergo de his
modicè antiquitatis bibendum sensibus est, utiq;
quibus ualeuins caput non est. Quibus autem
est, his & Falernum, & Surrentinū, & Ariusium,
& Lesbū, & Mytilum, & Tmolites, idonea sunt.
Huc autem dirigi omne consilium debet, ut ui-
num ipsū sit substantia tenuissimū, atque fuluo
colore: quantū pallidum cōmodum etiā existit.
Calidissimū autem uinum, si colore spectes, est
flauum: minime uero calidum, album. Quæ me-
dia inter hæc sunt, prout alterutri magis acce-
dunt, ita uim eius exhibent. Vnū igitur illud ma-
ximū sensibus cōmodum ex uiuo accedit, quod
omnia eorum membra calefacit: alterum, quod
per urinas serum sanguinis expurgat. Quæ om-
nia præstat tenue simul & flauū uinū. Quæ uero
ex pallidis aut flauis uinis substantiæ pinguis
sunt, hæc & sanguinē augent, & corpus nutrūt:
quo sit ut ea utilia sensibus interdum sint, utiq;
quo tempore nec ferofam humiditatem in uen-
tris habent, & calidius liberalius desiderant. Cæterū
quæ diu in uentre morantur, ut crassa simul &
astringentia uina, eorum sanè nullum aptum est
seni. Si quis ergo sensum dulci uino uti a balneo
uelit, ubi manē comedit, huic optimum Fau-
stianum Falernum fuerit, aut aliquod illi simile.
Possunt etiam uinis hī uti senes, quæ melle con-
diuntur: maximè uis suspicio est gignendi calcu-
li in renibus, aut podagra, articulariue morbi
impetus futuri. Verū quia obstruēdo a cibis
crassum atque lentum succum gignentibus, diffi-
lior curatu est ea quæ a uinis procedit, ideo ca-
uendum sensibus est a multo alic, aut casei, aut
ouorum, aut cochlearum, aut bulborū, aut len-
tis, aut suillæ carnis esu: multoque magis ne anguil-
larum, aut ostracum, aut cartilagineorum, aut
rhynnorum, aut cetariorum usum frequentent.
Sed neq; ex carnibus ceruina, caprinæ, aut bu-
bula est utilis, nō modō sensibus, sed neq; ulli æ-
tati. Oulla uero iuuenibus quidem nō malus est
cibus. Sensibus tamē, nec ea est cōmoda: atque hæc
etiā multo minus agniua. Hædina uero seni uō

*Senes crebrius
et parum cibis
desi.*
*Antiochus qua
sensu uictus ra-
tione, sensibus
crebrius omni-
bus integris ad
extremum du-
rant.*

*Vinum ut po-
tius est aduersissimū
sensibus, ita quam
aptissimum seni
bus.*

*Senibus quibus
uina sunt cōme-
da.*

*Vinū flauū cali-
dissimū est, al-
bum uero maxi-
me calidum.
Vinū quæ cōmo-
da præstat senti-
bus.*

*Vina incōmoda
senibus.*

*Senes a quibus
cibus cauere de-
bent.*

*Carnes omni
ætati inuicibilis
sunt ceruina, ca-
prina, & bubu-
la.*

Senilis salvia esse meliora recensius

incommoda est: præterea auct ex quæ extra paludes ac flumina, itagnant degunt. Salvia autem omnia meliora recensibus sunt. Ergo ante omnia cauendum ab obstruentibus est. Quod si res cogar aliquando copiosius huius ur, proutius mendum medicamen Dialacanthides est, aut etiam diatrion peperon: aut piper album & redactum in pollinem, cum ipsis cibis ac potione est miscendum. Sed & cepas escitare tunc expediret, alliumq, si huic affueuerit. Quod si post obstruentes cibos, ea quæ obstruções aperiret dederit, atq, ab huius soluta alius sit, utilissimè posttride rheriacem propinaueris, sicuti & Ambrosiam, & Athanasiam. Iam illud prætere arbitror, panem quog, huius exhibendum, qui nec salem, nec fermentum, nec subactionem, nec iustam coctionem desideret: nõ autè ut similitudinem, aut quæ ex ea fuit bellaria, cum nimirum uiscera obstruat. Quippe nisi placens quæ ex butyro & similitudine nist, mel assanum admixtū est, nullus cibis omnibus hominibus, ne dum senibus, magis ad uetus esset. Panis itaq, quod purior fuerit, eo magis seni aduerfatur. Si quidem nisi multum fermenti & salis receperit, diligentissimè sit coctus, obstruções in iecinore, liene, & renibus facit: maxime quibus in his uisceribus uasorū exitus angustiores natura sunt: pro quorū sanè diuersitate contingit etiam, ut alij citra noxam dum lacte nutrantur, alij grauitatè in præcordijs ac maxime pondus, dum urant illo, perferant. Noui autem quendam, cui ex lactis uis dentes omnes perierunt: id quod ea de causa contigit multis alijs. Porro lactis comoda sunt, uentris moderata deiectione, succi bonitas & nutritio: pascuis ipsis quoq, animalibus, quorum lacte sumus usuri, nõ parum ad hæc conferuntur. Nam si scam monia, aut trithymalior quopis uiscantur, constat in lacte etiam laxandi uires infle. Quare animalibus quorū ueluti optimi succi lactis usus, neq, acris, neq, acuta, neq, admodum austera nutritura esse debent. Animal autem ipsum sit ætate florens oportet, habitusq, inculpato corporis. Sanusq, fuerit alterum capram, alterū asinam esse, rarūq, lacte uictibus uti. Quippe asinus lacte tenuerofumq, est: capræ, mediocris subtilitatis exstitit. Itaq, hoc nutret mater, illud omnino ruitus est. Nam & si quando solum cum pane fuit mutur, tum citius subducitur, tum minime est stultentis: sed neq, in uentre cogitur, potissimū si prius salis aliquid & mellis in miseris. Lac tamē nõ omnibus exhibendum est, sed eo solis, qui id probe concoquant, nec ullum ex eo symptoma in dextra præcordiorū parte sentiant. Vina autē quæ calidiora sunt, & quæ ipsas urinas mouent, ea magis conducunt senibus. Cum autem senile corpus, quantum ad ipsas partes attinet, frigidum siccutiq, sit: facile autem ierosus & pituitosus excrementis, eo urium infirmitatem, impleatur, hæc quidem purganda sunt, solidæ autē partes calidioræ simul & humectandæ. Iam quod moderato motu & somno senes indigent, satis magna documenta sunt, quod uictus eorum consilium dirigi debeat. Quare si quando propter pituitam aut obstruções cogimus aliquid ex his quæ incidunt ac discedunt petere, reuertendū

fine mora ad humectantē uictum est: atq, alia ex melle, cui acen aliquid mistum sit, aut ex mulo, nimirum ex libano exhibenda, aut lacte utendū, aut priuata bene cocta, quæ piperis pollinem acceperit. Ita uerò & maturi sici, præ cæteris autumnalibus fructibus eligendi sunt, sicuti hyeme carice. Panis autē præparatus sit uti diximus exhibeatur. Sed urinas quotidie moueri cōuenit, nõ per pharmacā, sed apio, & melle, uinisq, ad id faciendū: necnon alium soluere, potissimum oleo ante cibum absorpto, atq, olenibus ex oleo garopis ante cibum assumptis. Quin & ficis, prunis, alijsq, id genus quæ ætate autnolū uigent, solum nõnullis aliis. Hyeme uerò tum caricis, tum Damascenis prunis, aut elixis, aut in mulo cui plufculum infusit Artici mellis, maceratis. Non gè autem ad deiciendum aliu Damascenis Hispania præstant. Oliuas etiam ex muris præsumere aliquando licet. Aloen uerò (quod multos senum, quibus fucus ueter est, facere uideo) laudat quaquam sumi iussim, nisi maior aliqua necessitas urgeat. Quod si biduo astrictus uenter tunc die nõ soluitur, sit eo tempore fuerit mercutiale herbarum, & marinam brasiacā, & cnicum in priuata, dedisse. Similiter & terebinthi resinam, nucis ponticæ magnitudine: aliquando duarum triumue. Quippe non modò alium solui uere citra noxam potest, sed etiam uiscera omnia, tectur, lienem, renes, pulmonesq, abstrigere. ¶ Vitarum autem prædictarū exhibere oportet, tum uerò id medicamentū quod ex caricarum cucurbit, & pelliculis exutorum tuiorumq, pari mensura consistat. Sumere uerò cōuenit duarum triumue caricarum magnitudinis modum. Cæterū nullum eorum quæ dicta sunt exhiberi admodum copiose debet. Si quidem nonnulli in præsens gaudent, si copiosius desideret: uerum quantum magis sunt uacuari, tantò his uenter sequentibus diebus magis astringitur. Quo fit ut ipse, si qui sunt quibus in diuturnis morbis uenter fistit (contingit enim id post longum morbum in conualescentia) huius alium ducam non acerbis per inferna infusus, sed tantū oleo: id quod sanis similiter utile est. Omnis porro affectuōnis corporalis prouidentia, in duobus cōsistit: nempe propria eius internodienda essentia, & materiarū præfidiorum uiribus. Ut statim in proposito nunc sentio, qui scienter pernouit esse lectum esse lectum & frigidum corporis temperamentum, annorum multitudinis ratione proueniens, si quidem quæ humectant pariter & calificant præfidiorum materias nonit, in idoneis senum medicus fuerit. Quod duplex uerò materiarū genus cū sit, quæ sumuntur, quæ geruntur, quæ educuntur, quæ fors admovent: utiq, ex singulis eligere oportet, quæ calescere humectareq, possint. Quod autē ad exercitia pertinet, ut iuuenibus ea mutare quæ nocent, tantandum est, enā si a pueris his maxime infuerint: sic uilius est senibus consueto opere exercitari, uel si modice noxiū sit. Sicuti uerò senum ipsorum inter se non parua differentia est, ira & eorum quæ natura siccorum frigidioraq, sunt, si ad medicamentum comparas, non parum in temperie differentiam inuenias. Atq, humectare quidem hoc cale-

Senibus uictus humectans congruit.

Ficus maturus congruus senib.

Senibus urina et alius quibus me dicamentis atq, alio uicandis.

Damascena priuata.

Oliua. Aloen ipsum improbat Galenus in senibus.

Ventrem soluen ea tunc.

Terebinthinau soluen alia abstrigensq, restringit.

¶ Vitarum.

Medicamentum ex caricis cucurbit, absorptiōnda cōmodum.

Ventrem tantū magis astringi sequens tempore, quod magis uenter uacuat.

Chylum ex sola oleo ad diripiendū ad elonandum modum, sicuti esse.

Affectuōnis corporalis prouidentia, nempe propria eius internodienda essentia, & materiarū præfidiorum uiribus.

Senium quid.

Materia remediōrum quæ duplex genus.

Senium diripiendū quæ humectans, & calidificans.

Senes exercenda congruis opere, uel si modice noxiū sit.

Senes quibus uictis debeat præsidia ne in obstruções uis incident.

Panis qualis ex libano uis.

Bellaria esse abigenda à senibus.

Melle corrigi præuicatem placentalium.

Panis quo purior fuerit, eo magis sine aduerfatur.

Lac esse aduersissimum dentibus.

Lactis comoda.

Pascuis animalium uis conferre pascuis ad bonitatem lactis, maxime.

Asinum lac quale.

Capritum lac.

Lac asinum uicissim in uentre cogitur.

Lac quibus sit et uis uicissim.

Vina senibus quæ conducunt.

Senile corpus, portibus quid pascuis esse facit.

Ex frigiditate colicæ tamen in se potest esse excrementum.

Quæ sunt purganda.

calefacereq; cōueniet: audacius tamen eos, qui per ætatem maiori exercitio ferundo sunt. Conducit autem ad certiorē affectū notitiam, cūm ætatē confutandis, tum causarum quas pro catarractis uocant, consideratio. Qui uerō affectum exactē norit, faciliē adinueniet remedia, cūm contraria contrarijs auxilio sint. Malē itaq; affecto corpori, semper contraria: optimē se habent, uiribus similia exhibeantur. Quinetiam intemperies ipsas, quæcumq; adhuc intra fanita-

Affectu cognitis, facili inueniet remedia. Contraria contrarijs auxilio esse.

Sana esse constituta similibus.

Intemperies quæ intra sanitatem fines confusit, per eam quodam contraria possit lauari per labores autem, similia.

Similibus maioris parte morbo tentamus.

Intemperies quodammodo ad propriam naturam redit, quā ad optimū temperamentū accedit. Quippe id cūm in medio omnis intemperantiæ sit, quisquis conueniente naturæ suæ morbo laborat, ab eo longius abest: qui dissimilis, minus. Ergo nec assuetudines ipsæ, tamen si parue sint, dissimilicibus adhuc sibi corporibus, sunt mutandæ. Cūm autem cōtrarij inter se multorū hominum corporis status sint, certē mirandum non est, nōnullos utilitatem ex contrarijs percipere. Ac proinde sicut fieri nō potest, ut unum calidum ad omnes homines fatur accōmodet, ita nec medicus unam omnibus uitæ speciē quæ conducatur, potest accōmodare. Nonnullos liqui-

Affectu cognitis, inuenietur autem esse.

Speciem uitæ suam, non possit omnibus accōmodari.

Calidū quibus sit uoluntatem.

Ratio inuenit. Expectatio fidei inuenit rō com probat.

Leue in quibus debet cōprobat.

Calidū naturis quibusdam esse. Dissidia ueniunt inuenit rō quodam.

Calidū quibus salubre.

Calidū morbus prædicti quæ ad ueritatem.

mento) ualentiōres motus desiderat, ac uictū in quo superet quod tenuem succū faciat. Hi uerō, nec si in sole exercites, lædunt: nec etiam si balneo absterant. Porro senescit celeriter, quæ corpora frigida & sicca sunt. At humidum & calidū temperamentū est fluxionū uitæ obnoxii. Iam uerō omnes intemperas naturas corrigere quidem contrarijs oportet, dum planē in ocio sunt: seruare autē similibus, dum per negotia uacare sibi nō possunt. Cæterū plus laborandū est propter humiditatē corporis: præceleri motu non utendū, propter calorē. Ad huc, cūm ex signiore uitæ ratione ad exercitationes & balnea se transferat, illic fluxionū tentantur morbis, nisi prius sint uacuat, quā exercitationes adeant: quare autem terere per ueris uinū sanguinis de-

Naturis si quibus ac humidi, quæ obnoxia.

Senescit celeriter corpora quæ.

Intemperas natura di sunt in ocio, corrigenda contrarijs: ut si nuda similibus, dum sibi uacare nō possunt.

Sanguinis delecto, aut per ueritatem, quibus ac in prospectum dum sibi uacare nō possunt.

Vinū frigidū ex sicca natura est utilissimum.

Vinum medicum, modicū natura dandum.

Calidū tempera modicū differens triplicem.

Calidū tempera modicū alij excessu humori et ficitur, quæ ueritatem offerat dum sit.

tractione oportet, aut per incisionē uenā, aut scarificationē malleolis. Quod si ira inaniri recedunt, purgandi medicamentis sunt, non simplicibus fauleariis, sed quod trahere statum bilem, & pituitam, & serosa excrementa possit. Vinum autem frigidū & sicca naturis utilissimū esse prius dictum est: circūcindendū uerō ijs est, qui summe calidi propter intemperiem existunt. Nam qui media temperie sunt, utiq; plurimus ijs fuerit naturalis calor: ac tali quidem naturæ mediocriter dandum est uinum, sicuti ipsa quoq; mediocriter est. Sed cūm triplex genere sit calidi temperamenti differentia: una, in qua reliqua cōtrarias (nempe quæ in humido & sicco cōstitit) mediam temperiem seruauit: altera, in qua siccitas subultrat: & tertia, in qua unum calidiorē reducat humidum: ei quidem quam primo loco diximus, tantum albi, tenuis, atque diluti uini offeremus, quantū ipsa à summa intemperie recesit. Reliquarū autē differentiarū neutri, cūm summe caliditates existant. At quod calidissimum uinum est, id frigidissimū intemperantiū est utile: reliquis autem quod portione respondet. Hæc uerō dicta militi de ijs sunt, qui mediam senectutis ætatem agunt.

GALENI PERGAMENI de sanitatē tuenda lib. VI.

Cūm autem anterioribus quinglibris, quod pacto quis cum qui optimo corporis sit statu, ab omni ciuili negotio immunit, propriæ tantū ualitudini indulget, à prima inuente ætate ad ultimam usq; senectutem in sanitatē custodiat, iam abunde docuerimus: nunc faciat ad eos ueniemus, quibus per negotia esse, bibere, atque exerceri debito tempore haud licet: præterea ad eos, qui statim ab ortu sunt ualitudinarum corporis statum sortiti. Vitiōsi autem corporū status, genere duplices sunt. Alij siquidem inueteras similes particulas similes habent intemperas: alij uerō dissimiliter, inæqualiterq;. Quinetiam instrumentis etiam partium compositione, quædam æqualiter, quædam inæqualiter condite sunt. At primū quidem dicam licet quoq;, qui status corporum sint maxime ualitudinari: sicuti & prius, qui maxime sanus esset, ostendit. Verū si unusquis erit. Etenim in omnium rerum genere, quod optimum est, id unum est.

Vitiōsi status corporis esse duplices generis.

Vinum ubiq; est, quod optimū est.

Vitiosa esse plurima.

Intemperium vnam per se diu durare non possit.

Temperium optimam sibi adolefcentia accendit.

Althos corporis adolefcentis precipue potius, ut animalis, proveitioribus, quae de destinationem.

Atque circumscriptis numeris annorum non possit.

Rebus humanis omnibus possit in generis etatem.

Sanitas latius deest amplius.

Sanitas finem non est sanitas absoluta.

Corpora ab iis possumus constituta, non pervenire ad finem: aut ali quo tempore morbo interit.

Calidiori abiectione humidi- tatis aut frigida sit temperans ut quae desint.

Vitiosa uero plurima sunt. Eorum autem quae per omnes partes similem habent intemperantiam, maxime improbanda sunt, quae ualidas habent ipsae intemperantiae, ac potissimum frigidas simul & siccas. At eorum quibus inaequaliter se habent corporis partes, illa quidem maxime morbis parent, quorum principis maxime partes contrariis intemperantiis affectae sunt. Minus obnoxiae ualitudinibus sunt, quibus ignobiliores partes ira se habent. Afficiuntur autem interdum partes per consensum aliarum, atque consorsit lege. Primum ergo de his uerba faciam, qui aequali sunt intemperie, id est ab his qui praeculdi sunt, auspiciis. Dictum autem alibi a nobis est, non posse diu intemperiem unam solam per se durare: quidam ipsa sibi ipsi alteram ex necessitate afficiunt. Sciendum etiam est, temperiem optimam corpori in adolescentia accedere: reliquas autem etates, hac deterioratione existeret: necnon corporales quidem actiones, praecipuas adesse pueris: animales autem, etiam, quae a pueritia ad remissionem usque succedunt. Nec tamen est hac etatem annorum numero circumscribere, nisi forte in latitudine quadam. Pubescere quippe incipiunt aliqui, ubi expleverunt quartumdecimum annum. Quidam uno post anno, aut etiam amplius. Initium praeterea remissionis nonnulli habent statim a trigesimo anno: nonnulli post quintum & trigessimum. Ac robur quidem omnibus minuitur, post ipsam summi uigoris etatem: non tamen hic sanitatem amittunt, tamen minus uero hanc quam antea laudabilem habent. Nam cum latitudo fatians sit ampla, non solum usque ad initium senectutis, uerum etiam in ipsa senectute tota (quae quibusdam naturae esse morbus uidetur) sani dicuntur homines, sanitate senectutis congruente: quae tamen, sanitas absoluta non est, cum actiones in senibus non sint perinde ualidae & firmae, ut in his qui etate florescunt. Quare horum sanitas, propter ipsam actionum uirtutem integra est, & de qua queri non possit: senem sanitas, quoniam omnia non uacat. Quamuis enim omnes actiones habet, nullam tamen ualidam possidet. Porro corpora quae a prima statim genitura prouenit ad morbos ita turn sortita sunt, ea sanae ad senectutem nunquam perueniunt: aut si quando perueniunt, uno saltem diutino morbo penitus laborant. Qui autem salubrem uicem rationem ignorant, credibile etiam est, hos citius quam pro naturae ratione interire. Sed iam ad illos conuertamus sermone, qui aequaliter per omnes partes, calidius sunt sortiti temperamentum: ceterum in humiditate & siccitate se habent modice. Ac talis quidem corporis natura, ab initio statim magis apparebit sana, quam quae in utraque oppositione est vitiosa. Citius quippe edet dentes, & citius articulatam uocem, ingrediturque citius, & singulis annis ad portionem incrementi. Postea uero quae adolescentiae annos compleuerit, exinde ad remissionem usque manifeste apparebit calidior, ita ut tum morbis, tum symptomatis quae ab bile oriuntur, facile sit obnoxia. Multus namque calor dum humorem adsument, siccus reddit temperamentum. At cum florescit iam etas: item calida sit, nimium composita eorum temperies, calida si-

mul & sicca erit. In talibus autem temperantibus, bilis abundare tum pallida, tum saua solet. Sunt uero, qui hac natura sunt, ad etatem usque adolescentiae, similiter educandi, qui optimae sunt naturae. Si igitur bilis ipsa uentrem superio rem petat, per uominum expellenda est, post exercitationes aqua tepida propinata: nam uino tunc utendum non est, nisi difficulter uolant ex aqua. Quippe eiusmodi educandi naturae sunt, quibus utique uinum dulce, ubi aquam praebuerint, est concedendum. Praeterea etiam magis, ubi temperamentum eorum ab initio calidius siccitiusque fuit, uomitio petenda est. Quam & exercitatio utilis est, non acuris exercitationibus & praeugetis, sed potius tardis, & mollibus. Sunt enim omnes qui hoc statu sunt, graciliores. Acute autem exercitationes extenuant: lentae implent corpus. Sunt uero etiam qui impense calido temperamento sunt, & qui exercitari prorsus non debeant: sed abunde hic satisfaciunt inambulatione, balneo, & mollis ex oleo frictio. Quos etiam uiuat a cibis balneum, nisi in dextra praecordiorum parte dolorem, tensionemque aut grauiter sentiant. Etenim quidam eorum incredibile est, quam etiam obeli sint redditi ex tali uictus ratione. Antiqui autem uinum inimici his est: album uero & tenue, idoneum. At si quando eorum quae dixi aliquod circa dextra praecordia sentiant, illico dandum aliquod est eorum quae iecur obstruunt libenter, abstinendumque ab his cibis, qui crassum efficiunt succum: id est donec affectus sese remiserit. Vile sane fuerit & liquor in quo macerata sit absint huius coma, offere: praeterea quidrum ex ea, tum ex aniso & amaris amygdalis conficitur: quod etiam bibere ex oxymelte praestat in eo tempore, quod inter surgendum & somno, laudum amig interuenit. Non inutile est & medicamentum dicacalaminthes, ex oxymelte: cuius tamen assiduum usum canere oportet in biliosis temperamentis. Porro alimentis species, si quis horum temperamentum uertere in melius studet, contraria esse intemperantiae debet. Ceterum qui uersatur in rebus ciuilibus, & multis uicibus distringitur, huic rarius est, ut nec teneri suum temperamentum libenter, sed similia sibi nutrimenta assumat. Nutritio siquidem fit, cum is qui nutritur cibis, corpori quod alit, assimilat. Citius autem assimilat corpora sicca, siccis, & humida humidis. Quibus uero aequale temperamentum est, si quare iucundius fuerit quod edunt, rarius utique fit magis nutritus. At qui inaequale temperiem sortiti sunt, si diuersum est, quod assumptum iucundum est, ab eo quod cuique est particulare idoneum. Duplex autem est, id ipsum quod cuique conueniens dicit. Aliud quippe secundum simplices qualitates, aliud secundum totam substantiam esse conueniens dicitur. Atque illo quidem uiuimus, dum aut mutare intemperiem per oculi uolumus, aut seruare, propter negocia. Hoc autem quod tota substantia maxime idoneum est, sola experientia discitur, habetque uim non uulgarem, ad mutationem alimentorum in substantiam animalis nutriendi, totius substantiae conuenientia. Funt autem & qualitatibus conuenientia, utique si seruare temperamentum studeas humidis naturis humectante cibo

Bilis abundare in calida & sicca temperantibus. Bile purgatio quomodo se habenda.

Calida & sicca temperantibus praedicti, lenius molibus exercitatio: sunt exercenda.

Naturae quae molis ratione purgationis se habent.

Obstructiones uicem formae quidem in absinthio, aniso, amara, anis, platano, & medicamentis de calaminthes.

Occupati negotio, non debent temperantem mutare. Nutritio fit, cum nutriti cibis alendo corpus assimilant.

Conueniens cuique duplex dicitur: aut scilicet quae habet uim, sicut dum totam substantiam.

Temperantia effugienda si molibus, ut alenda curantur.

*Calidus, frigidi
ne intemperan-
tes, cur semper
contraria calu-
benda.*

*Semiles partes of
se admodum fic-
cas, licet modica
capacitate su-
perflua humidi-
tate redundent.*

*Calido & fici-
co temperamento
qualis visus ra-
tio continetur.*

*Venus ficiis tem-
peramento inu-
mensissima est.*

Iracundia vis.

*Calidum humi-
dore, natura
in pueris atate,
fluxionum, & po-
tredinis, mor-
bis sentitur.*

*Corruptum maxi-
mum in ossibus acci-
dens morbus.*

*Longae maxi-
mi, & spissae ma-
ximae exsistit hu-
miditas.*

*Humidum ripe-
runt in principio
deterius sit, tempore
tamen reliquii
præstantius euadit.*

cibo maxime quadrante: siccis uero eo qui fic-
cet: sin alterare placet, contrarijs. In eo uero qui
est in calido frigidoque ad temperatam lapsum,
contraria dare semper expedit: cum efficaciores
quam quæ ex siccitate & humiditate consilium,
eiusmodi temperationes sint, facileque similibus nu-
trimentis in morbosam intemperatam abeant.
At si ficcis quoduis membrum efficias, nihil ma-
nifeste lades. Pari modo nec si humidiori suam
serues humiditatem. Evidenti uero argumento
tibi etates sint. Quæ enim à prima gentura, ad
10 lescitiam usque habentur, humidissima res caro
est. At senili ætate, tum caro, tum ceteræ partes
admodum sicce sunt, licet modicæ capacitatis
superflua humiditate impleantur. Corpus itaque
iusto calidius, si quidem in prima constitutione
medium siccitatis humiditatisque habitum obse-
ruerit, omnino id in incrementi statu ficcis effi-
citur: alij tum magis, tum celerius, si etiam natu-
ra erat ficcis. Sed & senectutem idem citius, quan-
to utiq; ad summum incrementum peruenit
citius. Hi ergo in præcipuis uigoris ætate potissi-
mum humidam uictus rationem postulant: quæ
humectantibus cibus & balneis, tum exercitatio-
num, quæ præualide & multæ sint, abstinentia,
perficuntur. Prodest his & frigidæ potio. At Venus
siccitas temperamenti inimicissima est. Vitandæ
quæ maxime his sunt exultiones, & lassitudines,
& sollicitudines, & uigilæ, & motus omnis celer.
Iracundia uero, cum biliosis naturas maxi-
me accendat, acutas febres parit. Eatenus autē
intendere, & remittere speciem uictus oportet,
quatenus supra naturalem habitum aucta dimi-
naturæ sunt temperamenti elementa. Ac muta-
tur quidem temperamenti contraria uictus ratio-
ne: custoditur simili. Sanè calidiores humi-
dioresque nature in puerili ætate, fluxionum, pu-
tredinis, & redundantie morbis tentantur maxi-
me. Quo magis & pluribus exercitationibus,
& exacta uentris concoctione net digere. Itaque
40 & ante cibum bis teriq; si li lauent, & calidis spon-
te ortis utantur, maximum inde cōmodum sen-
tiant. Quippe huc dirigitur in his consilium, ut
ipsas animalis particulas seruemus humiditas.
Quæ res omnis temperamenti cōmunis est, si
modò contraria ratio omnium animantium cor-
pora cūis ad senectutem perducit, ipsaq; est, cu-
ius culpa omne genitū corpus mortale sit. Nam
cum non liceat corpori elugere progressum ad
siccitatem, idcirco senescere nobis, corruptumq;
50 est necesse. Erit tamen id maxime diuturnum,
quicquid erit minime siccitatum. Ac proinde qui
maxime humidi sunt, ij maxime sunt longæui,
& sanitate, ubi corpus ad robur peruenit, plus
ceteris fruuntur: & reliquis qui parē ætatem
agunt, ualentiores ad extremum usque senium
perfistunt. Nam tamenq; humidū temperamen-
tum in principio deterius sit, tempore tamen re-
liquii præstantius euadit. Quo magis qui nū-
de huius corporis sanitati præficuntur, excretio-
60 ni omnium recrementorum oportet maximam
operam nauet, tum balneis ante cibum plurimis,
tum exercitatione, tum apoplegmanis &
purgationibus: sed ante omnia cibus boni succi,
neq; tui potione, quod urinas promoueat.

At frigidorū temperamentorū tres summe dif-
ferentiae existunt. Nam aut modice se habent in
altera oppositōe: aut altera qualitas in his exu-
perat, utique uel siccitas, uel humiditas. Pessima
tamen merito sicca tēperatura est: quippe quod
temporis spacio senectutibus accidit, id res sta-
tum à principio contingit. Ergo istos humectare
calefacereq; oportebit: quod fiet exercitatione
modica, & nutrimento humectante, & calido:
præterea calidi uini potione, & somno liberalio-
re: illud interim prouidentibus nobis, ut quoti-
die excrementa omnia expellantur. Venerem au-
tem aduersissimam esse temperamenti siccis,
iam diximus. Quare aduersari eam ipsi quæ
præter siccitatem sunt quoq; frigidi, etiam uersimi-
le est. Nam innoxia Venus res tantum effi, qui ca-
lidi sunt & humidus, tum uero qui genitura natu-
raliter abundat. Malum uero & illud frigidum
temperamentū est, quod cum humiditate con-
iungitur: maximeq; est id fluxionū morbis ob-
iectum. Succurrit huic & balnei abstinentia,
& exercitio, & tenuiori uictu, & unctiōibus
quæ modice calefaciant. At qui frigidi natura
sunt, ceterum in siccis humiditq; temperatura se
modice habent, minus neq; ad sanitatē, uel ad
corporis robur sunt inepti, quim qui sunt in il-
las temperat. Horum igitur excitare, firma-
reiq; calorem expedit: in humiditatis uero sic-
citatēq; specie, tota uictus ratio sit media. Nunc
autem de his dicamus, quibus corporis status est
in culparis, uiuunt tamen uitam seruilem, aut ne
gocij implicatam: sed ita, ut ad extremum dici
libere possint sibi uacare. Salubris & inculparis
corporis status, in latitudine intelligi debet, sicu-
ti & ipsa sanitas. Cum autem ad extremum dixi
dico, distinguendum est: circa ne solitum æstus-
um, hybernū ue, an circa æquinoctia, dies ipsa
sit æstiuanda. Romæ siquidem maximū dies æ-
noctes paulo maiores quindecim æquinoctiali-
bus horis sunt: cōtra minimi, paulo ultra nouē.
In magna uero Alexandria, maximus dies qua-
tuordecim horarū est, minimus decē. Ergo qui
in breuissimis diebus & longissimis noctibus à
ministerio sole occidere redit, huc fricari per
o cum, & lauare, & modice dormire licet. Nemo
autem tam infelix est forte, qui in maximis, & e-
tiam in minimis diebus, non possit aliquid me-
diocriter agere. Ceterū qui ex ætate rationis nō as-
sueuerunt, sed citra frictiōne protinus persuli o-
leo cōsueuerūt lauare, satis per se transpirabiles
sunt, ita neq; assidue, nec longo tempore ægro-
tēt, ij ad alia consuetudine transferendi nō sunt: si-
cuti neq; ulli aliq; nisi qui longi tempore æ-
grotant. Agrotare autem solent, aut redundan-
tia, aut succi uitio. At si quid redundantiæ uitij
ægrotent, succi ad cōuenientem modum sunt re-
uocandi. Sin succorum uitio, ad meliorem frige-
m ij reduci oportet. Vbi igitur qd exhalat à
corpore, minus est res quæ accipit, redundantiæ
oriri morbi solēt. Quare prospiciendū est, ut eo-
rum quæ eduntur & bibunt, respectu eorū quæ
expelluntur, seruetur conueniens mediocritas.
Seruariū sanè is modus, si ponderetur à nobis
in uitij quantitas. Detrahimus porro de nutri-
menti uel quantitate, uel qualitate, uel etiam

*Frigidum tem-
peramentum
differt a tri.*

*Sicca temperat
est pessima ex-
istit.*

*Sicca frigidaque
temperamenta
præstat, quæ ra-
tione caliditatis
diuini & hu-
militatis.*

*Venus aduersa-
tur temperamē-
to siccis & frigi-
dis.*

*Venus quæ, in-
noxia.*

*Humida & frigi-
da temperamen-
ta, quæ se occur-
rendi uictus ra-
tione.*

*Salubris corpo-
ris constitutio,
se sanitas, etia
latitudinem ha-
bet.*

*Dies maximū
& minimū quot
sunt horarū ka-
ma. & in ma-
gna Alexandria.*

*Redundantia
morbi quādo se
laetum oritur.*

utrag. Ac quemadmodum de quitrate dematur, norum est. De qualitate demitur, cum unius maxime alentis cibi loco, alius exiguus nutrimenti ap-
ponitur. Qui igitur celeriter notabilem abundantiam acceruat, is de utrag: qui nō celeriter, aut nō notabilem, is de altera demptum esse fac fuerit, utra uidelicet homo ipse potius uoluerit.

Qui uero uitiosus congerunt succos, is non perinde ut qui redundantiam cogunt, uni tantum rei sunt intenti: quandoquidem neq: unica est ui-
tio succi species. Cuius tamen horum ab is-
bis potionibus abstinentum est, qui eum que ipsi congefserunt uitiosum succū facile gignant. Ac sane omnibus his comune auxilium est alui de-
iectio, sicuti & uenter cōueniens in mediocritas. Nam quibus inculpara corporis constitutio est, nō debent is, ueluti siccis suprà præceptum est, is uenere omnino abstinere. An uero semel in die, an bis, sit is qui eiusmodi uitā agunt, comedisse ex usu, cum ex corporis ipsius natura, tum ex cō-
suetudine, atque deo tolerantia ad ipsius cōsue-
tudinis mutationē, indicationes petendæ sunt.

Et eorū quidem quibus biliosus uenter est, primi semper ciborum ac potionū sint, qui alui densi-
sunt. Nempe ex uinis dulcia, & que mollire uentrem possunt. Ex cibis olera cū oleo & garo. Viranda uero ex uinis sunt austera: ex cibis, qui astringunt: nisi si firmandi oris uentris gratia, post totā cō-
mestionem exhibeantur. Sequidem astringentiū usus, in is qui imbecillius oris uentris obtinent, nō solum aluum non cōprimunt, sed etiam ad deici-
endam illam conducit. Cuiuscūq: uero palatitæ exercitijs ante balneum sunt usi, priusquam di-
strictæ negotijs uitæ se addiderent, is ut ab ipsis abstinuisset est in cōmodum, ita ut similiter utantur, præter in cōmodum etiam fieri non po-
test. Ergo apothērapia istis utendum censeo: & simul de suillæ carnis modum nōnihil demendi.

Quibus autē ante balneū aliquid estrasse est mel-
lius, si quidem in die (gratia exempli) tredecim horarum æquinoctialium, circa horam decimā curaturi sint corpus, is hora quarta solum panē assumat, id quod ipse solum solutus facere. Modus autem eius sit is, qui decima hora possit esse cō-
coctus. Sed nec post assumptū ipsum bibendum est. Eorum porro qui repleti cibo se exercent, nōnullis caput repletur uaporibus, & in iecino-
re aut pōderis, aut distentionis, aut utriusq: sen-
sus percipiunt. Si igitur caput repleti sit, succur-
rendum ambulacionibus est, sed potissimū ante cibum. Nihil tamen utat quā post cibū. Cæterim has quāximē lentas esse oportet, illas his celeriores. Si iecur obstructum sit, is que in uis-
cus laxentia expeditur. At que obstructos hepatis meatus aperiant, eadem tarditati cōcoctio-
nis conducunt. Horum optima sunt oxyme-
li, & diatrion pepercene, quod nihil nō familiare receperat: hac ex tenuioribus uictus. Vbi uero corruptio ciborū in uentre accidit, quibus id quod corrumpitur, per aluum descendit, is ma-
ximū id cōpendiū ad sanitatem est. Quibus autem nō descendit, is prouocandi is sunt, que deſcunt leuiter: cuiusmodi sunt dioscolicon, unq: cū pari cum reliquis pondere nitrum im-
mixtum habet: & quod ex ficis & cnico compo-

nitur, alijs que ex cnico uel epithymo cōfi-
ciuntur. Porro is qui sic sunt affecti, etiam uoluntus ante cibum ex uini dulcis potione condu-
cit: necnon alui subductio, ex conuenienti inter-
uallo, medicamine dialoēs (quod amarum uo-
cant) exhibitio. Nam si longo tempore uitiosum succum augeri finas, grauis quispam ipsis inci-
det morbus. Consulendum uero his est, ne quid humidum, aut malè olens, aut facile corruptibile nutrimentum acceptant, sed qui boni succi sunt
potius eligant. Ars quippe que sanitatē tuetur, is qui sibi paruierit, firmissimam sanitatē pro-
mittit: qui uero aut uoluptate, aut ambitione ui-
cti, parere recusant, is perinde est, ac si omnino nō esset. Iam uero, is qui nimis graciles sunt (so-
let enim accidere uōnullis gracilitas ob frigida & siccam intemperantiam: nonnullis propter di-
gerentis in corpus, uel nutrientis, uel ambarum facultatū naturalem imbecillitatē) illicio ex pice cōducit maximè. Dein unguentum illud qd dō
pax dicit. Prodest tamē si ante balneū manu mediocriter molli corpus perfrices, quoad ruborē contrahat: dein de dura frictione, non multa, cau-
tem cogens, densam eam duramq: efficias. Ab his, si mediocri exercitatione usum, ac lotum, citra longam tamen in solio moram, hominē ab-
stergas, moxq: quibus oleo exiguū, & cibum of-
feras. Quippe studium in his est, ubi bonum san-
guinē in corporis molem attraxeris, ut tum tri-
tū uim firmes, tum ne quod attractū est ex-
halat, prospicias. Ac firmatur quidem nutriti-
uis excitato in carnisbus calore. Non exhalabit qui in has sanguis attractus est, si oleo unxeris: urpote quod emplastici medicamētū uim habet. Quod si atas non reclamet, etiam si frigida laxa-
tione uni cum prædictis utatur, magno fruetur cōmodo. Contra uero in is qui immodicē sunt obesi, minuenda digestio est, augenda uero cor-
poris exhalatio. Minuetur porro digestio, alia-
dua uentris derelictione. Corporis autem exhalatio inagabitur celeri exercitatione: cuius gene-
ris curius est: præterea unguentis is que euapo-
randi uim habent, fricando ōplurimū. Frictio ta-
men ipsa esse mollis debet, ac que laxum corpus efficiat. Qua ratione præpingue quendam par-
uo tempore ad mediocritatē carnis reduxi. Sed & alias que torum occupant corpus intempe-
rantias, simili methodo corrigere conuenit: primi-
um, eorum que agi expedit, inuento scopo: mox materijs que ipsa prestare queant. At iam ad inæquales corporis status accingor. Sane in-
æquales status trifariam sunt, prout composi-
tio corporis nostri est triplex. Vna ex primis ele-
mentis, ex quibus constant similes particule. Secunda ex is ipsi similibus, ex quibus instru-
mentalium compositio consistit. Tertia ab his, compositio totius corporis ex ipsis instrumē-
talibus. Ac facillima quidem, tum ad discernen-
dum, tum ad curandum, tertia est: difficilior se-
cunda: maximè lubrica est prima. Cōmodus er-
go ad tertia incipitur. Quare exordiamur dispo-
sitionem à capite, quod intemperatæ naturæ sit, adeo ut multa excrementa gignant, unde laxi sub-
iecta membra cōtingat, in quodcūq: excremen-
ta decubuerint. Ac promptissimè quidem in os

Veniunt ante cibum quibus con-
ducit.

Dialoēs.

Ar. sanitatis
tendat, qui si
bi paruierit, fir-
missimam sanita-
tē promittit.

Gracilitas
rudi.

Gracilitas re-
media.

Nutriendi via
qua ratione for-
metur.

Oleo inuolutio
probat ex o-
leatū facit.

Obesi esse rudi
digestionem me-
nuendi, augen-
dam autem ex-
halationem.
Exhalationem
modestia.

Inagabitur
instrumētum for-
mationis cor-
poris triplici.

& nares

Nutrimenti
quādo immen-
dantur, aut
milde quali-
tas, aut uirgū
faciendū sit.

Alui deiectione
quibus sit ausi-
lium cōueni.

Nutritia uis
tem solutata,
quib. ante cibum
cibis sunt inge-
randa.

Astringentium
usum is qui es
uenterius imbe-
cillum possidet,
ad aluum deici-
endam conducit.

Apothērapia
is qui uis con-
ueniat.

Eorum qui
crapulam, quā
mala solitū pro-
ducere.

Capiti placo
succurrendū est
ambulacionibus.

Obstructionis re-
media etiam ad
circulationem fa-
cere.

Oxymeli.
Diatrion peperc-
ne.

Diungere aluum
leuiter dioscol-
icon medicamē-
tum, quā ex
ficis, & cū cū
epithymo cōficiat.

Capitis excrementa in quatuor partes solent dividere.

Larynx instrumentum est vocis: quod si recipiat fluxum, etiam parit admodum.

Tabes rade gignatur.

Calida in ventriculum fluxus quid molietur. Frigida in ventriculum fluxus quid faciat.

Citra.

Capitis proficiendo esse, principium ad morbum et deficiendo humorem ex ipso ortum, necesse est.

Capitis laborum in ventriculum calida, frequentius bilis dicitur aqua medicandam esse.

Caput vehementer astringit, resque refrigerantia esse.

Arteria quando feranda sit capite.

Bilem non auferre in ventriculum, si colicatum exhibeat.

& nares excrementa impetū faciūt. Decidunt uero & in oculos: nonnullas etiam in aures. Sed excrementi in os decursum, tum gula excipit, tum aspera arteria, cuius summa pars ori coniuncta, quæ larynx dicitur, instrumentū est uocis. Ergo in larynx ab ipsius capite decidunt madefacti, principio quidem rari uocem faciunt procedente uero tempore paruam. Si uero longius etiam procedat alium, totam admittit: quippe cum larynge, arteria quoque ipsa uisū humectat. Quod si acris fluxio sit, non solum ad uocem ineptæ prædictæ partes fiunt, sed etiam grauissima eis erosio accedit, quæ & pulmo simul exulceratur, qui morbus tabes dicitur. At si in gulam & uentrem feratur fluxio, quæ quidem frigida est, in frigida intemperiem corpora mutat, quæ calida, in calidam. Hæc uero etiam spacio exulcerat. Verū inter initia appetentiæ & concoctionis prostermit. At frigida quidem fluxio tarditatem concoctionis & cruditatē, & acidus ructus creat. Quod si etiam corrupta sit, alimentū quoque uerit in corruptionem. Si uero inferius se noxa recipiat, & ientum, & colon intestinū affligit, rangit, uasa quæ in mesenterio sunt, per quæ fit in recur cibi digestio. Ac nonnullos quidem fastidium ciborum excipit alios appetentiæ canina, aut etiam uiriosi cibi cupiditas, qualis est citra affectus in grauidis. Nec later uiam quoque, & paristhima, & parulides, & antiades, & erosiones dentium, & ulcera, & in ore putredines, hanc sanem quæ a capite in ipsa decidunt, cōsequi. Satius autem in his omnibus est, ipsum malū ceu fontem prius tollere, caput firmandum, quam ad eam curationē nos conuertamus. Aut si id præ magnitudine narulis intemperantiæ non licet, saltem illi prospicere, ab ipsa solliciti uitii specie, prouidentia indicatione semper accepta. Quibus igitur ex calida in temperie caput male habet, hos frequentius balneo dulcis aquæ fouere expedit. Calidarum autem quæ sponte nascuntur, noxiū his uisū est. Si quid quæ ex ipsius sulfuree bituminosæ uel sunt, ex propterea quod calefaciunt, inimicissimæ calido naturaliter capiti sunt: aluminosæ uero, quoniam angustios meatus claudunt. Solis autem ipsæ sponte natiæ quæ dulces sunt (si tamē ipsi utendum sit) uel citra noxam poterant. Nam quod utile enī aliquid ipse præstare possunt, hoc dicere non perinde tutū est: quiddō nec calide fortasse forent, si omnis calefacientis medicamentosa uirtutis essent expertes. Quibus uero caput uel uenter calidum astuans est, ipsæ præstat estatis tempore rosaceo perungi, qd ex rosas in oleum ophaciniū salis perperis inieciis, componit. Sūt capita quæ propter arteriarū temperamenti in uertiginis & capitis doloris incidunt, in quibus etiam incidere arterias solemus. Sed hoc genus propositæ artis limites egreditur. Quæ autē ex nimis acuto neruorū sensu (qui a capite orti, inter alia os etiam uentriculū texitur) frequenter dolent, his sanē ederi, propositæ artis officium est. Postius tamē consiliū est id agere, quod minus hæc uolū modo incidunt, curando ne aut biliosus humor in uentrem prorsus confluat, aut tūceterim inde expellat. Atque ut ne prorsus quidem confluat consuleris, si citius cibum exhibeas. Vbi

enim totius corporis biliosus temperamentum est, necnon imbecillus uenter, nisi in corroborat cibo, defluunt in eum quæ corpus accumulatum suffluxu sanies: ex quarū uapore dolores capitis, suffusiones, atque morbi cōminales gignunt. Horum itaque omnium ueneris uisū ratio ad frigidius potius, humidius mutanda est. Quod autem in uentrē cōfluit, id uomitione ac uentris solutione expellendū. Stomachus uero cibi quidem quotidie priusque bitem cōtrahit firmam. Purgetur etiam medicamentis ex maiori intervallo, abstinētiā coma, & compositione ex aloē, quæ picram nominant: quippe hæc quod alius in tunicas biliosus uentris se recipit, expurgat: abstinētiā parū id præstare ualent, ut cui uisū tantū detergendi astringendiq, ac talis, quæ fordes tunicarū uentris detergeat: nō si quid alius in eo imbibitū est, foras extrahat expellatq, sicut aloē. Quæ uero post hanc uentris extrinsecus ad mouenī uñctiones, ex modicis astringentes sunt: ut melinū, mastichinū, & nardinū. Ac æstare quiddē potius melinū, hyeme nardinū, vere mastichinū summe. Est autē opulentius mulierib, & quod præstantius nardinū uungentū sit, nempe foliatū: præterea quæ spicata uocantur, quæ uentrem & robore possunt, & calefacere. Si uero nō modō caput calidam sanē transmittit uentri, sed etiam uenter ipse calidum intemperie habeat, utiq, refrigerante tum potione, tum cibo, semper uti cōueniet: atq, eam qualitatem in his pro temporū anni ratione intendere uariē, ac remittere: nusquā tamen ad contrariū peruenire. Ad eundē modū si utraq, pars sit frigida intemperie affecta, illis calefacientibus est utendū: uariē tamē ea pro ratione temporū intendenda remittendā sunt. Porro difficilis cōnexio est, quoties uel in calidum uentrē frigida & pituitosa sanies defluit, uel in frigidū calida. Atq, harū duarū alteram semper expertus uim magis ad curandū rebellem: nempe in qua frigidi pituitosiq, succi in calidū decidunt uentrē. Pessimus uero in istatus est, si præter id, homo etiam ea natura sit, ut neq, alium faciliē solubilem habeat, nec uomere ex facili possit. Si uero pituitosus succus a capite in frigidum naturā uentrem decurrat, faciliē his succurrat, si manē aliquid medicaminis diatrion peperon sum pserint. Sed & piper solum, præcipue quod album est, cōminutū, atq, aquæ immixtum, bibere ipsi licet. At portio abstinētiæ his aduersissima est, ut quæ pituitosum succū ipsorum uentri affigat. Sed neq, aloē ualde his conducit, cūm ei biliosus tralendi humoris facultas sit: eoq, excogitata salubriter est cōposio quam picram dicunt, quæ acrimonia calore eorum quæ in se habet, crassos & lentos fauces dissecat, ac deterget. Verūm assidue uti hoc medicamento nō licet, sicuti diatrion peperon, aut dialamintus. In totū ergo ad aloē drachmas decem, reliquorum cuiusq, coniunguntur sex drachmæ, quæ ipsa quoq, sex sunt. Atq, hæc est picra quæ Romæ omnes præparat. Ego uero etiā alias duas cōpono: atq, in altera, eorū quæ calefaciūt, plus in altera, minus cōmixco. Vtrūq, autē fiet, si aloē solus pōderi nunc præscripto, aut addamus, aut detraha mus uiginti drachmas. Cæterū si cinnamomi co

Ventriculū imbecillū, nisi corroboratur cibo, recipere totius excrementa corporis.

Picram ex aloē expurgare humores alius in bilibus in ipsius uentriculū trahit. Abstinētiā uiri. Vntibus robore uentris lūm.

Foliata rugosa.

Spicata rugosa.

Frigida intemperie capitis. Cōtrahit uim modo succurrendum.

Status uentris in piperis quo.

Diatrion piperis, neq, ex aqua succurrendum uentriculū frigida in quā pituitosa deficiat a capite: abstinētiā autē illi esse aduersissimā: neq, alio ualde uisū lūm.

Picra uisū, atq, cōposio in drachma.

pia nō sit, ponendū pro eo est optimæ calis dup-
 plum. At in quibus quidem uenter aut frigidus
 est, aut etiam temperatus, ad frigus tamen propen-
 sior, hie apriū diopsolicon est: qd dupliciter con-
 fici assuevit: hie nempe qui aluo est astricta, ni-
 tro, quod Berenicarū uocāt, cum cumino, ruta,
 & pipere, pari pōdere admixto hie uero qui sunt
 soluta, dimidio. Grauis autē nec facili tractabi-
 lis cōplexio est uentris, qui intemperanter calidus
 sit, cum frigido capite: quippe os uentris ab hie
 quæ calorē accendūt, offendit. Ergo in hie qui
 sic sunt affecti, id agendum, ut pituitā disseces,
 detergeas hie quæ minimè calefaciūt, quod ge-
 nus oxymeli esse nouimus. Iam lubrica atq;
 curatone difficilis cōnexio est, ubi tales partiu
 affectus colerint, in quibus os uentris imbecillū
 ac nauosolum est, sinitur autem uenter. Iis igitur
 cōuenit primo loco olera cū oleo & garo, aliaq;
 quæ uentrē mollire solent, lumere. Post iustū au-
 tem cibi modum, aliquid eorū quæ stomachum
 roborent, accipere. Ea sunt māla, & pira, & puni-
 ci. Ipse autē qui affligitur, omnibus scorum usu
 exploratis, quod minimè noxum, lucundissi-
 mumq; inueniet, eo in quantitate mediocri uta-
 tur. Atq; in totum magis qui ita sunt affecti deni-
 ciant, si quid astringens post cibū sumpserint, q̄
 si eo caruerint. Siquidē eorū usu roboratus uen-
 triculus, natates succos peliat ad intestina, quos
 ea etiam cōtinuata expulsiōne propellunt. Quē-
 admodū ē cōuerso, ubi humor aliquis mordax,
 ad expulsiōne sui circa sedem nos irritat, quē ta-
 men colibere propter ciuilia negocia coacti, ne
 quæ ab his expediti cum expellimus, signum est
 illum ipsum humorē, conuersione factā, ab inte-
 stinis pulsū esse uerūsuperna, unde sepe-
 mero capitis dolore tentamur. At ubi renes cal-
 culos aut raphos gignūt, totus uero habitus gra-
 cilis est: quæ inæqualis cōnexio ceteris maligni-
 tate nō creditur medicamenta & uictū quæ exte-
 nuare possint, requirit: ea tamen gracili corpori
 inuicissim a sunt. Ceterū cū interrogaret me
 quispiam, q̄ni ob tales renum affectus, succissimi
 uictus ratione usus, in maximā siccitatem inci-
 derat, quo itaq; uictu, citra renum noxam, me-
 deri quis posset scititati illi suæ, prius ex cremo-
 rem excogitauit, & pisces rum saxatiles, tum qui
 in alto mari degunt. Simili ratione & ex uolanti-
 bus quæcunq; similem carnē habent. Porro mul-
 tre ex mōdianis uolucribus tali sunt temperamen-
 to. Quas nāq; in urbibus cōclusas humido nu-
 trimento impingunt caupones, aduersissimæ
 hie sunt. Optima uerd sic affectis caro est, ut ex
 auiibus, perdicum: proxima attagenarum, & tur-
 norum, & merularū, & turdorum. Quod si mon-
 tanarū auium copia nō est, de hie quæ in agro ui-
 ſitrit, & gregalibus columbis, passeribusq;, qui
 in turribus nesciant, sumere licebit. Sunto au-
 tem in editis locis lusiuisquēdō turres. Ita nāq;
 & gallinis, & gallinaceis qui in corte alunt, ut li-
 cet. Ex lacticibus autem, solum asinū est conce-
 dendū, propterea quodd ceteris omnibus est te-
 nuiss. Ac breuiter, media inter extenuantē im-
 pinguantemq; sit eorū uictus ratio. At si obsequis
 sit quæ calculus infestat, ad dactyl huius tenuē ui-
 ctum iniungito. Eadem & hie qui articularū ui-

tis laborant, conuenire præcepta censebis. Scire
 tamen licet, podagrica annōcta multū distare à
 nephriticis, nō tantū quod crassos glutinososq;
 succos attenuent, sed quod etiam calefaciūt & sic-
 cent. Nam calculus, quæ ualde calefaciūt, dare
 nullo modo cōuenit. Iam uerd partes quæ sic
 sunt ob deflusionem à capite, nō omnes cor-
 roborandæ ueniūt, sed ex tantum, quarum perma-
 gnus est usus: ut oculus, aut auris. Ideo de
 cedentibus in has partes extenuatis à capite, de-
 riuatio per uicinas partes molienda est, ac ad na-
 sum potissimū trahenda, quæ in illa decumbūt,
 idq; per ea quæ stertutamenta mouent, aut eius
 obstructions aperient. Si ad nasum nō sequun-
 tur, in os ipsum apophlegmaris sunt deducen-
 da. Oculi uero ipsi robur adiiciunt, si sicco
 collyrio, quod ex Phrygio lapide constat, utare:
 ac sic palpebris specillo inducas, ne oculi mēbra
 nam intus cōtingas. Ita nāq; mulieres quotidi-
 faciant, cū subio oculis gratiam cōciliant. Ad
 aurium uerō robur adhibeas uel glaciū solum
 super cote tritum cum aceto, ac mox tepidū: ut
 collyrium quod diagnolum uocatur, aut dia-
 rhodon, aut crocodos, aut nardinum, aut quod
 di alio dicit, aut deniq; foliat & spicat unguen-
 ta. Ceterū ubi satis firmatæ sunt, ita ut nihil iam
 in has cōfluat, assidue aliquid instillandum est
 optimi unguentū nardini. Porro auris uelut, An-
 dromis medicamentum, similibusq; medebis. In
 terim tamen auertere materiam ad nasum & os
 oportet. Ut autem ea quæ à capite deflunt,
 leduntur nōnulla eorū quæ illi subiecta sunt, sic
 ex iecinore & renibus, & liene, in alias partes
 quæ ipsi sunt imbecilliores, morbi incidunt: ni-
 mirum semper ipso excremento à fortiori ad im-
 becilliore partem demisso, donec ad imbecilli-
 mam omnī deuenit fit. Atq; ad hunc modū,
 quorū nulla fit cura est, alius alia parte assidue
 uexatur. Qui uerō nihil colligit supernacui, nec
 qualitate, nec quantitate, hie manent imbecilli-
 partes semper in putro. Iam quod redundat, aut
 per totum colligitur corpus, diciturq; affectus
 plethora: aut in parte aliqua princeps, sed quæ a-
 lioqui natura sit imbecillior. Ante omnia tamen
 est definendū, propriū ne affectu plethor mem-
 brum, an propter aliud, quod prius ipso sit affec-
 ctum. Sed extrinsecus etiā imbecillæ parti noxa
 potest accidere: plurimū tamen ex utriusq; uictus
 ratione. Artēdere itaq; magnitudini naturalis in
 firmatatis membri cōueniet, ac tenuiorem qui-
 dem uictum quā antea, exhibere homini: tum
 idoneam exercitationē iungere, canendo ne
 quid ab externis causis nox incidat. Postea si ab
 his neq; ipse gracilis fiat, neq; imbecilla eius pars
 affligatur, instilandum eidem uictus rationi est.
 Sin autē aut omnibus membris fiat gracilis, aut
 male affligatur quod uisio est habita, mutare
 talem uictus rationē debetis: utiq; si affligitur,
 aut uictum hominis in tenuiorem mutabis, aut
 certo anni tempore purgatione uteris. Ac aliq;
 quidem una quotannis purgatio vere incipere
 satisfacit: aliq; altera quoq; post hanc, autūno est
 opus. At si sanguinis quidem abundantiam cor-
 pus accumulauit, mittendus is est. Sin utrosq;
 succū, uacillūque proprio ad id medicamēto fue-
 rit. Quod

Diffusio cum
 posita duplex.

Ventrius im-
 perie talida co-
 mune cum cap-
 tu frigida, quid
 agendum.

Oxymeli.

Oro uentrius
 manifestatio exi-
 stente, cū asiri-
 bus alio, quid
 agendum.

Renis si gignit
 calculos, totum
 aut corpus sit
 gracile, quæ res
 dum uictus ra-
 tione.

Loco asinorum
 solum est uictu
 rebus calido-
 sis, cū totum cor-
 poris siccitate.

Podagrica reme-
 dia differe à ne-
 phriticis.

Calculus nullo
 modo dila val-
 de calfaciens.

Deriuatio per
 uicinas partes
 molenda est.

Collyrium sicut
 ex phrygio lapi-
 de, oculis robur
 addit.

Auribus auris
 auris remedia.

Excrementa sem-
 per à fortiori
 ad imbecilliores
 partes deflunt.

Plethora quid.

Picatore quam
de utendum.

rit. Quod si ex tenui uictu pars afflicta leuatur,
sed corpus emaciatur, picatore utendū. Porro
status corporis corū enī est pessimus, qui geni-
tale semen copiosum calidū gignūt, quod eos
ad expulsiōem sui prorit: post quā & uentris os
illis resoluūt, & ipsi toto corpore nō solum rela-
xantur, imbecillīq; fiunt, fed etiam fici, graciles,
pallidi, cauisq; oculis conspiciunt. Quod si pro-
pterea quod ex concubitu sic uexantur, ab hoc
se retrahant, nō modō capitis molestiam, sed sto-
machi offensionē, fastidiūq; sentiunt, nec ex con-
tinentia magnopere iuuantur. Accidunt enim
ipsis per nocturnas imagines nō minora incom-
moda hīs, quæ à cōcubitu senserunt. Somnare igitur
hī debent non cibos modō, uerum etiam me-
dicamenta quæ semen extinguant: tum uerō ex
ercitationibus uti, quæ supernas tantum partes
exerceant: ac deniq; à balneo lumbos rotas uñ-
gere unctiōne aliqua refrigerante, qualis ex om-
phacino oleo, & rosaceo, & melino conficitur.

Semen calidū ex
propterea, quod
tenuis, aut ut ip-
sorum expulsiōem
sui prorit, qua
lu uictus ac me-
dendo ratio co-
muniatur.

Semen ex-
haustū.

Lini semen in
aqua colinum, re-
frigerantem ex
more efficit.

Plumbū lami-
nam lumbi ha-
erens, facere con-
tra Veneris no-
cturnas eugra-
ues.

Vulnimen ex pa-
pauere mandra-
goriæ suspēda.

Ipsī autem oleis, nō desistant, ceram adiacere po-
teris. Vbi uerō ceratum id in mortario subege-
rit, cum eo succum aliquem refrigerantem mi-
scebis accuratissimē: uidelicet semperuiū, aut so-
lani, aut umbilici Veneris, aut psylli, aut polygo-
ni, aut tribuli, aut portulacæ, aut lactucæ. Porri-
laca tamen succū suum nō remittit, nisi dum in
mortario tunditur, assuūm sit humoris quippil-
lenius aquosiusq; substantiæ, qualis uix immatu-
ræ est, & rosarum. Quinetiam lini semen si in a-
qua coquas, refrigerantem cremorē efficit. Ego
uerō cum ē plebe cuidam consulerem, ut plumbi
laminam renibus superponeret, quō nocturnis
semen careret Veneris imaginibus, tali præsidio ad-
iutus postea mihi erit gratus. Alter autem qui
plumbi duritiā non tulit, ex dictarum herba-
rum, cum eisq; mollum zmerinx & rutæ folio-
rum appositione, necnon ex assiduō esu semini-
is ipsius amerinæ, singulare præsidiū sensit.

At quæcūq; ex papauere mandragoræ unctiō-
nes fiunt, omnino fugiendæ sunt. Sed neque ut
predicātis, ita his quocūq; substratis utendum est,
cum in uigore cōsistunt. Quin rosas experiri cui-
dam suasi, sensitiū ex hīs substratis lenamen citra
ullam renū noxam. Alios autē, qui ubi cibus bo-
ni succi modicē se impleuerunt in carnā, postea
concubere dormientes, postero die cum satīs
dormierint, ac surrexerint, iubeo linteis fricari,
quoad rubor per cutem appareat: mox aliqua
ex oleo frictiōne modicē uti: tum exiguo inter-
posito tempore panis aliquid fermentati & in
cibano cocti, & puri, ex uino mixto, illis gustan-
dum portigo: atq; ita ad cōsuetum opus dimitti-
to, magnam hinc utilitatem expertos. Non disai-
mlem roborandi per cibum stomachi rationē,
& grammatico cuidam, quæ assiduē morbus co-
mitialis urgebat, suasi: ac mirifice contulit. Maxi-
mē uerō in fiduciam ueni hominis iuandī, ubi
didici tum spasmos incidere, cum diutius à cibo
abstinuisset, magis si dolor interim, irāue inter-
uenisset. Quinetiam habitū eius intrabar gracilem:
scizicitanisq; mihi de hac ipsa re, stomachicum
assiduē bīli urgeri est assus. Nōnulli itaq; immo
diocē ueneris uisū hī dunt. Alii citra noxā uisū
ad sensū uisū sufficiūt. Verū hæc amō genera ra-

ra. Totum uerō quod in medio est, id cum maio-
ria minorisq; discrimine, ad magnū hominū nu-
merum se extendit. Ac de his hæctenus. Huic au-
tem cōmentario iam colophonē imponam, ubi
medicamen illud descripsi, quod ex mālōrum
succo conficitur, tum ad appetendū uim excitan-
dum, tum ad iuuandū faculratē coëtricem, ro-
burq; cōciliandū uentericulo, maximē confe-
rens. Accipies igitur succi mālōrum cotoneorum,
quos dulciora maioratq; sint, sextarius Romanos
duos, quibus mellis optimi tantūdem miscabis,
aceti sextariū unum & semissem. Hæc cum super
prunas modicē coxeris, & spumā detraxeris, im-
mities singiberis uncias tres, piperis albi unc. ij.
Dein rursus in simili igni recoques, donec mel-
lis crassitudo consistat. Quæ utiq; crassitudo,
stomachica medicamēta parari solent. Hoc por-
ro pharmacū, etiam hīs quibus inualidum secur-
est, salutare in primis existit. Illud uerō latere nō
debet, ieiunio id maximē dandum esse, medio-
cris cochlearis modo. Quancūq; nec si à cibo sit
sumptum, quicquam ledit. Cōmodē quoq; da-
bitur, etiam si prius pransus quipsiam, ante co-
nam id sumpsit. Maximē tamen tempētūiue id
duabus horis aut tribus ante cibum obuleris.
Quod si id astringere magis uoles, ex succo acer-
borum cotoneorū conficies ipsum. Licebit autē
piperis zingiberisq; portioni addere, sicuti etiā
detralere, atque omnino nihil illorum miscere,
prout is qui tali est medicamine usus, aut calidū
biliosūq; uentrem sortitur: contra, fri-
gidum atq; refertū pituita: aut deniq; in medio
constitutū temperamento.

Medicaminū ex
cotoneorum suc-
co & spumā & cō
positū.

GALENI PERGAMENI de Usu respirationis, lib. vms.



Inimē sanē uulgarem esse respiratio-
nis usum, hinc liquet, quod ea pri-
uat, ne momentum quidem possi-
mus uiuere. Ex quo manifestū est,
respirationē ipsam, ad nullam parti-
cularem actiōem, sed ad solam uitam * conferre.
Cum igitur actio animæ, uita sit, quæ plurimū
respiratione iuuatur: tandiu certē utilitatis mo-
dum nos ignorare oportet, quandiu animæ sub-
stantiam (quæ nobis incognita est) ignoraueri-
mus. Coarguitur autē faciliē Erasistrati opinio,
dicentis, impossibile esse ut cor ex pulmone ak-
torem transmutet, circa respirationis cohibiti-
onem. Nam si millies quis inspirationem faciat,
plurimumq; undique premat thoracem, & nihil
rursus experit, apparebit certē nihilominus in
ipso cor pulsans, hoc est, tum attrahens, tum ex-
pellens: suffocatur tamen interim homo, idēq;
magis & citius, quod nūq; mispirationerit: quod ni-
mirum tunc non subitanea, sed qualitate spiri-
tus, cor opus habeat. Quare huius suffocatio-
nis medela, unica expiratio existit: quæ quidem
si consentim & cum magno strepitu fiat, ualide
compressio thoracis, & retractor aperiæ arteriæ or-
rificio, efflatio appellatur. Si igitur ipsum cor
substantiam tantūm egeret spiritus (quod nimi-
rum Erasistratus existimabat) magis utique ex
penuria ipsius, quā ex abundantia oborirent

Respiratiōe pri-
uat, ne momen-
tum quidē possi-
mus uiuere.

Vita est actio
animæ.

Animæ substan-
tia est nobis in-
cognita.

Suffocatiōe me-
dela, expiratio.

Efflatio quid.

laciones, id quod minimè apparet, cum tunc precipue affligatur, dum maxime illius copia redundat. Similiter confutatur illorum etiam opinio, qui solius nutritionis ipsius animalis spiritus gratia, nos respirare contenti dunt, cum suffocatio, respiratio colubita, non propter inopiam nutrimenti animalis spiritus accidat. Adhuc siquidem largus tunc in pulmone spiritus: longiusque requiritur tempus ad hoc, ut animal propter inopiam nutritivi spiritus pereat. Etenim substantia

animæ, etiam si non una sit, per omne tamen uitam, ad multum tempus durat. Ergo si ubi ob substantiæ, relinquatur quoddam qualitatis penuria, animalia in respiratioe colubitione extinguantur. Quæ igitur ista qualitas sit, inquirendum venit. Porro quandoquidem ubi amplius quidem secundum naturam caliditas in locis circa cor & thoracem fuerit collecta, statim, & amplius solito, respirare appetimus: uideri ungu possit refrigerationis gratia, respiratio fieri. Rursus, si perfrigerata ipsæ organis (quemadmodum in magna fame, & ubi quis in magno frigore sit uersatus, contingit) non solum non refrigerare eam, quæ in nobis est, caliditatem oportet, sed etiam calfacere, refrigerationis gratia respiratio minimè fieri apparet. Nonnulli tamen huic obiectioni occurrentes, insitum calorem semper egere refrigeratione contendunt: uerum cum auctus sit, ampliori: pauciori uero, cum imbecillior est redditus. Hanc autem controuersiam dilucemus, flammæ exemplo proposito: quæ quidem (ut animalia) aëre priuata extinguuntur: quemadmodum indicant cucurbitæ medicinales, undique circumpositæ. Nec uero tantum si quis eam quæ circumponatur flammis, sed in balneis etiam, & solis ardoribus, & frigoribus excellentibus, & uehementer uentilata, & maxime multitudine obruta, sicuti & inopia alimentum, similiter extingui uidentur. Angustior autem ac roborantur a moderato frigore, & si moderate uentiles, & comoderato alimento nutritæ. Omnes autem flammæ duplici moueri motu uidentur: altero à materia exa accenduntur, per quem maxime sursum feruntur, & undequaque disperguntur: altero huius contrario, ad sui ipsarum principium, ac ueluti radices uergente, per quem confidunt & contrahuntur. Etenim si facies quæ maxime supernam extremitatem accendens, confestim ad infernam peruenit ignis. Si quidem cum omnis flamma celeritè corrumpatur, ob id necessarium est, uelocissimam eius esse generationem. Atqui generatio uniuersusque flammæ, est ex subiecta materia accendi. Corrumpi igitur omnem flammam est necessarium, si aut materia, aut altero motu priuetur. Quippe ex contrariis motibus, quorum alter alterum mutuo excipit & consequitur, alterum fine altero conseruari impossibile est. Ob id igitur, moderate frigido ambiente aëre omnia flamma opus habet. Qui enim excellenter calidus est, motum alterum ipsius immodice extrâ extendendo, frigido uero alterum immoderate intrâ protrudendo, extinguat. Verget autem modice uentilatus, flammam materiam applicat, ut frigidus aër temperat: supra modum uero moueri, flammam di-

spergit, ueluti etiam calidus exhemeter ambiens. At uero moderato, omnium conseruatrix flammarum existit. Eodem igitur modo caliditas animantium insita, materiam unde accenditur, sanguinem habet: necnon à natura insitum principium motus in utranque partem, ita ut altero priuata, etiam reliquo ex necessitate destruantur. & ob id ipsum, siue à respiratioe probebeas, siue à sanguine, statim corrumpitur: nam & lucernæ flammam tolles suffocando, aut omnino oleo priuando. Simile itaque positum cor funiculo, oleo sanguine, alicui organo cauo pulmone: nam circumsitus est cordi forinsecus, ad cucurbitæ similitudinem. Verum quo tempore expirat animal, assumilaueris ponas ipsum cucurbitæ foratæ: ubi uero respirano colubetur, imperforatæ & undique occultæ. Quemadmodum itaque cucurbita perforata intra se non potest flammam extinguere, respirantem per ipsum foramen: quæ uero è uentigio est conclusa, eam per suffocationem extinguat: ad eundem modum pulmo arctus & densus, qualis est in respiratioe colubita, extinguit perioratus autem & rarus (talis enim existit circa respiratioem) insitam caliditatem conseruat.

Iam exspiratio ipsa, ad euacuandum id quod ueluti fulgus sanguinis est, mire conducit. Fauilla quippe, & fumus, & fuligo, & omnis eiusmodi uitæ materis superfluitas, non secus quam aqua, consuevit ignem extinguere. Ex omnibus itaque sunt recipiendi illi, qui dicunt, infini caloris gratia respirare animalia. Nam & moderatè illum tum uentilari, tum refrigerari expedit: motumque aliquem præfici fuliginoso excremento, quod nascitur ex uisione sanguinis, explosendo. Itaque ex uentilatione principii caloris insiti, & ex moderata refrigeratione, & ex eius quod in ipso ueluti fumosum est, defluxione, unum coaceruat caput & summam, conseruatio uidelicet naturalis caloris. Quare in balneis diuinus uersantes exoluiumur, ac tandem morimur: id non ob euacuationem ex toto corpore spiritum, sed quod per spiratio tam quæ per uniuersum corpus, quam quæ per os fit, offendatur, calidum spiritum attrahens. Nam cum torpedini talis uis insit, ut uel per insitum ipsi tridentem picatores maxime stupefasciat: certe mirum esse non debet, si aër etiam ambiens, suam nobis, qualiscunque illa sit, qualitatem comunicet. Porro per uehementes exercitationes, perque ardentissimas febres, amplius & frequenius respirare solemus: minus autem & rarius, ubi loci circa cor & pulmonem refrigerant sunt. Valde namque & crebro uentilata paruum caliditatem non conuenit. Si quidem maior flamma ampliori aëre, minor pauciori habet opus: omnis tamen flamma eo indiget, ac proinde & calor omnis aliquam uentilationem desiderat. Iam uero pueri, & puberes, plus & crebrius respirant, ob id fortè quod plurimum habet calidi innati (necessario enim sequi ad magnitudinem caliditatis, magnitudo & frequenra respiratioem) aut quod eorum spiritus, si quidem à respiratioe nutritur, ampliore aërem desideret: quem dum conficiunt, plurimum fuliginis procreant. Vbi enim amplius alimentum elaboratur, ibi amplior superfluitas gignit. At senibus, cum

Caliditate aui
medicæ cucurbitæ
maximè sanguis.

Pulmonem esse
modice cucurbitæ
talis similitudinem.

Expiratioem
confirre ad san
guinem expulsa
dam fuliginem.

Respiratioem
fieri uento cal
ore insiti gratia.

Balneis diuinis
cor non exoluit,
motum tradit.

Torpedinis vi
ris.

Respiratio mag
na & parua
quod accedat.

Calor omnis a
gri uentulo.
Pueri quoniam
breues, ac plus es
crebrius respi
rant.

Anima substantiam
nam ad motum
tempus durare.

Suffocari anima
ob quod
tatu pueri, cum
dum respiratio
colubetur.

Flamma quod
modo extinguitur
passim.

Flamma à quibus
angustior
Flammæ motus
tuo duplex.

Motum si inuicem
consequuntur,
alterum si
ne altero seruari
non est possibile.

Flammam unam
ac egeret modice
si frigido aëre.

60

Secundum respira-
tio est per
gna & rora.

Respiratio par-
ua frequens, et
quasi desin-
tibus adest.

Spiritus anima-
lium esse aut sub
stantia animae,
aut partem ip-
sorum instrumen-
torum.

Spiritus anima-
lium unde moria-
tur.

Spiritus anima-
lium proprii mo-
tus esse inspira-
tionem quae fit per
nares.

Caliditatem
moderatam immo-
deratam corporis ef-
fe maxime nocif-
sam.

Caliditas ab ip-
sa respiracione sal-
ua esse non po-
tuit.

Respirationis or-
gana.

Delirium in a-
ctibus febrium
esse accidit.

Alii non membra
promptissime ad
calorem immo-
des ledi.
Constitutio mor-
bis in qua consti-
tat.

cum pueris ad adolescentibus frigidiores existat, respiratio adest minor, & rara. In calidis prae-
terea regionibus & naturis, semper editur respi-
ratio maior, & densior: frigidis uero, minor, &
rarior. Parum etiam & frequenter respirant, qui
cibum acceperunt & potum, ob septi transuersi
coarctationem: sic & praegnantem. In aqua etiam
inter cutem, & in hepatis, uentris & splenis in
flammationibus, similiter respirant eadem de
causa. Iam uero quandoquidem ubi uentriculi
animalis spiritus iuxta cerebrum uulnerantur,
statim immobiles ac sensus expertes nos red-
dunt: oportet utique omnino hunc ipsum spi-
ritum, aut substantiam animae existere, aut primum
ipsius instrumentum. Qui sane spiritus cum ne-
cessario nutrire debeat, certe rationi esse con-
sonum, partim ab aere per inspirationem attra-
cto, partim a sanguinis euaporatione, illi nutri-
tionem accedere. Nam si arteriae carotides circa
collum uinculis constringantur, nihil offendit
animal, quod pertinet ad respirationem, nec
non ad motum & sensum. Vnde liquet cerebrum
spiritu per eas a corde allato, non ualde habere
opus. Reliquum itaque est, aut euaporationem ex
sanguine ipsi sufficientem existere, aut per nares
inspirationem. Atqui nec euaporationem lar-
gam contingere uersimile est, si arteriae laqueo
excipiuntur: quare necessum est ex inspiratione
per nares potissimum alimenti partem animali
spiritui accedere: id quod sensit Hippocrates di-
cens: Principii alimenti spiritus, os, nares, gut-
tur, pulmo, & cetera respiratio. Ex omnibus e-
nam his nutritur nullatenus impeditur. At si quid
ex his impediatur, per reliqua tamen ei alimen-
tum suggeritur. Est itaque maxime & utilis & ne-
cessaria animalibus moderata caliditas, praefer-
tim animalis spiritui, & principalissimis orga-
nis, imò uero etiam uniuerso corpori. Tunc igitur
principium naturalis caliditatis, ipsum uide-
licet cor, respiratione in tantum egens habemus,
quantum etiam ipsi moderata caliditate indige-
mus. Siquidem contra respirationem impossibile
est saluam esse caliditatem: proinde totum cor-
pus est transpirabile. Ceterum respiratio mode-
rata omnibus alijs membris per arterias contin-
git. Cerebro uero & cordi duo praecipua adia-
cent respirationis organa: illi nares, huic pul-
mo. Verum ut moueatur pulmo, thorace opus
habet. Quod si etiam sanguinis euaporatione
ad nutritionem animalis spiritus indiget,
id quod credibile est, maximum habuerint sane
animalia & hoc a moderata caliditate commodum.
* Etenim ubi sanguis melancholicus aut
etiam biliosus est, in uisofos uapores soluitur:
atque alter ad atram bilem, alter ad animi aliena-
tionem perducit: propterea in pestuosis febris-
bus aegri ipsi delirant. Conseruit moderata caliditas
ad uniuscuiusque membri conseruandam
propriam constitutionem, actionemque similiter:
quae si nulla re promptius laeditur, quam a calo-
re immodico: quemadmodum & constitutio
ipsa, quae in debita temperatura quatuor quali-
tatum consistit. Atque in alijs quidem organis a-
ctionum offensae parui momenti est. In his uero
quae ad uitam pertinent, magni refert. Postremo

in his quae non solum ad uitam conducunt, sed ad aliam
etiam rationem principii habent, maximi. Talia
autem sunt cor & cerebrum: quorum constitutio-
nis lesio uitae damnum infert. Nequit autem con-
stitutio ipsorum aliter breui offendi, quam per
caliditatem immoderatam. Nec ob aliam cau-
sam in spiritibus colubitionibus defungimur ui-
ta, quam ob immoderatam caliditatem. Prima
itaque respirationis utilitas, per inspirationem &
expirationem completur: alteram nimirum refrige-
rationem & uentilationem, alteram excellentem
fuliginosa. Secunda uero, quae est nutritio ani-
malis spiritus, per inspirationem duntaxat acci-
dit. Quod uero cum cor a pulmone aërem par-
tium quidem ad se attrahat, partium uicinis ar-
terijs transmittat, ipse aer qui expirat nihil par-
cior appareat eo, qui per inspirationem attractus
est, in causa esse uidetur, quod uapor quidam om-
nino expiratur, par copia portioni spiritus in
cor & arterias transumptae.

Respirationis
prima utilitas.

Respirationis se-
cunda utilitas.

Expirat aer
cuius pars respi-
ratur.

GALENI PERGAMENI de causis respirationis lib. unus.



Vi respirationis causam efficientem
deprehenderit, in demum solum tum
offensionis differentiam, tum cu-
randi modum cognosceret. Ceterum
cum tres sint in genere respiratio-
nis causae, facultas uoluntaria, instrumenta uo-
luntari seruentia, & ad haec utilitas ipsa, ob quam
etiam prioribus causis opus habemus: utilitas
sane principium inter respirationis causas locum
obtinere, utpote quae innati caloris comoderationem
conseruat, & animalis spiritus substantiam
alitur. Voluntas uero disponit, & uelut ad
rhythmum coaptat respiratorias actiones. Verum
instrumentorum species multitudine & multi-
formis existit. Quaedam enim ad ueluturam spi-
ritus destinata sunt, quaedam aërem susceperant,
quaedam ea quae mouentur mouent. Principium
itaque est aer, qui per os & nares attrahitur, ma-
teria existens utilitatis respirandi, besariam par-
tibus: cuius altera quidem & minor pars, ad ce-
rebrum per nares suggeritur: altera uero maior,
per asperam arteriam ad pulmones illabitur. At-
qui arteria ipsa organum uocis, uia est etiam re-
spirationis. Pulmo autem, uelut profundus uen-
triculus, destitutus spiritui est: cuius dilatationem
& contractionem thorax gubernat, qui mus-
culus mouetur, & ossibus inarticulatur: prae-
terea septum transuersum, respirationis similiter
organum. Circulare enim id est, in centro quidem
neruofum, circum circa uero carnosum.* Sic etiam
in medijs costarum regionibus duo & uiginti mu-
sculi numerantur, * praeter duos alios prima-
rum costarum, & totidem extremarum. Ultra hos,
tres alij ex collo utrinque promouentur: deinde
qui iuxta spinam porrecti, & cum ipsis, qui cir-
ca * abdomen consistunt, octo. Ac tot sane sunt
musculi inferentes respirationi. Actiones autem
singularem, eorum quidem qui in septo trans-
uerso sunt, ut respiratione inuiolentam operen-
tur: corum uero qui iuxta costas constituti, ut tho-
racem exacte dilatent, & coarctent. Qui cum du-

Respirationis cau-
sa esse in gene-
re tres.

Utilitatem respi-
rationis, inter
causas illas ob-
tinere principii
locum.

Instrumentorum
respirationis spe-
cies multitudine,
Ac aeris materia
respirationis.

Aeris portione
uocis ad cerebrum,
alia ad pulmones
illabi.
Arteria aspera
vix.
Pulmonis vix.
Thoracis vix.

Septum trans-
uersum.

Intervales
musculi duo &
viginti.

Musculi abdo-
minis vix.
Musculi utrinque
promouentur ut
respiratione in-
uiolentam.
Musculi tho-
racis ad hoc par-
ticulares.
Musculi interco-
stales duplices.

plures sint, externi expirationem, interni inspirationem perficiunt. Et tantorū quidem duorum actio est, ut supernam tantū thoracis partem dilatent: inferiorem uerō, ut infernam eius partem contrahant. Qui ex collo descendunt, retrahit simul & dilatant sublimēs thoracis partes. Ex rectis etiam * iuxta ipsum collum musculis, hi qui ad clauiculas extenduntur, fines cartilaginum quæ illic sunt, contrahunt: quemadmodū etiam hi, qui ad costarū in spina radices pertinent. Musculi demum * abdominis, firmitudo existentes septi transuersi, thoracis contractionem adiuuant. Cum itaq; duo genera respirationum sint, nempe facili & uolentia, habeatq; utraq; ipsarū inspirationem & expirationē, sit ut in totā quatuor sint respirationis partes. Ceterum singulis his quatuor partibus, propria quedam instrumentorū natura inest. Quippe facili inspirationi septum transuersum subleuat: uolentia * tum sima scapularum pars, tum interni musculi intercostales. At facili expirationi * musculus famulan tur abdominis: uolentia autem, * externi musculi intercostales. Atq; hoc quidem modo res musculorū se habet. Porro nerui duo qui ad seprū pertingunt, ex cōnexionē inter quartum & quintum colli uertibulū procedentes, in ipsam septi neruofam partem se inferunt. Qui uerō à spina dispergunt in musculis intercostales, transversim progrediunt ad pectus. At qui in alios musculos respirationis opifices feruntur nerui, ferē omnes ex spinali medulla oriunt. Voluntas igitur similis equiti existit, qui habenturum motu equos ipsos impellit. Habentis autem sunt nerui similes, quemadmodum equis musculi. Sic uerō & unitas extremū est respirationis uotum, perinde ac uictoria artis aurigandi.

GALENI PERGAMENI de difficultate respirationis li- ber primus.



Vod respirandi difficultas respirationis quedam sit laxisio, nomen aperte indicat. Cum igitur id quod secundum naturam habet, unum atq; idem sibiq; semper simile existat, ueluti regula quedam: uariū autem arque dissimile multiplicitate errore inuolutum, ac proinde & infinitum numero, & arte incomprehensibile, quod præter naturā: impossibile certē est, huius immensitate certis terminis comprehendere, citra cognitionem eius quod habet secundum naturam. Cum itaq; unum sit hoc, & animalī cōmodum, palam est etiam id moderatum existere. Quare immoderātū fuerit, quod præter naturam habet. Cum igitur immoderatum omne duplex sit genere (aut enim deest quid ab eo quod secundum naturam habet, aut excedit) tot sanē in seipso particulares differentias fortietur, quot possibile est rem ipsam suscipere, circa moderatū excessus defectusq;. Suscipit autem simplex duplex: compositum uerō ex pluribus, duplicatas, iuxta numerum eorum ex quibus conlatur. At uerō, cum duæ quidem sint primæ & principalissimæ totus respirationis

partes, inspiratio uidelicet, & exspiratio: duæ uerō alie per accidens, nimirum quæ interueniunt cessationes: in quatuor sanē his uniuersa consideratio de respirandi difficultate consistit. Quare oportebit omnino unam ex prædictis, aut plures, aut simul omnes utiri, aut corrumpi, ut respirandi difficultati sit locus. Fuerit autem optimum, simplicem appellare respirandi difficultatem, quæ unam tantū respirationis partem occupat: compositam uerō, quæ plures læduntur. At cum posterius sit semper compositum simplicibus, à simplicibus auspicabimur respirandi difficultatibus. Quandoquidem igitur ex ipsa quas diximus partibus, duo motus sunt, inspiratio uidelicet, exspiratio: duæ uerō hos cessationes distinguunt: ac generatio quidem motibus composita est, cessationibus uerō simplex: manifestum utiq; fuerit, immoderationes illorum, plures: cessationum uerō, binas tantum produci. Hæ namq; simplices existentes, iuxta temporis quantitatē solū differentias sortiuntur: motus uerō nō solū iuxta hanc, sed iuxta quantitatem etiam spaci localis, per quod instrumenta respirationis mouentur. Itaq; duplices erunt immoderationes ipsorū, quemadmodum & cessationū, utraq; iuxta temporis quantitatem diducit, scēdum quas aut ueloces aut * tardi motus dicuntur: duæ uerō adhuc alie, iuxta quantitatem distentionis instrumentorū distincte, quarum nimirū ratio, aut * magni, aut parui appellantur. Si quidem inseparabiles sunt ab omni circa locū motione, tum tempus, tum spaciū, per quod id quod agitur motu, mouetur. Quemadmodum autem motui propria sunt uelocitas atq; tarditas: ita & quantitati cessationū, raritas & densitas. Præterea cum & ipsa respiratio ex contrariis motibus per cessationes distinctis cōposita sit, densam ipsam reddet breuitas cessationū, raram uerō longitudo. Atq; hæ sanē uniuersæ sunt simplices respirandi difficultates. Cum itaq; respiratio ex duobus contrariis motibus constet, inspiratione uidelicet, & expiratione: necnon ex cessationibus binis: offensiones unq; circa motus contingunt, in uelocitate & tarditate, magnitudine atq; paruitate: circa cessationes uerō, in raritatem & densitatem: nec præter has, simplicem aliam difficultatis respirationis differentiam reperias. Porro cum unūquodq; ab ipso peius aut melius reddatur, per quæ omnino produci solet: certē si sciuerimus à quibus causis respiratio prodūcitur, sciemus etiam & respirandi difficultatis causas. Igitur animalis facultas thoracem mouet, cum quo simul pulmo mouetur: ad distentionē cuius sequitur inspiratio, sicuti ad contractionem ipsa exspiratio. Etenim principalissima respirationis utilitas, est conseruatio caloris inliti, animalisq; spiritus nutritio. Si ergo & facultas, & usus, & instrumentum quodq; organorū optimè habuerint, iuxta naturæ legem animal respirabile: sin uerō ex eis fuerit quicq; uinātū, iuxta illud animi respiratio nem impediri est necesse. Inquirendū igit iam, quanam causæ esse possint respirationis celeris. Eius uerō nullū est uerum, eandem utilitatem à respiratione quidem, ei qui circa cor est calori: à pulsi-

*Diffinitio simp-
plex, quæ sit di-
cenda, & quæ
preterea compo-
sita.*

*Inseparabilia
ab omni latio-
ne esse, tempus,
& spaciū, per
quod mobile cor-
pus mouetur.
Naturæ propria.
Cessationū quæ
sunt propria.*

*Respiratio cen-
satur ex contra-
riis motibus in-
termittente dis-
tincta.*

*Respirationis
utilitas principa-
lissima est esse
calorem inliti
seruare, animalisq;
spiritus nutritio.*

*Vnum eisdem ef-
fe respirationis
& pulsus.*

*Musculi abdo-
minis.*

*Respiratio
partes sunt qua-
tuor.*

*Separatio faci-
li uolentia, quæ
organum inferant.*

*Septi transuersi
nerui.*

*Musculorum in-
spirationis instru-
mentum uolentia.*

*Voluntas equi
similis.*

*Nerui habentis
sunt similes.
Musculi sunt si-
miles equis.*

*Diffinitio est re-
spiratio in laxisio.*

*Vnum est quod
secundum natu-
ram est.
Variū est quod
præter naturā
existit.*

*Immoderatio
omne est duplex.*

*Respiratio
partes præcipue
duæ.*

à pulſibus uerò, ei qui per totū animal eſt diſperſus, contingere: ac uelox quidem pulſus, ſicut & omnis motus, ab utilitate urgente, facultate intergra, & promptis organis perficitur (quæ quidē à uobis alibi ſunt demonſtrata) eadem certē eſſe poſſunt cauſe uelocis reſpirationis. Poſſibile tamen eſt utilitate ſufficienter urgente, etiam ſi facultas moderatē debiliſor ſit, quandoq; motum fieri uelocem. Si uerò magis debilitetur, nō amplius poſſibile eſt uelocem actionē fieri, ſed pro ueloci denſam. Omnis autem denſitatis actionum una cauſa aſſignat, prioris uidelicet actionis defectus: ſiquidem illa urgente, coguntur ſe ſtinare expeditius.* Porro ſermo à nobis habitus in cōmentariis de pulſibus, reſpiratione uidetur fuiſſe cōmunis. Primi quidem, nam de omni motu illic diſſeruiſimus in uniuerſum. Deinde, quia parum abeſt, quin omnis reſpiratio pulſus proportionē reſpondeat. Quippe ſimiliter ut ille, eſt compoſitus ex contrariis motibus per ceſſationes diſtinctus: arque eiſdem utilitatis gratia contingit. Præterea ex partibus eius, inſpiratio quidem cōſimilis exiſtens pulſus dilationibus, inſtitam caliditate refrigerat: expiratio uerò, ueluti contractio pulſum, ſumidum ſanguinis excrementū excernit. Quia & ad nutritionē animalis ſpiritus ambas actiones conſerre: & ex ceſſationibus, eam quidem quæ poſt dilationē ſit, breuiorem eſſe: quæ uerò contractionem ſequitur, longiorē: ambobus cōmunia exiſtunt. Eundem autem cauſarū concurſum magnitudinem reſpirationis, quem uelocitas, poſtulat: nempe utilitatem urgentem, facultatis robur, & promptitudinem organorū. At tarditas paruiſſiſq; non omnino opus habent cōtrariis omnibus ſimul, ſed unum ex iſtis proſuſ a deſe oportet: plura non eſt neceſſe. Quemadmodū igitur ſi parum ſit aucta caliditas, perſpicue maior, nō tamen ueſtior: ſi autem plurimū, & maxima & uelox & denſa inſpiratio redditur: eodem modo ubi caliditas ſecundum naturam imminuta fuerit, alijs cauſis immotis manentibus, neceſſe eſt parum, tardam, & raram inſpirationē fieri: ſed paulo tamen quā ſecundum naturam minore, multo uerò tardiore, plurimū autem rariore. Robuſta enim exiſtente facultate, non eſt poſſibile multo minore fieri dilationem. Sed ſi quæ ad utilitatem pertinent, admodum exoluantur, plurimam ceſſationē fieri uerſimile eſt: non tamen propterea omnino tardē moueri, modō facultas robuſta ſit. Porro quæ in aucto calore, eadem & in animali ſpiritu ad nutritionem urgente, ſpecies erunt reſpirationis diſcultatis, eis uidelicet quæ circa * inſpirationes conſiſtit. * Quemadmodū etiā immoderatio fuliginis eadem reſpiradi diſcultates circa expirationē efficit, quæ circa reſpirationē relaxat. Veloces quippe erit, & magnæ & dēſe, ubi multa eiſmodi ſuperfluas collecta fuerit: tardæ autē & paræ & rare, circa affectiones contrarias. * An igitur ratio poſſit, reſtatur autē aliquid eorū quæ euidenter apparet: Ego ſanè omnia hæc circa ætatē, regionē, uniuerſas conſtitutiones æris ambientis, exercitiā deniq; morbos, maximē conſentientia reperio. Vbi eſt abundat caliditas, ue-

loces, magnas, & denſas uidere eſt inſpirationes fieri: ubi ruriſus frigiditas, contrarias, nempe tardas, paruas, & raras. At uerò quibus animalis ſpiritus euacuatur, & ob id citā renutritioe habent opus, hi nō ſoldū ualde, ſed & citō & denſe inſpirant: quibus nihil uacuatur, hi contrarij illis habent inſpirationis ſpeciem. Si uerò ambo concurrant, & caloris augmentū, & ſpiritus conſumptio, hi omniū maximam, & uelociſſimam, & denſiſſimam inſpirationē fortiuntur: & maximē ſi ambo fuerint aucta uehementer: quemadmodum ubi ambo fuerint admodum imminuta, minimæ, tardiſſimæ, & rariſſimæ ſunt inſpirationes. Ipſa enim expirationis ſpecies, ſi quidem multæ fumoſæ ſuperfluas collectæ ſint, maxima, uelociſſima, & denſiſſima erit. Si uerò pauciſſimæ penitus fuerint ſuperfluas, minima, tardiſſima, rariſſima. Et enim ex ætatibus omnes quæ in augmento ſunt, magnam, uelocem, & denſam facere inſpirationem cernimus: quæ uerò decreſcunt, raram, paruum, & tardam, propterea quod illis caliditas amplior, ſi longē minor exiſtit. & illis quidem animalis ſpiritus ſubſtantiam cum corpore coaugeri eſt neceſſe, hiſ uerò cōtrabere. Iam uerò cum in ætatibus quidem creſcentibus, ob inſiti caloris robur, atque adeo ob ipſum augmentū, maxima humorū copia abſumitur: in decreſcentibus autē, quantum neceſſe eſt ad ipſam uitam duntaxat, utpote quæ neq; augeretur amplius, & iam ſunt perfrigerata: merito ſanè illis uelox, magna & denſa: hiſ uice uerſa, per omnia cōtraria editur expiratio. Quemadmodū uerò eſt cundam ætates, ita & iuxta tempora, & regiones, & omnes ab iſtis conſtitutiones, tum pulſus cum reſpirationibus, tum reſpirationem cum pulſibus proportionem habent in calidis quidem ad magnitudinē, uelocitate, & denſitatem, mutata: in frigidis uerò, cōtrario modo. Quinetiā in exercitijs improbis (quod in eis augetur quidem caliditas, abſumatur autē animalis ſpiritus) ualde, uelociter, & denſe reſpirare ſolemus: quicquid uerò, parū, tardē, rareq; quandoquidem ſic marceſcit caliditas, ſpiritus autē neq; in totū, aut omnino modicē abſumitur. Ex balneis etiā, calida quidem, uelocem, magnā, & denſam faciūt reſpirationē: frigida uerò, contrarij. Porro in ſomnis, magnitudine & uelocitate motus, expiratio inſpirationē excellit: quando ciborū cōſumptiones & concoctiones maximē tum perficiunt. Vnde uerſimile eſt, coaceruari in illis plurimū fuliginis excrementi. At per affectus febriles, maximē ubi circa aliquod reſpirationis organū, aut circa cor, maxima caloris copia eſt collecta, omnis reſpiratio magna, uelox, & denſa reddit. In quib; uerò perfrigeratus eſt calor, cōtraria proſuſ. Atq; hiſ etiam, ut in alijs omnibus, pulſus & reſpiratio proportionē habere uident. Neutrū nāq; ipſorū in totū perire eſt poſſibile, quādiu uiuent animal: eſt interdū ob paruitatē nōnullis peririſſe putatur. Hoc autē diſcrimen eſt inter reſpirationē & pulſum: quod illi quidē, cum ſit animale opus, uolūtas poſſit coercere, ac proinde in uarijs ſpecieſ mutare, uel ſi ſanitas bona ſit, & facultas integra, & organa reſpirationis ad operandū præp-

Inſpirationes ob calorem excrementum, quales. Inſpirationes ob immodicam frigus, quales. Inſpirationes ob excrementum ſpirituum.

Expirationis ſpecies pro conſuetudine differentia variatur.

Augmentū & decreſcunt in ſomniatione.

Exercitijs improbis augeri quiddam caliditatem, ſpiritus autem animalis abſumitur.

Balneæ qualem reddunt reſpirationem.

Expiratio in dormientibus, cum in aquaculione et reſpiratio: ſpū inſpirationē ex cōtinet.

Reſpirationem reſpirationem qualem.

Perfrigeratio pulſum.

Vita manente, nec poſſum, nec reſpirationē omnino perire poſſe. Reſpiratio eſt uoluntarium opus.

Pulsus est naturalis acutus.

Aspiratio inflatur maus thoracis.

Dyspnœa ob solâ ardorem producta, quælibet.

Spiritus in aqua letas, quævis asphyxiam sit nota.

Tu uocem præter naturam cœlantes septem triduosum, parvam, uocem, et dñsum facimus spiritum.

fima: pulsus autē, utpote existēs opus uirale, nec suppressi, nec uariari possint, quando tres illæ causæ insculptibiles cōspirant in unum. Ob idq̃ circa inflammatas partes dolor uehemens ob arteriarum motū oritur, quod in nostra manu nō sit morum facere magnitudinem minorē, aut uelocitate tardiorē. Thorax itaq̃ unum ex respiratiōis organis, quidōmodum respiratio motus uoluntarius exsistit, ad similitudinē crurum mouebitur. Quamobrem si firī inflāmati, & ad motum cogatur, tardius multo q̃ oportebit, dilatabitur, ac proinde cum respiratiōe difficili, animal in discrimē suffocationis perducet. Cæteru ne suffocet, densiores actiones edit, nō amplius tantum cessans, quantum solebat cum secundum naturam haberet. Quamobrem tunc est necesse totam respiratiōē fieri paruum, tardam, & densam, multisq̃ sanē minorem, q̃ par est, nō autem ita multo tardiorē. Dolor quippe nō adeo grauius uexat thoracem, ob motus uelocitatem, sicuti ob magnitudinem dilationis. Quod si solus dolor thoracis particulas affligat, manente calore cordis intra naturæ terminos, tunc motus thoracis manifestē tardior reddetur. Si uero ardor quidam in ipso corde oboritur, uelocitas quidem minimē exoluitur, aufertur autē hic etiam multū de magnitudine, pro qua densitas generalis, ob urgentē utilitatē. At quæ ob solum ardorem contingit dyspnœa, ea magnū & uelocem & densum spiritum efficit. Ob idq̃ magnitudine tantum & uelocitate, ab ea quæ propter dolorem solum orta est, distinguitur. Quæ uero ex ambabus causis cōiunctis generatur, ab ea quidem quæ ob ardorem fit, sola paruitate differt: ab ea autem quæ propter dolorem, sola uelocitate. Cæterum difficultas respirandi ob peruerationem naturalis caloris, paruum, tardum, & rarum spiritū reddit: cum aliarum nulli simul tarditas & raritas accidat. At quantum in defectibus & excessibus caliditatis, ipsa respiratiōis species à rhythmo naturæ excedit, tantū etiam cum pulsibus cōmuniter & eodem modo habet. Differt autem ab illis, in eis quæ ob dolorificos organorū affectus accidunt. Nam reliquæ affectiones instrumentorū, quæ circa dolorem per obturationes, aut durities, aut compressiones, aut omnino coarctationes quasdam fiunt, cōsimiles uariationes in utriusq̃ actionibus, animalibus & uitalibus faciūt. Quippe in id genus affectibus, paruum & uelox, & densus spiritus redditur circa pulsus & respirationes, necnon inæqualitas, quæ uel præcipua earum affectionū est nota. At paruum quidem tunc spiritus agitur, propterea quod ob angustiam sulcatoriorū instrumentorum, paucior q̃ oportet attrahitur: densus autem, quia ob expletur uotū utilitatis: atq̃ ob eandem causam densus. Vt autem quæ respiratorijs instrumentis sunt propria cōmemorem, tumores præter naturam, qui circa uentrē, hepar, splenem, colon, hisq̃ coniunctas partes consistunt, ob septi transuersi coarctationem, paruum & uelocem & densum faciūt spiritum, iuxta eundem modum & aqua inter cures laborantibus, & gerentibus uterum, & hęc quæ si supra modum cibo expleuerunt, & qui prominentē uentrē ha-

bent, huiusmodi sit respiratiōis species. In orthopnœa etiam (quæ erectæ ceruicæ spiratio est, sitq̃ collectis uiscidis & crassius humoribus circa asperam pulmonis arteriam) & similiter ubi circa pulmonē aliquid indurat, aut tuberculum gignitur premeant atq̃ coarctans ipsam arteriam asperam, paruum, densus, ueloxq̃ spiritus reddit. Ad eundem modū si in thorace tuberculū tale cōstitit, paruum & deorsus & uelox spiritus generabitur: occupante nimirū tumore præter naturam, pulmonis regiōē, in quā dilatatus extendebatur. * Perinde autē est, ad hoc ut compressus pulmo nō possit sufficientē aëre attrahere, siue thorax totus angustus reddat in affectū quouis, siue media regio occupet à quibsdam præter naturam corpculis, siue ipse etiā pulmo induret, aut obturet, aut intrumcatq̃, ueluti in peripneumonici uirgī cōtingit. Vna enim in ijs omnib. cōiuncta est causa, ob quā parua inspiratio redditur, coarctatio uidelicet asperæ arteriæ. Cæterum paruutatem inspiratiōis densitas & uelocitas sequitur, si facultas robusta fuerit. At cum iuxta pulmonē affectus ipse consistit, quīs thorax distendit plurimū possit, parū tamen inspirat: ita etiam ubi intermedij ipsorū organorū regiones fuerint occupatæ. Vbi uero totus thorax aut fortis, aut aliter paruum & angustus reddit, tunc distentionē paruum efficiens, pulmonis causa est uelocis inspiratiōis: quemadmodū & septum transuersum, quidō ab aliqua mole iuxta infernam regiōē opprimitur. Porro suppuratorum affectū, quīs sæpe ex pleuritide oritur, his proximē relatis annumerabitur, quæ uidelicet iuxta pulmonē coarctationē citra dolorem faciendo, parū reddunt inspirationē. * Quo modo igitur hæc respiratorijs organorū una citra dolorem consistētia, ab ijs quæ cum dolore fiunt distinguuntur, si & paruum & densus utriusq̃ similiter spiritus redditur. Motus uelocitate. In affectibus,

siquidē dolorificis modicē respirant & dense, nō tamen uelociter, nisi fortē etiā febris adsit. Quæ præsentē, licet iuxta paruutatem & uelocitatem respirant similiter, tamen densitudine distinguuntur: quippe non modicē densatur ipsi spiritus: id qd nō euenit illis, qui ob solum coarctationē instrumentorū difficultate respirant. Quin & expiratio febricitibus maior simulq̃ calidior est: quod nō cōtingit hęc, qui ob coarctationē parum & dense expirant. Verum in doloribus organorū respiratiōis, minimē quidem ob affectionē ipsam, sed ob actionis facultatē, quæ animalis exsistit, spiritus paruum & densus reddit. At species difficultatis respirandi, quæ ad coarctationē pulmonis cōsequitur, nihil opus habet facultatē ad sui generationem. Perspicuū igitur est, quod amplius in magnis thoracis moribus dolore uexant partes quæ in uentre cōsistunt, minus uero in paruisset ob id paruum & densus erit spiritus, nō solum in pleuritide, sed & quibus stomachum, aut uentrem, aut hepar, aut splenem, aut peritonæon, aut intestina, aut præcordiorū musculos, dolorifica affectio infestat. cum tamen ea omnia partium appensa sicut, partim agnata respiratorijs organis, atq̃ ad eorum motū moneantur, ac proinde ostendantur in respiratiōibus. Quare illis etiam

Orthopnœa quid sit, et uocem de gignatur.

Inspiratiō paruutatem densitatem & uelocitatem sequitur, si facultas robusta fuerit.

Empyema a reditu paruam inspirationem.

Motus uelocitatem distinguunt affectiones instrumentorū respiratiōis, ab ijs quæ citra dolorem insistant.

Expiratio febricitibus quælibet.

Spiritus in paruam & densum, quibus suppuratiōes affligunt.

*Respiratoriū et
ganū promouē-
tiam incipit, quā
causa, ut gra-
uius dolore affligi-
tur animal.
Pulmo fieri est in
frigidū.*

*Spiritus paruus
& densus, dolo-
ri exilis signū.*

*Alienati mente
obliuiscuntur a-
nimalem actio-
nem, quae po-
tētia cōferta et
magna obest.*

*Alienati mente,
cur ratio et ma-
ximam spiritū
reddunt.*

*Spiritus quan-
titas desponsio
organorum spe-
cialitatem res-
pirationis re-
probat, quāvis
pro natura mor-
bi se habeat.*

*Inspirandi com-
posita difficultas
ex sua natura
quatuor : toti-
demque similiter
expirandi.*

*Inspirationis cō-
expirationis cō-
lata.*

*Respirationem
dari inaequalē.*

non uulgaris prouidentia inest, ut * ne grauius dolore affligatur animal. Quod uero ad pulmo- nem spectat, parū abest quin omnino sensus sit expertus. Itaq; licebit pronuntiare iam nobis in u- niuersum, paruam & densum spiritum signū esse doloris, nō modō respiratoriū particulari, sed etiam aliarum animi, quae cum respirationis organis cōmouentur. Igitur naturales facultates omnes, semper necessarii sibi operibus uan- cant, & nunquam torpent, aut negligentes sunt: quae uero sub uoluntatis potestatem cadunt, ex- ceptae, ubi uoluntas ipsa circa alias actiones de- tenta fuerit, negligentius perficiuntur. Quare qui animi alienatione laborant, animalium actio- nem obliuiscuntur: quas omnes, ut longo inter- posito tempore faciūt, sic confertim & magnas. Ceterū si quis minus quam oportet bibat, non ad dies tantum, sed ad integros menses durare posuit: fin uero minus q̄ par sit respirare, nec mi- nimā diei partem durare queat. Proinde respira- tionis utilitas nō expleta in ijs qui cōmō sunt mente, solliciti ad actiones excitat: quibus sanē maximis, totū illud recuperat, quo per cessatio- nis tempus finit defraudata. Atq; nō rarus mo- dō, sed magnus alienatorū mente spiritus reddi- tur, tantolq; quam cōuenit maior, quantō uideli- cet rarior: contrā quā in potu coningit: mul- to enim rarius, paulō uero plus bibunt. Porro ubi secundum naturā se habent organa, quanti- tas spiritus semper est ipsorum distentionibus si- milis: nō autē cum prae naturā fuerint dispo- sita: nam possibile aliquando est plurimū disten- di thoracē, uerū ob coarctationē pulmonis, aut ob aliam causam, paruam inspirari aëris externi. Nequāq; igitur ad affectionē omnī spiritualium instrumentō proportionē, sed solū asperarū arteriarū, inspirationes sunt. Sufficit autem ad dignoscendam omnia haec, inspicere quantus aër inspiretur, & quantus per expirationem reddat- ur.* Etenim cōtractiones thoracis citra abdo- minis musculorū concitationem, nunquā ma- gnā possunt facere expirationē. Quae uero il- lorū etiam impulsū sunt, quāq; exilationes exi- stunt, magnitudinis sunt opifices. Vt autem ad compositas respirandi difficultates ueniamus, cum aliqua sit magna inspiratio, & aliqua uelox, sintq; contrariae hae parua & tarda, necessum est quatuor fieri omnes inspirandi compositas di- ficultates: magnam uidelicet & tardam, magnā & uelocem, paruā & tardam, paruā & uelo- cem: totidemq; similiter expirationis. In cessatio- nibus uerō impossibile est cōpositam respira- di difficultatis speciem fieri, cum una tantum in eis oppositio habeatur, iuxta raritatem & densi- tatem consistens. At uerū ipsis morbus murō inter se collatis, inspiratione dico cum expira- tione, species quaedam erunt consonantiae to- tius respirationis. Possibile est enim inspiratio- nem fieri magnā, expirationem autem paruā: aut uice uersā, paruam inspirationē, & expiratio- nem magnā: aut utraq; paruā, aut utraq; ma- gnā: sic & ueloces, aut tardas utraq; : aut alte- ram uelocem, alteram tardam. Quin & inaequalis est aliqua respiratio, quemadmodū & pulsus, tum circa motū cōiugationes, tum nō rarus motū.

unū. Similiter & ordinata & inordinata fieri res- piratio potest, perinde ac pulsus. Est sanē quod differenter inaequalium pulsuum, tum circa unū motū, tum circa plures consentiunt existunt, tot etiam reperiuntur respirationum. Etenim si in- spiratio aut expiratio uarietur, siue ex tarditate in uelocitate, siue ex uelocitate in tarditate mo- tu transiente, cōpositam siue inaequalem ipsam actionē dicemus. Similiter si cessatio aliqua in- terceperit, secueritue alterum motum, siue inspi- rationem, siue expirationem, cōpositam etiam esse dicemus tunc eam quae interrupta est, utra- tandem ea existat. Aliquando autem, licet raro, est uisum in uno eodemq; homine simul interci- pi utraq; nimirum a collecta in arteriis asperis tanta humorum colluue, quae suffocare animal possit, ob pleuritide perniciosam, aut peripneu- moniam, aut deniq; suppuratōē non expurga- tam. Quemadmodum etiam ob arteriarum le- uium obturationes compressionesq; interdum pulsū inaequalitatem gignunt. Ob facultatis prae- terea imbecillitatem, quae una uice nō potest ip- sam actionem perficere, ut in pulsū, sic etiam in respiratione, est quando inaequalitas cernitur: hoc tamē interiecto discrimine, quod ad ipsam sanē respirationem, quandoquidem actio ani- malis existit, plurimum ipsa uoluntas confert: illa autem ad pulsuum motus, quod nō a facultate uitali proficiat. Vbi igitur uoluntas nihil ad actionem cōducit, ut in pulsū inaequalitate, eadem praenotio affectionis est in uniuersis ho- minibus. Vbi uerō aut totum, aut plurimū con- fert, ut in ipsa respiratione, ibi amplius mores æ- gri expendere oportet. Sed quemadmodū diffe- rentia facultatum efficientium actiones, tum cir- ca pulsus, tum circa respirationes, differētis prae- notiones facit: sic etiam circa ipsam organorū naturā, quaedam iudicationis alteratio erit. Pul- sus enim per leues arterias, respiratio uerū tum per asperas, tum per musculolum genus perfici- tur. Primō siquidem animalis facultas moue- musculos ad respirationis generationē: huius- thoracem: qui tandem pulmones cōmouet, quorū pars asperae arteriae existunt, in quas aër qui in- spiratur, illabitur. Quemadmodū igitur harum coarctationes totam respirationē saepe inaequa- lem reddunt, sic & musculorum aberrantes mo- tus & inordinati. Atq; illarum quidem, ut rece- ptaculorum spiritus: horum uerō, ut organorū motionis est noxa. Ceterū coarctationes in arteriis asperis, tumores praeter naturam decla- rantur morbo. Porro affectiones simul & aber- rantes motus musculorum existunt, conuulsio- nes, confusiones, atq; tremores, ob quos nimi- rum respiratio inaequalitas reddetur. Omnī itaq; respiratio inaequalitatem, aut asperarum ar- teriarum coarctatio, aut thoracis musculorū ab- errans motus, aut facultatis ipsam efficientis de- bilitas, in causa est. Musculorū igitur genus pro- prium & priuam destinatum respirationis est, praeter pulmonem rationē. Praeterea facultas quidem respiratoriae arbitriū, uoluntate permis- sum est: uitalis autē facultas, nullū dominū supe- riore agnoscit, sed prorsus libera existit. * Quin etiam quidam ad inaequalitatem generationē

*Respiratio ordi-
nata, inordinata
est.*

*Respirationis
inaequalitas uo-
le fletu accide-
re.*

*Mores acri quā-
da expendenda.*

*Pulsus per leues
arterias fit.
Respiratio fit
per asperas arte-
rias, et masculas*

*Musculorū effec-
tiones et ab-
errantes motus.*

*Respirationis in-
aequalitatem cau-
sa.*

*Respiratio est
arbitrio sub-
dita.
Vitalis facultas
est libera.*

respiratio habebit, præter pulsuum rationē: dum uidelicet partim quidem à sola proficitur facultate animali, partim uerò à complexu ipsius cum doloribus. Porro in delirij superat quidē raritas & magnitudo: apparet autē quædam inæqualitas, & ordinis perturbatio, tum iuxta plures respirationes, tum iuxta unam solum: quod nimirū spectra & phantasmata aliquando plus, aliquando minus, rationem à naturalibus operibus reuocent. In doloribus etiam instrumentorū cōtingit totam respirationē inæqualem & inordinatā reddi, cum neq; in illis etiam expleat utilitas iuxta actiones singulas: quippe nec uelociter, nec dense, nec amplius thoracē distendere possunt. Omnia enim hæc ipsi molesta sunt, & præsertim magnitudo: deinde uelocitas: postremo autē densitas. Dolentibus namq; minus molestum est per longius tempus, q̃ per breuius moueri. Cæterū dum ob ipsorū motū immutationes, parū abest quin animal suffocetur, uoluntas tunc cogitur ad aliquod tempus maiore facere respirationē, & multo uelociorē, & priore densiorē. At cum in eiusmodi actionibus utilitas quidem expleatur, animal uerò affligat doloribus (omnia quidem quæ utilitatem expleat, exacerbant dolores) uoluntas rursus à magnitudine & uelocitate & densitate detrahit aliquando plus, aliquando minus: utpote quæ cōsiliū mops, nec sistere actionē possit, ob suffocationis periculū, nec reperire aliqui doloris medellam: quare modò ad hoc, modò ad illud transit. Vnde tum inæqualitas circa singulas & omnes deinceps respirationes, tum multiformis illa ordinis perturbatio oritur. Siquid ex corruptione partitatis, inæqualitatem omnī, itemq; ordinis perturbationis generario cōstat. Partitas quippe cōtinua, æqualitas est: paritas uerò iuxta circuitus, est ordo. Ob idiq; ubi paritas cōtinua corrumpitur, gignit inæqualitas: ubi uerò iuxta circuitus reuertens, ordinis perturbatio intro ducitur. Cæterū quia multa inæqualitas & ordinis perturbatio in eiusmodi affectionibus incitat, superat tamen id genus respirandi difficultatis, q̃d iuxta paritatem & densitatem cōsistit. Quare recte uidetur dictū, quod ad omnia dolore afflicta organa, quæ cōmouentur circa respirationes, paruus & densus spiritus consequat: & iuxta eandem rationē in delirij magnū fieri & rarum spiritū, idq; inæqualiter: nunq; autē paruū & densum. Igitur inspiratio magna simul & uelox, ob utilitatem urgentem, prompta organa, & integram, aut certe parū remissam, gignit facultatē. At magna simul & tarda, solis mente motus cōtingit, atq; his non semper. Conspicua autē etiam hic est ex prædictis, causæ cōsideratio: quædam modū etiā, cum paruū habent inspirationē & tardam i, quibus calor insitus est nimis perfrigeratus. Quæ restat adhuc cōiugatio quatuor, paritas erat cum uelocitate: sitq; penitus in nulla affectione simplici, quædam modū neq; magna simul & tarda, quam aliquando alienatus mente accidere diximus: sequitur tamen ut plurimū, ubi simul dolor & unitatis incrementū concurrat. Ad eundē cum prædictis modū etiam in cōiugationibus circa expirationem perferuari ipsas affectiones oportet.

Nam & in his, aut facultatem, aut aliquod organum lesum, aut calorū modum alterari deprehendimus. Si igitur quis fumosa caliditate in corporibus redundante, expirationem magnam simulq; uelocem fieri dicat, nō utiq; errat. Manifestum est autē quod & facultatē integram tunc esse oportet, & ex organis nullum unari. Similiter autē magnā simul & tardam in quibusdam delirantibus fieri, eodē modo quo inspirationē, contigit. Sic paruū simul & tardam fieri i, quibus nullum fumosum recrementū fuerit collectum. Sicuti tum paruam, tum uelocem illis, qui cum recrementū huiusmodi collegerint, dolēt etiam aliqua parte earum quæ circa respirationem mouent. Ad dissoluantas autē deueniendo motū respirationis, si tardior quidem & minor quim secundū naturā sit inspiratio, expiratio autem & uelocior & maior, dicemus sanē imminu tum esse calorē secundū naturā, auctum uerò excrementū fumosum. Si cōtra, inspiratio quidem sit magna & uelox, expiratio autē paruā simul & tarda, auctū naturalem calorē dicemus, nullūq; inesse recrementū fumosum. Porro simplices respirandi difficultates, plurimū affectionū cōmunes existunt: ob idq; nil certi indicant. Coniugatarem autem alia, ad iudiciū minime fallax perducunt. Magnitudo siquidem * inspirationis, ipsa per se respirandi quædam difficultas est simplex, uerū nullus certe cognitonis est signū. Nam & urgente utilitate, & læta fieri mente asselet. At si cum densitate consistat, utilitatem urgentem: si uerò cum raritate, delirij indicat. Similiter & cum per se ipsam paruata nil certi sit, aut dolere afflicta partem aliquam, aut exolutam utilitatem ostendit: ad densitatem iuncta, dolorem: si cū raritate, utilitatis exolutionē portendit. Per se etiam nec rara quidem, nec densa fieri quicquam ostendunt. At densa simul & magna, utilitatem augmentum indicat: densa uerò simul & paruā, organi alicuius quod inter respirandum mouetur, dolorem. Rara similiter, si cum magnitudine quidem coeat, delirij: si uerò cum paritate, perfrigerationes ostēdit. Atq; ob id sanē omnium compositarū respirandi difficultatum hæc quatuor ultimæ coniugationes sunt utilissimæ. Fiant autē, differentiæ actionū iuxta magnitudinem & paritatem, ad cessationē differentias permittitis. Cæterū ex cessationū oppositione (quæ unica tantū est penes raritatem & densitatem) alia differentiæ permittita, quatuor etiam oriuntur coniugationes. Prima quidem est densa & uelox: secunda, densa simul & tarda: tertia, rara & uelox: quarta deniq; rara simul & tarda. Nullum tamen certe cognitonis signū simpliciter & necessariū exhibent, quædam modū priores quatuor: quare iam ad prænotiones neutiq; indigent, cum nimirū si qd significet, id tam distinctū per priores illas habeamus. Porro si qe ægrotatus facultatem respiratoriam, omnīq; facultatem animalis, præcipue refrigerat, propria signa cupit habere, in alarū nasi motū habebit, & omnī musculorū, q̃ circa scapulas sunt, actionē, & cōferent faciliā cōcidēt thoracū. Quidē em̃ hic debilius q̃ expediat moueri, circa respirationes quidē, spiritus ductū nālē alia adiuuat: circa expirationes autem

Delirantium respiratione.

Dolorei organorum respirationem, reddit actionem ipsam inæqualem inordinatam tamq̃.

Virilitatem copiam exacerbat dolorem.

Paritatem corruptionis, cum sit causa.

Respiratione lenta organa, qualem consequatur spiritum.

Delirantium spiritus magnus simul & tardus.

Inspiratio magna & uelox causa.

Inspiratio paruā simul & uelox.

Inspiratio magna simul & uelox causa.

Inspiratio magna simul & tardus delirantibus accidet.

Expiratio paruā simul & tardus, quibus.

Expiratio paruā simul & uelox, quibus.

Dissoluantis motum respirationis causa.

Respirandi simplices quatuor difficultates, nil certi inducunt: cum inget a mte, ad iudiciū minime fallax perducunt.

Respirandi difficultates compositarum, quæ sunt utilissimæ coniugationes.

Cessationem circa respirationem est appellat rariem, penes raritatem & densitatem.

Respiratoria animalis, facultatem extremam refrigerat: propria signa quæ sunt.

Nesci alia quid sit spiritus ductus alicuius alicuius.

autem

Cicidentia the
pate & insit
densius de
men.

Septum trans
versum.

Eflatus fieri ab
intercostalibus
musculis.

Respiratio
duplex cessans.

Respiratio
natura officio
duplex.

Cessatio inter
respiratio bre
u & longa, à
quibus causis
prospiciantur.

Respiratio
natura motu
ab ipso impulsu
procedit cessa
tione cessans.

Deficiencia pro
prio symptoma
est respiratio ma
gna simul & ra
ra.

Deficiencia car
diacalis reddi
tur.

Respiratio magna
simul & rara,
non est respiratio
bona à delirio.

autē, thorax confertim delabitur, nō autem pau
latim demittitur. Etenim cōcidentia differt à de
missione: quōd illa quidem, faculrate agrotan
te fiat: hæc autem, integra & valente eadem. Ete
nim septum transversum thoracis tensione ad
inuat, solumq; illam per expirationes resolu
it, nōnihil etiam opulantesbus intercostalibus mu
sculis, per quorum actiones ipsi fiunt eflatus.
Cum autē duplex exsistat cessatio in respiratio
nis, una ante inspirationē, altera ante expira
tionem: uter sanē motus offendatur, cessatio prę
cedentem, ab eo quod secundum naturam ha
bet, immutat. Duplici igitur existente in moti
bus offensione, ac duplici item in cessationibus:
utilitatis quidē defectus, diuturni temporis sem
per cessationes efficiunt: redundantur uerō, bre
uioris. Itaq; abundantia caloris secundum natu
ram, reddens inspirationē magnā, statim etiam
precedentē ipsam cessationem, brevis temporis
efficit. Abundantia uerō caloris præter naturā,
fuligine siq; ut expirationem magnam, sic etiam
cessationem præcedentē reddit breuiorē. Quare
magnus & densus penitus sit spiritus, ubi ca
liditatis genus redundat. Sic etiam si sublata uti
litas sit, ob caloris uideletur immutationem, ubi
quidem naturæ aliorum calor immittitur paruam re
dit inspirationem, etiam longa cessatio præce
dit. Vbi uerō calor præter naturam perditus
fuerit, parua quidem expiratio, longa uerō ante
ipsam cessatio accidit. Sæpenuerō uerō calor
præter naturam est auctus, immittit calore se
cundum naturam. Atq; ita cessatio ante expira
tionem * brevis temporis redditur: altera uerō
ante inspirationem * longioris. Vtrum enim ex
motibus ipsa urgebit utilitas, is præcedentē ces
sationem cunctari non permittit.

GALENI PERGAMENI de difficultate respirationis li ber secundus.

Proprium itaq; desipientiæ symptoma est,
magnam & raram, hoc est, per longū tem
pus, respiratiōē facere: uidenturq; ambare
hæ, ueluti obliuioſe actionis affectus esse. Nam
immoderatam facere spiritus attractionem, rur
sumq; immodicā quietem, eius est, qui nec quan
do desinere ab actione oporteat, nouit, nec
quando rursus incipere: sed in utriusq; mensu
ram egreditur, ob conuenientis ignoracionem.
Cum igitur respiratio animale opus sit, desipien
tes autem habeant oblectam rationem, obliuio
siores tum circa actiones, tum circa ipsarum in
terstitia fiunt. Quamobrem & actiones & quie
tes in multo facientes tempore, hoc modo ma
gnitudinem & raritatem circa totam respirati
onem efficiunt: id quod Hippocrates cum in alijs
locis, tum etiam in præmotionibus, sensisse uide
tur, ubi ait: Spiritus magnus & per multum tem
pus, desipien nam significat. Quo sanē oraculo,
magnum & raram spiritum desipientiæ signum
esse contendit: non tamen necessum esse, ut is
qui delirat, magnam simul & raram faciat inspi
rationem. Nec enim inseparabilem magnam &
raram spiritū, sed proprium esse delirij diximus.

Quicquid autem proprium exiſtit, haud conti
nuo est etiam inseparabile. Esse quippe geome
tram, propriū hominis est, nō autem inseparabi
le, quemadmodū rationale, exiſtit. Licet itaque
dicere ex doctrina Hippocratis, omnibus qui
dem delirij magnū & raram spiritū iuxta prop
riam ipsorum rationē comitem esse: nō autem
delirus omnibus, sed illas tantū, qui nō per aliam
quamdam affectionē delirio maiorē, habent re
spiratiōem aliter alteratam. Hippocrates siqui
dem aliquando magnū & raram spiritū fieri de
lirio nouit, aliquando uerō ipsius cōtrarium: in
terdum in eodem homine utrumq; uicissim inci
dere. Porro qui in calore & luctu suspirant,
duplice de causa post longum tempus inspi
rationem magnā efficiunt: tum quod circa curam, ob
quam trahuntur, conuersi, per multas ex ordine
actiones respirant minus & rarius, ob idq; tan
dem cogitur uno actu totam semel explere atq;
reparare: sicut: tum amplius enim, propterea q
per morores, & spiritus & calor intrinsecus moueāt,
qui quidem homini facilius negotiū, cum ad
maiorē expirationē compellit. At in affectioni
bus delirantiū, necessitas utrumque magnæ respi
rationis à prima quidem causā, esse perſimilis: à
secunda uerō nō item, cum nō intro magis q
extra his calor moueāt, nisi alia forte quardam ac
cessio fiat. Differunt autem & febri ratione de
liri ab his, qui alijs aliquo calore cruciantur.
Igitur reuocatis in memoriā quæ in primo li
bro sunt tradita, si à solo delirio perueniat re
spiratiōis cōcinnitas, omnino erit spiritus ma
gnus simul & rarus. Si uerō à solo dolore, par
uus & densus. At si cōspiciantur ambo, & dolor
præcellerit uehementer, obscura omnino altera
tio ex delirio erit. Sin autē moderatus fuerit do
lor, aut plus quidē à dolore, minus uerō à dei
ri, respiratiō alterari cōtinget, aut uice uersā,
aut æqualiter iuxta utrumq;. Sic enī si cum alia
quapiam affectione delirij complexū sit, respi
rationis speciem interdū aliam efficiet, prout su
perat, aut superatur, aut æqua potentia est prædi
tum: aut nunc quidem (si ita cōingat) superat,
rursus alio morbi tempore superabitur. At uerō
in peripneumonica, pleurica, & in angina, ac
breuiter in omnibus quibus aliquid circa thora
cem, aut pulmonem, aut etiam in uentre inferio
re sit phlegmone (hoc est, tumore dolente, duro
& calido) obſeſsum, paruus omnino & densus
spiritus sequitur: qualis est hydropticus, & eos
qui se aut potu aut cibis expleuerit intemperan
tius, necnō pregnantēs, uentre prominulo præ
ditos, anhelosos, purulentos, atq; eos denique
quibus dorsi spina contorta est, comitatur. Verū
Hippocrates de his quidem respirandi diffi
cultatibus, quæ sunt uel idiotis nonſimæ, nihil
memoria prodidit. Porro in pleuritide quatuor
mala semper se ostendūt symptomata: uidelicet
febris ardens, assiduus dolor, rufus, ac difficilis
respiratio, parua simul & densa exiſtens. Dolor
quippe, nō secus q̃ perſpiratione, paruū solta
cere respiratiōē: uerum dolor quidē, cum den
sitate, perſpiratione autē, cum raritate. Cum au
tem splen sit uisus minimē obnoxius dolori, nec
septum transversum, primū & principalissimū

Proprium omne
non statim est
etiam insepara
bile.

Suspirantes ex
luctu, cur post
longum tempus
inspirationem ma
gnam efficiunt.

Respiratio deli
rantium simul
et densa quæ
li.

Phlegmone
quid.

Spiritus paruus
& densus quæ
conueniunt diffi
ciliorem.

Pleuritide sym
ptomata sunt,
febris ardens, as
siduus dolor, ruf
sus, ac difficilis re
spiratio: parua
necnō prominu
lo tumore simul
& densa.

Splen est uisus
minimē obnox
ius dolori.

Septum trans
uersum est prin
cipalissimum re
spiratiōis orga
num.

respirationis organum, ipsius tumor cōprimat, nisi maximus sit, & caput illius occupet, haud quidem sufficiens est ut respirandi difficultatem ex delirio inductam superet, spiritus paruum & densum reddens. Quandoquidem opus est doctorem ipsum consistere circa aliquam partē, quæ iuxta respirationem mouetur: aut aliquid ex organis respiratorijs coarctari, ut paruum & densus spiritus fiat.

GALENI PERGAMENI
de difficultate respirationis li-
ber tertius.

REst autem Hippocrates rationali diuisione usus, sexto populari morborum libro duas oppositiones difficultis respirationis inter se complicans, eam scilicet quæ secundum magnitudinē & paruitatē est, illi quæ secundum raritatem & densitatē, quatuor in uniuersum fecit cōiugationes: unam uidelicet, magnā & raram: secundam, paruum & raram: tertiam, magnā simul & densam: quartā, paruum & densam. Quibus etiam adiecit ibidem, & reliquas duas cōiugationes, quæ ex collatione inspirationis cum expiratione oriuntur: ut puta magnam inspirationē & expirationē paruum. Inspirationem exiguam, & magnā expirationē. Dux siquidem oppositiones inter se complicate, quatuor cōiugationes efficiūt. Porro qui methodicē uelit diuidere, in primis expendat oportet, qualis naturæ existat, quod diuidendū uenit. Quod si simplex esse uideatur, quæ iuxta substantiā ipsius rationē sunt, quot sint, & quæ, ac qualia, considerandum. Si uero compositū, utranq; aut singulas eius partes diuidere expedit: totum autē, ex modo compositionis. Igitur dictio Hippocratis ita habet: Spiritus parui densi, magni rari, parui rari, magni densi, extra magnus intra paruum, intra magnus extra paruum, alius extendens, alius uergens, dupla intra reuocatio ueluti super inspirationibus, calidus, frigidus. Quod itaq; ex spiritibus intra & extra meatu, totius respirationis actio composita sit, quodq; altera eius pars inspiratio, altera expiratio appelletur, ignorat nemo. Quod uero nullius alterius rei, q̃ motus, propria sint uelocitas atq; tarditas, iam est à nobis expositū. Ceterū magnitudo & paruitas, ut motui propria sunt, sic omnino inseparabilia existunt ab eo, quod per localem distantiam fertur: ob idq; iuxta utranq; respirationis partem dux differentes oppositiones erunt: altera iuxta uelocitatem ac tarditatē, altera iuxta magnitudinē & paruitatem. Est autem & alia oppositio iuxta densitatem & raritatem consistentes: quæ quidem nō tantū morui, sed tanq̃ alius rei ex ipsis distantibus consistat, inest respirationi. Quare in his tribus oppositionū generibus omnes respirationis differentias esse necesse est. In uelocitate quidem & tarditate, propterea quod hæc propria, & ab omni motu inseparabilia sint. In magnitudine & paruitate, quod per distantiam organa respirationis moueantur. Densitas autem & raritas (quæ tertia oppositio est) neutrius propria rum ac primarū respirationis partū proprium

aut inseparabile existit, uerū totius respirationis pars sit per accidens quoddoquidem ex duobus contrarijs motibus quiete distinctis cōstat. Hæc itaq; sunt primæ differentiæ totius respirationis. Ceterū cum respiratio res sit, quæ & facere aliquid, & pati possit, aliud utiq; fuerit differentiarum genus in ipsā, utraq; uidelicet parte æqualiter inæqualiterue perfectā: aliudq; cursus ipsius totius ut composuit, partibus inter se mutuo collatis. Hæc cum ita habeant, sciendum pri-
mas quatuor differentias difficultis respirationis, in proposita Hippocratis dictione assignatas, totius respirationis esse, cum ad neutra eius partem raritas densitasue pertineat. Similiter etiam sequentes duas: nam & in his dux totius respirationis partes mutuo inter se conferuntur. Quæ uerō deinceps alix dux sequuntur, ubi ait: Alius extendens, alius uergens (quibus tardus & uelox pulsus significatur) eas sanē alterius ipsius respirationis parti proprias, maximē substantiales, purandū est. Tarditas namq; & uelocitas ab omni motu inseparabilia sunt. Quod postea deinceps habetur, Dupla intrō reuocatio, ueluti super inspirationibus, inquam inspirationē ostendit. Inquirēda est autē eadem oppositio & in expiratione, quam ego omisam puto à transcribentibus, potius quā ab ipso Hippocrate. Adidit præterea & optimē differentijs prædictis, calidum frigidumq; spiritū. Quanq; certē in Prænotionū libro, liorum trium, densi, & magni, & frigidi tantū spiritus meminit, tali dictione utens: Spiritus densus existens, dolorē, aut caloris effectus uelocitatem in locis supra septū transversum significat. Magnus autē & per multum tempus, delipentiam ostendit. Frigidus uerō ex uariis & ore prodiens, ualde iam periculosus est. Reliquas autem differentias subricit, tum propter breuitatē ueteribus familiarissimā, tum propter altitudinē animi, quæ ipsimet erat genuina Hippocrati. Demonstratū enim à nobis est, quæ uis sit semper hic uis, ut qui ea quæ alijs medicis nota sunt, prætereat, uelut quæ à nemine eorum qui artē ingenue exerceant, ignorari queant: quæ uerō talibus sunt ignota, omnia diligenter, simulq; perspicue exponat. Merito itaq; differentias densitatis, ut quæ medicis esse ignore non possint, una summa comprehensas exposuit, dicens: Spiritus densus, dolorē, aut maximū incendium significat, in locis supra septum transversum: tanq̃ sanē posuimus non intelligere, quæ cum paruitate quidem, dolorē significet: cum magnitudine uerō, incendium inextinguibile paruum supra diaphragma, quod immodice caliditates partū quæ infra id sunt, respirationē in magnitudinem & densitatem augere nō possint. In pleuride itaq; & peripneumonq; angustisq; & orthopneis, densus sit ac paruum spiritus. Imò uerō etiam si pleuritidis nō adsit, solus autem dolor costas infestet, spiritus densus & paruus red-
ditur. In uniuerso autē, siue tumor quis sit premeus coarctansq; quodcunq; respiratoriū organum, siue dolor circa quamcunq; partem, sic appropinquanti respirationis organis, ut ipso motu simul moueatur, densus ac paruus ipse spiritus erit. At calore maximo in respiratorijs orga-
nis coar-

Respiratio difficilis quatuor cōiugationibus.

Methodicē diuisum quæ sint consideranda.

Respirationis differentias omnes in tribus oppositionibus comprehenda.

Respirationis totius quæ sit differentia.

Spiritus frigidus ore & uariis prædictis, ad modum periculosus est. Breuitatem suam reuerberat in salutem summam.

Hippocrati iugmentum.

Spiritus densus quid significet.

Spiritus paruum & densum ut qui bus effectibus accedat.

*Spiritus densus
simul et magnus
quid reddatur*

*Organorum respi-
rationis dolente
aliquo, cor par-
uum, sed celeriter
agamus spiritus.*

*Febris calida
sum multum de-
sum spiritum reddi.*

*Peripneumonia -
cor spiritum est
parum & den-
sum.*

*Orthopnea
qualis comitatur
febrim.*

*Orthopnea la-
borans et curis
non spiratio re-
cta.*

*Respirationis
parum et rari
etiam ab organo
respirationis re-
spiratur.*

nis coactuato, spiritus densus simul & magnus
ageret: id quod indies in omnibus exurentibus
febris est conspicuū. Quare ignorandum nō
est Hippocratem, densum quidem & parū, dolo-
ri: spiritū autem densum & magnū, incendio
caliditatis tribuisse. Quemadmodū enim dolenti-
bus cruribus, progredi multū non possumus,
eodem modo ubi aliquod organū ex his quæ in-
ter respirandum mouentur, dolerit, parum re-
spirare cogimur, & citius desistere cupimus: quā
sic citius a dolore immunes reddamur. Ceterū
quāto citius quāto oportuit, motus respira-
tionis cohibetur, tantū ipsū animal defectuo-
sius est inspiratione recreatū. Quemadmodum
igitur si quis pauciores cibos, quā sit ex usu,
accipiat, hic statim aliorū ciborū opus habebit:
sic si quis minus quā expediens sit, inspirauerit,
is citius inspiratione indigebit: quæ ex occasi-
one spiritū densari cōtingit: id quod etiam sen-
tiens Hippocrates in libro de Vitiis ratione in
acutus morbis, ait. Sputū intrā retentum, prohi-
bet quidem spiritū intrō ferri, cogitque cum citō
expirari. Porro iuxta copiam eius quæ inspira-
tur, substantiæ, oportet magnitudinē ipsius re-
spirationis metiri. Reliqui autem Hippocrates
exemplum difficilis respirationis orire a dolore,
quod multis locis iam ipse duxit, actiones or-
ganorū a dolore impedi, quodq; illius cogniti-
o oppidoq; facili sit. Nec uerō tantū a dolore
& retento spiritui, oriiri densitas respirationis po-
test, sed uel maxime etiā ab incendio febris cali-
ditatis: cuius quidem est multū densumq; spiri-
tum reddere. Magnus spiritus, quantitate circa
singulas indicatur respirationes: multum uerō,
possibile est aliquando ex multis paruis coacer-
uari: ut uidere est in pleuritis, qui cum magnū
quidem spiritū semel ducere ob dolorem nō pos-
sint, quamuis ære largiori ob febrim opus ha-
beant, conuinitate tamen actionis, æquale mul-
titudinem spiritus magnis respirationibus colli-
gunt. Quod enim pauca magna, hoc multæ par-
uæ præstant. Similiter in peripneumonicis mul-
to est opus spiritui, uerū ob coarctationē loco-
rum parum inspiratur: quare densitas iacturam
paruæ inspirationis restatur. Quod autē in or-
thopneis paruis & densius ob coarctationem
fiat spiritus, haud scio an quisquam ignoret. Cæ-
terum omnes qui ob talem coarctationem fuisse
cipient inspirare nō possunt, aëtorosā faciliū
respirationem, & in suffocationis discrimen ue-
niunt, si decumbant: ob id rum totum thoracē,
tunc collum, eos rectū habere oportet, cum non
paruum auxilium ipsis ex huiusmodi figura ac-
cedat. Quippe ampliora simulq; longiora sic sunt
omnia respirationis organa, partim quidem per
rectam figuram in directam extenta, partim uerō
minus in sese cōcidere prohibita. Iam uerō re-
lecta etiam parua simul & rara respiratione, Hip-
pocrates frigide meminit, quod nimirū nō alta
sit parua simul & rara, alia uerō frigida. Nam
cum magna & densa ex immo derato calore col-
lecto in organis respirationis gignatur, necessa-
rio certe parua & rara (quæ illius contraria ex-
istit) his ipsis organis perfrigeratis oriatur. Si qui-
dem calida respiratio, cuius similiter meminit,

eadem est cum densa & magna, sub qua uideli-
cet cōprehenditur. Etenim spiritus frigidus, om-
nino paruus & rarus est: densum autē & magnū
indicare incendiū organorū respirationis, mi-
nimè sanè quis duxerit, nisi & ipse etiam esset
calidus. Solam uerō frigidam expirationē dixit
esse perniciosā Hippocrates, mortis nunciā,
quod perfrigerati respirationis organa planè sit
perniciosa, cum nimirū inter ea sit cor situm,
instit calorū fons & principium. At uehementis il-
lorum caliditas, aut dolor, aut desipientia, nō
omnino sunt perniciose, licet nō sint extra pericu-
lum. Nam si facilis respiratio ualde magnā uim
ad salutem habere putanda est, in omnibus acutis
morbis, qui cum febris sunt, & intra qua-
draginta dies iudicantur (quale documentū non
bus reliquit Hippocrates) iungit respirationes diffi-
ciles minimè uacabunt periculo. Verū quæ
iam morientibus accidunt, ut uidelicet ipsa expi-
ratio frigida, ea nullū magnū momentū in præ-
nonionibus habent. Est enim honorū medicorū
opus, non quæ iam idiotis apparent, præagere,
sed quæ ipsos latent, & cum nihil mali æger la-
bere putetur, cernuntur. At frigide respirationis
Hippocrates meminit, ut omnes respirandi diffi-
cultates complecteretur, & quod etiam magnæ
simul & dense ipsa opposita existeret. Porro in
Prænonionibus libro nihil de inæquali respiratione
difficultate scripsit nobis Hippocrates, quan-
doquidem propositū illi erat in prænonionibus
solum ea quæ uerē a cutore morborū propria
sunt, recensere: quæ uerō diuturnis propria es-
sent relinquere. Quare rationaliter etiam illi
inæqualem respirationis difficultatem, ex alio
morborū genere, consualioris uidelicet, procedentem, omisit. Acuti autē sunt morbi, qui om-
nino cum febris cōiunctionibus sunt: ut pleuritis,
peripneumonia, phrenitis, & febris æliana.
Nec meminit in prænonionibus de his respiran-
di difficultatibus, in quibus aut sola inspiratio,
aut sola exspiratio est magna: sicut nec uelocitas,
nec tardæ respirationes: quod ad quingiam di-
ctas difficultes respirationis differentias hæc om-
nes reduci possunt. Iam uerō exspiratio rara simul
& magna (id quod etiam docuit Hippocrates)
continuari oscitationis & signum & causā medi-
catoria existit. Nam cum oscitatio continua fiat
ob uaporosum quendam crassumq; spiritū in ge-
nere musculorū contentum, certè exspiratio que
rara est & magna, erit quidem signū, ut affectio-
nis in contrariū mutare: causā uerō medicato-
ria, quod contrariorū sint cōtraria remedia. Ete-
nim per talem expirationē spiritus diuinus colli-
bitus, quæ ratione singulus sanat, uidelicet alie-
na euacuando, eadem enim mederi oscitationi-
bus poterit. Quemadmodū autē ipsa detentio
spiritus superflua excernere potest, sic respiratio
continua, uenilare simul potest & exallescere
perfrigerata: exultans eorum & signū, & causā fa-
lubris. Iuxta hanc igitur rationē etiam in secundo
Morborū populari consulum Hippocrates,
ut quis perfrigerari essent, ex candentiam in
duceremus, & euocandi coloris, & sanguinis in
uasa subter curiculum colligendi gratia: tanq; fa-
ne innatū calorē excitare queat ex candentia.

*Expiratio frigi-
da quæ moris
nuncia.*

*Cor est instar ca-
loris fons et prin-
cipium.*

*Spiratio facilis,
ad salutem ma-
gnam uim obis
nat.*

*Medici optimi
morum quod sit.*

*Acuti morbi
sunt, qui omni-
no cum febris
cōiunctionibus
sunt.*

*Expiratio rara
simul et magna
continuari osci-
tationis signum
atq; medela esse
sibi.*

*Oscitationis cō-
tinua causa.*

*Contrarium
sunt contraria re-
media.*

*Spiritus diu-
initus, sanatur
singulis.*

*Exspiratio contin-
ua uenilare si
nulli potest ex-
callescere refriger-
ata.*

*Perfrigerati cor
fons excitandi ad
erum.*

*Ex candentia
innatū calorem
rouocari, & de-
suerem reddidit re-
spirationem.*

quæ quidem quod densior etiam omnino reddat respirationem, nemo ignorat. Vtemur itaque ipsam refrigerat, decolorat, gracilibusque, non tamen perpetuo, sed ex intervallis, & opportunis temporibus, ne uidebitur facultatem ualde lacdamus. Verum inuenio quod Hippocrates ait, spiritum frigidum ex naribus & ore prodeuntem, ualde perniciosum existere, id in morbis acutis intelligendum est. In alijs autem morbis, qui circa febrem consistunt, sæpe frigiditas totum animalis haberi apprehendit: & accidit quidem neque his extra periculum, non tamen penitus perniciofa. Ex his enim est strangulatio uteri, omnesque spiritus interceptiones, quæ mulieribus quidem assidue, uisum præferim, accidit: raro autem aliquando & uiris. In huiusmodi enim omnibus affectionibus, præ multitudine materis frigide, innatus calor opprimitur, ad similitudinem flammæ, quæ suffocatur multis humidis lignis obstruitur. Quare enim accendere quandoque possibile est hanc, ubi materiam expauerit. Aliquando tamen consumpta materia, necessarium etiam & ipsa extinguitur: quare in his qui per acutos morbos sic expirant, nulla spes salutis relinquatur.

Spiritus frigidus uix ex naribus effertur, in acutis tantum morbis esse perniciosis admodum.

Respiratio inueni non amans periculis per acutos spiritus spiritus quæ ratione cognoscitur.

Anhelosa respiratio unde proficitur.

Spiritus parui ex densis quæ ducitur.

Anhelosa, Sublimis spiritus.

Spiritus obsecutus, quibus sit malum.

Spiritus interitus, quibus sit malum, quibus sit malum, quibus sit malum.

Pulsus respiratorum non esse eundem, quibus sit malum, quibus sit malum, quibus sit malum.

Quod autem in spiritibus interceptionibus non omnino respiratio perierit, licet minimus transmissus spiritus per illas trahatur, hinc cognoscitur manifestissime, quod si aut pulu, aut tenuissimam lanam, ægri prætentans naribus, illam moueri percipies. Atque in affectibus sanæ id genus omnibus. Spiritus densus, causa simulque signum salubre existit: quemadmodum connuati oscitationum, expiratio rara simul & magna. At uero anhelosa respiratio, quæ & densum spiritum facit, & thoracem nimis distendit, oritur aliquando quidem in affectibus multa inspiratione indigentibus. Fit tamen interdum à cursu, aut ab alio quocunque exercitio improbo. Eiusmodi etiam spiritus accidit in omnibus ardentibus febribus: & quando obturatio, aut compressio, aut coarctatio, instrumenta respirationis infestant. In inuicem autem, quando aut tumor, aut dolor quipsi, in partibus iuxta illa consistit, paruus & densus necessarium spiritus ducitur. Porro spiritum impense densum, anhelatione consuevit uocare Hippocrates: quemadmodum & sublimem eum, qui paruus simul & densus fuerit, qualis in anginis percipitur. At obsecutus spiritus aut esse rabelentibus malum, sicuti & non parientibus. Etenim non parientes mulieres (sunt autem hæc omnino quæ non probe purgant) maxime à spiritibus interceptionibus apprehenduntur: perinde ut illæ, quæ ducuntur sunt uis. Quare spiritus qui conspicui & insignes non sunt, eos obscuros nominat. Ac sermo de respiratione difficili suum iam lucem fortiaur.

GALENI PERGAMENTI

de pulsum 7^{mo}, lib. 7^{mo}.



On esse eundem quom pulsus & respirationis, eodem quom medici existimant, certe rationibus his quipsi ostendere possunt. Primum nam respirationem si cui adimas, illico morietur alicui. At pulsus si complures particulas priues, non magnopere lædes. Quippe si uel arterias quæ

per inguina descendunt ad crura, uel quæ per alas ferunt à manus, laqueo cōplecti uelis, uniuersas quidem, quæ in his artibus sunt, arterias pulsu priuabis: non tamē artibus ipsis aut mortu adimere uoluntariū, aut sensum. Ad hæc si ipsas quæ in collo sunt arterias uinculo exceperis, nullā eundem noxiā animalī artuleris: tamen cor cum cerebro, princeps scilicet instrumentū actionū uitalium, cum principe animalū, cōnectant. Si igitur cum sint læsæ arteriæ, rubil tamen officium, cōstat utique & cum ualentibus, nihil eas cōferre. At si obsequamus illi qui arteriarum usum sic negat, nos maxime præcagere ex pulsū: id minime quidem fieri ut ex causis id genus, quæ plurimum habent momenti, sed ut ex opportunis signis, responsum dabit: ut si quis mortem ex incur uis uingibus nigricantibus coniecit. Cor si quidem princeps uiscus existere, ex quo omnes arteriæ oriuntur: ac proinde eas eundem cum illo tunc serare, offendit similiter, atque ita non exiguæ rei indices esse possent. Ad maior medicorum argumēta philosophorū pars, inde eundem utriusque morbus esse usum existimant, quod uterque similes ipsorum ex causis mutationes accipiat. Nam & qui exercitant, & qui in balneo lauantur, & qui aliter quouis modo ex caluio, eorū nō modō respirationem celeriorē frequenteremque ac maiorē cōrueri licet, sed pulsus etiam pari modo mutatos.

Præterea qui algent, aliterque quolibet modo perfrigerant sunt, horum sicuti respiratione rarior, rarior, ac minor uisitur, ita & pulsus. Similiter qui urentibus prelitus sunt febribus, ut maxime ijs & celerimē densissimēque respirant, sic etiam maxime, densissimē, & uelocissimē, quæ pulsant arteriæ. Quod si ab immodica repletionē pulsus sentiant maiores, respirationes minores, ne id quidem sermo hunc reddat ambiguum. Quippe minores tamen respiratū quom pulsū idcirco habent, quod angustus transuerso eorum septo super sit locus. Ceterū quantū minores, tantū hunc & crebriorē habent: scilicet respirandi paruitatem, assidue uisus eius ope penitantes. Ideoque tantūdem minor simul & frequenter respiratio potest, quantū maior simul atque infrequenter. Dicuntur autem hoc loco rationē pulsū eum qui cōmestioni succedit, non utique cum eo qui cōmestioni præcedit comparantes (quippe quo est frequenter) sed ad respirationis speciem referentes. Igitur si respiratio pari cum pulsū modo, ipsidem ex causis mutatur, non tamen eandem noxiā, cum perit, asserit, hoc utique hinc etiam colligere opposita: nempe tum ambo morbi à natura eundem usus gratia esse datos, tum nō eundem: id quod est impossibile. Itaque nobis inuestigandum est, quæ parte alteri rationum claudat, ipso respiratorum usu pro norma nobis proposito. Qui quidem duplex existit: nempe alter qui maior est, insit calidius custodia: alter qui minor, animalis spiritus nutricao: in quorum utroque ex attractio per nates spiritum accedere

Nervus uix interceptus, partes in quas feruntur sunt defectus motus simul ex sensu.

Præcagere ex pulsibus suum.

Cor esse arteria non originem.

Pulsus ex respiratione unde colliguntur esse rationes eundemque.

Respiratio ex pulsibus ipsam ex causis mutationem similes recipiunt.

Repletionem immodicam reddunt pulsus quidem maiores, respirationes autem minores atque crebriores.

Respirationem ipsam esse duplicem: unam calidius custodiam, alteri animalis spiritus nutricao.

*Cerebrum fuit
respiratio per
aures.*

*Respirationem ple-
rū fieri à caroti-
dibus ad basin
coloris consuela-
ta.*

*Spiritus ani-
malis rechaer-
ri per violentas
motus.*

*Corpus univer-
sum esse spiritus
spirabile & flu-
abile.*

*Flammā extingui
quā alio sub co-
curritur medio
validius.*

*Respiratio sola,
cordis calorem
tuetur.*

*Calorem costellae
reliquas partē cor-
poris duplex.*

*Calorem à cor-
de membris acū
demitti per ve-
nas.*

*Respirationem et
præter est usum
vitæ.*

*Pulsus est datus
caloris firmandi
gratia.*

accedere cerebro utilitate dicimus. Id quod ni-
deri possit in causa, ut carotidibus arteriis (quæ
sanguine calido & halituoso plenas, cum per-
teant ad cerebrum, antequam duram eius mem-
branam transferant, iuxta ipsius cerebri basim
multis ac variis plexibus inuoluitur, admirandum
quoddam rete faciunt: ut quemadmodum in
ustorum testium resolutionibus semen, atq[ue]
in uoluminibus interituum chylus, ita in eo
sanguis ille dilutus laxatus, perfectissime elabo-
retur, additque simul animalis qui in cerebro est spi-
ritui, alimentum copiosum.) iunculo exceptis,
per diem integrum animal sine noxa perderet.
Quamquam certe si cogatur tale animal curre-
re, diu quidem id facit probe, postea uero fati-
scit, atq[ue] elanguescit: cum nimirum illa animalia
spiritus, quo pleni sunt uentriculi cerebri, assiduè
nutriti possunt, absumantur per uoluntarias,
præcipueq[ue] uoluntas, motus. Cæterum
si animal quiescat, quousq[ue] commercium cum cor-
de sit interceptum cerebro, satisfacere tamen ei
diu textus ille reticularis potest, seu animalis spi-
ritui in motum uoluntarium minimè tum con-
sumpto. Mirum autem esse nō debet, si alicuius
partis haud omnino pereat caliditas, etiam si at-
terit illius uinculo confringatur. Nam cum
totum corpus sit sibi conspirabile & fluxile, cer-
tè si non per arterias, at per alia, & præcipue per
uenas, propter eam qui est de una in alteram
transitum, in omnē particulam deferretur à cor-
de calor aliquid. Nec uero simile est, ut insiti
caloris principium pati, aut aliquid eorum quæ
ab illo calorem accipiunt. Id siquidem semper ter-
uer est opus, ut quod tum cæteris pulsantibus
præstat, tum ea caliditas: his autem ad salutē est
fatia, si nō omnino sit frigida. Nec mirari præ-
terea debemus, si principium ipsum, ubi respiratio
ne priuatur, plus quam cætera uoxæ contrahit:
quippe sub cucurbitulis medicinalibus flamma
illico exstinguitur. Nam uero si cor nudatū refrige-
ret, celerrimè perit animal: si calidū seruet, pari-
tur nihil. Quod si corde refrigerato, ac propte-
rea animali iam mortuo, in alterutrum uentriculo
rum eius, & præcipue in sinistrum, inseras digi-
tum, magnū inibi calorem deprehendes, longeq[ue]
maiorem quam in alijs sit partibus, dummodo
pro naturæ modo se habeant. Siquidem ut par
hæc caloris portio cordi sit minima, sic reliquis
partibus omnino est magna. Proinde ubi quod
pro naturæ modo est, non seruat, cordis qui-
dem calor, qui ueluti flamma est, perit: reliquorū
calor longo tempore durat. Porro illi sola respi-
ratio calorem tuetur. Alijs autem partibus du-
plex eius custodia est: pulsus uidelicet, qui ueluti
quedam est respiratio: & quod ex abundantiore
naturæ gratia accedit, quæ ad eum cōsistit. Quod
autē nō solum per arterias, sed etiam per uenas
confuit à corde calor, hinc colligere licet, quod
quibus ex uinculo excepte fuerint, eo uulnera,
partes in quas ferebantur, fuerint perfrigeratæ.
Cuius igitur nihil iam aduersari uideat, quo mi-
nus respiratio nō & pulsuum usus, finisq[ue]
sit, facitè promptumq[ue] collectu arbitror, caloris
in quaq[ue] parte custodiendi gratia pulsuum condi-
tum esse: atq[ue] ita, quod ex respiratio uni pre-

statut cordi, id ex pulsu calori illi qui in toto est
animali, accedere: cōmunem uero utriusq[ue] esse,
& animalis spiritus nutritionem: magis tamen
arteriarū propriam. Quoniam igitur in nā quæ
de respirationis usu tradidimus, nobis monstra-
tum est, natūū calorem per inspirationē quidem
refrigerari: per expirationē autem purgari, sumi-
do scilicet extremū ex cufio: ambas uero actio-
nes ad eius custodiam conferre aliquid utile: pa-
ter arbitror, quod in pulsu etiam idem dicendū
erit: nempe in dextræ arteriæ, substantiā quam-
piam attrahi: in systole, q[ue] ex humorū deuti-
one in toto animali contractum est, ueluti fumi-
da superfluitas, expelli. Verū quemadmodū &
fauces, & pulmones, & uniuersum pectus, dum
recipiunt spiritū dilatantur: itidem arterias, quo-
traliunt tempore, dilatari oportet, non quo spi-
ritum reddunt, ut existimant Archigenes. Quin
& quies illa quæ arteriarum contractioni succe-
dit, cum multo maior sit ea quæ dilatationē se-
quitur, sicuti quæ inspirationē præcedat, ea quæ
superuenit illi: ostendit sanè, etiam secundū hoc
esse quandam similitudinem inter ipsam respi-
rationem & pulsū. Cuiusmodi enim institumē-
tia spiritus res inspiratio est, eiusmodi arteriæ di-
latatio existit. Et cuiusmodi est illis emissio spi-
ritus, eiusmodi est arteriæ contractio. Cuius
quidem duplicis & compositi arteriarū motus,
quod nominamus pulsū, autor & origo est cor.
Cæterum cum uis illa, unde cor contrahitur di-
latatur, in omnes arterias per tunicas earū in-
fluxu, ea cogat apeririq[ue], quemadmodū ipsum
cor: utiq[ue] sicut illud dum dilatur, ea quæ oscu-
lis suis appropinquat, trahit: cum contrahitur,
expellit: sic & arteriæ, cum se perueniunt, ad se un-
disq[ue] trahunt, cum contrahuntur, iū omnem par-
tem expellunt, uidelicet per uniuersos meatus,
quibus in intestina, uentriculum, uniuersam fan-
tum, atq[ue] adeo in uenas se aperit. Quippe si a-
nimali alicui, ex ipis quibus arteriæ sunt amplæ,
magnas multasq[ue] arterias quis uulneret, unus-
sum per eas sanguinē euacuat. Sunt itaq[ue] arte-
riæ & uenis cōmuna oscula, per quæ quidem,
dum dilatantur arteriæ, ex uenis trahūt: in eas,
dum contrahuntur, reuertūt. Sicuti nimirū per ora
quæ in cutem finiunt, quicquid halituosum fu-
midumq[ue] excrementū habet, excernūt: recipiūt
autē ex aëre ambiente, nō exiguum in se portio-
nem, per aliaq[ue] spiramenta similiter. At à corde
quidem accipiūt plus: reddūt autē ei minus, pro-
pter membranas illas, quæ in earū superna na-
scentur parte: quāq[ue] certè aliquid impertiunt.
Iam uero cum sanguis in arterijs, etiā rectè se ha-
bente animalis, contrahat: manifestū est non ideo
dilatari arterias, quod spiritu profecto à corde
impleant: sed potius ob id impleri, quod dilatantur.
Quippe si essent sanguine uacui, fieri fortissi-
me posset, ut exiguū tempore, quod à corde con-
fluit, ad fines earū perueniret: sanguinē uero in
se habentibus, fieri omnino nequit, ut motus ce-
leritas cum ea dilatatione cōsentiant, quæ ex ipis
cordis implendis proveniat. Arterie itaq[ue] seipsas
mouēt, uicissim se attolūt: summū est: itaq[ue]
eadē qua cor ui: qui scilicet ab ipso corde oriū,
per tunicas earū transmitti diximus. Est enim ut

*Animalia spiri-
tus nutritionem
esse motus cō-
munes respi-
ratio & pul-
sus.*

*Calorem inna-
tum refrigerari
per inspirationē
ad, purgari autē
per expirationē*

*Dilatatio arteria-
rum substantiā
spiritus attrahi,
systole expelli fa-
cilius.*

*Arteria dilatari
tur dum in trahit
spiritum.*

*Pulsus & respi-
ratio similitudo.*

*Cor est principium
compositi
arteriarum mo-
tus.*

*Pulsus sicut san-
guis à corde in-
fluxu arterias,
per ipsarum tu-
nicas subtiliter
trahit.*

*Arteria trahit,
dum dilatatur,
expellit cū con-
trahitur.*

*Arterias traho-
re à uenis, & in
illas pulsare per
cōmuna oscu-
la.*

*Arterias parum
cordis fere reu-
ere.*

*Sanguinem cō-
ueni in arterijs.*

*Arterias nō quia
implentur dilata-
tione, sed quia
dilatantur im-
pleantur.*

*Arteria seipsa
mouet, eadem
qua cor facit*

Aspirationem esse opus animum potius; pulsum, vitale.

Diastole est enim arteriarum alluacum.

Expiratio est alius respirio.

Systole naturalem esse relaxationem aliam.

Systole respiratoria, quae est aliam proportionem respicienda.

In quibus arteria diastole & systole qualis. Calor per similitudinem ad internam convertitur.

Per se respiratio & systole excedens. Sensus systole tardior.

Pulsus a quibus maiori pulsi.

Molles tunicae quando sunt egredientes ad motum & quando tardiores dantur.

respirationis uis animalis, quae a cerebro proficiscitur, sic pulsum uitalis facultas, quae a corde emanat, efficitur. Porro uicem, animal uita iam functo, simulac uicem sunt sanguine, proflus in seipsas fidunt, ita ut suprema earum tunica pars, cōmittatur cum inferiore arterie, partibus diuisis dentibus nunquā nō conspicunt: quod sanē propter alteram earum tunicam, quae dura est, euenit. Quod autē nō modō diastole, sed diastole sit etiam actio arteriarum, contrā quā nōnulli arbitrantur, admodum perspicuū uidetur: cum nimirū ipsa diastole sub uirum robore magna sit: sicut ē diuerso parua, sub facultate imbecilla. Ad haec, si quemadmodū expiratio, sed diastole actionis esset remissio, utique nec intensio in ea, nec remissio, sicut nec in spiritus emissionē, perciperent: nec omnino robur & uehementia ictus, quae percipiuntur. Diastole itaq; mihi ex genere actionū uidetur. Deinceps considerandum, an sicut expiratio remissio actionis thoracis est, atq; ita cessatio quaedam: emissio uero actio, atq; idcirco intensioem & remissionē admittens, quod expiratio non facit: sic systole in pulsibus relaxatio sit arteriarū operis, aliaq; huic annexa inuentia, quae emissioem respōdeat, actio. Ac mihi id quoque uidet esse uerissimū. Etenim rationale est, ubi ex humorū deussione collectus fuliginosus uapor plurimus fuerit, tum animal efflatū appetere. Contrā cum uel ob succi temperiē, uel caloris mediocritatē, nihil talis excrementi colligit, tum expirationē duntaxat. In arterijs quoq; ubi tale excrementū redundat, similem efflatū systolem edī. Reliquas, cum id quod ex ipsis uacuat, halitus q̄ fumo est similis. Quōbrem ipsi qui se ingurgitant cibo, per somnū sit remissio: quidem diastole, systole autē intensior: quippe tunc intro magis q̄ foras naturalē calorem se conferrent: eoy enī circa uiscera & uentrem, qui succos & cibos cōcoquant, iam plurimo collecto, necessum est excrementū, quoniam id quoq; copiosius gignit, naturalem uacuationē desiderare. Proinde expiratio quidē maior, & perspicua cum emissio ne perficitur: cōtrā actio autē arterie, illi proportionē respōdens. Similiter ambre & in pueris excellunt, quod sit in eis uehementis propter incrementū concoctio. Contrā senum aetas tardior & minor uidet habere systolen, utpote minus necessariā, cum & imbecillior cōcoquant, & minime succos cōficiant. Ad proportionē horū omnium, tum a huius tempus, tum regio, tum omnis uero uerbo circūdantis aëris ad frigus & calorem mutatio, pulsus alterare uident. Pari modo & animi affectus omnes, & uitae fortēs, & morbi, arteriarū motum introitus extrorsus ue promouent. Qui uero iniquant, arterias nō agendo aliquid, celerius intensusq; descendere: sed propter tunicarū mollietatem, ubi a diastole dimittuntur, & ulterius & celerius, q̄ duras, in seipsas recidere: facile redargui possunt. Quippe faciliores ad motus erūt molles tunicae, cum scilicet facultates ipse aliquid per eas mouent, utpote sic magis eas obsequentes. Dum uero postq̄ ab his sunt mota, rursum permittunt ad statum propriū reducere, tum unq; durs, q̄ molles, ob impetū, robur & firmitudinē suae constitutionis, reuertunt mul-

tō celerius: quemadmodū grandiores arbores, quae ut cum renua trahuntur, sic dimissae, reuertuntur celerimē. Diximus igitur, & quod pulsus naturalis qui per totum corpus diffunditur, calorū gratia fit conditus: & quod dilatare arteria, is calor refrigeretur, contracta rursus purgetur: & quod motus hi, spiritus moribus omnino sint similes: & q̄ animalis spiritus cōducant: & q̄ una reuānt, respiratio & pulsus distindit, nēpe quod illa ab animalis facultate, hic a uitali oriat.

GALENI PERGAMENI

introducō in pulsus.



Nierse arterie pulsum habent nō modō sibi inter se, uerumetiam cordi ipsi permixti, adeo ut ex una ipsarū positis de reliquis iudiciū facere: nō tamen motū omnium squabuliter sentias, sed earū quidem quae partibus ex carnibus insunt, clarius: quae uero in carnosiss, obcurius: quae autē carne multa integuntur, aut intra ossa sunt, & interna parte corporis, ex perpetuo motu sensibili praeclatē sunt. Verū neq; expeditius, neq; honestius, nec si usum species, maiori cōmodo aliam attingeris, si eas quae in carnis sunt praeclatē, & quod maxime perspicue & explicitē sint, & secundum rectitudinem sit.

De quantitate dilatarionis.

Tibi autē tangenti, arteria sentitur in omnē dimensionē extendi. At dimensionēs corporum omnium sunt tres: in longū scilicet, latum, & profundum. Ceterū cum animal secundum naturā habet, cōpries arteriam moderate admodū dilatare: cum autem cōtrā prae naturam habet, interdum secundum quamuis dimensionē partim minuitur, partim exuperat. Quo casu memoria tenere oportet, cuiusmodi pulsus naturalis extierat. Tum si is qui est prae naturā, auctus latitudine inueniatur, latū: sin longitudine, longum: si profunditate, altum appellare. Ad portionem & nō contrarios, qui uidelicet naturali sunt minores, angustum, breuem, atq; humilem uocabis. Pulsū uero secundum omnē dimensionē in statum prae naturā traductorū, qui undiq; est diminutus, paruus: qui auctus undiq; est, magnus nuncupatur. Atq; hic pulsus sunt in dilatarionis quantitate differentie.

De morus qualitate.

Proprie morus differentie sunt, celeritas & tarditas: quarum illa quidem, motus quidam est concitatus, haec autem exolitus: quas ita demū diiudicabimus, si eas ad motum naturalem cōparauerimus. In occurssu porro qualitate, languor ac uehementia consistunt. Ceterū durities atq; molliēs, tunicae ipsius arterie sunt qualitates: minime autem propriam pulsus differentiam cōstituant, licet eo percipiuntur. Tres igitur has differentias pulsū, & praeterea quartam illam quae in magnitudine erat & paruitate, in percussione arterie reperies.

Pulsus nō.

Respiratio & pulsus quando differant.

Pulsus habent ex omni arteria fons.

Pulsus non a qualitate percipi in arterijs omnes.

Arteria sensibilia pulsum ad dant.

Corporum arteria est omnis apertissima, ut tangatur.

Arteria in omnem dimensionem extenditur. Diuersitas corporum est tres.

Pulsus, qui natura, medium excessus sunt, de quibus dicitur talia.

Pulsus celeritas quod. Tarditas.

Languor pulsus. Vehement.

Pulsus duritiam atq; molliem, ad tunicam arteriae referunt.

De tempore quietis.
Quintā autē aliam numerabis, quæ est in intermissione, quæ inter percussiones intercedit. Voco enim percussiones, cum arteria tactu nostro occurrat intermissione autem, quietem quæ inter duas percussiones intercedit: secundum quam, frequens, rarus, atque inter utrumque medius pulsus iudicatur: quo in medio pulsus secundum naturam consistunt. Porro omnes huius temporis etiam quantitate dijudicant. Nam frequens dicitur, cum quietis tempus breue fuerit: rarus, cum diuturnum. Non facit autem alienum, si tyronibus contractio arterie ponatur esse insensibilis.

De æqualitate atque inæqualitate.

Æqualitas autem et inæqualitas in dictis omnibus differentiis inueniuntur. Nam ubi in illis ordine se consequuntur est æqualitas ac similitudo, æqualitatem tunc uocamus. Verbi gratia, si pulsuum ordine subsequenter magnitudo fuerit æqualis, ibi tum pulsuum in magnitudine æqualem dicere possumus: sin in celeritate, celeritate æqualem. Ad eundem etiam modum in uehementia, frequentia, & languore. In æqualitate porro, æqualitatis est labes, in qua uisum differentia ipsa accidit.

De pulsui ordinato inordinatoque.

Nonnunquam autē & post certam quandā percussionū numero præfixarū seriem, pulsibus æqualibus inæqualis unus intercedit, idque multis modis. Nam tres æquales, quartus inæqualis subsequitur, seruaturque id deinceps uno tenore: aut quatuor, quintus: pari modo & in omni alio numero. In quibus certe omnibus æqualitas non seruatur, ob eamque causam pulsus fit inæqualis. Quia uero certā quædam series seruatur, ob id ordinatus uocatur. Quæ certa periodos si minime seruaretur, pulsus ite diceret etiam inordinatus.

De inæqualitate quæ in uisum pulsus accidit.

Accidit autē & in uisum inæqualitas, tum partibus arteriæ situ & motu inter se dissidentibus, tum cuiusque pulsus motu sibi ipsi uon consentiente. Inæqualitas igitur in partium situ accidit, cum arteria ipsa à propria sede traducitur. In motu autem, cum arteriæ uelocius aut tardius, tempestiuus aut serius, uehementius aut languidius, tempore diuturniore aut breuiore, assidue aut penitus nihil, mouentur. At in singulis pulsus partibus est inæqualitas, cum pulsus est interitus, repetitur. Præterea cum motu celeritatem eandem, aut uehementiam, aut languorem, aut magnitudinem, aut paruitatem non seruat. Sunt igitur hæ simplices inæqualitates.

De pulsuum in æqualitate composita.

Compositæ autē fuerint, quatenus licuerit alteram alteri, ac singulas singulis, aut unam pluribus, aut plures pluribus copulari. Quarū nonnullæ quidem sæpe sunt propriam applicationem: quænammodi pulsus uermicans, formicans, & hæbicus. Vermicans quidem, cum arteria uelut reptantē uermem, atque fluctus instar subilientē nobis repræsentat, non autē tota ipsa uno tempore dilataris. Ceteri si cum exigua dilatare acciderit, uermicans: sin cum magna, fluctuosus simpliciter appellat. Persipicui autē est, quæ uermi-

cans pulsus, languidus est & frequens. Qui uero languidus summè fuerit, frequens ac paruus, in formicans cognominabitur: qui tameti celeritate præ se ferat, non tamē est reuera celer. Hæbicus uero, quo modo febris, ita pulsus quocumque nuncupat, quod nihil magnopere immutat, sed perpetuo sui similes, coheret, ac nunquam solutus permaneat, utpote toto corporis habitu in febris eiusmodi ac pulsibus, in statu morbo suo mutato. Vt igitur quæ sunt dicta, denudē in memoriā reuocem: Pulsus magnus est, qui fit cum arteria multū in longū, latū, & profundū diducit. Longus, cum in longitudine rariū. Larus, cum in latitudine. Altus, cum in profunditate. Mollis, in quo arterie tunica blanda est ac tenera. Celer, qui fit dum arteria exquo tempore dilatat. Frequens, cum paruo interposito repetit. Aequalis, qui serie continua sibi est æqualis. Ordinatus, qui singulis periodicis est æqualis. Qui uero in una percussione est inæqualis, in una percussione dicitur inæqualis. Pulsus omnibus his contrarij, satis sunt perspicui. Liquet præterea, quod aliorū contrariorū omnium unus est medius: æqualis uero & inæqualis, uallus est medius: sicut nec ordinati, & inordinati: quod id illorū quidem omnium mediū ipsi sunt secundū naturā, in his uero solus æqualis & ordinatus.

De causis pulsuum.

Cum ab omni causa pulsus mutari soleant, triplicem & generalissimam mutationis ipsorū differentiam statuo. Ac prima quidem mutatio, naturalis existit: secundā uero naturalis, quæ non uoluntate præter naturā: tertiā denique præter naturā. Verū omnes hæ mutationes, differentias naturales se quuntur. Arteriæ siquidem, alij aliter natura mouentur. Proinde primas eas illi esse exploratas oportet, qui uelit dignoscere, à qua causa, & qua tenus pulsus ipsum mutari esse cõgnerit. Primum autē cuiusque pulsus experientia cetero didicerit: ob idque arteriā tangere sæpe cõuenit, potissimū quidē perfecte sanæ, ac dum ab omni uehementi motu quiescit: post autē, & in ipsis affectibus. At cum fieri nequeat ut pulsus omnium experientia explorent, ceteri artifex plurimū poterit, si eorum quæ multis passim similiter insunt, scientiam sibi cõpararit. Nam cõmunio quædam naturæ uiris inter se est, quemadmodum etiam mulieribus: quam quæ probè calluerit, à recto aberrare non poterit. Ac uiri sane in uniuersum mulieribus pulsuum habent maiorem multo, uehementior emig: ceterum tardiores paulo, ac longè rariorem. Qui natura sunt calidiores, huiusmodi pulsuum habent maiorem & celeriorē, ac longè frequentiorē, non multo tamen uehementiorē. Qui autē natura sunt graciliores, maiorem quidem, ac longè rariorem, uerum non multo uehementiorē. Mutatur uero pulsus, & per ætates. Puero recens in lucem edito, pulsus frequentior est, facili senari rarior. Qui uero ætate sunt inter hos media, huiusmodi pulsus ad portionē respondent, prout scilicet propius ad pueri aut senis ætatem accesserint. Pari modo puero quidem celerissimus est, seni uero tardissimus: mediū me dix ætates sortiuntur. Cæterum inter ætates,

Formicans pulsus quo dicitur.
Vermicans pulsus non est celer.
Hæbicus pulsus

Pulsus magnus
Longus.
Larus.
Altus.
Mollis.
Celer.
Frequens.
Aequalis.
Ordinatus.

Pulsus inter æqualem et inæqualem modum ut modum sicut neque inter ordinatum et inordinatum.

Pulsuum mutationis differentia triplex.

Pulsus cuiusque propriam experientiam cognoscere.

Pulsus rariorem.

Pulsus calidioris.

Pulsus gracilioris.

Pulsus infansculi.
Pulsus senis.

Pulsus dici frequens, rarus, & modicus, pro ratione quietis intercedentis systolem & diastolem.

Æqualitas pulsus quomodo in dictis reuocet.

Inæqualitas pulsus quid.

Pulsus ordinatus, inordinatusque quomodo discernendum.

Inæqualitas in uisum pulsus quomodo accidit.

Inæqualitas simpliciter pulsus.

Inæqualitas composita pulsus.

Vermicans pulsus quando accidit.

Fluctuosus pulsus.

Pulsus florentiū.

maximus florentiū est pulsus: minimus autē senum: medius inter ipsos puerorū, est paulo maior. Præterea florentium quidem uehementissimus, senum autem languidus, puerorum denique medius. Sed per anni tempora pulsus etiam mutantur. Si quidem vere medio, pulsus sunt maximus & uehementissimi, celeritate uero & frequentia, moderati. Pariter etiam & autūno medio se habent. At progrediente vere, magnitudo quidem ac uehementia ipsius minuuntur: augeatur autē celeritas & frequentia: ac tandem ubi æstas aduenit, sūt languidi, parui, celeres, ac frequentes. Autūno uero progrediente, omnia minuantur, magnitudo, uehementia, celeritas, & frequentia: ut cum hyems accesserit, iam sunt pulsus in paruitate, languorem, tarditatem, ac raritatem mutati. Porro ut veris initium, autumni exitus: ita ueris exitus, autumni initio respondet. Tum quemadmodum æstatis initium, æstatis exitus: sic hyemis initium, hyemis exitui respōdet. Proinde quæ ab æstate media, hyeme media, in utranque partem distant, eandem aequaliter pulsus immutant. At æstas media, partim hyeme media est similis, partim dissimilis. In utraque enim pulsus sunt parui, ac languidi: æstas tamen sunt celeres, ac frequentes: hyeme uero tardi, ac rari. Non tamen pulsus parui pariter hyeme atque æstate, sed æstate minus: nec pariter hyeme atque æstate languent, sed minus hyeme. Mutantur & per regiones pulsus, per se alias constitutiones æris ambientis. In calidis quippe, tales reddunt pulsus, quales est æstate media: in ualde frigidis, quales hyeme media: in temperatis, quales vere medio: quæ uero inter has sunt mediæ, ad portionem se habent. Mulieribus utero genibus, pulsus sunt maiores, frequentiores, ac celeriores: cetera uero modū suum naturalem retinent. Somnus etiam permutat pulsus. Nam principio quidem minores ipsi, tardiores, rariorem, & languidiorē efficit: procedente uero tempore, tarditatem iungit, & raritatem, idque præcipue post cibum. Maior autem fit tuus & uehementior. Quod si diuturnior in fuerit, rursus in languorem mutatur ac paruitatē: tarditatem autē & raritatem retinet. Qui a somno sunt excitati, protinus quidē ipsi pulsus sunt magni, uehementes, celeres, frequentes, & turbati quodammodo. uerum non ita multum post, reuertuntur ad mediocritatē. Quod uero si status corporis acquisitio pertinet, non aliter ē, quā naturalis, pulsus immutant. Quando quidem qui natura erat gracilis, sicut postea quadratus (quod Græci *διπλαρ* uocant) pulsus habet ei, qui talis natura est, similem: de ceterisque parti iudicio. Corporis quoque temperamenta & constitutiones, haud secus quā naturalia, pulsus immutant. Inter causas autē non naturales, incipientes quidem excitationes, quousque ad mediocritatem peruenerint, pulsus uehementiores efficiunt, magnos, celeres, ac frequentes. Si quis uero multo ac supra uires laboret, paruos, languidos, celeres, ac frequentissimos. Sin modū plurimum excesserit, adeo ut uires sint exolutæ magnopere, paruos admodum, languidos, tardos, & raros pulsus habebit. Quod si uero uirum progrediā dissolutionē, pulsus habebit uirum

dissolutarium proprios. Balneorū quæ moderate calida sunt, magnos, celeres, frequentes ac uehementes: quæ uero immodice, paruos ac languidos, præterea celeres & frequentes pulsus efficiunt. Quod si ibi non cessetur, paruos & tardos, raros, & languidos. Quæ autē frigida sunt, repente quidem paruos & tardos, raros & rariore pulsus reddunt: post autē sunt stuporē, aut robur inducunt. Quod si refrigerariet, stuporem inducunt, paruos ac languidos, tardos & raros: in calorem conciliant & robur, magnos quidem ac uehementes, celeritate tamen ac frequentia moderatos efficiunt. Copiosior cibus, qui ut uinci possit, pulsus inæquales iuxta & inordinatos efficit: moderatus autē, magnos, uehementes, celeres, atque frequentes: parior, qui sit ex usu, minorem & breuiorē pulsus mutationē efficit. Vinū, ceterā quidem, ciborū instar, pulsus immutat: in eo tamen differt, quod repente immutat, quodque raro quæ ab eo proficiunt, citius desinat, quæ a cibo proveniunt: ac denique quod celeritatem magis augeat & magnitudinē, quā uehementiam & frequentiam. Aquæ omnium quæ sumunt, mutationē minimā efficit: mutat tamen & ipsa ad portionē ciborū. Reliqua uero omnia, quantum possunt aut alere, aut callescere, aut refrigerare, tantū arteriarum motū immutauit. At æris constitutiones, ac ciborū copia tanta, ut uires opprimat: præterea exercitationes, balnea, & somni, ubi modū excedunt, omnia sunt præter naturā. Nam cūque uires naturales & non naturales diximus, quantitas excessus erudit in causas præter naturā. Causarū uero quæ non quantitate modo, uerum etiam genere sunt præter naturā, numerus est infinitus. Porro casuali omnium præter naturā, alix quidem uires utiles ueluti soluti & dissipant: alix autē uires ueluti premunt & grauāt. Ac soluti quidē, alimentum inopia, morborū malignitas, eorumque aut diu tenuitas, aut uehementia: præterea affectus animi immodici, necnō uacuationes immoderate. Opprimunt autē, tum ipsa materie copia, tum instrumentorū affectus: inflammationes uidelicet, scirrhi, tumores, moles, abscessus, & corruptiones uariæ. Solutæ itaque uires, paruuli, languidi, ac ualde frequentē pulsus efficiunt: pressæ uero, pulsus mutant, cum in reliquum omnē inæqualitatē, & ordinis cōsusionē, tum in eam quæ in uehementia spectat, & magnitudine: nam inæqualitates hæc, opprellarū uirū maxime propriæ existunt. Quinetiam in eiusmodi affectibus, motus quidam suaditus pereit, aut intercidunt. Ceterū qui in tercidunt, minores: qui pereunt, maiores læsionem indicat. Solutarū igitur ob alimentum inopia uirū, pulsus uertuntur principio quidem, in languorem, paruitatē, celeritatem, ac frequentiam: ad mediū autē, in languorem, paruitatē, tarditatem, & raritatem: postremo in paruitatem summā, languorem, frequentiam, & eminentiam celeritatis imaginem: qui pulsus est, quem formicantē appellant. Vermicis autem pulsus, sit quoque & ipse uiribus iam dissolutis, sed aliquantū adhuc resistentibus: in eo qui formicantē dicebat, quod non indem in summū languorem ac paruitatē reductus sit, tum quod peripicuum habet in uno iectu inæqualitatem, quæ sit, dum partes moueri tempe-

Pulsus differentia pro balnearum diversitate

Pulsus differentia pro modo cibi assumps.

Vinū qualiter pulsus immutat.

Aqua quomodo pulsus immutat.

Immodica omnia esse præter naturam.

Causarū præter naturam diversitas.

Vitalium facultatem solutaria.

Vitalium facultatem quæ opprimant.

Pulsus facultati solutaria.

Pulsus facultati opprimit.

Pulsus facultati solutaria ob aliam mentis inopiam.

Formicant pulsum. Vermicant pulsum.

Pulsus differentia secundum diuersa tempora.

Pulsus differentia pro diversitate regionum.

Pulsus generis utero.

Pulsus dormientium.

Pulsus experientium ab æstas ad hyemem.

Pulsus mutari ab acquisitis habitibus & temperamentis, perinde ac a naturalibus.

Pulsus differentia pro excitatione tum diversitate

tempestivius aut ferius incipiunt unde tardus est minus q̄ parvus. nonnunq̄ autē nihil penitus habet tarditatis, ob idq̄ ipsum, minimē malignus existit. At quæ à febris extialibus atq̄ acutis oriuntur syncopæ, pulsus uermicantem nō habent: qualis utiq̄ reliquis utrium solutione ut plurimū comitatur, ac eadē præcipue, quæ sine febris accidunt: aut certē cum exiguis admodū. Ob eam utiq̄ causam syncopas quidem cardiacas, fornicantes: choleras uerō morbos, ac fluxus uentris uehementes, hæmorrhagias, fluxus muliebres, reliquosq̄ affectus qui corpus inanunt celeriter, ut plurimū uermicantes: cum autē extremū afficiunt, fornicantes sequunt. Iam uerō ab ira pulsus fit altus, magnus, uehementis, celer ac frequens. A uoluptate autē, magnus, ac rarus, nō tamen uehementia diuersus. A mœchia, paruus, tardus, languidus, atq̄ rarus. A metu recenti quidem ac uehementi, celer, turbulentus, inordinatus, atq̄ inæqualis: inueterato autē, pulsus à mœchia est similis. In omnibus porro his, si diu perseverarint, aut uehementes admodum fuerint, tales pulsus fiunt, quales consequuntur solutæ vires. Dolor autem qui pulsus immutat, aut quia uehementis, aut quia in partibus principalibus est, id facit: quem admodū inflammatio. Cū igitur adhuc paruus est, atq̄ in ipso ortu, maiorem, uehementiōrē, celeriorem ac frequentiorē pulsus efficit: auctus autē, uehementisq̄ admodū factus, ut iam robori uitali noxam inferat, minorem, languidiorem, celerem ac frequentē. Qui uerō vires iam dissoluit, pulsus mutat in languorem, paruitatem, & falsam celeritatis imaginem, immentisq̄ frequentiam. Inflammationem pulsus, cōmunis quidem omnium, quasi ferratilis est: ut pars quidem arterie alia quidem dilatari uideatur, alia autē minimē, quæ uidelicet durior sentitur. Habet autē pulsus luc & turbationis nonnulli: præterea celer quidem est ac frequens, magnus uerō non semper. Proprius cuiusq̄, incipientis quidem, maior est naturalis, uehementior, celerior, frequentiorq̄. At in ea quæ adhuc increfcit, omnia hæc sunt auctiora, pulsusq̄ iam palam est durior & turbulentior. Cū uerō ad uigorem peruenierit, euidentior quidem est, durior, ac turbulentior, sed minor quidem antea: non tamen languidior, nisi morbus vires exuperarit, quo casu frequentior & celer redditur. Quid si diu admodū perseueret, ritusq̄ scirrhosorū accedat, pulsus tenuitas

luntur: suffocant autē quibus pulmones. Syncopeprehendunt, quibus os uentriculi. Atrophia laborat, quibus hepar. Non cōcoquant, quibus uentriculus. Vrinæ supprimunt, quibus senes experiant inflammationē. Ad liq̄ partes sensu exactiori prædite, pulsus, propter dolores, immutant: hebetiori autē, duntaxat propter affectū. Itaq̄ pulsus pleuriticos celer ac frequens est, nō tamē magnus admodū. Est præterea nō languidus quidem, nō tamen, quod ad affectū spectat, uehementis. Porro quantitas frequentie in pulsu excedat consuetū modū pleuritidi, cū pleuritis ipsa in peripneumoniam transit, aut etiā minatur syncopam. Intra modū autē subsistit, cū in cata ploriam, aut neruorū lesionem definit. Eodem modo & inæqualitas illa ferratilis, quæ pleuritidis maxime est propria, remittit quidem, si pleuritis sit mollis, ac facile concoquat: intendit autem, si ea sit extialis: in dicatq̄ ipsam esse coctū difficile. Tales autē pleuritides, si simul addit imbecillitas uiriū, periculū præfens minant. Sin uirum robur nō desit, signū est eas concoctas iam esse, aur in empyema translatas, aut in tabidum marcorem degenerasse. Cæterum si pleuritis coquatur, sensim deponit pulsus omnem mutationem præter naturā. Cū uerō transit in empyema, fiunt pulsus empyematum proprii. Pari modo & marcoris proprii eis accidunt, qui tabidos marcores sunt in cursuri. Talis autē est purulentorum nuper ordiente pulsus, qualis uigentis inflammationis: hæc siquidem ipsū est suppurationum principium. Nonnunq̄ autem est inæqualis & inordinatus: omnibus tamen est hecicus. Cū uerō iam pus instat, cetera quidem est similis, nisi quod magis æqualis. Postquā autē est ruptum, languidior, lartior, tardior ac rartior. Marcescentium pulsus nō simpliciter, neq̄ secundum unam speciem, mutat. Qui namq̄ unū cum plægmonē nōdum soluta paulatim emarcuerūt, pulsus habent languidos, celeriōres, frequentes ualde, atq̄ cum depressione in angustum redactos: quos utiq̄ myuros uocant. Porro marcescentibus omnibus cōmunis est pulsus hecicus: dein autē in diafoles magnitudine myuron imitans inæqualitas: postremo uerō ea quæ in frequentia consistit: quæ omnibus etiam perpetuō inest, qui in marasum inciderunt propter inflammationes: aut quibus propter cardiacos affectus, uel syncopas stomachicas, periculū præfens imminet: quip̄ uno epoto periculū quidē præcepse efugerūt, nihilominus tamen tempore procedente maruerūt. Iphelificorum pulsus, paruus, languidus, mollis & celer est, læticiusq̄ mediocriter. Peripneumonicorū uerō, magnus, aliquantulum fluctuosus, languidus, mollis, non aliter quam lethargicorū: nisi quod inæqualitate superat, tum ea quæ in una percussione cōsistit, tum ea quam systematice uocant. Cū autē peripneumoniici omnes aut febrī acuta in festent, aut soporis grauis nōnihil habeat, utrumuis præuoluerit liorū, secundum illud frequentie quantitas maxime deprehendit. Nam si in peripneumonia sit inflammatio febris, pulsus erit admodū frequens. Sin sopor paulo magis pollear, infrequentior. Lethargicorū pulsus, cū sit magnitudine,

Septo transuer-
se inflammatus,
quælibet remittit
multos errorē:
re suffocationes
pulmonis phle-
gmonis obsequi.

Pleuriticorum
pulsus.

Serratilis inæ-
qualitas pleuri-
ticorum.

Pleuritidis diffe-
rentia.

Purulentorum
pulsus, est qua-
lis uigentis in-
flammationem

Marcescentium
pulsus.

Myron pulsus,
Pulsus lethæus
omnium marce-
scentium cōmu-
nis.

Phelificorum
pulsus.
Peripneumoni-
corum pulsus.

Peripneumoni-
ci quæ afebris.

Lethargicorū
pulsus.

Pulsus differt
na secundum di-
uersas synopas.

Tranquillorū pul-
sus.

Voluptas quo-
modo mouet
pulsus.

Mœchia pul-
sus.

Mœchia pul-
sus.

Pulsus differt
na pro varieta-
te dolorum.

Pulsus inflama-
tionem com-
munis serratilis.

Pulsus differt
na pro inflama-
tione, & par-
tium inflama-
tōrū naturā di-
uersis.

languore, & mollitie, peripneumonicorū pulsū cōsimilis, eodem tamen est tardior, languidior, minus inæqualis, magis deficiens q̃ intercedens. Porro cōfusio ordinis ut plurimū inæqualitates sequi: nam inæqualem pulsū rarō quidem ordinatū reperias. Ceterū minores noxx, inæquales & ordinatos: maiores uerō, inæquales & inordinatos efficiunt. Phreniticorum pulsus est parvus: rarissimē autem magnus fuit visus, roburq̃ mediocriter habere. Durus præterea est, ac nervosus & frequens, & ualde celer. Videas autem licet & speciem inæqualitatis in situ, in eo nonnunq̃ uelementer accidere. Quin & tibi sepe uidebitur tota arteria suo ipsius loco relicto, sursum deorsumq̃ ferri turbulentiſsimē: cuius magna frequentia eminentē mutat syn-
copen. Et si alius quidam nomine carens æstus, ex pleritidis & lethargi generibus mistus: quo detenti, bonam quidem temporis partem oculos claudunt, suntq̃ somnolenti ac ster-
tunt: post autem oculis incontinentibus atq̃ immotis intuentur diutissimē, nō aliter q̃ catochii: rum si quis eos interroget, inuitosq̃ ad collo-
quium trahat, tardi di erunt ad respondendū, diffi-
cilesq̃: plerunq̃ autē turbulenter effutiant, quic-
quid primū in buccam uenerit. Atq̃ eius sanē af-
fectus pulsus sunt frequentes & celeres, quo mo-
do plerititicorum, sed minus. Pari modo & ro-
boris habent minus quā illi, uerū iam sunt, atq̃ parui, nec dum extrā mouent, quicq̃ habent
cōteritū ac simul interitum: sed alia ratione ue-
luti intrō properantes suffugit, systolem quidē
accelerantes, suffurantes autem diastolem. Non
tamen, ne in hac quidam sunt phrenitici similes,
cū nō habeant nescio quid interitum. Ca-
tochōn, hoc est, detentorū pulsus, ceterā qui-
dem similes sunt lethargicis, magnitudine, tardi-
tate, ac raritate: quemadmodū & totus affectus
i lethargo specie nō multū discrepat. Catochōn
tamen pulsus imbecilli non sunt, nec molles, sed
in his uel multum dūsidet: quemadmodū cer-
tē & quod lethargicis totus habitus sit solutus,
ac tumens, catochus uerō cōstrictus, cōactusq̃.
Præterea detentorū pulsus æqualis est: inæqua-
lis autem lethargicorū. In consulsis, ipsum qui-
dem corpus arteriæ cōactum esse uidetur, com-
pactūq̃ undiq̃, nō tanquam i quoquam com-
pressum, aut arctatum: nec rigidum planē, ut in
febris, & maximē in earū accessionibus: nec
propter duritiem dilatari difficile, quod tempo-
ris longinquitate accidere solet, præsertim si uia
quædam, aut uiscerū affectus adfuerit: sed
nō aliter quā si corpus nervosum cauit, ut inte-
stinum, ab utroq̃ sine fuerit extensum. Talis est
motus inæqualis arteriæ, quæ instar funis, sur-
sum & deorsum traducitur. Nec enim ullum est
diastoles aut systoles signum, sed confusio: po-
tius simile quippiā hic accidit. Apparet autē ue-
hemens esse ac magnus consulsorū pulsus: is ue-
rō nec languidus est, nec paruus: nō tamen adeo
uehemens aut magnus ut uidetur. Percussio e-
nim multis imponit, quæ propter tensionē qui-
dem, roburq̃: propter turbationē autem, exilire
apparet. Vnde aliis quidē altior, aliis quāsi stre-
pitum quendam asperū ad tactum nostrū uidē

efficere. Quem pulsū, qui fuerit exercitatus, fa-
cile deprehendet, cū nulli sit alteri similis. Para-
lyticus pulsus paruus est, languidusq̃ & tardus:
nonnullis tamen rarus: sicuti alij frequens qui-
dem, uerū penē deficiens inordinatē. Epilepti-
corū autē & apoplecticorū pulsus, sunt similes:
quocirca quæ de epilepticis memorabunt, eadē
& de apoplepticis dicta fuisse est putandū,
nisi quod omnia sunt in his intensiora. Porro
quandiu mediocriter natura ipso affectu turba-
tur, tantisper nullam mutationē in pulsū est repe-
rire cōmemorabilem: sed solū ueluti tensa in u-
trinq̃ partē uidetur arteria, quemadmodum in
consulsis. Vbi uerō inualuerit affectus, ita ut op-
primat uires, inæqualitatē quandam ac tensionē
fortē asciscit, longiorū fit pulsus, languidior &
rarior. Quod si affectus ipsas uires deiecerit, pul-
sus efficit languidus, frequentes ac celeres. Angi-
na laborantium pulsus, tensionem quandam
habet cōuulsioni æsimilem: magnus tamen est,
ac fluctuosus, quo modo peripneumonicorum,
Atq̃ utrumuis in eo præualuerit insigniter, se-
cundum illud est trāsmutatio expectanda. Nam
si pulsus peripneumonicorū similis præpoller, in
peripneumoniā: si cōuulsioni, in consulsione,
in peripneumoniā: si cōuulsioni, in consulsione,
Angina terminabitur. Ceterū qui ex ipsa
nimis angustia pulsus fit paruus & rarus: expi-
rantū autē, iam frequens & inæqualis. Ortho-
pnœ acutę pulsus est inæqualis, inordinatus, &
penē deficiens: cū autē mediocriter est mali-
gna, frequens: cū autē extremū urget, tardus ac
deficiens: cū hominem iam ē medio tollit, fre-
quens ac languidus. Suffocationis ac matris ore
te pulsus, est cōuulsoriē extensus, ac rarus: eius
autē quæ est exitialis, frequens, languidus, inor-
dinatus, & penē deficiens. Os uentriculū af-
fectum, si quidem in sefel inflammatione, eam facit
mutationē duntaxat, cuiusmodi in inflammatione
corporis uerui fieri iam diximus. At mor-
sus illius, uomitus, nausea, singultus, appetitus
priuatio, atq̃ dissoluciones, præterq̃ quod pul-
sum parū efficiūt & languidū, ipsum etiā nimia
frequentē reddūt, & quibuscūq̃ moderatē celero
rem. Cōpressio autē sola, citra ac omnia, rarum,
tardū, parū, obfcurū. Præterea quibus fames est
magna, pulsus est eiusmodi. Qui uerō affectus
in frequentē ipsū pulsū permittit, si diutius
perseuerarint, aut uehemens affuxerint, ip-
sum uermicantē efficiūt. Qui in raritatē, præterq̃
quod memoratas differentias intendunt, talem
præterea quidā pulsus speciem in ea inqualitate,
quæ in uno pulsū accidit, efficiūt, ut corpus arte-
riæ in multas partes cōminuūt esse uideat. Hy-
dropum pulsus, alacritate quidē, longus, frequens,
& subdurus cum quadā tensionē est: tympanitæ
autē longior, nō imbecillus, celerior, frequens,
subdurus, cum quadā tensionē. Eius uerū qui in
toto nascit corporis habitu (quem Greci *oedemā*
nō nominant) fluctuosus, latior, ac mollis. Ele-
phantiasis laborantium pulsus paruus, imbecillus,
& frequens. Ictericorū pulsus sine febris,
minor, frequentior, durior, non languidus, neq̃
celer. Eorum qui sumptierunt helioborū, paulo
quidem anteq̃ uomant, latus, rarus, languidior:
cū autem uomunt ac diuellunt, inæqualis, &
inordina-

*Inæqualis pul-
sus, qui ordinis
sui sit, reperitur
rare.
Phreniticorum
pulsus.*

*Cataphoricorum
signa, et pulsus.*

*Catochi, hoc
est, detentorum,
pulsus.*

*Consulsorum
pulsus.*

*Percussiones ar-
terie multis im-
ponere.*

*Paralyticorum
pulsus.*

*Epilepticorum
apoplecticorūq̃
pulsus sunt simi-
les.*

*Epilepticorum
pulsus.*

*Angina laboran-
tium pulsus.*

*Orthopnœa ac-
ta pulsus.*

*Suffocationis
producta ab ore
te pulsus.*

*Pulsus in diffi-
cultate diutius,
pro toto ora-
troniculo affi-
ctibus.*

*Hydropicorum
pulsus.
Hydropis tria
signa.*

*Elephantia-
sicorum pulsus.
Ictericorum
pulsus.
Pulsus eorū qui
sumptierunt heli-
oborum.*

inordinatus: cūm meliusculē iam habent, ordinatus quidem, sed adhuc inqualis, minus tamē quā prius. Cūm autē sanescūt iam, & penē ad statū naturalem redierūt, equalis & maior q̄ antea, uehementiorq̄. Qui uerō ex hīs syncope corripitur, conuellunt, atq̄ singultunt, hīs pulsus parvus & languidus, inordinatus, celerior, atq̄ admodū frequens. Qui ex eis suffocant, paruus, languidus, inordinatus, inæqualis, nō tamē frequēs, neq̄ celer, sed subtar magis. Præ se fert autem & fluctuosum quiddam & larum, & nōnunquam exiguum quandam arteriæ tensionē,

GALENI PERGAMENTI
de differentiis pulsuum, liber primus.

Prima genera pulsuum.



Arteria corpus quide.

Pulsus quid.
Pulsus inest quia in gema.

Motum contrarium non exordiri naturā priorem, quā priore sedauerit.

Arteriam fortiter distensionem, perinde ut reliqua corpora. Quāvis distensionis contraria sit omni.

Arterij contractionis missa, Arterij distensionis tunc tunc contraria sit.

Proportio uicinis uicinis pulsus, ad alteram.

Differentia in uno pulsuum inest, quā sit.

Pulsus differentia inest, quā sit.

Color pulsus. Tardus. Moderatus.

Differentia pulsus inest, quā sit. Tardus. Moderatus. Pulsus inest, quā sit.

Vandoquidem arteriæ corpus est quāquam, longū & circumductile, habetq̄ perpetuū geminū motum ex contrariis constitutū partibus (aut enim in seipsā undiq̄ cōsidet, aut in omnē partē distendit: qui duplex motus uocatur pulsus) in utroq̄ ei gemina quies accidat necesse est: altera à distensione, priusquā contrahatur: altera à cōtractione, priusquā distendatur. Quas quidem binas quieses experientiū tactus cognoscit, nec minus demonstrat ratio. Nam prius contrariū motum natura, q̄ priorē sedauerit, non exordiri. Atqui sedari, subsistere est, & in quiete esse. Sic motibus intercedit quies. Exprimat ergo necessitas, quoddam esse tempus propriū utriusq̄ motus: aliquid etiam intermissionis, & harum item utriusq̄ propriū. Iam quia tres arteriæ dimensiones, ut reliqua omnia corpora, obtrinet, longitudinem, latitudinē, profunditatē: non potest in singulis dimensionibus nō fieri quantitas aliqua distensionis & contractionis. Præterea contractionē quandam necessitas habet, ut aut ægrē, aut languidē, aut prōptē, ualenterq̄ operetur. Est etiam ipsa arteriæ tunica aut mollis aut dura: necnon intercapedo interna, aut uacua quodammodo, aut plena. Atq̄ hæc omnia aliquando equalia, aliquando inæqualia sunt. Temporis item distensionis aliqua proportio est cum tempore contractionis. Aliā in uno pulsū differentiam constituas præter has nullas: sed fuit omnes que in unum pulsū incidunt differentie generales, quas retulimus. Quibus dux accedunt aliæ, quas collectiuas appellat. Ex his in plurium pulsuum murus contentionē, equalitatem & inæqualitatem, ordinē & eius perturbationem æstimamus.

Differentiæ cuiusq̄ generis pulsuum.

At motum ipsū pulsū, aut moderatū & naturalem esse, aut tardiorē, aut celeriorē, oportet: quæ tres pulsuum circa motū differentie existunt. Fit igitur pulsus celer, ubi modico tempore ipsa arteria mouetur: tardus, cū multo: moderatus, ubi mediocri. Differentiæ pulsū in distensionis quantitate, si quidem in singulis concipiantur dimensionibus, nouem numero sunt, in unaquaq̄ trium dimensionū tres. In longitudine arteriæ, qui moderatus in ea est, & qui lunc

excellit, uel eo est inferior. Vocatur qui excellit, longus: qui inferior est, brevis. In latitudine, moderatus, & alij immoderati duo: nempe latus, qui moderatum excellit: huc contrarius, angustus. Idem in dimensione profunditatis arteriæ, unus moderatus est, alius altus, & alius humilis. Hæc pulsuum sunt in una dimensione acceptorum differentie. At differentie pulsuum in trinis simul dimensionibus, sunt septem & uiginti. Perspicias has manifestē in tabella. Vnus enim erit longus simul & latus, atq̄ alius, qui omnibus præponatur: alius longus, latus, & profunditate moderata, scribaturq̄ secundus: alius longus, latus, humilis, qui sit ordine tertius: similis reliqui omnes cognoscuntur uia & ratione, ut dux primæ dimensionis manet immota, trisariam ultima uariet, hoc pacto. Quartus longus, moderata latitudine, & alius. Quintus longus, moderata latitudine, similisq̄ moderata profunditate. Sextus longus, latitudine moderata, humilis. Deinde alij tres, prima dimensione longum seruante, secunda angustum, tertia trisariam uariante. In his nouem, una dimensio permanet, longitudinis longe: alie omnino cōmutantur. Mox alteri nouem, dimensione longitudinis in mediocritate seruata, uariantibus reliquis. Ad hæc nouem alij, ubi longitudinis brevis dimensio sit, & alie immutantur.

TABELLA.

1	Longus	Latus	altus	magnus.
2	Longus	latus	moderatus	
3	Longus	latus	humilis	
4	Longus	moderatus	altus	
5	Longus	moderatus	moderatus	gracilis.
6	Longus	moderatus	humilis	gracilis.
7	Longus	angustus	altus	
8	Longus	angustus	moderatus	gracilis.
9	Longus	angustus	humilis	gracilis.
10	Moderatus	latus	altus	turgidus
11	Moderatus	latus	moderatus	
12	Moderatus	latus	humilis	
13	Moderatus	moderatus	altus	
14	Moderatus	moderatus	moderatus	medius
15	Moderatus	moderatus	humilis	
16	Moderatus	angustus	altus	
17	Moderatus	angustus	moderatus	
18	Moderatus	angustus	humilis	gracilis.
19	Breuis	Latus	altus	turgidus
20	Breuis	latus	moderatus	turgidus
21	Breuis	latus	humilis	
22	Breuis	moderatus	altus	turgidus
23	Breuis	moderatus	moderatus	turgidus
24	Breuis	moderatus	humilis	
25	Breuis	angustus	altus	
26	Breuis	angustus	moderatus	
27	Breuis	angustus	humilis	gracilis.

Longus pulsus. Breuis. Latus. Angustus. Altus. Humilis.

Pulsuum differentie in trinis simul dimensionibus acceptis, sunt septem & uiginti.

Atq; inter* uigintiseptē hos pulsus qui ex ternis dimensionibus constant, primus quidem ab omnibus magnus dicitur, ultimus autē parvus. Reliqui uerō proprio nomine carēt. Neq; enim qui graciles dicunt & turgidi, certū unum significant, sed multis simul generatim tribuuntur. Nam in quibus longitudinis dimensio duabus reliquis præstat, omnes hos tenues & graciles uocant: in quibus duæ reliquæ ab hac, rum crassos, rum turgidos. At moderatū dimensionibus pulsū, mediū inter magnū & parū nominat.

De differentiis reliquorum generum pulsuum.

Tertij generis pulsū, quod in cōtentione cōsistit, tres differentiæ existūt. Vnus quippe est ualidus cōtentione, qui uehemens uocat: alter imbecillus, qui languidus: & tertius inter utrunq; qui mediū dicit. Quartū etiā generis, quod circa arteris corpus uersatur, totidem sunt differentiæ: durus uidelicet, mollis, & mediū. Similiter quintū generis, quod arteriæ ueluti infusio de clarat, sunt differentiæ tres: plenus, uacuuus, & inter utrunq; mediū tenens. Quæ quidem differentiæ quinq; cum æqualitatibus & inæqualitatibus suis, in uno arteriæ motu consistunt.

De differentiis pulsuum quæ in tempore intermissionis consistunt.

Qui contractionē pulsuum percipere se fatentur, tardiatē quidem & celeritatē in diffentionis contractionisq; tempore collocant: crebriorem uerō & rariorē, in quiete utraq; at rhythmum, in diffentionis tempore, unā cum tempore insequētis eam quietis, ad tempus collato contractionis, simul & expientis eam quietis. Porro quietem quam uocant superam, quæ secundum diffentionem contractionē præcedit, quantā sit, tactu quæz ad unguem assequi: inferā nō item planē, quod utrinq; sibi afficitur partes, ad initium, contractionis extremitatem: ad finem, principium diffentionis.

De differentiis quietis & rhythmī.

Itaq; in genere quietis arteriæ, tres pulsuum differentiæ consistunt, rarus, creber, & mediū. At uerō cum omnis pulsus aliquo rhythmico cōstet, erit unig; arhythmus pulsus eurythmus contrarius: eurythmus autem, genus commune utriusq;. Cæterum pulsus eurythmus in diuisus & cunus manet. Arhythmi tres differentiæ sunt: paralythmus, heterorhythmus, ecrhythmus. Et enim cuique ætati suus est naturalis pulsus. Qui ex ipsi igitur rhythmum seruat, uocatur eurythmus: qui labefactat, arhythmus. Atque labefactans ipse, interim uicinæ ætatis rhythmū mutat, qui paralythmus: interim cuiuslibet ætatis, qui heterorhythmus dicit: sicut qui rhythmum prorsus nullus ætatis retinet, ecrhythmus. Eisdem differentiis & in naturis, annisq; temporibus, necnon regionibus, ac breuiter in omnibus, statuere oportet. Jam uerō inter omnes rhythmos, hi quidem pari proportionē, illi impari constant. Pari, ubi diffentionis tēpus æquet tempus contractionis. Impari, si alteruter corū excedat: id quod modō certis, modō incertis fit excessibus. Certis bisariam: aut* multiplici proportionē, aut ut numeri ad numerū. Ac propor-

tio quidem multiplex, aut dupla est, aut tripla, aut quadrupla, aut insequentiū aliqua. Vt numeri ad numerum, ubi quot est diffentio temporū, totidem fuerit cōtractio. Incertis, in uniuersum tripliciter. Nam aut diffentionis est tempus incertum, aut contractionis, aut utrunq;.

De æqualitate, inæqualitate, ordine, & ordinis perturbatione.

Porro æqualitas & inæqualitas tum in uno pulsū sunt, tum in pluribus. Ordo & perturbationis ordinis, in pluribus duntaxat. Ergo (ut a facilius cognitu ordinarum) quæ in pluribus pulsibus æqualitas in æqualitatibus cernunt, quæ collectiue uocitant, in contentione omnium differentiarum estimantur primi pulsus cum reliquorum differentijs. Nam pares si omnino mancant, æqualis absolutē in pulsus uocatur: fin omnino impares, absolutē inæqualis. Quod si in una uel pluribus pares existant, & in una uel pluribus impares: quatenus pares sunt, hæc tenus dicitur æqualis pulsus: quatenus impares, hæc tenus inæqualis. Nam pulsus absolutē æqualis, nec magnitudinem, nec uelocitatē, nec aliud habet impar quicquid. At uerō ordinatus & inordinatus pulsus, diuisa inæqualitate in paritatē circuitū, & in absolutā imparitatē, in utroq; membro gignuntur: in circuitū paritate, ordinatus: in absolutā imparitate, inordinatus. Sint itaque omnes unius pulsus differentijs, insequentium differentijs omni in genere pares. Absolutē æqualis talis pulsus dicitur. Contrā omnes sint omnibus impares: erit ille absolutē inæqualis. Quod si aliqua uel aliquæ pares existant, & aliqua uel aliquæ impares: in aliqua pulsus uel aliquibus æqualis erit, in aliqua uel aliquibus inæqualis.

Qui enim absolutē est æqualis, aut una, aut pluribus differentijs, nō admittit sectionē. Qui autem absolutē inæqualis est, hunc per unam aut plures species secant, circuitū paritatē & imparitatē ordinatū reperiemus & inordinatū, uel absolutē, uel pluribus in differentijs, uel una. Cæterum qui absolutē ordinatus est, pares sortitur circuitus omnes. Qui circuitatim ordinatus est, nō omnes æquales, sed certos. E diuerso inordinatus absolutē, nec habet deinceps omnes pares circuitus, nec certos. Circuitatim uerō inordinatus, ambo hæc nō habet, altera habet. Ita utriusq; mediū sit, ordinatū & inordinatū: atque illud utriusq; commune habet, hoc non habet.

De collectiue inæqualitatis differentiis: ac primō de æqualibus inæqualitatibus.

Collectiue inæqualitates, quæ in accretio plurium pulsuum consistunt, primam habent differentiam, quæ interiem æqualiter, interiem inæqualiter sunt. Quippe inæquales pulsus, sicuti & cætera ferē omnia, pristinam naturam mutantia, quatenus æquam semper mutationem recipiunt, æqualiter dicuntur mutari. Quæ uerō partem mutationem minimē afficiunt, ea inæqualiter inæqualia uocantur. Vbi igitur primo pulsus secundus est paulo minor, & tertius tantō secundo, & quartus similiter tertio, ac sic deinceps: tales sanē pulsus *uicij*, quæ immixtos, à turbulari figuris sumpto nomine, appellat. Jam qui ex ipsi perperuū diminunt, nec minui desistūt, deniq;

Æqualitatis in æqualitatibus, in uno pulsū & in pluribus ferē, ut dicunt confusim, in pluribus tantum.

Pulsus absolutē æqualis. Pulsus absolutē inæqualis.

Pulsus ordinatus in circuitū paritate cōstitit. Pulsus inordinatus in absolutā cōstitit circuitum imparitatis.

Pulsus absolutē æqualis non admittit sectionē.

Pulsus absolutē ordinatus, pares sortitur circuitus omnes. Pulsus inordinatus ferē simpliciter, pulsus circula tim inordinatus.

Æqualiter mutari quæ decemunt. Inæqualiter inæqualia quæ immutentur.

Pulsus uicij.

Pulsus magnus. Paruus.

Gracilis.

Turgidus.

Pulsus rebus. Languidus.

Durus. Mollis. Plenus. Vacuus.

Quotē pulsū superat, quā sit, tactu posse discerni: infernam autem, nō item planē.

Pulsus diffentia secundum quietē arteriæ, sunt tres: rarus, creber, & mediū.

Eurythmus pulsus. Arhythmus pulsus.

Eurythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Arhythmus pulsus eurythmus.

Deficiente mo-
tu pulsu.
Deficiente pulsu
differentia motus
et pulsu.
Pulsus immu-
tus recipit.

deniq; ad quietem omnino recidunt, motuq; de-
ficiuntur, quos vocant deficientes *pulsus*. At qui
defiunt, duplici sunt differentia. Quidam enim
in qua primum parvitate minui defuerit, hanc
constantissime servant. Alij autem rursus augen-
tur, quos immutatos reciprocis vocant. Quo-
rum quidem ipsorum nonnulli ad parem reuer-
tunt pristinæ magnitudinē, alijs ad minorem: alijs
idem excessibus quibus fuerant prius immu-
ti, rursus augent. Sunt qui minoribus accessio-
nibus, maioribus utantur.

De inæqualium inæqualitatum differentijs.

Inæqualium in
æqualitatis dif-
ferentia.

Inæqualium inæqualitatum quædam nul-
lam prorsus æqualitatem retinent: aliquæ
retinent ad tres usq; uel quatuor, uel quinq; pulsus,
sed postea amittunt: quoq; inest utriq; uel or-
do, uel perturbatio ordinis: ordo, si circuitus ser-
uent aliquos pares: perturbatio ordinis, si & hos
quos uolent. Atq; hi quidem ex ipsis & motu-
bus deficient, ut illi qui æqualiter agitantur. Ce-
terum ut illos decurtatos deficientes, sic hos inæ-
quales deficientes uocamus. Porro intercur-
rens pulsus ex sola inæqualitate creberrime nasci-
tur: intermittens uero, ex inæqualitate raritatis
& paruitatis, alio atq; alio utrobique modo, con-
stat. In raritatis inæqualitate, quod quies sit pro-
ducta longissime: in paruitate, quod minima fue-
rit distantia. Vel potius, ex pulsui paruitatibus
deficientes constant: intermittentes, ex raritatibus.

De inæqualitatis unius pulsus differentijs.

Inæqualitatis
unius in uno
pulsu differentia.

At inæqualitatis motus in uno pulsu, duæ pri-
mæ differentie constituende sunt. Quarum una,
in una arterie parte gignitur: in pluribus altera.
Earum autem utraq; potest iterum in plures distri-
bui. Auspicabimur tamen ab ea, quæ circa unam
arterie partem uersatur, licet distinctis tempori-
bus: quod nimirum inæqualitas illa sæpe inuenia-
tur in pulsibus, multaq; denotare consueuerit. 40
Tres igitur illius sunt differentie primæ: cum ui-
delicet quies interpellat motum particule: aut
cum ille continuus apparet, non pariter tamen ue-
locitatis: aut cum interdum recurrit. In prima au-
tem, ubi a quiete motus interpellatur, pulsus non
uem differentie inueniuntur.

Primæ differentie inæqualitatis mo- tus, membra.

Pulsus differen-
tia una in par-
te inæqualiter
motus.

Sit prior motus celer: alter uero, aut celer, aut
tardus, aut moderatus: iam hinc tres differentie
oriuntur. Rursus alteræ tres, ubi prior manet tar-
dus, & trifariam secundus uariatur. Aliæ item tres,
si permaneat moderatus primus, uarietur autem
tribus secundus modis. At uero inter non inter-
mittentes differentie inæquales motu pulsus,
quidam uelociter motum exordientes, tarditate
finiunt: alijs contra, tardi sunt initio, celeresq;
semper magis ac magis euadunt: idq; horum
utriq; habent aut æqualiter, aut inæqualiter. U-
lorum ergo qui motum æqualiter minuunt, uel 60
augent, quidam ab extrema tarditate ad moder-
atum motum perueniunt: quidam a moderato
motu ad ultimam tarditatem: alijs a prima ce-
leritate ad moderatum motum: sicuti & alijs ab
hoc ad extremam celeritatem. Sunt præterea qui

utrinq; a moderato motu paululum defleunt,
hijs bifariam: modo enim celeriores, modo tar-
diores fiunt, ut sex sint cunctæ eorum differen-
tiæ, tamen plures excogitari possint. In solis au-
tem inæqualibus pulsibus qui inæqualiter ua-
riant, interdum (licet rard) accidit motus ex tar-
dissimo uelocissimo, sicuti & ex uelocissimo
tardissimus redditur.

Differentie pulsuum una in parte in- æqualiter inæqualium.

Eorum uero pulsus qui inæquales cum sint,
inæquali in mutatione uersantur, interim duæ
planè, interim tres motus differentie ceruntur.
Nos quartum aliquando, sed obscure animad-
uertimus. Vbi igitur motus arterie duas sensi-
biles differentias efficit, sex erunt formæ concur-
sum: ubi autem tres, quatuor & uiginti. Quod
autem cdm in utroq; disparum motuum insint
tres pulsus, uelox, tardus, & moderatus, ex con-
cursum eorum non uouem dicamus, sed sex dif-
ferentias prodire, hac ratione intelliges, si noris,
qui eundem bis deinceps pulsus ponat nulla in-
tercedente quiete fieri, unum cum totum æqua-
lem pulsus efficeretur. Itaq; de nouem cõmis-
suris tres detrahuntur, in quibus non inæqualis
iam pulsus, sed æqualis reddidit, uel celer, uel tar-
dus, uel moderatus: id quod ex tabella euader
apertum. Nam secundus in ea, & quartus, & no-
nus, sunt æquales: celer secundus, tardus quar-
tus, nonus moderatus.

TABELLA.

1	Celer	tardus
2	Celer	celer
3	Celer	moderatus
4	Tardus	tardus
5	Tardus	celer
6	Tardus	moderatus
7	Moderatus	tardus
8	Moderatus	celer
9	Moderatus	moderatus.

Eadem ratione si tribus positus inter se dispa-
ribus motibus, in singulis his ternos pulsus com-
mutatos cõmittas, uigintiseptem numero for-
mæ erunt. Ex quibus tres necesse est in æqualita-
tem recidit: estq; id etiã ipsum ex tabella planè.

TABELLA.

1	Celer	celer	tardus
2	Celer	celer	celer
3	Celer	celer	moderatus
4	Celer	tardus	tardus
5	Celer	tardus	celer
6	Celer	tardus	moderatus
7	Celer	moderatus	tardus
8	Celer	moderatus	celer
9	Celer	moderatus	moderatus.
10	Tardus	celer	tardus
11	Tardus	celer	celer
12	Tardus	celer	moderatus
13	Tardus	tardus	tardus
14	Tardus	tardus	celer
15	Tardus	tardus	moderatus
16	Tardus	moderatus	tardus
17	Tardus	moderatus	celer
18	Tardus	moderatus	moderatus.

19	Moderatus celer	tardus
20	Moderatus celer	celer
21	Moderatus celer	moderatus
22	Moderatus tardus	tardus
23	Moderatus tardus	celer
24	Moderatus tardus	moderatus
25	Moderatus moderatus	tardus
26	Moderatus moderatus	celer
27	Moderatus moderatus	moderatus.

Iraque tres in his sunt æquales, secundus in tabella, & tertiusdecimus, & uigessimus. Celer enim secundus est: tardus tertiusdecimus: medius ultimus. Et iam alij duodecim pulsus, in primam tabellam transeunt. Nam primo primæ tabellæ, duo sunt similes, primus nempe & quartus secundæ tabellæ, hic tarditas plus, ille celeritatis habet. Et tertio, tertius & nonus, ille plus obtrahens celeritatis, hic mediocritatis. Quinto undecimus & quartusdecimus, ille maiorem celeritatem, hic tarditatem prædunt. Sexto decimusquintus, atque decimus octauus, hic plus habet mediocritatis, ille tarditatis. Septimo uigessimus secundus, & uigessimus quintus: hic mediocritatem, ille tarditatem excellens. Reliqui de secunda tabella duo, uigessimus, & uigessimus sextus, octauo sunt primæ tabellæ similes, hic mediocritatem præstans, ille celeritate. At duodecim secundæ tabellæ reliquos, qui profus sunt inæquales, nihil cum illis prioribus tabellæ consentire, clarissimum est: in quibus sanè ipsa est a scripta inæqualitas, non quod alij illi duodecim qui cōueniunt cum prima tabella inæquales nō sint, sed quod in ternis hi differentie motu apertè in æqualitate sint prædicti, cum in binis differentijs eam habent alij. Sunt autem, si ordine à primo numeres, quintus, sextus, septimus, octauus, decimus, duodecimus, decimus sextus, decimus septimus, decimus nonus, uigessimus primus, uigessimus tertius, uigessimus quartus.

De tertia differentia pulsuum in una parte inæqualium.

Qui repetentem pulsuum, siue ferientem iterū (quem Atchigenes dicrotum uocat) duos esse pulsus existimant, ballucinantur. Nam qui in una distentione intermittebat, quantiū iterū feriant, non ob id tamen eos dixerit duos pulsus existere. Quemadmodum enim dum malleo ad incudem ex longo intervallo prior ualideq; pulsus incutitur, illi secundus minor accedit, ueluti resiliante haud ita multum ab incude malleo, recedenteq; in eam languidius & breuiori intervallo, sic dicrote pulsationes in una distentione inæquales oriuntur. Arteria siquidem in occursum quasi repellitur, moxq; redit. Cuius delapsum à primæ distentionis fine nulla dirimit manifesta quies, qualis animaduertitur inter systolem & diastolem, sed simulatq; attolli desinit, ipsa arteria recedit, atq; paulisper uibrata, mox occurrit iterum: id quod etiam in tractu ramis deindeq; dimissis accidit. Atq; ubi cum ui maior tales pulsus contingunt, ipsius arterie partes uno eodemq; tempore, hæc quidem attolli, decidere illæ uidentur. Sic itaq; cum gignant dicroti, differentie erant in illis omnibus que retulimus generibus coram, plenitudinis, duritiæ, magnitudi-

nis, uehementiæ, celeritatis, & his contrariorum, tam in ipso primo motu, quam in reditu ab ipsorum discessu. Nam magnus potest esse & non magnus, sicuti & æqualis & inæqualis: ac sic de ceteris differentijs, quarū sanè cōmunitates, multas species cōstituant dicrotorū pulsū: quorū hæc quidem in una distentione sunt differentie, in æqualitate occupate nā partē dūtaxat.

De inæqualitate diuersarum partium in una distentione.

In æqualitate que secundum diuersas fit partes, primæ differentie sunt duæ, iuxta quas aut continuus est motus, aut interitus. Reliquæ ex harum diuisione gignuntur. Nam cōtinuus, aut est æqualis, aut inæqualis. Si æqualis, aut remittatur celeritas, aut increseat à primo, sex modis, necesse est, ut paulo ante exposuimus. In æqualis sunt differentie plures, pro pulsus magnitudine longa, uel breui, uel moderata. Namque duobus digitis si motus occurrat, sex differentie existunt: si tribus, quatuor & uiginti: si quatuor, septuaginta octo. Nam cum eorum que tres differentias habent, cōiugationes existant nongintiseptē, si quattuor illis accedat, cui tres differentie in sint, unam & octoginta numero esse ratio postulat. Quibus si tres que creant æquales pulsus, eripias, reliqui quidem erunt septuaginta octo.

De differentijs motus interrupti.

Interrupti motus primæ differentie sunt quatuor, quarum singulari complures. At quatuor in hunc modum. Aut primus & tertius digitus motum sentiunt, non secundus autē & quartus: aut primus & tertius & quartus, nō autē secundus: aut primus, secundus, & quartus, minimè uero tertius: aut primus deniq; & quartus, secundus & tertius nequaquā. Vbi igitur primus & tertius duntaxat sentiunt, nouem pulsuum in singulis generibus differentie sunt: ubi uero primus & quartus, & quartus, uiginti septem. Totidē cum primus, secundus, & quartus: at cum primus & quartus, nouem. Atq; hæc quidem est iam inæqualitatis diuisio, que differentie in partibus fit. Cōmiserunt porro uarijs modis ambæ inter se primæ differentie, ut non iam diuersas tantum partes, uerumetiam singulas teneat inæqualitas.

De inæqualitate quantitatis distentionis in diuersis arterie partibus.

At uero inæqualitas quantitatis distentionis diuersas quidem arterie partes occupans, cum animaduertit crebro, tum percipitur facillimè, & interrupta, & continua, æqualiter & inæqualiter. In una uero arterie parte nō recipit huius generis inæqualitatem unus pulsus, quod prius quàm finem motus attingat, magnitudinē minimè deprehendi possit. Si quidem magnitudinis & paruitatis differentiam, nisi iam moueri arderet desiderit, nequitiam cognoscere possis.

In æqualitatis uitalis contentio- nis differentie.

In æqualitas uero contentio- nis uitalis, eandem distributionem ac inæqualitas motus habet. Nam aut eandem partem, aut distinctas tenet. Eandem tribus modis: aut interrupto motu, aut perpetuo, aut dicrote. Distinctas bifariā, uel cōtinuo motu, uel interitū. Singulari præterea

In æqualitate pulsuum, que si cōtinuum diuersas arterie partes occupant.

Interrupti motus in pulsū, distincti quatuor.

In æqualitate quantitatis distentionis, diuersas arterie partes occupant.

In æqualitate uitalis contentio- nis differentia.

Dicrotum pulsuum, siue ferientem iterum, non duos, sed uicem tantum pulsuum existere.

Dicrote pulsationes quomodo sunt in una distentione inæquales.

Dicrotum differentie ferientis in quibus cōiugantur generibus.

terea horū generū totidem sunt singulares differentie, quot imptus. Quin & cōmiseri etiam possint una in parte in xqualitas uocesse eff, ut illas que in diuersis sunt.

De inxqualitate corporis arteriæ.

Sed inxqualitas corporis arteriæ, ex qua pulsus aut mollis aut durus redditur, in una quidē nō potest parte fieri: in diuersis fieri duobus modis uidetur (non aliter ac inxqualitas motus & contentiois) ut aut continuus motus sit, aut in tertijs. Qyo fit ut differentie huius generis sint eadem, atq; prædictæ illorum. Verum arteriæ pars una non potest initio esse distentionis, mollis, dura in fine: aut contrā primō dura, in exitu mollis. Quare hæctenus quidem ab hoc pulsus genere dituties & mollitudinis, duo genera distident priora, motus & contentiois.

De inxqualitate ab infusa materia in cavitatem arteriæ.

Pulsuum genus quod efficit infusa materia, in quo quidem pulsus plenus & uacuus est, eadem habet questionēs ac superius quod quantitate distentionis constabat. Videbit namq; licet quoq; obtrine diuersas partes possit in uno pulsū inxqualitas: unam autem eandem non posse. Porro quia euidennus in arteriæ sede febris calor qui sit, quā si aliam tangas partem, cognoscitur, ideo probabatur quibudam, inter alia hoc etiam genus pulsuum annumerari, quo calor qualitatem pernoscimus. Cuius quidem generis xqualitas & inxqualitas in una distentione uersant. Ac inxqualitatis erunt differentie, prima, tum que diuersas partes, tum que singulas tenet. Qyas iterū si prædictis rationibus leces, alteræ particulares plures nascentur.

De inxqualitate à sede arteriæ.

Est & aliquid generis diuersum inxqualitatis in uno pulsū, quod à sede arteriæ proficiscitur: ubi pars quidē nō dextrorsum, pars sinistrorsum, pars sursum, pars deorsum deflectitur: id quod accidit aut in duobus locis, aut pluribus.

De pulsū undoso & uermiculante.

Aliud item inxqualitatis unius pulsus genus est, quod uocatur undosum. Ad cuius sanē generationem minimē uidetur arteria in ea inxqualitate simul distendi uniuersa: sed primō prima eius pars, deinde secunda, mox tertia, & sic consequenter: idē cum eleuatione quadam undosa, altera unda semper priorem excipiente. Prioris siquidem partis arteriæ dilataationem, secundæ consequit, ut interueniat pulsus à motu libera nullā: ueram propemodū queti similis est finis undarum. At non reperias tamen ullam partē prius quiescentē. A uermiculante porrō hic pulsus magnitudine differt. Neque enim eos qualitas, sed quantitas separat. Vtriq; tamen, omnibusq; eorum speciebus aliquid inest cōmune, sicuti & aliquid propriū. cōmune, unde nomen uterque inuenit, undoso quidem, exurgere quasi undas in arteria alteram ab altera: uermiculanti uerō, effe uermis gressū consimilem. Differentiæ autem eorum hoc modo speciatim fiunt. Quibusdam enim rectā fertur unda: quibusdam in obliquum deflectit. Quidam etiam breui longitudine, alitrudinem insignem sortiuntur. Sunt con-

trā, qui longiores altitudinem humilem: aliquid lati sunt, nonnulli angusti, alij etiam pari celeritate præditi, alij secus. Et cōtentionis hæc etiam unda plus, illa habet minus: interim simul eff istarum differentiarum inxqualitas. Habent autem utriq; hi, tum undosi, tum uermiculantes pulsus, ut tales sint, à sola distentionis inxqualitate ipsius quantitatatis. Vna enim hæc inxqualitas, adiuncto sibi, ut partium motus alter anteuerat, alter cūcteret, huiuscemodi pulsus gignit.

De pulsū formicante.

Iam uerō ut undoso pulsui succedit uermiculans imminuto, ita formicans uermiculanti, ubi multis amissis motibus, in unū eundemq; prorsus parū defuerit. Quare inxqualitas eius præ exiguitate nos fugit. Est porrō hic pulsus paruus (quo nec alius est minor): languidissimusq; & creberrimior: nō tamen (ut quibudam uisus est) celer.

De uibrato & conuulsu pulsū.

Superfunt autem uibrati & conuulsui, qui hæctenus quidem sunt inter se similes, quod unum locum arteria non teneat, sed sursum deorsumq; agitur, naturali sese deferta. Distant tamen uel hoc ipso, quod non adeo in affectus in conuulsui uos cadat: in uibratos magnopere, admodumq; peripicuē: ac præterea, quatenus ex terminis utriusq; retrahit, contendit & conuelli conuulsui uidentur. Vibrati omni isto uacant. Ad hæc magna frequenter eff dilatatio uibratis, ac conuulsuius parua. Et partes arteriæ quædā superiora petere, quædam demuti uno eodemq; tempore apertē in uibratis cernuntur: cōuulsui uerō id perpaucis & obscure accidit. Breuiter sentias ueluti fidem quandam intensem in cōuulsuius pulsū, quæ illi res cum nullo alio conuenit. In uibratis nihil simile animaduertas. Maximē enim iaculis motum eorum, quæ magna uel emissā, celerī impetu uibrantur, asimiles. Omnes autem hosce pulsus qui præter quinq; illa prima genera in una distentione inxuales sunt, horū duorum accessio constituit, que sunt, genus inxqualitatis in arteriæ sede, & cum maturius aut serius morum partes aspicantur.

De pulsū caprizante.

Pulsus etiam caprizans inter inxuales in uno pulsū refertur: effiq; etiam compositus, experts tamen inxqualitatis utriusque, quæ primis quinque generibus adiuncta erat. Verū ubi motum arteria interpellat quapiam in parte, tum possissimum generatur, licet nō semper, sed ubi motus à quiete alter celerior primo & uehemientior oritur.

De inxqualitate crebritatis, raritatis & rhythmi, in diuersis pulsibus: quæ collectiuam inxqualitatem appellant.

Vbi omnia ordine æqua icium sunt interualla per omnes pulsus, æqualem distantiam habent tunc pulsus esse: ubi uerō partim maiora, partim minora, inxqualem in crebritate, raritateq;. Rhythmicū iam etiam eodem modo ex proportionem temporis icus ad interualli tempus cōstantem, cū deinceps maneat eadem, æqualem eum esse aiunt: quemadmodū inxqualem, ubi talis proportio uariatur,

Inxqualitas corporis arteriæ, effe in una parte non potest in diuersis fieri duobus.

Inxqualitas pulsus ab infusa materia.

Inxqualitas unius pulsus à sede arteriæ proficiscitur.

Undosus pulsus quemodo fiat.

Uermiculans pulsus ab unda sonat qualitas, sed quantitas sola distat.

Undoso & uermiculans pulsus, quæ communia, quæ propria uisunt.

Undoso pulsui succedit uermiculans.

Uermiculans pulsui succedit formicans.

Formicans pulsus est omnium minimus, nō tamē celer.

Conuulsui pulsus.

Vibrati pulsus.

Caprizans pulsus quemodo gignatur.

Collectiua inxqualitas.

Inxqualitas in crebritate, raritateq;, secundum diuersos pulsus.

Rhythmicus quædam æqualis, quædam inxqualis dicitur.

De inæqualitate crebritatis, raritatis, rhythmiq; in uno pulsu.

Inæqualitas crebritatis, raritatis & rhythmi, in uno pulsu cōmutatur. examinatur.

Partes arterie aut omnes unā motum exor-
diuntur, aut hæc quidem maturius, illæ autem tar-
dius. Si * igitur moveri omnes simul corperint,
postea autē morte, minus æquis temporibus di-
latationem alteram aggregantur, duorū gene-
rum in uno pulsu inæqualitas erit: quod uideli-
cet illa sit quædem cognata, ubi primū secunda di-
stentio cepit, in secunda tamen ipsa minimè cō-
tineatur: sicuti neq; ipse * rhythmus, nec genus
crebritatis & raritatis, cum & hæc ipsa fiant in
uno pulsu, * quamvis ut cognoscantur, omnino
secundum desiderant: quandoquidem ante huius
initium, prioris nequit finis cognosci: quo
incognito, nec crebritatem, nec raritatem, nec rhy-
thmum ualeas cognoscere. At uerò tempus partis
quæ * præ cæteris prima motu deficitur, mini-
mum est: maximum eius quæ ultima: propor-
tione autem media, in quantū aut à prima, aut à
postrema abint. Contrā æc tempora motus,
quietum tempora, longiora sunt illis quæ pri-
mæ à motu deficiunt: in illis quæ postremæ, bre-
uiora. Quare tempus motus quem habuit pars,
quæ prima moueri desit, minimum, cum maxi-
mo tempore quietis eiusdem comparatur. Et ul-
timæ tempus, quod maximum erat omnium
motus, quod minimum cōfertur quietis eius-
dem partis. Atq; ita rhythmus in singulis cōmu-
tatur, quatenus proportio temporis motus ad
quietis tempus non eadem in omnibus manet.
Si itaq; dilatatio quidem prior, in omnibus si-
mul partibus auspicetur motum, sed non pari in
omnibus tempore: secunda autē deinde & ipsa
motum incipiat, non tamen simul omnium par-
tium, sed prius quidem eius quæ prior quieue-
rat, secundo autem illius quæ secunda, atque ita
deinceps: inæqualitas quidem ita rhythmi fiet,
crebritatis & raritatis nō item. Nam quies cum
in omnibus æqua sit, differentiam in crebritate
& raritate efficit nullam: nō respōdet tamen mo-
tus tempus, tēpori quietis. Si quidem motionis
tempus nō erat omnib; par: quietis erat, ac pro-
inde nō idem omnibus rhythmus erit. Quod si
cum moueri arterie simul omnes partes cor-
perunt, non item simul omnes alteram disten-
tionem ordiantur, nec priorem terminauerint
simul, sed ne quies quidem in omnibus æqua sit,
binas in eo necesse est differentias esse. Nam cre-
britatis & raritatis in alterutra differentia inæ-
qualitas sit, ar non rhythmi tamen necessitas.
Posiunt quippe omnium partium tempora motus,
quietum temporibus respondere. Et si hoc, erit
quidem rhythmus æqualis. Sin autem eadem in
omnibus partibus proportio nō cōstat, simul
perdet rhythmus. Iam uerò ubi omnes partes
moueri corperint, motusq; æquo sint tempo-
re, si * secunda dilatationis nō idem omnes ini-
tium partes ordiantur, sed quædam maturius,
quædam incepterint serius, non erit iam rhyth-
mus æqualis, nec crebritatis raritatisq; differen-
tia. Hanc enim impares quietes inæqualem effi-
ciunt: rhythmum uerò, proportionem cōmuta-
tio. Ac pot sunt inæqualitatis utriusq; uno in pul-
su generis differentia, cum omnes unā partes ar-

Rhythmi inæqualitas quomodo fiat.

Rhythmus efficitur inæqualis, proportionem cōmutatio.

teriz distendi corperint. At ubi hæc primò, illa se-
cundò distendi corperit, si omnes simul quieue-
rint, ac dein distentionē unā alteram auspicare
sint, necessariò inæqualitas in altero tantū gene-
re fiet rhythmi. Quod si alteram distentionē ar-
teria iuxta orā sit, ac priorem, ut in utraq; disten-
tione eadem pars prior altera parti intervallo in-
cipiat, idq; sit in omnibus partibus cōstant: atq;
illa etiā simul priorē distentionē absoluerint, *
necessariò utiq; in utroq; genere inæqualitas e-
rit. Nam omne tempus quod est ex motu & in-
teruallo cōstat, omnibus est æquabile arterie
particulis. Sed motū proportionem, quod totū
tempus in æquas partes nō distribuitur, nō re-
spondent proportionibus quærit. Quare simul
inæqualis rhythmus necessarius erit singularum
partium: & quatenus tempora intermissionū diffe-
runt, etiā crebritatis raritatisq; cōiungi cum his
inæqualitatē est necessariū. Si uerò altera disten-
tio, perinde ac prior fecerat, initium motus par-
tium sit orā, non sit autem prior distentionis
finis omnibus idem, duæ differentie oriuntur.
Potest enim & longè quidem quiescere prius,
quæ prius motum est auspicata: potest etiam po-
sterius. * Si igitur tantò quieuerit prius, quantò
cepit, fiet ita æqualis ut utroque genere pulsus.
Sin multò prius atq; est auspicata quieuerit, duo
rum generū inæqualem pulsum efficiet. At si quæ
prior cepit deficiat posterior, duorū generū om-
nino inæqualitatē erabit: si uidelicet aut multò
tardius, aut paulò, quieuerit. At uerò si nec pri-
oris distentionis initium ex omnibus simul partibus
fiet, neq; secundæ, est cum rhythmus posuit esse
inæqualis, necnō crebritatis & raritatis genus.
Verūm si sic motū tempora temporibus quie-
tum respondeant, rhythmus æqualis erit. Si uerò
tempora sola paria fuerint intermissionum,
æqualitas erit in altero genere. Sed hæc infre-
quētia sunt: inæqualitates uerò permultæ. Nam
omnes possūt simul partes à motu cessare, & nō
simul. Et cū nō cessant simul, ut prius, illæ poste-
rius: iam etiā uel longè prius, uel longè tardius.

GALENI PERGAMENI de differentiis pulsuum lib. II.

Non eundem usum hic liber pollicetur, ac
primus: sed quam ueratrum rationem habet,
uel sciamonitū cum pane, & carib; eandem
quæ nunc dicemus, cum superioribus habent.
Nutrire sentim mentes illa sanas, hæc res-
secare prauas: sententias ualent, ut morbos quo-
dam. In primis autem mihi cum sophistis est bel-
lum circa usurpanda nomina. Illi quippe ipsas
res negligentes, barbaras quasdam uoces, undi-
que citra delectum contraxas, Græcorum com-
miserunt nominibus: neq; ita finē integris, legiti-
mis, sed corruptissimis: atq; ita nobis aures
obundunt, qui perpetuò sumus soliti, ut no-
minibus quæ purissimis sensum interpretemur:
ut clarissimè quis mentem suam posuit significa-
re, ita sermone uti cum opime, exultantes. Ad
hæc uerò, illi priuicquid homonymiam distin-
xerint, singula quædam conantur: unde neces-
sum est eos quanturpissimè hallucinari. Neq;
enim nomina sunt, sed terē definitiones. Proinde
quando

*Sophista res ip-
sas negligens, de
nominibus an-
ty & sollicitus.*

*Definitiones
sunt res, nō
nomina.*

Definitiones ipsas debet esse quas res.

Christi doctrinam impij subvertit Galenus

Grecam linguam vniuersi commendat Galenus.

Ad aliquid, esse commune modum.

Pulsus maioris debet, continui quousq. aut sex differentias.

Maximus pulsus. Magnus simpliciter pulsus.

Pulsus magnus et paruum, sub predicamento ad aliquid est. Et quantitatem significat. Longus pulsus. Latus. Alius. Magnitudo nula esse potest absq. dimensionibus tribus. Quantitatem vniuersi extensionis, non est magnitudinem.

quando ab uno nomine res indicantur multae, tot definitiones, quot res, necessario desiderantur. Vbi uero unius rei plura nomina habentur, una tantum definitio est opus. Porro ubi Archigenes etiam de octo qualitatibus pulsuum temerariam illam suam nobis sententiam protulit, debuisset aliquam addere, si non firmam demonstrationem, ac certe rationem ualidam: ut ne quis iniurio itarum, ueluti in Mosis & Christi schola impingens, leges audire nulla stabilitas de demonstratione. Olim etenim homo duarum linguarum peritus, ostendebatur digito, omnibusq. erat admiratio. Ad sophistam hodie nos multas ediscere uolunt, ceterum barbarissimas: cum tamen praestaret ipsos doceri unam graecam adeo ornatam & cultam, praeterea communem omnibus, ac plenam humanitatis. Quia quidem si imbutus fueris, neuiquam ut illi fateberis, omnia prima genera pulsuum, qualitates existere. Siquidem inter differentias ipsorum referri tum magnam, tum paruum, tum medium constat: necnon longum, breuem, latum, angustum, atq. alios deniq. aliter nominatos: quorum quidem omnium unum esse commune genus consistens in qualitate, nemo sane mentis fateatur. Quippe ipsius magni pulsus & parui, non qualitatem, sed aut quantitatem, aut ad aliquid, aut cõiunctam cum ad aliquid quantitatem, esse genus, rationi consentaneum uidetur. Neq. enim sumus nescij, multis generibus esse commune Ad aliquid. Si quidem albius & nigrius sunt in coloris genere. At qui color qualitas est. Jam superius & inferius etiam in genere Vbi: maturus item & tardus, in genere Quod. In alijs etiam pluribus generalibus praedicamentis, uersatur Ad aliquid. Proinde mirum non est, si in praedicamento quantitatis illi adsit etiam locus. Quare optime sanè ualeas moderatum pulsuum, qui desideratur, ostendere, si exquisitè moderatè cognoris. Ceteri in maiori pulsui, qui uidelicet moderatè excelsit, sat fuerit cõstituire quinq. aut sex differentias. Etenim illum qui omnes superet, maximè appellabimus. Qui mediū est inter maximū & mediū, simpliciter magnum. Iam interponendi huic & illi utrinq. bini alteri: unus paulo maior moderato, alter qui magno paulum cõcedit. Alius item qui magnum superet: sicuti & alius qui sit proximus maximo. Dicimus itaq. maximum & paruum pulsuum, sub predicamento Ad aliquid esse, & quantitatem significare: inesseq. utrique magnitudinem, ut magno magnam, ita paruo pusillam. Ad longum dicitur, qui longitudine excedit medium latum, qui latitudine: altus, qui profunditate: quorum intelligitur nullus in tribus dimensionibus arteriae, citra quas nulla magnitudo consistit. Siquidem quantitas uniusq. extensionis, non magnitudo, sed longitudo est: ex qua nonnullos longos & breues dicimus, non magnos uel paruos. Nec uero ita lineam unq. appellamus, sed aut longam, aut breuem. Verum corpora quae trimam dimensionē fortuntur, ea magna & parua appellamus. Proinde pulsus qui ab una dimensionē cognominantur, à magnitudinis quidem genere reijciuntur: sub eo autem qui secundum quantitatem est, continentur. Vbi igitur

à proportionē tres illae dimensiones discedunt, atq. aliqua uel aliqua illarū minuantur, uel superant, quatuor & uiginti pulsuum differentiae nascuntur: quas nos, quod uiginti septem esse obtinentiū tres dimensiones pulsuum differentias ostendemus, cum praedictis tribus in tabella proposuimus. Quibus omnibus uinum commune genus, quantitatē scilicet distentionis arteriae, inuenimus. Quod si licet etiā contractionē tactu discernere, & in hac quoq. reperiri totidē differentiae. Enimvero qui nullū aiunt longū se simpliciter pulsuum posse animo cõprehendere, cum omnino si aliqua sit praedictis latitudine & profunditate, mihi rudes primae disciplinae uidetur: quandoquidem nec magnū etiam sic concipere possent, quod uidelicet si simplex non datur, nisi simul celer uel tardus, uel uehemens, uel languidus, nec particeps sit aliarū differentiarū. Etenim quae sine alijs esse non possunt, nōne mera fatuitas est, ne cognitioni quidem representari citra illa possit. Porro ex unica dimensionē pulsus, multa nos cognoscere possumus. Nā ut certā rem demonstrare magnus pulsus potest, ita etiam altus solus, non simul cum ipso conceptis alijs dimensionibus animo. At uero pulsus binarum dimensionum, nec ad uiam & rationē quaequam faciunt eorum, qui trinis simul dimensionibus intelliguntur, & à diuidenti sunt methodo abducti. Porro ubi ex omnibus differentijs uolumus intelligere compositū ipsū, tunc ars iubet, ut propositae rei totam perspicuam naturam. Eam itaq. nos in simplices differentias resoluiamus, quod absq. eo, compositum exactè intelligi nequeat. Nisi uero totam rei naturam in unum completē, neq. in una differentia & simplici consistere ualeas, nulla erit ars, nulla uia uel ratio, nulla deniq. utilitas. Quamobrem nos primum pulsuum uniuersarum naturam diduximus in differentias, quae ipsam constituent: atq. hanc quantitarum distentionis uocauimus, illam quae latitatis ictus, aliam qualitatis tunicae, aliasq. ordine commemoratas. Deinde in his rursus simplices noniones inuestigauimus: ut quam habet rationem differentia quantitarum distentionis ad totum pulsuum ex omnibus cõstaram naturam, ita inueniatur aliud, ad hanc ipsam se similiter habens. Sunt autem differentiae omnes uniuersaeq. dimensionis, aliarum omnibus copulatae: ut in unaquaq. binarum dimensionum copulatione existant nouem differentiae, omnes uiginti septem. Adscribam unam, postea de reliquis etiam licebit discere.

Pulsuum differentiae uiginti septem.

Compositum non potest intelligi absq. ipsius rebus latente in simplicibus differentijs

1	Longus	latus
2	Longus	moderatus
3	Longus	angustus

4	Latus	moderatus
5	Moderatus	moderatus
6	Angustus	moderatus

7	Breuis	latus
8	Breuis	moderatus
9	Breuis	angustus.

In itac ergo tabella tres longitudinis differentias cõplicantes cum tribus latitudinis, nouē ei-

ficimus differentias. Altera erit eodem modo tabella, cum tribus longitudinis differentiis, con-
tinentas profunditatis tres habens. Tertia præte-
rea, in qua profunditatis tribus, copulabuntur
tres latitudinis. Erunt itaque omnes differentiæ
viginti septem, cum singulæ tabellæ novem con-
tineant. Ceterum hos omnes pulsus, qui con-
cipiuntur binii, ob dictas causas omnisimiles tradidi-
mus autem eos, qui singulis dimensionibus in-
telliguntur, numero novem : atque eos qui tri-
ni simul, quos in tabella descripsimus, viginti-
septem : quorum omnium fecimus commune genus
quantitatis differentionis. Porro excessus pulsuum
atque defectus, qui una dimensionem intelligunt, à
principio diuidere poteris : ut in magno nobis
est demonstratum. Nam moderati soli singulis di-
mensionibus recipiuntur : alij autem, plures di-
mensionibus recipiunt, ac fusi quidem natura infinitas.
Quod enim genus maiore & minore excessum
& defectum obinet, infinitas necesse est diffe-
rentias fortituri, non tamen secundum sensum.
Ergo esse quoddam omnium pulsuum qui in quan-
titate differentionis consistunt, satis ostensum est.
At quandoquidem celer quidam est, & tardus, &
moderatus, in arteriæ motu pulsus : atque horum
cōmune genus qualitas est motus : nam aliquod
invenire cōmune genus valeamus qualitatibus &
quantitatibus, nobis est attendendum. Quod si ue-
queamus, in prima referemus genera, tum quan-
titate differentionis, tum qualitate motus. Cum
autem qualitas motus differat à qualitate corporis
ipsius arteriæ, certè qualitatibus prædicamentū cō-
mune erit utriusque generi : tamen genus haud item
ambæ qualitates ullum cōmune obineat. Nam
per homonymiā utraq; affectu qualitas dicitur.
Neque enim eadem est in ambabus qualitas, sicuti
in albo & nigro, certè quæ frigido & calido. Genus au-
tem pulsuum in quantitate differentionis, à genere
motus, corporis ipsius arteriæ, planè distat : quā-
titas quidem à qualitate dissidet : atque idcirco etiā à
genere contentionis, necnon à rhythmo, & à ge-
nere ordinis & perturbationis illius, sicuti & ex-
qualitatis inæqualitatis. Quæ quidem prædi-
camento Ad aliquid attribuuntur omnia. Proinde
superest, ut illud cōparemus cum genere cre-
britatis & raritatis : nam hoc constituit videtur
quantitas temporis quietis. Sed solum idem sic rur-
sus prædicamentū reducentur : genus amborum
tamen non erit idem. Nam genere toto quanti-
tatis dimensionis corporis, à quantitate abest tem-
poris. Ac nullum sanè esse, apertū est, in pulsibus
genus aliud, quantitatibus genere differentionis. Ve-
rū differentia ipsa interdum quidem atque cō-
muniter accipiuntur, tum pro generibus, tum pro
speciebus : peculiariter autem pro illis quæ in di-
visionibus reperiuntur, quæ nec species sunt, nec
genera. Differentia tamen nomen potest omni-
bus assignari qualitatibus, quantitatibus, rela-
tionibus, & uno verbo, universis. Nam ab eo
quod differat unum ab altero, nomen differentia
factū est & conceptum. Differant autem quæ-
dam statim primis generibus prædicamentorū,
ut homo, album, bicubitale, dextrū. Nam unum
illorum est substantia, alterum qualitas, aliud
quantitas, aliud Ad aliquid. Quædam subiectis

generibus sub his ut album & triangulare. Col-
lor enim, illius est genus : huius figura. Hæc rur-
sus ambo prædicamento subiecta sunt Qualita-
tis. Itaque albo primū prædicamentum cum trian-
gulari conuenit : est enim utriusque qualitas : ceterū
generis sunt diuersi, hoc figurarū, illud col-
lorum. Alia iam specie differunt, cum non diffe-
rant genere : ut album & flauū. Similiter alia dif-
ferunt numero : ut, gratia exempli, album ab hoc
albo, peculiari quadam differentia dissidet, sed
eidem speciei subdum est, albo : præterea utrius-
que idem genus est color, & cōmune prædi-
camentū Qualitas. Atque ita quodlibet à quo-
uis, alterum ab altero prorsus aliquatenus diffe-
ret. Quando igitur differentia à differendo ap-
pellata est, & inuenta : differre autem tum indi-
uidua, tum species, tum genera inueniuntur sub-
alterna, & semel omnia quæ aliquo modo sunt :
differentiaque rebus omnibus inest, nō autē qua-
litas : malè utique Aristoteles prima genera diffe-
rentiarum pulsuum, qualitates uocauit : nos autē
rectè, atque ordine, cum hæc, tum alia omnia, dif-
ferentias. Quæ etiam uniuerso operi titulum fe-
cimus, de differentiis pulsuum.

GALENI PERGAMENTI de differentiis pulsuum lib. III.

Tamor sapientia atque honesti singulis iuxta
placere (ut ait tragicus) nulla foret mortali-
bus contentio ambigua. Nunc quia non ui-
detur omnibus idem nec honestum, nec sapiens
esse, neque etiam uerum, necessariō controuersia
nascitur. Ceterum qui in dubia opinione uersat-
ur, quod non assequatur scientiam, ei coudo-
nandum fuerit. At qui de nominibus digladiat-
ur, nec ullum licet faciant finem aut modum, mi-
nimè mihi uenia digni uidentur. Nam rerū cum
sit ea obscuritas, ut si uel in tripulum hæc uita uo-
stra prorogaretur, ne tum quidem exactè co-
gnoscere omnia possemus (qua ratione adduc-
tus Hippocrates, uitam ait esse breuem, & ar-
tem longam) quo modo, qui in ipsis quæ ab re
sunt tempus conterit, absurditatis impudèntia
noram abneget? Etenim de nominibus labora-
re, est prorsus operam ludere : res autem ipsas ex-
pendere, artes locupletare. Perinde si quidem est
si uocemus ipsum pulsuum Dionem : dicamus au-
tem illum dignosci exactè, si comprimamus ar-
teriam, nec leuiter attingamus : necnon pulsuum
proficisci à robore facultatis uitalis, esseque signū
salubre in morbis : & præterea quales indicatio-
nes soleat promittere. Porro ipsius robore ictus,
in tactus impulsu, repulsiu, subuersioneque pos-
sum esse, omnibus in professo est : at à qua cau-
sa fiat, controuersum existit : unusquisque liqui-
dem propriam opinionem tueri. Otius autem
Mosis affectus & Christi sua deserant dogmata,
quim qui sectis addicti & consecrati sunt, tum
medici, tum philosophi. Itaque inter pulsus est
quidam, qui tactum ipsum subuerit : id est, ual-
de & cum renixu quoddam pulsus. Dignoscitur
autem is, ubi plurimum infirmus digitos, non
leniter palpamus. Causa eius existit, facultatis ro-
bur pulsus efficientis. Proinde si de medicis uo-
cabulis primō omnis uostrā potestas sit insti-
tuendis,

Moderati pul-
sus soli singulis
generibus indi-
uisionibus sunt.

Differentia ma-
ior uide fit de
tunc.

Pulsus differe-
ntia autem genera pri-
ma, Aristoteles
proprie qualis
latet uocant.

Ceterum qui
de nominibus
digladiatur.

Vita breuis,
ars longa.

Pulsus profici-
scit à robore fa-
cultatis uitalis.

Robor ipsum ar-
tem uocant, illud,
in quoniam pos-
sum fit.

Christianorum
confessio sum-
ma Galenus ex-
primat.

Differentia in-
terdum accipi pro
generibus specie-
busque.

Differentia ma-
ior quibus pos-
sit accideret.

Pulsus cunctus.

tuendis, contentum eum pulsum, non uehementem uocemus. Nunc quia à pluribus iampridem uehementis est uocatus, nomen nihil mutamus: tamen non minus necesse, uehementem nomen actioni semper tribui, contente simulatque citate. Iam uero dum uacuum pulsum appellant, cum nihil omnino uacuum in orbe detur, bisariam illum interpretabimur. Nam aut arteriam sic intelligemus uacuum, ut quæ aërem tantum continet: & quamquam fit plurimum inflata & distenta, uacua tamen fit appellanda, ut inflatus culeus uacuum dicatur uino: aut ita illam uacuam esse dicemus ut utres ipsos, quidam aëre ex pulso, eorum tunice confidunt. Ac prima sane significatio erit pulsus talis, qualem Erasistratus natura cum semper afferit esse: altera uisui à paruo differet. Itaque necessum uidetur, ut aut paruum pulsum, aut aëreum, uocemus uacuum: itemque contrarios non plenos, magnum scilicet, atque cum qui humidam speciem refert. Præcipue aut

Plenum aut uacuum vas præcipue dicitur in medicina ratione.

Metaphorice est ableganda ab artificiosa doctrina.

Similiter corpus uacuum esse plenum aut uacuum.

Dura que sunt, mollia que.

Tactus dicitur durus, mollis.

Mollis est que cedens tactui.

Dura est que non cedens tactui.

Aristoteles præferunt Platoni.

Molle est quod in seipsum cadit nec migrat alio.

Durius est quod non cedens tactui.

Qualitas tactui quædam sunt.

tamen infuse substantiæ ratione appellare licet plenum aut uacuum uas: ratione autem tunicarum arteriarum, aliter: quas rectius sanè duras & molles, non plenas uel uacuas appelles: cum simile corpus (nisi per metaphoram, quæ à disciplina artificiosa ableganda est) quod uacuum uocetur uel plenum, sit nullum. Quædoquidem autem omnia corpora, ex terra, aqua, igne, & aëre constata sunt: in quibus exuperat quidem uel terrestre elementum, uel aqueum à gelu concretum, non possunt ea non dura esse: in quibus uero igneum, uel aëreum, uel humidum elementum excellit, non concretum, necessum est ea mollia existant. Præterea si prædicta foraminibus sint, uel meatibus, si superior ibi sit terrestris substantia, uel aquosa concreta, facit necessarium ad totius duritiem corporis: sit subtilis uel humida, sed non concreta, ad mollitiem. Est autem in nobis tactus iudex corporis duri mollisque. Quem quidem dum applicamus obiectis, quæ ostendimus illum admittere, & quasi subeunt cedere, mollia appellamus. Contrarij, quæ uim afferunt cuti nostræ, & protrudunt, si hæc cedens urgentia intus excipiat, dura illa uocamus. At si omnino cedat & denique ab urgente, id quod concidit, imbecillus omnes: quod denique, ualidius appellant. Porro Aristoteles climatijs quam Platoni non id quod cedit, appellat molle: sed ei addit, modum, quod in seipsum: modum, quod loco non dimouetur. Quod si simul utrumque addamus, ut in secundo libro de Generatione & interitu Aristoteles fecit, ac molle dicamus esse, quod in seipsum cedit, nec migrat alio, ad huc definiemus aptius: utriusque siquidem soli accidit molli. Nam cedere quidem, commune symptoma est molli, & imbecilli: in seipsum, solius est molli: ut non in seipsum, imbecilli tantum. Præterea, ut in uicinum locum migratio, proprium infirmi est: ita non demigrare, unius molli. Iam uero, ut tangibile est corpus durum, sic durities est qualitas tactus. Siquidem qualitates tactiles sunt, calor, frigus, humiditas, siccitas, grauitas, leuitas, durities, mollietas, lentor, friabilitas, asperitas, Igur, crassities atque tenuitas. Quæ omnes exprimi tangibiles qualitates possunt, & corpora non secus

ijs prædicta. Quippe horum pariter septem sunt oppositæ coniugationes, & nomina quatuordecim. Prima est oppositio calidi & frigidi. Secunda, sicci & humidii. Tertia, grauis & leuis. Quarta, duri & mollii. Quinta, leni & friabili. Sexta, asperi & læui. Septima, crassi atque tenuis. Durum igitur corpus, quod sic proprie & primarie appellatur, renititur, & nihil tangenti cedit. Quia uero multa corpori duro accidunt, unumquodque eorum metaphoras nobis suppeditat: inter quas sanè ut repudiamus obscuras & rectas, sic probamus illas, quæ apertam illustremque similitudinem præ se ferunt. Ut, dum legem duram & iudicem dicunt, qui à uenia dan da sunt omnino alieni. Corpus itaque arteriarum, uel durum, uel molle primò & præcipue est dicendum. At pulsus eius statim denuncians, non proprie, nec primò, sed per accidens uenit durus aut molliis uocandus.

Tactum corporum septem oppositum.

Durum corpus simpliciter.

Metaphora que non sunt recipienda.

Pulsus dici durum aut molle ex accidenti.

GAL. DE DIFFERENTIIS PULSVVM LIB. III.

At uero, ubi etiam ante definitiones, ipsæ res notæ existit, nullus profecto est usus definitionum: quemadmodum in pulsus appellatione, quam intelligunt etiam omnes mortales, nec medi. Proinde in cunctis sunt, qui circa definitionem pulsuum inter se maxime digladiantur, alij aliud esse pulsuum censentes. Sunt porro definitionum prima genera duo: alterum quod planè rei notionem explicat: alterum, quod ipsam essentiam docet. Virtus est sua utrique definitioni: illi quæ notionem explicat, ut omnibus sit testata, qui eodem sermone utuntur, & ad rei essentiam ne aspiret. Huc quæ essentiam docet, ut ei quæ notionem subijcit, consentiant, non sit tamen cum ea eadem. Ac prima quidem debet ex seipsa fidem habere, res perspicuas explicans, manifestatque. Vnde Aristoteles eam definitionem nominis appellauit: sicuti alteram esse definitionem ait, quæ quid sit, explanat. Etenim quibuscumque in partibus cutis, non modò tactu, sed etiam oculis, motu quendam percipimus. Qui quidem ut ipsi qui rectè se habent, in multis corporis partibus cernitur: de quibus est carpus manus. Palpi siquidem illic deprehendimus ascensum quendam atque descensum, præterea mediam intermissionem. Quam sanè notionem omnes pulsuum appellant. Hinc qui breuius posuit interpretari, optimè definitionem ille notionis effecerit, si nec omittat quicquam, nec superfluum aliquid addat. Vt si dicat, cum talem motum, esse arteriarum pulsuum. At si quis tunicas arteriarum explorat, facultatque reperit quæ arteriarum motionem excitat, ipsiusque motionis usum cognorit, is certe ut prætergressus notionem est, sic uniuersam essentiam pulsuum generationis tenuit. Veritatem istam quidem nequeas definitionem uniuersam complecti. Vnde de, ut nulla pulsuum definitio proficiat essentialis constitui possit: aut certe prælonga erit. Sensibilis itaque illi arteriarum motus (quem quædam interpellat diximus pulsus uocatur. Nihil autem aptius est, quam motum ipsum in altum, latum & longum extendi, in gracilibus corporum, atque in maximis pulsibus. Ceterum

Definitionis prima genera duo, notione uel essentiale.

Definitionis nominis.

Definitionis quæ explanans.

Arteriarum motum in corpore esse uocem perceptibilem.

Pulsuum essentiale definitio, quæ breuem sit, nulla constare potest.

Pulsus quid.

*Pulsus vsus est
totela inuacua
laria.*

*Arteria attra-
hens duo dela-
tentur: ex pulsi-
one contrahit
vires.*

*Pulsus defini-
tio essentialis.*

*Conuulsio ex
tremor, in solis
conficit nervis.
Pulsationem,
fieri etiam in cute*

*Rarus ex cre-
brius dei pul-
sum, et respira-
tionem, pro dis-
tinctione quatuor
intercurrentium
motibus.*

*Pulsus esse mi-
sum motu, aut
Zeno.*

*Definitio rerum
qua in gene-
ratione efficiuntur,
que habentur
optima.*

integram pulsus definitionem feceris, si usum
eorum generationis adiunxeris, quæ rutela in-
nati caloris existit. Facit autem ad procreandum
animalem spiritum, illa spiritalis substantia, quam
arterie continent. Atque attrahunt quidem arte-
rie, dum dilatarunt: excurrent autem dum con-
trahuntur. Igitur definitio essentialis, quæ oratio
est rei efficientiam edocet, necessarium est genus
explicatura, & differentias, & usum generatio-
nis: causam item efficientem, & materialem, aut
instrumentalem, aut utrunque appellare volueris.
ut Genus, aut motum, aut actionem, aut pas-
sionem arteriarum. Differentias, quod per disten-
sionem & contractionem, quodque sponte. Usus,
quod innati caloris nomine, vel spiritus vitalis
gignendi, aut herede etiam animalis. Causam ef-
ficientem, quod vis sit quædam cor distendens
& arterias, aut vitalis, aut animalis, aut utraque.
Materialem denique & instrumentalem, conforma-
tionem arteriarum ad actionem, uidetur de-
monstratura. Atque ita suam quæque secta ratio-
nalis, fortiter definitionem. Nos uero dicemus
pulsus esse peculiarem actionem, cordis præci-
pue, deinde arteriarum, quæ distensione & con-
tractione mouentur à facultate uitali, quod caloris
natus medicocritas retineatur, generetur au-
tem in cerebro spiritus animalis. Verum apud ryo-
nes cuiusvis disciplinæ, minimè sanè profere-
re substantiales definitiones sunt: sed ubi à no-
tione exoritur, ad efficiendos eos notitiam ducimus,
hic iam, promptæ memoriæ gratia, rem uniuersam
limitata complecti ratione fuerit expediens.
Cum ualeamus igitur, cordis & arteriarum mo-
tus, quando illa distenduntur undequeque, rur-
susque in se confidunt, pro dignitate obeuntur.
Sin autem ægrotemus, ut palpitans, uel concu-
tiens, uel conuulsus, uel tremulus motus arte-
riarum appareat, nil noui est, si pulsus uocemus
modo conuulsus, modo uibratus, interdum pal-
pitantem, interdum tremulum. Quamquam cer-
te conuulsio ipsa tremor, in solis contingit ner-
uis. Nam palpitatio peripneue etiam fieri in cute
cernas: sicuti & in carnosius partibus, quæ portio-
nes sunt musculorum. Porro quietes pulsus longè
obscuriores sunt, quam respirationis: ob idque
nonnulli eas inter partes pulsus minimè annu-
merant. Quæsit autem thorax & pulmo id tem-
poris quod intercedit inter ingressum spiritus,
& eiusdem exitum. Ac pro tempore quidem ha-
rum quietum, raram appellant, uel crebram re-
spirationem. Similiter dicuntur rarus & creber
pulsus: suntque nunc cum æqualitate sua & inæ-
qualitate, cumque ordine & illius perturbatione,
ex eorum genere, quæ non parua nunciant. Ita-
dem intermittens pulsus & intercurrentes, ex eod-
em quo genere, futurorum sunt haud negligenda
signa. Non perperam autem Zeno mixtum
quendam motum aut esse pulsus, non simplicem,
neque uniformem: cum ex contrariis motibus con-
stet, ut motus respirationis. Porro quod com-
une est omnibus pulsibus, id debet in definitio-
ne proferri: nempe res per quam pulsus concipi-
untur, dicunturque, non per quam certi quidam
pulsus. Ad hæc, rerum quæ in generatione sunt,
definitio causam efficientem complectens, opti-

ma habetur: de quibus est pulsus, qui ut ceteri
motus, dum sit, est. In uniuersum igitur, defini-
tione quidem significationem explicare propo-
sui nominis, si quidem proposuimus rem non om-
nes planè assequantur, non dico cōducit, sed ne-
cessariò est. Necessarium etiam, ubi quis uel uerba
de indultia, uel præ stupore imprudens, signifi-
cationes commutet nominum, tribus alijs rebus,
ac omnes homines. At si abique utroque horum sit,
omnino res non est aperienda definitione: quod
sui ipsam nomen abundè declarat. Nam defini-
re omnia uelle, ad sophisticum pertinet disciplinæ.

*Definitio quæ
da est res expli-
canda, et quæ
da minima.*

*Definitio omnia
uelli, ad sophisti-
cum pertinet di-
sciplinæ.*

GALENI PERGAMENI de dignoscendo pulsibus li- ber primus.



Peculatio autem hæc quæ ad pul-
sum dignoscendum spectat, minimè
quidem oratione prolixam deside-
rat, sed tempus aliquod simul omnibus
longius: quandoquidem tactu est
nobis opus exercitatio, ut uel paruum eorum ex-
actè differentiam sentiamus: nec in nostra manu
est illius exercitatio. Itaque ad exercendum tactum
medicus plurimū temporis postulat, utpote cui
plurimū uno eodemque tempore affectus arterie
sint perpendendi: primū distensionis quantitas:
dein qualitas & tempus motus: quin & mouen-
tis facultatis cōtenno, ac denique ipsius tunice ar-
terie status. Hæc enim simulatque illa attollitur,
omnia sunt cognoscenda. Quænam caloris qua-
litate, * impulsus, qui in arterie motione sit, a-
pertius indicat: & etiam æqualiter an inæquali-
ter illa quæ memorauimus omnia, una in parte
& in diuersis fiant. Atque in distensione & con-
tractione sunt. In contractione sanè similia illis:
præterea tempus inter utrumque mediū, quo quæ
scit, duplex illud: unū à distensione ante contra-
ctionē: alterū à contractione ante distensionē:
& horum mutua proportio, uidelicet temporis
motus ad tempus motus, temporis quietis ad
tempus quietis, & utriusque simul ad utrumque. Quæ
sunt uniuersa ante alterū arterie ictum cognos-
cenda, cōfecto iam primo pulsu. Nam cum iam
alter inciperet, cum ipso prima tum attenden-
da quæ declarata in priori fuerūt: tum uero quod
æqualitatem eorū & inæqualitatem percipias,
omnesque differentias, quæ in illo sunt expositæ,
cum ipsæ quæ in hoc, cōferenda sunt. Inde tres,
quatuor, quinque, atque adeo multi deinceps
sunt pulsus uidendi, ut ordo tibi atque cōfusio sit
explorata. Ad quorum omnium absolutissimam
cognitionem, totam humanā requiri uitam exi-
stimo. Quamquam certè exercitatio assidue, uel
tandem scientificam cognitionem conciliat,
cum maximo emolumento: ubi quispiam fuerit,
ut ueritatis studio accensus, sic ab immensa diui-
tiarum siti, ac gloriæ cupiditate (quæ hodie diu-
60 minatur inter mortales) alienus. Neque uero deli-
ciji dedatos, sed egregie nauos industriou, hæc
cōmentatio desiderat. Porro dum pulsus à demo-
neter manus, hic quidam firmus est infingenda,
illuc applicanda leuius, ut in nehermeti & lan-
guido pulsu. Nam illum, nisi premas arteriam,
non

*Pulsus dignos-
cendi admodum
longum tempus
desiderari.*

*Tangenti arte-
riam, quæ simul
sint perpenden-
da, ad dignos-
cendum pulsuum.*

*Vitam humanā
totam desiderari
ad certā di-
gnoscendum pul-
sum.*

*Exercitatio assidue
vires, et fieri
certificam cogni-
tionem cōducit.*

*Pulsus uoluntate
si, firmius in-
genda est ma-
nus: et languis
applicanda lenius.*

nō dignoscas : hunc tantum abest ut cognoscas premendo, ut semel etiam si ita facias, uideatur immotus. In consensu autē pulsū, aut minime sentiri dīfēto, aut parum certē & obfcurē uide tur:arteria nimirum ipsa in fīdis modū fursum deorsumq; iactata. Similiter etiam fit & uibratus pulsus, ubi arteria propriam sedem deseruit. Si tamen animum intendamus, oō modō ictus (ut opinatur Empirici) fit dīfēto etiam om nium pulsuum, tactū ipso cognoscitur. Quōd autem contractio etiam sentiri possit, his ratio nibus euadet perspicuum. Quandoquidem tan gentia corpora partim leniter sefe ac mutuō ran gunt, palpitantia duntaxat: partim uerō urgent, impellunt, euertuntq; atq; ita quōd fortius est & durius, ueluti subitū probecilius & mollius: al terum autē cedit, euertiturq; ac ueluti amplectitur id quod urget: sanē dīfēctus eorum mutuus nō potest eodem modo effici: ceterū quē in su perficite tangunt, discedunt subitō. At quē ce dente molliore, longius progressa, ueluti intrāt illud, nō reuertunt item subito: sed quantō ā pri mo occurfu progressa penitus urgebant, tantū illis discedentibus sensibile superest. Tempus namq; intercedet inter primū impetum disceden di, & extremū finem, secundum quem non dīce dere amplius, sed subsistere iam dicentur. Quo tempore toto, paulatim discedente altero, paula rim etiam alterius emissio pressu, utriusq; sen tietur motus. Iam si hoc accedat, ut quod ab imo mouetur, feratur fursum: & quod tangit, si perne incumbat: prater hoc, quōd pressus ei qd incumbit, detrahatur, etiam accidit ei, ut ueluti subfidat: quia quod prius excipiebat, & fursum impellebat, nunc defertur. Quorum sanē omniū in uesicis ipsis & uetribus, possis periculum face re, cognoscereq; sic se habere contactus corpo rum, atque recessus, ut diximus. Sentimus itaq; ab immissione uehementem pulsuum, carnem nostram, unā cum ambiente illam cute, repelli: huius autem est adiuncta mori & premennis co gnitio. Quin etiam recedente arteria sentimus in ipso corpore nostro motum. Siquidem intrō compressa, siue ea cunis est, siue carnis pars, co mitatur descendente arteriam, pristinam se dem, qua deiecta erat, occupans: simulq; fit, ut in recessu cognitionem uetiāmus. Nam senti mus primos omniū, affectus nostrorū corporū: deinde, quē hos induxerunt foris obiecia. Vbi igitur ā premendo recedit arteria, sola inquali tas pressus, sed etiam & contractionē eius annun ciat. Porro languidos pulsus, si quis leniter ran gendos illos ignoret, fortasse abolitum homini pulsū ducet: qui quidē mentis inde, quōd oō rectē ipsos tetigerit. Contrā planē uehementes, quōd ipsorū deprehendatur robur, requirunt ut qui tangunt, digitos ualde infingant. Repelli em̄ hoc tibi magis uidebuntur, quōd eos urges magis. Vnde etiam contractionem omnes uehe mentes pulsus habent sensibilem: languidorum uerō nullus. Ceterū qui maximus simul & ue hementissimus durusq; sit (quatenus coniungi cum magnitudine duritiei ualeat) non autē ue lox, hic apertissimū habet contractionē. Omnes alij, quatenus plus uel minus de illorū aliquo ha

beant adiunctum, eatenus percipientur aut faci lius aut uigrius. At uerō non ut maximos simul & uehementissimos, ita durissimos eosdemq; maximos unquam pulsus repetas: ac ne duos pariter & maximos: sed qui inter durum & mol lem medius est pulsus, cum maximo connexus inuenitur frequenter. Etiam durum simul ac ue hementem non raro eundem cernas: sicuti & durum simul & uehementissimū. At uehemen tissimus & durissimus nunquam idem pulsus existit: nec maximus, uehementissimusq; atque idem tardissimus. Quippe maximū & uehemen tissimū maiori ex parte sunt celes: fin minus, at nō tardi. Vehementissimus ergo & maximus, qui nec mollis sit, nec uelox, clarissimam contractionē adducet. Claram etiam uehementissimus certē, & magnus, & durus, & etiam uehemen tes simul & magni, & duri. Minus autem quā horum, sed euident tamen contractio uehemen tis, magni, & mollis existit. Manifesta adliuc ue hementis simul & moderatē magnitudine atq; duritia. Imō uerō qui tribus differentijs est mo deratus, perspicuum adhuc contractionem for titur. Ar non facili contractio uehementis & parui, qui omnino etiam durus est, cognoscitur. Ar parui, duriq; sed contentione moderata, etiam obfcurior est. Iam si paruus nec durus sit, & moderato robore, ut deprehendatur is, sen sum flagras probe exercitaturus. Languidus pul sus, neq; cum magno coniunctus, neq; cum par uo, apertam obtrinet contractionem. Is si cum duro iungatur, necessariō erit miuissus. Iraque non cuiusuis pulsus potest cōtractio sentiri: nec quorū potest, perinde omnium est euident. Ceterū uel uehementis, uel non languidus is pul sus sit, est occesse, qui sensibile tangentibus co ntractionem fuerit reperiaturus. Porro ex his, qui moderato sunt corpore, & temperata natura, in flore ætatis, maxime Vere inter anni tempora, regionemq; incolunt temperatam, at que robusti sunt, & omni macrore, metu, saturi tate, motuq; uacui, hi pulsū uehementem ma gnumq; omnes habent. Qui si se moderatē exer cuerint, fortisq; sint modicis balneis, uel uini non permultum hauserint, uel irati sint, uel aliquam operam strenuam nauauerint, non magnos iam & uehementes tantū, sed quāmaximos, uehementissimosq; pulsus habebūt. Idem si la borent sincera tertiana, uel ardenti, miti, & sim plici, uel qua alia magnopere calida, & ueluti fer uente febris: preterea diariorum aliqua, quæ ex bubone proficiuntur, & ex aduotionibus, mo dicisq; lasitudinibus, maximos etiam tum, & ue hementissimos pulsus habebunt. Quorum quidē fit arterias contringas, clarissimē contractio nem persenties. Nam ut maximum & recessus arte ris ipsatum & tempus in illis est, sic apertissima eius erit cognitio. Sed oōm̄hil est conductu du rities, ad percipiendam systolem, quem ad um ictus magno pete conserat. Quōd igitur disten tionis uolentia semper respondeat contractio nis sensus, hoc contractio dignoscitur clari us, quō uolētriorib; succedet dilatationib;. Ma gnus tamē pulsus haud facili cū duro miscet. Ce terū quib; ualida uitalis facultas est, sed in ictu

Durissimus si mel et maximos pulsus non reperiit requiem. Pulsus inter si curantur, & qui curat nō possunt.

Contractio ar teriarum in qui bus cōtricta sit pulsus, & in quibus obfcura

Contractio nem exaltaturus seu sistens pulsus, qualis uero esse debeat. Pulsus ueluti magnis quib; alij.

Diaris febres unde proficiuntur.

Arteria duritē cōtricta plurimū ad percipiendā systolem.

Consensum pulsus.

Vibratus pulsus

Contractio nem pulsus etiam seu ter possit.

Arteria systole quādo deprehendatur.

Pulsus languidus esse leniter contrahendus.

Pulsus uehementis in suis ualde apprehendendi.

delinquit, ac precipue in uini intempestua por-
tione, ipsi tales pulsus contingunt, conspicui est
in eis ipsius arterie contractio. Iam tarditas, quā-
tum augeat recessus tempus, tantō manifestiorē
motum ostendit. Quod uerō ad manus applica-
tionē pertinet, si comprimendo applicemus ta-
ctum, nulla differentia sensibilis ex manus super
arteriam, uel subter, applicatione inueniatur.
Vel si palpendo tantum, ueluti suspensus digitis,
ne tum quidem ullam differentiam animaduuer-
tamus. At tertius applicandi modus, qui medius
est inter compressionem & palparationē leuem,
ne obiri quidem potest, si infernē tangas arte-
riam. Siquidem liberare oportet tum manū om-
nibus uoluntariis motibus, & ueluti languidam
ad mouere. Quod nō fecerimus, delabatur ma-
nus à grauitate depressa, ut minus contractare
possit arteriam. Proinde supernē attingere tan-
tūm licebit, infernē autem nequāq̃. Quatenus
igitur in uehementibus magnis, nec uelocibus
pulsibus, ab arterie distentionibus tactū repel-
li accidit: hæcenus recedente illa, sensibilis con-
tractio fiat, necesse est. At uerō contractionē ma-
gis comprimendo, quā leniter attingendo, dig-
nosces: nec minus si infernē tangamus, quā si
supernē: quod perinde utrobique arterie con-
tractionem tactus sequatur. Verum manus ipsa
quæ tanget, non modò promptē sentiat oportet,
uerumetiam sit mollis: sic enim uel minimus
motus dignoscitur. Similiter etiam, si per lon-
gus interuallum feratur, clarius contractionem
percipiet. Etenim media applicatio quæ citra ul-
lam uim fit, hæcenus motum sentiet in pulsi-
bus minimē certē languidis, quatenus uisus: in
languidis uerō sentiendis, etiam uisui cōcedet.
Altera, cū premimus, in languidis, supra pri-
mam, motum arterie obscurabit: in uehementi-
bus percipiet præ cæteris. At tertia, quæ ueluti su-
spendimus manum, motum sanē quambreuem
sentiet. Iam uerō maximæ quidem arterie, quæ
secundum dorsum est sita, cuius fugit pridem
motus, simulatque contabuit animal, ad abdo-
men motus percipitur. Arterie quippe, leuiora
corpora, ubi distenduntur, faciliē secum attol-
lunt: grauiora ægrius, prægrauia autem ne mo-
uent quidem. Hinc fit, ut crasis pulsus exiguus
insit, quod uidelicet longitudo eius minuat, &
latitudo fiat limitatior, cōstricta nimirū à mul-
ta carne. Ascensus item in illis ubertate corporū
incumbentiū supprimitur. Gracilium uerō, cæte-
rū robustorum, insignem latitudinem & lon-
gitudinem pulsus habet, conspicuū etiam ascen-
sum. Verumenimvero initium distentionis no-
strum sensum effugere, cū ob corpora quæ de-
grauat arteriā, tum interdum etiam ob internæ
quietis magnitudinē, nemini obscurū existimo:
quemadmodum & ipsius contractionis finem.
Nam cū maiorem motum in contractionibus
nō sentiamus, sed uel parē ac in distentionibus,
uel quod uerum est, minorem: omnem autem
in distentionibus non percipimus: planum est
utiq̃, nec totum nos percepturos in contractio-
nibus. Tanta autē pars distentionis nō sentitur,
quanta inter arterie primum impetum motus,
& ictus usq̃ ad nostrum tactum distributionem

intercedit. Similiter quando tantā senecimus con-
tractionis partem, quantā distentionis, aut pau-
lō minorē: erit etiam contractionis pars illa quæ
nō sentitur, pars distentionis parti, aut aliquantū
maior. At uerō arterie interna & externa quies,
per accedens pulsus partes dicunt. Quarū exter-
nam quidem, simpliciter manū admouēs, quan-
ta illa sit, maximē deprehendēs: aut si etiā preme-
re libeat, idq̃ in uehementissimis pulsibus, uide-
licet urgendo hæcenus, ut motum ipsum nō lax-
das. Internam autem si premas, quoad tibi per
præsentem liceat uehementem, ira maximē il-
lam dignoscēs. Atque externam quidem totam
quietem, si ordine attingas, planē animaduuer-
tes: internam uerō, uā cum partibus quæ senti-
ri nequeunt, utriusq̃ motus, sine uidelicet con-
tractionis, & distentionis initio. Vbi igitur di-
gnosce re externam quietem est animus, citra ul-
lam uim applicare tactum debemus. Contrā, in-
ternam, si uergas comprimās, non cognos-
cas. Nam contractioni arterie constantissimē
debet hære tactus. At premere minimē nisi in
uehementioribus licet. Liqueat itaq̃, in his etiam
solis internam quietem posse dignosci: imō ne
hic quidem exactē, sed plerūq̃ sanē multo ma-
iorem quā reuera sit: interdum paulō, attra-
ment adhuc illam maiorem animaduertes. Ne-
cessario enim duo ei tempora accedit partium
insensibilium utriusq̃ motus: & quod ad finem
contractionis est, & quod in distentionis prin-
cipio. Quæ cū aliis aliam longitudinem ha-
beant, nec parē semper accessionem tempus
internæ quietis habebit, nec exactē unquam di-
gnosci poterit.

GALENI PERGAMENI de dignoscendis pulsibus li- ber secundus.

DEINCEPS autem quæ partibus pulsū in-
sunt, accuratē exponamus, à distentione
auspicati: quod princeps hæc pulsuum
pars sit, & plurimam habeat cognitionis in se u-
rietatem, plurimumq̃ ad præstigiendum sit u-
tilis. Porro cū multa sint quæ distentionibus
insunt, inter ea omnia motus principalissimas
partes occupat, ex ratione substantiæ pulsuum,
maximē ad illas pertinet. Omnis autem mo-
tus tempus habet, quo fit: præterea celeritatem
uel tarditatem, uel æqualitatem, uel inæquali-
tatem: ad hæc, ubi feratur, spaciū. At aliter ul-
detur tempus dignosci, aliter tarditas & celeritas.
Neque enim si motionis sit breuius tempus,
continū pulsū dixero celeriore existere. Est
autem pulsus celer, qui in paucō tempore mo-
tum finit: tardus, qui multo. Cæterum motus
prædix longiori tempore pulsus, est nō raro ue-
locior eo, qui breuius obit. Hallucinant igitur
qui formicantē pulsū, quod imbecillus, cre-
ber, & paruus sit, celerem esse existimant. Siquidem
ad iudicandam motus alicuius celeritatem,
non modò temporis, sed spacii etiam in quo fit
motus, ratio est habenda. Nam fieri non potest,
quin arteria quæ breuissimo intervallo uehitur,
minus consumat temporis, quā quæ maximo.

Sigritur

Applicatio manus ad corpus
qualis mobilis
sit.

Contractio arterie
qualiter sentienda
sit.

Manus tangendo
apta qualis
nam esse debeat

Applicationis
manus ad cor-
pus tres differe-
ntiæ.

Arteria dorsalis
pulsus in labo-
re ad obdormire
discreuit.

Crisis pulsus
exiguus cur ad-
sit.

Gracilibus si-
milis et ualidis
pulsus esse om-
ni dimensionem
conspiciunt.
Initium disten-
sionis arterie, et
contractionis
finem, cur uisui
sensum effugiat.

Quies arterie
per accedens pul-
sus partes dicuntur.

Quies arterie
dignoscenda
ratione.

Quies interna
tempus in pulsū
non possit exacte
dignosci.

Distinctionem
quæ principis pul-
sus partem plan-
tationis ad præ-
stigiandum con-
ducit.

Motus quæ in-
sunt.

Pulsus celer et
tardus, qui sunt.

Formicantem
pulsū non esse
celerem.

*Celeritati pul-
suum dydncan
de quid repre-
dere oporteat.*

Si igitur & spacium spacio, & tempus tēpō deat
tempori, quē celeres fieri motus dicemus. Si ue-
rō maior sit proportio spaciū ad spaciū, quā
temporis ad tempus: uel temporis ad tempus,
quā spaciū ad spaciū: hos motus minime exi-
stimus pari celeritate fieri. Si quidem si spaciū
cum spacio collati maior sit proportio, quā
temporis comparati cum tempore, manifestum
est cum motum necessāriō celeriorē existerē.
Contrā, si prioris motus spaciū minorem ha-
beat proportionē ad spaciū alterius, quā
tempus, priorē necessariō erit tardior. Fingamus
igitur iam duos ascēsu impares pulsūs, sitq; pro-
funditas profunditatis decupla, & tempus tem-
poris duplū: pulsūs certē, cuius altitudo erit de-
cupla, multo erit celerior altero. Nam humilis si
in eodem confinis motu, decuplo in profundi-
tatis dimensionē inuerterit, sit ille quidē & quē
a celer altus, sed tēpore longē maior, q̄ ille. In-
uentus itaq; est humilis pulsūs breui tēpore du-
rans, qui alio diuturno sit tardior. Iam uerō ue-
rō uermicans atq; formicans pulsūs mutuo inter se cō-
uertuntur: quippe ut uermiculantis extremis
delapsus formicantem gignit, ita formicantis
incrementum generat uermiculantem. Quā-
plurimū autem interet, tardiorē dicas aliqūē
motum, an tardum: celeriorē, an celerem. Si-
quidem celer & tardus proferuntur absoluto ser-
mone: at celerior tardiorq; rēferuntur ad alter-
um. Similibs in alijs differentijs esse ratio uide-
tur. Porro magnus & paruus, sicut & maior &
minor pulsūs, si non ad relationis, at certē ad
quantitatis predicamentum spectant. Dicimus
autem unamquāq; rem magnā uel paruā,
non absolute, sed cum alijs sui generis compara-
tam. Atq; hoc sanē inter magnū & maius inter-
et, quōd maius quidem omni minori possit ma-
ius dici: magnū uerō nō quolibet maius, sed tan-
tū cognari. Eadem de minore & paruo distin-
ctio est: necnō de celeri & celeriore, rardo & tar-
diore, duro & duriore, molli & molliori, crebro
& crebriori: ac sic de ceteris omnibus, quę par-
tim cum altero quolibet cōparata, partim cum
ijs tantū cum quibus conueniunt, talia uel ta-
lia dicuntur. Nec uerō si cum omnibus quę sunt
eiusdem generis magnū comparemus, statim
sic nominabimus. Ceterū cum medio ipso,
moderatoq; in unoquoq; genere, ceu cum regu-
la, singula comparantes, quę illud quidem ex-
cedunt, magna esse dicemus omnia: quę contrā,
parua: id quod usu uenit in omni uita, & præci-
pue in artibus uniuersis. Nam ad moderatū om-
nes examē referuntur. Verū pro ratione æta-
tis, habituum corporum, temperamento-
rum, anni temporum, locorum, statuum, iostitu-
torum uitę, ac deniq; animi affectuum, alios ma-
gnos, alios paruos, alios moderatos pulsūs di-
cimus esse. Iam hos celeres, illos tardos, quod-
dam moderatos: parū modo in ceteris differ-
entijs. Si quidem pro hogulis earum causarum
indies ipsi pulsūs uariantur. Quę causę quom-
semper mutuo permixtę sunt, difficile, ac potius
impossibile fuerit, reperire distictam aliquam
differentiam pulsūs, quę omnino & sigillatim
earū cuiuspiam respondeat. Quare satis fuerit il-

*Uermicans &
formicans pul-
sus sibi mutuo
conuertuntur.*

*Maqui & mod-
erati dydncan.*

*Comparatiōem
magnę & paruę
faciendā ipse ad
ipsum generis me-
dium.*

*Pulsūs uariari
pro ratione di-
stictarum causa-
rum.*

tali inquisitione in perfedere: per singulas autē
earum causarum, exercere hominē, cuius pulsū
ipsam exploratis: ac sic pendere, quam in
illum mutationē eiusdem pulsūs moliantur: id
quod etiā in alijs atq; alijs hominibus est faci-
endum periculum. Ceterū si neq; id quod com-
mune est, in suas diuersas partes, nec causas
quę per se & primariō agunt, ab ijs quę ex acci-
denti sunt distinxerimus, haud dubie in iudicio
pulsuum rursū imē hallucinabimur. Nam si di-
xeris exercitatorum tales pulsūs existerē, nec ad
dideris quorum exercitorū, nec explicaueris
ipsius exercitiū speciem, nec modum, nec qualita-
tem, nec deniq; quantitatē, utiq; magnum lap-
sum cōmittere, quod uidelicet rem cōmunem
minimē in suas differentias secueris. At uerō si qui
plethoricus sit, ac thoracē & pulmone affecto,
simul ut caput exerceri uelociter, in dyspnœam
inciderit, utiq; pro dyspnœa ipsi pulsūs varia-
bunt: quorum alterationē tu exercitationi at-
tribues, quod causam ex accidenti minimē ad
propria distinxeris. Ergo ne in experiundo fallā
mur, corpus propositum designabimus ad expe-
rientiam, cum sanum sit, ac nulli externę obno-
xium alterationi: tum exercitationē quā ad id
utemur, moderatā quantitate feruabimus: præ-
terea in mutationē it attendemus, ecquid ca-
su inciderit, non ex ipsa exercitationis natura.
Si enim tria hæc respicias, nullo negotio inue-
neris, quemadmodum & quatenus omnis ad-
uentina causa pulsū ipsum immutet. Itaque si
in omni genere causę, alterationē experientia
didiceris, non est quod sis sollicitus, ut qualis sit,
qui natura moderatus est pulsūs, persicias. Sed si,
qui sit singulis, de quibus agitur, peculiaris, ten-
neas, quatenus mutatus hic est, cum ab alijs cau-
sis, tum uerō ab ipso morbo, noscās licebit. Por-
ro moderata exercitia pulsūs in magnitudinem,
celeritatem, uehementiam & crebritatem cōuer-
rant. Pro ætatibus autem, maximi sunt iuue-
num pulsūs: senum minimi: eorum quorum æ-
tas declinat, maiores quidem quā senum, mi-
nores tamen quā iuuenum: senum deniq; mi-
nimi. Exoriri autem quæritū possit, cur paruos
pueris sit pulsūs: quāquid certē nullam reperio
causam, cur debeat in eis esse talis. Proinde mo-
deratum pulsū cognoscere, adhuc magis ne-
cessariū uidetur. Potest quippe uel pueri pulsūs
moderatū excellere. Quare ossi moderatū prius
pulsū iuuenieris, ne Empiricus quidem ipse ob-
seruationem accuratē instituit potest: cum nō
omnium ægrotorum usus sit consuetudo per
sanitatē, quod experientia naturam illorū agnos-
cat, indeq; memor illius, cum ægrotantibus tam
comparat. Vbi igitur optimam constitutionem
humani inuenieris corporis, primū animā ad-
uertendum est, qui nam eius sint pulsūs: idq;
nec obiter, nec negligenter: sed in eo statu ho-
minem accipiemus, ubi suum proptum motum
pulsūs, à nulla externa causā immutari, retineat.
Hoc fiet si homo ipse ab omni excessū & defectū
sit immunis & liber. Postea inuestigandę sunt
corporū uisiosę constitutiones: earūq; exces-
sus atq; defectus, cum moderata & optima con-
ferendi. Dein uerō, ubi quantū oportet earum

*Pulsūs exa-
men qualiter in
modum sit.*

*Pulsūs exequi-
tatio permuta-
tione, tria spe-
cianda esse.*

*Exercitia mode-
rata quemodo
inueniunt pul-
sus.
Pulsūs differ-
entia faciendā at-
tes.*

*Puerorum pulsūs
sint parui.*

*Pulsū moderatū
esse inueni-
endum.*

*Pulsū moderatū
tam, inueni-
endi ratio.*

naturarum pulsus dissidere ab inculpatissimæ
pulsu perpendis, longolus ulu exercueris ratio
nem simul & tactum, iam demum certò putabis
te moderatè tenere in omni genere pulsuum: al-
iosq; etiam, qui aliquo modo ultra hunc sunt, &
citra. Idcirco quicquid aut corporis nostri opti-
mam naturâ, aut virosas non nouit, aut ratione
quidem perspexit eas, sed usu ut dignosceret nò
laborauit, nihil prius fructus feret hic sermo: si-
quidem illa prius sunt ediscenda, postea huc ue-
niendum. Naturæ igitur optimæ pulsus, aliorū
omnium medius, ac ueluti mensura & regulā
quædam exiit: cum quo ubi ceteros compara-
mus, celeres, tardos, magnos & paruos dicimus
esse. Ipse uerò qui medius & est & dicitur, nullo
nomine quod immoderationē significet, nomi-
natur: sicuti neq; homo eo ipso præditus: quem
quidem non crassum, non gracilem, non calidum,
frigidum, humidum, aut siccum dicimus,
sed omnibus partibus corporis temperatū. Cæ-
terum dubitauerit quispiam in hunc modum: Cum
omnes qui in corpore sunt arteriæ, esse æ-
quales non possint, ac proinde nec etiam disten-
di æqualiter, utique non poterit pulsus unus in
quantitate distentionis moderatus exiire, ne
si optima quædam natura fuerit: sed in motu &
robore, cæteriisq; generib. unus esse per omnes
arterias potest. Quippe similem cum inter se mu-
tuò, tum cum corde motum, omnes necesse est
habere: magnitudinem uerò, ut earum differunt
corpora, sic distentiones par esse ducetas. Ve-
rùm hæc qui dicit, ignorat, æquē in magnis cor-
poribus ac in paruis constare eandem naturam
posse. * Quod quidem si exploratū haberet, neu-
quam amplius requireret, nec arteriarū quæ in
singulis partibus sunt, nec item ipsarū dilata-
tum, parem magnitudinē esse in uniuersis incul-
patis naturis, cum pro magnitudine & paruitate
corporū, illa etiam uariet. Porro uescarū, foli-
um, utrum, omniū deniq; rerum quæ prædita
cauitate aliqua sunt, magnas & paruas disten-
siones solum dicere. Dicimus etiam interdum ue-
sicam esse distentam maximē: utrem autē & sac-
cum, qui uiginti eiusmodi uescicæ facili capiant,
nondum maximam distentionem esse consecu-
tos. Censemus siquidem distentionem ad cuius-
que cauitatē corporis esse æstimandam, non ab-
solutē pronuntiandam ad eundem ubiq; modū.
Nam est certus in re qualibet modus, in quo nec
contendi tunicas, quæ cauitatem ipsam comple-
stuntur, nec remitti cōtingit. Vbi igitur aut ten-
sio, aut cauitas in ipsis percipitur, tum magnas
dicimus eis aut paruas distentiones inesse. Vbi
uerò nec sensibilibus causis sese ostendit, nec tuni-
cæ laborant tenis sub ipsa dilatarione, modicam
sanē & moderatam, naturamq; corporis dis-
tentionem illam censemus exiire. Similiter igitur
est iusta quædam ipsius arteriæ distensio, ita
ut nec contenta daret, uel laxam aliquam ipsi partē
relinquat. Nam ut omnino confidat, tunicarum
dura natura prohibet. Atque sanē distentionē
moderatā & naturalem dicemus. Etenim in na-
turs optimis hæcenus dilatarunt arteria, quoad
usus expleatur largiter, & nihil ledantur tuni-
cæ. Proinde qui regulam uelit attingere in ma-

gnis pulsibus & tardis dignoscendis, optima na-
tura inuenta, cognitāq; unus in illa arteriæ cu-
lusculq; magnitudinē corporis atq; distentionis,
recordandum illi & æstimandū est, arteriam
hac maiorē, quantū oportet maiorē distentionem
habere, in naturis optimis. Quæ si tanta re-
peritur esse, quantā fore cōstiebat, sic moderatū
pulsū appellabit: sin uel maiorē hac, uel
minore, magnum uel paruum. Arteriæ depre-
hendet in optima natura magnitudinē, aut per
dissectionem, aut ex collectione signorū. Quod
si nesciat etiam quanta sit arteria præditis opti-
ma natura, certè eorum pulsus memor, si in alte-
rum postea inciderat, & colligere possit, num par
sit maiores hunc aut minores, si illam habere ar-
terias: cum magnitudine iam distentionis cōser-
re poterit, cōstiebatq; an magnus, an paruus,
an moderatus sit pulsus. * Etenim si quantū ui-
detur arteriis maiores habere homo qui com-
paratur, tantū maiorem etiam distentionē for-
titanur, moderatum esse illius dicemus pulsū.
Quod si arteriæ magnitudinē uideat superare ma-
gnitudinē distentionis, aut minor quam illa sit,
magnum tunc, uel paruum pulsū uocabimus.
Præterea si arteriæ corpus uideatur esse maius
quàm pulsus, paruum: sin arteriæ minus, & pul-
sus maior, magnum. Haud secus in reliquis ge-
neribus pulsuum: ut in ipsius motus genere, in
quo celeritatem & tarditatem dignoscimus: in
genere quietis, in quo creditatem & raritatem
contentionis, in quo uescientiam & remissio-
nem: ad hæc, corporis arteriæ, in quo duritiem
& mollitudinem. Nam per hæc omnia, tum mo-
deratum inuenimus in optima natura, tum im-
moderatos uel ob excessum, uel ob defectū, nō
inter se, sed cum moderato comparabimus.

GALENI PERGAMENI de dignoscendis pulsibus li- ber tertius.

Celer autē pulsus uocatur, qui pauco tem-
pore suum motum absoluit: quemadmo-
dum tardus, qui multo. Etenim si hoc
prius nobis constet, moderatus pulsus quanto
tempore, quantum confecerit interuallū: de-
inde alterius ostendamus, qui par habuit tem-
pus, spacium minus: multo tempore dicemus
hunc motum fuisse. Si quidem si duo pueri di-
missi in diuersos locos non æquē distantes sint,
& simul reuertī aliter, quod iter pauco tem-
pore absoluerit, collaudamus: alterum incre-
pamus, quod multo. Nam ex uis: longitudine
æstimamus, quum paucum uel multum tem-
poris dicimus, non absoluto sermone. Cæterum
ad dignoscendum celerem pulsū uel tardum,
nec quantitatem temporis, nec interuallū (ut
iam quod uerum est fatear) considerandam cen-
semus: imò ne proportionem quidem illorum,
de quibus (ad extirpandum errorem quorundam,
qui ex solius temporis quantitate, iudi-
cium ipsorum pulsuum ferebant) uerba fecimus
in superiori libro. Nam celeritatem quidem &
tarditatem, ut primum occurrit arteria, nosci-
mus: rationem uerò temporis ad tempus, &
interuallū

*Pulsus natura
optima, aliorū
omnium regulam
ex mensurâ esse
illam.*

*Arteriæ inter se
motu, & simul
cum corde simi-
lem semper mo-
tum ferunt.*

*Arteria in illa
distensa.*

*Pulsus moderatus
quantus in
diandus sit.*

*Arteria magni-
tudo quomodo
cognoscenda.*

*Pulsus magnus
uel paruum quā-
do dicendum.*

*Pulsus in omni
genere moderatus
contentus -
triginta ueniendi
tatis.*

*Pulsus celer &
tardus quā sit.*

*Pulsuum celeri-
tatem uel tardi-
tatem ut regu-
larem, quomodo
parum, aut inter-
uallū quantita-
tem esse specian-
dam.*

intervalli ad intervallum, ut exploremus, opus nobis est longo tempore. Quemadmodum itaque si ob oculos moveri quempiam videamus, impetus ipse indicare potest motus celeritatem: sic & in arteria contingit. Nam aut incitatum, aut remissum eius motum inveniamus. Omnia enim corpora quae moventur, ex locis ubi semper moventur, quo modo moveantur, dignoscimus. Siquidem si in his immoretur, tardum esse motum cum dicimus: si vero descendat levis, celerem. Vnus itaque sensus celeris & tardos pulsus declarat, ex ipso locorum transitu iudicio nobis confirmans.

Motus celeritatem aut tarditatem, ex loco ubi moventur corpora iudicant.

Quare celeritatis & tarditatis facile notitia consequimur: non perinde consecuturi, si quantitate temporis & intervallorum aucta, eorum proportionem observare sustineremus. Atqui non sustinemus: nam ut primum aciem intendimus, momentum temporis obiectum motumque corpus deprehendimus, ex quo conjicimus transitum. Quare igitur eminus cernimus, ea diutius videntur nobis consistere, vel si agitentur celerissime. Unde liquet, ratione nos motum colligere, minime sensu deprehendere. Quia vero sensui ratio coniuncta est, & transcursus mentis est velocissimus, fac penumero non ratione, sed deprehendi sensu videtur. Non est itaque temporum neque intervallorum quantitas inspicunda, sed ipsa qualitas motus, licet explicari difficilis: a qua etiam dignior inaequalium celeritate & tarditate pulsuum ducit originem. Quippe unius distinctionis saepe initium motus plane celerius videtur: proximi tardius: iterum finis celerior. Quo minus levis palpan dum est, ubi genus hoc pulsuum perpendimus: alioqui extremi motus finem sentientes duntaxat, non integrum motum. Ex quibus liquet, eiusmodi pulsus nec parvos, nec languidos esse. Neque enim trifariam potius scire motum, nec in parvis intervallis, nec in parvis imbecillis. Quamobrem nec in pulsibus lethargicis deprehenderis inaequalitate. Porro maximus & vehementissimus pulsus validam fert compressio nem: atque alius quilibet, quantum a vehementia vel magnitudine abest, tanto minor est. Quare qui cuius pulsui inuertiatur sit contestatione appositam, hunc singularem prudentia esse, & expertum in dignoscendo oportet. Moderatus igitur motu pulsus in optima constitutione, non ex intervalli aut temporis quantitate est, sed ex ipsa qualitate explorandus. Quo quidem qui percipiuntur celerius decedere, celeres: qui tardius, tardos vocemus. Ceteri si pulsus aequalis sit, universam distinctionem non expectamus, sed ex parte eius, facere de tota coniecturam libebimus. Si vero inaequalis, integram asequi expediet, & tunc pro magnitudine pulsus & vehementia varie applicare. Deinceps de quantitate distinctionis agamus. Enimvero cum corporis arteriae dimensiones sint tres, longitudo, latitudo & profunditas: nulli earum possumus totam sentire. Ac de longitudi ne quidem apertissimum est. Vtriusque enim arteria,

Pulsus maiorem vehementissimumque, ferri videmus cum pressum.

Pulsus moderatum effectum solum motu qualitate explorandus.

Pulsus aequalis est: inaequalis tamen quousque cognoscenda.

Arteriae dimensiones sunt tres, quarum nullam totam percipimus.

bus adeo circumvallentur & contegantur arteria, ut neclatitudo nec profunditas motus exacte deprehendi possint. Est tamen in singulis corporum naturis aliquid sub ipsa cute elucescens, verum in natura optima, moderatum. Etenim si quid supra hoc secundum longitudinem sit, longum: si quid infra, breuem pulsuum efficiet, qui definiti numero digitorum non potest. Eodem modo iuxta dimensionem secundam, tum latos, tum angustos pulsus cum moderato collatos deprehendens: similiter altos & humiles iuxta tertiam: sicuti in tribus simul dimensionibus, magnum & parvum. At vero singulos esse in singulis alijs pulsuum generibus moderatos, sed in sola quantitate non plane unum, sed suum cuique corporis parti, ante ea explicatum est. Quandoquidem igitur dimensiones pulsuum non facile deprehenduntur, danda nobis opera est, ut cōmonstremus rationem qua in optimam singularum cognitionem veniamus: ac primum sané de illa dicemus, quae circa longitudinem tota nerfatur. Esse autem eam censendam optimam, quae motus maximam partem sentiat, clarissimum est. Porro in tribus his, natura videlicet, exercitatione, & applicationis modo, sensibilibus cognitionum omnes differentiae sunt fixae. Nam qui naturam habet appositissimam ad sentiendum, & probe ipsum tactum exercitatum, quem sensibilibus etiam decenter admovent, optimus licet explorator fuerit eorum quae intus sunt condita. At qui hoc aliquatenus est inferior, quammaxime ab illo abest, tam pessime ab solutari cognitionem consequitur. Qui igitur ad tangendum fuerit optime comparatus, cogniturus longitudinem pulsus, omnino non premat, imò saepe cōtrectet leniter, ac veluti suspensat manum. Qui modus accōmodatus in primis est, parvis pariter & imbecillis pulsibus. Quorum quidem, si eos aliquatenus premas, magna ex parte motus exsoluitur, imò vero perit sepe universus. At modicum pressum non grauter ferunt quidem pulsus vehementes: non laxentur tamen ne hi quidem, si nihil premas. Qui modus tangendi cum optimus sit languidis pulsibus, nec in cōmodos vehementibus, nulli alteri est proponendus. Porro ubi diversas partes secundum arteriae longitudinem premis, non perinde videtur in omnibus laxi motus. Sed si cordi viciniores premantur, magni iniuriam subiectis inferunt. Si remotiores, saepe numero nullam, quae animadverti possit, si bene pulsus sit vehementis: interim tamen manifestat, in non uehementibus. Porro ut sensu percipimus differentiae latitudinis & profunditatis, sic nos saepe circularem figuram deprehendere in pulsu manifeste fauerum. Quod igitur ad dignoscendas eas duas dimensiones pertinet, si leniter palpes, aut pluribus in partibus necessum est arteriae occursum percipias, aut in paucioribus. Quo cognito, ad sensum ratio adiuncta, nobis magnam distinctionem suggeret esse, quae multis partibus movet tactum: parvam, quae paucis. Agē fac circula rem eius occursum esse: quid, nonne clarum est, si insigne sit circumferentia circuli magnitudine, totam etiam crassam esse distinctionem

Pulsuum dimensio nes depre hendit ratio.

Sensibilibus cognitionum omnes differentiae, in natura, exercitatione, & applicationis modo, cōfixae sunt.

Arteriam circumvallandi modus.

Arteria circula rem figuram in pulsu deprehendi potest.

Distinctionis magnae quae sit.

arterie: & uniuersam distentionem gracilem, si circunferentia sit parua: Quod si gibbiores ac præruptiores uideantur obliqui occurfus arterie, præterea cauior quodammodo & humilior in profunditate, adeo ut ne circuli quidem circunferentia cernatur amplius, sed ueluti recta linea: profecto apertum est talem pulsulum latum fore atq; humilem. Et diuerso, si motus obliqui partes, longe citra medium confiterint, ac medium ipsum satis gibbosum appareat, planè is pulsus altus & angustus existit. Si, semel angustus eius in latitudine occurfus euadat, ut non modò imminutus esse obliquus motus, sed & totus pertransisse omnino uideatur, difficilis cognitio est, uel potius cognosci non potest, quantum in his est, qualis sit pulsus. Iam uerò oportuñ est & de rhythmo etià aliquid dicere. Qui quidem cum in collatione temporis distentionis, cum tempo-

Rhythmum in quo consistat.

Distentionis arterie initium, et contractionis finem, imperceptibilem esse.

Rhythmum dignoscendo quod explorandum.

Essentiam rei prius require quam qualitatem.

Rhythmum in solo dequato ue harmonisissimo pulsibus.

GALENI PERGAMENTI de dignoscendis pulsib. lib. IIII.

Est autè in distentione arterie ueluti quidam ictus, qui, dum tangimus, tactu ferit. Hic, si uolentius sit, propriè existimabis ictum uocari: at si uolentia careat, nò item. Comitatur porro ictus ipse multas ac uarias species pulsuum. Duri siquidem pulsus, uehementis, magni, celeris, alti, conuulsui, & nibrati esse comes, atq; cò-mune symptoma. Quare còfundendi illi pulsus non sunt, sed discernendi suis notis. Cum igitur tactum impelli à pulsu, si illius debeat sentire oc-cursum, necesse sit (impellitur enim nò perinde semper, sed nunc plus, nunc minus, interdum ut palpet tantu) quicunq; motus eum protrudunt, & longè submouent, nò sanè uolenti ictus specie referit. Ac protrudere quidem longè potest mo-tus arterie duræ, ueluti tactum contandens: & qui robore mouens eam facilius ueluti euer-tit: præterea qui magnitudine distentionis pro-greditur plurimu: iam etià, qui qua fertur cele-ritate impellit ualenter, & qui præ altitudine ue-luti subit ac intrat: quiq; quòd tensus sit, ægrè mouet: ac deniq; is, qui ob uibratione, simul ten-sionis & durities, celeritq; occurfus imaginè re-præsentat. Cæterum incidās in multos quotidie medicos, qui illos omnes pulsus uel maxime di-screpantes, dicant uehemèntes esse. Etenim quòd

Ita quo comi-tatur pulsus.

Tactum nostru quo motus repel-lant.

Impellere tactu solum magnitudi-nem esse, non ue- hementiam cõtra-cta.
Magnitudo pul-sus uide cognos-citur.

occurfus celeritatis, non eadem sit cum uolentia ictus, hinc cognoscere licet, quòd nec longius celer pulsus impellere ualeat tactum, nisi simul sit magnus. Vnde liquet, non hoc eum sua sponte obtinere symptoma, sed ob magnitudinem iun-ctam. Quippe longè impellere magis ad magni-tudinem pertinet: nec etià ad hanc per accidens, uidelicet uehementiq; rationis. Magnitudo siqui-dem, non quòd longius intret, sed quòd multis in partibus longitudinis pariter & latitudinis & profunditatis attingat tactum, cognoscitur. Si enim pulsus circunferentià quæ satis magna est perceperimus, ex ea facillè ascensum, qui ex mul-ta profunditate fit, cõuenimus.* uel si tactus to-tum interuallum affecimus nò fuerit, sed externu tantu finem perfererit. Si uerò * à primo dilata-tionis ihpetu, uelimus motu ipsu sentire, ma-gna ex parte magnitudinè interpellabimur, ita ut ne magnus iam esse pulsus uideatur: idq; ubi magnitudini uehemèntia est adiuncta. Nam si in pulsibus qui citra uehementiam sunt magni, aut ascensui occurras, aut ipsam arteriam cõprimas, mox totus pulsus perierit. Iam uerò si magnus pulsus tribus dimensionibus præditus, nisi erit uehemens fuerit, minimè tactum protrudit lon-gius, manifestum utiq; est, nec altum id sua nata ra effectum, qui una tantu dimensione opera-tur, sed quòd simul aut uehemens sit, aut certè minimè languidus. Omnes itaq; illi pulsus, ut longè propulsent tactu, planè uehementiam de-fiderant. Quanti & alij etià, à quibus diuelli durities non potest, uiolenter ferunt, ut uibra-tus, & cõuulsus. Qui quidem non aliunde cõ-pararunt ictus uolentiam, quàm à duritie per-tinetus. Quamobrem duo tantu genera habent pulsum uolenter ferientium: nempe uehemens

Pulsus nullum abiq; uehemèntia possi tactum protrudere.
Pulsus uehe-menter ferien-tium, duo tantu genera habere.

tum

*Dura que dicitur.
Mollis que finit.*

tium, atq; durorū. Etenim quibus carnis nostre natura cedit, ea dura vocantur: quæ uerò carni, ut aqua, hæc mollia dicitur. Fingamus itaq; manum nostram nunc aq; rapido fluctui ex aduerso occurrere: nūc lapidi, quæ altera manus sensum admoveat: nōne ab aqua perspicies plane ipsam eueri, non pressam tamen: & lapidem ab hac eueri, sed pressa ab illo? Nam durum quidem, quod minus progrediamur, obstrare per se non potest: sed aut per pondus, aut motum acquisitionem impedire interdū poterit: uehementem autem, suapte natura reprimere, cohibere, repellere, ac deturbare intelligitur. Liqueat igitur, aliud nos cum uehementia tangimus, aliud cum dura, sentire: nam hæc premunt carnem tantū, illa impediunt progressum. At quia sæpe fit ut ambob; conueniant, atq; id quod occurrit fit durum, pariterq; uelementer moveatur, non potest sensus etiam non duplex nobis offerri: unus ueluti prementis, alter ueluti euerientis. Quæ si sint ita,

*Duri proprium
est premere.
Uehementis est
proprium euertere.*

*Archigenum fuge
gallat Galenus.*

*Asitres.
Hydripi.
Tympantales.*

*Contentorum
quantitas qua-
litatē, unde de
proboscide.*

ut sunt certē, duri pulsus, in premendo tactu, cognatio ponenda est, ut utroq; ictus uolentia cōueniat: sed proprium duri sit premere, euertere uelementis. Hallucinatur autem Archigenes, dum pulsus, cum arteriis status cognoscitur, ple-
num pulsus appellat: potius is durus, aut mollis, aut modēratu dicitur meretur. Dum uerò air, secundo alio pleni pulsus genere cognosci qualitatem substantiæ in arteriis cōtinet: quam qualitatem intelligat, haud pro dignitate explicat. Ceterū grauissimē peccat tertium aliud genus pleni pulsus assignans, cuius uis, ex quæ in arteriis sunt, innoteſcant nobis. Quippe tactus, spiritus ne in arteriis tantū sit, an simul humores aliqui, indicare nō ualet. Quinetiā nullus profusus est sensus, qui cōmonstrare ualeat, in arteriis contentus sanguis, quā sit multus & qualis. Imō uerò in ipsa aqua inter cutem nequitiam licet nobis, humor ne sit an spiritus, qui in regionibus conuenit uentris, ipso tactu explorare, nisi pressu cute causata: quam nec frequenter cauari conspicias in fynceris asitres, & in eo hydrope, quem tympanitem appellant. Sed ad ueram notitiam comparandam pulsare cogimur abdomine, ut attendamus si ueluti tympanū reſonēt: secundo loco aliter componere hominē, conuertēdū in latera, quod fluctuationem aliquam exaudiamus. Siquidem ut strepitus in moriū tympani spiritū nobis annunciat, sic fluctuatio humorem. Vno autē admoto tactu, haud faciliē deprehenderis, status ne an aqua subsit, tamen si cutis his contrabuerit: tantū abest, ut per crassam arteriæ tunicam, & quæ peritonæi est sexcupla, qd latitat in ipsa arteria noscamus. Præterea ex magnitudine quidem pulsus, copiam contenti humoris cognoscimus. Sed nō perpetuū hinc nobis (quod ille arbitratur) humidum esse ipsum humorem constat. Solæ itaq; fluctuationes & strepitus sunt, ex quibus cognosci possit quid sit, aut quale, quod continetur. Sensus autem tactus, manet sui semper similis.

GALENI PERGAMENTI de causis pulsuum lib. I.



Vix immutant pulsus, partim eorū generationis sunt causæ, partim tantū alterationis. Ac generationis quidem, tum usus, cuius gratia fuit: tum facultas abs qua, tum instrumenta per quæ distenduntur. Alterationis, cæteræ omnes, & quæ præcedentes uocantur, & quarum sunt procatartice. Nam triplex sanē, nō in pulsibus modō, sed in alijs cunctis, causarum genus existit. Vnum quidem primū atq; præcipuum, quod cōtinetur ideo appellatur, quia uolentiam complectitur, nimirum generationis (ut modō diximus) existens causa. Reliqua uerò duo genera, ut fiant pulsus, in causa nō sunt: canſe tamen existunt illorū qui iam sunt, mutationis. Quippe humorum crassitudo, abundantia, lentor, acredo, efficere nō ualent pulsus, alterare ualent. Ita frigidum balneum, uel calidum, & hyems, æstasq;, breuiter frigus, & calor, alterationum pulsuum sunt, non gignendorū, causæ. Ceterum quas ultimō cōmemorauimus, procatartice sue principientes dicuntur. Quas uerò ante has, illæ nempe quæ circa humores uersantur, antecedentes. In summa autem, quæcunque extra corpus possint, quicquid in corpore immutat, procatartice causæ, siue principientes uocantur, * cui incipientes prius quam dispositiones corporum. * Quæ quidem ipsæ dispositiones, quando continentes excitant, ipsarū antecedentes causæ redduntur. Denſetur enim ab occurſu externi frigoris, cutis: cuius densitas, naturalem halitus digestionem reſtramat. Reptus ille coarctauerit, tandemq; febrim accendat, ob quam usus pulsuum mutetur, ipsiq; similiter pulsus. Hic certē occurſus externi frigoris est procatartica causa: cæteræ usq; ad usum pulsum omnes antecedentes. Causa igitur procatartica, antecedentibus causis mediantribus, quia usum pulsuum permutat, quæ una ex cōtinentibus causis existit, dicitur etiā pulsus ipsos uariare. Neq; enim posset ulla cōtinentis causa mutari, ut continas maneat eius effectus. At priusquam continentes alteratio attingat, pulsus immutari non possunt. Ideoq; principes hæc, & præcipue sunt, primariæ causæ pulsuum. Cæteræ sunt harū gratia, nec per se alterare ipsos pulsus possunt. Quare illam qui peritus euadere artis de pulsibus uidit, in omnibus causarum generibus apprimē effe exercitatum oportet. Porro quæ sunt gignendorum pulsuum origines sunt continentes causæ, eatenus etiam alterationum. Siquidem differentie causarū in quantitate qualitatis, pulsuum differentias in qualitate & quantitate cōstituant. At uerò cum perpetuū cor ipsum unā cum arteriis omnibus, quandiu superſtes est animal, cernamus habere motum illam pulsantem: homine autem iam uitā functo, tum arterias, tum cor, ipso pulſu deſtini: sanē constat aliquam fuisse causam, à qua ille motus excitaretur. Quam quidem causam, licet eius essentia nos fugiat, quod facultatē tamen habet faciendi pulsus, illam facultatē uocamus. Quam

*Pulsus à quibus
mutatur.*

*Causarum generum
tria sunt.*

*Causa cōtinentis
est.*

Causa procatartice.

Causa antecedentis.

*Causarum quæ
pulsus mutant,
generaliter et
exple traditio.*

*Causa cōtinentis
alterationum pul-
suum, qd uisus
euidetur.*

*Causæ præcipuæ
pulsuum, sunt cō-
tinentes.*

*Anima essentia
ignorante Galeno
est.*

autē omnis facultas, alicuius facultas sit, haud dubie eius notio erit relationi subiecta. Ceterū dum robur facultatis, virtutēne dicimus, aut contrā infirmatēne & vitium, hæc nomina ad functionē referimus. Siquidem quæ obit efficitur functionē causā, interim ad eam melius est apposita, interim deterius. Quo sit, ut modō prædiximus: postea si res ferat, deterius, functio ipsa obeatur. Ac præstantior ad functionē dispositio, facultatis virtus & robur est: deterior, infirmitas atq; vitium. Quod uerō ad pulsuum usum spectat, gratia tuendi caloris uniuersū corporis, instituti uidentur, ut uidelicet illum refrigerent: & si quid fit fuliginis ex succorū aduisione contractū, id euestigio excernant. Conseruit etiā ad gignendum animalem spiritum. Reliqua & tertia gignendorum pulsuum continens causā, ipsum est arteriarū corpus. Siquidem omnis facultas quæ alicuius causā agit, instrumenta quærit ad opus apposita. Erat autem hūc instrumentum ad cōmodum, quod ipsius tunicis esset, atq; intrinsecum. Vbi igitur illa facultas refrigerantem substantiam trahit, arteriarū corpus distenditur. Vbi uerō fuliginosum expurgat, contrahitur. Nunc uero præpollēt dilatationis usus, nunc contractionis: consequiturq; omnino alteram motus partem reliqua. Cū ergo ex his causis pulsus proficiantur, omnes uariationes illorū pro causarū alterationibus fiant est necesse. Unde tot sunt primæ & generales pulsuum differentię, quot causarum. Ex facultatis quidem differentię sunt, robur & imbecillitas. Naturi caloris, adusto, refrigeratio. Arteriz tunicę, durities, & mollitudo: atq; præ his omnibus, in singulis generibus, cōmemoratorū mediocritates: quæ ut naturales efficiunt pulsus, qui medium locum inter excedentes fortiuntur, ita excessus ipsi, pulsus giungunt præter naturam. Ad facultatis robur necessariū pulsuum uehementem facit, infirmitas languidum: sicuti instrumentorū durities, durum, mollitudo mollem. Ut autem incremento uel decremento naturi caloris consequatur semper unum & idem genus pulsuum, non est necesse. Nec enim celer, nec magnus, aut creber incidit semper, ubi natura aduertitur: nec dum exstinguitur, tardus, uel paruus, uel rarus.

*Pulsuum altera
tamen quæ à quibus
huius causis magis
proficiantur.*

* Disputat autem contra Magnū Archigenes, quod celeritas pulsus non à robore potius, q̃ ad facultatis imbecillitatem proficiantur. At neutriū sequitur necessariū. Magis tamen peculiaris celeritas robori facultatis est, abundantię caloris, necnō mollitudini instrumentorū: tarditas autē contrarijs. Eodem modo huiusmodi facultatis magnitudo, & copię caloris, tum etiā mollibus instrumentis familiaris exiit: paruitas uerō contrarijs. Ad crebritatem nulla necessariū ex cōmemoratis inheret: magis tamen facultatis imbecillitati est propria, copięque caloris, ac duritię item instrumentorū. Similiter raritas magis ad cōtraria declinat, non illius perpetuō annexa. Si amplior in corpore fuerit collectus calor, animanti cū maiori erit opus respiratione, tum maioribus pulsibus: & quia maioribus, cōtinuō etiā celerioribus & crebrioribus. Ut enim qui subundi sunt, nō multū modō, sed & celeriter po-

tant, & crebriō: ita qui refrigerio indigent, copiosum simul & celeriter, crebriōque attrahunt. Quamobrem peculiaries dixi esse pulsus copioso calori, magnū, celerem, crebriūq; nō tamen illi perpetuō annexos. Postulant enim ut tales euadant facultatē ualidam, atq; ipsa instrumenta mollia. Quid si infirma facultas sit, aut instrumentū durum, nec magni esse, nec celeres possint, cū instrumentū quidem sit per duritiā aduersus mouentem facultatē contumax: illa uerō attollere quatenus oportet arterias, per imbecillitatē impositas. Quare ut celer pulsus uel magnus fiat, tria oportet causarum genera inter se cōstare: nempe, ut usus illorum generationis urgeat: facultas ualida sit: mollesq; arteriarū tunicę, aut certē nō rigide. Porro ubi solus calor incrementi, & manserit facultas, tunicęq; arteriarū immorē: pulsus necessariō maiores & celeriores fient, unūq; cum calore augebuntur, donec ad maximam distentionem perueniant. Celerissimi uerō ne si quidem prius erunt, quin calor ipse superauerit maximam distentionem, ita ut ab ea sans refrigerari non possit: tunc enim celeritate relaxetur motus defectus, atq; sic euadent pulsus celerissimi. Ceterū neq; hæc satisfaciunt calori uel hementi incrementi. Nam quod temporis inter duos motus antea quiescebat, nunc id præsecat etiā, adeoq; efficit breue, ut totus unus esse motus cōtinuus nulla interceptis quiete uideatur. Hoc tamen accidit, ubi extremē calori fuerit accessus: tunc enim, cū tres sint prædictę rationes in excessibus uniuersis, omnibus simul utitur. Nam & plurimum consequitur refrigerantem substantiam, celeritēq; & in primis alidū. Quorum primū maximus pulsus, secundum celeritimos, tertium creberrimos reddit. Nec ubi liberaliter illum magnitudinē distentionis refrigerat, irritat celeritatem: sicuti nec crebriorem ubi ab ambabus auxilium recipit: sed alterius illarū semper defectus, corrigit altera: magnitudinis, celeritate: celeritatis, crebriatē. Quid multat: crebriatē pulsuum causā una est, prioris actionis defectus. Iam quod defectū naturalis caloris nullus comitatur ex necessitate pulsus: familiaris sunt tamen ei paruus & tardus precipuē, mox etiam rarus. Nam ut natura quæ iam pridem refrigerata est, nec multū requirit, nec celerē refrigerari, sic nec breuibus interuallis. Porro inter magnū pulsū & paruum, naturalis intercedit & moderatus: cum quo cōparantes & æstimantes reliquos omnes, qui maiores sunt eo, hos magnos uocamus: qui minores, paruos. Idem inter celerem & tardum medium modera- tusq; naturalis exiit. Sic inter crebriū & rarū, durum & mollem, mediū sunt naturales. At naturalis nō item uidetur, qui inter uehementem & mediū & languidum. Validę quippe facultatis est opus, uehemens pulsus: ueluti infirmę, languidus. Cuius sanē nō est contra naturam firmitas: mox hæc uirtus est, & secundum naturā infirmitas uerō facultatis, uinum, atq; præter naturam. Iam uerō uino modicē epoto, cū maiores & celeriores, tum uehementiores aperte pulsus euadunt. In ira autē, & exercitio nonibus modici, nō perinde aperte: mox si quid illis accedat uehe-

*Calori copioso
quis nam pulsus
suis famularetur.*

*Pulsus celeri uel
magno quatenus
dozantur, aut in
uinum quæ causa
liberatur.*

*Celerissimi pul-
sus quando gi-
gnantur.*

*Pulsus creberrimos
est causa cau-
sa extrinseci dicit
Ius.*

*Crebriatē pul-
suum causā aut
prioris actionis
defectum.
Caloris natura
lis defectus qui
pulsus sunt famu-
liantur.*

*Pulsus omnes
modi sunt natu-
rales, excepto
ista qui habetur
inter uehementem
et languidum.
Vino modicē e-
poto, quales pul-
sus giuntur.
Briandus omni-
es pulsus, quales.*

uehementiæ, id adeo est minutū, ut animaduerti nō grē possit. Cūm igitur in cōfesso sit, à facultate distendi arterias, probabile est ipsam plus & celerius eas attollere ualidam, minus autem & tardius infirmam. Ut autem priora repetam, quorū pulsū postulat generatio unā causā, huic perpetuū illi adhiberebūt, eiusq; fidelissimū signū existent: ut uehementis, ualentis facultatis: languidus, imbecillus. At quorum nisi plures interfint causæ, constitui generatio nequit, hos familiares causis esse dicemus, non autē significare certam ex illis aliquam. Eodem modo, si ex una aliā quando causā pulsus proficiatur, sed non semper ab ea, familiaris quidē omnibus causis erit, quæ efficiunt eum: cōstanter uerō nullam ex eis indicabit. Neq; enim si celeritas pulsuum adfit, statim robur quoq; necessariō facultatis adfuerit. Imo est, cūm maior sit usus generati animæ spiritus: & est cūm calor sit copia, uel instrumentorū molities, uel horum quædam, uel omnia simul. Haud alter si magnitudo sit pulsuum, erit uel facultatis robur, uel impendū animæ spiritus maius, uel calor in corde abundanti, uel mollitudo organorū, uel quædam horum, uel uniuersa. Qui igitur optimē constitutus ac temperatus fuerit, si homo si calidior soli to euaserit, atq; hac re sit alteratus duntaxat, uehementiam pulsuum non immutauerit: imo nec duritiem, nec mollitudinis genus: sed in magnitudinem & celeritatem uertet, interim etiam in crebritatem, prout magis uel minus eius calor increuerit. At si frigidior iusto sit factus, primū raritas peripicua maius, deinde tarditas, postremō paruitas. Nam cū ualida facultas existit, etsi paulo minor sit usus, primam actionem nec par uam necesse est, nec tardam esse: secundam uerō post longius tempus, quā si urgeter usus, est consentanea rationi. Iam si maior fuerit refrigeratio, eoq; magnopere usus ipse remissus, unā e languescet celeritas motus, atq; minor statim erit distentio. Si plurimū sit refrigeratio progressa, necessum est pulsus ipsos rarissimos quidem esse, ceterum nec tardissimos, nec etiā minimos. Nam perfectē tardi uel parui, si ualida facultas sit, uel si admodū sit ipse usus remissus, nunquā fient pulsus. Eadem & in respiratione est ratio. At uerō ubi non modō usus, uerum etiā facultas mutatur, quatuor tum differentis diuerse in uniuersum erunt. Quarū prima quidem circa facultatis imbecillitatem, caloriatq; augmentū uersatur. Si igitur magnopere sit imbecillis facultas, calor autē igneus, parui & tardi pulsus, creberrimū orientur. Sin noxa sit moderata, quæ fiant crebri, sed in distentione & motu mediocres. Secunda coniugatio in imbecillitate & perfrigeratione cōsistit: cui pulsus competit cūm imbecillus, tum paruus, tardusq; sicut pulsus prioris cōiugationis: sed nō neq; ut illi, ad extremam deuenit crebritatem, nisi ubi omnino facultas protrata fuerit: tunc enim pulsus minimus erit, intermitteretq; deficit frequenter. At si modicē sit facultas infirma, ualidaq; refrigeratio, creber minimē euadit pulsus, q; uidelicet usus faciat talis facultas fians. Tertia cōiugatio sit, ubi calor simul atq; facultas augent: quā quidē cōiugationē

uehementissimi pulsus & maximi comitantur, sed non sunt aperte. Quarta coniugatio est, in qua cōiunt pulsus facultatis, & calor penuria: cūus sine sunt pulsus magnitudine moderati, sed tardiores, & satis rari. Nam cū sit paruus tum pulsus usus, totumq; facile magnitudo distentionis tuatur, haud immerito diutissimē quiescent arterie: tamen ob facultatis robur, distentionis nō impeditur apertē uel dilucidē quantitas. Quæ ratione etiam, nec multū prepollet tarditas. In uniuersum autē, ipsius ictus qualitas, sententis nature responderet. Porro molle instrumentū, quia promptē in omnē partem extendit, facile dilatur: durū nō abiq; magno negotio. Iam comes est promptitudo distentionis, magnitudo: renixus & cōtraxio, paruitas: itemq; celeritas, prioris generis: sicuti alterius, tarditas: non tamen ex æquo & magnitudo & paruitas.

Paulo enim celerior est pulsus perfectus à molitudine instrumentorū, eo quem procreat durities: maior autē permulto: quia tunc ipsius arterie, quibus duriores interim fiunt, ad celeritatem quandā motus sunt faciles: ad magnitudinē uerō distentionis, ineptissimæ omnī. Nam opus est, ut in omnē partem extendat facile, quod maxima dilatatione sit effectus: huiusmodi enim est molle. Ceterū ubi à natura longissimē aut ad mollitudinē, aut ad duritiē, corpus arteriarū recesserit, tardior mollis pulsus fit: durior magnitudine tamen nō modō eum etiā superat, sed illum etiam quā secundum naturā habet. Iam uerō cū duriorum instrumentorū dura distentio sit, ac proinde minus expleatur usus: mollis contra, insignis distentio fiat, & quæ usui par sit explendo, merito cū duris pulsibus crebritates, cum mollibus raritates coherent. Quod si quando incidat, ut cum duritie concurrat refrigeratio, & calor cum mollitudine, tum pulsus durus, mollihus euadent rariore. Si igitur durum corpus arteriarum sit coniunctum cum innati caloris refrigeratione, pulsus efficiet iusto minores, tardioresq;. Si superet durities, minores quā tardiores. Sin autem refrigeratio, contra tardiores quā minores. Ad eundem modū crebriores, si durities refrigeratione superior sit: sin uincat refrigeratio, rariore. At si par sit utriusq; à natura flexus, tanto fient pulsus minores, quanto tardiores: à raritate uerō & crebritate nō abducentur. Est altera coniugatio, in qua cum calore superat mollitudo. Quæ etiā tres necessariō primas differentias producit. Interim enim par mollitudinis est & caloris mutatio: interim præpollet uel mollitudo, uel calor. Quare si quantū naturam mollitudo reliquerit, tantūdem deficiat etiam ab ea calor, magnos necesse est, & celeres fieri pulsus: nō tamen ita crebros, sed ubi generandorum eorum usus uincat magnitudinē distentionis. Si mollitudo præter, magnitudo etiam superabit celeritatem. Si uerō ita præpollet calor, ut usum ac actionem compleat, celeriores ut fiant necesse est, quā maiores pulsus, simulq; etiā crebri. Quod si abunde à natura fruat usus, æque magni aut celeres. Sed & tertia erit causarum complexio, quæ pulsus in hoc

Ubi quali, si fuerit natura sequitur. Mollis instrumentum facile dilatur, citra quā durum.

Pulsū differentia, pro molitudine uel duritie organorum.

Duri pulsibus crebriores, mollihus rari: ut autem esse.

Calore cōiuncto cum mollitudine instrumentorum, quæ pulsū differentia oritur.

Pulsū qui nam tu semper causæ adhibeant. namq; fideliter indicent: ex quo rariū familiaris tantum ipsi causis de causis.

Celeritas pulsuum à quibus causis erit posita.

Pulsū magnitudo de ueritate quibus causis posita.

Facultate resisteret ualida, nunquam pulsus fuit perfectē tardi uel parui.

Pulsū differentia quatuor, si facultas simul atq; usus mutatur.

Caloris fit ad iuncta instrumentorum durities, quae pulsus differentias admutat.

Frigiditatis mollietis organum si obviatur, quae pulsum differentia praemoueat.

Pulsus omnes quo moderati sunt, non constans & naturalis est, pro mixta modis quibus facultas & instrumenta mutantur.

Continuitatem causam variatam pulsum, obliquo coniugatione.

Adiones omnes reddi crebriores ob defectum quae accidunt illis.

genere variant, ubi calori fit adiuncta durities. Quum igitur uterque plurimum à natura declinat, pulsus erunt celerissimi, creberrimique: minimi autem nequaquam (nisi simul facultas oblecta fuerit) sed aliquatenus iusto minores. At si immodicus calor sit, & instrumentum non magno pere durum, uerum paululum à moderato uariet, tantum abest ut iusto fiat distantia arteriarum minor, ut etiam maior euadat. Erit autem celeris, utra causarum excellat: maximè tamen cum calori quo tempore luculentior erit & breuitas. Superest coniugatio ex mollietate & frigiditate. Quia uerò magnus pulsus hic quoque est molitudini affinis, & paruis frigiditatibus, utra longius à natura deflectat qualitas, illi necesse est pulsus assimilentur. Enimvero omnes naturales pulsus inter excessus moderatos & medios annumerantur: non tamen quicunque sunt moderati, etiam naturales existunt. At uerò quot excellentiam caloris affectus sequuntur pulsuum, tot etiam usus generandi animalis spiritus. Sic instrumentorum durities facultatis imbecillitati coniuncta, paruos pulsus, & tardos, & crebros concitat: robori, paruos & crebros, non etiam tardos, imò longe interm quam par sit, celeriores. Verum si instrumentum sit molle, facultas autem ualida, maiores quidem manifestò pulsus fiunt, at aliquantò tardiores, rarioreſque. Quod si ad mollietatem instrumentorum infirmitas adiuncta sit facultatis, si quidè æquus utriusque, simulque modicus fuerit à natura flexus, moderati simul & naturales uidebuntur si pulsus esse, nisi quod erunt mollietate uarij. Sin ualde immodicus sit, parui, tardi, atque crebri fiunt. Si uerò imbecillitas multò præpollat, tunc etiam erunt parui, tardi, crebri. Si superior sit mollietudo, accedent pulsus ad moderatos. Restat iam ut omnes simul committamus differentias continenti causarum pulsuum: ex quibus octo coniugationes constantur. Dux, quum remissa facultate pariter & usu, modò mollius solito sit instrumentum, modò durius. Dux altera, ubi languescat facultas, & usus auctus sit, instrumenta quoque molli, uel dura. Præterea alij dux, quando ualida sit facultas, sed remissus usus, una cum uariante instrumentorum differentia. Reliquæ dux, quum ualens facultas sit, auctus usus, accedat instrumentorum, quam diximus, differentia. Ac languida quidem facultate simul & remisso usu, omnino in paritatem & tarditatem mutantur pulsus, in utraque differentia instrumentorum. Ceterum uero redduntur necessarii crebri uel rari. Sed si parua facultatis offensio sit, nec in lignis instrumentorum duritia, nihil crebritate pulsus uariant: si quidem non pulsus modò, sed uniuersæ actiones crebriores ob defectum euadunt, qui earum accidunt singulis. Iam defectus, usu æthimali. Quum remissus hic fuerit, paruusque lesio facultatis, nihil per instrumentorum nimiam duritiem, nihil in actione desiderabitur. At si facultas sit magis

facultas plus uel minus, aut usus offensus est, etiam pulsus ipsi necesse est plus uel minus ad paritatem tranſeant & tarditatem. Nec uerò existimandum est, alterationem pulsuum quæ ex omnibus simul causis moderate oblectis procedit, maiorem oportere ea esse, quam facit una. Possunt siquidem, uel ob unicam tantum causam exactè affectam, ad ultimam deuenire ipsi pulsus alterationem. Igitur facultas extremè delecta, minimos efficit pulsus, etià si molles quidè tunc instrumentorum sint, urgeat autem necessitas. Itaque ad pulsus extremos constituendos, interdum plures causæ desiderantur, interdum satis est una. Maximus quippe pulsus neutiquam fieri possit ob facultatis robur summum, citra opem aliarum: minimus autem nonnunquam ob imbecillitatem sit solum. Quare ante omnia in pulsuum alterationibus, attendenda quantitas est causarum offensionis. Vt autem ad tertiam & quartam coniugationem explicandas nos conuertamus, ubi languescat facultas, urgeat usus, durumque instrumentum sit, potissimum ad crebritatem, deinde ad paruitatem, postea ad tarditatem, pulsus uidebis uergeret: non necessarii tamen, nec perpetui, nec etià in quolibet illorum, nec simul concurrunt omnia. Etenim ubi læsa insigniter sint omnes causæ, minimi, creberrimi, & tardi ipsi pulsus fiunt. At si offensio sit instrumentorum & facultatis parua, ac generatiois eorum multus usus, hi non erunt iusto minores, nec tardiores: imò interdum manifestè celeriores: maiores autem si uou aperte, pares certè perspicue moderatis. Si uerò infirma facultas sit, & maior usus, una cum mollietudine instrumentorum (quod in quarta coniugatione contingit) si quidem permixtus usus uon crescat, nec longe à natura abſint facultas & instrumenta, multò magis increſcet pulsus in magnitudinem, quam in celeritatem. Crebrior etiam iusto erit, sed non perinde ac ille tertij complexus, quod usui quædam ille magis hic satisfaciatur. Quod si paululum usus & facultas à natura li statu deflectant, instrumenta uerò multum ad mollietatem deflectant, ad mediocritatem pulsus liorum affectu accedent, tum quantitate differentie, tum qualitate motus, præterea quietis tempore, tantumque una occurrit mollietudine & statum naturalem excedent. Si uerò non ita deflectant multum usus & instrumenta, facultas autem uehementer laboret, tales pulsus admodum parui erunt & crebri, modicè uerò tardi. Si autem durum sit instrumentum, facultas ualida, & usus remissior (hoc enim erit quintæ coniugationis) minores pulsus gi-gnentur, non tamen necessarii tardiores, si cuncti nec crebriores. Verum si admodum remissus sit usus, & instrumenta modicè dura, non minores modò, uerum & perspicue tardiores atque rarioreſ fiunt. Si uinum usus, à uitio instrumentorum uincatur, abundè fuerit pulsus paruus, & crebri. Si uerò instrumenta sint mollià (quemadmodum per sextam coniugationem) neutiquam minor quam naturalis, quod quidè conspici possit, pulsus ipse uidebitur, nisi singulariter usus sit imminutus: & omnino hoc rarior apparebit, quod dissolutior sit usus. Porro si usu aucto facultasque ualent, mollià sint instrumenta (hanc enim constituo

Facultas extremè delecta, minimos efficit pulsus.

10

10

30

40

50

60

confitituo coniugationē septimam) prorsus magni erant pulsus & celeres: crebri uerò nō semper, sed ubi modicē ipse usus increuerit. At si arteriarum duræ sint tunicae (quæ octaua & ultima est coniugatio) si parua quidem durities sit, sed usus insignis mutatio, maiores, celeriores, crebrioresq̃, quàm iustum sit, ipsi pulsus euadent. Sin autē æquo utraq̃ causā, nec illo admodū longuo intervallo, à natura deflexerit, pares quidem naturalibus, sed celeriores atq̃ crebriores fient. Iam si insignis læsio usus & instrumentorū sit, ut hæc planē duriora sint reddita, ille urgeat impetu, celeriores etiamnum moderatius erunt, minoresq̃ & crebriores. Cum igitur à ualida facultate uehementis discludi pulsus non possit, nec mollis à mollioribus instrumentis: si quando pulsus deprehenderit celerem (qualem diximus familiarē esse robori facultatis, usuiq̃ urgenti, & multitudini instrumentorum) si quidem cum neutro illorum celeritas sit coniuncta, intelligas eum pulsus oriri à solo usu urgētē: si uerò cum altero, omnino ex illo orietur, quod signum tale producat, necessariūq̃ etiam ex incremento usus. Non possunt siquidem celeres pulsus existere, sicuti nec magni, nisi usus posulet. At quatenus ad robur, uel imbecillitatem facultas transit, ex proprijs eius pulsibus dignoscas licet. Eadem est ratio & in qualitate instrumentorum noscenda. Quamuis autē pulsuum generationis sit usus, colligendum est ex cōmūtatione magnitudinis crebritatis atq̃ celeritatis. Si enim pulsus maximus sit, creberrimūq̃ & celerissimū, summē urget usus. Sin magnus tantū, & paulo celerior sit, non tamen maximus, nec creber, usū nō erit magna immutatio. Ex alijs etiā signis, citra pulsus, ipse usus cognoscitur. Nam siue copiosus sit calor, siue exhaustiur animalis spiritus, id haud magno negotio exploratur: quod uidelicet calor quidem tactum oī fugiat, ac præterea spirandi difficultate, fin, atq̃ interno

*Pulsus nec celer
nec possit esse, nec
magnus, nisi
usus posulet.*

*Calor qui non
fugit deprehenditur.*

*Animalis spiritus
in quo quiescit
leat absumi.*

GALENI PERGAMENTI de causis pulsuum lib. II.

Inæqualium pulsuum quidam in arteriæ uno motu labefactant equalitatē, alijs illam euerunt in pluribus: quam medici collectiuam inæqualitatem appellant. De cuius sanæ causis primo loco considerabimus. Comitantur enim eiusmodi pulsus inæqualem cordis temperiē, uel instrumentorū & facultatis. Nam ut obstructionibus, aut compressionibus, aut duritiei, aut plenitudini superueniunt, sic ut intelligas plenitudinem quæ estimatur ad uires, seu facultatem. Cum igitur tres causæ sint continentes pulsus generationis, instrumentum, facultas & usus: non potest ex usus alteratione constitui collectiua, quæ aperta sit, inæqualitas: quod nec repenti, nec cumulatē adeo unquam immutari minus possit, ut pulsus (uerbi gratia) prior sit magnus, uel celer, uel crebrior: alter tardus, uel paruus, uel rarus. Cæterum non quos ratio coll-

*Pulsus inæqualis
à quibus causis
fit prædicatur.*

*Pulsuum genera
trium causæ continen-
tes sunt tres,
instrumentum, facultas
& usus.*

git esse impares, uocare inæquales solemus: sed quos dilucidē conperimus sensu tales existere. Porro itacundia (quæ uidetur innati caloris esse ueluti quidam feruor) habet sanē interdum & ipsa inæquales pulsus: oī illos quidem sua sponte (semper enim haberet tales) sed ubi adiūctus ad eam aliquis timor fuerit. Iurē ergo tunc & inæquales apparent, cū nō tantū in diuersis alterentur causis, sed etiam natura cōtrarijs. Nam propter uindictæ cupiditatē, alii, magni, celeres, uehementes: quia uerò timor est maior accipiens di mali, quàm spes inferendi, parui, humiles, languidi, & tardi sunt. Quare inuicem utriq̃ pro causæ præpollentis oatura, uidentuariariac excellit modō quidem ira, modō metus. Quinimod ipse timor uehementis existens, inæquales efficit pulsus, idq̃ nō usq̃, sed facultate oblecta, nec imperante omnibus instrumentis. Non tamen omni facultatis læsioni succedit collectiua inæqualitas. Siquidem cū per se in firma est, gignit pulsus oī ita crebri inæquales. Vbi uerò suapte natura est ualida, opprimit autē à copia humorū, aut enām cōrumacia instrumenta sortitur, tunc illā inæqualitatē efficit. Cū itaq̃ delapsa in imbecillitatē insignē facultas arteriæ fuerit, pulsus ædunt languidi, parui, tardiq̃. Sin illa, quantū in ea est, ualeat, sed aliqua copia opprimal, uarios ita & inæquales efficit pulsus: plurimos quidem languidos, tardos & paruos, cū uidelicet graui onere est pressa: plurimos autē uehementes, celeres atq̃ tardos, ubi leuiori. Quod si nec admodum grauis, nec nimis leuis offensio sit, cōtrarij ex æquo, pares numero ipsi pulsus conspiciant.

*Itacundia efficit
pulsus innati caloris
feruor.*
*Itacundia, dum
alij est timor adi-
unctus, pulsus
inæquales efficit.*
*Timores effi-
ciunt inæquales
dum cōtrariis.*

*Timor uehementis
quæ ratione pul-
sus inæquales effi-
ciat.*

*Facultas arteriæ
cōtrariis imbecilla, uel
aliqua mole humo-
rum oppressa,
quæ pulsus elat*

*Instrumentorum
uicia, quando
inæqualis pul-
sus efficiant.*

At instrumentorū ultra, in hunc modum gignunt inæqualitatē. Vbi enim circūfectas regiones arteriæ, quæ ad hoc destinatae sunt, ut illam distantem ex capiat, aliud corpus infederit, non possunt per illud restrictæ arteriæ distendi satis. Itaq̃ singulari actionis defectus, tandem conseruunt unū magnū opus absoluit, quod alioqui usus nō expleat. Quo tempore uolentē & uehementē agere ipsa facultas cogitur, ut exploret omnino illa, quæ sua instrumenta obfederūt, & proliuerūt motu. Ac sic sanē maiorē prioribus, & uehementiorē, & celeriorē, necesse est pulsū euadere, qui etiā crebrior * uel ab ipso principio fuerat: quādoquidem impari usui actionem, necessariō comes est crebritas. Si igitur parē impetū facultas in omnibus quæ cōsequuntur distentionib. retineret, æquē magni semper fierēt, & uehementes, & celeres pulsus: quia nō non retinet, sed refert se ad pristinū motū, ne in casum defatigat, uaria oritur & cōstuita inæqualitas. Accidit etiā interit inæqualitas ob sanguinis copiam, aut in uenas, aut in arteriis ipsas infusam. Ea tamen facillimē sanguinis detractione sedatur. Siquidem sanguinis copia in uenis, uicinas arteriis nō secus ac tumor præter naturā cōstringens & premeus, si per uiam uacuet sectionem, subito arterijs amplius exhibet locū. Quod uerò sanguis in ipsas arterias infusus, præcipue si crassus uel lentus sit, uiam intercipiat spiritus, uarijsq̃ & difficillimas edat inæqualitates, nemo est qui nesciat. Vbi igitur aut ualidē comprimitur, aut obstruunt arteriæ, uel si integra sit

*Pulsus inæqualitas
occedit ex ordine ab
sanguinis copiam
in uenas aut in
arterias infusam.*

facultas, inæqualitas corripit pulsus. Quod si una cum instrumentorū affectu, facultas etiā perpeſſa fuerit, clarissimū est magis uariam inæqualitatem existere. Verū si instrumentorū illasus status sit, sed magnopere facultas infirma, decurtata in æqualitas fiet. Ad abmotis enim digitis uicta facultas, minores semper imbecillioresq; pulsus creat. Ceterū ipsarū imbecillitas imbecillitatem, quæ quidem prima & exigua exiit, minores languidioresq; non autem decurtatos pulsus efficit. Quæ uerō est hæc tantō maior, ut iam facultati sint oneri applicati digiti, hæc pulsū decurtatorū est causa. Quorū si quidem, qui ad primum reuertuntur motū, reciprocū uocant, minorem imbecillitatem ostendunt: qui uerō alicubi resistunt, maiore. Quemadmodū si perfectē pulsus deficeret, extremam imbecillitatem nunciaret. Verū hæc omnia exploranda esse applicitis arteriæ digitis, non suspensis, apertissimū est. Dissert autem abolitio pulsus, ab eo deficiente: quod illa quidem uelut priuatio sit totius functionis: hic, dimidiæ tantū amissio. Qui sanē deficiens pulsus quantō decurtatus est grauior, tantō leuior exiit ipsa pulsus abolitio. Atque hi quidē tres status quæritate noxæ differūt. Quartus est reciprocō decurtatorū: nempe omniū leuissimus. Quintus hi addit intermittentiū, qui præcedit deficiendum statum. Quod enim in uno aut altero erat, aut certē in numero pulsuum certo, id status deficiendum in omnibus efficit. Porro intercedentes pulsus, contraria ratione ac intermittentes, noscuntur: qui quidem etiam inter æquales, qui æternitatem sunt, consistunt: incidit ubi ualens facultas copia humo- rum, uel instrumentorū obſtructione impeditur. Vt ergo ad repellendā quæ moleſtans, maior saepe & uelocioribus ædit, celerioresq; pulsus: ita plures quoque in eiusmodi præſentibus statibus, atq; alii pulsus sunt: itaq; decretoriam excretionem portendunt. Nec uerō tantū facultatis infirmitas inducit intermittentem pulsū, sed instrumentorū etiā ualida obſtructio, compressioq; & contractio, ubi in se nihil prorsus arteriæ allucere ualeant. Nunc uerō de causis inæqualitatis in uno pulsu est agendum. Solent igitur celeriter quidem primū concitata arteria, deinde parua interposita quiete, motu quodam rardo reliquū diffentionis absoluerē, dum & usus urget, & facultas, quantum in ea est, obsecundat: interruptur tamen ab instrumentorum uisio, aut ab humorū insigni abundantia. Etenim facultatis robur, prioris motus celeritas indicat sicuti urgentem usum, motus qui sequitur quietē. Quippe nisi usus urgeret, nunquā inceptum motū facultas absolueret: sed ubi inhibitus primū eius motus esset, ibi defineret diffentionem, unumq; hunc faceret parū pulsū. Est & alia differentia diffentionis per mediam quætem distincta, in qua motus utriusq; est celer. Videntur tunc facultas propriam contentionem tueri, copiose humorū reſectare: quare differentia hæc omniū est saluberrima. Est præterea quidam alius status medius inter utrumq; ubi motus secundus medius est inter tardum & celerē, hoc est, moderatus. Hæ sunt tres differentie di-

ffentionum quiete interpellatarum. Sunt præter hæc & tres alie, ubi tardo priore motu, alter trisariam uariat: ut aut tardus, aut celer, aut moderatus fiat. Ex quibus pessimus est, qui pulsus a-
 10 trunq; motū tardum habet. Ac longē hoc commodior, in quo celer alter: medius inter utruq; ubi sit moderatus. Haud aliter cum a primo motu moderato, alter tribus modis conuertitur, cō-
 20 modiorē significabit statum celer motus: perniciōsiorem tardus: contrā pessimā est paruitas. Si militer uehementia optima, remissio pessimā. Quod si omnia quæ cōmemorauimus mala, in uno pulsu cōueniant, hic illorum pessimus erit: contrā, si omnia cōmoda, optimus. Transseūdo autem ad eos pulsus, qui rotis diffentionis habent quidem perpetuum motum, non uniuersum tamen pari celeritate, certē qui iam inde ab in-
 30 initio in celeritatem insurgunt, minus onerari facultatem annunciant: qui contrā, magis. Ceterū facultate oppressa, nullus horū exiit. Est autē propriū nō qui in contraria aſſatum mutantur, non solum grauari facultatē, sed etiā obſtrui & premi instrumenta. At in cōtraria aſſatum mutari intelligo, si cum moueant celeriter, subito
 40 fiant tardi: aut si ex tardo primo motu euadant celeres. Oriuntur enim hi, cum ex obſtructionibus & compressiōibus, tum ob facultatem humorum colluuię oneratam. At uerō uibratus pulsus fir, facultate existente ualida, instrumentū duro, usuq; urgente. Quorū si abſit quicquid, *minimē uibratus exiit. Ceterū uiolenta durg arteriæ diffentio, proximē illius generationē cōstituit. Urget autē usus, ubi functio ipsi nō satisfiat, idq; aut ob propriā imbecillitatē, aut cōsum-
 50 mationem instrumentorū, ut etiam maior exiit. Cū igitur in proposito pulsū genere facultas requirit uegeta, relinquit ut uel usū incrementē, uel redundantibus instrumentis, uel utriusq; iunctis, diffentio in uibratis pulsibus ipsi usus fir im-
 60 par. At usus, abundantia calorū augeatur, uel exhausto animali spiritu. Contumacia instrumenta sunt, ob obſtructiones, compressiōnes, atq; duritiem. Quæ sanē deridies inflammati, scirrhi affectis, reſectatis, perſeueratis, ac deniq; diffentis accidunt instrumentis. Itaq; iam omnes inuenimus causas originis uibratorū. Nam in temperata inæqualitas, si progrediat, uibrationē quidē augebit, nō tamen causā eorū generationis. Dicrotus autē pulsus (qui fieri nō potest, quin sit uibratus) in hunc gignit modū. Vbi parte illa arteriæ, quā tangimus, diuiores sint frigidioresq; atq; ita difficilis moueant partes utriusq; fixæ, quas nō attingimus: ac deinde partē mediā diffentionis suæ cōtraherint, retraxerintq; intro, ac secum
 70 rursus exulerint, his necesse est ipse tactus ferriatur. Atq; huiusmodi pulsus est dicrotus tantū, nō autē uibratus perſeipicē. Alter uerō qui iuxta & satis uibratus est & dicrotus, fit ad hunc modū. Vbi enim arteriæ subſtat cum uibratione pars illa quæ sola cū est intectā, iactetur facili, alie

Diffentionum
pulsus quiete in
terpellatarum
differentia.

Facilitas abla-
ſſa diſcreſa, na-
træ pulſum inæ-
qualitatem pro-
ducunt.

Decurtatorum
pulſum diſcre-
men.

Pulſus abolitio
à deficiente pulſu
quomodo diſſer-
nat.

Pulſus decurtatus
reciproci.

Pulſus intermittens
tamen.

Pulſus interce-
dentes.

Decretoria ex-
cretionē quæ pul-
ſum indicant.

Intermittens
pulſus à quibus
cauſis erit pul-
ſus.

Inæqualitatis
in uno pulſu cau-
ſa.

Pulſum in cō-
traria aſſatum
permutatorum,
quid proprium.

Vibratus pulſus
uolens.

Vibratus pulſum
quomodo uigat.

Vibratus pulſum
abundantia co-
lorū augeatur,
uel exhaſto a-
nimali ſpiritu.
Instrumenta cō-
trahentia quomodo
ſunt.

Dicrotus pulſus
(qui neceſſariū
etiam uibratus
eſſe) generatio.

Dicrotus tantū
pulſus qui dicitur.

Dicrotus uibratus
tam rudo.

alix autē partes utringue sit, crassitudine numeroque onerari corporū incumbenū, adeo ut ne motus quidem earū occurrat tangentibus: necesse num est, parte hac, quę est aperta, omni iam sublatā, reliquas nō manifestas, quę utringue sunt, adhuc attolli: ac proinde etiā media, quę delata indudū est, de integro unā cum illis quę utringue sunt, attollerat, ita ut redeat, occurratq; iterū foris ipsām tangentibus. Planiū est igitur dicrotū pulsum, interim ex magna intemperie ortū trahere, parialq; duritie arteriæ: interim ex ingenti duritie, cōiuncta cum intēperie aliqua, uel crassitudine, uel colluuiū humoris, uel carnis.

*Capitaneū di-
croty pulsus di-
ferre.*

Capitaneū uerō pulsū illoc cū dicrotō cōuenit, quōd bis pulsāt, causa autē nō cōuenit. Neg enim cum instrumentorū duritia necesse illi est, nec cum in temperie, ut iungatur. Verū ubi facultas contentiōē naturā retinet, arcetur autē a motu, uel ob humorū colluuiū, uel obstruccionē, uel compressiōē instrumentorū, quiescent distētiōē intercipit. Cuius altera pars post quietē, iurē roborator est illa, quę eam antecedit, quōd ab impecta collectā facultatis oriatur. Quōd si etiā ille secundus impetus inferior atq; imbecillior fuerit, erit sanē is caprizante detenor pulsus, non tam dicitur caprizans. At undosi & uermiculantes pulsūs, sola differunt quantitate, sub uno cōprehenū genere. At sunt sanē inter eos nōnulli, qui in diuersis partibus arteriæ, inæqualitatē, idq; in una distētiōne, forisant. Sunt autē illorū generatiōnis causę, imbecillitas facultatis, uel cōpia humorum, uel instrumentorū summa mollietates. Nam cum uis a principio in arterias permeans, totum uis attollere pari firmitudine nequeat, hic quę propinquior est parti principi, morum primō auspicatur: sicuti quę remotior, serius id quod Erasistratus perpetuū fieri, ceterū falso, arbitrat. Siquidem nemo ignorat, omnes arteriarū partes naturaliter eodem mōre tempore. Rarō autē, idq; præter naturā, partes cordi uiciniores moueri prius, ac dein remotiores. Qui pulsūs nec undosus, nec uermiculūs est, nisi etiā hoc illi accesserit, ut quod fluere per arterias uidetur, sisti alicubi, & quiescere appareat: mox uetō iterū fluere, ac iterū remitti, atq; hoc per uniuersam arteriā. Porro qui ex his a cōpia humorū gignunt, ab illis quos imbecillitas facultatis, cōpia humorū copē, induxit, sola magnitudine differūt: unde hi ob paruitatē, uermiculantes: illi ob magnitudinē, undosi appellati sunt. Et causam habēt illi facultatis languorē, hi a bundantiā humorū. Sed consequunt enām extremā molliēdinē instrumentorū huiusmodi pulsūs. Cuius rei molles ac tenellę uirgę, quę undoso modo tendunt, nōbis exemplū suggerunt. Validam itaq; facultatē undosus habet: cuius nimirum ope, magnas poterit arteriarū partes attollere: imbecilliorē uermiculans, quōd paruis interuallis tum ipsā facultas moueatur. Quem certē necesse est, in æqualem alioqui, etiā intermittentem euadere. Decurtati enām pulsūs consequunt imbecillitatē ipsius facultatis, a qua nimirū pulsūs creant. Vbi enim a corde uis permeans in arterias singulas, magis ac magis diffoluitur in partibus remotioribus, minores tunc

*Arteriarum par-
tes moueri, aū pro
uocari a modo se
haberi, eodem
mōre tempore.*

*Uermiculati pul-
sus.*

*Decurtati pul-
sus uide prope
mostr.*

languidioresq; necessariū eorū motus fient. Si autem nerum sit illud, reperiri nonumquam minores motus in partibus origini propinquioribus, ad inæqualitatem intemperiei anteriorum causa id genus pulsuum est referenda. Siquidem instrumentū a pari robore, eodemq; si humiditate & calore sit modico temperatū, facilius ac magis mouetur: squalidum autem, aut impenſe humidum, aut frigidū, leuiter minusq;. Annuentes autem & circumueniens pulsūs, fieri aliquando simili modo possunt: sæpe alijs de causis accidere. Si enim ualida sit facultas, corpora autē incumbētia arterijs marcescant, quā parte illorum maximē marida, atque eo leuiore, emicare motus possit, ibi etiam maxime illius magnitudo elucet. Quōd si huius partis dilatatiōē alijs utringue minoribus compares, decurtatū motum in utrisque partibus cernet: id quod fieri in facultatibus ualidissimis nequit. At uerō ex situ arteriæ fit inæqualitas pulsuum, ubi tēduntur in illas corporis partes, in quas distorquentur. Porro inflammationes, scirrhi, abscessus, & crudorum quorūdam generatio tuberculorū, ac breuitate omnes præter naturā tumores, uicinas partes ad se trahere ualent. Squallida præterea durities, frigulus immodicus, necnō conuulsia intentio, ac breuiter intemperatura inæqualis, arterias ipsas distorquet. Conuulsus autem pulsus ab ipsa specie, & affectu, quē denotare solet, rectē nōmē accepit. Tendi enim ad utringue arteriam putaueris, statimq; homo conuulsione corripitur. Est enim confluxio una (ut rectē dixit Hippocrates) & conspiratio una, & omnia consentiunt omnibus, etiā omniū natura cōmunis. Nam nisi hoc effet, duo animalia esset, non unum, quicq; nostrum. Cor igitur cerebro arterias, uin culum societatis, transmittit: cerebrum neruos cordi, pari uicinitati daret: qui quamquam non magni sint, mandatū tamen rationis perficere possunt. Singulis præterea arterijs fibræ a neruis deductæ ad societatem cohererent, per quas sit mutus quidam, non modō actionum, sed affectuum etiam consensus. Nihil itaq; mirum, si cum uniuersam neruorum genus coniunctum arterijs sit, cōmunis appareat affectus. Ut autem de alii, humilis, lani, angustū, longi, & breuis pulsūs etiam generatione dicamus, sciendum est, in ualentibus omnibus & ægrotantū plenisq; dum dilatant arteriæ, nos eorum superficiem * supernam multo clarius percipere, quā partes obliquis, & quōd illa propius ad nostrū accedat tactum, & quod cum * paucioribus interpositis corporib; feriat. Peiorē de se rectē expēdas, naturalis pulsus est altior, q; deficiat semper eius in latū motus, præpollat autē in altum. Verū quia in aliorū omniū nobis est mensura, & ueluti regula quædā, nec altū ipsum, nec angustū uocamus, sed moderatū, atq; inter omnes excelsus mediū. Et est lōgus & breuis ad huc col-
60 latus dicit. * At uerō dū moderatū est pulsū dicimus, nō sensum, sed naturālē proportionē & mediocritatē, cōstruimus equalitatis normā. Nā si p sensu iudiciū facias, in illo pulsū lōgitudinē præstet, pson dicitur: quæ dūmodū hęc latitudini. E qui dem altos pulsūs in iracundiā & ante iudicationē

*Annuentes pul-
sus, circumueniens
que uide g-
gnantur.*

*Inæqualitatis
ex sita arteria
causa.*

*Conuulsus pul-
sus causa.*

*Confluxio in
toto corpore
est una.*

*Membrorum
principaliū ut
cōstet.*

*Arterij singula
uicij fibræ a
neruis deductas.*

*Pulsus natura
la cor altior sem
per uideatur.*

*Pulsus moderat-
us quo dicatur.*

*Pulsus alti, lati-
que, ubi cernen-
tur.*

*Pulsus alii qui
sunt dicendi.*

fieri manifeste cōperio : latos autē ut plurimū in
excretionibus decretorijs. Pulsus igitur modera-
ti memores, si quādo offendamus ipsius motus
admodū altitudinē auctā, latitudinē autē aut ni-
hil, aut parū, rectē vocabimus eos pulsus altos.
Quōd si latitudinē manifestū incrementū acce-
dat, eos magnos simul & altos dicemus. Si am-
bo in creuerint, altitudo simul & latitudo, sed nō
multā latitudinē altitudo superet, hos magnos
appellamus duntaxat. Cū uerō eadem propor-
tione altitudo ad auctā latitudinem uincat, qua
etiam in naturali pulsuperaret, is pulsus can-
dem, quē moderatus, retinebit speciem. Itaq; non
altus, ut negi ille, sed maior tantum alio uidetur.
Quin etiā eadem est & in lōgitudine ratio. Nam
ubi eadem proportione augetur, qua profunditas
& latitudo, uniuersum pulsuum, ut diximus
modō, representat maiorē. Quare ut magnus sit
pulsus, nō requiritur ut pares sint motus qui in
dimensionibus trinis augent, sed tantum ut pro-
portione aequales existant. At consistat eorū pro-
portio, ubi nulla prater naturā insignis in crassi-
tudinē mutatio, aut in gracilitate corporis fiat :
præterea nec siccitas immodica, uel humiditas,
uel maximē distentionis necessitas. Perit autem,
aut perturbat, cuiuspiā horū presentia. Vt, si cæ-
tera omnia le rectē habent, facultas autē cōpel-
latur ita magnē facere distentionē, ut eius tumo-
rem circūiecta arterijs loca nō capiānt, in eo affe-
ctū necessarium est altus pulsus apparere. Dum etiā
in eam attolli magnitudinē distensio arteriarū, ut
nisi quā coarctet, naturalem trium dimensionū
proportionē tuebitur. At coarctata, tantū detra-
het de illa dimensione, quā cōstitit, ut progressu pro-
hibita. Quocirca iratis, licet corpore sint optimē
cōparato, sit pulsus altus. Distentionis enim sum-
mum excessum, ne is quidem cōmodē ferat liabi-
tus, sed iam ex imo premitur, & ex obliquo arte-
ria. Sola ergo pars illius ea, quæ infiltrata sola cute
est, nempe superna, omnē calorē excipit : qua-
re necessariō sit altus pulsus. Cæterū multis gra-
cilis corpore, nec facultate admodum firma, pul-
sus, si irascant, magni, & nō alti uidentur esse. Nam
cū in alris pulsibus tantū facultatis robur desi-
deretur, ut maximā distentionē moliri possint, &
quā loca arterias ambientia excipere nequeant:
manifestū utiq; est, in cōmemoratos affectus nō
posse altos pulsus incidere. Iam uerō ubi natura
la robore facultas aliquatenus deficiatur, & lati-
tudo sit insignis locorū, pondusq; accedat arte-
rijs ex superioribus partibus, hic pulsus collatus
ad modō dera, est lanor. Etenim aut altitudo im-
minuta, aut latitudo aucta, potest latum pulsuum
efficere. In uenit autē motus nonnullū, qui qua-
tuor occurrat dignitas, sed ita angustus & obicu-
sus, ut subilis fides speciem referat atq; is quidem
pulsus longus uocal. Ac talis quidē pulsus, qui
uidelicet si dēm aut pulum refert, nō solum tuni-
carum maximā siccitatē ostendit, sed etiā indi-
cat facultatē imbecilliorē, quā quæ possit con-
tumax instrumentū distendere. Quis igitur si lūc
uera sunt, * non statim talis pulsus sit brevis * an
quōd huiusmodi pulsus, in tenui corpore, cō-
tentiq; & aliquātō duriori cute accidat. Etenim
si cutis remissa & crassa, magnā partem motus *

*Pulsus magni et
quodam quid re-
queratur.*

*Trinis sit pulsus
altus.*

*Pulsus letum
quando acci-
dat.*

*Pulsus longus
quatuor, et quid
significet.*

obscurat, utiq; tenuis simul cōtentalq;, totū o-
minino seruabit. Vnde liquet cōspirare gracilitatē
totius corporis oportere, & duritiē cutis simul
& instrumentorū, cum facultatis imbecillitate,
nō summa tamē, ad talem pulsuum gignendū. Ac
uocatur quidem per excellentiam longus : pro-
priē autē tenuis & gracilis. Nam propriē & abso-
lutē dicitur longus, cuius neutram reliquā di-
mensionū percipimus. At uerō brevis sit pulsus,
ubi in parua quapiam particula, arteria sola cute
contegitur, ob idq; sensibilibiter pulsus : partes au-
tem ex utroq; illius lare omnes in profundum
merguntur, nnde proderet motū nequeunt sensi-
bilem. Dicitur etiam per excellentiam hic pulsus
brevis. Propriū tamen eius nomen est, crassius &
tardius. Nam qui simpliciter brevis est, uel ex
corpulentia nascitur, uel ex paruitate. Proximū
est ut de ordinatis & inordinatis agamus. Qui
quidem quādoquidem inæquales omnes sunt,
sed in eo uariant, quōd æqualitatē hic certis orbi-
bus seruent, illi cōfusi undequaq; sint. intelligun-
tur est, causam, quæ eorum in æqualitatē efficiat,
semper firmam in ordinatis & fixam esse. in inor-
dinatis autem, nequāq;. Insuper ordo, ut æquali-
tas, naturæ, si quid aliud, est familiaris. Quare si
alterum eorum sit cōtrahens, minorem signifi-
cat offensam : sin utrumq;, maiorem. Concur-
runt autem ambo in inordinatis : alterum in or-
dinatis qui sunt inæquales. Quod uerō ad mu-
tationum rhythmorū causas pertinet, si rectē qui-
dem est demonstratū, allici per arteriarum dila-
tationes æream quandam substantiam in con-
tractionibus autē excrementa externi, & quasi
fuliginem auctorum humorū : certē necessarium
est, cū distentionis usus insit, maiorem fieri,
celeritoremq; distentionem : cū contractionis,
contractionem. Quamobrem, quibus in xati-
bus plurimi usumuntur humores, ac proinde
plurimum excrementi colligitur (semper enim
quantitati confectorū succorum, excrementorū
respondet quantitas) quæ sunt usq; ad iuuentu-
tem, in ijs nō nihil cedit contractioni distensio.
In quibus autem paucissimi (quod contingit in
senibus) longē maius est distentionis tempus
tempore contractionis.

*Pulsus simplici-
ter brevis qui sit*

*Pulsus ordinati
inordinati que
causa.*

*Ordo æquali-
tatis natura fa-
miliaris existit.*

*Rhythmorū mu-
tationum causa.
Arteria dilata-
ta trahit aërem,
contractis expul-
sum fuliginem.*

*Excrementorū
quantitas respicit
quantitatem cō-
fectorum succo-
rum.*

GALENI PERGAMENTI de causis pulsuum lib. III.

Quandoquidem pulsuum alterationes, quæ
ex primis & præcipuis causis proficiunt,
abundē * sermo antē habitus enarrauit, il-
las nunc explicabimus, quæ ab alijs omnibus
sunt, quæq; non per se planē, sed quōd mutant
primas, causæ pulsū nocant. Cæterū quia hæ
partim præter naturā sunt, partim naturales, par-
tim etiam inter has mediæ, quæ nō naturales ap-
pellantur : rationi uidentur consensū, ut à naturali-
bus exordiamur, idq; eundem sequētes ordinē,
quē in libro tyronibus descripto obseruauimus.

Vir igitur * in uniuersum, mulieribus habent
pulsuum longē & maiorem, & uelocientiorē, pau-
lō tamen tardiorē, sicuti & fatis rariore. Si-
quidem cū mas sit calidior & siccior sexina,
necessum est usum generationis pulsuum, & in-
strumentorum * constitutionē, differre in illis : ac
proin

*Causarum diffi-
rentia triplex.*

*Vir in uniuersum
mulieribus
habent pulsuum
longi et maiori
et uelocientiorē.*

Max est calidior
et sicca sumus
nati.

proinde ipsos pulsus. Atqui copiosior caloris magnus pulsus esse familiarem ostendimus. Igitur cum mas sit nō calidior modō, sed multo calidior fœmina, utiq; maiores, ac multo maiores quā illa pulsus habebit. Siquidem pro naturali temperamento, maior tantū, nō multo maior erit ipsius utri pulsus: si autē accesserit à peculiaribus uiræ institutis utriusq; differentia (illa enim in ocio uiuit, hic in multis laborib.) ut sanē multo ita calidior uir reddatur, sic pulsibus eiq; fœmina longē maioribus. Addidimus autē sermōni particulam illam, in *ueneris*, ut studiosis uice sumuli esset, ad totius rei perscrutandū naturam. Sic enim statim de naturali differentia uiri & mulieris meditabunt, reperientq; uniuersum genus in omnibus animalibus, masculinū ualentius fœminæ esse. Cæterū uidelicet alias differentias præter naturam (ut uidelicet sit hominem frigidō prædictū temperamento, molliterq; educatum, cum biliosa uragine cōfusus) certē in muliere ipsa reperies quā in uiro pulsū longē maiorem. Naturalis itaque differentia, ut mas quidem ad fœmellam, maiores tantū, atq; uementiores: ut uiri autē ad mulierē, multo maiores ac uementiores pulsus producit: quōd nimirum uiris naturale robur laboribus crescat. Quinetiam & faculteras robur, quod maribus adest, & ipsum aliquid conferet ad magnitudinem pulsū. Quippe ualidis faculteribus magis pulsus peculiare existunt. Taceo totū corpus uirile, ad perspiratū esse optimē comparatū, tum, excrementisq; uacū, nec compressum: fœminis autem cōtrario modo dispositū. Quare ut illorum habitus ad magnitudinem, sic haec ad paruitatem pulsus uidetur aptus. Nam est ipsi ad sit instrumentorū molines, quæ ad pulsus magnitudinem facit, plures tamen fortiores quā alia, sunt paruitatis causæ: nec plurimum uiri à mulieribus discedunt mollitudine. Quōd si multo mulieris instrumentum sit mollius, cū facilius sic sit cessurus humoribus infestantibus, id ipsum erit etiam in causā, ut minores in eis pulsus fiant. Est autem mulieris pulsus celerior quidem pulsū uiroꝝ, non tamen excessu insigni. Siquidem cum eorū pulsus sit multo minor, quā ut possit usum explere, augeat quantum potest celeritatem: cui eandem ob causam accedit crebritas. At uerō infans masculus maiorem tantum, uementiorem, rariorem, non item multo, pulsū habet, quā infans fœmella. Quis calidi sunt, multo habent maiorem, celeriorem, atq; crebriorem pulsū: non autem multo uementiorem. Cæterū impræsentariū calidos (ut moris est) dicimus, qui humiditate, siccitateq; temperati cū sint, caliditate exuperant. Hi igitur quā calidiores sunt temperatis, eo maiores habent, celeriores, atq; crebriores pulsus. Cur autem non multo uementiores, id quidem iam exposuimus prius, de ipsiq; nonnihil potest dici. Graciliores citra ullum affectum alium, maiore, rarioremq; multo, uementiorem paulo pulsū sortiuntur. Nam cum graciliter ipsā, regiones arteriarum magis dilaret, leuoraliq; incumbētia corpora reddat, pulsibus magnitudinem haud con-

temendam conciliat. Atqui, ubi pari relicto usu, crescit magnitudo, rariore sic necesse est pulsus fiant, idq; tantō, quāto scilicet sunt maiores. Maiores uerō erāt multo, proinde rariore etiam multo erunt. At uementiores esse apparebūt, nō quōd ullum acquisierint robur, sed quōd magis prodant quā habebant tensionē. Pro ætatebus hoc pacto pulsus uariant. Infantis pulsus creberrimus est, rarissimus senis: omnes qui inter hos intercedūt, proportionē seruant, prout uel ad puerū, uel ad senem accedūt propius. Celerimus item pueri pulsus, tardior senis existit. Reliquarū ætatum pulsus ambigūt inter hos. At fœnex à puero, longē magis raritate, quā celeritate distat. In uementē & magnitudinis differentia, maximus est, ut in ætatibus, pulsus iuuenū, minimus senum, medius & paulo maior pulsus puerorū. Iam uementissimus iuuenū, languidissimus senū, medius inter hos, puerorū est pulsus. Etenim cum calore nō pauco pueri prædicti sint, substantiā quoq; quæ refrigeret illū, nō paucam postulant. Quinetiā substantiā animalis ipsi ritus in illis nō tantū nutrire oportet, ut in adultis, sed etiā unā cum instrumentis augeri. Itaq; his nominibus pueri magnis dilatationibus egent. Quia uerō etiā humores exhauriūt plurimorū (ui delicit nutrimentū & incrementū ratione) ob idq; fuliginorū excrementorū acerrimū per totū corporis habitū contrahant, utiq; desiderant etiam arteriarū maximas cōtrações. Maximū ergo, simulq; celeritū pueri utriusq; motū requirūt: sicq; infra usum est functio in q̃. Nam licet quāxime celeres sint, & magni, usum tamen non explent: quare hic crebris opus est motibus. In senibus autē planē cōtrā habet, calor paucus, cui par est generatio fuliginosorū excrementorū, ipsi etiam animalis nutri nō iure itaq; habent contrarios illis pulsus, paruos, tardos & raros. Sunt ergo pulsus puerorū magni, si cum magnitudi-

ne eos arteriarū cōfusus: parui autē, si quāritatē tantū distentionis spectes, eamq; ad pulsus iuuenum cōfusus. Sed tamen nō maximos pulsus sortiuntur pueri, ne si ad magnitudinē quidem eos arteriarū perpendas. Siquidē nec facultas eorum perueniat ad summā robur, & cōarctent in eis molles arteriarū tunicæ, multo de maxima distentione detrahatur, tamenq; pulsus eorū mediū superet. Porro mollitudines instrumentorū, quæ remore à cōarctationeque sunt, ad pulsū magnitudinē conferūt: quæ uerō premunt atq; grauatur, ad paruitatē: præcipue si facultas destituitur robore. Cū autē utriusq; motus plurimus instantibus usus sit, minimis senibus, & omne interpositū tempus ætatis utriusq; ulum remittat, magis autē cōtração: rationi consonū est, ut quantum à pueris recedit ad senes, tantō semper utriusq; motū habeant tardiorē: magis autē cōtração. Atq; ex his nascunt differentē rhythmorum pro ætatibus. Est autē uementissimus iuuenū pulsus, & languidissimus senū: quoniam illis quācūq; facultas ualidissima est, hic debilissima. In alijs etiā ætatibus, pro robore illarū uel imbecillitate, pulsus remissione & uementia differunt. At uerō pro anni temporibus, medio quācūq; Verē pulsus maximū & uementissimū sunt, ut in tē-

Pulsus senum
dum ætate
fœminæ.

Iuuenum pulsus
est maximus.

Puerorum pulsus
celerissimus, magis
q; crebris.

Senum pulsus
paruos, tardos, atq;
raros.

Mollitiei instrumentorū quando ad pulsū magnitudinem conferūt, ut quādo fœcus.

Viri naturale
robur laboribus
crescat.

Faculteribus
ualidis magis
pulsus peculiaris
existunt.

Mollitiei instrumentorū,
ad pulsū magnitudinem
faciunt.

Mulierum pulsus
qui quāto uementior
celerior.

Calidiorum namque
pulsus.

Graciliores
pulsus quales.

Autumno qualiter fiant pulsus.

Hyeme qualiter fiant pulsus.

Pulsus differentia secundum tempora referuntur ad ipsum facultatem. Cuiusmodi sunt.

Ver medium est de temperatis. Pulsus peculiaris est optima constitutio corporis. Qualis.

Aestate crescit visus pulsus, sed languet facultas.

Hyeme augetur facultas, sed pulsus summi visus minuitur.

Crostitas pluvialis habent calidissima.

Calor innatus est temperatus, ut acquisitus intemperatus.

Calor adveniens sunt functiones vides imbecilliores. Pulsus commutatus est regulatus, ut si quidem a temporibus.

poribus: celeritate vero & crebriitate commode pari. modo medio autumno. * Progrediens autem Ver, nonnullum de magnitudine & vehementia derahit, sed augeat celeritatem & crebriitatem, ita ut incurrente aestate iam languidi, parvi, celeres crebrius fiant. Autumni progreffus cuncta imminuit, magnitudinem, vehementiam, celeritatem, & crebriitatem. Sic incurrente hyeme, in paruitatem convertitur, remissionem, tarditatem, & raritatem. Respondet autem initium veris, extremitati autumni: illius finis, initio huius. Aestatis item principii, suo, & principii hyemis, suo fini. Proinde quae pari spacio à media aestate & media hyeme in utranque deflexerunt partem, similiter variant. Porro media aestas, partim contineat cum media hyeme, partim dissidet. Nam parvi utrobique & languidi sunt: sed celeres, crebrius aestate: tardi, rari, hyeme. Non perinde tamen parvi aestate ac hyeme: sed aestate minus. Nec ita hyeme languidi, ut aestate. Quae igitur fecundum tempora accidunt, ad has referuntur tres causas: ad usum, facultatem, & instrumenta. Nam prout in ipsis horum singula variant, mutantur pulsus. Ad medio quidem Vere, aëris status nos amplectentis, temperatissimus est: itaque corpora etiam sunt sana. Siquidem eo praecipue tempore, facultas est robustissima, & moderatissimus calor, necnon instrumenta ipsa libera ab omni excessu. Vnde & pulsus corporibus quidem optimè comparatis, maximi & vehementissimi fiunt. Nam hi peculiare sunt valde facultati, & moderato usui, instrumentisque naturali lege constitutis. Si vero usus nonnulli mediocritatem excedat, non modò magni & vehementes, sed etiam celeres fiunt. Quòd si ne sic quidem functio expleat usum, mutatio transibit in ebrebitatem. Aestate porro crescit usus, sed languet facultas. Quamobrem aliquatenus decrevit illa vehementia simul & magnitudo: sed tamen hac minus. Nam quia urget usus, augetur nonnullum: unde etiam celeritati & crebriitati accedit momentum non contemnendum. Hyeme contra, quam aestate, est validior facultas, non aequè tamen ac Vere: sed usus remittitur generationis pulsuum. Quare languidiores pulsus hyeme quam Vere sunt, & vehementiores quam aestate: ceterum satis sunt parvi, quòd & facultas infra summum sit cohor, & usus remissus admodum: quae ipsa in causa remissio est, cur tardi, rari, exstant. Iam vero ubi Hippocrates dixit, Quae augentur, plurimò habent calidi: non simpliciter calidi dixit, sed innata addidit, ut qui alterum sciret calidum acquisitum esse, cuius magna copia iuvenibus suppetit. Est enim temperatus calor natiuus, acquisitivus autem intemperatus, & quasi igneus. Similiter quando inquit, Venit hyeme & Vere natura calidissimi sunt: de calore nativo intelligit. Què quidem calore abundante aestate paucissimum, advenit calore abundante: unde marcescit potius, quam nutritur, corpus. Ad hanc, in advenit, calor tantum abest ut functiones meliores reddat, ut eas etiam longè inferiores efficiat illis, quae à moderato proficiuntur. Pro regionibus etiam, perinde ut pro natura temporum. In ue-

menter calidis, sicuti media aestate: in magnopere frigidis, ut media hyeme in temperatis, ita ut medio Vere. Ad hanc rem proportionè, quae siquidem locum fortuantur. Similiter alij status aëris nos circumdantis, calidi quidem, temporibus calidis, frigidi frigidis, mediis medio Veri respondent.

Pregnanti pulsus, maiores, crebriores & celeriores sunt: Ad hanc rem tenetur. In eis siquidem, praeter usum, priorum mutatur est nihil. Intellexit autem is, & augetur, quòd mulier non sibi iam soli respiret ac pulset, sed facti etiam cogatur: quare celeriores, maiores, & crebriores fiunt pulsus. Somni etiam, si quid aliud, inter naturalia censetur, qui & ipsi variant pulsus: initio siquidem minores, languidiores, rariores, rarioresque illos efficiunt: * procedentes, tarditatem pedetentim auget, & raritatem, praefertim à cibo: tunc tamen sunt maiores, vehementioresque pulsus: tandemque si diuturni huius fuerint, ad remissionem & paruitatem redeunt, tarditatem & raritatem servantes. Etenim facultas concoctrix pro somnum se intro recipit magis. Cum ergo intro moveatur, conficiat materiam, primò quidem veluti imbecillior reditur, oneraturque paulò autem post, dum alimentum fruitur, quod conficit, confirmatur ipsa, calorque animatus augetur. Quia igitur oneratur facultas initio somni, atque debilitatur, oportet minores pulsus & languidiores existere: at mox ea confirmata, & diutius maiores, vehementioresque. Cur autem concoctiones per somnum exactius fiant non in ventriculo modò, sed in arteriis & venis, non est huius loci explicare. At vero quòd quidem dormientibus motus calor qui foras tendit, est imminutus: uiget autem, qui intro: contractiorem quidem oportet celerem fieri, distentionem vero tardiorum: ac proinde totus ille pulsus non est absolute tardus, potius quam velox, sed tantum altera parte tardus. Nam si motus qui intro pergit, praepolleat, protiusque confideat: ac rursus inde incipiat, qui foras tendit, haudquaquè hic pulsus distentionem producat plurimam. Si vero praepolleat motus qui ceditur foras, contrario existente debili, minimè sanè tunc ab extremo orditur collapsus in distentione, ac summum tandem assequitur magnitudinem. Porro dormientium pulsus, quae parte foras movetur, similis est uigilantium pulsibus: quae intro, permultum videtur distare, quòd terminos inter nos motus sensus nostri non assequatur. Minor tamen est & languidior, praefertim in ipso principio. Praeterea tardus in distentionibus est, & in contractionibus velox, introque recurrens magis. Quare si vehementem quem in contractionibus dicas, nihil eras. Etenim excrementum fuliginosum, quod tunc ex confectis fuscis copiosius colligitur, arteria excerneret vehementius desiderat. Ad vero ubi absolute fucci confecti sunt, si in somno permanet homo, immoderatus erit utique talis motus: ob idque merito uterque motus erit minor, tardus, imbecillius & rarus, cum nimirum somnus sit mortis frater. Nam si alimentum elaborationem excipias, quae communis somno cum viventibus adest, cetera mortem referunt: non videtur

Pregnanti pulsus maiores, crebriores & celeriores.

Somni quos pulsus faciunt.

Concoctrix facultas pro somnum se recipit magis.

Contractiorem autem per somnum se recipit, quod tunc ab extremo orditur collapsus in distentione.

Somnus post confectum fucci, per somnum se recipit, quod tunc ab extremo orditur collapsus in distentione.

uidere, non audire, nihil intelligere, uel cogitare, uel sentire, ratione carere, ac breuiter, proiec-
tum esse. Quod itaq; aliud est somnus, illo com-
muni ablato, quam ad interitū uia? Qui exper-
giscuntur, euestigios pulsus magnos, uehemen-
tes, celeres, crebros, & cum quadam uibratione
habent: qui mox mediocritatem assequuntur.
Non perinde autem in somnum incidimus uigi-
les, ac ex somno euigilamus: quod hoc ferē sub-
ito, illud omnino pedetentim fiat. Etenim turba
lenta insomnia, uel si quis uociferetur, perstre-
par, aut ipsum dormientem tangat, celerem sic,
& subitanēam cōcitatur mutationem. Quare tunc
pulsus illi quos nuper cōmemorauimus, claris-
sime percipiuntur. Fit autem somnus, ubi nati-
uus calor aut ex fangatione, & nimia siccitate
ad alimentum sese cōuertit: aut ob immodicam
humiditatē foras nequitur progressi. Quorum pri-
mus quidem saluberr & naturalis existit: secun-
dus autem, qualis est in comatibus & lethargis.

*Somnus est uia
ad interitum.
Expergiscuntur
pulsus.*

*Somnus quoque fit
modis.*

*Somnus natura
lis quoque.
Somnus prater
naturam.
Vigilia inuolun-
ta.*

*Ascititia habi-
tudines, pulsus
ut naturalis im-
mutant.*

*Ascititia tempera-
mentis, perinde
ut naturalis im-
mutant pulsus.*

*Pulsus pro ex-
ercitatione uolun-
tate uoluntatis.*

*Vinum pulsus
augere ob ex-
altationem spiri-
tus, & incrementum
caloris.*

*Pulsus pro uia
riante calidior
balneorum ma-
iorum.*

languidos, tamen adhuc celeres & crebros.
Quod si hic non cessetur, paruos, languidos,
tardos & raros. Etenim ex balneis commodera-
tis, si quis eis opportune utatur, uidelicet ubi de
seisi fuerimus, incaluerimus, refrigerari, refici-
cati, nauseas affecti, aut inaequali intemperie
fuerimus, aut denique euacuationem desidera-
rimus, manifeste corpus uiuatur. Nam corpori
restituunt mediocritatem temperamenti, uires
corrigit, opportumum calorem augent, ac de-
nique und cum sudoribus nonnulli * flatum
disciunt. At immodice balneis, ipsam faculta-
tem dissolunt, usumq; prater modum inten-
dunt. Frigidæ balneis, illico paruos & langu-
diores, & tardos, rarosq; pulsus efficiunt. Pos-
tea, prout sit fit quod induxerunt, omnino
in torporem conciliabunt, uel robur. Quæ torpo-
rem induxerunt & refrigerarunt, paruos & lan-
guidiores, & tardos & raros efficiunt. Quæ ex-
calfecerunt, & robur concitarunt, magnos, ue-
hementes, celeritate & crebritate moderatos.
Etenim balneis frigidæ statim refrigerant omni-
no: postea uero uel confirmant, uel obruunt fa-
cultatem, unaq; perfrigerant. Itaq; & pulsus pro
ratione immutantur causam. Porro in lone-
ne frigida, artenarum motus plus intro quam
foras fertur: quod & calor illius illico magis fe-
atur. Cibus adeo copiosus, ut opprimat fa-
cultatem, pulsus inaequales atque inordinatos
concitat. Modicus, magnos, celeres, crebros, ue-
hementes. Parcius quim qui satis nutriat, non
quæ ac moderatur, ceterum minus mutat, ne-
que id diu. Vinum pulsus cetera ut cibus ua-
riat: hoc uero interest, quod illico immutat, & ci-
tus mutatio a nino profectia recedit, quam illa
quæ il cibo: quod item celeritatem amplius &
magnitudinem, quam uehementiam & crebri-
tatem angeat. Etenim apposito quom facit ui-
num, celeris est, quid humidum sit & calidum.

*Balneorum mo-
derata in cor-
moda.*

*Balneis immodi-
ca facultas dis-
soluit.
Balneis frigida
quomodo pulsus
immutat.*

*Pulsus pro ci-
bi uariis modis
mutatio.*

*Vinum quom ce-
leriter ipsi pul-
sus immutat.*

*Vini appositio
ad corpora, ut
celere ita minu-
m diuturna exi-
sit.
Vinum corpus
pulsum, quom ci-
bus, maiorem et
celeritatem reddit.*

*Uermiculantes
pulsus quibus
fictis accedunt.
Uermiculantes pul-
sus quomodo ex-
nascuntur,
Cacoethes
fictis.*

Præterea, quæ astantia ac subito nutriunt, huic ce-
leriter permanc. Quamobrem, ut celerem, ita
minime diuturnam a uino appositionem corpo-
ra accipiunt, cum facile digeratur per lialitum.
Porro quod nutriat, pulsus ita ut cibus uariet:
quod aut amplius quam ille calfaciat, insignio-
rem adiciat illis & magnitudinem, & celerita-
tem. Iam uero in cholericis, magnis alui sibi
mensibus, ac omnibus deniq; his, quæ immodi-
ce corpus uacuantia, ipsam facultatem debili-
tant, cōtinenter pulsus uermiculantes accidunt.
Vbi autem oppressa est il febre cacoethis fa-
cultas, formicantes oriuntur. Siquidem ut pulsus
uermiculans sit, tardus omnino esse atque rarus
debet. At in acutis febribus (cuiusmodi neces-
sario sunt cacoethes) non sustinet pulsus caloris
copiam, uel tardum in summo, uel semel fieri ra-
rum. Ceterum tardus est, aut certe nō celer pul-
sus, ubi facultas opprimatur.

GALENI PERGAENI de causis pulsuum lib. IIII.

In hoc autem libro, de Causis pulsuum præ-
ter naturam dicamus, ab animi perturba-
tionibus orsi. Ite igitur altus est pulsus,
magnus, uehementis, celer & creber. Siquidem

*Ida pulsus qua-
lis.*

facultates animalis moderatrices, si quando impendat necessitas, maiore vi suas obeunt functiones: id quod in iracundia conspicitur. Similiter etiam per bonas iudicationes, pulsus sunt manifeste uehementes. Tunc siquidem facultas, ut molesta explodat, seipsam excitat. Lætitie magnus, rarus, & tardus est pulsus: at nihil differt uehementia. Lætis enim diffunditur per uersum corpus calor, ac plus foras eius moras effertur, ut tritibus intrō. Vnde maior fit meritō pulsus illorum, nō tamen uehementior. Cæterū ea quæ diximus, * de moderata lætitia, & quæ propria ratione pulsus ipso immutat, non de immodica, quæ uires ipsas * resoluit, intelligenda ueniunt. Trititæ paruus, languidus, tardus & rarus est. Nam cū trititia ipsa refrigret, caloremq̃ intrō concitet, meritō contrarios pulsus superioribus efficit, qui lētitiam sequuntur.

Pulsus reddi
breuiter, per bo
nas iudicationes.
Lætitia pulsus.

Lætitia diffundit
calorem per uer
sum corpus.
Tritibus intrō
conuerso calora
moras.

Trititia pulsus.
Trititia refri
gerat.

Tumor pulsus.

Tumor inuetera
tus à trititia
non differt.

Pulsus pro do
lorum variatio
ne mutatur.

Pulsus pro ra
tione inflamma
tionis mutatur.

Nervosiores par
tes pulsus duri
us edunt.

tes, & minores: quæ pluribus uenis præditæ sunt, & arterijs, contrā. Atq̃ inter hos maior est, dum arterie in parte abundans: si tunc inæqualis, ac facile inordinatus. Porro quibus sepius transuersum est inflammariū, hic consensuionibus sunt obnoxij: quibus pulmo, suffocationibus: quibus os uentriculi, syncopes: quibus secur, atrophie: quibus uentriculus, cruditas: quibus renes, urinae suppressiones. Ad hæc, partem insignio ri præditæ sensu, pulsus etiam dolorum nomine mutant: quæ minus sentiunt, pro affectu tantū. Etenim omni parti quæ inflammata est, hæc necessariō duo accidunt, calor immodicus, & tensio: quæ corpori uniuerso cōmunicantur, ubi aut pars nobilis inflammata fuerit, aut insigni prædita inflammatione. Atqui immodicus calor qui uniuersum corpus occupat, febris est, quæ usum pulsuum alterat ut dilucide. At partis inflammatio tensio peruatet arterias: quam obrem pulsus durior redditur, præcipue in nervosis partibus, quod præ ceteris hæc tendantur inflammationibus, ut quæ sunt sua natura iam tensæ, atq̃ uel secum partes uicinas contendunt. Nihil autem est mirum, si inæqualis in arteriosis partibus inflammatis fiant pulsus, cū eorum facultas esse cōtra, opprimat humorū colluuiæ, ipsaq̃ sint affecta instrumenta. Pleuriticiorum celer est pulsus & creber, nec admodum magnus. Videri etiam possunt uehementes. Est tamen nec uehementis, nec languidus, quod ad affectū attinet. Etenim pleuriticorum pulsus, quia nervosior è durioremiq̃ arteriā prodit, imperitis imponit, ut uidelicet durum pulsus, esse uehementē existant. At uerō illa inæqualitatis species, quæ serrantis præbet imaginem, pleuritidis in primis propriū est signum: si quidem remissa sit, mollis & facile maturanda: si uerō magna, difficilis, & admodum crude pleuritidis. Tales cum imbecillis facultate coniunctæ, periculose existunt: cum firma autē, aut tardē coquentur, aut ad suppurationem descedent, aut tabidus eas excipiet marcor. Ac illius sanæ quæ maturificat, pulsus pedetentim deponit omnem mutationē præter naturam. Quæ uergit ad suppurationē, pulsus suppuratorij proprios sortitur: sicuti & marcorū illa, quæ in tabem degenerat. Est autē ipsa pleuritidis inflammatio costas succingentis membranz. Itaq̃ febrili acutē, quia pars affecta, cordi est uicina. Quia uerō eo modo febricitant, ideo habent & pulsus celerem: durum autē insignitum, quod pars nervosa affligatur. Iam quia ita habet, ideo minor est pulsus, quā febrē expedit. Quare ut & creber fiat, par est: quod magnos pulsus calor possit, refragetur autem durities. Siquidem quantū ab usu abest magnitudo ipsius pulsus, tantū a crebritate pensatur. Inæqualis autē in his est crebritas, quod neq̃ humorū qui inflammationem cōmittunt, una sit species. Quare si sint biliosiores, etiam febris acutior erit, cōsequenterq̃ facultatis offensio quædam. Sin piruitiores, & leuior erit febris, & ad soporem procliuor. Nunq̃ enim in pleuritide & peripneumonia sit, ut caput non afficiatur, quod humorū excipiat in illis inflammationibus putrescentiū fuliginē. Verū si putris humor fuerit biliosus, uaporē edit

Inflammatio
dum, uerū sym
ptomata in docu
mentis.

Inflamatio par
tis accendi ne
cessario immo
dicus calor, &
tensio.
Febris quid.

Arteriosus parti
bus inflammatis
cor inæqualis
fiant pulsus.
Pleuriticorum
pulsus.

Pleuritidis prop
riū signum est
serrans vocatur
pulsus.

Pleuritis est in
flamatio costas
succingentis mē
branz.

Pleuriticorum
pulsus celer, du
rum, minorq̃
febrē expedit,
nec uero creber
esset.

Pleuritidis uari
a symptoma
ta pro differētijs
humorum à quo
huius generatur.

Pleuritis ex pe
ripneumonia
cor caput por
to afficiatur.

inficit

inflat fuliginis acrem, qui mordicat & erodit, irritatq; cerebrū. itaq; ad delirium perducit. Si pituitosus sit, nec fumo acri similis, sed caliginis crassæ turbulentię, quasi nubem quandam ad caput attollens, humectat id grauatiq; cerebrū, cogitq; in grauem fomum deferri, atque sopiri hominem. Recte ergo, cum pulsus in maiorem crebritatē mutantur, sūt peripneumoniam, aut syncopem nunciat. Peripneumoniam, quod occupet semper, offendatq; latens inflammatio nunciat partes, ut quæ a calido gignatur feruentis humore, atq; facile mobili: syncopem uero, ex affecta facultate, uel per neruorum lisionem, uel soporem, cūm ex pituitosis humoribus usorantibus cerebrū ipsum repletur. Quod si lissio progredi ad ramulos ualeat, consequetur offensio neruorum: sicuti sopor, si nequeat. At talibus quidem humoribus, rariores: contrarijs, puta biliosis, crebriores iusto modo pleuritidis pulsus eueniunt. Porro autem medius est inter rariorem & crebritatem modus in pleuritide, ubi qui morbum committit humor sanguineus sit. Sic etiam modus duritię ex tali humore, ac moderata inflammatio oritur. Auge tur uero, sūt ob inflammationem immodicā magnitudinē, sūt ob humores biliosos. Itemq; per contrarios imminuitur. Suppuratorum pulsus initio statim pulsū refert uigilantis inflammationis: nōnnumquam est inæqualis & inordinatus ob uinata instrumenta & facultatem imbecilliorē, sed omnisbus hecificus. Vbi uero iam pus adfuerit, cetera quidem fit pulsus similis, æqualior tamen. At quum erumpit, languidior, latior, tardior & rarior. Qui igitur multum puris inter thoracem & pulmonem collectum habent, ij suppurati appellantur. Qui sunt, ubi maxima iuxta costas inflammatio, peruenit ad suppuratorem. Interim affectus in comitatur peripneumoniam. In uniuersum autem, omnes quibus inflammatur uiscus aliquod cōuersum ad suppuratorem est, suppurati sūt purulenti dicuntur.

Pulsus durus a quibus aut perijolent. Suppuratorum pulsus.

Suppurati qui dicuntur. Suppuratio quid do accidet.

Marcus nomen unde translatus Marcorem ca lora pulsus.

Marcorem sibi bricari.

Marcorem pulsus est unde quæ æqualis, quum consistat in solidis partibus. Hecificus pulsus.

Senium ex morbo.

unā cum inflammatione, quæ nondum discussa sit, emacuerunt, languidos & celeriores, mirety crebros pulsus habent, ac decurtatos magnitudine in uno ictu. At uero hecificus pulsus omnibus marcetibus inest: etij eis cōmuni sumus. Post illum autem inæqualitas distentionis magnitudinem decurtata: quæ etiam adest pleurisy, deinde crebritas: etenim hæc quoq; omnibus qui ex inflammatione marcescunt, perpetuo adhæret. Præcis autem marcetibus in sliam inæqualitatē pulsus, ac illam quæ penes magnitudinem est, permittitur. Plethicus habet pulsus paruum & languidum, ob facultatis imbecillitatem: at non nimium celerem, ut pleriq; febricitantes, quod urente febrī nō decessit. Ceterum habent & hi, ut febrim, fit pulsus hecificus. Peripneumonicorū magnus est pulsus & languidus, mollisq;, similiter atq; lethargicorum pulsus, nisi quatenus præpollit inæqualitate, & in uno pulsū, & collectis, quam uocant: In uno ictu, nam ueluti interpellatur, undosusq;, ac interdum bis seculis reddidit. In collectis autem, cūm sliis differentias fortitur, tum modō intermittit, modō intercurrit. Neq; enim est mirum, uel magnū esse pulsū illorum, uel languidum, uel inæqualem, ob pulmonis inflammationem, uisceris tam laxi & molles, fistulisq; inuibus undique infinitis caui, tamq; uicini cordi. Nam quis laxum est & molle, & undiq; uacuum, à pituitosiore atq; crassiore inflammatur sanguine. Talis enim fluxio, tunica uasorum irrigat, frangit autem uim facultatis, quæ in illis est: quo fit ut magnos simul & languidos pulsus efficiat. Quis uero cordi est ipsum uiscus cōiunctum, multiformis inæqualitas gignit: nimirū pulmonis arterijs oppressis, contrictis, atq; languidis redditus. Raro itaq; in peripneumonia pulsus di crotus accidit: quod is nasos duritiem postuler. Iam pro offensa magnitudine, uel intermittit pulsus, uel intercurrente cemerit. Cūm autē febre tenetur acuta omnes peripneumonici, atq; habeant adiunctum nōnihil comatis, si insignior esse uideatur febris, pulsus erit admodum crebri: sin maius coma, minus creber exister.

Lethargicorum pulsus, pulsus peripneumonicorum est similis, magnitudine, remissione, molitudine: sed eo est tardior, rariorq;, ac minus inæqualis, intermittens potius quā intercurrente. Est cūm dicrotus sit. At undosus semper in alitis quidem sponibus est. Gignitur autē lethargus etiam ex pituitoso humore. Vnde merito est pulsus similis illis est peripneumonicorū pulsus: nerū hoc tardior, quod procul sit à corde remotum cerebrum. Est autē intermittens potius quā intercurrente, cūm longe frigidior sit, atq;, ut ita dicā, letalior morbus lethargus, quā peripneumonia. Etiam affectus frigidus, facultatis ualde refrigeratę, proprius pulsus intermittens existit. Phreniticorū pulsus est paruus, modicę contentus. Rarissime autem conspectus est magnus. Est præterea durus, neruosus, mirety celer & creber. Habet præterea nōnihil undosus atq; interim subteremere tibi uidebitur: interim enī præcisus cum cōuulsione quodam. Etenim febrū propriū celeritatis symptoma hic obritet

Marcetibus si mal com inflamatione, quales sunt pulsus.

Pléthicus pulsus.

Pléthicus habet in se feruorem pul sum hecificum. Peripneumonicorum pulsus.

Pulmonis subsistit a leuæ, mollior, cum sit, à pituitosiore inflamatione sanguine.

Peripneumonicus omnibus adfectu febrim acutam, nōnnullisq; comatis.

Lethargicorum pulsus.

Lethargus quid est pituitoso humore.

Lethargus est peripneumonicorum morbus peripneumonia. Peripneumonicorum pulsus.

euidentiſſimè, in atroque termino diſtentionis, præcipue extremo. Inuenias etiam inæqualitatem in poſitu genus, inſignitatem aliquando in illo apparere. Imò totam ſubinde arteriam, ſua ſede deſerta, cõſpicias attolli potius cum uibratione ebullicntè, quàm more pulſus diſtenti. Pari modo detractam potius, quàm cõtractam. At uerò immodica eius crebritas proximà denũciat ſyncopam. Nec ſanè cauſas illorũ quæ diximus inuenire magni laboris fuerit, ſi ſcias generari à bi-
10 liſo humore phrenitim, ut lethargum à pituiſo. Præterea lethargum * præcipue gigni in cerebro: phrenitim uero in tenui meninge, atq; ſepto tranſuerſo. Quæ ſi memineris, etiam paruos me-
ritò pulſus & duros eſſe, nõ habebis neceſſe diſcere. Atqui ſi affectus calidus eſt, pulſus autem parui, omnino etiam crebri ſunt. Porro phreniticorum pulſus rariſſimè undofus percipitur, quod mollitudine uacet. Quod uerò ſubtre-
20 mere imbecillæ facultatis ſit ſignum, alibi à nobis oſtenſum eſt. Vbi enim artenariũ facultas ob caloris copiam diſtendere illas amplius conatur, idq; tunice durities prohibeat, quodammodo uidetur pulſus ſubtre mere: id quod tunc poſſi-
ſſimè accidit, ubi ſyncopa imminet: quo modo ubi conuulſio, etiam motus pulſum eſt con-
uulſiuus. At hoc phreniticũ pulſus habent perpe-
tuum, ut cum conuulſione quadam motus eorũ abruptumatur, non autem paulatim deſinat: calor ſiquidem uiget, ſuntq; dura inſtrumenta.
30 Iam uerò inſignis illa crebritas, cum ab imbecillæ facultate exoritur, ſyncopem inſtare portendit. Eſt & alius quidam affectus ex phreniti-
cũ & lethargo conſtat: quo quidem qui tenetur, * ut plurimum oculis conuiuent, ſomnolentiſſimi ſunt & ſterunt. Rurſus oculis fixis, inconni-
uentibusq; diutiſſimè, ut catochi, intrant. Quod ſi illos ad colloquium compelles, difficileſ ſunt, ad reſpondendum tardè: plerumq; etiam ſtultè loquuntur, temereq; reſpondent. Horum igitur pulſus ſunt celeres crebriq;, perinde ut phreniticorum, minus tamen: & roboris item minus q̃ illi obtinent. Lari autem ſunt, ac breues. Externum motum non habent ſubito truncatum, ſed alio modo ueluti intrò ſe propicientes ſubter-
40 giunt, ac concitant contractionem, & quaſi ſuf-
ſurantur diſtentionem. Catochorum pulſus ce-
tera lethargicis ſimiles ſunt, magnitudine, tarditate, crebritate: ut nec totius huius affectus ſpec-
ies late ab illo diſidet. Catochorum tamen nõ imbecillè eſt pulſus, nec mollis, ſed in ſuis fanè multum diſfert: ut etiam in hoc, quod laxatur le-
thargicis atq; intumefcit totus habitus, contraſtiparè cogitur catochis. Præterea æqualis eſt catochorum pulſus, inæqualis lethargicorum.

Phreniticorum pulſus immodica crebritas, propterea denũciat ſyncopam. Phrenitim à bi-
liſo præduci ha-
mere. Lethargum ab humore pituiſo exoriri. Lethargũ gigni in cerebro. Phrenitim gigni in tenui meninge, & in ſepto tranſuerſo.

Lethargum ab humore pituiſo exoriri. Lethargũ gigni in cerebro. Phrenitim gigni in tenui meninge, & in ſepto tranſuerſo.

Phreniticorum pulſus quidam adſit perpetui.

Phreniticorum pulſus quidam adſit perpetui.

Catochorum pulſus.

Catochorum pulſus.

Catochorum lethargicis diſtinctus.

Conuulſiuus pulſus.

tionem exillire apparet. Paralyticorum paruus pulſus, languidus, tarduſq; eſt. Nõnullus rarus quoque, alijs creber, ſed nonnihil inordinatè intermutans. Eſt enim paruus & tardus, quia morbus eſt frigidus: languidus, quod facultas inſirmior. Comitialium & attonitorum pulſus ſunt ſimiles: quare quæ de comitialibus exponemus, eadem de attonitis, ſed cumulatius, ſunt accipienda. Dum affectus non uique adeo inualuit, nulla inſignis in pulſu mutatio cernitur. Tantum eſt conuulſus intentu iure utrinque arteria. Sin autem affectus ſuperet facultatem, inæqualitatem atq; tenſionem ualidam ſibi contrahit pulſus: necnon minor, languidior, rarus, tarduſq; efficitur. Si morbus opprimat facultatem, languidus, paruus, celerèſ pulſus con-
10 clit. Anginæ pulſus tenſione quadam præditus eſt, conuulſiuo perſimilis. Magnus eſt & undofus, ut pulſus peripneumoniorũ. Cæterum ſi peripneumonia ſpecies ſuperior ſit, in peripneumonia: ſi uerò conuulſus, in ſpasmus angina deſinet. Quicunque autem ex anginoſis ſuffocantur uelementer, paruũ hi habent & raram pulſum: ubi uerò iam animam agunt, crebrum atq; inæquale. Plus autè uel minus tenſionis habet anginæ pulſus, prout humor in ſauces influens aut bilioſus, aut pituiroſus fuerit: necnon pro ipſorum inſtrumentorũ in aſpre-
20 dine diuerſitate. Siquidem neruoſiora & contioniora uelementius pulſum tendunt: carnoſa & remiſſa, illud uindofiore efficiunt. Orthopnea acuta (talis enim eſt, quæ diuturna) inæ-
qualem habet pulſum, & inordinatum, deſicientemq; nonnihil. Quæ mediocriter eſt grauiſ, crebrum. Quæ uiolentiſſima, tardum & deſicientem. Quæ iam perimit hominẽ, crebrum, & languidum. Cæterum pro diuerſitate oſtenſi, ut creber magis, uel rarus ſit pulſus. Nam celer, ob facultatis imbecillitatem ſit nunquam. Vteri
40 ſuffocationis pulſus, ut ſi conuelleretur, protenſus eſt, atq; rarus. Quod ſi extitit ſit ſuffocatio, creber, inordinatus, & nonnihil deſiciens. Cum enim neruoſus ſit locus affectus, par eſt ut protendatur pulſus, frigidus conuulſus exiſtat. Quia uerò affectus eſt frigidus, adnecneſta raritas. At ubi oppreſſa iam prout facultas ſit, rectè ſit creber, inæqualis, & nonnihil deſiciens. Ouentericuli affectum, ſi duntaxat ſit inflammatorius, ita pulſum inmutat, ut ſolet corpora neruoſi inflammatio, ſi comprimitur, uellicetur, languſcat, ſingultus, uomat, nauſeat, fiſtidat, do-
50 leat, pro genere cuiuſque ſymptomatis. Nam uellicatio, uomitus, nauſea, ſingultus, languor, non ſolum paruũ & languidum reddunt, & interim modicè celeriorem, ſed etiam admodum crebrum. Sola uerò compreſſio, raram, tardam, paruam, & languidam, qualis etiam per caninam famem conſpicitur. Porro omnes affectus qui in crebritatem mutant, ſi ſine diuturni, uel grauiores euaserint, pulſum gignant uermiculantem. Qui uerò in rari-
60 tatem, non ſolum commemoratas differentias adaugent, ſed ſpeciem etiam inæqualitatis in uno pulſu generant, ut multis locis perſum corpus arteriæ uidetur: nimirum ob ipſius in-

Paralyticorum pulſus.

Paralyticorum pulſus, eſt pulſus apopleſticorum ſimilis.

Angina perſimilis.

Orthopnea pulſus.

Vteri ſuffocationis pulſus.

Pulſus diſtinctus pro uarijs eorum uentriculoſiſſimis.

Famem caninam.

ſitu.

*Hydrcpum fin-
gula fperiri quâ
pulfuâ differen-
tiam fortiaue*

Affues.

*Tympaniti re-
plet taurifum
corpus ftrictum.
Anafarca im-
buit immittit-
traurifum cor-
pus habetum.*

*Elephantiafis
pulfus.
Ichterorum pul-
fus.
Pleura hila ubi
nec vim defic-
candi.*

*Ventrum potius
qualiter ftrictus
pulfus mutare.*

firamenti intemperiem. Aquæ inter cutē pul-
fus. Afcite parvus, crebrior, subdurus, & cū qua-
dam tenfione est. Tympanitæ longior, non im-
becillus, celerior, creber, subdurus, cum quadam
tenfione. Illius quam anafarca uocant, undofus,
lanior, mollisq. Afcite fiqui dem, copiam acer-
uans nō modicam fecundum ventrem humoris
aquoſi, ſimul magnas arterias intendit, grauât,
refrigerat. At tenſionis quidem nomine meri-
tō reddit pulſum cum tenſione quadam ſubdu-
rum. Quia uerō facultas laxâ & refrigerata eſt,
minorem. Iam quō minorē iuſto, hōc etiam cre-
briorem, præſertim ubi adiuncta ſit febris. Tym-
panites minus grauat, uerū nō minus tendit:
quare pulſus etiam ſubduros gignit, cum nōn ſul-
la tenſione, ſed aliquanto celeriores, minusq. im-
becillos, quā affcite: ac crebros, iſdem de cau-
ſis æ ille. Longiores, ob leuiatū regentium ar-
teriarum corporū, quæ quidem in tympanite adeſt:
etenim ſpiritu uniuerſum corpus replet. Ana-
ſarca autē, quia imbut uniuerſum corporis habi-
tum humiditate copioſa, tunica reddit arteria-
rum molles, ac proinde pulſus molliores, undofos,
lanioreſq. efficit. Elephantiaſis pulſus par-
uus, languidus, tardus, creberq. eſt. Ichterorū
pulſus eſt, ſi abiſt febris, minor, durior, crebrior,
non languidus, nec celer. Vim enim poſſidet de-
ſiccandi ſtatu bilis, ut muria, & mare. Quamob-
rem tunica arteriarū in durandō & deſiccandō,
pulſum quoq. reddit duriorē atq. minorē, ac
proinde etiam crebriorem. Ceterū nec languidus
eſt, nec celer, quia nec imbecillitas, nec fe-
bris adeſt. Qui ſemper tuit ueratrū, li pau-
lō ante uomitur, ubi comprimitur, pulſum
habent latum, rarum, languidiorē, atq. tardio-
rem: interea dum uomunt & diuelluntur, inæ-
qualem & inordinatū. Cū rectius habere cor-
perint, ordinatum quidem, ſed inæqualem ad-
huc, minus tamen quā antea. Vbi uerō iam ad
naturalem reuertuntur ſtatum, æqualem ac ma-
iorem quā dudum, uchemētioremq. Qui ho-
rum ſyncopa corripuntur, conuelluntur, atque
ſingultunt, paruum hi, & languidum, inordina-
tumq. & celeriorē, atq. multum crebrum ſor-
tiuntur. Qui ex his ſuffocantur, paruum, langui-
dum, inordinatum, inæqualem, non autem cre-
brum, nec celerem, ſed potius tardum. Repre-
ſentat etiam nonnihil undofū & lani, atq. inter-
dum paratæ arteriæ tenſionem.

GALENI PERGAMENTI de præcognitione ex pulſibus liber primus.

*Præſentia ha-
bent non ſecuro-
rum modo, ſed
præſentia etia,
atq. præſentia*



*Cauſarū egiſt-
tiam pulſu ſtricta
gignat.*

Vidē non tantū futurorum præ-
ſentia ſit, ſed præſentia etiam atq.
preteritoria, ſatis id Hippocrates
demonſtrauit. Cuius quidem qui
peritus futurus ſit, cum in iſis quæ
de dignoſcendis pulſibus, deſi differentiis, &
cauſis pulſuum à nobis tradita ſunt, prius exerci-
tari oportet. At uerō cauſarū pulſuum diximus
eſſe unum genus, eorū generationi cōiunctum,
quod ſcilicet naturale exiſtit: alterum autē con-
trarium, nempe cauſarū præter naturam: ac ter-

tium deniq. cauſarum nō naturalium. Quæ tria
genera referuntur ad illorum eſſentiam ueram:
aliud autem quartū, ad apparentem. Quod qui-
dem, quia proprium eſt in primis præſagiendi
cōmentationi, diligentiſſimè eſt explicandum.
Porro nullus pulſus mutari poteſt, niſi effectū
eius facultas, uel tunica arteriæ, uel uſus, quam-
obrem ſit, in aliqua ſint mutatione & alteratio-
ne. Vbi igitur pulſus, exempli gratia, maior æ-
quo uideatur, expendendum eſt, facultas ne ſit
robuſtior: an hæc eadem manſerit, mollis autem
euaſerit tunica arteriæ: an quod inuenerit uſus,
taſis mutatio acciderit. At ſi facultas robuſta ſit,
pulſus erit uchemētiōr. poſſumus autē cum ma-
iōre duntaxat uideri. Quōd ſi tunica tantū arte-
riæ emollita fuerit, pulſus neceſſariō erit mollior.
Si igitur neutrum appareat, clarum eſt mutatū al-
iquatenus eſſe uſum pulſuū generandum, quē eſ-
ſe docuimus duplicē: primū atq. maximum, tu-
telam natiaſis calorſis: alterum, animalis ſpiritus
generationem. Sic uoco illum quō unius anima
ad uoluntarias functions. Ceterū ſi parua fiat
a natura * alteratio ob uſum, ſola perſpicua erit
magnitudo, nōdum autē celeritas. Si maior, in-
creſcet magis magnitudo, & clarē celeritas ap-
parebit. Sin adhuc amplificabitur, magnitudo
celeritatis augebitur, atque accedet præterea cre-
britas. Sin autem nō ſit factus maior pulſus,
ſed taſis eſſe uideatur, gracilius ſolito aliqua de
cauſa euaſit hominis corpus. His cognititis, in-
eundem examen eſt, primū in corporibus ſim-
pliciter ſanis: mox in iſis, ubi adiunctas eſt ali-
quæ aſcitiuus morbus: poſtea in corporibus * ſim-
pliciter ægrotantibus: ac poſtremo in iſis, qui-
bus alteratio quæpiam a deſt externa. Etenim in
corporibus inculpatæ ualitudine præditi, doce-
bit magnus pulſus & temperamentū hominis,
& corporis habitudinē. In corporibus ubi adi-
unctus eſt aſcitiuus ſtatus, illum præpollere mo-
tum, cui magnus pulſus eſt peculiaris. At in iſis
qui ægrotant ſimpliciter, indicabit magnus pul-
ſus calidam * morbi cōſtitutionem. Si unā cum
morbo recens aliqua * externalis alteratio ad-
ſit, illum uincere motum, cui magnus pulſus ſit
familiaris. Reuocandus autē ad memoriam pul-
ſus eſt moderatus (qualis reperitur in corpori-
bus optimē temperatis, atq. ab omni qualitate
aduſtentia alienis) & quē nunc inuenimus, ma-
gnus, ut in comparatione illius conſiderandus
eſt, ex qua cauſa in magnitudinē ipſam exce-
uerit. Aut enim ex gracilitate corporis, aut ex ca-
lore temperamenti, aut ex aſcitiuo motu. Cæte-
rum morbus aſcitiui motus deſinit: permanent ue-
rō amplius ob gracilitatem & temperamentum.
At uerō omnium alterationū quæ corpori acci-
dunt, certiffimū aſſequimur in illis corporibus
cognitionem, quorū naturam noſcimus. Hanc
autem non agnoſcimus ſemper, quare nec in ex-
actam ubiq. cognitionem uenimus: uerū ad
cognitionē abſolutā tantū abierimus, quaſi
ab ipſius nature cognitione. Igitur mutationes
pulſum ex cauſa externa, in hunc modum ſunt
differendæ: Quæ ex balneis, curſibus, frictio-
nibus, ceteriſq. motibus ſit, non eſt diuturna,
ſed mox ad priſtinum ſtatum reuertitur. At ma-

*Pulſum iſum
iſi mutatum,
qua ratione de-
prehendamus.
Pulſum generen-
dum iſi eſt
duplex: tutela
iſis calorſis,
& animalis ſpi-
ritus cōſtitutio.*

*Pulſus moder-
tus in quibus nō
reperitur.*

*Aſcitiui motus
non deſinit.*

*Pulſum muta-
tū a cauſa ex-
terna, quomodo
differenda
ſit.*

gnitudo pulsum ex uino & cibo profecta, dururna existit. Hæc ex uelementia exploratur, quæ illi coniuncta est. Nunc tantum in propolitus est, qui duntaxat fit maior. Iam etiam magnitudo quam ira concitat, adiunctam habet uehementiam: quæ alioqui prudentem non latet, si oculus iran respiciat, uniuersumque corpus. Etenim calor quidam copiosior secundum pectus iratorum, non fecus quam exercitatorum, percipitur. Atque hi sanè sunt artificiales modi causarum dignoscendarum. Externos autem, ubi minime in tentatores, ac pessimos sycophantas, fraudulentosue incidere, partim per investigationem, partim ex eo quod non discesseris ab ægroto, quamoptimos fore iudico. Nam qui huiusmodi medicus non semper ægrotis adest, nec illi uolunt ueritatem exponere, hi sunt difficillimi, & medicum requirunt accuratè prudentem. Cui sanè ad ueritatem peruehendam esse primus scopus debet ipsius accessionis tempus: dein ægrotantis consuetudo & mores. Sunt siquidem qui medico imponant, nihil magis habeant in uotis, quam ut coarguant illum, eumque nihil firmiuscè demonstrent. Quare tunc habenda omnia suspensa sunt, distinguendaque, tum quæ propria artis ratione pertineant ad dignoscendum, tum quæ adueniunt extrinsecus. Alii contra sunt candidi, modestique, nec celat quicquid, dissimulantque: neque in his nil clam factum, est suspicandum. Porro cum magnus pulsus nunc ad moderatū, nunc ad alium quemlibet referatur: cumque duplex sit hic quilibet, aut minor moderato, aut maior: deinceps de incremento ad magnitudinem est dicendum utriusque pulsus: dico enim minoris eo qui mediocritas est, & maioris. Commune igitur est omnis ad magnitudinem incrementi, solum auctum calorē esse, quo scilicet tempore nec facultas affecta sit, nec instrumenta, siquē immotus ægrotans. Proprium autem est de fluxu illius à natura, unius magnitudinis incrementum. Reliquorum duorum etiam, nempe celeritatis & crebritatis non unquam. Commutationis etiam pulsui in paruitatē, tres numero sunt differentie. Aut enim ex moderato, aut ex maiore quā hic sit, aut ex minore, mutationes in paruitatem contingit fieri. Vocatur autē qui moderato est maior, absolutè magnus: qui minor, paruus. Sic igitur pulsus cuiuspiam homini minor quā dudum, mutatione præditus præterea nulla ullius generis. Etenim minor solito pulsus sit, aut cum imbecillior facta sit facultas, aut instrumenta duriora, aut usus remissus. Nunc autē nec imbecillior facta facultas est, alioqui consumpta sit cum paruitate remissio: nec corpus arteriæ durius (neque enim tum minor tantum, sed & durior pulsus esset) superest ergo solum esse alteratum usum: ac si id temporis quietus homo fuerit, quantitati refrigerationis quantitātē respondere mutatione. Quæ quidem mutatio accidit ex maiori pulsione, quæque fit naturalis. Nam de naturali statu ob frigiditatem mutatio ad paruitatē, simul etiā rariorem eum atque tardiorē reddit. At immutatio ex magno supra modum aucto, statim adiungit sibi celeritatis & crebritatis aliquid: quod

qui multū ultra modū sit auctus, tribus in generibus uariet. Quā obrem qui magnitudinē tantā imminuit pulsus, & reliqua seruat immota, hic est qui paulo maior sit iusto, solusque ex paruo in cremato calorē cōstat. Iam uerō, quemadmodum ubi corpus calit præter modū, magnitudo planè prima, mox celeritas, inde de crebritas apparet in pulsū: sic etiam ubi refrigeratur, raritas primò percipit, dein tarditas, ac ultimò loco paruitas. Porro causæ refrigerantes totidem numero sunt, quot numerantur calfacientes. Aer siquidē frigidus nos circumstant, inspiratusque, & aqua frigida, uel balneum, uel medicamentū corpori inunctū, refrigerat. Quinetiā longa quies, & uel lunilatebræ, & pituitosus cibus, medicaminaque refrigerantia, ac breuitas, merus diuturnus, corpus frigidius efficiunt. Ex contentis in corpore humonibus, qui frigidi tēperamento cum antea quiescerent, nūc cōmoti, aut tenuiores quodammodo calidis sunt effecti, etiā corpus refrigerat.

Arteriæ altitudo semper æqualem latitudinē distentionē habet: sed fit ut occultetur aut arceatur sæpe à corporibus circumiectis & oppositis, uel uniuersus motus, uel certē eius quædam pars: idque aut in profunditate magis, aut in latitudine, aut simul in utraque dimentione. Vbi igitur per totum corpus sensu nostro pulsare nulla arteria percipitur, is affectus dicit pulsus priuatus: reuera tamen in corpus uisū nunquā cadere potest. Neque enim est unquam, quin cor unū cum arteriis, in omnibus agitur. At uerò longi dēcūtur pulsus, quibus sensibilis motus longitudo naturalē excedit: breues, quibus infra naturalem statū est: quibus par est naturali statui, moderati. Tantū enim animaduertitur semper de motu arteriarum, quantum permittunt adiacentia corpora. Unde fit, ut corpulenti breues pulsus fortiantur: graciles uerò, longos: & quadrati, moderatius, esse moderati uideantur. Nam etiam apparentis motus his, non æquē semper ut profunditas, latitudo impeditur. Verū ubi arteriarū regiones in obliquo, uel ad adipis, uel carnis, uel ut poram, uel humorū sint plenæ, ac incumbens supernè cutis nihil eas oneret, latitudinis tantū obcurat motus: & magis si uehementis pulsus & magnus, quantum in ipso est, fuerit. Cū uerò regiones uicing sunt mundæ, rugosa autē quæ eas tegit cutis, magis profunditatis motus latet in eo corpore, ac potius si nō uehementis pulsus & magnus, quod in eo est, sit. Si igitur pulsus inuenias longiorē iusto, si quidem unā latitudinē eius profunditasque increuent, uide gracilior homo solito, an calidior euaserit, remoto motu aduentitio. Nam si factus gracilior sit, idque tantū, quantum est pulsus maior, unum hoc tantū eum immutauit. Sin autem nō tantū, non hoc modū est causā, perueniet etiam calor. Quod si in eadem consistent habitudine corpus, solus mutatus est calor. Sin crassior euaserit, duplo auctum calorem artima. Sin longior sit factus pulsus, & lanior, non autē perinde auctus profunditatis, sed moderatus, nam præter superiores notas, necesse est rugosiorē euasisse supernè arteriæ incumbente cutem. At si conuertas membrū, ut que eius pars modō superior erat, nunc sit inferior, nulla tum profunditas uidebitur impedita. Arque hū quidem duo pulsus

10
20
30
40
50

Refrigerantes
causæ tot numero
sunt, quæ cal
facientes.

Timor distor
tione corpus refri
gerat.

Pulsus priuatus
in corpore uisū
non nunquam
cadere potest.

Pulsus longi quā
nam dicuntur.

Pulsus breues
quæ.

Pulsus moderati.

Latitudinis mo
tus quando in
pulsu obliuiscitur.

Causæ dignoscendarum
quæ sunt artificiales
modi.

Causæ dignoscendarum
quæ sunt naturales
modi.

Fraudulenti qui
modis sycophan
tarum moris.

Pulsus mutatio
in paruitatē, tri
bus differt.

Gracilitatem
corporis quo pul-
sus significat.

pulsus, in primo libro de eorum differentijs, om-
nium primi inter uigintiseptem pulsus constan-
tes ex dimensionibus ternis, sunt in tabellam re-
lati. Reliquorum autē uiginti quinque haud diffi-
cile fuerit causas simili etiam methodo inuestigare.
Igitur ubi supra proportionē profunditatis
& latitudinis longitudine fuerit extensa, corporis
significat gracilitatē: nō tamen ubi * imminuta
intra proportionem profunditatis est, corpulen-
tiam denotat, sed uel naturalem quandam con-
formationē, uel situm arterie inaequalem. At uē-
rō quæ quidem in omnī primo, ac magno dis-
tincta sunt pulsus, eadem etiā in ulīmo, nempe
breui, angusto, humilī, qui nimirū uocal paru-
us) sunt distinguendi. Nam si naturaliter con-
parata sit corporis habitudo, hic pulsus nō solū
uidetur paruus, sed etiā talis existit. At cum cra-
sius fit, si * quantō homo seipso crassior euasit,
tantō sit pulsus maior, erit tum quidē quod ad
ipsum attinet, moderatus: sed ob corporis crassi-
tudinem minor moderato uidetur. Si longē sit
crassior quā pulsus minor, is pulsus quantum
in ipso est, mediocri erit maior. Sin autē minus
sit crassus quā paruus pulsus, hic, si eius natu-
ram spectes, naturalis erit minor. Quōd si gra-
cilis corpus sit, quāuis uideatur pulsus paruus, in
sanē est paruus natura, sed nō perinde uidet par-
uus, ac uerē est: quōd gracilitas, quatenus a na-
tura recessit, hactenus est speciem magnitudinis
auget. Similiter etiam in alijs pulsibus omnib.
adhibenda eadem est distinctio, quæ de paruo
& magno pulsū est adhibita: sciendumq; illorū
quorū uel paruum esse natura, uel magnū, uel
moderatū. Ac tres lii pulsus in quantitate disten-
sionis positū sunt, quod ad ipsius rei naturā atti-
net. Videtur uerō esse uigintiseptem, ob crassi-
tudinem uel gracilitatē corporis, uel ob rugosio-
rem cutem, uel regionū arteriarū inaequalem an-
gustiam, uel proprietatē cōformationis. Iam uē-
rō longus, angustus, & humilis pulsus, quod qui-
dem ad suam naturam pertinet, idē erit & par-
uus: nimirū longitudine ipsa accedente ob te-
nuem habitudinem corporis. Quōd autē & lan-
guisus sit, hunc euadit peripneum, quōd nuq̃
facultate ualente, pulsus esse paruus ad summū
posuit. Ad duritiem uihil est necesse coniunctam
esse huic pulsui. Oportet tamen cor unū cum ar-
terijs esse refrigeratū, atq; etiam minus perfrigera-
ri. Quōd uerō refrigeratū esse, lesam esse faculta-
tem sit: refrigerari autē, mutari usum, unq; intel-
ligere oportet. Facultatis essentia singularum
partium, in singularū illarū posita cōmodo tem-
peramento est. Nam tum demū suum quæq; mu-
nus obit strenuē, ubi sit temperatissima. Contrā
male fungitur, si immoderata sit: atq; hactenus
male, quatenus fit immoderata. Ad eundem mo-
dum cordis corpus cum immodicē fuerit refri-
geratum, calfactum, humectatū, aut exiccatum,
pulsus pro suæ interperiei modo facit languis-
cos: id quōd illi est facultatē oblesam esse. At ue-
rō consuetudinē habere cum sanguine in ipsius
contento sinibus, & cum spiritu, qui calidior lon-
gē ac naturalis status requirit, sit, aut cum eo qui
in inuolucro cor ambiente cōstitit, uel in pulmo-
ne, aut cum ipso etiam inuolucro cor ambiente,

& pulmone usum est tantū uariasse, citra faculta-
tis offensionem. Ac sic eandem rationē habet, refri-
geratum esse, & refrigerari. Nam si in ipsa cordis
temperie frigidum elementū præpollat, faculta-
tis læditur. Sin uerō in tanica cor ambiente, &
in pulmone, sanguineq; & spirito, quos eius uen-
tricalis continent, usus est remissio. Iam humidi-
tates & siccitates, si in ipso corpore cordis consi-
stant, nocent facultati: si in quoquam uicino, nō
immurant usum. Siquidem proba temperatura,
interperiesq;, ex quatuor sunt elementis: usus
uerō incrementa uel remissiones, duntaxat ex ca-
lido & frigido. Porro ubi iam ad ultimam usus
dissolutionē deueniat, corporibus uicinis cordi
uehementer refrigeratis, nō poterit etiam cor-
dis corpus nō interperari existere: id quod ni-
hil est aliud, quā facultatem debilitari. At uerō
ubi cum duritie coniunctus est pulsus ille oblon-
gus, angustus, & humilis: necessariū etiā et adest
uel languisus, uel medius inter languidū ac ue-
hementē: declaraturus esse in affectus in corpo-
re, qui reddit arteriam duram. Hæc est siccitas,
uel contractio à frigore, uel tensio. Siccitas quidē
in ardentissimis febribus, ubi pessimē inue-
terarint: ac præcipue * in marcore torrido, cer-
tissimè melancholicis & quartanæ febris generibus.
Contractio sit à rebus refrigerantibus. Tensio
ab affectibus conuulsentibus, & ingentibus in-
flammationibus. Scis sciriis uerō contractio ar-
teriarū & tensio nascitur, cum aliis, tum uel ma-
ximè ubi lien & hepar scirrho indurantur. Sed ra-
tū eiusmodi affectus deprehendunt, & per u-
rinas, & alui excrementa, peripneum lingue, tum
uniuersū colorē corporis, atque adeo etiam per
febrim genus. Qui autē alij corporis affectus
pulsū creant durū, partim originem ex recentibus
offensionibus repentinam trahūt, reliqui
omnes pedetentim. Offensiones quæ inducunt
eiusmodi affectus, sunt uini potio & frigida tem-
pestiua. Sæpe etiam fructus refrigerantes,
balneumq; frigidum. Deprehendens noxam à ui-
no illatam, cum subito pulsus non durus modō,
sed maior etiam sit, celerior & uehementior. Ce-
teras à uino in cōmuni discernes, quōd nec ma-
gnitudinem adiunctam, nec uehementiam, nec
celeritatem habeant: singulas autem febrium,
ubi symptoma aliquod apparuerit, eorum quæ
fructibus id genus ingestis solent superuenire:
ut delirium, exempli gratia, quod à uinosis fru-
ctibus proficiscitur. Iam uerō si nervorum ori-
ginem aliquis distortum affectum occupet,
conuulsas dispositiones inducit. Sic enim il-
las appello, quas ante mortem, conuulsionis ali-
quod necessariū comitatur symptoma. Ac mori-
untur sanē omnes in hunc modū affecti, etiam
nummi calidi: contrā ac illi, qui corripuntur syn-
copa: hi siquidem uehementer etiam frigidi, ui-
uunt adhuc. Est autem operæ precium nosse, om-
nes duos simul & paruos pulsus, quæcūq; dis-
simul fieri vibratos: & si qui vibrati non sunt,
eos aut ob uitalis facultatis imbecillitatem, aut
remissionem usus, aut utriusq; concursum,
uon admittere vibrationem. Nam si quidem us-
us magnam posset diffentionem, uisq; op-
erari ualcat uitalis, sed uon refragat corpus

Temperiem in
interperies, ex
du, ex quatuor
elementis con-
flari.

Siccitas in qui-
bus morbus arte
riis madat.

Contractio.

Nova illata à ui-
no, quomodo de-
prehendenda.

Conuulsas dispo-
sitiones quæ sunt

Duos simul &
paruos pulsus, om-
nes fieri vibra-
tos.

Facultate ual-
te nūquam pul-
sus esse paruus
ad summū po-
ssit.

Effensionem facit
eius cōmuni per
ipsum parua re-
perantem cōsi-
stere.

60

Vibratio pulsus
quid sit accidat.

Vibratio pulsus
si ad se, nihil
robore facultate
tem possidere de
clarat.

Moderatus pul-
sus quod modis
dicatur.

Celerior pulsus,
calidior: tardior,
frigidior tem-
peramentum de-
clarat.

Celeris pulsus
de magnitudine,
modis ad iugum
tem crebris.

Mutationes pri-
mae et simplici-
sima pulsus in
celeritate et tar-
ditate.

arterie, quod attolli in magnam distentionem
præduritie non possit, vibratio in eum statum
incidit. Nulla præterea ratione fiat arterie vibra-
tus motus. Quocirca hic pulsus qui uidetur vi-
bratione carere, aut extremam imbecillitatem
virtutis, aut remissionem usus declarat maxi-
mam. At vibratus si sit, nonnulli roboris facul-
tatem possidere portendit, nec pulsuum usum
propterea dissolutum existeret. Ad eundem modum
si pulsus circa vibrationem * longior sit natura-
li, angustiorque & humilior, non longissimè ta-
men à natura in singulis his recesserit, sed ali-
quantulum: si quidem etiam sit durus, frigiditas,
uel facultatis imbecillitatem indicat, uel
utrumque simul. Atque hæc ex consequentibus discer-
untur. Sin uero simul & durus sit, & vibratus, il-
los significabit affectus, à quibus durus pulsus
prodest: facultatē tamen non imbecillam, ut in il-
lis, nec dissolutū usum. Quanta uero utriusque sit
nox, in facultate indicabit uehementia & remis-
sionis differentia, una cum qualitate ipsius vibra-
tionis: in usu, differentia celeritatis & crebritatis,
cum vibrationis item qualitate. Reliqua ex an-
te dictis conijcto. Haud aliter si non paulum, nec
multū tribus differentijs pulsus ille à naturali rece-
dat, sed mediocriter & moderate, ex dictis nota-
tum discrimina. Celer etiam pulsus dicitur, inter-
rim comparatus cum moderato, interrim cum
quolibet alio. Præterea ille ipse moderatus, nunc
ab solute dicitur, quem in optima natura con-
spicimus: nunc de unoquoque homine, qui incul-
pata sanitate fruatur. Atque hic ex comparatione
absolutē temperati æstimat, docetque quale nam
sit ipsum temperamentum. Ac celerior quidem
calidior, tardior frigidior temperamentum de-
clarat. Verum solum non est reperire mutatio-
nem in celeritate & tarditate, nec in sanis, nec
in affectu corporis. Nam qui calidior est tem-
peramento, quam simpliciter moderatus, si ui-
deatur habere celeriorē pulsus, cum habet ne-
cessario maiorem. Et cui pulsus est aliqua ex oc-
casionē celerior solito, omnino etiam est maior:
neuter tamen horum necessarius est crebrior: si-
quidem crebritas illis, ubi calor accumulatur co-
piosior, accedit. Itaque cum celeritate, modō ma-
gnitudo, modō etiam crebritas est coniuncta.
Similiter mutationes in tarditate pulsuum, par-
tim ex moderato statim in raritatem simul mu-
tantur: subinde etiam in paruitatē, ubi amplius
usus sit imminutus: partim ex statibus nō natu-
ralibus, nunc aucto usu, sæpe una cum mutatio-
ne in paruitatem, interrim cum raritate, nonnun-
quam cum mutatione in utrumque. Ceterum mu-
tationes pulsuum ob imminutus usum, in tardita-
tem fiunt, cum raritate & paruitate. Habes pri-
mas & simplicissimas pulsuum mutationes in ce-
leritate & tarditate: * quarum causæ antecede-
ntes & primitiue, eadem inueniuntur ratione,
atque illæ quas de magnitudine & paruitate expo-
sumus. Mixtæ uero mutationes atque composi-
tæ, cum uehementia, uel remissione, uel duritie,
uel mollitudine coeunt. Quæ etiam examinandæ
discernendæque sunt eadem uia & ratione,
quam cum de longo, angusto & humili disputa-
remus, declarauimus, Vt, exempli gratia, si simul

& celerior esse & mollior ideoque pulsus, animadu-
uertendum est, tantō ne celerior sit, quanto mol-
lior, an magis. Nam si quanto est mollior, tantō
etiā celerior sit, à sola mollitudine ipsa mutatio-
ne facta. Sin celerior quod mollior, nō à mollitudi-
ne tantū, sed etiam ab usu aucto. Contra si mol-
lior quam celerior, quanto mollior est, tantum
detrahit solius usus remissio. Similiter in alijs cō-
iugationibus danda opera est, ut præpollentem
causam inuehigemus: magnitudinē quarum ex
proportionis excessu deprehendes. Cum igitur
in distentione arterie quatuor generales sunt
differentiæ: prima, eademque inter omnes maxi-
mè pulsuum propria, quæ in qualitate consistit
motus: secunda, quæ in quantitate distentionis:
tertia, quæ facultatē: quarta denique &ultima, quæ
tunicam arterie indicat: hoc certè postremū ge-
nus, non est proprium pulsuum, sed aduenitū.
Ceterum tum ipsam, tum penultimum genus,
causam semper à qua gignuntur, manifestè de-
clarant: duo autem reliqua genera superiora, nō
perpetuū. Etenim duobus obuenit generibus
posterioribus, ut ab una utrumque causā constituatur:
primis uero duobus, ut ab omnibus causis,
quas tres demonstrauimus esse: quare in primis
illis ad inueniendam causam, quæ in ultimis, pluri-
bus opus est distinctionibus. Porro secundū ge-
nus, quod circa distentionis quantitatem ueritat-
ur, hoc præter cetera habet, quod septem & uiginti
pulsuum differentiās cōplecti uidetur, quæ
tamen sunt tres duntaxat. Porro uehementis
pulsus à facultatis semper robore fit: proinde *
quanto uehementior fuerit, tantō facultatis ma-
ius esse robur significabit: languidus, ex facultatis
imbecillitate: quare * quanto languidior sit,
tantō facultatem ostendit imbecilliorē. Haud al-
liter durus pulsus efficitur ab arterie tunica du-
ra: mollis à molli. Præterea quantitas pulsus du-
rini mollitudinisque, quantitate duritiæ molli-
tudinisque arterie declarat. Ceterum qui medius
est inter durum & mollem (qualis dicitur mode-
ratus) primus natura est inter eos, solusque dicitur
naturalis. At inter languidum & uehementem
hac ratione medius est nullus: quod languidus
sit oriundus ex facultate imbecilla, & defici-
scente à natura: uehementis autē à firma & rectis-
simè habente. Verum alio modo, inter languidum
& uehementem medius aliquis esse possit. Modus
autē dignoscendi per tactum adhiberi est. Nam
cū à pulsū eueritur, eum uehementem uoca-
mus: ubi tactus euerit pulsū, languidum: ubi
neutrum sit, medium cum pulsū dicimus inter
uehementē & languidum: qui quidem nō aliter
atque languidus, præter naturam est. Porro altera-
tiones pulsuum, * quæ quidem in remissionem
& uehementiam fiunt, illæ certè & solæ fre-
quentius fiunt, hoc est, citra ullam aliarum diffe-
rentiarum miscellam, atque etiam ab una causa:
ut si ceteris causis naturalem modum seruanti-
bus, facultatis robur sit paululum auctum, aut
imminutum: interdum tamen ab una quidem
causā gignuntur, at non solæ: quemadmodum
ubi facultas aut imbecillima, aut robustissima
essetia fuerit. At mutatio pulsui in duritiem &
mollitudinē, si quidem ab una causā procedat,

Distentionis ar-
terie quatuor ge-
nerales sunt diffe-
rentiæ.

Quantitas di-
latactum ar-
terie, septem & uiginti
pulsuum diffe-
rentias comple-
ctitur.

Uehementi pul-
su à facultate
semper robore fit.

Pulsus durus et
mollis uide pro-
ferantur.

Medius pulsus
qui naturæ alio fa-
dari nullus inter
languidum & ue-
hementem possit.

Medius pulsus
inter languidum
et uehementem
quemadmodum
dignoscatur.

omino aliquid unâ generum aliorum in urabi-
tur. Quid si sola comitet, ex concursu plurium
causarû generitur. Simul autem & sola & ab una
causa nequaquam fiat, nisi minimo planè spacio
â natura recessit. Causæ antecedentes quæ
robur facultatis adaugent, partim in ipso misunt
corpore: ac humores quidam sunt femicosi &
crudi, qui iam consequuntur: & naturæ ad iudici-
ationem impetus: ac præterea iracundia. Par-
tim adueniunt extrinsecus, ut unum, cubus, mo-
dicæ exsiccationes, & omnia quæ intemperies
eorrigunt. Deprimunt uerò facultatem inedia,
vigiliæ, sollicitudines, metores, uacuationes im-
modicæ, uelentes dolores, uel cum quadam
proprietas accidentis, ut quom fiamchâ af-
fectum appellant, qui animi deliquium inducit.
His adiuuge omnia quæ cordis uel artenarum
creant intemperiem. Mollem reddeunt arte-
riam humidi cibi, frequentiores balneæ, fomni
multo, mollior uita, & delicta: quæ omnia intra
septa nature manent. Præter naturam autem
sunt, similis idem moliantur, lethargus, coma,
hydrops, & si quis finit alia quæ largo humore ac
maximè pituitoso artenarum tunica imbuntur.

*Causa autem
dentis, quæ sa-
nitatis robur
adjuvunt, sunt
duplex.*

Facultatibusque
decretauit.

Arteries mol-
liss redendae.

Passar ante alia empresa, indicat comença la causa mai tard en al que especificat a continuació.

GALENI PERGAMENI
de præcognitione ex pulsibus
liber secundus.

Cicero libro ar-
bitrat conficiat quod
sunt genera pul-
sorum.

**Differenzierung von
Strahlungs- und
Schallquellen**

Contrastionis
in artibus color
et magni vim
extremis fide-
litate indicat.

*Fulgurasi entre
morta quando
plu, & quando
morta atrofia.*

Contractio etiam habet quatuor genera pulsum, quod scilicet dilatum. Si quidem uel iocior & tardior, maior & minor, uel ementior & languidior (& naturam ipsam specietes rei) fit contractionis motus: ac preterea etiam arterie corpus, aut durum, aut molle redditur. Haud dignoscas tamen horum generum, præter tarditatem & celeritatem, ullum. Porro tum diffinitio tum contractio arteriarum, naturalis caloris tuetur mediocritatem: diffinitio, ueluti inspiratio quedam, excessum caloris refrigerando, & uenilatione quod extinguitur incendendo: contractio in modum expirationis fuliginem expurgando. Ergo celestas contractionis indico rei fuliginisiorum excrementorum ingentem colligi multitudinem, expurgandis id temporis, quando cuncti inueniuntur. Tarditas contractæ, nec uis multum concutari excrementi, eoique euaacuatione desiderari. Atque acutius tamen magna copia fuliginis, ubi humores putrescunt: quo tempore necessum est febres accendi: pauci autem, dum corpus bonos humores continet. In alijs stantibus qui medijs inter hos sunt, pro portione fuligulorum statuum. Inter eundem & doemendi, plus: pro uigilijs & inedia, minus. Eadem planè ratione pro oborbi natura, ex illis qui prauos humores gignant, plus: minus ex his qui probos. In febribus ad eundem modum in actionibus plus: alijs temporibus mi-

Sanguis in infir-
mitatibus cum
patrescent, quod
fides pugnet se
leat.

Flammæ in a-
pexu pulmonum
arteriæ delinçit
tes, unde illuc cõ
fluât, & quæ de
causa patitur.

Taber v. de Coo
crabapple.

Quis arteria
duplex.
Quotibus ar-
teriis quod
sit communis.

Quinti arteria
cum utroque quod
si probatum.

Idem si pulsus fit rarior, in utra hi coierint ambo quiete, contractus prior motus, & alter nimis tardatus, erit status nunc quoque duplex, atque ex utroque compositus. Ceterū externa quies clare sentitur, interna autē ne obscurē quidem. Eam tamen cōiectura quis assequi possit, ex utriusque monitionis impetu. Iam uero contractus ipsa, interim tō tam diuturna est, quā dissentione interim aequē diuturna est, cū diuturnior sit, non tamen quintuplo (ut ait Herophilus) sed paulo

Herophilus.

Collectiva inaequalitas.
Inaequalis pulsus
fuerit quatuor
tur.

Intermissio arteriae
periculis
est alius inaequalitatis
omnibus.

Intermittentes
pulsus vnde
conferuntur.

Interperies cordis
est minor inflammatio.

Cordis interperies
conuerti est in
breuissimi facultatis.

Inaequalis pulsus
gignit quatuor
quatuor.

Pulsus diuersi
motu interperies
Galeni dicitur
tali aut quatuor
motu possit.

Valida facultas
tamen de quatuor
motu possit.

Inuicem corpora
per se vnde
conferuntur in
motu facillime
interueniunt.

pueri ab illis, quod concitant digerantque per halitum, humorum copiam & crassitudinē, quae interperies inaequalis producit: cū nimirum concoctrice facultate sint ualidissima, corporeque mollissimo, ac facile peripirabili. Iam uero naturalis arterie motus, sanitate refert: uitiosus, morbum: omnino intermissio, mortem. Ex quemadmodum soluere apoplexiam ingentem quidem est impossibile, leuē autem non facillē sic intermissio diuturna pulsuum ut tollatur, fieri non potest: breuis autem potest, haud tamen citra negotium. Ceterū diuturnam uocem, quae excedit duorum pulsuum curriculum: breuē, quae intra duorum pulsuum tempus manet. Iam mors à pulsibus intermittētibz repentina corripit, non aliter ac ab apoplexia. Vtrobique enim cordis calor exstinguitur, deficit respiratio. At raritas quidem ab intermittēte pulsū discernit diuturnitate temporis: interdum etiā, quod raritas interim habet aequalitatem cōiunctam omnium ictuum: intermittētes autem pulsus necessariō inaequalis existit. Ad haec, quēz frigiditas rarus pulsus producit: quēz quidem uel cordis, uel sanguinem spirituumque illius, uel consentientem ei aliquam partem occupat. Siigitur corpus ipsum cordis prehēdat, ita languidos, tardos, & paruos reddit pulsus, ut ipsa praepotens est. Quae uero à parte proficiscitur alia, raritate longius quā cetera genera,

Intermittentes
pulsus minime
necesse est
fieri ex pueri,
quoniam iuuenes.

Pulsus omnino
intermissio morbum
tunc refert.

Raritas ab
intermittente
pulsu quomodo
discernatur.

Rarus pulsus
vnde
gignatur.

Ad mortem uero inter loquendum, cū illo modo, tum etiam inter loquendum, intermittētes pulsus perniciōsiores sunt raris: siquidem generatio ipsorum fit raritate producta: solutio autem, est reditus quidam per raritatem, in comoderationem pristinam. Raro pulsui aduer-

Intermittentes
pulsus perniciōsiores
sunt rari.

Intermittentes
pulsus intermittentes
si aduerfatur.

Intermittentes
pulsus vnde
conferuntur.

Ardensissima febris
omnes
pulsus
crebrum
fuerit.

Raritas pulsus
aliquam
releat
periculo
sicut
nec remissio
nec paruitas.
Vehemens
pulsus
est vnde.

Valens pulsus
tardus
fuerit
conferuntur.

40 fatur creber, sicuti intermittēti intercurrens. Fit autem ipse intercurrens ex crebriore inaequali, quod functione obeat cor minus plenam, quā usus postulet: id quod fit sanē, ubi ab humorū colluuiē oneratum est cor, aut instrumenta obstruēta, aut in artū coacta. Quae quidem causa erat etiā intermittētū. Ad disidentem inter se, quod repugnat in intercurrentibus, ac decedat cum noxijs causis facultas in intermittētibz autē, hoc nō sustineat facere. Quare iudicationem sepe atrulenter pulsus intercurrentes. Iam uero omnes ardentissimae febres, pulsuum crebrum fortuitur: quarum quidam ex parte periculi sunt. At qui in syncope sunt crebri pulsus, propter remissionem (quae perpetuō coniuncta est cum omnibus syncopis) existunt periculosi. Ceterū raritas nunquam uacat periculo, sicuti nec remissio, nec paruitas. Sola autem extrema uehementia in pulsibus, non modo uacat periculo, sed est etiam maximē utilis. Magnitudo autem summa, ubi coniuncta est cum molliē morbofa, periculum nūciat: fin cum salubri aliquo arteriae statu, nihil subest ei mali. Præterea ueloces pulsus tardis sunt securiores: siquidem summa celeritas, summa tarditate est securior. Summa quippe tarditas, non secus ac raritas,

tum

tum incidit, cum calor natusque extinguitur. Celeritatis incrementum procedit ab uia urgente, atque à valida facultate. Verum formicans pulsus, nec omnino est celer, nec summum attingit crebritatis. Durissimus pulsus perinde est, ut mollissimus, periculosus. Nam ex scirrlo ille, aut inflammatione insigni uisceris, aut ex contractione per frigus, aut ex siccitate ab ardentissima febre protecta, aut ex ualida consensione: hic ex alto comate, & leuco phlegmatia, atque ex immo dica humiditate labibus gignitur. In summa uero, omnes pulsus, qui longè à naturæ modo recedunt, non sunt laudabiles. At languidissimus, tardissimus, rarissimusque, omnium pessimi sunt: ab illis, minimus, mollissimus, durissimus: inde celeritimus. At non celeritimus uel maximus: sed sunt hi modicè periculosi.

Vnus uero inter omnes extremos optimus est uehementissimus. Inqualitas enim intermittens in uno pulsù, omnium periculosissima est, præsertim mortem annunciat. Hæc sit, ubi distentionem interpellat quies. Vbi igitur uehementior secundus motus sit priore, commodus est: ubi languidior, periculosus. Lam tardior item, signum periculosius exitur: celerior, tutius. Gignuntur quippe hi pulsus, dum simul & certat natura, & impeditur in salubribus causis. Est enim melior motus uehementis, & celeris languidi & tardi. At uero prior motus alterum nihil excellit ferè, in magnitudine parauerans differentia: sicuti neque in duritia, aut mollitie: etsi quod inter dum uibratus fit, durior alter occursum uideatur. Etenim nibratio est duræ arteriæ symptoma, ubi amplius cogitur ui distendi. Pessimus autem est pulsus in intermittens, cuius tempus quietis prolixius fuerit. Inequalitas igitur intermittens in uno pulsù, causas habet genere easdem, ac collectiua: sed quàm illa est deterior longè. Corpus cordis facultatè quandam obtingit, quæ distendit & contrahit, tuendi gratia ionao caloris. Hæc in contractionibus fulgionum excrementi effundit: in distentionibus alliciat refrigerium. Vbi igitur ex æquo calidum, uel frigidum, uel purum, uel turbidum, ipsum cor fuerit, omnes eius partes pari impetu ad functionem contendunt. Vbi uero aliz calidiores, aliz frigidiore existerint: ac hæc omnino munda, illæ abundantia excrementorum confusæ: non eodem omnes impetu ad munus feruntur, sed hæc antecurrunt, illæ cunctantur. Vt autem plures & maiori ui ad actionem properantes fuerint, uniuersum cor excitant: ita contrà, ubi pauciores sint quæ ad motum festinant, quæ consistunt plures, uniuersum in longiore quiete continent. Lam uero calidiores si motui præsent, maturior simul & celerior, maiorque distentio editur: sin frigide, serior, tardior & minor. Motus itaque principales maiori numero partium deferuntur: specie enim magnitudini usus. At uero si alteræ partes alteris uel paulo fortius plures, uel plene pares, uicissim uincunt, atque uincuntur, uariosis efficiunt & inæquales totos uisceris motus.

Capripans pulsus ex genere est illorum, qui intercipiuntur quiete: succeduntque interdum salubris cordis affectibus, quemadmodum etiam

dicrotus, qui ex genere est intro retractorum: & comitatur nonnumquam inæqualem cordis in temperantiam. Etenim si nua contingat, ut quædam sint partes cordis præcalide, aliz fumosa fulgine præfocentur, ac contrarios profuerint motus, ut hæc quidem distentionem moliantur, illæ confidant. Ac tunc sanè distentioni contractio potest succedere tribus modis. Primò, cum distentionem, prius quam mensuram impleat, contractio exceptit: secundò, ubi prius quam plene succedat, externa quiete deperdita: tertio denique, dum distentionem nodum perfectam contractio retrahit, ceterum debilius reddita, reliquum permittit compleri. Haud aliter etiam contractionem distentio, nunc abolutam consequitur, nec permittit consistere: nunc etiam prius quam sit completa, impediamt & uictam excipit: nonnumquam retrahit nonnihil, superatur tamen. Atque hi arteriarum motus sunt interdum uel citra affectum cordis, aut propter eam rum inæqualem intemperiem, aut facultatis imbecillitatem, aut etiam duritiem tunice. Porro ipsius facultatis essentiam, nihil aliud puramus esse, præter qualiter temperantem. Tres autem affectus hæc sunt, originemque bis ferentium pulsuum inuenimus: unum uibratori, hæc sola re ab illis distinctam, quod cum breuem pulsus longitudinem habeat ex utraque parte arteriæ, obicura uibratio sit: quamobrem dicrotus, non uibratus uideatur. Alteram, in qua non uibratus est pulsus, sed arteria dura, & imbecilla facultas, ut à corporebus decumbentibus opprimatur, aliqua tamen parte iuxta cutem si, attollatur liberè. Atque hi quidem duo pulsus rum dicroti sunt, rum duri. Tertius qui ex intemperie nascitur, haud est dicrotus, sed bis modo pulsans, nec necessarîo durus: possumus tamen eum dicrotum appellare. Etenim intemperiem qua cordis corpus affligitur, comitatur pulsus bis feriens: consequitur etiam ille, cuius externa quies est amissa, & cuius impeditur distentio. Est & aliud frequens genus inæqualitatis in uno pulsù, ubi arteria principio propinquior parti, prius mouetur. In quo genere undosus atque uermiculans pulsus constituit, à molli arteria & non ualida facultate profecti. Ac uermiculans quidem, non modò non ualidam, sed infirmam etiam facultatem denunciat. Undosus autem, interdum non satis firmam, ac nonnumquam medio crite ualidam, cum præsertim sudorem decretorium promittit. In humidis enim reperitur & pituitosis morbis in quibus etiam radicitatem & rancorem, magnitudinemque solet acquirere. Quod si alorudinem præterea, & uehementiam sit natus, decretorium laudandis sudorem significabit. Magis hic sperandus est, si plures uehementes & alii appareant, quàm còtrarij. Qui si æqualiter etiam fiant, salubre simul & breui pollicentur sudorem, maxime si còcoctionis morbi appareat indicia. Undosus itaque pulsus, ex humida mollisq; arteria oritur, simulque ex facultate modicè affecta: uermiculans autem, ex molli quidem, uerum imbecilla insigniter facultate. Quæobrem etiam sine febribus solet superuenire uniuersis largis euacuationibus. Decurtatorum pulsuum

Dicrotus pulsus.

Effractus fracta in nullo esse aliquid præter qualitatem temporis.
Pulsuum bis ferientium geometriam tri.

Formicans pulsus.
Durissimus pulsus unde accidat.

Mollissimus pulsus causa.

Pulsus omnium pessimi, qui.

Pulsus uehementissimus, optimus.
Inequalitas in intermittens in uno pulsù, mortis annunciat.
Pulsus intermittens qui exstant periculosiores.

Vibratio quid.

Inequalitas in uno pulsù, longè est quàm collectiua deterior.
Cordis facultas.

Cæcæ ueneri ca terior, quatuor à particulari sunt excitata ad motum.

Capripans pulsus.

Vermicans pulsus infirmam facultatem denunciat.

Undosus pulsus quid sudorem decretorium promittat.

Undosus pulsus ex humida mollisq; arteria nascitur.
Vermicans pulsus solet extra febrem accidat.

Decuratum pulsum duplex genus.

Decuratum pulsum dignoscendum ratio.

duplex est genus alterum in unica distentione, alterum in aëreo. Quod in unica distentione sit, facultatis imbecillitatem una cum corporis gracilitate arguit. Est autem ad modum dignis arteria tangenda. Deinde si animaduertatur interea in arterie primis partibus maior pulsus, uel uehementior, uel uterque in postremis minor, uel languidior, uel ambo: primus digitorum applicatorum est attendendus, perspicient dumque, utrum similem illi qui antea erat, quam hic sustolleret, sequentes digiti motum percipiant, an uehementiorem atque maiorem. Ergo si motum similem, digiti sequentes fultarii digiti, sentiant, sua sponte arteria decurtata distentione habebat: quod nobis infirmæ facultatis à corde prodentis, uel stigium erit. Nam illa quando recte se habet, usque ad finem arteriarum omnium contentio quæ attollit eas, similiter permeat. At in pulsibus decurtatis, paulatim remittitur, tantoque efficiat imbecillior solito, quantum est à principio remota. Quod si eleuato ut primo digito, postea motum percipias ualiditatem, ac maiorem quam antea: declarat ille quidem etiam minus facultatis arterie imbecillitatem, sed minorem certe quam alter: quod illi facultas remitteretur à principio discedens: hic maneat, quantum in ipsa est, par, sed grauata ab iniectione dignis, imbecillius mouetur arteria: quod quidem minus habet periculi. Nec enim ita ipsius cordis, ut arterie quam tangimus, ostendat affectum. Alterum autem, potius cor esse imbecillum significat. Porro si omnino pulsus deficiant, tum multo magis declarant facultatis imbecillitatem: quo tempore sunt submouendi omnes digiti, ac deinde spacia paruo interposita, deinceps admouendi. Breviorem autem ipse aboletur pulsus: uel quia prius non pulsant arterie, id quod extremum est malum: uel quia pulsant quidem, sed ita languide & parum, ut fugiant sensum: estque sane hic affectus, si citra deliquium aliquod animi repentinum accidat, difficilissimus. Reciprocatur autem motus, modo ex ultima pulsus abolitione, modo ex paruo pulsus & languido. Sed ille quidem a deficiente reciproco dicitur, hic reciproco decurtatus. In huiusmodi æstimandis, sic debemus partem componere, quancumque tangamus, ut subter teriam anster sit tactus. Omnium uero sunt pessimi pulsus, qui a b amisso motu minime reciprocantur inuicem in membro. Minus his, qui in uerso illo uidentur moueri. Quibus etiam minus, qui sunt decurtati, non tamen perdunt plane omnem motum. Iam etiam his minus reciproci decurtati, adeoque si multis simul occurrant digitis. Ceterum numerus digitorum, quibus motus sit necursurus, sicut cuiusque arterie. Ad quam rem magis proprie referri narum tenere ægrorantis. Qui buseam enim natura sua pulsus eussit minor: sicuti & aliquibus breuior. Quod si nos nature ipsius ægroti proprietates lateat, ex cõmuniori-bus differentiis conieciatur faciemus, temperamenti scilicet, & habitudinis corporis. At in temperamento, presertim calidi & frigidi differentiam expendimus: in habitudine, gracilitatis & corpulentie. Ac sit interdum, ut ambe in x qualitates pulsuum, tum quæ in uno pulsu, tum quæ

in aëreo consistit, concurrant. Sæpe quoque illa quæ in uno pulsu consistit, non adest: quæ autem in aëreo, manifeste conspicitur. Later autem inæqualitas unus pulsus, aut ob affectionis exiguitatem, aut non ipsorum pulsuum breuitate. Vtrumque itaque genus decurtatum pulsum, significat facultatis imbecillitatem. Verum si in una fiat distentione, etiam gracilitatem indicat. Fit igitur decurtatus pulsus in quibusdam, ex causis præter naturam: in nonnullis tamen inuenitur ex propria conformatione: quo modo inueniuntur & circumuensi pulsus. Qui quidem fit, si arteria ita sit conformata, ut eius pars duntaxat media, nudæ cum subiecta sit: partes autem utrinque altius demergantur. Quancumque fit etiam ob facultatis imbecillitatem, quæ attollere unus non potest. Ex horum etiam genere est pulsus tremulus, qui non petinde est conficiendus. Quia uero imbecillitatem facultatis sequitur tremor, necessarium est ideo etiam tremulum pulsum languidum simul & paruum esse: quæ de re fugit sensum. Pulsus igitur tremulus, facultatem imbecillam, tunicam arterie nullam, corporis gracilem nunciat habitum. Videtur autem quique ordo perturbantini eiusdem generis præstare, propterea quod ordinis nature nostre in primis familiaris existit. Ordo etenim fixum quodammodo causam esse & perpetuam, indicare uidetur: perturbantini autem illius, uariantem, nec in una manentem uel magnitudine, uel specie, uel regione. Ceterum talis causa non perniciosa, sed incertior censenda est. Ita quæ nihil certi, nihil ordinis perturbantini firmi habet: nec tale, quale ordo, uel bonum, uel malum.

GALENI PERGAMENI de præconitione ex pulsibus liber tertius.

Deinceps agendum de his pulsibus est, qui dispositionibus præter naturam peculiaribus existunt. Etenim quicquid præter naturam est, aut affectus sunt, aut causæ horum, aut symptomata. Cum igitur ex affectibus, hi quidem simularium, hi autem instrumentalium partem sint proprii: exordiar à simularium affectibus, qui quidem sunt octo numero, ab intemperie omnes præfecti. Quorum quatuor dicuntur simplices, calor, siccitas, frigiditas, humiditas: quatuor compositi, frigiditas siccitati, caliditas siccitati, frigiditas humiditati, caliditas humiditati coniuncta. At nero pulsus per intemperiem, nisi arterie sint affecti, uel cor, alterari non queunt: possunt tamen arterie nihil læso corde affici. At affectu corde ut innoxie permanet arterie, impossibile est. Ceterum frigida & calida intemperies cordis prompte in omnes arterias permeat: humida & sicca ægrius. Peculiares igitur pulsus copiosius calori sunt, magnus, celer & creber. At magnus, non tantum calorem excellentem, sed & instrumenta requirit mollia, facultatibus ualida: itaque non erit calidæ intemperiei perpetuus. Celer etiam firmam possulat facultatem, ac instrumenta quæ distendantur prompte: quare ne hic quidem perpetuus erit. Creber similiter, si largè

Decurtati pulsus significat facultatis imbecillitatem.

Pulsus inueniuntur ex propria conformatione.

Pulsus tremulus quod indicat.

Ordo est familiaris nature nostre.

Ordo pulsuum quod indicat.

Perturbantini ordinis quod significat.

Pulsus aboletur buseam.

Pulsus deficiunt reciproci.

Pulsus reciproci decurtati.

Arterias tangenda ratio.

Arterum præter naturam esse tria differentiarum affectus, causas, symptomata.

Affectus simularium partem sunt proprii, autem instrumentalium partem sunt proprii: exordiar à simularium affectibus, qui quidem sunt octo numero, ab intemperie omnes præfecti, quatuor simplices, quatuor compositi.

Corde affectu, necessarium est arterias affici.

Caloris pulsibus copiosius calori sunt, magnus, celer & creber.

3-

si largè usui à magnitudine & celeritate sit factum satis, nulla fiat ratio: si nō expleatur usus, fiat: proinde perpetuus ne hic quidem fuerit. Quamobrem ex peculiaribus nullus erit inseparabilis. Si igitur calor solus increuerit, & in naturali statu maneat facultas, instrumentaque, quum mutatio ipsa est parua, magnitudo tantum pulsuum augetur: quum maior, etiam celeritas: ubi insignis, iam etiam crebri-
 tas. Proinde maximus pulsus, idemque celeris-
 mus & creberrimus, summum incrementum caloris significabit. At si celeritissimus & creberrimus sit, non autem maximus, hoc nisi facultas sit imbecillior, uel arteria durior, accide-
 re nulla alia ratione possit. Similiter ubi ingens sit crebrietas, nec simul celeritatis & magnitudinis par incrementum, calorem quidem etiam tunc oportet esse copiosum, sed uel facultatis imbecillitatem, uel instrumentorum duritiam. Ceterum imbecillitatem erit adiunctus languis-
 dus: duritiei durus pariter & uibratus. Si durus citra uibrationem sit pulsus, ac summe creber, imbecillam facultatem unā cum calore magno nunciabit: & quum talis languidus sit, minabitur syncope. Est autem aliud, cor & incallescere & incaluisse. Etenim ubi à substantia quam in suis uentriculis continet, ipsum cor caluit, potest firma facultas esse: ubi uerò & incaluit, & in eandem incidit caloris intemperantiam, qua tenebantur sanguis & spiritus uen-
 triculorum, tunc sanè eam intemperiem sequitur necessariò imbecillitas facultatis. Quod si incaluerit largius, & per ipsum totum calor febrilis permeauerit, febrem excitat hecticam. A calore itaque cordis ipsi pulsus uariantur. Qui quidem calor duplex quum sit, aut est certè à putribus humoribus genitus, unde ac remanentem atque fumosam contraxit: aut cum uapida quadam & suauis humiditate coniunctus, sola quantitate à natura recessit. Ille igitur prior constans & ægrè solubilis est: secundus autem, usque adeo obfirmatus: qui quidem balneis, exercitationibus, cibo calido, uini porui, atque animi affectibus: timori & iracundia solet superuenire. Porro calor qui diuersus est à natu-
 uo, breuem habet externam quietem: celerio-
 rem autem, quam pro portione distentionis, contractionem. Qui quantitate sola uariat, maiorem simul & celerio-rem distentionem contractionem. At qui etiam fuliginosus est, longè citatio-
 rem distentionem, contractionemque celeritatem reddet. At uerò si cor quidem calidius sit, frigidores autem arterie, ipsa mo-
 tuum exordia simul utrobique fient, si modò uenæ à corde facultatem citra lesionem recipiant. Cor tamen singulis arteriis maiorem, celerio-
 rem, uehemensiorémque pulsuum habebit. Etenim motus principium à corde illis omnes habent: eius autem speciem fortissimi singula-
 rit, prout cum ipso corde temperatura consen-
 serint. Porro nōnunquam accidet, ut arterie eodem tempore nō accipiant ex corde influentem facultatem: uerum quæ cordi propiores sunt, primæ: posteriores, quæ remotiores: quod potissimum euenit, si arterie frigidores & cor im-

*Caloris peribit
rem pulsus mol-
lus est insep-
rabilis.*

*Hæc febri
quid excitat
Pulsus à calore
cordis uariatur.
Cordis calor
duplex.*

*Arteria habens
motum principium
à corde.*

*Arterias uidentur
quæ nō eodem
omnes tempore
à corde influen-
tem facultatem
recipere.*

becillius coluerint. Nonnunquam etiam in corde ipso percipitur temperamentorum pugnantia. Nam modò frigidus uisceris corpus æquo est, & in uentriculis contenta substantia calidior: modò è diuerso, substantia frigidior, cor autem calidius: ubi etiam pulsus sunt moderatissimi similes. At ubi aer quem inspiramus, infestus putredine sit, putredineque ipsa ad cordis corpus peruenerit, febrem pestilentem ac letalem accendit: quæ quidem ex caloris acredine, ipsius caloris genere agnoscitur: & ex pulsus etiam, qui parum à natura modo recedens, in eodem statu perpetuò manet: quemadmodum in hecticis febribus, quarum sanè duo hæc propria sunt signa, si perpetuò sibi illæ uideantur similes, nec inuasionem ullam accessionis, nec incrementum, nec uigorem, nec remissionem habent, nec febricitare se percipiat ægrotus. Hos pulsus nihil est necesse maiores iusto, atque interim nec crebriores quidem esse: ac omnino celeres tamen, cum febricitantium pulsibus uniuersis addit perpetuò celeritatem. Cæterū quibus putridus ille calor, non cordis corpus inuasit, sed humores in uentriculis illius contentos, (deprehenduntur enim affecti hac peste, si febrim primū percipiant, nec dein æqualiter semper febricitant: ad hæc, si pulsus nō habeant per ualidum) multum horum seruantur. Frigide intemperaturæ ipsius cordis, pulsus paruus, tardus, atque rarus efficiunt. Ac primū sanè crebri-
 tas immutabitur, dein celeritas, ac ultimò magnitudo, si quidem illarum facultas sit: nam si ipsa fuerit offensa, ad paruitatem & tarditatem potius, quam ad ranciditatem pulsus mutabitur. Cæterum ubi facultas laboret plurimum, et si coniuncta frigiditas sit, pulsus extremè quidem fuit parui, sed non tardi extremè: imò nōnunquam moderatius similes: crebriorem tamen non absiciunt pristinam, sed etiam adaugent. At ubi paululum debilitata facultas sit, & frigiditas uiget plurimum, longissimè ad raritatem pulsus deflectunt, parum ad paruitatem, medio modo ad tarditatem. Eodem etiam arteriarum modo, si in natuo temperamento consent, mouebuntur. Nam si corde frigidior existeret, ipse calidiores sint æquo, tantum alterabunt pulsuum illius, quantum à natura recesserint. Vacant huiusmodi affectus febre, quod fiant refrigerato corde à succis frigidis, ipsidem lentis & crassis. At uerò si perinde ut cor arterie etiam iusto sint frigidores, remissionem moruum illius augebunt: idly in genere eodem. Accidit autem interdum frigidus iusto esse cor, humidiorumque excrementorum plenum: quo tempore pariter & minor & rarior distensio sit, contractio uerò celerior. At si ipsum corpus cordis incidit in intemperiem aliquam inæqualem, necessum est pulsus ipsius cordis, adeoque arteriarum omnium, uariè inæquales fieri. Si quidem & collectus, & circa unum pulsuum inæqualitas, in omni genere accidit: quod subito fiat in magnitudine, paruitatem, celeritatem, tarditatem, remissionem, crebriorem & raritatem, mutatio. Verum in duritiam & molitudinem, subita mutatio fieri unquam non

*Cordis iussu nō-
nquam uariis
temperamentis.*

*Postulentium fe-
bris pulsus pa-
rum à naturali
recedere.
Hæcticorum fe-
brem duo signa
propria.*

*Febricitans pul-
sus uarietur ad
est semper celeri-
tas.*

*Frigidam cordis
temperat quæ
minuunt pulsus*

*Cor, si febre
inæquali mor-
borum pulsus uari
uariis uari in-
æqualitas offere.*

potest. Non vibratus autem inter dum & vibratus, subira quædã uicissitudine sese in affectibus excipiunt, adiuncta ad cordis inremperiem duritia uel tensione arteriarum. Porro pulsus bis feriens, in temperie corporis cordis proprii symptoma est. Cæterum si durities accesserit, iam hoc indicium labefactatur: nam in dicrorum conueritur cõmunem plurimum affectuum. At vibratus dicrotus gignitur, ubi pulsus qui absolute est vibratus, deminuta sit longiorum. Dicrotus uero non vibratus, æquæ est ac vibratus durus: sed talis per suam tarditatem efficitur, & corporum omnis incumbendum. Iam uero ubi cordis corpus præter modum est calidum, materię autem contentæ in eo frigidiore, aur eñs partes illi adhaerentes, tribus id contingere differentijs potest. Aut enim illud tantò calidius est, quanto hæc frigidiore: aut multò illud calidius, quàm hæc frigidiore: aut minus illud calidius, quàm hæc frigidiore. Quarum prima differentia pulsus præsentat ad unguem moderatũ, magnitudine, celeritate & crebriitate. Ad remissionẽ autẽ tantum depellit, quanto spacio naturalem temperaturam uiscus ipsum relinquit. Sunt autẽ pestilentes non paucæ febres inde ab initio hecicæ, distantijs ab omnibus alijs febribus, quæ ex magna putredine oriuntur. Præterea macrorem interdum sequuntur & iram à principio quædam hecicæ febres: aliter nescio an inde ab initio fiat hecica. At successu temporis, multis alijs succedunt hecicæ, quas perpetua æqualitas satis manifeste declarat. Notitia autem firma in huiuscemodi affectibus ex urina quidem inuestigari nõ potest: ex pulsibus autem in initio adhuc arg. primis diebus per febres hecicas nõ facili cõparatur, cùm speciem cõmunem habeant tunc cum diarricis febribus. Verum elapso triduo, iam clariore sunt etiam pulsibus iudicio. Si quidem aperte hæc celeriores, quàm decet, pulsus habent, tantòq; languidiores iusto, quantum calor increuerit. Deinceps de illis febrib. dicamus, in quibus cor calidius est, quàm uicina frigidiore. Nam in huiuscemodi affectibus, pulsus celeriores simul & maiores, & crebriores, languidioresq; iusto erunt. Longius tamen ad remissionẽ & celeritatem, minus ad crebriitatem & magnitudinẽ, diuertent à natura. Strabilis & cõstans harum generatio est, ut cæterarũ hecicarum. Quodd si non ita longius uiscus à natura deficiat ad calorem, uicina ei longius ad frigiditatẽ: minores pulsus in his & rariore erunt: at celeritate uel similes erunt naturalibus, uel tardiores. Similes, si non multò frigidiore uicina sint: tardiores, ubi multo longiori intervallo, hæc ad frigiditatem à natura desierint, quàm ad calorem cor. Remissio hic eñs quantitati calorẽ respondebit. At uero si frigidus iusto sit ipsum cordis corpus, materia porro, reliquaq; uicina, eo calidiora, erunt & hic tres numero differentie, & uariabunt pulsus in unaquaq; sicuti superiores. Primũ requẽ refrigeratũ sit cor, ut incaluerunt uicina: tardior æquo erit pulsus, si insignis fuerit alteratio: cui etiam remissio respondeat. Ceterum si uiscus sit frigidus omnino, quàm potuilet naturalis modus, & uicina similiter calidiora, febricitabit utq; homo,

nõ hecica tamen febre, sed uel diaria, uel ea quæ humorũ putredinem sequitur. * Vtriusq; autem sunt propria signa. * Diaricæ quidem coniunctæ cum frigidiore corpore cordis, si ex æquo à natura uterq; pulsus recesserit, nihilq; magnitudine à naturali differat, nec crebriitate ferẽ, nec celeritate, nisi utraq; insignis sit mutatio. Erat etiam tunc tantò languidior pulsus, quanto uiscus frigidus. * Eius autem quæ humorũ putredinem sequitur sunt indicia, par semper magnitudinis in pulsus: nõ tamen ut in eo qui secundum naturam erat: nec eadẽ erit paritas in alijs generibus. Verum ubi à natura * parum recessum est, nihil ferẽ ubi maiori intervallo, aperte in contractione pulsus celerior sit. Iam etiam clarẽ in extrema quiete crebrior & languidior apparet tantò, quantum refrigeratum est cor. Fingamus rursus, magis refrigeratum cor esse, quàm uicina incaluerint, sitq; febris ephemera: horum pulsus manifeste languidiores erunt, & minores: at tardi non perinde aperte, sed * pro ratione excessus, quo uicina partibus est cordis corpus frigidus. Si uero sit febris putrida, pulsus languidus adierit, perinde ut superior: sed illo etiã minor in distentione, tardior: at contractio naturali: celerior erit. Ponatur rursus tertium genus cõmurationis, hoc est, minus ad frigiditatẽ cor declinasse, q̃i ei cõiuncta ad calorem: ac febrem esse diaricæ pulsus habebit hoc corpus tantũ q̃ par est imbecilliores, quãto corpus cordis fuerit temperatius: ac maiores & celeriores naturali, sed maiore res q̃ celeriores: ad hæc crebriores erunt. Hæc omnia sunt accipienda, pulsibus nec in duritiã, nec in mollitudine aperte mutatis. Omnes febres diaricę, in magnitudinẽ, celeritatẽ, crebriitatemq; pulsus, quantum in ipsis est, mutant. Nam si cõcurat alius affectus, mistam oportebit mutationẽ esse, ex illa, & hac, quæ cõmatur febris. Similiter febres hecicæ, pulsus in easdem differentias conuertunt, quantum in ipsis est: amplius in ipsis mutatur celeritas. At quæ ortæ sunt ex putredine humorũ, in uigoribus utroq; habent motũ celerem, & distentionis, & contractionis. Præterea crebriitatem ex æquo mutant, cùm externæ quietis, tum internæ. In initio accessionis, non perinde, sed magis augment contractionis celeritatem. In incrementis cum hanc, tum etiam externam quietem plurimũ concitant, ut pulsus in illa creberrimus esse uideatur. Atq; hi pulsus febriũ per se sunt proprii. Reliqui omnes qui febrientibus accidunt, alios potius affectus, quàm febres, sequuntur. Quorũ etiam affectuum sunt duo genera: aut fluctantes, aut instrumentorũ uitium. Quippe ad causas inueniendas, quæ immutant pulsus, tria hæc sunt animaduertenda, instrumentũ, usus, & facultas. Porro pulsus qui ab inflammatione excitantur, ad hys quos humorum putredo efficit, sola distinguuntur duritia. Si quidem pulsuum ortorũ ex inflammationibus, durus occurrit existeri. Quare si durum occurrit, quem efficit tensio arterię, discernere ab eo uales qui generat frigiditas atq; duritia, tres prædicere hinc causas præteritis poteris, potum frigidũ, meracius uinum, inflammationẽ. Si quidẽ induriscunt ex immo dicæ frigidæ potionibus arte.

Pulsus bis feriens, in temperie corporis cordis proprii symptoma est.

Pestilentes non paucæ febres q̃e ab initio hecicæ.

Hecicæ febres quæ nam ab initio sunt.

Huiuscemodi febrium notitia ex urina inuestigari nõ potest.

Diaria febre uel putrida quæda febricitabit homo.

Diaria febris diuina propria.

Febris putrida propria signa.

Diaria febris quælibet pulsus mutant.

Febris putrida quælibet pulsus mutant.

Causæ mutant pulsus ut non accedentes, considerare oportet instrumentum, usum, et facultatem.

Arteria à quibus causis duratur.

*Heftica febris
e arfione à pro-
prio exoritur.*

*Heftica nūquā
ad illi magni
pulfus nec velo-
mens.*

*Celeritas febris
pericula propria*

*Pulfus in utroq;
pari mutatur,
accessio uisū
nūciat.*

*Causarum ge-
nus duplex.*

*Causa antece-
denti quā dicit
deteri.*

*Causa interna,
feu procatari-
tica, quā uoluit.*

*Inaequalitas pul-
sum ineca ac-
cessiones, quid
inducit.*

*Vigor accessio-
nis quid sit.*

*Causa interna
in arteria quā
fuit.*

arteriarum tunice, & à uino immodice pote ex-
icantur. Iam uerò febris heftica * rarissime à
principio oritur, quamquam eo tempore non-
nunquam sint ortæ. Ad hæc, nec magnus pul-
sus, nec uelemens, unquam cum febris heftici-
tis coeunt. sed si alterutrum habeant horum, mi-
nimè sine sunt heftice. Si simul utrumq; habcant,
planè sunt diatriæ, si quidem eorum contractio
non properet. Propria est enim eorum que se-
quitur putredinem humorū, celeritas. Cæterum in
remissionibus accessio-¹⁰ nis, celeritas contractio-
nis exsoluitur: initio autem gignitur, ac per incre-
mentum augetur. At ubi iam propè uigor adue-
rit, ingens incrementū suscipit diatriæ celeritas
contractio-²⁰ nis pari celeritate manente. Vbi
uerò uigat iam planè febris, in illa accessione
ad summā celeritatem diffinitio peruenit, im-
mutaturq; celeritas contractio-³⁰ nis. At uerò pulsus
in utraq; partem mutatur (si adiecerimus * di-
stinctionē) accessio-⁴⁰ nis initium nūciat. * Distin-
ctio autē ipsa erit, si mutatio citra alienam oc-
casionem acciderit. Atq; occasiones quidem ipsæ,
partim externæ sunt, partim ab ipso corpore o-
runtur: quarum utraq; genus notæ. Verū clari-
oris doctrinæ gratia, appellabimus que proce-
dunt ex corpore causas, unde uel faculas, uel in-
strumenta alterantur, antecedentes harum autē
ipsarū causas, que extra corpus posite induxe-
runt alterationem, externas, seu procatari-⁵⁰ ticas.
Porro inæqualitas pulsū, que se inuadit undā
cum accessio-⁶⁰ nis, compressarū uel obstructa-
rum modo arteriarū, uel copiarū humorū oppre-
ssum facularē, est signum. Quæ igitur pul-
sum mutationes sunt, dam cordis calorem au-
getur, aut coarctant in trō humores, aperit ac-
cessio-⁷⁰ nis initium annūciat, si quidem ab alijs oc-
casionibus sint remore. Existimare autem con-
uenit, ubi acutus materię humidæ initio ac-
cessio-⁸⁰ nis ad cor peruenerit, in primis quidem, mor-
tis periculū esse: quod periculum maxima muta-
tio pulsū in raritatē, tarditatē, paruitatemq;
præ-⁹⁰ nūciat. Nam si his insignis remissio succer-
ferit, exemplo peribit. Sin autem abbit remis-
sio, contendit natura eam superare, atq; arteria-
rum motū maiorem, celeriorē, crebriorēq; ex-
citāt: ut uterq; motus celerior quidē fiat, sed clari-
us contractio-¹⁰⁰ nis, increscat hic breui manife-
stē, donec augeat accessio. Tandem ubi mater-
iam superauerit, calor quasi flamma succendit:
atq; is est uigor accessio-¹¹⁰ nis, ubi fuliginosum na-
tura excrementū, expiratione & contractione
arteriarū expellit. Quod uerò est ueluti cineritū,
non perinde, quia crassum est, potest excernere,
sed per insignes quosdam meatus educit. Hoc in
partibus inflammatis, pus est: in ipsa uasis, sedi-
mentū urinx. At si cor fictus quā-¹²⁰ pro modo
naturæ eualuit, unā secum omnes alterabit
arterias: id quod interdum in una animalis par-
te ipsæ arteriæ accidunt, interdum autem in plu-
ribus. Est cū sint contrā quā cor affectē ipsæ
arteriæ, sed si men eius affectio-¹³⁰ nis recipiat: ita ut
conferat illis mediū quidam affectus in humi-
ditate siccitatēq;. Præcedentes causæ que indu-
cant arterias, sunt aqua sulfurea aluminosaq;, &
omnia breuiter que euacuādi non possident.

Quæ quidem interperies ubique arterias in-
ualent, pulsū reddit duriorē. * In corde au-
tem siccam interperie-¹⁴⁰ producta sicca uisus ra-
tio, diutius administrata: præterea medicamen-
torū exiccantiū tum efus tum potio, in quibus
est uinū merū: ad lux cibi potioniq; abstinē-
tia, immodicus labor, feruor, solitudo, tristitia,
diuturnæ uigiliæ, febris heftica, præter ceteris,
marida. Cuius humidæ interperies sunt edema-
ta, quæ partes diutius tenuerunt: leucophleg-
matæ, quæ ipsam etiā cor mutant: omnia deni-
que principium uiscerū edematæ cum arterias
humectant & cor, tum pulsus efficiunt molles.
Pulsuum causæ mollitudinis mediocritas sunt, ci-
borum copia humorū, multū octum, somnus
longus, balneū à cibo. At durorū pulsuum angustia
ostendimus esse paruitatem, ut mollium maghi-
tudinem * comitem: quas quidem celeritas atq;
tarditas, crebritasq; & raritas consequuntur. Sunt
autē primæ ac ueluti cōiunctæ causæ generatio-
nis pulsū, uisus atq; facultas. Porro in corde non
excitant tumores, qui pulsū duriorē efficiant,
quemadmodū in alijs uisceribus inflammatio nes
& scirrhi: siquidem prius homo correptus syn-
cope intereat, in illorum tumorum auspicijs.

GALENI PERGAMENTI de præcognitione ex pulsi- bus lib. III.

Reliquum autem in hoc libro fuerit, cæte-
rarum partium dispositiones, quibus cor
consentiens cōmutat pulsus, omnes expli-
care suo ordine: ubi hoc ante omnia admonue-
rimus, totius corporis pulsus, anteq̃ cor con-
sentiat parti prius affectē, fieri non posse ut in cō-
mūnem alterationē trahatur: in parte tamen ali-
qua, licet offensionē cor non percipiat, arteria-
rum motus uariari posse. Partes animalis respi-
rationi seruientes duæ tantū sunt, pulmo & tho-
raz. Nutritionis multo plura quā in duo instru-
menta, iecur, uentriculus, intestina, lien, renes, &
utraq; uesica. Celeritatem cordi & omnī maxi-
mā noxam, dat pulmo. Sedem habet enim om-
nium ei cōiunctissimā, illiq; uasis quæ maxime af-
finis est, & consensus per maxima oīia in uen-
tricos eius. Quamobrem si quando solio calidi-
or eualuit, continuū cor calfacit: sicut & re-
frigerat, frigidior effectus. At humiditatis & sic-
citatē interperiem, non perinde ac illas, sed citius
etiam in eas tamen, quā cetera instrumenta,
imparit. Vbi igitur ob pulmonē exalfactū, cor
prauum calorem contraxerit, pulsus efficit, qua-
les solet usus actus efficere. Qui affectus si sit
diuturnior, in periculū uocabitur illud, ne in fe-
bre hefticā incidat. Atq; perinde respiratio
& pulsus alterabuntur, siue folium per se cor in-
temperatum sit, siue consentiat pulmōni. Maio-
rem tamē in toto sinu thoracis æstus percipiet,
qui ex pulmone laborat, caliditūq; planè expira-
bit, & si net etiam altero magis, & calidioribus e-
rit faucibus atq; lingua, eaq; maiori e parte sic-
ciore: quæ, si in grauefactū malum, cum æstredine
quodam uigrescat. At si pulmo refrigeratus sit,
cor ei consentiens, pulsus primō in eam altera-
tionem adducet, quæ usum exolutum consequi-

*Cor exicare
quā possunt.*

*Humida inter-
peries causa.*

*Pulsus molles ex
duris quā effi-
ciunt.*

*Pulsus graues
duris primæ cau-
sæ sunt, quæ
facilius.*

*Coris iniquitas
obteri tumores
qui pulsus da-
ntes efficiunt.*

*Pulsus totius
corporis, ante
quā cor effi-
ciat partē prius
affectā, pertra-
hit in cōmūnem
alterationē non
posse.*

*Respirationis
organum.
Nutritionis
organum.
Pulmonis finis.*

*Cor pulmonis cō-
sensus quā
pulsus facilius
efficit.*

*Pulmonis calidi-
tas in ipso af-
fectu nota.*

tur: processu temporis, ubi heticam frigiditatem contraxerit, pulsus excitabit, quales huic, si polleat, tribuent. Cæterum quibus primus refrigeratus est pulmo, frigidam reparationem persequitur. Si siccitate fuerit intemperatus pulmo, à primo pulsus penè nihil mutabit: tandem cõsentiente illi corde, ipsos duriores efficiet. His fauces, ramentis nihil sitiant, promptè arefcunt. Humida intemperies uuidas reddit fauces, sputum extinguit, tempore ad mollitudinem pulvis ipsos traducit. Atque ex simplicibus his, discernere cõpositas intemperies licebit. At uero fluxionis omnium quæ in pulmonem impingunt, cõmunis est inæqualitas pulsus: uerò minor quidè, à subtilibus simul & paucis: insignior autè à crassis & uiscidis, copiosis fluxionibus proficiet: quod uidelicet huius magnus obstruant, grauent, & cõprimant. Duriores quæ oporteat sunt pulsus, per intemperiem siccam, & inflàmatos uisidatosque tumores pulmonis: contrà, molliores, per cõdemata. Frigida intemperies parua, tardam, raramque respirationem gignit, non aliter ac pulsus. At fluxiones frigide, pulsus similiter mutant respirationem autem, nec parua, nec tardam, nec rara reddunt. Quia enim cõstrictus pulmo est, paucus spiritus recipitur: qui cum natura non faciat satis, cõtingit ut altera actio, statim celeris efficiat & magna. Respirationis itaque species est omnibus fluxionibus eadem: at non omnibus accidit similiter suffocatio, * sed calidioribus omnibus magis: quod quidem largorem atrali spiritui natura tum postulat. Solà intemperiem nullà suffocationis periculat excipit. Porro si arteria tantum aspera sit: oppletur, nihil pulsus duritia uariant: sin læues, quia totius animantis arterie intendunt, pulsus efficiunt duriores. Intemperies thoracis eadem alteratio nes inducunt, ac paulò ante illæ pulmonis: tumores, pro multitudine & genere humorum qui efficiunt eos. Variat autem, quod citius cor, ac magis pulmone quæ thoraci cõsentiant: & quod interim pars thoracis affecta sit * musculus, interim succingens costas membrana. Maior siquidem tensio oritur, ubi duræ partes & spissæ intrumescunt. Unde etiam pleuritici semper duriores pulsus quæ peripneumonicis habent: æqualem tamen, non ut illi in æqualem. Ite in ore affecto pulsus ex intemperie uariant, ut superius docuimus. Si excitati sint tumores præter naturam, cõueniunt ferè etiam in his, sed minus ex inflammationibus, indurefcunt, quàm ex thoracis inflammationibus, & tanto quidem, quanto quàm ex pulmonis magis. Nunquid autem ex thoracis uel lecinoris tumore pulsus mollis gignitur, quod nec instrumenta ea unquid cõdemate pituitoso siffigant. At cor cõsentit uel citiori, uel calidè causæ uenæ. Cõsentit autem sepro transuersio cor præter omnes alias thoracis partes, quod ex ipsa causa uena in illud uenæ inferantur. Tensionè uerò nulla perin de aliis pars inferat arteriis, præcipue si neruosa eius pars sit affecta. Quod si à solis excrementis * quæ in eo gignuntur, absque febre intendatur, dolor ac dyspnœa ab ipso principio oritur, postea putrescentibus excrementis febricitabit. Si ex fluxione quæ aliunde in ipsum decumbit (omnino autem hæc fit uel sanguinis, uel calidi sanguinis & tenuis oportet:

nam crassum sanguinem & pituitam lentam, propter densitatem, nunquid recipiat) necessario in delirabunt, pulsusque habebunt insigniter durus: itaque etiam paruus, ac prouide creberrimus, cõmunis erit copiosus sit calor. Iam uerò omnia quæ magnis pleuritidibus accidunt, respondent sicut pomatibus parua neruosa septi transuersum quod succingens costas tunica multis neruis prædita sit, tum quod aduersæ septo transuerso, membranis thoracis interscipientibus, per quas ad cor continuat. Ac maximè sanè indicium ex talis pleuritidis est, si pulsus sit magnopere durus, ob idque similiter paruus, & ob ambo hæc, ca loremque, creberrimus. Pleuritis namque cum tali pulsus est nullus unquid seruat. Cæterum huius minus, quam quibus inflammatus est septi transuersum, delirant: siquidem proprius accedit ad cerebrum, diaphragmatis neruorum exortus. Ventrículo intemperie affectus, pulsus ita ut superiora immutabit. Si tumore secundum fluxionem, aliorum more. Si ad eius os in cõfistit, pulsus ob neruorum multitudinem erit durior: non ita durus tamen ut ex septo transuerso, aut costas succingente membrana. Siquidem quia huius nerui insigni sensu præditi futuri erant, ob id molles & magni sunt cõditi, atque à principio ipso producti. Igitur ob mollietatem ipsorum, & quod ea pars sit carnea, nunquid ex ore uentriculi ita durus sit pulsus, sed tum paruus, tum creber: quia propter exitum sensum de fatigato spiritum, densiturque facultas: quæ quidem ne paulisper quidem illic copiam humorum sustinet, sed de grauat, pulsusque inæquales, atque interdum languidos efficit. Cætera instrumenta nutritionis, quæ propiora quidem sunt cordi, & magnis nasæ ei copulata, celerius & magis in cõsentium trahent: quæ remotiora sunt, & paruis affixa, minus & tardius. Eodem modo quæ dura & cõtenta, neruosis prædita sunt plurimis duris, facillè hæc durus pulsus efficiunt quæ contra, molles. Quæ sensu uigent, utroque in cõditi facultatem afficiunt. Porro qui inclusi in spissioribus corporibus & cõspicati sunt humores, ita maiorem dolorem, quæ qui in rarioribus & mollioribus sunt, cõcitant. At uero si cerebrum, aut illius etiam meninges, laborè inflammationis, necessario febris atque delirium sequitur: non necessario autem per aliarum capitis partium inflammationes. Nam musculorum temporalium inflammationes, si magnæ sint, febris, deliria, spasmi, soporesque frequenter inducunt, non tamen semper: quippe si paruus sint, nunquid talia symptomata excitant. Cerebrum ipsum ubi in morbofama intemperiem incurrit, lymphoma necessarium, quod intemperiei familia re est, inducit in calorem immoderatum, si quando soli per se acciderint, delirium si siccatu cõueniunt, una cum uigilia. Vigilia siquidem propriè est siccitatis symptomata: ut humiditatem, somnum profundum: ac refrigerationem, fatuitas. Cæterum si cum frigiditate humiditas coeat, alius sopor inducitur. Si uero luge calidus humidiusculus cerebrum, quæ sit æquus, euaserit, sopor uigilia atque delirium illius oriet. Vehemens frigiditas cerebrum, siccitatem cõuenientem, motu priuat uniuersum corpus. Si cerebrum admodum calidum sit, nec adit siccitas, * in cõfistia arteriæ pulsus moderati erunt: magnitudine uerò,

Fluxionem omnium in pulmonem intemperiem est inæqualitas pulsus.

Pulmo frigida fluxione infestus tum quæ celeris respirationem.

Fluxiones cõueniunt pulmonem eadem cõmutatur species respirationis.

Thoracis intemperiem, tumoreque quæ in pulmonem alterationem inducant.

Ite in ore affectum quæ pulsus producat.

Ordemate nec thoracem, nec uel cor infestari uenam. Cor cõsentit uel citiori, uel calidè causæ uenæ.

Cor quæ celeris sensus septi transuersi.

Septi transuersi effectus, ut pulsus variatur.

Pleuritis enim cõuenientem quæ pulsus significat.

Diaphragma in inflammationem cor deliria sequuntur.

Ventrículo affectus quæ pulsus effectus.

Ore uentriculi nerui quæ.

Cerebrum aut uel nigrum inflammationem necesse fieri febris atque delirium sequuntur.

Cerebrum in febrem affectum quæ symptomata inducat. Vigilia uide.

Somnus profundus. Fatuitas.

Vigilam sopor.

uerò, celeritate, & crebriitate lactenus superabundat, quatenus prauus calor nanuū excederit. Si nō modò sit calidius, sed siccus præter naturā, statim utiq; etiam tenuis meninx, quæ regit cerebrum, in eandē affectiōē incidit, unaq; cum ea omnes nervi atq; arteriæ inde pulsū nascuntur duriorē, quod earū tunica & exscent & contendant. Quod si ex bilioso humoris affluctu cerebrum in affectū calidū & siccū deuenit, etiā magis tendunt arteriæ: si uerò ex calidi ac ueluti 10 seruitis sanguinis, siccitas minor & maior tenetio cū ipsas meningas corripit, tum nervos atq; etiā arterias. Si igitur arteriæ corpus cum siccitate uideat durum, alterutrū est existimandū obfiderē ipsum cerebrū, uel intemperiem calidam & siccam, uel copiam bilis: inflammationē autē, si cum tensione. At si cum ambabus dispositionibus, affectū puta cōstātum esse ex sanguineo & bilioso humore. Ac delirant sanē omnes in hunc modū affectū: modicē tamē qui sola interperie laborant, habentq; n̄ infirmas omnes voluntarias actiōnes. Qui uerò à bilioso humore affligunt, nō eas libet infirmas, sed delirāt impēius. Qui ex 20 atra bile feruescere ob putredinē id panuū, facili mente alienant: quorū pulsus etiā sunt duri, siccitatis atq; tensionis ratione: simulq; parui ob duritiē, & iusto celeriores, quia febrili: nec nō crebri, quod usui nō fiat satis. Humidū intemperantia: cerebri, molles tēpore efficiūt pulsus, somnolentumq; hominē. Si ad illas febrilis calor 30 accesserit, morbus appellat lethargus, pulsusq; specē referet arteriæ cōrentæ, quanq; illa sit mollis. At magni pulsus in morbis hūc omnib; habētus erūt, quatenus auctus sit calor. Celeritas aut omnino minima est, aut liss nihil profuse intendit: crebritasq; similiter. Si uerò ex bile simul & pituita ipse affectus sit mistus, nec profusius uigilant, nec alio fopore tenent, sed somnolenti desipiunt, genatq; attollere nequeūt: quare pulsus eorū etiā sunt miscellanei. Si morbofa frigiditas 40 circa materiam in cerebro oriat, cui cor cōstentat, *minores, tardiores, atq; rariore æquo pulsus ad densū, idq; absq; ulla tensione. Sin autē cum ea interperie materia etiā melancholica affluerit, aut crassa & glutinosa pituita, fiet ut arteriæ tendantur, ac proinde pulsus durior uideat. Si humida & statulenta pituita comitata sit intemperiem, siue tensione molliter pulsabit arteria. Si mista fuerit pituita, simul mollis erit, & nōnihil interus pulsus. Neq; autē obcurū est, quin si pulsus sit mollior, erit etiā maior q; antea. Subtilis meninx quæ *distinguit cerebrū, absq; illo perpe 50 ti dictōrū quicq; nō potest, neq; etiā absq; meningē cerebrū: sed statim sibi affectū ultro citroq; cōmunicant. At dura meninx, quia longissimē à cerebri distata est, affecta esse sola potest. Cuius affectus si insignis sit, ut cor ad cōsensum atq; arterias sollicit, pulsus, quemadmodū in affectibus cerebri, alterabunt. Calidi itaq; affectus illius usum augent: frigidi cū hūc remittūt, tum arterias sensim indurāt, præcipuē eas quæ corde sunt altiores. Sicut intentū & durū pulsū efficiūt, si uidi mollē: ita tēnē nō ita mollē & durū, ut cerebrū, sed duriorē & minus mollem. Siquidem corpora sua spōte dura, si in affectus indurātes

inciderint, maximā cōtrahent duritiē. Quæ autē natura sunt mollia, si in aumeclantes & solutes incurrit, semel remittunt atq; mollescūt. Sin dura arripiant affectibus humectantibus, aut mollia indurantibus, nequaquā assequuntur extrēmū sibi cōtrarij status. Porro qui cerebri & pulmonis grata molles sunt pulsus, ita sunt molles, ut nullus alius. His præ ceteris uicinior est ille, qui ex iecinore & hene oritur ædemate affectus. Nam scirrhus etiā licet uiscera obfusa, pulsus satis duros efficiūt: minus, si sint inflāmata, q; si laboret scirrhus. Cerebrū atq; pulmo, fortassis ne scirrhus quidē admiserint: duris enim corporib; & ipsi 10 sic hic affectus, non rari & molliibus familiaris existit. Igitur affectus supra omnē modū frigidi, pulsus duros efficiūt, alioquin nequaquā. Ad licet arteriæ uiciniores affectui, promptius in mollitudinem atq; duritiē transiant. Quæ uerò longius distite sunt, aut si cor interpositū addit, minus. Quod si teneas, non est quod dubites in ceteris morbis faciei, colli, & artuum, quales pulsus gignantur. Nam pars affecta si sit ipsa atq; dura, pulsus efficiūt duros, siue inflāmata, siue scirrhus affecta, siue supra modum refrigerata ipsas arterias sollicit. Si sit carnosior, eiq; uel inflāmata sit, uel scirrhus induratus, duros quidem, sed minus 20 suspensiorib; sin ordina labuerit, molles. Cōsentient autē artenciosus celeritas uicinor omnes arteriæ, & cor uenosis secundū has: tardissime autem nervosis. Iam uerò cū insigni lien scirrhus esset affectus, frequenter cōspeximus nō consecutam aquā inter cutē, quæ indurato iecinori nec cessarij uidebat, sirig; tum pulsus peditus signis utriusq; affectus, existens partim mollis, partim durus & tensus. Oritur porro hydrops ob litemorrhoidā mētiūq; immo dici uacuationē, aut suppressionē insolūtā. Testes, est *extra inguina sit, statim tamē febris propter usum uicinariū accendūt. Etenim supēne à renū regionibus ue 30 na & arteria descendūt per peritonai foramina ad testes, uasā fāsā magnitudine insigni. Præterea ipsa erythroides tunica adnata peritonæo est: ob idq; si sit inflāmata, pulsū efficiūt durū, ac proinde minorē. A testibus inflāmatis nō perinde durus oritur, sed magnus tamen, febris ratione. Quæ est partes arteriosæ & uenosæ sunt, maiores pulsus excitant: quæ nervosæ, aut omnino nihil, aut paruos: at teranos & spasmos generāt.

Ac præsentū quidē cognitio nihil est aliud, q; affectū inuēto. Cognito autē præteritorū est inuenio causā, quæ induxerit affectus. At ex præsentibus præcāgā *futurorū sum unū. Vnum igitur ac primū quod præcognoscere cupimus, est, quālē eorū habiturus sit morbus. Secundū, quod tempore iudicabit ad salutē aut mortē. Tertium, quinam modus erit aut salutis, aut mortis. Quæ omnia ex *dispositionib; n̄s præcāgant, ex quib; morbi genus, & facultatis imbecillitas, uel robur, dignoscit. Morbus porro cognoscit 60 ex loco affectio, eiusq; *dispositione. Facultas ex cōmodo temperamēto, uel inuētemperie corporū solidorū. Nam si imbecillitates quædā ob spiritū accidit animalē, breues sunt illæ, & symptomati ratione cōsequunt. Ergo si facultas uigor morbi sit sustinendo, homo necessarij seruabitur: si

Pulsus mollesci-
mos esse, qui ex
affectu cerebri
& pulmonis or-
iuntur.

Scirrhus duris
tanti corporib;
facilius exis-
tit.

Pertus spissus &
durus, quod da-
tus efficitur.

Aquam inter in-
tem necessarij
succedere iudica-
re uicinor.

Hydrops causa.

Testes inflāmata
cur statim febris
de accendunt.

Cognoscere qua-
ritur aptum.

Non rari modo
et, nec rari.
Sunt autem rari
et, nec rari.
Sunt autem rari
et, nec rari.

quidem nihil * delictū fuerit extrinsecus. Sin autem facultas fit impar, morbi est necesse. Iam uerō qui sunt exsursi, eo liberabuntur tempore, quo natura morbi superauerit * abolutissimē. Qui autē sunt morituri, tunc peribunt sanē, cum facultas adeo uincat a morbo, ut functio aliqua necessariarū ad uitam penitus extinguatur. At ratio tum salutis, tum morbi, indidem etiā præscitur. Porro functiones requirit ad uitam, ubi extinguunt, hæc quidem suffocant, hæc uitalem facultatē proferunt: alie simul & hanc proferunt & suffocant. Quæ igitur facultatē uitalem suffocant, à thoracis, pulmonis, asperæ arteriæ, gutturis, faucium procedunt * dispositionib. nōnullæ etiam in ipso corde cōsistunt. Quæ facultatē proferunt, ab ionicis dispositionibus (quas sequit̃ syncope) hepaticis diuturnis, ob quas * ciborū usu nō promouentur, præterea ex longis doloribus, uel uehementibus, ad hæc ex omnibus heclicis febribus, ac breuiter cordis ingenti intemperie oritur, deiciūt illam. Similiter animalis facultatis imbecillitates quide comitantur maximas interperantes cerebri: quæ uerō uelati suffocant omnes sunt, tum repletiones uentriculorū illius, obstructionesq; meatuū illud ducentiū. Proinde cui status facultatis ad unguē perspectus sit, locusq; affectus, ac illius dispositio, luc ad futura prænoscentia peritissimus erit. Cognoscitur autē ipsa facultas & ex actionibus, & ex intemperie agentū. At uerō ubi omnes pulsus per se languidi sunt, facultas uitalis est imbecilla: id quod accidet per uniuersum corpus, si ipsum cordis corpus intemperatū fuerit: in una parte, si sola illa pars. Vbi uerō earundem arteria tum nūc languidus pulsus sit, nūc uehemens, facultas nō est per se quidē imbecilla, sed abundantia humorū degraui: quæ inæqualitas ob eandem occasionē fit & in cæteris differentiis pulsuum. Cæterū si pulsus uehementes & magni, tum uero cōtrarios uincant, minus facultas à copia ipsa ostenditur. Sin paru & languidi, magis. Præterea inæquales in uno ictu, si fines moruū ualidiores & celeriores efficiant, nūciant facultatē robustiorē cæteris, quæ languidiores & tardiores effecerint. Si uerō in tali constitutione altus pulsus uideat̃, statim est magnus erit, ostēdetq; naturam plenitudine superiorē. At languidus pulsus nunq̃ altus existit. Verū magis & minus uehementens, quod altior simul & uehementior euaserit, robur facultatis, motumq; minimē impedit declarat. Omnes igitur huiusmodi pulsus iudicium morbi cum excretionē futurū indicant. Quare cōtractionis motus uti spectandus: ea si quidem semper abijt priorē illam celeritatem, idē nunc magis, nisi minus. Melior autē iudicatio expectari solet, contractionis celeritate plus exoluta. Quod si etiā signa cōtractionis accesserint, optimā indicationē hic status promittit. At pulsus magnus & uehēmē, si nō præcedat eum inæqualitas, nō semper excretionē portendit. Altitas autem semper quidē, sed si inæqualitas nō præcesserit, modicas excretionēs prænuñciat: copiosas, cum multas sequatur inæqualitates, quæ declarent facultatem copiam onerari. Non est autem eadem facultas uitalis & nutritia, natura-

lisue. Illius liquidū hoc unū opus est, generatio pulsus. Naturalis, id quod familiare est ad nutritionē, allacere, & quod est alienū, excernere: præterea retinere, alterareq; familiare alimentū. Hæc quippe ad nutrienda corpora desiderantur, sicuti ad naturi caloris mediocritatē tuendā, distinctio & cōtractio cordis & arteriarū. Quam facultatem neq; in stirpibus inuenias, neq; in animalibus frigidis: cuius generis sunt ostra, & quæ per tris, uel alia solidis corporibus adnascunt. Animalia calida, maximē sanguine prædita, aperitissimam hanc facultatem & uehementissimā obtinent. Hæc in cōtractionibus pulsū tantū erit excrementū fuliginosum, quod obesse potest calor is mediocritati: in distentionibus item, quod se refriget et, alluat. Altera facultas nutritia, cōueniens attrahit alimentū, excernitq; incoomodum. Distincta igitur facultatū principia sunt, ipse tamen mutuo in singulis instrumentis inter se cōfunduntur. Nam arteriæ, quatenus nutriunt, facultate nutritoria gubernantur: cuius excernere alimentis excrementa est munus: * quemadmodum alterius uitalis, fuliginosa excrementa expellere. Quæ cum abundant, maximam simul & celerissimam contractionē ipse arteriæ moliantur. Vbi uerō nulla hæc excrementa fuerint, humores autem, qui putrescebant antē, sint afflicti coctionem, ab altera naturali ui concoctōem excrementa expellunt. Quæ facultas sanē nō per solas arterias & uenas dispergit, sed per omnia animantis membra, perq; carnem, neruos, ligamenta & ossa, disseminat. Hæc igitur est illa facultas, quæ iudicationes efficit: cuius quatenus arteriæ participes sunt, nutrimentū excrementū expellunt. Altera facultate pulsatrice, quam solē ipse obtinent, in contractionibus recementū fuliginosum explodunt: distinctiōnibus autem refrigeriū allaciunt. At usus nō perpetuū par utriusq; est actionis, sed præpollentis usus ex: ellit nonnuq̃. Itaq; ex se etiā pulsū figurat, si quidem ei facultas respondeat. At uerō si fumidum excrementū præpollat, contrahitur plurimū: distenditur autem non plurimum cor cum arteriis, sed lætēntia duntaxat, ut satis refrigerari ab extrema cōtractione suppetat tis. Sin autē paucus fuerit fumosus calor, copiosissimus autē mundus & purus & quasi flammæus, in plurimū distenduntur: at contrahuntur eatenus, quatenus satis fiat altit uui. Quare semper æqua magnitudine distinctio fit & contractio, nisi casu nobis admoventibus dignis, fiat repentina mutatio. Vnde altus pulsus excretionē significat, cōcoctus qui inducunt febres humoribus superuenientis. Semper enim omnis excretio, naturæ lege perfectā, sequit̃ concoctionē: quippe secundum uentrem cōspicitur natura excrementū à cōcoctione excernere. Cæteræ excretiones q; cōbi concoctionem præcedunt, nunc quod uellicet ab illis quæ cōtinet, nunc quod degrauiet, ante tempus cōcoctio nis moliri cogitur. Haud aliter totius corporis facultas, posteaq; sanis familiarē succum singularum partium cōcoxerit, tum demū excrementum excernit, nisi qd eam irritet importunū. Copia excrementon, tum ex plethorici signis quæ præcesserunt, tum ex præciti calor is inflammatione

Facultatē uitalis opor.
Facultatē naturæ opera.

Facultatē uitalis quibus uergeta, & quibus uoluntati daturis animalibus.

Cōtractione arteriarum excrementa fuliginosa. Distentione arteriarum attractio fibrarum.

Facultatē principia distincta esse, ipsas autem misceri in singulis instrumentis.

Expulsiōnem facultatē esse, quæ erit fuit.

Altus pulsus qui de excremento significat. Excretio naturalis semper sequitur concoctionem.

Excrementorū copia uide deprehendatur.

Functio tum requiritur ad uitam, tum diffinitio.

Prænoscentia futura que fit peritissimus medicus. Facultas uide noscitur. Pulsus languet quando per uia uerum corpus. Quando in uia ea parte accidit.

Crisis morbi cum excretionibus, quæ pulsus indicant.

Excretiones ipsi
ma qua.

tionem praeosciat, ob quæ ipsum calorem pulsus ma-
gni uidentur, & alii. Quare pessimæ omnium sunt
excretiones, in quibus pulsus est minime magnus:
at celer in contractione. Porro autem si eni se
introd recipiat, sumidi excreti affluens in pri-
mis est nuncius, simulq morbi crudi. Si præterea
fit pulsus languidus, syncope periculum immi-
net. Si uero piruliosior sit morbus, cum ab in-
qualibus pulsibus mutatio fiat in plures uche-
mentes & magnos, iudicatio fiet per abscessum.

GALENI PERGAMENI de diebus decretorijs lib. I.

Solutio mor-
buri fixa, qua
adisse debent.



Resoluit morbi
quando iudica

Vò solutiones morborum qui non
paulatim, sed subito finierunt, certas
esse cognoscimus, aliqua excretio
copiosa, uel insignis abscessus* defi-
deratur. Nam qui morbi citra hęc fi-
niuntur, in ipsa recidua timenda est. Quare tunc
ægrum modis omnibus obseruare oportet, ne que
omino sanis uel in cibo, uel in potu, uel balneis,
uel mona, uel deniq in alijs quibuslibet concedi
mus, agere ipsum permittamus. Si namq cõque
scens morbus exiguus fuerit, forsan ob tam ex-
actam uictus rationem prorsus subsederit, ut po-
stea nunq reuertatur. At si malignior existat, eni
tunc, cum hoc uictus modo usus fueris, redibit,
sed tamen non cum summo discrimine. Si uero
sanq planè solutus neglexeris, euadet multo gra-
uior quam antea. Firmè itaq solutione uehemen-
tis morbi, oportet solutoria signa præcedat. Præ-
cedunt autem ipsas ceticas excretiones absces-
sus, grauius quædam symptomata, ac uò medio
cris in ægri corpore perturbatio: aded ut nihil il-
le ab ipsis distare uideat, qui in foro de capite iudi-
cantur. Quam sanè turbatio nē subito, nos ap-
pellamus crisin: tamq finire interdum quidem
ad salutē, interdum autē ad exitiū, affirmamus.

Criticis excre-
tionibus grauius præ-
cedunt sympto-
mata, ægri: ma-
xima perturba-
tio.
Crisis quid.

Crisis accide-
re quando debet.

At uero ipse crisis fingit diebus accidit, sed
neg pares numero, neq ex æquali fide. Hoc in-
tercedit etiā discriminis inter illas, quod alie sa-
lubres, alie perniciose accedant. Quædam enim
cum pluribus & difficilioribus symptomatibus,
& maiori certamine, nonnullæ itam ab initio ru-
pissimè eueniunt. Quin et in hoc plurimū dis-
sunt, quod hæc deficientes, illæ perfectæ sunt nec
minus, quod alie certis statim diebus iudicæ
prius, sicut alie repente, & ex improviso eueniūt.

Iudiciorum tot
differentia quot
dierum decreto-
riorum recessus

Septimam diem
esse optimam de-
cretorum.
Septimam diē esse
decretorum pos-
simum.

Iudiciorum
differentia tot
quot.

Tor autē iudiciorū, quot dierum decretoriōrū,
differentiæ existunt. Cæterū in duodecimo & de-
cimo sexto, nullum unq iudicium uidi. In septi-
mo, ne uel numerare omnes adhuc possum. In
sexto iudicatur, sed cum difficilibus symptomati-
bus, & periculo nō mediocri: ad hæc, absq fide,
imperfectè, obfcurè, sine notis, & ad pernecium.
Etenim multi morbi iudicantur septimo die abso-
lutè pariter & securè, apertèq, & cum signis salu-
tribus: duodecimo autē raro adeo, ut nobis nō-
dam sint uisi. Porro imperfectè iudicationē uo-
camus, ubi ex morbo quæpiam relinquatur: infir-
mam siue incertam, quæ morbi sequitur recidua:
periculofam, cum quæ grauius symptomata
accidit: obfcuram, quæ citra excretionē, uel eui-
dentem abscessum euenit, sine signis euenire di-
citur, quæ à nullo priore die indicata est: mala,

quod in ægri pernecium omnino definat. Rur-
sus absolutam eam dico, quæ ex morbo nihil fa-
cit reliqui: fidam, firmā, securam, certam, quæ re-
dit nunq: tutam, quæ siue periculosis symptoma-
tis accidit: manifestam, cui excretio quædam, aut
abscessus insignis atq cõpicius adest. cum bo-
nis accidit signis, quæ ab* indice die præmonstra-
ta iam fuerit. bona deniq est illa, quæ in sanitate
desinit. Cæterū nō fat es, raro uidisse diem al-
tium iudicantem morbos, ut in decretorijs dica-
tur, sed oportet in illo crebrè iudicia fieri: præterea
ut crisis sit bona, perfectā, securā, manifestā,
tuta, necnō præmonstrata. Quis igitur uel septi-
mum, uel undecimū, uel decimum quartū, uel al-
ios quosdam eis similes, nō dixerit decretorijs
nemo, opinor, cum omnes notæ iudicationū in
illis ad sint. Est enim decretorijs dierū natura
quædam propria & eximia. Quare cognio ipso-
rum, ad curationes morborū uò leue momentū
adest: ne uidelicet hæc timeamus, qui fides die-
bus sunt iudicari: aut tenuem uictum eis in iun-
gamus: nēue per hæc iudicatos diebus, parū ac-
curatè obseruemus. Primū igitur omnium dierum
decretoriōrū septimū dicimus, idq nō numero,
aut ordine, sed dignitate & potentia: omnes
quippe decretoriōrū notas sortitur. Nam pluri-
mos iudicat, & absolutè item cum manifesta ex-
cretionē, uel abscessu, & sine periculo uehemen-
ti: estq ut plurimū quartus inter illius. Nam si
urinx, uel puri, uel deiectionis, uel appetentia,
uel cogitationis, uel sensus mutatio manifesta
in quarto die cõtingit, rationi consonū est, ut si-
milis iudicatio cõsequatur illam in septimo: bona
uidelicet, si ad salutem: mala, si ad mortē mu-
tatio illa aprauerit. Plurimū itaq bona iudicia
eueniunt in septimo: quanq nōnulli etiam in eo
moriuntur, alij euidenti conuersione ad peiora
urgentes, in sequenti quodam decretorio inte-
reant. Sexum uero diem, quid præciuos in eo
iudicantur, quā in septimo, tantū cum mai-
oriorem inuenio, ut qui ferè ex aduerso natura
septimo oppositus sit. Quinetiam qui in quarto
ad peiorè statū recidunt, pleriq sexto moriunt.

E cõtrario rursus si bona conuersione cõtingat, sep-
timū expectabit. Quod si raro interim ad me-
liora conuersione in quarto die factā excipiens
sextus, eam iudicauerit, dici nō potest quanta eā
perturbatione, periculo, & metu id fiat, quasi æ-
ger statim adeo fato sit functurus. Nam si quæ
excretio accidat, omnino conuertantur, pulsus ip-
sorum cõcidunt, color abit, remittunt & collabuntur.
At septimus dies, pro excretionis portione
efficit semper ipsos magis ac recreat. Præterea
sexto die maligna, acris, fœtidai* maiori ex par-
te rum deiciūt, rum uomunt: raro autē sudores
æquales, toto manifest corpore, calidit uisunt:
quales si quando oboriantur, *intercipiuntur. Inter-
dū parotides malignæ, uel acruatus morbus,
uel alius quidam abscessus, alterū certamen, quod
discutatur requirit, emergit. Sed neq in urinis
boni quicq inueniunt. Etenim nud, decolores,
tenuis, boni nihil, quod subsideat, habentes, sed
copia tantū condens, in die sexto uisunt. Atq
hæc moderatissima leuissimāq sunt, quæ illo
die incolumi futuro cõtingunt. Nam plurimos

Decretory dies
qui existant.

Decretorijs
dierum cognio
ad conuersionem
morborum nō le-
ue momentū ad-
fert.
Septimū diem
est inter decreto-
rios præcipuum.

Septimi quar-
tus est index.

Stratus dicit quid
si inueniatur sit
signum.

Stratus dicit quid
si inueniatur sit
signum.

alios syncope itatim corripuit, uel sanguinis larga effusione, aut evacuatione immodica exanimavit, uel incatocho aut infanti perduxit alia denique permixtione infanabili conciliavit. Multi sanè frequenter in mente uenit septimi diei naturam regi cupiam alimulare, sexti uero tyranno. Ille siquidè longe clementior, ceu benignus aliquis princeps, his quos iudicat, uel supplicij partē adiicit, uel illustrat uictoria: hicē contrariō, uel perniciē illius, quem iudicandū suscepit, gaudet, uel salute doler, quare uix anniū expleat, & malè argum, qui in ipsum incidit, tractet, & longa punitioe exerceat. Est itaq; sextus dies decretorius quidē, sed melius: quemadmodū septimus, bonus. Ceterū sexti dies uel septimi quartus enī est index. At uerō naturā septimi, maximè imitatur decimus, quartus. Proximi his sunt nonus, uel decimus & uigessimus: prope hos uerō septimus, decimus & quintus: post hos quatuor: hunc sequuntur tertius & decimus, octauus. Sexti autem naturā nullus exactè aliorū dierū imitatur. Si aliquando in octauū diem, uel decimū, subita morbi solutio incidat, similis ferē ē est, quæ sexto accidat. Verū rarō in his solutio, nec cum fide, nec bene, nec perfectè, sed obscure simul & citra notat: quare alterius esse naturæ cum supradictis apparēt. Quemadmodū autē in his subitō morbus non soluitur, ita neq; in duodecimo, sextodecimo & nonodecimo. Medius autē inter eos qui subitō morbi non soluitur, & eos qui subitam indicationē faciūt, uidetū multi esse decimū tertius. Atq; huiusmodi quedam distictō dierū, ad uigessimū usq; differentia est. Ceterū cum exactum morbi principij statuere semper sit laboriosum: morbis itē, in quibus obscura principia sunt, omissis, decretorios dies in manifestissimis exploramus: iūniū morbi tempus illud in uniuersum existimantes, cūm aegri manifestē incipientes febrē decubuerint: id qd cernatis, & exercitatis, & lotis, facillimē subitog; plerūq; cōtingit. In quē sanè modum Hippocrates indicationē ipsas, a primo die quo febricitauit homo, nō ab illo quo doluit capite, uel eiusmodi aliud quippiā est passus, accuratè explorauit: q; in principis huiusmodi experientia dierū decretorios sit medicū sita. Porro quemadmodū undecimus quartidecimus est index, ita septimi quartus. Si igit uel quartus uel undecimo factō indice, crisis quolibet modo attingerit uel septimū, uel decimū quartū, illorum ipsam crisi esse, ac beatari est opus. At si iudicium extra illos dies cadat, ut neq; in illis incipiat neq; cōpleatur, constat nō adhuc esse dicendum, morbi in septimo aut decimo-quarto iudicatum fuisse: uerū in alio quopiam die, qui totū crīsem in se comprehendat. Quod si nullo indici prius habito, crisis cōtingat subitō, duos artendū dies, utriusq; sit distinctus, proportionē a ccessionē, natura dierū, numero decretorios temporū, ac tempore iudicij exploratis. Sic autē explorat accessionis proportio. Nam si aeger diebus imparibus laborauerit magis, die imparis erit magis propriū iudiciū: quemadmodū paris, si paribus: quidodoquidē in acceptionibus iudicia maiori ex parte cōtingit. Dierū autē natura obseruari hoc pacto: Si ambigat uerū noni dies, uel

decimi sit iudiciū, si quidem salubre, perfectum, atq; sine periculo sit, noni est magis: si imperfectum, malū aut periculosum, decimi. Quod uerō ad numerū decretorios temporū pertinet (sunt enim tria: nēpe decretoria: accessionis initium, decretoria monitionis principij, ac deniq; ipse iudicij finis) qui dies finis tempora duo uendicauerit, magis sibi iudiciū affumit. Sic & ipsum tempus iudicij, utra die longius fuerit, illi magis iudiciū attribui debet. Si itaq; quatuor hæ notæ uno die introducant, huius quoq; iudiciū attribuet. At si una ex his relinquat, et aliteris similiter, sic tamen ut iam alterū etiam diem existimes ipsius crisis esse participem. Si uerō æquales sint notæ, iudiciū utriq; diei putabis esse cōmune. In terim non duos modō, sed tres etiam dies iudiciū attingit. Ac tūc sanè, quauis ad temporis longitudine aritet, medius est præferendus: nō tamē uniuersum est iudiciū tribuendū. At uerō si princeps ac subita in ægrotantis corpore perturbatio, morbi solutioē præcedēs, crisis fit appellanda, utq; nec primū, nec secundum diem, decretorios esse censebimus. Sin autē solutio simpliciter appellanda est crisis, hi quoq; erunt decretorij. Quare omnes febres diari solutioē partim primo itatim die, partim secūdo nascuntur. Ad hęc perturbatio illa, quæ fit ante exactam solutionē morbi, ab soluto sermone dici crisis meretur: alia rum autē nulla a soluto: uerū quæ ad perniciem tendit, mala crisis: quæ autē insignē quidem mortū attulit, morbi uerō exactē nō soluit, deiciens crisis dicatur. Alia quæ insigniter ad peiora declinat, imperfecta simul & mala. In uniuersum autē, quæ omnīū crīsum notas sortitur, crisis a soluto uocat: aliæ autē, cum oppositione non minus appellabunt. Quod pertinet ad decretorios dies pot uigessimū, quidē uigesimo uigē simū primū posito, licet cum illi præposuerit Archigenes. Similiter uigessimū septimū uigesimo octauo antepono. Habet præterea & trigessimus quartus uim neutiq; negligendam: atq; hoc maiorē & quadragesimus. His minus decernit uigessimus quartus & uigessimus primus, & multo adhuc minus trigessimus septimus: ita ut in dierū decernennā, & eorū qui non decernunt, medio collocatus esse uideat, magisq; ex nō decernentibus esse. Reliqua multirudo dierum inter uigessimū & quadragesimū, prorsus facultatis decernendi est experta. Si sunt duo decim numero: nempe uigessimus secundus, uigessimus tertius, uigessimus quintus, uigessimus sextus, uigessimus nonus, trigessimus, trigessimus octidus, trigessimus tertius trigessimus quintus, trigessimus sextus, trigessimus octidus, ac trigessimus nonus. Atq; usq; ad quarundecim quidē, magnæ sunt perturbationes in morbis: proximo loco succedūt, quæ usq; ad uigessimū habent: quæ post hunc ad quadragesimū pergūt, paulatim uelocitatis remittūt. Dies autē omnes post quadragesimū, prorsus languet, cōcoctioe potius morbos & abscissibus, q̄ crīsis, terminant. Accidit in his quoq; per executiones indicia interdum, sed rarō, nec magnā habentia efficacā. Et frequenter iudicia ipsa pluribus dieb. cōpleantur, maximè cūm in abscissum delinierit. Ac ceteros quidē post quadragesimū

Decretoria temporis tris.

Iudicia quæ in accipis sunt, quibus dierum finis tribuenda.

Crisis quid.

Dies primus atq; secundus appellati erunt quomodo possint. Epithema quod dicitur solutio.

Dies ordo post trigessimum.

Dies facultate decernendi omnes expertes qui sunt.

Dies omnes post quadragesimū cōcoctioe potius morbos & abscissibus, quæ crīsis, terminant.

Septimus dies af simulatur regi. Sextus dies tyrannus finit.

Quartus dies si septimū sit finit omni dī index.

Septimum qui dicitur imitatur, sextum deum qui referant.

Dies qui subitō morbi non soluitur.

Principium morbi incertum, laboriosum exploratum morbi quod sit.

Vigessimus quartus decimus est index. Quartus septimus uel undecimus.

Accessionis proportio quemodo exploranda sit. Index maior ex parte in acceptionibus finit.

20

30

40

50

60

dica

dien, cōtemnere uidet Hippocrates: sexagesimi tamē, octogēsimū, centēsimū rationē habet. At ipsi alios quidem septē mēlibus, alios septē annis finiri ait, alios uerō in binis annorū hebdomadiis, uel in ternis. Vbi igitur morbus acutus nullum signū periculolum portendat, & quarto die euidens quædā cōcōtionis nota apparuerit, septimo crisi futura est. Quare signa periculosa fatalitatis in primis sunt cognoscēda, una cum cōcōtionis indicia, ut hæc præfigere ualeamus. Porro si periculosa symptomata quarto die adfint, una cum nota cōcōtionis, iudicij, si parib. diebus accessio fiat, sexto expectandū est: q. si hunc exceſſerit, octauo: si imparib. dielibus, septimo. Bonis signis apparentib., septimo die discunt et morbus: at letalia signa, cum cōcōtionis notis coibunt nunq̃. Hæc autē nō minus q̃ periculosa & salutaria inspicunda sunt: quia si quarto apparuerint, septimo a dent mora: quæ crisis est mala.

Septimo quidē crisi futura sit.

Letalia signa cito nunquam cum cunctis bonis signis.

Letalia signa cito consideranda.

Diuisi pariter importantur: ex pendere oportet.

Quæritur natura: ut ostendat sepius.

Brachibus circa ægrum cōmissis, uentibus decretorij dies obſeruari.

nec medicus quid peccauerit, nec æger, nec ministro rum quicquam, ad huc etiam nec extrinsecus error admissus sit, necessarius morbus die septimo iudicabitur. Cū autem omnis circa uictus rationem error, iudicium ipsius impedit, nec uictus ratio proba sine præcognitione uigoris & crisi morbi unquam inibitus possit, utique non alius quicquam medicus recte curauerit, alius præſagiet exacte: sed quicquid præſentissimus fuerit, in simul præſagiet & medebitur. Porro si levis error quatuor die et una cum bonis indicij contigerit, eueniet sanē etiam die septimo crisi, non tamen exacte inculpabilis: si magnus, ut a septimo in sequenti aliquem differatur, magnitudo ipsius noxæ uel dicat, an uo uel undecimo die, morbus sit iudicandus. Itaq̃ morbi qui omnino sine periculo sunt, diuturni esse ob delicta solent: qui incolmitem promittunt, nō tamen uacant periculosa symptomata, ob errata letales sunt. Imo uerō qui minime exiſtunt periculosi, multis magnisq̃ deinceps cōmissis erroribus, in letalium naturam * degenerant: id quod mirum esse non debet. Nam si in recte ualentibus delicta grauius, morborum letalium sunt causæ, quid in ægrotis est expectandum? At uerō si in letali morbo dies quartus signum letale habuerit, septimo die mala expectanda est crisis. Ceterū si peccatum aliquod nō ita exiguum interea temporis accidit, septimum diem crisis nō expectabit: sed si accessiones quidem ipsæ sunt dielibus imparibus, morbus autē sit peracutus, & peccata non admodum leuia in ipso quarto contigerint, miraculū nō est in quinto hominē intrare. Sin autem accessiones hiant paribus diebus, nec morbus sit peracutus, nec magna lesio errororū, sextum diem expectabit. Vbi uerō diem mortis cognoueris, considerandum est inde, in qua potissimum cuiusq̃ accessionis parte æger grauetur maxime, grauiorally adſint symptomata. Quippe non ignorandum est, in pessimo accessionis tempore hominē moriturum. Ac proinde non magni negotij fuerit, uni diem, sic etiam crisi horam prædicere. * Si igitur secundus dies (exempli gratia) & quartus, longē uellementi oris accessionē, quā primus, tertius & quintus, afferant, ad sextū diem mors prædicenda est. Quod si etiam cuiusq̃ accessionis pars (gratia exempli) sit circa sextam horam grauiſſima, non fuerit difficile præſagire, in die iudicationis, illa eadem hora hominem moriturum. Nam tametsi speculatione hac interdum falli possumus, maiori tamen ex parte hoc uerū esse deprehendemus. Ceterū in omni principio nō licet futura cognoscere, nisi quis morbi speciem admaximū perspicillā habeat. Porro si qua primo die acuta febre inſeſcit, nullū autē ei adſit signū periculolum, sed in urinis aliqua cōcōtionis nota apparuerit, intra quartū diem soluetur morbus. Si uerō multa letalia signa primo statim die deprehendant, æger intra quartū morietur. At si acutē febricitet, nullum uerō adſit signū letale, sed nec aliqua cōcōtionis nota, sien nō potest, ut hic quartanus decedat. Quod si nec cōcōtionis, nec lōgitudinis morbi indicia adſuerint, in secundo quaterione morbus statū accipiet.

Vilius ratio pro ba sine præcognitione uigoris & crisi morbi, non quā inſuſa potest.

Morbi faciles ob delicta prodicuntur, atq̃ morbo letales sunt.

Moriturus homines in pessimo totius accessionis tempore. Horam crisi posse etiā prædicere.

Si longitudinis indicia adfint, secundum quater-
nionem excedet, hoc est, diē septimū: ex qua
dem præcognitione, qualis debeat esse nutriti-
di modus, perducet. Si quidem quod longus ab-
fuerit status morbi, ac morbus ipse clementior
fuerit, eo nutrities uberius. At morbi qui ad deci-
mum quartū omnino sunt crudi, tardiusq; mo-
uentur quodāmodo, nō finiuntur ante quadra-
gesimū diem. Quare signorū vires maximē co-
gnoscere oportet. Vi igitur quartus septimi, sic ut
decimus decemquartus est index. At uigesimali
et uigesimaliprimi, index est decimusseptimus: ma-
gis tamē uigesimali, ut decimus octauus⁸ solius ui-
gesimaliprimi. Cōsiderare autē in uniuersum opor-
tet, totius morbi mori, omniaq; indicia & sym-
ptomata, ut ritē crisi finem præfigere ualeamus.

GALENI PERGAMENI
de diebus decretorijs lib. II.

Quanta sit providentia naturæ, quāvis or-
do & ornatus in morionibus suis, anima-
lium generationis, ortus, & incrementū in-
dicant. Siquidem cuiusq; animantis conceptui,
suū tempus est statutu, natura scilicet ordinatos
semper motus seruante. Post partū etiā anima-
tia singula incrementum, perficiuntur atq; satisfi-
cūt, idq; præstant temporibus. Cæterū si recorderis
quantopere providentia & ordine superetur ca-
duca hæc atq; inferior natura, ab æthera illa &
celesti, utiq; huius nostræ substantiæ motus nō
ordinē, sed illius perturbationē tribueris: necnō
quicquid in ea pulchrū ordinatumq; est & artifi-
ciosum, omne id a superna illa natura omnino
emanare putabis: sicut inordinatū omne & er-
raticū, a nostra proficisci materia. Est autē na-
tura in nobis quædam res ordinata. Quæ quidē
ubi superat materij proportionibus quibuscūq;
certis, ordinatisq; periodicis, suas motiones perfic-
cit. At quæ aliquando præter rationē eueniunt,
ordinemq; cōfundunt, tunc ipsi obueniunt, cum
nō planē materiam uicerit, sed impeditur a ea,
prohibeturq; moveri proportionib. suis. Si igitur
celestes substantiæ, necnō quæ terrenis ani-
mantibus insunt, certa quā dā proportionē ma-
nifestē mouent, nemini sanē debet uideri mirū, si
decretoriū dies numerū ordinatum sortiantur.
Constat autē unamquamq; septimanā esse perfe-
ctum periodum. Quippe mediū ipsius ab utroq;
extremo æqualiter distat, ut idly a d ambo simi-
lem cōmunionem sortitur. Etenim quartus dies
morbos qui primo die nō cessarūt, soluit: unde-
cimus rursus, q̄a septimus nō disculuit. Quod si
morbus maior sit, q̄ ut iudicari quarto de-
possit, solutio quidem ipsius in eodem⁹ præparabitur,
suis autem septimo die a dicitur. Pari mo-
do qui septimo nō deferunt, eos natura soluere
undecimo die molitur: quare aut in ipso eos iu-
dicat, aut decimo quarto disponit. Verū septima-
tiæ præcipuis sibi uendicant vires, dein quater-
niones. Nec negligere tamen oportet dies inter-
calares, tertium pura, quintum, sextum & nonū.
Porro si in uigesimali diem tertiumq; septimanę finitur
(ut Hippocrates arbitrat) oportet haud du-
biē decimusseptimū diem esse uigesimali indicē:
excidere autem ē primo diem decretoriū or-

dine, decimus octauū & uigesimalumprimū. At si
integre hebdomades cum numerandis sint, deci-
mus octauus uigesimaliprimi erit index: rationem
uero nullam decretoriam habebunt, decimussepti-
mus & uigesimalus dies. Cum autem nō solū
iudicari morbos decimo septimo die, sed firmi-
ter iudicari & absq; recidui timore, proficitur
Hippocrates, sane inter ualidos & primos decre-
torios debet annumerari. Quare si cōstituerimus
decimum quartū diem ut finem secundæ, sic ini-
tium tertie septimanę exsistere (quod Hippocra-
tis doctrinæ est consentiens) utiq; decimussepti-
mus primi quaternionis in tertie septimana erit
finis, atq; index uigesimali, tertiam hebdomada
terminans. Quippe uigesimo die plures abso-
lutē fuisse factas morborū indicationes, experiē-
tia didicit etiam Hippocrates: id quod naturam
decimusseptimi satis abundē cōprobat. Quinetiā
in permixtis alijs diebus, qui ex ordine decimi-
septimi sunt post uigesimalum, fuisse morbos inte-
grē ac feliciter iudicatos meminisse: ut in uigesi-
mo quarto, uigesimo septimo, trigesimo quarto,
quadragesimo & octogesimo: in nullo autē eo-
rum, qui a decimo octauo procedunt, facta sup-
putatione per septimanas integras, tale quid cō-
tingisse prodidit: excepto uigesimo primo, in quo
aliquando morbi facta sunt crisi. Constat itaq;
decimusseptimi ordinem altero longe fortiore
exsistere: ipsūq; decimusseptimū decimo octa-
uo, & uigesimalū uigesimo primo, quod pertinet
ad iudicandū uim, multis numeris antecedere.
Porro quanto ulterius morbi proferantur, diu-
tiusq; euaserint, perturbatio quæ præcipi-
tē immutationem præcedit, tantō magis con-
quiescat: iudicij ipsa tunc paulatim ueniunt,
duos aut tres dies in totum occupant. Unde me-
dicorum nōnulli diuturnos morbos minimē iu-
dicari pronunciant. Quāq; certē nihil aliud esse
iudicij, q̄ solutionē morbi, ut testimonio Dio-
scoridi, liquet. Non tamen purandum est, diuturno-
res morbos necessariō absq; ulla conspicua iudi-
cari excretionē aut eorum crisi plures semper
dies occupare. Aliquando liquidē morbi diutur-
ni fuerūt iudicari die unico, idq; per excretionē.
Differūt autē huiusmodi omnes inter se dies,
tum natura, tum usu. Natura sanē, quia omnib.
pulchrē euenientibus ad quaternionis circuitus
iudicia omnino perueniūt: erratis autē quibusdā,
in coincidentes recidūt. Vt uero, nam ad
futurā crisi cognitionē quaternionis circuitus
sufficit. Cæterū ad iam factam crisi iudicandā,
omnibus semper opus est cognitis. Est autē lon-
gē tuior crisi quæ nono die accidit, quā quæ
octauo. Porro certitudo iudicij, ad bonū uictus
rationem iudicatis morbo præscribendam con-
ducit. Prænotare autē quando crisi adueniet,
ad nondum indicatos est necessariū. Dierum igitur
differentias haud ignorat Hippocrates, me-
rito eorū tantū in prognosticis atq; aphorismis
meminit, qui secūdum quaterniones inter se cō-
plicantur. At quippe in prognostico: Febris, siue
sanus ab ip̄s quis euadat, siue pereat, æquali
dierum numero finiantur. Verū ut saluberrimæ
febres, quæ uidelicet tutissimas fulciantur notis,
die quarto uel antea quiescere solent: ita pesti-

Decimus quater-
tuus sit finis sc̄da
die, sic initium
tertie septima-
næ existit.

Vigesimo die plu-
res absoluti fuisse
si facta morbo-
rum indicatōes

Decimusseptimi
ordinem, alterum
quæ a decimo
octauo sit, longe
fortiori exsistere.

Crisim nihil ali-
ud esse quā solu-
tionē morbi.

Dierum decreto-
rium differē-
tia duplex.

Iudicij iam facti
& faciendi cog-
nitio, ad quod
conferat.

Hippocrati de
dierum decreto-
ry sententia.

Nutriendi mo-
dus unde colligi
possit.

Colum uerius
rem ei dandum
quā languis ab
fuerit status, &
morbus clemen-
tior fuerit.

Decimus septi-
mus est index
vigesimali & ui-
gesimaliprimi, ma-
gis tamē uigesi-
mali.

Natura in sin-
gulis providen-
tia.

Naturam hanc
inferiorem a ce-
lesti magnopere
superare, ab eiq;
quocūq; id habet
boni, recipere.

Natura quid.

Septimanam q̄
si perfectam pe-
riodum.

Septimanam diem
absoluit, quod
quartus non po-
test.

Intercalares
dies.

Vigesimo die
esse finem triam
septimanarum.

Decimus septi-
mus diem esse
vigesimali indicē.

me quare, & quibus periculossima signa ad-
sunt, quæ quarto, uel circus interficiunt. Primus
itaque earum insulsius sic finitur. Secundus quater-
nio in septimū diem producit. Tertius in un-
decimū. Quartus in decimumquartū. Quintus
in decimusseptimū. Sextus in uigesimalū. In apho-
rismis etiam sic ait. Septimorum quartus est index.
Alterius septimanæ octauus initium. Contemplan-
torius autē rursus undecimus. Hic enim est quar-
tus secundæ septimanæ. Contemplatorius iterū 10
in decimusseptimus. Hic enim quartus est ad decimo-
quartū, ut septimus ab undecimo. At in primo
Epidemion, omnium dierū mentionē fecit, sic di-
cens: Est autē primus decretorius circuitū, qui
paribus diebus decernit, quartus, sextus, deci-
mus, decimusquartus, decimus octauus, uigesi-
mus, uigesimalquartus, uigesimal octauus, trige-
simus, trigesimalquartus, quædragesimus, sexa-
gesimus, octogesima, centesimus, ceteris uel
gesimus. Eorum qui imparibus circuitibus iudi- 20
cant, primus est tertius, deio quintus, septimus,
nonus, undecimus, decimusseptimus, uigesimal
primus, uigesimalseptimus, trigesimal, primus.
Decretorius itaque fortissimus omniū est dies se-
ptimus: quæ dies quartus prænunciat, hæc duo
habens, ut & decretorius sit minor, & index se-
ptimi. Deinde undecimus & decimusquartus,
eandem naturā & proportionē inuicē cōseruan-
tes, quæ cum septimo quartus. Post hos frequen-
ter quidē decimusseptimus ad uigesimal, raro au-
tem decimus octauus ad uigesimalprimū, eandē
rationē habet, quæ cum septimo quartus, & un-
decimus cum decimoquarto. Hi igitur quater-
nario aucti, ad uiginti perueniūt. Coincidit eis
nonus, quintus, & tertius. Ac plurimos quædem
nonus in dicit, secundum uim quintus obtinet.
& post hūc tertius. Sextus malus est decretorius.
Decimus tertius omniū imbecillissimus decretorio-
rum, ceterū omniū qui non decernunt fortissi-
mus, in medio quodā uirtutis utroque est situs. 40
Vehementissimæ itaque sunt crises, quæ ad decimū
quartū diem ueniūt, minus huius, quæ ad uigesimalū
usque pertingunt: iode ad quædragesimū produ-
citur, adhuc imbecilliores euadunt, sed in illo ab-
solutē exoluūt. Proportio autem dierū decre-
toriorū perpetuā seruatur. Ut enim decimusquar-
tus & secundæ septimanæ finis est, & tertix prin-
cipium, ita trigesimalquartus quintæ terminus
est finis, & sextæ initium. Quare tres septimanæ
uiginti diebus semper describunt: ideoque sexage-
simus, non sexagesimus tertius, decretorius exi-
stet. Pari modo octogesima, & centesima, &
centesimus uigesimalus. Respondebit ergo trige-
simalquartus decimoquarto circuitus, cum ex
duabus septimanis diffusus fiat: & quædrage-
simus uigesimo, ut qui tertiam hebdomadam cō-
iungentiam expleat. Dicunt autē minores circuitus
illi, qui diebus quaternis fiunt. Secundas partes
obtinēt, qui diebus septem cōpulantur. Hos ac-
cedunt qui septimanis duabus constant, licet im-
perfecti quo dammodo. Omnium perfectissimi
sunt, qui ex trinis septimanis constānt. Morbi
tamen ipsi, partim quidem diebus, partim men-
sibus, partim annis fortissimè suas iudicationes.
Atque in horū singulis, differeunt quædam parti-

culares existunt. Proponat igitur adolescens ua-
lido morbo correptus, qui in primo quaternio-
ne sit discutiendus, in eo certē est aphorismus il-
le imitandus: Vbi morbus est peracutus, statim
etiam extremi dolores adsunt, tenuissimūque uictū
est utendum. Quare nihil ei alimētū exhibueris:
imò etiam ab aqua, quantum potest, ipsum abstinere
iubeto. Si uero septimo die crīsis sit habiturus,
paululū hāc uictus rationē immuta, uel nullam
ei exhibens, uel aliam quamplurimè ponens morbi na-
turæ familiarē. Quod si æger facili dissoluatur in
dies, eiusque offensa diffusetur, sepe pridie, uel ante-
ea, minus est exhibendum. Rursus, si tertio uel
quarto die morbus finitū iri spes adsit, nec mali-
gnitatē stomachi, nec suspicioris inanitionē habi-
tus, ipsique etiam æger ualidissimis uiribus sit, faciliē
longā inedia toleret, nec morbus aut oxymeli,
aut nullam requirat, is certē ad septimū usque diē
ad cibis poterit abstinere. Quod si ad tertium uel
quartū quaternio crīsis futura uideatur, non ita
abstinere poterit, nec sola potione seruari. At se-
rō peracutus morbus uocal, qui tantū ad septi-
mū usque diē extendit. Qui longius procedit, sim-
pliciter acutus. Ceterū exactē peracutus is est,
qui usque ad diē quartū progredit: nō exactē, qui
ad septimū usque producit. Similiter qui usque ad
decimusquartū extendit, exactē acutus uocal: nō
exactē uero, qui durat usque ad uigesimal: quan-
quē est & ipse etiam acutus. Est & alius morborū ge-
neris, ad quædragesimū usque diē perueniens, qd ab
acuto nō integrè iudicatur ducit originē. Nōnulli
præterea statim ab initio tanquā prohibiti, ad
quædragesimū producunt: quorū duplex natu-
ra est. Aut enim remissiones paroxysmorū in ex-
actam integritatē definiūt, aut semper cōtinua fe-
bris perdurat. Noui enim complures ad quædra-
gesimū usque diem cōtinua febre cōstātatos esse:
sic enim uoco illam, quæ nunquā remittit. de quib.
sermonē uidetur fecisse Hippocrates in prognos-
tico, ubi ait: Existimare autē oportet, quod faci-
lis spiratio in omnibus acutis morbis, quibus fe-
bris copulatur, quique intra quædraginta dies iu-
dicantur, magnū ad salutem habet momentū. 60
Atque hoc sanè ultimū prædictum genus, acutum
ex decidentia uocari debet. Nullus autē morbus
a primo acutus in uigesimal diem alabitur, qui
nō prius iudiciū expetens sit. Qui uero ab initio
submersi lenitū apparent, & inde ad quædrage-
simum perueiant tardius, sed rursus intendi ui-
dentur, hos iure diuturnos appellaueris.

*Crasis adole-
scens ualido
morbo correpti*

*Confusum
esse aliquod con-
ducendum.*

*Peracutus com-
munitur ducitur
morbus qui tan-
tum ad septimū
usque diem exten-
ditur.*

*Peracutus ex-
actus morbus qui.
Acutus exactus
morbus qui.*

*Morbus qui ad
quædragesimū
usque diem peruenit
de natura du-
plex.*

*Crasis, sicut
dicitur quæ nō
quam remittit.*

*Spiratio facilis
in quibus acutis
morbus ad solu-
tionem magis ha-
bet momentū.*

*Acutus ex de-
cidentia morbus.*

*Diuturni morbi
qui.*

GAL. DE DIEBUS DECRETORIIS LIB. III.

igitur non omnes dies de morbis decernere,
experimento cōstat: sicuti & quæ septimanis cir-
cuitus ualidissimi sunt uirtute præditi: post
hos quaternarii, quidam uero extra hos concidant.
Imò quod nec omnes septimanæ inuicem
separentur, sed aliquæ ipsarum etiam cōiungantur:
nec omnes quaternarii, sed horum aliqui

*Septimus est
omniū decre-
toriorum fortis-
simus.*

*Quartus diu
que adsit.*

*Coincidens
dies.*

*Sextus malus
est decretorius.*

*Decimus tertius
dies in medio de
cretoriis et
maximè decerni-
tium consilii.*

*Decretorius
dierum semper
proportionē ser-
uat.*

*Circuitus mi-
nor qui.*

Acutus morbus
impertit diuturnum
numerus, longum
periculis ad
uincit.

Inferiora hac o-
mnino respice et
natura a se ipe
rioribus.
Sol autem tempo-
rum, animalia
etiam gignit.

Luna opera So-
lis effectibus in-
feriora.
Luna menses atq;
dies eius dispo-
nit.
Nouilunium
quando fiat.

Lunam quando
deficit lunam.
Lunam a solis
recessu sua om-
nia mutationes
recipere.
Lunam ferre.

Luna opera in-
ualiditate, quam
ipsa est plena.

Luna ei qui sub
lunare spiritum
moratur diutius
fuerit, pallor,
et capiti graui-
tatem cruciatum.
Luna Solis auri-
liis egerit.
Sol multum alibi
operi desiderat.
Temporis uetus.
Sol uelut rex
quiescentem mare
mouet.

Luna est uelut
paterfamilias inter si-
lem atq; mori-
dum.
Mori at uelut
a seculatone
profectus inter si-
ferentia mul-
tiplex.

separant, aliqui coniunguntur. Insuper, quod ac-
utis morbis impari diu numero, longa pari, iu-
dicia omnino accidant. Porro causas horum ratio-
ne nobis indagantibus, duo prima omnium quae
sunt primordia esse statuenda uidentur: uorden-
natum uidelicet, quod ex hac mundi materie pro-
ficiuntur: ordine uero ornatum procedit, quod
coelestibus originem fert acceptum. Omnia siquidem
haec inferiora ab illis ueniuntur & ornatum
suscipiunt. Fruimur namque superiorum omnium
astrorum uirtute. Verum Sol maxime hunc orbem ex-
ornat, & coelestem disponit. Quippe ueris, sitis,
autumni, & hyemis auctor nemo alius extat: nec
alius tam manifestum ex eo terrestri specie animalia
gignere potest, uel maturare fruges, uel ad coeli
& generis propagationem animalia incitare. Mag-
na sane & Luna opera in hac rerum substatina ap-
parent, uerum Solis effectibus inferiora. Etenim
menses haec perpetuo, atque omnes eius dies dispo-
nit, idem eundem ad eam in marinis bellis quan-
& hoc ipsum Luna beneficio debet. Nouum enim
lunae sortit, cum Sole primum fruitur: tantum sem-
per eius portio illucelcit, quantum Sol aspiciat. Pro-
fus autem deficit, lucis expers redditur, ubi terra
suo interuictu ipsam obtenebrat. Quapropter
a Solis recessu omnes sunt mutationes. Ete-
nim plena est, cum diametra apparet. Aequa por-
tione diuisa, cum est quadrangula. Gibbosa, cum
triangula. Falcata specie refert, sexangularis. Ac-
tum primum recens est, cum post Solis congressum
ostenditur. Obscurat omnino, cum sub ipso So-
le conuertitur. Igitur fructus augeat, intransitum: ani-
mantia implet, menstruum statum tempus con-
seruat mulieribus: comitaturque circuitus gignit,
quatenus Solis plus, uel minus participat. Om-
nia siquidem quae facere nata est, ubi falcis figura
repraesentat, languida sunt: inualefcit, cum ple-
na fuerit. Quapropter & fruges interea adauget
& maturat celerrime: ferarum occidit corpora in ta-
bem usum suo resoluunt: somnoque soporis sub eius
lumine, uel aliter immorantur diutius, pallor, &
capitis grauitate coelestis. Ceterum ut Luna Solis
auxilio in omnibus indiget, ita Sol nihil uel maxi-
mi alterius cuiusdam astris, uel ipsius Lunae opem
desiderat. A nullo enim impeditur, quo minus
aestate faciat, cum in uertice nostro consistit: aut
frigus adducat, si humilis eius cursus fuerit: aut
aequinoctium utrumque constituat, cum modice obli-
quus uidetur. Sed ipse uelut rex quiescentem maxi-
mus est: Luna uero, ut princeps non mediocriter in-
ter illum & nos medius constituit, merito terre-
strem hanc regionem gubernat: non potentia cete-
rorum planetarum, sed uicacitate experientia. Porro ue-
llementer mutationes eueniunt, ubi ipsa cum
Sole coit: dein autem, in apparitionibus plenilu-
niis: minores his contingunt, dum medio orbe ap-
paret: obfcure, dum curuata in cornua, & falcata
uidet. Etenim diametra Lunae statio, seu dis-
tinguens dispensans, maxime coetras ipsius
Lunae dispositiones (maxime enim Luna incre-
mentum, eiusdem immutationis aduersatur) eam
omniū est ualidissima. Dein uero duae dispositio-
nes dichoromi, in quibus Luna per medium de-
ter secta, utraque ipsius differentiam, dico aug-
mentum & decrementum, ad aequilibrium secant:

prior quidem augmentum, decrementum secunda.
At omnium extremis obscurissimae aeris nos am-
bientis per mutationes in falcatis, incuruisque ap-
paritionibus sunt. magis autem, in ipsis incuruis.
Iam uero plenitudines Lunae, celeritimas muta-
tiones efficiunt: nouilunium uero, inaequales, di-
urnasque. Nam quid ante Lunam apparente ma-
nifeste pronuncies, non est. Longum autem hoc tem-
pus occultationis est, integri ferre cursus
explens. At mutatione ex incremento ad immi-
nutionem, punctum exacte distinguit: quod pun-
ctum a Luna quasi momento absoluitur. Qua-
re breues pleniluniarum coniunctiones existunt, diu-
turnae coniunctiones. Tuta igitur crisis eua-
det, quid in toto mense statum secundo die fiet,
quo primo & manifesto Luna, & longo satis re-
spice super terram iam apparet, & lumen sensibile
de se mittit, ad hanc umbram euidenter ostendit.
Primum autem dies tandem Luna supra terram uagan-
tem habet, quam diu adhuc Solis etiam lumen post
occasum retinet. Quare in hoc Luna simul cum
Sole occidit: subinde uero & prior est occidua, et
secunda de se prius elucet: minus minus, nunc ma-
gis apparet. Atque hoc ei accidit longitudine a So-
le recessus. Plerumque autem Luna triuaginta in coelo
solis morata, plane inuisibilis est: quo nodum hanc
terrena immutare potest. Cuius circuitus uice-
nus diebus septenis, & tertia ferre die parte per
agitur. In tanto enim tempore totum signiferi cir-
culum percurrit. At quod is circuitus, quo nobis
lucet, eidem quoque numero coeueniat, perspicue
intelliges, si occultationis tempus ex toto men-
situo tempore eximas. Quod autem menstrui tem-
pus non omnino triginta diebus consistit, sed mi-
nus unius ferre diei dimidio: quod mensium
alius quasi mensis & imperfectus, dies uiginti
nem fortia: alius uero, nempe absolutus, trigina,
liquidum constat. Quemadmodum igitur autem
integrum Sol absoluit, ita Luna mensiem, immuta-
tione per septimanas ei accidente. Nam utrumque
tempus, & quo post primam apparitionem in mediū
orbem accrescit, & quo inde plenitudo efficit, septem
diebus absolutum, ambo quatuordecim. Simili
modo, si inde, cum aequali portione est diuisa, ad
secundam diuisionem eiusmodi ratione subduxa-
ris, & hos dies, reliquosque, cum plane ab oculis
Luna declinat est, septem inuenies. Quod autem
aer non circumsat, maximas mutationes fortia-
tur, dum Luna primum occultatur, ac dein rursus
se ostendit, nemo mortalium ignorat. Itaque mensiem
a Luna immutari secundum septimanas, ac proinde
cetera omnia, admodum est perspicuum. Iam uero
quoque omnibus. subfistentibus accidit, horum
causam Luna habere obseruata est, maxime in te-
tragonis & diametris stationibus ea immutans.
Nam si Luna in tauro existente semen conceperit
fuerit, uel etiam partus coegerit, magnas eius mu-
tationes inuenias, cum in leone, scorpio, & aqua-
rio signiferi ambir. Verum in leone tetragonos se-
primas unius existit: in scorpio diametra duas
septimanas habet. Ita quoque in aquario, secunda
quadrangularis statio necessarii in tertiam se-
ptimanam procedit: quod Luna uicenis diebus,
septenisque, & particula quadam adiecta, maxime
tertia diei parte, uniuersum signiferi ambitum
peragat.

Luna occultatio
non ipsam quam
longum sit.

Plenilunium diu
fieri breues ex-
cellens, diuturnae
causae lunales
Crisis tunc quid
de accidet.

Luna circuitus
negant sepius du-
bus & tertia fer-
re die parte per
agitur.

Mensium non om-
nino triginta die-
bus consistit.

Sol omnino
absoluit.

Mensiem a Luna
immutari per se-
ptimas, ut ad-
lia mensis.

Luna motu esse
causae omnium
permutatorem,
que in responsu
accident.

*Luna indicere
seivt aut infestum
progratum
causam non mo-
do agere, sed sa-
ne etiam posse.*

*Circuitu diffi-
rentia.*

*Diuturnorum
morborum ratio
causam ostendit
tempus, ut
aniam.*

*Mutationes
validissimas
quae tempore
septimani die
proprie dicuntur.*

*Tertiu diem ef-
se principium de-
cretorum autu*

*Excrementa cur
interu citum,
interu tardum
autu oportet
a natura expel-
lantur.
Expatrici riu
crises in morbu
facere.*

peragat. Nec uero agris tantu luna, sed etia sa-
nis, dies quales tande sunt sint, praenunciare po-
test. Etenim Luna, si planetas salutaris ac repa-
tos asperxit, fauoris ac bonos pducit dies: mo-
lestos autu, si intemperatos. Ad huc, alterationes
magnas, quas in tetragonis & diametris per se-
ptimanas fieri diximus, in letalibus quide mor-
bis, letales & ipsius salubribus, bonas euenire
est necesse. Luna igitur tetragonu, diametrali
statione, in principijs bonis, bonas faciunt alte-
rationes: in malis, malas. Circuitu autu aliq nu-
mero quod i diebus constant, alijs mensibus. Cete-
rum qui diebus constant, septimani sunt, & Luna
modo incedit. Qui mensibus, ad Solu referuntur,
eodem modo eueniunt. Ac sic illud intelligen-
dum est, qd ait Hippoc. xxiuos morbos hyeme,
lyemales xitate solis. Hoc enim diuturnoru an-
naliumus morboe iudicationis tempus statum
est, quodamodu acutoru decimusquartus. Cum
enim i mensis principio ad usq pleniluniu tem-
pus, totius lunaris circuitus dimidiu existat, ean-
dem ratione habet qd intervallo, qd ab hyeme
ad xitate usq intercedit. Queniam i plenilunio
ad occultatione tempus, spacio qd ab xitate ad
hyem usq porrigit, proportionem respodet. Sed
horu utroq bifaria sectio, in acutis morbis est se-
ptimana: diuturnis, clarissimu syderum exor-
tus: quoq ratione uer, xitas, hyems, & autum-
nus, describunt. Quemadmodu autu septimana
acutoru morboru est decretoria, sic temporis an-
nui mutatio, diuturnos morbos discit: ut hye-
me quide constitutu moebu ver dissoluat: in ve-
ce constatu, xitas. Simili ratione per xitatem co-
tractum, autinus: in hoc paratu, hyems. Ceteru
anni tempora singulis partibus bifaria diuisa,
mensis quaternionib, proportionem respondent.
Et quemadmodu anni temporis cuiusq & initiu
& finis, syderu manifestoru ortu & occasu descri-
bitur: ita eti medietas singulu, alterius rursus sy-
deris exortu distinguit. Itaq uniuersas particula-
ces morboru mutationes, uel tanq ad proximam
ipsoru principiu, uel ambiens nos aeris conuer-
sione, euenire est necesse. Qui igitur ex proprio
principio mutant, Luna sequuntur: qui uero ceu
ab aere nobis circumfluo immutant, in toto quide
anno, Solem in singulis mensibus, Lunam.
Hinc iam accidit, mutationes ualidissimas esse,
quae cuiq per septimanas dies proprie cotingunt:
quae ipsis sece comiscant, quas aer excitat. Atq
in acutis quidem morbis coincidentes decreto-
ria sunt plures: quoniam & corpus mutationi acci-
modum, in motu & perturbatione uehementi co-
stitutu est: in longioribus, uia & ordine magis
septimanaru circuitus procedit. Principiu igitur
dieru qui acutis decernit, & cum quadam pertu-
batione morbos immutat, tertiu die ab ipso prin-
cipio statueri oportet: quippe qui nullu iam cu
prima septimana comunione habeat, sed ex co-
incidentib sit. Iam uero perturbationis uolentia,
naturu ea quae molestant, eti ante tempus pro-
pullare copenit: id quod alioqui nentiu factura
fuisset ante coctione perfecta: quae interdu iam
absoluta, saepius tardari solet, propter facultatis
(quae aliena excernit, & crises in morbis efficit)
infirmitate. Fuit itaq iudicatio optimae, cum

iam omnia in animantis corpore fuerint accurata
cocta. Perniciosum autu est, si quatu ipia
crisis praecurrit. Nam idonea simul cum qis quae
laxat, excernunt quod sit natura incitata, uel
ab exteriore quodam, uel ab ipis quae in ipso cor-
pore detinent. Atq unu quidem ex illis quae na-
turam stimulant, & uelut promoucat, accessio est,
nullam quere, nec morbum cedentes, ueru incita-
tans, mouens, & ceu pugna indicens. Vnde ac-
cutoru morboru in diebus imparibus iudicium
contingit. In his enim & accessiones fiunt. Nam
secunda accessio ab initio ad tertiu diem delate-
tur, tertia ad quintu, quarta ad septimu, quinta
ad nonum, omnes deniq in imparibus fiunt. At
dispositi primariu decernendi uirtute no habent,
sed per accidens id consequunt: quod uidelicet in
accessionibus iudicant morbu, alijs autu in dies
impares incidunt. Neg enim septimu, uel quartu
numerus, crises est auctor: sed quod Luna inno-
uante, & terrena immutante, motu quoq circuitu
ad hos principes numeros uenire cotingat,
merito in ipsis tanq stat alterationu tempora
inueniunt. Quippe mutationes no numeris, sed
Lunae terrena debent. At cim id quod mutat in
motu consistat, tempus mutationis necessarii
coniunctu est: quare necessarii & numerus. Lu-
na itaq omnia terrena immutat, atq in septima-
na praecipue magnas mutationes inducit: dein
autem paruas in quaternionibus. Porro tertius &
quintus dies decernit, no ex lunari circuitu tale
facultat fortiti, sed quod tertius uolentia accessio-
ne crism quarto die futuram praeruat: natu-
ra autem quarto die defatigata, minime irrita-
ta conqueiscat, ac postea in quinto ad iudicium
moueat. Iam uero & nonus, inter duos decreto-
rios septimu & undecimu medius, uel non fa-
ctum in septimo die iudicium, uel undecimo fu-
turum, ipse sibi uendicat: at rariu quidem septi-
mu, saepus undecimu assumit crism. Porro in diu-
turnis morbis, ut accessionis uehementia, sic nu-
merus coincidentiu dieru minuitur. In omnib,
autem sece diebus peracutos morbos iudicari
cotingit, quoniam ultimus decretorius ipsoru est
septimus: & ante hunc no quartus modu, sed ter-
tius, quintus & sextus aliquando decernunt. At
peracuti omnes morbi uel continuu febrem, u-
niformemq, i principio usq ad crism sibi habet
comitem: uel aliam, quae eti manifestas habeat
declinationes & accessiones, non tamen tertio
quoq die manifestas tantum habeat, ueru in ipso
rum quoq dierum medio, quemadmodu & se-
mitertiana. Proinde prima peracutoru differen-
tia, ueluti uia quaedam accessio est. Quamob-
rem nihil (quantum ad accessionem pertinet)
impares paribus praestant, cum febribus singulis
diabus aequalis existat. At in altera differentia,
com quidem ueluti ad septimu diem festinat, &
secundum ipsius rationem in eodem finiturus
est: medius uero accessionis magnitudo, naturu
ante suum tempus uenire ad crism compellat,
uel si extrinsecus aliquid eueniens ipsam irriter,
crisis haud dubie sexto die praerumpet. Etenim
in secundo die natura alioquo modo est ualida:
item in quarto magis q in sexto: sed nondum in
certamen uenire audent: in sexto autu accessionis

*Crisis optima
quando fiunt.*

*Accessio morbi
naturam cimen-
ti.
Acutoru mor-
boru uolentia in
diebus imparibus
fiunt, quia
& accessiones.*

*Dies non prima
sui, sed ex ac-
cessione decernit.*

*Dies tertius &
quintus qua ra-
tione decernit.*

*Noni diei facul-
tas.*

*Peracutus mor-
bus (quoru ali-
mi decretorius
est septimus) an
quasi uolentia die
bus iudicari co-
tingit.*

*Peracutorum
morboru duplex
differentia.*

uehementia frequenter eam ad certamen pronocat: quare uel in eo desistat prius, quod quæ insistant excrucietur, extinguaturque: uel eorum magnam partem propulset: reliquum uero adhuc non potest, sed imbecilla & defatigata prorsus cadit, & uicta acet. Deinde si postero tempore recreari ac refici possit, morbum paulatim concoquit. At si morbi reliquæ robore illius maiores sint, tandem æger superuiuet, quod diu natura sufficere poterit: morietur tamen postea. Decernit autem uigilissimus, & uigilissimus primus, sed multo magis uigilissimus: quoniam huiusmodi morbus diuturnus iam est, & paribus diebus accessiones fiunt: dein, quia septimana non integris septem diebus constat. Etenim uti annus ad trecentos sexaginta quinque dies

*Vigilissimus dicitur
decernit magis
quam uigilissimus
primus.*

Annus.

Menstruus.

Septimana.

*Vigilissimus dicitur
quod morbus
inducit.*

*Apparitionis
quod tempus
inducit.*

*Quatermionem
qui separantur,
et qui iunguntur
transgredientur.*

*Acutus morbi
non sunt
tempora
exiguæ, non
tam
ampli
breui
uero morbi
conu
nati
ex
hinc
d
ceti.*

poris: & omnis diuturnus, nec cessatio tardus. Non tamen si breuis temporis sit, acutus statim fuerit (cum multæ ephemeræ longè breuissimæ sint, omnino periculo uacat) nec si tardus, longi temporis.

GALENI PERGAMENI de crisiis lib. I.

Totius morbi tempora sunt quatuor in uniuersum: principii uidelicet, augmenti, status, & declinationis. Quædam uero ægritudines ob eorum malignitatem, atque ægritudinis imbecillitatem, in ipso statim augmenti tempore hominem iugulant: sicuti & quedam aliter in uigore. Desinunt autem ea tempora minime diu numerari. Porro an ipse morbus augeatur, non ex eo tantum cõiecturari oportet, quod accessiones anticipent (sæpe enim talis anticipatio, morbi proprietatem consequitur, potius quod incrementum, cum & quartanæ, & tertianæ, & quotidianæ febres quidam circuitus usque ad integræ solutionem ita anticipare sint uisi) sed quod etiam longiores & maligniores existant: id quod similiter est in intermissione & declinatione considerandum. Voco enim intermissionem, quod febris in quietem desierit: declinationem, omnem eius partem, quæ uigore ipsum sublequitur, usque ad secundæ accessionis principium. Etenim si accessio (exempli gratia) cõfuerat anticipet horam, longior etiam fiat, & uehemens, maligniorque, & cum ipsius praesens symptomatis accidat: ad hanc ipsam declinationis tempus fiat breue, nec omnino facile, nec symptomatum accessionis omnino expertis, in certis morbus ad magnitudinem crescit. Si uero accessionis initium tardet, longitudo autem eius ac magnitudo minor exsistat, cessetque etiam malignitas, necnon intermissio uel declinatio sit facilius tolerata, longiuscula, omniaque accessionis delens symptomata, haud dubie declinationis morbi hæc fuerint aperta indicia. Vbi uero quæ ad accessiones duas pertinent, æqualia fuerint, morbum demonstrant cõsistere. Quare Hippocrates ait, ad morbi incrementum noscendum, esse accessiones inuicem conferendas. Iam uero sæpe quidam in morbis nullam reperit sensibile ipsius uigoris tempus: sed habente adhuc quartam (si ita cõtulerit) accessione indicia augmenti, quinta superueniet accessione, declinationis habens principium. Simile quiddam accidit in morbo augmentis. Nam sæpe prior accessio principii simul habuit, ascensumque & uigorem: dein secunda uidet manifeste inclinare. Generosi autem medici est minus, futurum statim præcognoscere, cum omnem uictus rationem ad ipsam inspicere instituat. Eadem ratione principii atque augmenti morbi, non ubi iam perfecta sunt, sed multo antea præstat cognoscere. At accessiones & cõstitutiones (quemadmodum inquit Hippoc.) morbi indicant & anni tempora, & circuitus successus incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue in longiori tempore fiant. Præterea si in laterali morbo (putum statim appareat, incipientem morbum facit breuiorem: si uero posterius, longiorem. Porro quæ propria sunt morbi accidentia, simul cum morbo inuadunt, in principium: reliqua uero omnia mox apparent.

*Tempora totius
morbi sunt
quæ
inueniuntur.*

*Tempora a morbo
non desinunt
de
rum
numera.*

*Anticipatio
accessionis
non
semper
morbo
incre
mentum
arguit.
Incrementum
morbi
uero
cõsequi
reperitur.*

*Intermissio.
Declinatio.*

*Morbi
crescentia
ad
magnitudinem
uideat.*

*Declinationis
morbi
argu
mentum.*

*Morbi
uigore
inducit.*

*Status
morbi
de
est
qualiter
quæ
ta
uicem
ratio
esse
debeat.*

Pleuritis propria symptomata.

Sputum nihil, si quous esse cruda pleuritidu.
Sputum non bonum, duplex.

Sputum concoctum, morbum facit breuiorem.

Sputum prauum malignumque, periculum atque perniciem indicat.

Expulsiuum quae perniciosa est.

Sputum facile, bonum.

Urina nigra, perinde ut sputum nigrum, mortem praenunciat.

Principium secundum latitudinem considerari in prima accessione.

Superfluitas partis cuiusque illius propria dispositione consideranda est.

Excrementa alui quae obesse debent.

rent. Inuadunt igitur unâ cum laterali morbo febris acuta, lateris dolor pungitîs similis, tussis, & difficilis respiratio. Mox autem apparet quædam, ut ipsi morbo propria: nonnulla ut cômuni omnibus febriçtanti. Propria sanè ipsius morbi, primū quidem, si nihil cum sputo educat: qd fusi ciens crudi morbi est indicium. Secundo autem, si educat quidem, sed non bonū. Est autē & hoc duplex: unū quidem, quod solū caret coctione: alterum uerō, quod etiā prauū existit. Ab his omnibus, id quod coctū est, separatur: quod etiam propriè spurū appellatur. Si igitur hoc statim appareat, morbum facit breuiore: cum uerō nullo modo educitur, aut crudum, longitudine morbi ostendit. Si quid autē prauū expulitur, periculum imminere significat: mortē uerō, si prorsus malignū fuerit. At quæ propriè expulsiōnes uocantur, ex his, quæcūq; sublaug, & subruffæ, & subpallidæ, & subpumose, & tenues existit, solum cruditatē significat: nullū uerō in signis malū prænunciat. Quæ uerō sine alia coactione sunt flaua, uiridæ, crassæ, spumose, uirides, ualcosæ, rotundæ, atq; his etiam magis nigrae, sunt perniciosa. Propterea facilitas expulsiōnis, bona est: ut difficultas, malā: qd pulchre in prognosticis docuit Hippocrates, dicens: Spurū oportet in omnibus doloribus, qui pulmonē & latera infestant, celeriter expui ac facili, cōsummūq; uelementer uideri flauū sputo. Eadem autē & in urinis, & in alui excrementis faciendā distinctio est, quā in ipsis sputis fecimus. Si quidem nonnulla corū, coctionis sunt signa: nonnulla uerō cruditatis: quædam mortis indicia existunt. Etenim ut nigrum spurū, præter id quod crudū est, etiā mortē portendit: sic & urina nigra, nō cruda solum, sed etiā letalis existit. Est autē simpliciter crudū, quod album est ac tenue: quod aquosum uocamus. Porro quonotus de principio morbi fecit sermonem Hippocrates, nō de indiuisibili illo primæ accessiōnis insultu, in quo nihil possumus obseruare, sed de alio quodā principio, qd sensibilibet habet latitudinē, nobis suis mentē exposuit. At uerō principii secundum latitudinē, cōmuni quādā imaginatione, absq; ullo artificio, continet in prima accessiōne. Atq; idcirco quædam statim cum incipiunt, statim accepisse dicunt, quemadmodū in primo Epidemiarū, ubi ait idem Hippoc. Statim enim continua est, quæ incipiens florescit ac uiget. Nam uerbum illud, *incipiens*, non dicitur hoc loco de uero morbi tempore, sed de eo qd sublequitur exquisitū principii, quod ut plurimū ad tertium diem extendit. Cuiusq; itaq; partis superfluitas, eam quæ illi inest dispositioni ostendit: si cocta quidem fuerit, salubre: cruda autē, pgram. Aliud excrementa (Hippocrate autore) optima sunt quæ mollia & coherencia existunt: & quæ eandem exitus horam ferunt, quā un fatione habuerunt. Quantitas uerō esse debet pro ratione cibi, qui assumit. Nam si excrementa talia fuerint, uentri inferiori sanescere dicant. Et sputum quoq; cum fuerit exquisitè simile illi quod sanis aduenit, integrum sanitate instrumentorū respiratiōnis significat. Si quo modo autē à naturali modo recesserit, tantū ea læsa esse demonstrat, quantum ipsam formā naturalem amiserit. Quod

uerō illi quod secundū naturā est, maximè cōtrarium uidet, existit crōdum, magnamq; patientiū membrorū imbecillitatē indicat. Quod uitiosæ causæ aliquod signū habuerint, quemadmodū nigrum, est perniciosum. Ita etiam in urinis res habet. Nam & hæc, quæ satis similes sunt, ueniosum instrumentorū genus satis robustū esse indicat. Quæ uerō crudiores sunt, eiūdem imbecillitatē significant. Rursus quæ maximè sunt sanis contraria, hæc quidem omnino sunt crude, & maximam uniuersū ueniosū generis imbecillitatē declarant. Quæcūq; uerō & superantis causæ prauitatem ostendūt, ueluti nigra, hæc sunt peritias exitiales. Hæc itaq; tria signorū genera, singula quæque coctionis præbent indicia: urinx quidem, eius quæ fit in uenis: deiectionis autē, eius quæ in uentre: sputa uerō, eius quæ in respiratū instrumētis. Sanguinis autē profusū & nartibus, sudores & tumores qui iuxta aures fiūt, reliquiq; defluxus, si in corpore quidē sunt opportuno, prodessē possunt: in pectus autē, nihil uult. Non sunt autē eadem decretoria, & quæ coctionis indicia dicunt. Si quidē fieri nō potest, quin ita omnino uel bene, uel malè se habeat. At coctionis signa, salutē quidē hominib; nō tamen per crīsim omnino, futurā nobis ostendūt. Porro in febribus uniuersis, quoniam ueniosū generis sunt passionēs (nam & artenas in hoc genere cōprehendimus) ad urinas præcipuū attendere oportet. In his autē qui laterali morbo afficiunt, primū quidē sputa, secundo loco urinas: quoniam is morbus omnino cum febribus lungit. Vt in passionibus uentris, si sine febre fuerint, sola excrementa inspicere oportet: si autē cum febre, etiā urinas. Principii igitur uniuersūq; morbi principii, coctionis signis determinat: potestē usq; ad multas quætionēs extendi. Cæterū tunc finiet, cum primū coctionis signa apparuerint. Reliquū uerō deinceps tēpus usq; ad statū, iam alterū 40 tempus est, qd augmentū & ascensū uocat. De posthac, status: qui est uehementissima totius morbi pars. Ultima uerō omniū est declinatio. Coctionis igitur signa (sæpius enim quæ utilia sunt, repetere cōuenit) nunq; malè apparent: decretoria autē, est ubi malè: neq; enim in augmentis, neq; in principijs, sed in statibus illa apparere cōuenit. Quippe nec sudores, nec hominis, nec alui excrementa, nec tumores post aures, nec profusio sanguinis, ante coctionē morbi ueniunt, unq; per crīsim inierūt morbos. Hæc igitur iam ueluti causæ, morbos credunt solueri: quæ uerō ueluti horum indicia sunt signa, deliria existit, uigilæ, graues corporis, dolores, lachrymæ, respiratū difficultates, oculis tenebræ obortæ, & quæcūq; similia: quæ omnia si absq; coctionis signis in morbi principio apparerit, pessimārū sunt dispositiōū indicia. At reliqua tria quæ coctionē ostendūt signa, errant si in prima prorsus accessiōnis hora apparuerint, ad bonū apparent. Sicuti igitur nō habet exquisitū principii cognitio, anteq; incipiat ascensus: ita neq; ascensus, anteq; status inuadat. Exercitandū itaq; hoc in loco est, ut ingruentē cognoscamus statū: deinde, ut præcognoscamus. Quod uerō principii morbi intellexerit Hippocrates esse, totum illud

Urina indicant concoctam quæ fit in uenis.

Decretoria signa ante coctionem quædam deesse dicuntur.

Febres esse affectus ueniosū generis.
Urinæ esse speculandum in febribus.
Sputa esse inspicenda in pleuritide.

Principium prout in nigro morbi, ex transitu signi determinatur.

Augmentum tempus quod fit.
Statu quo febrem monstrantur tantum morbi parti declinatio.

Decretoria signa ante coctionem ueniositatis, non magis per crīsim inueniunt morbos.

Coactionis indicia, quædam tempore apparent, alia apperunt.

Status morbi esse cognoscendus atque præcognoscendus.

tempus quo ipse morbus est crudus, colligere ex hac eius dictione licet. Cōcōcta medicari & mouere, nō cruda, nec in principijs, modō non gliscant. Eōdē illa pertinet: Quicquid infirmationes statim in principio morborū soluere tentant, ex eo quidem qd distēnt est atq; inflammari, nihil admittit: neq; enim cedit cruda adhuc p̄sio: quē uerō morbo resistunt, & sana sunt, colligere faciūt. Præfines autē manifestū aliquē terminū ultimæ parti ascensū, quemadmodū fini, si ita-
tus indicia in p̄exeris, meminere siq; Hippocrati-
carū admonitiōnū, quibus ait: In principijs quidem omnia suūt imbecilliora, in statu uerō, fortiora. Ad hæc: Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores. Cōtingit autē nōnunq; duas accessiones, ubi maximæ aliarū factæ fuerint, inuicem uerō æquales, circumscribere ipsius uigoris tempus: nōnunq; uerō unā omnīū aliarū præcedentiū reliquarūq; frequentū, esse maximā. Ad tres autē extendi accessiones uigoris tempus, in morbis acutis nō admodum accidit: in diuturnis uerō, nō modō ad tōidē, sed ad longē plurimas. Alui igitur excrementū optimū (aut Hippocratis) est molle atq; coniunctū, quod ea hora exierit, quæ tempore sanitatis consueuerat. Quantitas uerō eius, sit pro ratione cibi assumpti. Tale enim uim cōcoquendi in inferiori uentre ualidū liquidū ostendit, ac digestionē optimē fieri, nullamq; uentris partibus inflammationē inesse. Nō meminit autē coloris ipsius excrementi, quoniā nō magnā uim habet ad inferioris uē-

Infirmationes non esse statim in principijs soluedas.

Incrementum non esse statim in principijs soluedas.

Vigoris latitudo in morbis, quanta esse solet.

Excrementum alui laudabile quale nam esse debeat.

Excrementum color, non magis uim habet ad inferiorem uentre ualidum dispositionem.

Excrementum incoctum alui, quale nam esse solet.

Excrementum alui speciem plures præ se ferat.

Excrementum uoluntate facit, uoluntate putrefactionem inducit.

statulentum spiritus colluctat cum humiditate. Ac primū sanē immoderatē caliditatis corpus colluctans: secundū uerō, est inæqualis perturbationis effectus. Variū autē, uariū corpus affectibus esse obnoxium ostendit: & ob hoc ipsum, & diuturnū & malignū existit. Etenim simplex affectus facilius cōcoquitur, & minus est, q̄ multis formis, periculosus. Vinarū autem illa optima est, quæ uirgū sanorū simillima. Quicquid uerō nō est talis, simpliciter est incocta, uel præter hoc, etiam pernicioſa. Vinarū igitur optimē coctā, in ijs qui sup̄mū sanitatis obtinēt gradū ex plorare oportet. Talis enim est subruſa, uel subdaua: magisq; subruſa q̄ subdaua: statim enim & hæc mediocrē crassitudinem possidet. Nam quæ hæc ipsa crassior est, aut tenuior, coctionē imperfectam significat. Si quidem altera nondum in humorem cōuerſa est, altera uerō adhuc cōturbata existit. Cæterū cū triplex sit uinarū rurbiditatis differentia: quia uel cūm tales mixtæ fuerint, paulo post resident, uel semper similes permanent, uel puræ quidem mingunt, postea uerō conturbantur: praua quidem ex dictis tertia, bona autē prima, media uerō inter utraq; est secunda. Si quidem quæ statim resideret, parū aliquid inæqualis turbulentæ superesse demōstrat: quæ uerō semper manet similis, uigere adhuc quæ est in sanguine agitantē ostendit. At quæ extrā conturbat, debet incipere cōcoqui: quare *merito determi-
ma est: nam longiori tēpore, & uirtute forti, indiget ad coctionē. Porro quæ ad summū incocta est, has omnes malignitate superat: est etiā quæ exquirit: ac proinde uelū desperatæ coctionis accidentē, affectioiq; uenose nature existit: *quemadmodū uētris, cruditas. Vbi uerō urina ipsa *celeriter mingit (hæc enim p̄sio dicitur) & diabete uocatur: estq; talis, qualis circa alui uē-
sinorū læuitas: nempe extinctio uisualis uirtutis, retentrix simul & alteratrix: tunc sanē indet omnes urinas crudas ac p̄sima existit. Sed post ipsam est aquosa, quæ quidē solius facultatis alteratricis imbecillitate demōstrat. Huic proxima est altera urina, quæ in multis apparere morbis, ut uideat mistam habere formā uim tenuis & albi. Gignitur autem ex ipsa alba & aquosa, ut quæ paucum liquorē ex bili rufa suscepit. Atq; hæc sanē urina proximē accedit ad erudam. Post hanc est suppalida. Pallida uerō iam & subruſa est. Optima autem omnīū urina, subruſa & subruſa existit. Etenim cūm adhuc coquit sanguis, urina quæ mingit, læuem, æqualem, albā ac multam facit hypostasin. Perfecta coctione, color quidem urinx intenditur, minus autē subfideat. Quod si diutius homo à cibo abstineat, urina magis rufa reddet: si quidem quicquid alimenti supra modum calſit, præsertim si dulce fuerit & pingue, in amarum bilem conuertitur. Porro cō rufusad flauū proximē accedit: in hoc autem differūt, quod rufus quidem magis ad albū, flauus autem ad splendidum uertit. Quantū uerō flauo rufum est albius, tantū illo pallidū. Quantū rufus minus album est flauum q̄ rufum, tantū flauo rubicundū. Iam uerō in pueris serē omnibus, & perfectam ætatē habentibus, qui ocioſam uitam degunt, aut quouis alio modo sunt
pleni,

Excrementum variū variis corporis affectibus esse obnoxium ostendit. Vinarum quæ sit optima.

Vinarū turbiditatem differentia triplex.

Vrina cruda.

Diabete.

Vrinarū erudam quæ existat postea. Vrina aquosa.

Vrina suppalida. Vrina pallida. Vrina subruſa & subdaua, non quousa existit.

Coloris rufi speciem differunt.

Color flauus. Color rubicundus.

Urina a qua
bus habetur sub
sidentiam pluri
mam.

pleni satis multū habent urinae subsidentis: quia
in his omnib. plurimū crudi humoris colligitur.
Quare ipsi qui ex ocio & repletionē febriunt, si
sanitati restitui debeant, in urina plurimū neces
sariū subsidet. Contra ipsi, qui ex inedia & labore
rubida simul & biliosa urinae excernunt. Soluitur
quippe morbus plerumq. priusquā subsideat
aliquid: sufficiens in his nebulā, & suspensio o
prima, qualis est alba, laevis, aequalis. Nec uerō u
rimam rufam, simpliciter uideat. Aut Hippocra
tes, sed quādiu rufa simul atq. subtilis esset: quod
tunc cruditatem significaret. Ceterū quae fari
ngoraeae crassiori in urina sunt subsidentiae si
miles, grandis colligationis & ardentissimi in
cendij sunt signa. At quae folia representant, sunt
uaporum partes superficiales, quae scilicet corā
buerunt. Ite & fursure: nisi quoddā illis crassio
res atq. minores sunt. Nigra uerō subsidentia,
uel excedentē caliditatē, atq. ignem ostendunt:
uel ex frigidityte uelociter, extinctionē. Pessi
ma igitur est omnis denigrata urina, adeo ut ne
minem unquam seruauim uiderim, ex ipsi qui ta
lem minxerūt. Minus uerō perniciosa est, si sola
sit hypostasialis nigra: atq. adhuc minus, si solidā
id quod in medio pendet: ac multo minus etiam
si nebulā. Color uerō urinae fit in transitu ad ni
grum, * etq. uelut quoddam initij nigri. Nam
si morbus malignus fuerit, & uomitibus, & alui
excrementis, & urinis uiridibus, postmodum ni
gre superueniūt. Color autē liuidus, est tantū fri
giditatis effectus: odor grauis, putrefactionis.
Quod si ueluti oleum mingat, colligationis: e t
signis tales quidem urinae praeuē sunt. Quae au
tem bono colore sunt praeclara, & subsidentias
habent albas, & laeues, & aequales, aut nebulas
quasdam, aut suspensa similia, omnes urinas bo
nitate praecellunt: & praefertim in quibus subsi
dentia laevis fuerit. Secundā bonitatis obtinent
locum, in quibus suspensa sunt talia. Tertiū, in
quibus nebulae. Haec igitur coctionis sunt signa.

Urina nigra cui
amali possima.

Viridior color quo
modo fiat.

Urina liuida
Urina fusa
Urina oleagino
sa
Urina optima.

Coctionis signa.

Subrufa urina
Sublaevis urina.

Subrubea urina

Urina quae in
terro dicitur: mul
tibus, & quae
item parui re
tinali carystae.

Urinas in istis
non poterit, nisi
praefatur statu
morbi.

Reliquae uerō omnes partim cruditatem, partim
perniciem portendunt. Nam quae alba, & quae te
nuis, & quae turbulenta, cruditatem. At quae fari
ngae hordei crassiori, aut folijs, aut fursuribus si
milia habet: quaeque nigra, aut uiridis, aut liuida,
aut oleaginea, aut fetida est, petniciem signifi
cat. Subrufa & subliuida, si tenuis sit, media est in
ter exacte coctas & crudas: sicuti & illa etiam, in
qua alba quasdam & laeua supra efferuntur, aut
subsident: diuulsa uerō, minimeq. libi continua:
siquidem morbum semicoctū ostendunt. At sub
rubeae urinae, habentesq. itatim subrubeam atq.
laeuam hypostasiam, sunt quidem salutaree satis,
sed semicoctis ipsis diuturniores. Iam uerō in ui
ris quidē atq. mulieribus, urinae nigrae sunt pessi
mae: in pueris autem aquae similes. Quoniam igit
ur neg. signum ullum ita fidele est, ut exquisitē
ostendat singula ex futuris temporibus: nec quē
secundum concurfus signa sunt complicata, sola
possunt iudicari experientia: idcirco necesse est
signi cuiusq. naturā accuratē considerare, si quis
uult rectē praecognoscere, ut ex ipi uiuiscuiusq.
praecognitionē faciat. Etiam si fape unum signū
forte, multis debilibus fidelius exiit. Omnino
autē malē quis uictū inistuer, nisi per fida signa,

statū futurū praecognorit. Triple x in uniuersum
signorū omnū est differentia. Nōnulla siquidem
cruditatis & coctionis sunt signa: nōnulla salu
tis & mortis. tertiū autē signorū genus est, quod
crisisbus adiacet. Coctionis igitur cruditasq. si
gua, alui excrementa, & urinas, & spura, statuer
oportet. Mortē autē atq. salutē nunciante sunt,
quae unā cum his excernunt, & quae per totū ap
parent corpus. Quāto autē crises attinet, aliquid
quidem ualent nōnulla ex his: est tamē propriū
atq. praecipuū eorū signorū genus. At cruditatis
atq. coctionis signa, propriū uim habent semper
stabile, siue itatim in primo die, siue in sequētib.
apparuerit. Quae dam itaq. horū signorū in uri
nis, & alui excrementis, & spuris apparent, quae dā
in dispositione totius corporis inueniunt. quae
dam in naturalib. & animalib. conspiciunt op
erationib. Haec tamen nō omnia fideles sunt, in o
mnibus morbi temporib. Etiam criticorū sym
ptomarū duplex natura est. Siquidē eorū aliqua
sunt tanq. causae & signa: aliqua tanq. signa dun
taxat. Infida uerō est uniuersa eorū natura, & cō
traria significans in diuersis morbi temporib. In
his autē totū est praecognitiōis studiū. Nam in
alio quiddā tempore secundū aliam dispositionē
crises sunt: secundū uerō aliā dispositionē, sym
ptomata, uel signa praua sunt: crises autē non
item omnino. Coctio igitur celeritatis crisis, & cō
lubrem fecundatē significat: cruda autē & inco
cta, & in malos cōuersa abscessus, crisisū defectū,
aut uehementes labores, aut mortes, aut eorū
dem malos reuersiones. Porro si quis primo sta
tim die, nullū habens signū periculosum, sed po
tius salutaria omnia, acutē quidem febriat: uri
nam autē mingat bene coloratā, ac medio critere
crassiam: certe in primo quatuor diebus critem
et habiturus: & ed magis, si nebulā aliqua uel su
spensio optima in urina uidetur: magisq. adlu
c, si hypostasialis bona fe ostendat. Cuius rei nō igna
rus Hippocrates, ait. Mitissimae febres, quae cum
signis incursisimis sunt, quarto solunt die, uel
prius. At quae malignitate excellūt, & cum signis
grauissimis accidunt, quarto die uel citius occi
dunt. Sicuti igitur quae omnia habet signa turis
ma febris acuta, in primo periodo deterioriorū
dierū solutionē habet: sic quae isti proximē adia
cet, dā septimē nō transcendit. Similiter etiā ma
ligna, & cum grauib. facta signis, quantū absit
a malignissima, & cum grauisimis a cedente fi
gnis, tantū tardiorē mortē inducit. Sit itaq. pri
mo die urina quidē exquirit aquae, febris uer
debilis, licet sanē in longū protrahat tempus. Sed
quantū hoc erit, in primis diebus cognosci non
potest, nec cognita est uile. At praesens principij
tēpus nō solū internoscere datur, sed etiā sepius
praecognoscere quo finietur. Atq. in his quidem
ad diuturnis, sufficiens est tempus principij
longiū peracutus extremē angustij. Nam si sta
tim in prima die, in urinis apparet aliqd signū
coctionis, iam hic principij transgressum est. Si
militer etiā acun principij, ne praecognitionē qui
dem finis inquirere oportet: sed satis parare, si
dum a deit, cognoscere possit: & cum iuprimū ad
a cēsum conuertit, manifestē deprehendat. Si ita
quae aliqd manifestū apparet coctionis signum,

Signorum differ
entia triplex.

Coctionis signa.

Signa mortis
& salutis nu
ciantia.

Deterioriorum
februm genus
habere propriū.

Criticorum sym
ptomatum dy
plex natura.

Criticorum sym
ptomatum ad
ueram esse in
dem.

Crisis celeritatis
conclusio indi
cat.

Cruditatis quid
conueniat.

Crisis in primis
quatuor diebus
accessiva, exomi
plum.

Principij in ac
tu morbi cogn
oscere ratio.

usius aliquis fuerit, hoc est, laboribus, uigilijs, curis, & anxietatibus, cibisq; paucioribus & balneis, nonne etiam in hoc ipse seipso biliosior reddetur, ac proinde calidior & siccior? Atq; sic sane quæ diximus, cõmunia sunt ardentium febrium & tertianarq; generationis. Enim tertiana accessio ab acutissimis maximè adurentibus febribus nullo modo relinquitur: sed hoc discrimen interest, quod in hac, per totum corpus bilis defertur, atq; ideo uel emena sit rigor, bilisq; superuenit uomitus, atq; urinx & sudores biliosi adfunt: in alijs uerò adurentibus febribus, quæ nullam habent intermissione, flauis bilis in uasis una cum sanguine continet: id quod certè est in causa, ut tertiana febris per sudores uomitusq; finiarur: in adurentibus autè, singule accessiones ad infesticationem nō perueniant: quoniam qui earum est causa humor, nō expurgat. Sed quando in his bilis agitur uehementius, ac ueluti effuerit, at naturæ inualecente impellitur, tunc rigor superuenit, & febris soluitur.

Nam ardens febris, si superueniat ei rigor (ut inquit Hippocrates) soluitur. Quod uerò non modo causa frigida, sed acris etiam & calida, rigore faciat, in libro de symptomatibus causis ostendimus. Etenim acres & mordaces humores uehementius emoti agitant, & per sententia corpora uolenter delati, stimulant, pungunt & feriunt: atq; hunc sensum inaequalem, rigorem, cõsuetudinem inuehit.

Tertiana itaq; febris, quæ ex flaua bile mota ortū habet, rationabiliter statim ab initio rigore affert nō mediocrè: hoc ipso primū à quartanæ rigore differet, quoniam in illa quidem pungi uidetur ac percipi corpus (talis enim est in tertianis febribus sensus rigoris) in quartana autè febre tempore frigefactionis habet, qualis per gelu, tempore hyerno sentitur. Quippe in quartana febre atra bilis redundat: sicut in quotidianis, pituita. Tertianā igitur febrem "minime quidem licet absq; rigore uehementi, pungeat atq; sentiat carnem, oriri. At quartana febris nō primo statim die cum rigore inuadit uehementi, sed progrediente ipsa, atq; aucta, undè etiam rigor quidam grauis, ac ueluti ossa cõrunt, augetur. Quartanais autè nō comitatur rigor, nec in initio, nec in progressu, sed frigefactio duntaxat. Præterea quartanæ febres paruas, debiles, tardos & raras adeo pulsus efficiunt in inuasionibus, ut nulla altera dispositio: tertianis uerò parui quidè ac debiles, tardiq; ac rari, cum inuadunt, pulsus necessario adfunt. Verū tardius ac rarior nō paruo ab ipsi intervallo relinquuntur, quæ in quartanis accidunt. Nam in quartanarum principijs uidebitur tibi arteria quodāmodo ad interiora retracta, impeditaq; in tertianis uerò, nec aliquid tale percipitur, tarditasq; prope accedit ad eum qui secundum naturā est motus: ac præterea certus ordo æqualitatis pulsibus inest. Habet etiam tertiana febris per incrementa, æqualem liberamq; celeritatē: statimq; ad magnitudinē atq; uehementiā exeat, inuis omnibus frequentius correspondente: neq; ipsi ullū adeit inflammationis signū. Jam igitur & firmi uelut, & hominē exurit, & paulo pōt in rigore consistit: calor æqualiter quaquæuersim extendi-

tur, nihilot; plus thorax extemiratur calet: & si manum imposueris, in primo occurru quidem percipit calor multus & acris, qui ueluti quoddam cum uapore efferatur: paulo pōt uerò superatur à manu: non ut in febribus malis & adurentibus accidit. Ac iam sanè bibendi tempus ægrotanti instat: statimq; post portū plurimus uapores calens per cutem exhalat, sudoris nuntius, bilisq; superuenit uomitus, uenterq; soluitur, & bitionum mingunt. Incipit itaq; sudor uapidus, calidusq;, ueluti in balneis: totum uerò ipsius corpus æqualiter sudat, talisq; est pulsus, qualis in ijs qui rectè ualentes exercitant & balneant: uelox scilicet, magnus, uelut emens & creber. Sed præter hæc omnia statim ad infesticationē definit, uniuersum accessionis tempus ultra duodecim horas nō protrahens. Scpius autè septem horas accessio cõtinet. Nōnunq; citius aut tardius, sed non muled, finitur. Descripsimus itaq; ueram & exquisitam tertianam. Quod si urina reddat rassa, aut subflaua, apparet; crassitudo mediocrius: ac paulo pōt, uel albam nebulam, uel suspensionem optimam fecerit, febris ipsa ultra quartū circuitum non progredietur. Rustiore uerò urina existente, neq; suspensione aliqua, nec nebula in primo circuitu apparente, ad septimum extendetur. Quod si præter alia signa, in urinis appareat subdēntia leuiss, æqualisq; circa primū statim diem, ultra tertium circuitum ipsa febris nō diuagabitur. Ingreunte autem accessione quartana, eximia quædam ad tarditatem ac raritatē sit pulsuum conuersio. Solut peror quartanæ febris maximè oriri in autumno, præcipue si tempus ipsum frigidum & siccum, & inæqualem fore statuitur temperaturam. Quod si etiam regio talis febrium sit generatrix, & ægrotans natura atq; bili obnoxia, talisq; uicius ratio antecesserit, quæ huiusmodi aggregat humorē, & si eo tempore quartanæ febres populariter fiant, homioy inenofus fuerit, uel febres erraticas passus: si augmentum & status plurimū contraria fuerint, & necty & albæ & aquosæ urinx reddantur: si inquam hæc omnia in prima accessione adfint, quartanam esse febrem non dubites. Sed quotidianam à tertiana distinguere facilius est. Neq; enim primo statim die cum rigore inuadit, sed progressu temporis refrigerationes potius quam rigores ipsas adueniunt: neq; ullus ordo aut æqualitas pulsibus adfuit, cum primū accessiones fiunt. Sed nec deuri laborantes, nec denudare corpora, & pallia laxare cogit: nec multum ac frequenter respirare, ac uelut flammam exte efflare, frigidumq; potum expetere. Verū isti cum febricitant, minime simunt: uixq; ipsi in primis diebus tales sunt, quales quartanis incipientibus adfunt. Atq; in primis diebus minime sudant: sed progrediente tempore hoc etiam illis aduenit. Eget autem hæc febris, natura humidior, uitaq; ociosa, & plena crapulis. Quare in pueris assidue sit: ac petrarum est, quin & ouentriculi, & hepatis in ipsis male afficiat. Sed & cruditates anteedunt plurimæ, & coquendi moræ, & acidi rutus: & cum primū feluire incipiunt, præcordia ultra naturalem habitū intumescunt, Color lis cum pallore albus: taliumq; morborū

Tertiana corruptio
quo accessio
non tempore est
pau dauda.

Tertiana accessio
ultra duodecim
horas non protrahit
horas.
Tertiana exquirit
descriptio.
Tertiana breuiss
soluuntur quæ
rime indicant.

Quartanarum
febrium signa et
descriptio.

Quotidianæ
febris signa et
descriptio.

Quotidianarum
febrium indicia

Quotidianæ
ariditatis pericula
inuadunt.

Febres ardentes
et tertianæ quæ
egnant.

Tertianarum ad-
urentium febrium
descriptio.

Ardens febris si
superueniat ei ri-
gor, soluitur.
Uigilium fieri à
frigida & calida
causa.

Tertianam fe-
brem oriri à fla-
ua bile per cor-
pus mota.
Rigor tertianæ
et quartanæ quo-
modo differant.

Quartanam si
qui à bile atra.
Febres quotidia-
ne sit à pituita.

Quotidianæ nō
cum rigore, sed
ex refrigeratione
quantum in-
uadunt.

Tertianarum
quartanarumq; se-
cundum pulsus
descriptio.

Tertianarum si
gna & sympto-
mata.

Quotidiana
quo praecepti
quantur tempo-
re.

Ardentium ex-
quisitarum ex
tertiana febris
descriptum.
Continua quo-
tidiana descriptio.

Continua quar-
tana descriptio.

Continuarum
ex intermitten-
tium febrium di-
ferentia, secundum
modum genera-
tionis.

Febris tertiana
est, quae ad in-
ferocitatem, prius
quam solvatur,
non desinit.

Durum febris.

Tertiana pura
inter septimum
circum flexibilis
est.
Febris durior
nae quae.
Febrim simpli-
cium tria gene-
ra.

Febrim generi
compositum, cum
duobus dupliciter.

Febris quomodo
inter se miscetur.

hybernium tempus est ferax, & status temporis humidus, & eiusdem naturae locus: sitq; accessio-
num principii circa uesperam. Ita quidem quo-
tidiana, tertiana, & quartana, prima die inuicem
discernunt. Continuas autem febres, quae idem
genus cum his quas diximus habet, similiter pri-
mo die uir ex citatus cognoscit. Etenim ex quo-
tidiana ardens, cum omnia alia seruet exquisitae ter-
tiana indicia, eo solo differt, quod neq; cum ri-
gore inuadit, neq; ad infestationem definit.
Quae uero quotidie accessionem facit, quando
temporis statum, & aetatem, & naturam corpo-
ris, & uictus rationem antecedentem, ac prae-
terea pulsuum formam, coloremq; eundem habue-
rit cum exquisitis quotidianis, non peruenerit
autem ad infestationem, idem genus cum il-
lis obtinet. Eodem modo & quae quarto quoq;
die accessione facit sine ulla intermissione, nul-
la interposita febris quiete, eiusdem est generis
cum quartana. Et palam est, quod nec rigor in
ea accessione antecedet, neq; sequitur sudor.
Quae igitur in sola flaua bile febris accendit, sine
aliquo affectu uisceris, illi quidem manente adhuc
intra uasa bile accendat, exquisita febris ar-
dens dicitur: si uero per totum corpus defera-
ta, tertiana. Sic & si ab atra bile febris, cum per
totum corpus delata fuerit, quartana efficit: cum
immobilis, illa quae quarto quoq; die excrecit:
quodammodo si ex pituita ortu habet, uel quo-
tidiana sunt, uel quae accendunt singulis diebus.
In uniuersum autem uoco continuam febrem, quae
ad infestationem, anteq; ex toto solvatur, non
desinit: est declinatio aliqua sensibilis in ea de-
prehendat. Cum uero nec declinatio aliqua sen-
sibilis fiat, semper uero ad primo principio febris
uisq; ad crifim similis perleuerauerit, erit haec ex
genere februm deurentium, ab nsdem uero acutae
differt. Sed nec in primo die, nec in secundo die
huiusmodi febrem praecognoscere, nec aliter uti
le. Sae enim est genus agnoscere, q; scilicet bilio-
sa sit, deurens, & peracuta. Atq; liuius generis fe-
bres omnes in prima septimana disjucantur:
si uero tertiana pura fuerit, intra septimum circui-
tum. Omnino autem de uertice sunt, & quodiana
intermittens, & illi aduerteris continua, sicuti
& quartana, & quae per quartum excrecit. Quae
tertia erunt uniuersa simplicium febrium gene-
ra. Singula uero ipsorum in duas primas differen-
tias scinduntur: uel enim intermittentes, uel fe-
bres continuae erunt. At si morbus compositus
fuerit, non aequè facile cognoscitur. Dupliciter
uero genus febris compositum constituitur: in pri-
ma quidem sephone, uel quia ex quas diximus
febres citra aliuicuius membri affectu miscetur:
uel quia ex membri cususpium inflammatione ac-
ceduntur. Quae igitur citra membri affectum
constituit, dupliciter comiscetur: aliquando im-
plicatae, nonnunq; uero per se totas confusae. Sic
quoq; membra infestata: nam ex ipsa quaedam
sanè ueluti complicatae tantummodo, quaedam
uelun confusione quaedam habent dispo-
sitionum. Ac febres sanè, quaedam complicantur
unius generis cum alijs eiusdem generis, uel unius
speciei cum alijs eiusdem speciei. Contingit uero
nonnunq; ut etiam differentes miscantur, Nam

quotidianae tertianae, & his quartanae, & quae ean-
dem speciem seruant, inuicè plerumq; implicant.
Quo fit, ut idem homo tres interdum habuit
quartanas circuitus: sed hos quidem non est diffi-
cile agnoscere. Quandoq; uero aliqua ex inter-
mittentia genere cum continua, difficillimè uixq;
explorabilem facit mutationem. Porro quemadmo-
dum febres, ita & patienia loca millionem reci-
piunt: uel quia differentia membra propria singula
la febrim accendunt, ut lien & iecur: uel quia dis-
posio mista, ueluti inflammatio cum erysipela
nec species, nec genus, qd circa tertiam uel quar-
tam diem, cuius naturae sit, innotescere nequeat.
Inuadat igitur febris aliqua horrida, atq; omni-
no inaequalis in pulsibus, & in eo qui per totum
corpus sentitur calore, ut sepius propius statum
esse existimetur, uel medijs augmentis obnitet.
Rursus uero horrida fiat, & pulsus minores, debi-
liores, rardiores, atq; rariiores habeat: & calo-
rem quidem ab extremis partibus recedentem,
circa uero uentres atq; thoracè, copiosum. Hanc
non absq; ratione quispiam hemitritè fore spe-
rauerit, uel potius iam esse: à multis autem ter-
tio die noscitur. Sed haec quidem mixta est, ex bi-
liosa pituitosaq; febre, non inuicem complica-
ta, sed per se totas confusis. Quae autem ex com-
plicatione fit, quadrupliciter constituit. Vel enim
tertiana quotidiana comiscita: uel ea quae quoti-
die accessionem habet continua, illi quae per ter-
tium continua est: uel tertiana ei quae singulis die
bus accessionem facit continue: uel quodiana
ei quae per tertium continua est. Si qua uero febris
in primo die exquisita tertiana deprehensa, dein-
de sequenti die similem priori omnino fecerit ac-
cessionem, haec duplex tertiana existit. Sic autem
& duae & tres quartanae sepius inuicem compli-
cantur, quae accessionum forma à quotidianis di-
stinguit. Tria igitur sunt omnia quae ex humoru
putredine febrium accendunt genera: quaedam
enim ex flaua bile (huc plurimè sunt) quaedam
ex atra, quaedam ex pituita consistunt. Aliarum au-
tem omnium febrium uarietas, ex miscella horum
humorum nascit. Ad ephemeræ & haec febres,
alia duo constituunt genera, ab his, quae dicuntur
acutae febres, distincta. Porro febris acuta, uel illi
quo dictorum humoru copulantescent, uel mem-
bro phlegmone obfeso, gignitur. Mirantur au-
tem nonnulli, quod possit intermittens febris cum
continua misceri, quodq; nulla intermissione ac-
cedente febris, interdum solè intermissione mu-
tuò inter se miscant: id qd accidit non in tertiana
tantum, aut quotidianis intermittens, sed etiam
in ipsius quartana. Cum enim plures inuicè
copulantur, siue eiusdem generis, siue diuersi, acci-
dit ut febris secunda plurimè anticipet aduenire,
anteq; prima in exactam integritate desinat.
Deinde rursus tertiam eidem succedit, antequm
perfectè soluatur. Hoc uero maxime accidit in
longioribus accessibus. Etenim trium tertiana-
rum complicatio, in secundo statim die nobis

Quarta autem con-
tinua tribus
prope totum con-
ditiq; simul ho-
minem occupat.

Patientia loca
quomodo affe-
ctus suis imple-
rent.

Flumini autem fe-
bris descriptio.

Flumini autem con-
flare ex biliosa
pituitosaq; febre
per se totas con-
fuso, uel ex quibus
inter se complica-
tione: quod fieri
quadrupliciter
potest.

Tertiana duplex
quando ad
esse dicatur.

Febris putrida-
rum tria genera

Febris acuta qui
bus prius ex oc-
cupatione possit.

Februm quæ ex
loci patientiæ
accidit ut formæ
esse compositæ
Pleuritidis gene-
ralis, signa, &
symptomata.

manifestè est conspecta. Earū uerò februm quæ
ex locis patientiæ accidunt, forma composita
est. Quædam enim loci indicia præ se ferunt. quæ-
dam autem eius, ob quam consistunt, causæ. Veli-
t in morbo laterali locus quidem patiens est,
costas succingens membrana. Quæ quidem cum
inflammata sit, necessariò dolorè inuehit, & quoniam
neruosa est sed hunc pungentem, & longè
extensum, quoniam pars affecta, est membrana.
Quæ quidem cum unum sit ex spirandi instru-
mentis, necessariò difficilem habebit respiratio-
nem animal. Quia uerò & cordi & pulmōi pro-
xima est, necessariò & febricitabit, & statim infe-
stabitur tussis. nō tamen statim expuet. Sed si qui-
dem multū ac crassum ab inflammatione defluxe-
rit, tunc tussis expuet. si uerò paucū & tenue, irri-
tabitur quidem necessariò, ita ut tussis moueat:
nō tamen expuet, anteq̃ collectum simul atq̃ cō-
coctum ad multitudinē crassitudinemq̃ perue-
nerit. Nunquid uerò magis pituitosus sit, uel bi-
liosus humor, is qui inflammationē facit, ex for-
ma spūtorū cognoscens. Nam si spūta sint spūmo-
sa, fluxum maximè pituitosum ostendunt: fluxu
autem, biliosum impermixtū. quæ uerò rufa sunt,
amaram quidem & ista referunt bilem, fed non
paucam serosam humiditatem cum bile misceri
significant: & multo ampliore, quando palli-
da quis expuerit. Sic & nigra, atra bilis fluxum
ostendit. sicuti quæ magis rubida sunt, plurimū
quidem sanguinis: minimū autē amaræ bilis, in
eo qui inflammationē facit, cōtineri significant.

Spūtorum colo-
res ostendit dif-
ferentia humo-
rum quoniam
pleuritidis.

Spūta minora
quoniam sint in
pleuritide, &
quæ extrahit
magis.
Pleuritidis pul-
sū quærit.

Febris diuina.

Februm longi-
tudinem & for-
mam depre-
hendit posse ex na-
tura humorū
quibus generat-
ur, uel diffusi-
onem partium
quibus procedit.

Crisis repentinæ
uiciorū cal-
idarum febrium
sunt propria.

Atq̃ ideo inter omnia spūta hæc sunt mitiora: si-
cuti nigra, magis exitiabilia. Pulsus igitur pleuritico-
rum, qui quidem duram præ se fert tensionē,
neruosi esse locum affectum ostendit: quā uerò
terra similis est, inflammationis affectū. Quā
uelox simul & frequens, ac magnus, ad inflam-
mationem consequi febre. Quā singula quæ
diximus, maiora aut minora sunt, uel magnam
esse, uel parum ostendit dispositionem. Igitur
aut simplex est febris, aut cōposita uel cum loco
patiente, uel ephemeræ, uel hecetica. Si simplex om-
nino fuerit, humoris indicia affert, ex quo geni-
ta est. Si uerò composita, ex quot simplicibus fe-
bribus composita est, totidem numero humorū
multitudinem indicabit. At si hoc indicet, illud
etiam significabit, nunquid morbus diu dura-
bit, an cōdō finietur. Nam si humor pituitosus ex-
titerit, necessariò diuturnus erit: longè uerò ma-
gis, si atra bilis naturam referat. Quod si ad fla-
uam bilem inclinet, minimè quidem diuturnus
erit. Sic & locus patiens, qui quidem motu multo
exercetur, calidusq̃ est, ac rarus, & principa-
tum gerit, acutiores fore morbum portendit.
Qui uerò neq̃ in motu continuo est, frigidusq̃
ac densus, & sine principatu existit, ad longius
tempus debere extendi significat. Eodem modo
& dispositio, si quidem difficilem motum ha-
buerit, frigidiorq̃ fuerit ac densior, diu duraturū:
si uerò tamen facile moueatur, calidiorq̃ fue-
rit, & rarior, citò solum iniri. Similiter & de cau-
sis est iudicandum. Eas igitur quæ cum magno
ac repentinò certamine fuerit solutiones morbo-
rum (quæ præcipuè crises uocantur) febrium ea-
rum quæ ex calidis humoribus accendunt, pro-

prias esse est putandum. Post hæc, earum, quæ-
cumque morborum sunt principatum habentū,
facile mobiles caliditq̃ dispositiones. Epheme-
ræ uerò & heceticæ febres, sine magna perturba-
tione, & minimè subitas faciunt permutationes.
Ergo in omnibus inflammationis particulis consi-
piano ipsa, quæ locum probè distat prohibet,
statim quidē putrefacit humores, simulq̃ quæ-
dam calorem excitat, qualis & in reliquis omni-
bus putrefcentibus gignitur. Cuius caloris mo-
dus, cum simplex fuerit, necessariò alius earum,
quæ diximus, febrium assimilatur: uel potius
una ex illis est, uel ad amarā bilem, uel ad atram,
uel ad pituitam atinens. Omnino enim humor
qui inflammationem efficit, uel fluxu bilis est,
uel atræ, uel pituitæ. Si igitur impermixta mul-
tæq̃ fluxu bilis fuerit, tum facit erysipelatæ, &
eos qui herpeset nomini sunt sicuti si nigra, can-
cros, & phagedænas, aut elephantos, aut aliquē
ex his ad eū incurabilibus morbis. Quæcumque
uerò ingruente pituita in tumorem attolluntur,
hæc ærdemata nuncupantur. At qui sanguis atræ
bilis est permixtus, duras gignit inflammationes:
erysipelatibus uerò similes, qui amaræ: infarctas,
qui pituitæ. Cū uerò ipse secundum naturam
se habens sanguis, trusus in locum fluxioni ob-
noxius putruerit, hic quidem affectus inflam-
matio est. Simplex uerò ex ipsa febres accendit,
maximè ephemeris similis, quæ ex inflammatio-
nibus inguinum accidunt: nam & ipsa inguinis
inflammatio ex optimo sanguine fit. Liqueat au-
tem, quod cum hic putrefcere & exipere, non am-
plius bonus remanet, fed iam ad amarā bilis na-
turam transit. Atq̃ in hoc illud seruatur, triplex
esse genus uniuersum simplicium febrium. Quæ
enim ex sanguinis putredine fit, iam quodam-
modo biliosa est. Etenim sanguis ex moderato
calore gignitur: fluxu autē bilis, ex maiore: atra
uerò, ex impelle immo dico. Quicquid igitur pin-
gue ac tenue in sanguine est, sit fluxu bilis: cras-
sum uerò, ac uelut lax, quando immodicè exa-
ruerit excalcatum, atra. Fluxu enām bilis quan-
doq̃ in atram cōuertitur, cum assata fuerit. Om-
nes igitur quæ in particula aliqua accenduntur
febres, unum aliquem ex dictis, uel simplicē, uel
compositū charactērem habebunt. Qui uerò sin-
gulas per se febres exquisitè cognoscit, earum is
missionem nō ignorabit. Ephemeræ febres so-
lus spiritus sunt passionis, absq̃ humorū putre-
dine, aut membri inflammatione, nisi inflamma-
tis inguinibus accidunt. Earum autem genera-
tionis sunt occasiones cōmunes, uigilæ, crudi-
ditas, tristitia, amor, cura, iracundia, deusio, re-
frigeratio, lassitudo, ebrietas, & quæcunq̃ simi-
lia. Cōmuniter omnium pulsus promouet ad paru-
itatem atq̃ frequentiam, & nonnunq̃ ad magni-
tudinē. Exquisitè autē seruatur eam quæ secundū
naturā est, æqualitatem, mollitiem, & ordinem.
Sic & urinæ, nōnullæ quidem, suspensiones, nō-
nullæ uerò subdentes bonas habent, quædam
autē nebulas. Omnes uerò probè colorare sunt,
sicuti & in omnibus calor uapidas est: atq̃ ad o-
mnibus ipsis absunt maligna accidentia. Cōmu-
nes autē sunt omnibus & urinæ rufiores. Cæteri
ijs qui ob tristitiam febricitant, acrimonia potius

Constitutio fe-
brum quæ a ratio-
ne gignit.

Inflammatio
gignit uel fluxu
bilis, uel atræ,
uel pituitæ.
Illa quæ edat
tumores.

Atra bilis qua-
les tumores gē-
nat.

Pituita gignit
ærdemata.

Sanguis produ-
cit propriè dictā
inflammationē.

Sanguis putre-
factus ad ama-
ræ bilis naturā
transit.

Humorum gene-
rationes atq̃
transmutationes.

Februm mitio
non non ignora-
bit, quæ singulas
simplicia cognat.

Ephemeræ fe-
bres solus spiritus
sunt passiones.

Ephemerarum
febrium causa.

Ephemerarū fe-
brum indicia.

*Tristitia quæ
signa arguant.*

*Oculorum ex
signis, sanctorum
animi affectus
arguant.*

*Vigiliæ macer
tationum signa.*

*Vasanderum
signa.*

*Febricitis ex
lassitudine si
gnis.*

*Ephemeræ ex
depressa ente.*

*Ephemeræ ex
bubone ut et
quæ arguant.*

*Hebeticum fe
brim nulla sit
stans in pro
gressu.*

*Crisis per ex
cellentiam dicitur
sobita promota
no morbi ab
soluta.*

Crisis mala.

*Crisis imperfe
cta.*

*Crisis optima sit
cum sobita ex
cretionibus aut
effluuiis dicitur ab
soluta.*

*Crisis prae
uicinia sympto
mata.*

adest, quæ multitudo caloris: sicuti ipsi qui ob iram,
contrario modo. Sed & tenuitas corporis in ipsi
qui tristitia, quæ in ipsi qui curis exarati sunt, manifestus
apparet, & oculorum cœcitas, & insolita quædam decoloratio. Et hæc quidem cœcitas omniū
etiam aliorum, qui quocumque modo cogitationibus implicati fuerint, indicia sunt. Sed præcipue
ex oculis sunt discernendi: licet enim ex his etiam in sanis
animi affectum cognoscere. Eos qui nimium uigilaue
runt, distinguit decoloratio nimis: subhumida præterea
ipsi est facies, palpebrarum non facile attollitur, oculis
si habent præliumidos. Iracundis neque oculorum cœcitas, nec
manifesta inest decoloratio. Sed nec magnitudinem
pulli aufert. Eorum uero qui febricitant ex lassitudine,
cutis est siccorum, quæ in aliqua alia febrim ephemeram
merant. Quæ ex deuati cute febres oriuntur, laque
inter omnes ephemerarum in passionem astricta cō
stunt, facile dignoscuntur ex tactu: sic enim & caridæ
febres quæ ex lassitudine sunt. Caliditas autem
motus in ipsis quodammodo augetur. Earum uero fe
brim ephemeram, quæ ex bubone accenditur,
pullus maximus sunt, uoces atque frequentes, calor
plurimus, qui post statum statim ex profun
do attollitur, sed suauis. Præterea rubra facies magna
ex parte ipsis inest, & maior tumor, & urinae
subalba. Cœmunis autem his febricitantibus æqualitas
pulli. Quia uero nulla hebeticarum febrim in
primis diebus, sed in progressu temporis fit,
de illis non agemus improprie tempore.

GAL. DE CRISIBVS LIB. III.

Vbi morbus subito ad limitatē peruenit,
ex permutatio omnium prima est, atque
ideo ipsam per excellentiam crinim uoca
mus. Ex alijs autem permutationibus, quæ quidē
ad subitam mortē fit, mala crisis existit. Quæ uerō
aliquam effatum dignam mutationē efficiunt,
non tamen integram solutionē, imperfectæ cri
ses uocantur: sicuti & quæ sensim emoriente uel
uirtute, uel morbo contingunt: quæ solutiones
simpliciter, non crises uocant debent. Sola igitur
subita ad sanitatē conuersio, simpliciter crisis uo
catur: quæ fit subitis quibusdam excretionibus,
aut effatu dignis abscessibus. Quicunque enim ali
ter quieuerint, retro cedunt malignius. Antecedit
autem huiusmodi excretiones abscessus non
mediocriter perturbatur in ægrotantis corpore.
Nam anxietas, uigilia, demeritis, graues somni,
respirationes difficiles, uertigines, sensuum
difficultates, dolores capitis, colli, stomachi, &
multorum aliorum membrorum: nonnulli uerō
aurium sonitus, & uanæ iuxta oculos apparent
imagines, & lachrymæ in uoluntarie effluunt, &
urina retinetur, & labrum agitur, & aliquid tre
mulum fit obliuio præterea, & præsentium igno
rantia, & uelemens rigor accidit, & plurimum
accessio consuetam anticipat horam, & multus
æstus, sine expugnabilis sequitur: clamant
& saluti, sicuti furentes, nec possunt in eodem
situ recumbere. Deinde repente multus sudor e
rumpit, aut uomitus non expugnatus insequitur, aut
uenter subito soluitur, aut abundans fit fluxus
sanguinis, aut hæc omnia simul contingunt, un

de non paruis inuadit timor adstantes. Vigili
tate qualis fit habitura exitu præsentis crisis, agnos
cas, præsentis autem futuræ, primū ac maximē
omniū expendenda coctiones sunt ex urinis, ali
ui excrementis, atque ex ipsis sanguinibus. Quippe nemi
nem uidi intereuntē, qui præcedentibus coctioni
bus, crinim ipsam habuisset. Non tamen æqua
omniū signorum dignitas exitum danda est: sed in
morbis quidem thoracis atque pulmonis, præci
piue spūta sunt exploranda: non tamen unariū
contemplatio expendenda: sed & excrementa
sunt inspicunda. Si uerō tantum febricitet absque
aliquo uisceris affectione, & aut fit etiam aliquid
eorum quæ circa hepar, renes, uescicam, atque sple
nem habentur, phlegmone obfessum sit, maxi
mē urinis est intendendus animus. Sicuti si cir
ca uentriculum passio consistat, primū excre
menta alii inspicunda: sed neque interm sit
negligendæ urinae. Primū itaque & maximum in
stantis bonæ crisis indicium, sunt con-coctiones.
Secundum autem, quoddam aliqua die indicatio
ria, indicata prius fuerit, cui annexa sit dici ip
sius iudicantis facultas. Deinceps uerō inspec
te oportet, & speciem morbi, & morem: ac po
stea, si formæ morbi, ipsa excretio respondeat.
Etenim si febris exurens sit, uel sanguis est nari
bus profusus, uel post uehementem rigorem sud
or multus & calidus per totum corpus manabit:
aut per uomitum, aut per alium, biliosum ali
quid excreta. Ita & tertiana uomitibus & excre
mentis biliosis, & sudoribus toto corpore fluen
tibus, finiri debet. Plurimū autem perit in febrili
bus excrementis quotidianis, & multi per totum
corpus sudores huius. Finiunt autem & phrenitidem
sudor multus, præcipue si calidus & capite fluxerit,
sudante simul reliquo corpore. Contingit et
iam inter dum, ut per sanguinem fluentem & nari
bus phrenitis finiri soluarur. Non tamen lethar
gus, aut peripneumonia fluxu sanguinis amant.
Inter ipsas autem pleuritidis medium obtinet lo
cum. Lienis etiam hepatitis soluit inflammationes,
si simul adit acuta febris, sanguis & nari
bus profusus, & reliquis omnibus, quæ sub præ
cordijs fiunt, seruantes & acutas inflammationes.
Oportet autem per directum fluxu sanguinis,
ex dextra quidem nare, patiente hepate, uel lo
cis sub dextris præcordijs possit ex sinistrâ autē,
liene, & locis uicinis. Iuuat etiā & sudor bonus
omnes quæ sunt iuxta præcordia inflammationes
calidas & acutas. Hepatis uerō cœuæ quidem
partes patientes, fluxu sanguinis & nare dextra,
sudoribus bonis, copiosis urinis soluitur. Ca
uæ autem partes excrementis biliosis atque sudoribus
nonnunquam uerō & uomitibus. Sudores tamē
omnibus febrilibus proprii sunt, & præcipue
exurentibus. Finiunt autem quartanas febres, si
atra simul cum eis atque uaria excrenentur: semi
tertianas uerō, si biliosa simul & pituitosa. Sol
uunt etiam parotides, lethargos, reliquosque om
nes affectus capitis. Porro ceteri abscessus, feb
res omnes diuturnas secure soluere consue
runt. At uerō ægrotantis ætas atque natura, præ
terea uisceris ratio antecedit, locus in quo ægro
tat, anni tempus, præsentis status temporis, ue
niunt cōsideranda. Atque ex his quæ diximus licet
exer-

*Coctiones effe
expedientia, ad
excretionem præ
sentis crisis, ac
praecedentium
sunt.*

*Inter ipsi aliq
qui crisis p
aliquos præce
dentes habuisse
non uide Galen
non uagantur*

*Excretionis cor
poris, quæ in qu
bus morbus præ
sentis fuit expo
nenda.*

*Crisis bene ex
pressionem inducit.*

*Ardens febrim
soluit cum quib
us excretionibus
fiat.*

*Tertiana solutio
tionem excreto
nis soluit.*

*Quartana uerō
soluit cum ex
cretionibus ad
flectat.*

*Phrenitis quæ
excretionibus
soluitur.*

*Sanguis nari
bus, atque i
directo
profusus, quæ
soluit inflam
mationes.*

*Hepatis partes
quæ excretionibus
soluitur.*

*Sudores omnes
sunt febribus
proprii.*

*Sudores, quos
desolantes effe
ctus.*

Crisis futura praecognoscenda quae requiruntur.

Synochus febri nulli habere creditur.

Crisis cito et terribilis fieri, quae inducitur.

Calidum permutatio quae indicat.

Accessio non singula quatuor sunt tempora: vixitatio, augmentatio, declinatio.

Intermittens febris est quae ad integrum statum de facit.

Synocha febri nulla, vixitatio status existit.

Crisis salutaris aut perniciosa cognoscitur ad ipsam morbi naturam, et magnitudinem, et respirationem.

Solutio morbi, si infutura per crisis, non fecit, tunc cognoscitur perit.

Accidens superueniens, trifarium dicitur.

exercitatus uiris praesentē crīsim cognoscere. Ad praecognoscendam uero futurā, illa quae nuper diximus, unā cum natura morbi similiter expendenda sunt. Post haec autem & accessio, uel cuius ueniunt considerandi, an per tertium uel per quartum, uel per singulos dies eueniant, uel nullo modo eueniat, sicut in synochis accidit. Si enim properauerint, ac semper proportionabiliter anticipauerint horā, aut multo uehementius instauerint, & per tertium occurserint, citō crīsim subsecuturā denunciant. Si uero lente moueant, atque eadē inuaserint, & singulos dies sit, post longius tempus crīsim futurā portendunt. Præterea coctiones inspicere oportet: quarum insignis permutationes, si in diebus indicatorum accidant, indica sunt, quod sequentes iudicatorum dies ægroti absolute morbo. Minime autē contingat, febrem omnia signa securissima habentem, nec illam, in qua sunt omnia maxime perniciosa, alteram quidem nō liberare, alteram uero nō occidere in primo quaternario ægrotationem. Cūm autem unaqueque accessio quatuor habeat partes, principium, augmentū, statum, & declinationem: uel has omnes breui tempore accessio percurrit, uel tardo: uel nonnullas quidem citius, nonnullas uero ferius. Si omnes igitur celeriter peragat, manifestū in de sit, quod ad crīsim properat: omnino iū uisummodi febris est de numero intermittētis. Neque enim continē 30 ut illa quae omnes celeriter peragat, amplius continuā permaneat: sicuti neque ut quæ in omnibus partibus prolixitate seruāt, sit intermittētis. Voco febrem intermittētē, quæ ad infabricationē peruenit. Porro febres synochæ longus est status: * imō uero tota hæc febris status est. Cūm igitur morbi species, & magnitudo, & motus, & mos, inter se distinguantur: & species quidem sit ex proprijs accidentibus cognita: magnitudo uero, ex eorundem quantitate: motus, ex tempore accessionis partium: mos, ex accidentibus superuenientibus: his quoque adiuncta consideratione temporis anni, & naturæ, & regionis, & similium: nunquid morietur æger, aut seruabitur, ad hæc tria respiciens inuenies, ad speciem, & morem, & magnitudinem: sed præcipue 40 morem expendere oportet. Vtrum uero per crīsim terminabitur morbus, an non, primum quidem ex motu ac magnitudine perspicies: deinceps autē ex ipsius specie: postea ex anni tempore, & ex alijs quæ eiusdem sunt ordinis, & ex superuenientibus accidentibus, quæ uel unā cum crīsi ab initio inuadūt, uel paululum anticipant. Nam cū superuenientia accidentia diuidant trifariam: ea scilicet quæ morē morbi naturā ostendunt apta sunt: & in ea quæ adfuturam proximē crīsim denunciant: & in ea quæ nō solum signa, sed etiā causæ crīsis exsunt: primum quidem ex his simplex est genus: secundum uero & tertium nō semper, nequidem facere neque ostendere est aptum, fed variatur secundum tempora. Si æger igitur primo die habeat signa salutis manifestissima, huic in primo quaternione soluet morbus. Vtrum uero per solutionem uel crīsim, madine & paruitate distinguat. Magna siquidem, indicant omnino: parua autem duntaxat

soluuntur. At dies crīsis ex ipso motu inueniē. Nam si febris synocha fuerit, nullusq; acciderit error, sperandum est crīsim quarto futuram die. Si uero continua fuerit, magnitudine ac motu inspicere oportet. Conuenit namq; in tertio uel quinto die crīsim fieri: in tertio quidē, si morbus sit magnus, ac motum habeat uelocem: in quinto autem, si nec ualde magnus sit, nec moueatur uelociter. Oportet enim crīsim in idem tempus incidere cum accessione. Ob idq; raro accidit, ut in quarto die continuat crīsis uideat. Continuat itaq; febris, quæ in accessionibus crīsim habent, tertio die, uel quinto, rationabiliter finiuntur. Adiuuat motus celeritatē morbi magnitudo, & anni tempus, & regio, & ætas, & quæcumq; alia amari uili conueniunt. Tarditati autē motus insunt contraria. Cæteris principij signa, si diutius persequerantur, diuturnū fore morbum significant. Augmentū uero, si in quarta uel septima die apparuerint, sperandum aliquid in quartodecimo est: * id tamen uidecimo designabit. Nam si hæc tria in eo die coniuncta fuerint, & motus uelocitas, & febris magnitudo, & manifestum coctionis in dicium, fiet crīsis in quartodecimo. Si uero solum manifestum coctionis signum de uidecimo appareat, nec tamen morbi magnitudo, aut morbi uelocitas festinanti, tūc ultra diem decimūquartū differet crīsis. At si nec die quartodecimo aliquid inuouatū fuerit, qd sit exquirat, tunc ad diem decimūseptimū est respiciendum. Si enim in eo apparuerit aliquid signum, id fidissimū erit, quāuis sit perexiguū, crīsim igitur deinceps prædictabit. Quæ igitur crīses post igna oprima, & exquisitæ factæ fuerint coctione, ex necessitate erunt oprime: quomā & sola coctio, crīsis celeritatē salubre ostendit. Exquisita uero si coctio tēpore status. Cūm igitur forma uictus ad statū instituat, & crīsis optima in illo fiat, unig omnū crīsim ipse erit regula. Quæ enim huic est proximior, altera magis distante est pocior. Quare in nulla re ad eō exercitandus est medicus, ut in status præcognitione. Etenim quicūq; morbi status tēpore præterierint inuicidat, hi sine crīsi persequerant, & paulatim soluantur: nullumq; periculū est, status tempore elapso, quantū iudicio assequi possum. Qui uero perierunt in declinationibus, omnes hī aut proprio sunt, aut errore medicorū extincti, nequaquam autem ui morbi. Vbi enim natura superior euasit, restititq; uehementiori morbi conatu, & quæ instabant oppressit (hoc enim est ipsa coctio) fieri nō potest, ut deinceps succumbat. Quod si a morbo nō uincatur natura, mortem subsecutū nullo modo conringit. Siquidē nihil aliud mors est, quā omnimoda naturæ postroio. Igitur an moriturus sit æger, nec ne, præcognoscat nemo, nisi status tempus præcuerit. Vt autem scire non possumus, an portando oneri quispian sufficiens crīsi, hominis robore, oneris magnitudine, ac uisus longitudine antea nō exploratis: sic nihil de ægrotantis salute prius pronuciare licebit, quā m magnitudinē morbi, naturæ robur, ac futurum statum inuestigauerimus. At uero si ex tribus his cognouerimus, nunquid liberabitur aut morietur æger, colligere ita poterimus aliquid

Synochus diuersa esse à continuata febribus.

Crisis in idem eorum tempore debet cum accessione.

Critica febris, quare tertio uel quarto die soluitur.

Motus celeritate tarditati quæ adiuncta.

Crisis optima quæ.

Velut ratio in statu in fluxu.

Status morbi, omnium crīsis in regula.

Status præcognoscentis cura esse medicis debet.

Status tempore elapso, solum per leuam morbi, non magis obesse potest.

Mors est omni morbi natura postroio.

Prædictum saluti uel morti, debet prius magnitudinē morbi, naturæ robur, ac futurum statum inuestigare.

de crisis tempore & modo. Nam si morbus inueniatur salubris, & neq; eius a cūmen, nec magnitudo festinent, nec error aliquis committatur circa egrū, status tempus crisis expectat: quæ sanè optima erit, ut quæ morbo cōcocto fiat. Si uerò uel propter morbi magnitudinē, uel motus celebritatem, ante statū crisis uenire cogat, tantò hæc deterior optima erit, quantū statum anticipauerit. Quod si neq; usus ad statum sufficere possit, necessum est ægrum ex hoc morbo interire, non tamen omnino propter statū. Crisis enim uel in statu, uel parum ante ipsum sit. mors autē, in tribus temporibus, principio, augmento, & statu. Porro ubi quis subito liberatur a morbo, omnino huic aliqua euacuatio essat digna, aut abfcessus cōtingit, precedente tamen insigni quadam perturbatione. Atque hunc sanè solutionis modum uocamus crīsim. Est & alius solutionis modus, ubi scilicet nō omnino absoluitur æger: quæ crisis dicitur imperfecta. Vbi uerò morbi paulatim & citra perturbationē soluant, solutio illa per absum crīsim uocatur. Ac tres quidem hī sunt modi * permutationis morborū, cum ægrus est euasurus: tres uerò alij istis proportionales, cum uidelicet est moriturus. Vel enim subito moritur, cum perturbationibus, euacuationib; uel abfcessibus momentaneis: uel mortem non subito quidem exiit, sed multo derius euadit.

Vocentur autē hæc dux crises nō bonæ: quarum prima quidem perfecta, secunda imperfecta existit. At tertia ipse dies malæ permutationis, quæ hominē paulatim ducit ad mortē, præfectio dicitur. Est & quartus modus subitæ permutationis ad peius, sine magnis excretionibus, uel materię in aliquē locū affluxibus, quam neq; crīsim appello. Statuens igitur aliquā esse uitalem potentiam, stude ut agnoscat * ipsius ita in robore, ut in imbecillitate, dispositionē. Vbi uerò in his excretoratus iam fueris, cura deinceps, ut omnes morborū tam in magnitudine, q̃ in morē differētiis, & post hæc, futuri status præcognitionē, perdiscas. Quæ ubi accuratē didiceris, tunc te exerceas oportet in cōprehendenda per exquisitā coniecturā, tam morbi magnitudine, q̃ ægrotantis robore: & quauis læx tempore possint perdurare. Sicuti enim qui signa omnia bona præfert, in primo quætionē integrē liberabitur: ita qui omnia mala, intra primū quaternarium morietur. Cæterū qui quidem liberatur, omnia morbi tempora uniuersalia pertransit. Moriturus uerò ad declinationis tempus pertingere minime potest: imò nec necessariū ad statū. Contingit quippe ipsum in augmenti & principij etiā tempore mori. Crīsim uerò subire nō est necessarium, & maxime si in principio morbi moriatur. Hoc autē accidit, ubi natura a morbo plurimum supersatur. Tunc siquidem nec certare a diuersis ipsum aggregatur: atqui sine certamine non fit crisis. Hic igitur est quartus modus mortis, qui nulli salutarū assimilatur. Nemo siquidem subito morbi euasit fine crīsi. Multi uerò sine hac subito intereunt, plurimū in accessionū principijs, illi præferri qui propter materię multitudine & crassitudine, aut inflammationis magnitudine, exaltat laborant. In accessionū etiā particula-

rium declinationibus, ob uirium imbecillitatem moriunt. In totius autē morbi declinatione, nullus unquā extinguitur propria morbi ratione, sed ob errorē cōmissum. Quandoquidē ubi morbi status præterit, natura euasit superior: alioqui nō declinasset morbus. Fit autē semper uehemētiore pulsus, equalioris & ordinari, in optima declinatione. Debiliore uerò, inordinari, & inæqualior, in exitale. Tres itaq; sunt omnes morbi modi, q̃ qui fine crīsi moriunt. Crīsim quidē in accessionū principijs, qui in magnis inflammationibus principalis membrorū contingit plurimum, uel ob humorū multitudinē, crassitudinē, & tenacitatē. Secundus in tempore status, a morbi uir natura superata. Tertius in declinationib; qui rarissime accidit, uigore soluto uitæ. Horū uerò nullus cōtingit cum crīsi. Neq; enim morbum depellere in huiusmodi mortis modis ab initio natura tentauit. Vbi uerò tentauit, sed succubuit, illam crīsim talem euentū appellat: scilicet omnino cum excretionibus, aut abfcessibus momentaneis. Sicuti autē in malis crīsimus est plurima incertitudo cōiecturāq; ira in bonis scientia, & firmitas præualet. Determinati siquidem sunt, argo ordinati naturæ morus, si & ualida sit, & domine materię, proprias perficiat operationes. Indeterminati uerò, inordinatij & incogniti, si quando succumbat. Porro si morbo pernicioso existente, quarto die letalia signa se ostendunt: si quidem imparibus diebus accessio fiat, septimo accedet crīsim: uerò pluribus, sexto. Certior tamen expectatiō faciet ipsius morbi morus. Nam si in acutē moueatur, crīsim sexto die uenturū significat. Sin uerò tardē, ad hoc locū differetur. Cū uerò dies indicatrix nullum de mala crīsi futura signū ostenderit, præcognitio eius minime facilis erit. Est autem primo & maximū morbus mortalibus signū, quod sine crīsi mors fit subsecutura, uirū imbecillitas. Secundum uerò, si nullum uirū signum cōtionis: & præter hæc, si magnus sit morbus malignus, & moueatur celeriter. Cū enim hæc adierit, omnino absq; crīsi mors subsequetur. Mortis autem dies præcognoscitur, quantū superet morbus naturam considerando, & grauiore accessione inspicendo. Si enim effatus dignus fuerit excessus, & parū resistere adhuc uis naturę uideatur, mors citò subsequetur. Si uerò contraria affuerint, tardius. Sit igitur, gratia exempli, multus excessus, nō tamen manifestus: an ad unum diem, uel duos extendi poterit, hoc certe distinguetur accessiois circūbitus. Quō enim dies debet accessio fieri, in illo morietur. Constat rursus morbum esse exitalem, nec multam prostrationē uirium adesse: liquet primū ex hoc, mortē nō esse protulā. Deinde inquirendū est, an crīsis fieri possit. Si igitur uirtus robusta fuerit, & morbus moueatur uelociter, & aliquod signū cōtionis affuerit, nō extra rationē est, quod natura tentabit crīsim. At si uirtus quodāmodo succubuerit, ac morbus tardū habuerit morē, nullūq; adfuerit cōtionis signū, in hoc subsecutū haud crīsim cōtinget. Itaq; optimæ crīses in statibus fiūt: in augmentis uerò, si salus fit subsecutura, uel imperfectæ, uel nō secutæ. At in morituris, uel inter-

Mors cur uocetur
posita in totius
morbi declina-
tione, nisi ob re-
uerentiam elusissimam

Mortis esse tres
modos, q̃, qui
absq; crīsi mori-
untur.

Natura motus
quādo determi-
nat, argo ordinati
sunt, & quando
non contrarij.

Mortem absq; crīsi
accidentem
qui indicant.

Mortis dies qua
temperat

Crīsim quādo
tentabit natura

Crīsim optimæ
fieri in statibus.

Crīsi quæ mor-
bi tempore fiat.

Mors quo morbi
tempore accidat

Permutationis
morborum tres
differētiæ.

Crīsi perfecta
quid.

Crīsi imperfecta
quid.

Crīsi per absum
quando dicitur.

Permutationis
morborum, cum
æger est interiturus, tres modi.

Crīsi nō bonæ.

Aræsalis.

Euasurus mor-
bante, necessariū
debet transire in
leuē uniuersalia
tempora.

Moriturus ad
declinationē et
post peruenire
minime potest.

Crīsim morbi
tari quidē non
esse necessariū.

Crīsi nō fit absq;
quæ certamine.

Nemo absq; crīsi
subito morbum
mouit.

Mors absq; crīsi
quidē cōtingit
in acutissimis
periculis.

10

10

10

40

10

60

rimunt

rimunt subito, uel magnam ad peius mutationē efficiunt. In principio autem morbi, crīses non fiunt. Quando igitur futura crīsis ostenditur, & tunc praecedens molestia fuerit, & post ipsam accessio citius inuaserit cū quibusdā insolitis accidentibus, necesse est in eadem accessione fieri crīsim. Quālis autem futura sit crīsis, utrum per sanguinis fluxum, uel uomitus, uel sudorem, uel per aliquod aliud ex his, quae saepe ex numeratione antea, autor bonarum disciplinarū Hippocrates accuratissime exposuit, cū in primo Epidemiarū libro, tum uel maxime in cōmentariis prognosticorū. In uniuersum autem, nihil aliud oportet considerare in modo crīsis, praeter naturae ipsius inclinationē. Distinguendum autem est, an calidus & acutus sit morbus, crīsis in primis fiat periodicis: quippe necesse est tunc post crīsim, non abfcessum, sed excretionem subsequi. At tardi & diuturni morbi per abfcessum quiescere consueverunt: praecipue si urinae tenuēs & crudae longo tempore extierint. Nam si multam & optimam subsidientiam habuerint, rationabile est morbum potius paulatim concoctum iri, non per abfcessum solouendum esse. His praesentibus, deinceps considerandum est, si quidem per excretionē debeat terminari morbus, nūquid profusius sanguinis, uel uomitus, uel sudor, uel alui subdūctio sequetur: uero per abfcessum, quod si membrū, & quis articulus abfcessum fūcipiet. Ceterū in his qui per excretionem debent terminari, dupliciter distinguere oportet. & futurae excretionis signis si aduerint: & aliorum, si minime adsint. Si igitur praeter rationem alius supprimitur, uel urina, iam propē crīsi existente, rigorē sperare oportet. * Qui si accidat, distinguendū tunc est, nūquid sudor post ipsum sequatur, uel uomitus, uel subdūctio uentris, uel aliqua horum, uel omnia. Et primū quidem ad morbi speciem est inspiciedum. Si enim exquisitē fuerit incensens, statim certior erit rigoris ipsius praecognitio. Quod enim incendit, biliosum est. Atqui biliosus humor, ubi uelamentius mouetur, rigorem facit. Post haec autē & illud considerandum est, nūquid urinis tantum, uel etiam aluo cōpressis, riguit. Si enim ambobus, necessariū rigor plurimus subsequetur. Si urinis solis, considerari oportet, nūquid alui excrementa plura quā priora, uel pauciora ante crīsim extierint. Si enim * plura, manifestus motus naturae ad hunc locum est agnoscendus: sin pauciora, ad sudores. Si uerō & uomitus signa adfuerint, per has ambas crīses iudicabitur. At si uomitus signa non adsint, solos sudores expectare oportet, & magis quando agrotantes delirauerint incrementē accessione, & partes exteriores calidiores ac rubridiores extierint, & uia per quādam calidus exeat, qualis antea nō aderat. Quod si pulsus etiam undosus fiat, & insigniter molles, adhuc etiā amplius sudores expectare oportet. Durus autē pulsus, uomitus magis quā sudores praestendit. At alius, omnimodae excretionis est index, perinde ac uelēmēs. Si uerō magnus extierit, motus ad exteriora potius, quā ad interiora, signū exitit. Cū uerō uterq; fiat modo duplici, hic quēdā qui ad exteriora, per fluxum sanguinis & naribus, atq; sudores: alter autem qui ad interiora, per alium atq; stomachū: undosus quidem pulsus, sudores: magnus autē, simpliciter sanguinis fluxus praestendit. At motu superante ad interna, cū non aderunt signa uomitus, per uentris excrementa fieri crīsis: uero affuerint, & uenter insigniter subducatur, per utraq; perficietur. Inequalis autē pulsus in plurimis quidem crīsis fit, & praecipue cū non sunt sine periculo & pugna. Vomitus quidam sunt, oris uentriculi morius, unā cum dolore capitis, obortus uertigines, agitatō labri inferioris, magnusque ipsi tenuis deluxus. Propria uerō signa profusius sanguinis, quidam fulgoris motus oculis apparentes, quoniam humor est fluxus. Obfusions autē, quoniam multus, & rotus simul clarus ad superiora, spiritui meatus obferat. Ira autē & oculi lachrymantur, ob multitudinē fluxus. Eodem modo rubidi aliquando uidentur in malis: nonnūquid & naribus. Proprium uerō signum sanguinis fluxus & naribus est, etiam praecordiorū tensio sine dolore. Nam & hoc non parum indicium est sanguinis ad superiora tendentis: scitū etiā difficultas respiracionis, quae cōtingit sanguine transseuit in thoracē. Si uerō praecordia cum dolore extendantur, nō modō fluxum sanguinis nunciant, sed etiam aliquam ibi adesse inflammationē significant. Sed & dolores capitis, qui quidem ueluti mordaces sunt, uomitus: qui uerō quodammodo graues atq; extendentes, pulsantesq; & calidi, sanguinis fluxus propriē significant. Sic etiam uiscerum sub praecordiis existentium inflammationes, causae sunt ac signa sanguinis fluxus, quando morbus per excretionem est iudicandus. * Ceterū si ex cōtraria parte fluxus sanguinis, malum est bonū autem, si secundum relictū uiscerū, ut inquit Hippocrates. Quare praecordia dextra per dextrā narem bonū afferūt crīsim, per sinistram autē, sinistra. Si uerō per excremēta alui sit crīsis subsecutura, manifestum quidem nullum est signum: sed ex eo quod adfuerint quidē crīsis signa, desunt autē uomitus, & fluxus sanguinis, & sudorem, colligere licet. Quāquā uel si nullum horū signorū adfit, non hoc tantū modo, sed etiam per haemorrhoidas, fieri crīses contingit, & mulieribus per purgationes menstruales. Non tamen impossibile omnino est talia distinguere. Grauitas quippe lumborū effatū digna, & tensio, & dolor, menstrua licet antecedit. Haemorrhoides uerō, nō omnibus sunt consuetae. Quibus autē sunt consuetae, in his distictile fuerit distinguere. Igitur aliae omnibus, quando adfuerint signa coctionis & crīsis, uomitus uerō nō adfuerint, uel fluxus sanguinis, uel sudor, omnino uenter turbabitur. Si uerō morbi ad abfcessum conuerti uideantur, cōmunia quidem omnia indicia sunt, ubi negri salus deplorata non est, quod neq; morbus soluitur, neq; urina multa, & multam habens subsistentiam, sed cruda & tenuis appareat. Propria uerō non admodum diuturnorum morborū, sieger in difficiliorem respirationem repente incidunt, breui quidem liberetur a tali respirandi difficultate: sed excipiat ipsum statim dolor, capitis grauitas, inexpugnabilis dormiendi necessitas,

10

10

10

40

10

60

Inequalis pulsus quando per crīsim fiat. Vomitus signa quae sint.

Sanguinem fluxum per narium quae praestendit.

Præcordiorū dolor tensionem sanguinis fluxum & naribus, ipsam inflammationē, alui partem indicat.

Sanguis profusum inflammationem tenebris nigrarum, secundum eorum relictū non effatū debet.

Menstruas purgationes crīsis, quae signa praestere solent.

Crīsis per abfcessum futura signa quae sint.

Natura ipsius inclinationē statim esse confide videri, ad crīsim modum transfigendum.

Arteri morbi per excretionem, ut dicitur per alui fluxum, magis solui possunt.

Rigor quando expectandus sit

Biliosus humor uolentius motum, rigorem facit.

Sadura creta, quid sit expectanda, si expleta sit.

Vndosus pulsus uocat alui soluti. Pulsus uentris creta uocat alui significationem.

Pulsus magnus praestendit sanguinis fluxum & naribus.

furditas. Huic siquidem in glandulosis postea res parua, necesse est abscessum oriri. At si morbus fuerit inueteratus, neq. ullum ex his signis affuerit, sed in ægroto ex loca inferioribus uel grauitas, uel tensio, uel incendium, uel dolor aliquis apparuerit, huic abscessus ad partes inferiores est expectandus.

GALENI PERGAMENI

de præcognitione lib. viii.

CAPVT I.



Disciplina om-
nes neglig-
g. accipere.

Artium omniū
infirmitas uide
amari.

Romanorū me-
dicorū infirmitas.

Quintus medi-
cus ab inuicem
olim fuit pulis
Roma.
Vix optimi cur-
sui solentiam.

Præpotentium
moderum malo-
rum uideat esse
causā uideat.

Vidē fieri nequeat, ut quæ in singu-
lia morbis sunt euctura ægia, præ-
cognoscant, quam plurimi medici
exultant, & charissime Epigenes.

Postquam enim multo a reperire est
nō in Medicina modō, sed etiam in ceteris arti-
bus, qui apparere, quā esse, malit: si quid in di-
sciplina inest optimū, negligi cepit: cōtrā ex qui-
ri ea, ē quibus uulgo plurimū fiant: dicerē in quā
& agere in alienā granam, adulari, diuites & pri-
maria ciues manē officiosissime salutare, comi-
tari postmodū, domumq. reducere: cōtinentibus
insuper fatellitum instar astare, scurrasq. agere.

Atq. hunc est orta cōmunis illa omniū artū in-
filitas, quæ non sra ætate irrepsit. Nam quod qui
dem ad medicam professionē pertinet, si quan-
do aliquis medicorū, qui rectē proficiscat artem,

aliquid symptomata ægroto affore prædixerit, ra-
rum quiddam & mōstrosū ipsi uulgo uidetur:
tantumq. abest, ut admirationi sit, quā hoc præ-
dixerit, ut etiā bene secū ita agi putet, ni ueluti im-
positū aliquid auescēntur. Iam uerō aliorū me-
dicorū inuidiam ad eandē in rem ē cōcitabit,
ut ab eia tandem circūueniatur ueneno (quo il-
li præcipue infiditari solent) aut pro splendido e-
ruditionis luce præmio, cogatur in exilium abi-
re: id quod olim fuit Quintus passus, qui cū
Romanis medicis, multis nominibus antecelle-
ret, Roma tamē est pulsus, idq. falso quodā præ-
textu, quod ægros perderet. Quare multi synce-
rissimi uiri, prauitātē, quā hęc nostra ætā dete-
ra est, exploratā habentes, ā turba & frequentia
hominū, ceu ā ualida quadam tempestate & pro-
cella, in solitudinē salutē portū sese recipiunt.

Atq. erunt profecto hi multitudinis ignoti: cete-
rum noti & amici primū & maximē dñs immor-
talibus, deinde uiris quorū optimis. * Quin etiā
uitam tranquillam agent, sinentq. uersutia illa
* esse apud uulgos admirationi. Porro diuiri &
præpotentium mollities, malorum omniū esse
causā uidetur: qui uoluptatem præferentes uir-
tutē, ea quorū nihil faciunt, quia quæ uerē bona
sunt, non uirunt, & alios docere possunt: sed postea
torosa se hīs dedunt, qui uoluptatē conciliant,
hoc dicitant, hos admirantur, hos euehant subli-
mes, adeo ut salutariorū & auriarū imagines in-
ter deorum simulacra erectas uideat. Virorū autē
eruditio extenuis suspiciū, quatenus eorū ope-
ra indigent. Geometria igitur & arithmetica, ea

duntaxat ratione in precō sunt, quod ad suppu-
tandas sumptū ratiūculas, aut domos extruen-
das, usum seruiunt. Astronomia uerō & diuina-
ria, ad præsentandas hereditates uirunt. Musica,
quatenus oblectare potest auditū. Philosophiā

autē harū omniū dominā, & demonstratū disci-
plinā, omnino negligūt: nisi quando rhetori-
bus sophistica arte, instrumēto sanē maligno,
uti in oratione est animus. Hi enī in medica disci-
plina necessariū illud usum tantissimō spe-
ctant, neq. hanc satis exaltē: sed, ut Plato quan-
doq. ait, si quidem pueri & insipientes, de medi-
cia & coquā ferre iudicium debeant, nō parum
proculdubio coquus medico præferetur.

CAPVT II.

Cū igitur primū Romam ueni, horum om-
nium ignarū, nihil eiūsmodi suspicatus, stu-
diū nō equidem ex solia uerbis, sed ex operibus
ipsis, & morbo curando, & futura præcognos-
cendo, omnibus innotescere, quousq. multi tan-
dem euenērūt quæ paulō antē dicebam. Etenim
tunc in Eudemo Peripatetico mirē quantānam
febrem ab alijs ignoratam prædiximus: quā qui
dem ubi se manifestē correptum sensit, me miris
laudibus exultit, ceu in contrēfacto pulsu ad-
modum consummatum. Nam antea in sola phi-
losophia me credebat præcellere, in medicā uerō
obiter attingisse: tamen nō ignoratē patrem
meum apertis insomnijs admonitū, ex professio-
ne ipsā medicānam docuisse. Cū igitur cete-
ris medicis uideretur, ut possum mane eia diei,
in quo febris inuasa erat, Eudemus Theriacē
biberet, ipse, ubi illi abierunt, rogauit me, & equid
mhi spei in pharmaci usu foret. At ego nihil
cunctatus, respondi, pharmacum non modō ni-
hil præsidij allaturū, sed possum mane eia diei,
tantā duplicem effecturū. Eam quippe illius me-
dicamēti uim esse, ut uitiosos succos adhuc cru-
dos mouere, & ad perturbatiōē perducere ual-
lear: concoquerē autem, aut per halitum digere-
re, nequeat, præterit in euentū itā hyeme. Nec
uerō aliter conigit, q̄ ego ei affirmaram. Nam
postidie summo mane accedentes medici, propi-
nazarū illi Theriacē, & ex una & simplici qua-
tana modō duplicē, sed triplicem reddiderūt quæ-
ritam. Cū igitur omnia, ut prædixeram, euenis-
sent, obstupuit Eudemus, cunctisq. astransibus,
ordine singula exposuit. Aderit enim sorte qua-
dam, si qui in urbe Roma dignitate & eruditi-
one erant celebres: ut puta Sergius, & Paulus, qui
paulō post prætor creator: Flauius quoq., & ipse
uir consularis, & Aristotelice disciplinæ studi-
osus: præterea Boëtius, & Barbarus (erat enī hic
Lucii Imperatoria auiunulus, qui tūc Mesopota-
mix præturā gerebat) cum ipsius Seuerus etiam
uir cōsularis, & Aristotelice disciplinæ addictus.

Dein uerō, posteaq. ex tribus illis quartanis, qua-
nam die singulæ soluēde essent, prædicerem,
quem admodū etiam eā ortua prædixeram, nō
modō ex prædictione ipsā (quæ ad uirū succes-
sit) sed ex curatione etiā insignem gloriā iam cō-
secutus. Atq. in de prima mihi inuidie origo ex-
istit, cū iam & ob artū opera, & ob uitæ integ-
ritatem, esse admirationis capissem. Porro An-
gigenes medicus, unus ex Quinī discipulis, qui
mirum in modum me irriterat, quod Eudemum
tres & sexaginta annos natū, triplici afflictum
quartana, hyemēq. media, curandū suscipere, pa-
rum abuit quin posita, ubi uidit euentum rei,
obrueret terra, At Martianus calumnari cepit

Coquus medico
preferatur, si de
uicinis, ipsorum
pueri et insipien-
tes ferre iudicium
debeant.

Galenus Eude-
mo Peripatetico
affortum prædixit
quartanā febrem.

Galenus insom-
nijs patris alle-
bat, uasq. arti-
mē medica opor-
tuit.

Theriacem posse
crudos succos mo-
uere, concoquerē
autem, aut digere
per halitum, neque-
at, in euentū itā
hyeme.

Barbarus Lucii
Imperatoris auiun-
ulus.

Galenus libe-
ris Eudemum ā
tribus quartan-
is.

Galenus ia-
stans, An-
tigonem
medicum.

Martianum.

meas prædictiones, seu non ex Medica discipli-
na, sed ex diuinatoria quapiam arte profectas.

CAPVT III.

*Galenus quæ ra-
tione Eudemus tri-
plex triplicemque
tamen prædixit
vix.*

Cognoui autem atque prædixi Eudemo, cri-
sim illius quartanae triplicis certa quadâ nocte
futurâ, ex pulsui ipso. Si quidem arteriarum motus
plurimû se efferebat in altû, secûdum utranq[ue]
dimensionem: quod nimis cõtingere solet, cum ua-
tura infestantes succos & corpore excernere nitur.
Recentens igitur illi omnia ea, quæ cæteras
excretiones prænuntiât: excretionis uerò eius
quæ per dielctionem fit alui, nullas neq[ue] proprias,
neq[ue] efficaces esse notas asserens: tandem quia
nullius ex cæteris excretionibus signa tûc appa-
rebant, dixi alui profusum esse expectandû. Cuius
rei successum ubi uidit philosophus, iam nõ
solita moderatone, sed clamans dicebat omni-
bus, En amici, Pythius Apollo per os Galeni
uult, nõ sanitatè modo regns, sed diem etiâ uati-
cinari, in qua omnino nisi liberandi. Ipse em̃ op-
portuno usu Theriacis me tribus quartanis affli-
ctum, in sanitatè asseruit, quas ex intempestiua
illius exhibitione incidere nec quicquid præte-
rit, quin omnia uñ prædixerat, euenerint.

CAPVT IIII.

*Galenus appor-
tuno Theriacen-
sis, à quartana
triplex liberati-
onem Eudemum.*

Cilm uerò apud Eudemû conquireret de illa
animi prauitate, quam medicis inesse uidebam,
qui in urbe Roma clari habebantur: Nolim, in-
quit ille, perisursum fit tibi, uiros natura probos,
cûm in hanc urbem uenerint, malos alii qua ex par-
te fieri: ceteri qui iam antea petuo animo exte-
rerant, cûm hic & negotiorû materia abundet,
merces multo amplior, quàm in alijs urbibus,
undiq[ue] allicit eos, cernantq[ue] quondam multos si
bi datari similes, multiplices actiones eorum ac-
curatè imitari contendunt: itaq[ue] multis de cau-
sis ad summam illam improbitatem deueniunt.
Quodd si forte improbi ad aliquo deprehendantur,
habent alios in tanta urbe quos adorantur
tutò, utpote suorum morum ignaros. Vnde ma-
ximè fit, ut eadem semper perpetrare flagitia
possint. Qui uerò paruas ciuitates incolunt, capi-
li lucri magnitudine nequeit: tum quales sint,
facilius à suis concubibus cognoscuntur: nec si
quid delinquat, nisi minimum, crimen ipsum ita
calidè operire norunt. Contrà cuenit n̄ qui hic
degunt. Nam qui improbè agunt, plurimò sa-
lent, unde innata illa malicia tacitè augetur. Ete-
nim ignotis atq[ue] imparatis imponere est facile.
His auditis, me breui Roma discedere iam con-
stinuissè respondi, ut quamcunq[ue] fieri posset,
illorum declinarè improbè uitam. Ad hæc ille:
Non refruere, inquit, hoc decreuissè te. Quan-
quam si rescissent, cilm ipsi assidue mentiri so-
leant, eadem de te quoq[ue] suspicarentur. Quæ-
adam odum enim ipsi, in docti pariter atq[ue] inopes,
idcirco urbem hanc petunt, quod in patria
utam agere nequeant (neq[ue] enim qui cõmit-
tunt quondam, illic diu latere possent) alios etiâ
eadem de causa huc cõstare existimant, nec nisi
pecunia onustos, abituros sperant. Cûm hæc &
alia multa dixisset, adiecit postmodò, inuenio
quoq[ue] mihi molituros insidias, ubi ad nocendû
alia usa decesset. Sic quippe inueniem quendam in
arte maximè exercitatum, um à cum duobus fa-

*Roma olim Mo-
dica, quàm huc
nostra stipendia
infusit, multi-
mas merces at
que splendide
proponebatur.*

*Imponere impa-
ratis est facile.*

multis, fuisse ab ipsis extinctum. Ad hæc ego: Gra-
tias tibi ago præceptor longè charissimè, quod
mihi adeo exquisitè, cuncta quæ ad corû impro-
bitatè pertinent, enarraueris. Ego enim posthæc
* mihi canebò sedulo, tum ipse cedens, tum in-
scitiam ipsorû * dissimulans: atq[ue] ex hac urbe ma-
ximâ, populiq[ue] frequentia admirabili, in paruâ
& paucorû ciuium cõcedam. * in qua omnes in-
uicem nouimus, genus, eruditione, mores, rem
familiarè, ac demû omnem uix rationè ciuis u-
nuicuiusq[ue]. Hæc cûm ita facere decreuissè, in-
scitiam corû & improbitatè * redarguere destitui.
Relitui tamè iurum præter cõpures alios, tum
Charilampis familiarè, tum Diomedem rhetorè
in Sandalario, morbo duraturno afflicto. Quæ
omnia, digna magna laude sunt uisâ. Quare me
omnes magnopere suspicabât atq[ue] uenerabant
magnumq[ue] uisgerat Galeni nomen. At ueluti
indies gloria, sic pari quoq[ue] passu augebatur in-
uidia.

CAPVT V.

Eo tempore Flauius Boëthius, uir consularis,
summus uirtutis amator, atq[ue] discendi audis,
petit à me, ut nõnulla ex dilectionibus, hoc est,
qua ratione uox edformetur, animantiaq[ue] respi-
rent, exponerem. In quem uim herdos atq[ue] por-
cellos uò paucos iam comparauerat. Siquidem
non hæc modo animalia, sed & pedestria ferè u-
nuerfa, eadem earum partû structurâ forniuntur.
Ad illud igitur spectaculum omnes sunt cõ-
uocati quiscunq[ue] Romæ uel in Medicina, uel in
Philosophia clari habebantur. Inter ceteros au-
tem aderat Adrianus rhetor, qui nondum cau-
sas & curabat, sed adhuc cum Boëthio familiariter
ueuebat. Aderat & Demetrius Fauronii amicus,
necon Alexander * Damascenus, Boëthii
præceptor, ad cõtradicendum promptus. Cûm
itaq[ue] multis diebus haberetur conuentus, mon-
stratui primû, inspirationem thoracis eleuatione
fieri: depreSSIONe uerò, expiratione. Dein musicu-
los quibus attollitur, & neruo qui ex ipsali me-
dulla procedunt, ostendi. Præterea, quod spiri-
tus, si absq[ue] uolentia foras feratur, tacitè facit
expiratione: cûm uerò ui multa, strepitum atq[ue]
sonoriam, quam etiam efusatione uocamus. Moui
stratu insuper, aërem solum, dum efflatur, ac cir-
ca gutturis exitû à cartilagineis corporibus re-
percutitur, uocem efficere. Cartilagines uerò ip-
sas à musculis, musculos à neruis moueri: qui si
abscindantur, aut excipiantur unculo, animal mu-
tum redditur. Quæ omnia Boëthius per notari-
os cursim cõscribi iussit, eorum cõmentaria a-
pud se habere p̄cipiens.

CAPVT VI.

Iam uerò rogatus interea sum, ut mulierem
quandam inuiserem, quæ noctes integras inson-
nes ducebat, ac subinde decubitus formam per-
mutans, sese in lectulo huc & illuc iacebat. Quæ
quidem cûm febre omnib[us] aptis corporis uac-
care perspicerè, hinc illa Pyladis cuiusdam amore
detentam cognoui, quod eius nomine audi-
to, non uultus illi modo permuebatur, sed pul-
sus etiâ cõtrahebant sibi omnimodam inæqua-
litate, ut qui satis perturbari animam indeceret.
Eiusmodi nãq[ue] pulsus in ip[s]a inuenias, quib[us] rem
arduâ aggressurus fluctuat animus. Nec dissimili

*Galenus postula-
uit.*

*Galenus deponit
Rem, et gloria
et ego a quibus
tur inuicibus.
Flauius Boëthius*

*Adrianus Rho-
retor.
Demetrius.*

*Insufflationem
fieri dilatato
thorace.*

*Expirationis fit
thorace depresso.
Expirationis loci
ta, sonora, quo
modo fuerit.
Efflatio quid.
Air, solum efficit
uocem.*

*Nerui mouentes
laryngis muscu-
los, si abscondit-
ur, aut excipit-
tur unculo, mu-
tum animal red-
ditur.*

*Galenus quæ ra-
tione quandem
marranem Roma-
nam ex libidine
egressam
egressam.*

*Inæqualis pul-
sus in ip[s]a, qui
fuerat, et quod
magis fuit ag-
gressus.*

quoque ratione diuitia cuiusdam æconomum, nō morbo, sed merore cōfici deprehendi, quod uniuersæ administrationis, ad quam cogebatur, rationē reddere pro dignitate non posset. Ex animi enim cōstitutione & timore, pulsus ita-
tim euariant.

CAPVT VII.

Haud ab simili industria Boëthi filium, qui se-
pius recidebat in morbum, animaduerti, ob edu-
lia, quibus cūm explebatur, id ipsum perpeti.

CAPVT VIII.

Cūm alit Boëthi uxor laboraret muliebri pro-
flusio, cui superuenit postea grandis in uētre tu-
mor, tractareturq; ab obstetricibus, perinde ac si
prægnans esset, cōtingit ut in prima balnei domo,
grauissimus dolor subito eam inuaderet. Ab eo
uērō aquose humiditatis uim adeo grandem ex-
creuit, ut animo protinus linq̄reretur. Igitur cla-
more muliercularū audito, in silio actus, eamq;
in ulnas excipiens, nardino unguento os uen-
tris perfricuit: iussitq; affantibus, ut paritis offi-
ciii, hæc manus concallaceret, illa pedes, alie be-
ne olentia nardus admoueret. Atq; ita sanē ꝑce-
lerime illam restituit. Erāt autē inter fricandum
quæ spectabant ad uentris regionē, admodum
mollia & præhumida. Fuit porro usum medicis
uniuersis, qui illac cōfluximus, optimū fore, si
immodicā illam humidū affectus iōbolem exci-
caremus, ita tamē ut curatio nō per siccantia tan-
tū, sed quæ exalface simul possent, procede-
ret. In maris itaq; arena & quidē exalface, eam
reclinauimus. Talem autem ipse illi uictum in-
stituit, ut q̄minimo potu uteretur: frictionsēq; &
unctiones uniuerso admoueret corpori, quæ so-
lo melle cōstitant: primū quidem eluxato ꝑꝑri-
mē, dein instat fontane per statem aquæ, refrige-
raro. Sicuti uērō superfluas humiditates per
cutim cōmodissime digeri iudicauimus: sic & ad uesi-
cam, per ea quæ urinas proritant, deduci, & per
alium dēci. Atq; hæc quidem diebus septem &
uacuatione illa magna, sumus experti. Postea ue-
rō, ubi mihi soli Boëthi uxorem suam permisit
pro arbitrio meo tractandam, primū quidem a-
quam ducente medicamento illam curauimus. Dein
propinaui illi, asari, apnq; decoctū. His duobus
diebus peractis, cum nihil iam profusum appare-
ret, rursus die tertia modicū quippī ex medica-
mento aliū purgante exhibui. Post hæc diebus
singulis melle illeui, corpusq; perfricui, ex mol-
lissimo primū linteo, postmodū ex asperissimo.

Victus interim, uel ex carnibus mouanarū autū
erat, uel ex faxantibus piscibus. Quibus per dies
quindē peractis, cum ne minima quidem af-
fectus nota exararet, præcauendi modū postula-
uit Boëthus. Mense demū exacto, cum adeo be-
ne colorata foret, ut distaret nihil à naturali ha-
bitu, quadringentos aureos mihi dono dedit.

CAPVT IX.

Cæterū inuidit apud illos insignes medicos
nō parum Boëthus auxilii, magnifice de me præ-
dicans. Tamē sibi in animo erat, de meloqui apud
Imperatorē M. Aureliū Antoninū, qui tunc
Romæ agebat. Nam Lucius urbe aberat, ad Par-
thicū bellum cōspēdendum. Dum hæc fiunt, belli
cos tumultus in patria sedatos audio: quare ita-

tim Roma digredior, simulans me proficisci in
Campaniā. Primū itaq; Capuā peti, deinde Brun-
disiū, ut ibi nauim quæ Dirrachium, mox in
Græciam transfueret, expectarē. Metuens ne
quis ex urbis primatibus, aut ipse quoq; Impera-
tor, ubi disciscum rescissent meū, missis qui me
prosequerentur militibus, Romā quasi fugitiuū
reducerent. Postero deniq; die, Castipolim ap-
puli. Non multo post, cum Lucius Romā reuer-
sus esset, alterū bellum, quod cum Germanis est
gestum, initū habuit. Cū itaq; mox urbe existi-
sset, bellum aggressi, Aquileæ, ut delectus ha-
berent, & copias cogerent, hyemare placuit. In-
terim ad me mittit, qui imperet, ut illō me con-
feram. Cū uērō Lucius hyeme media migra-
set ad superos, frater caduere Romam asporta-
& iussus mortuorū peractis, apparatū in Ger-
manos suscepit, meis insequi iussit. Quod autē
uir probus & benignus foret, facile persuaderi
potuit, ut me Romæ dimitteret, cū præsertim
breui reditus uideretur. Igitur toto expeditio-
nis illius tempore, sans memor insite prauitatis
tum medicorū, tum philosophorū, qui Romæ
agebant, optimū iudicauit ab eis secedere, modō
in hunc, modō in illum locum: idq; cōmodum
ipsius filium secutus, qui sub Pitholao educaba-
tur. Nam huic Imperator Antoninus iusserat, ut
si quando puer ægrotaret, curam mihi illius cō-
mitteret. Cū uērō ultra opinionem protraher-
etur bellum Germanicū, cripit interm multa,
partim ad rem medicā spectantia, partim ad phi-
losophicam. Quæ omnia post Imperatoris redi-
tum, amicis efflagitantibus tradidi, persuasus ne
mini alteri ea esse legenda. Nam si uel minimum
suspiscatus fuissē in manus indignorū ea per-
uentura, profectō nec ipse dedissem.

CAPVT X.

At uērō Sextus Antonini filius, acutissima fe-
bre desinebatur, adeo ut septimam diem citra in-
dicationem petransire non posset. Saepē uaq;
irritata crisis eam diem præuenit, quæ tutō mor-
bum erat iudicaturā: id quod Sexto euenire pos-
se, quarta die cognorā: remiq; omnē Pitholao
p. & dixeram, affirmans morbum septimā diem
petransire non posse, sed sexta uel septima die
assuturam crisi. Quod si sexta, morbum omni-
no reuersurum prædixi: si septima, crisi habi-
tuū uel firmissimū, eamq; omnino per sudores.
Postquam igitur sexta die, quo prædixeram mo-
do, morbus iudicatus est, rursus decimaquarta
illū febris inuasit. Interrogante uērō Claudio
Seuero, eaq; de recidua illa sperarē: respon-
di (quod & Sexto & Pitholao paulō antē dixe-
ram) accessionem illam post triduum habiturū
suum finem, assuturūq; sudorem post decimū
septimū diem, ad secundam nodis horam: quod
præfagium ne tantillum quidem sefellat.

CAPVT XI.

Credidit etiam aliquid ipse Imperator, nec
minus Medici qui peregrinationis sue comites
fuerant, initium febrilis accessionis sibi adesse.
Ascitus sum itaq; & ego, atq; in palatio cubare
iussus. Venit autem primis factibus quidam mis-
sus ab Imperatore, qui nos uocauit. Igitur cūm
ex tribus medicis qui mane ipsū inuiserant,
duo.

Galeni in pa-
riam rediens.

Lucii interitus.

Nam Aureliū
elementum Ga-
lenus testatur,
Cicero ad se-
quebatur in tra-
lia Galeni, dū
Marcus Aureli-
us infortat bol-
lom Germanus.

Crisis, aut irri-
tatur, præuenit
decretū dūm

Galeni Sexto
Antonini filio
prædictū sibi
bonam, & res-
dūm morbo.

Pulsus variari
in perturbatione
animo.

Boëthi uxorem
laborantem sof-
focione uen-
tris, qua rursus res-
tuit Galenus.

Boëthi uxori
qualitatem uictus
rationem instituit
Galenus.

Boëthi uxorem
qua rursus cura-
uit Galenus. La-
borantem pro-
fusum muliebri.

Boëthi ob res-
titam uxorem
quadringscentos
aureos Galenus da-
nat.

Galeni uisum
se Romæ imperā-
re M. Aureli-
um Antoninu.

duo pulsus tetigissent, ambobus pariter usum est febrem iam advenire. Vbi uero me quoque pulsus cōtrectare iussisset, equidem bona quadam fortuna tactum natura exquisitissimū natū, penitentiis omnibus, habitatū tui ætatis, tum naturæ ipsius ratione, ac semorum pulsū sentiens, qui accessio principia significare solet, me nil tale suspicari dixi: sed potius ab assū pro cibo stomachi angorem quandam sentire. Ille uerō quanti agnitionem hanc faceret significavit, ter iterum repetens, ita est ut dicit: Profecto idipsum. Vt dixisti res habet. Nam à frigidiori alimento grauari me sentio. Quid igitur (subiunxit) oportet me facere? Cui sic respondi: Si quando in quiescens alium ita affectum in eido, unum iniecto pipere propinare consuevi.

Quia uero medici in erigibus, securissimis medicamentis utantur, satis est lanam calido nardino imbutam, ori uentris apponere. Consiueuerat & ipse, si quando & uenter malè haberet, ex purpurea lana unguentum nardinū calidum applicare. Quare Pitholao, ut hoc faceret, imperaui, nosq; dimitteret. Dum autē unguenti uentri applicuisset, pedesq; in caluissim, calidis manibus perfecit, Sabinum unum cum pipere bibit: dixitq; Pitholao, eo epoto, singularem sanè medicum natū sumus, cuiusq; ualde ingenium. Nec de me loqui cessabat, & medicum prestantissimū esse asseruit, & singularem philosophū.

CAPVT XII

At Cōmodus aliquando è palestra reuersus, octaua hora prius quàm cibum caperet, febrem admodum calida correptus est. Cū igitur pulsus tetigissent, particulam ipsius quamvis phlegmone laborare sensi: neq; id iniuria: quippe fauces habebat maximè rubetēs & asperas, quas etiam gargarismate ex rhoe & melle magis exasperauerat. Iussit itaq; pro eo, mulsum lumeret, rosie incoctis: qua per nos item, & insequentem diem, & quæ huic successit noctem, crebro uteretur. Tercio die manè phlegmone omnis sedata erat, & puer quasi febri liber. Suasi itaq; Pitholao, ut ipsum in balneo duceret, ac postea eum uictu consueto reficeret. Quod consilium ramen Ania, Faustina cognatione coniuncta, non ulq; adeo probauit: ut quæ diatrito methodicorū faueret. Porro Faustina* me ipsum methedum manu ducebatur, irritans quandam methodicū, eiq; dicens: Quantopere præter doctrina huius Galeni, uelut, modò satis apparuit. Nam cū puer regius, absente patre, uehementi febri per biduum detineretur, non unq; passus est (ut uobis placet) octauam horam ieiunium ipsum & fordi dum expectare, sed & mane lauit, & cibū dedit. Cui quidem infensurū currum, ipse ualedicens, subiunxit. Multo magis exosum reddidisti me à pud holce medicos, & Imperatrix. Igitur affectum corporis agnitio, speculatione inuestigatur: ex cognitione uero exquisita affectionū, futurorum præcognitione colligitur.

CAPVT XIII

Iam uero, cū semel in quodam ægro, qui quintum morbi diem agebat, uniuersi medici facere uenam, & rectè quidem, deliberarent: ipse prægens submonuit, si paululum cunctaremur, na-

turam ipsam per se moliturū sanguinis euacuationē, idq; per dextrā narem. Etenim æger ipse, cū perinde ac si fugere uellet exiret è lecto, in interrogatus, quæ de causa id faceret, respondit, uidere se rubrū angustè prosperentē è lecto. Ad hęc dextrā narem ad genū usq; cernebam esse ruborem magno persufum, qd sana firmū esse solet indicium, quod illac sit erupturus sanguis. Vbi igitur ægrum uidi, quasi nares scalperet, digitū in ipsas immittere, ac postea sanguinolentū extrahere, iussit ut uas subderet (iam enī effluebat sanguis) subiunxitq; uacuationē eam fore uehementē. Vires siquidē ualidæ erant, necnō morbus crudus: quibus sanè causis immo dicitur euacuationes solēt succedere. Cū itaq; ad quantorū librarū & dimidie pondus, sanguis iam effluisset, tunc respiciens ægrū statuens, iussit ut frigidam poscam naribus exurgeret: frontiq; spongiam frigida posca madentem apposuit, artusq; deuinxit. Verū cū neq; his proditiuū impetum possem sumpsire, affixa demum dextro hypochondrio cucurbitula, fluorem statim compescui.

CAPVT XIII

Cū uero æconomus quidam incidisset in morbum, foretq; eius cura aliq; quibuidam medicis demandata, crismi in septima per sudores habuit. Poitridie autē cū pulsus eius tetigissent, ubi intermittētē sentire, malignū quēpiā affectum deluere suspicari, magnopere sunt decepti. Nam cū me ob eam rem cōsuluissent, perduxissentq; ad ægrum, ipse pulsus eius cōtrectans, monui ut ad refectorium uictum traderent: esse enim tutū & integrè iudicatum. Quippe illam pulsus intermissione, naturalem ipsi, non ex maligno quopiam affectu, existere: id quod postea sic esse deprehendit. Vbi enim pulsus ubi in unica tantummodo pulsatione, uel pluribus ubi inuicem subsequētib; una compententis, nil aliud, intermissione illa excepta, præter naturam habere uideatur, scire licet, affectum illum ab ortu ipso extinctū.

GALENI PERGAMENI

de præsignis ex insomnijs sumenda liber.



St etiam ex insomnijs, corporis dispositionem cōiecturis quibuidam deprehendere. Si igitur incendium quis per somnum uideat, enim ista quidem bile insectari significatur. Si uero fumum, aut caliginem, aut profundas tenebras, atra bile grauat. Rursus si imber somniet, in eo frigidam humiditatem redundare indicatur. Sic qui nuem, qui glaciem, qui grandinem, phlegmatis* frigidū est plenus. In his autem & tempus, & consuetudo uiuendi ratio obseruanda uenit. Etenim si niue aliqua conspergi sibi uideatur, si quidem id post inactionē paroxysmi cum horrore, rigore, frigoreq; uenietis, somniet, tum plus est temporis, q; corporis affectio ui tribuendū. Sin uero remittente iam paroxysmo, huiusmodi somnietur bile offerat, firmiore nobis præbet significationem, frigidus in eo humores præualere. Quæ certior fuerit, si præterea

Galeni quæ ratione præuenit eandem assumentis sanantibus sanum per narem.

Vacuationis immodica quibus consuetudo precodere.

Galeni sanguis per fluxum rite mentem à nare dextra, affixa cucurbitula hypochondrio dextro, respiciendū.

Intermissio in pulsu, si ne naturalis an præter naturam, quomodo dignoscenda.

Insomnia multum loci adferre ad cognoscenda dispositione corporis, ex multis varijs Galeni conprobatis.

Galeni fuit prædixit exquissimum tactu.

Mari Aurelii de phlegmone non fuisse febrem, citra quam ceteri medici, deprehendit Galeni.

Vinum cui iniectum sit pipere, ueni ardentis reuinculo, & si gressum alimen- torum respici- gerat, lanamq; nardino imbu- tam, arg. et e- um applicatam.

Galeni: à Mar- co Imperatore magnusq; com- mendabatur.

Commodi mor- bus.

Gargarismate ex melle, in qua rosa dicatla fue- rant, iussit Ga- lenum Commodo fauces nimium exasperatas.

Faustina Gale- num prædixit manu ducebatur.

Præcognitione- torum ex affe- ctuum cogniti- onatur.

cibus pituitosis usus non fuerit: quibus sumptis, huiusmodi solent euenire plura, ut si per uni uerum corpus solent dispositio non adit. Cum igitur in somnis quidam crux sibi alteri facti lapidum cerneret, pergit omni opinione eo cruce factus est paralyticus. Palæstriti autem qui in cisterna quadam sanguinis plena stare sibi erat usus, sanguinem abundare cōiecit, uacuacione in digere. Quidā crisi in frange sudaturi, lauare, calidam aquam quā lacus se natare somniabāt. Sic inexplēbiter bibere, uisio est inribundorū hominum frequens: quemadmodū infatigabiliter edere, famelicorū: cū ueneri indulgete, eorū quibus semen abundat. Videt nāq in somnis anima corporis profundū ingressa, externis relictis sensibus, eas quæ corporis sunt, dispositiones sentire: & omnibus quæ ipsa cupit, tanq iam presentibus, per hanc imaginationē perfrui. Quæ quidem animalis uis interdū adeo multitudine humorū grauā, ut uix mouere se possit, aut grauiā quædā ferre onera, nonnulli sibi uideant. E. ouer so quoy accidit, ut adeo sit leues tēperatay cōplexioy corporis, ut nunc uolare, nūc uelocissimē currere, per insonnū se putet. Sic etiā in cōno stercorey agere quiddā se fœnit, q eos nimirū, corruptos, fecidos, putridosq humores habere, aut intestina stercore coppleta, est indicū. Cōtrā aliq in odoratis locis uersari se putant, propter diuersam ab illa dispositionē. Quapropter quæ in somnijs se facere putant ægri, q̄rissimē nobis & ad defectus, & ad excessus, & qualitates deniq humorum cognoscendas, conducunt.

GALENI PERGAMENTI,

quomodo morbum simulates sint

corruendi, lib. viii.



Vm multe sint causæ, quas propter egrotare se homines simulant, uide tur & in situumodi omnibus ueritatē inuēto ad medicū spectare. Ete- 40 nim phlegmonē, erysipelas, & tumores laxos, per pharmaca apposita extrinsecus, ex industria excitatos, medico ab ijs quæ ex ipso corpore proficiunt, licet discernere: sicuti & sanguinē ex oris partib. profluente, ab eo qui ex stomacho, uentre, organisue spiritalibus pro uenit. Nam deprehensū sunt quiddā, qui sub sine rufis, quoties uellent, sanguinē excreat: uenula quadā in hoc prius circa gingiuas aperta, sicq cōparata, ut quisdō uideret, lingua illā surgentes, stannūq reddi rufientes, sanguinē, quasi ex infectionibus reddidit, expuerent. Sic & delirare nonnulli, desipereq se & alios, simulauerūt. Fit autē sepe, ut dolor quipsi ita simulet, ut ingēs, fereq intolerabilis esse uideat. Equidem ipse quendā noni, in concione uocati dā ciuib. qui postq id sibi minimē ex usu fore uidisset, proptereaq interesse nollet, colica se passione torqueri fingebat: id qd ego certis cōiecturis deprehēdi. Nam & remedia respuēbat, quibus fuerat alia eodem in morbo aduersus: & cōiōne dimissa, extemplo couerui desit. Quin & ipsa uiuendi ratio quæ præcesserat, talis erat, ut colicū in eo dispositionē generare nō posset: quandoquidē ex cruditate refrigeratione, huiusmodi gigni solent affe-

ctus: quon neutrū in illa præcesserat. Hoc igitur, quod nō ratione anteactū uictus, ortus morbus ille esset, potuisse cognoscere, medicæ erat experientie opus. Alterū uerō istud, quod ob cōiōnem simulare hęc illū suspicatur, nam, medicū propriū nō fuerat, sed captus, & rationis eius, quæ cōmunis dicitur: exq, licet omnibus sit cōmunis, pauci tamen exacti, perfectanq habēt, ut inuenire in quoy negotio possint, qd faciū dum, dicendū uelut. Experiētie igitur nūc flagrat, ut coniuget hęc externa facultas, alia quoy similia fingentes, ualidosq dolores simulates, deprehendere licet. Quemadmodū ipse nuper, cū utroq genu uehementissimē dolere se pedissequus quidam diceret, statim doloris eius sitōne deprehēdit: ex eo partim suspicionem sumens, quod ad illam forte diem dominus ex urbe profecturus erat: partim ex adolescentis moribus, qui talis esset, ut facili in huiusmodi mē tref: quodq amore mulierculæ cuiusdā flagraret, ob quā in urbe resitare cupiebat. Quocirca per thapsiam admotū, sibi in genu tumorē maximi excita uerat. Ego uerō, cū profecto cōiōno pharmacū imposuissē, qd dolorē quiddā nihil leniebat, uerū thapsiā solū qualitatē infrigidare poterat, post loquū unū illū cōfidentē habui, nihil amplius se doloris sentire. Quod si ex phlegmone dolor is natus fuisset, nō solt per id uisigidans nō resedisset, sed etiā redditus fuisset uehementior. Potet uerō quis ex eo, quod leuius morbū ferant, indicū ficti doloris sumere. Accidit enim istud omnino sepe (nō aduertentib. ijs qui morbi uehementia simulant) quod in alit se, aliumq liabitū, illi qui uerē laborat, magnitudine uidelicet doloris agitati, transiūt. Præterea si reuera morbo uehementi premanē, qd uis perpen auxilij parati sunt, accersuntq ipsi ulterō me dicos, ut agant qd illis lubet, quō affectus ipse curet. Sin uerō leuiter, penitusue nō dolent, huiusmodi auxilia resugunt: neq longiora ieiunia, neq mordaciū pharmacorū oblationē ferentes. Quæ sola quidd, cū grauiter se laborare dicūt, huiusmodi dispositionib. cōferre, nos illis affirmare oportet: quæadmodū & sectiones, & uisiones, & omnis cibi potusq, cui uideamus eos esse obnoxios, abstinentiā. Morbū igitur simulates, & magnitudo doloris arguet, & nosq deprehendemus, cū ex alijs multis, tum ex medicinalis experientie notio nibus: in quibus sunt lan guere, infrigidari extrema, pallere, interdū quoy que frigidū sudare, pulsus inæquales (qui quidd ijs etiā accidit, qui mediocriter dolent) pluresq minorū q magnorū: cō obscurorū, q uehemētū, habere: præterea interrogatū de morbi specie, peculiarē affectū in mēbi dispositionē explicare posse. Quædā nanq, dolores longē lateq se distendentes habent: quædam uerō tanq fixos, unitatantum parti inluerentes. Sic alix pungunt, pulsantq: alix quasi diuellunt: alix quodammodo obstupescere, alix grauari uidentur: nonnulli deniq uomitus, quidd uentris perturbationes, quædam caliginem inferunt.

Retic commo-
nu.

Thapsia facil-
tas.

Doloris ficti an-
de posui uindic-
tiam.

Simulantes dolo-
rem q̄a ratio-
ne deprehendi
possunt.

Morbosus spo-
cies dicitur.

Colici affectus
ex cruditate
refrigeratione
gignatur.

ILLVSTRISSIMO ET CLEMENTISS. PRINCIPI, COSMO
MEDICES, TVSCORVM DVCI OPTIMO ET MAXIMO,
Andreas Lacuna Secobienfis, Doctor Medicus, miles Sancti Petri, S. D.



Mani corporis fabricam civitati optimè instituta esse similem, diuinus ille Plato profes-
sus est, clementissime Princeps: neq. id iniuria. Nam si constitutionem utriusq. dispen-
sationemq. accuratè expendamus, nihil planè reperiemus in ciuitate, quod longè cumu-
latius absolutiusq. humano etiam non insit corpori. Etenim fortissimam quæq. ciuitas, so-
let esse Valido cinctâ muro, quo incursionem hostium atq. insultus arceantur. Vice muri cuiusdam
est corpori etiam extima cutis, quæ tuetur ipsum ab iniurijs extrinsecis. Ciuitatem autem voluit in ex-
pugnabilem reddere, minimeq. insidijs obnoxiam, solent semper optimi duces Vnam tantum illi por-
tam amplam relinquere, excipiendis cômestatibus peruiam: plures autem veluti canales & aquæ du-
ctus, ad illius expurganda excrementa. Similiter etiam natura os Vnicum corpori humano indidit,
per quod nimirum ingrederentur quidem omnia quæ ad partes eius alendas pertinent: sermo autem
elideretur, instruendus animus hominum pietate & doctrina, maxime necessarius. ac præterea va-
rios meatus, per quos excernerentur quæ nō erant futura ex Vsu. Optima quæq. ciuitas, præsertim si
duratura sit, Vnico tantum, sed prudentissimo, iustissimo, & clementissimo debet esse Principi sub-
dita: quandoquidem Polyarchia semper fuit seditionis opportuna. Princeps autem ipse, à ciuium com-
mercio abstractus, à fidusq. stipatoribus custoditus, in sublimiori fortiori-^{q.} urbis parte se cōtinere, ut
illinc, veluti ex quadam specula, Vniuersos ciues suos conueri, & si qua conuatio oriatur, eam fa-
cile restringere possit. Nun aliter, dubio procul, ratio ipsa in homine, quæ reliquarum omnium sacra-
tum est imperatrix, in cerebro, sublimiori corporis parte, veluti in arce quadam cōsistens, membrum
Vniuersi sibi subditis imperat, eisq. viuendi leges imponit. Eius autem stipatores, ac veluti incorru-
pti quidam satellites, sensus exteriores existunt: qui nunquam nō facientes excubias, explorantesq.
singula, quæ aut rationi ipsi, aut cupiam subiectorum illi membrorum, obesse aliqua ex parte possint,
quicquid tandem perceperint, a clutium sensui cōmuni renunciant: qui ceu dux quidam, ipsi rationi
coniungit illis præfatus est. Eam verò ut Principibus adfunt nonnulli Viri à secretis, qui eos in ex-
pediendus negocij magna sollicitudine liberant: sic adest rationi memoria, Vniuersa quæ illi occur-
runt, si alicuius ponderi sunt, quam fidelissimè asseruans: eaq. dum occasio postulat, subitò, veluti ex
promptuario quodam, suppeditans. Solent habere Principes & pace & bello, milites quosdam sa-
cramentarios, tum ad repellendas iniurias extrinsecas, tum ad continendos in obsequio & fide ipsos
animos ciuium. Non secus profectò diuinus ille architectus nosler, rationi Vni irascibilem, à Plato-
ne Vnouerfè vocatam, adiunxit: ut si quando ratio immeritò ab aliquo infestaretur, confestim hæc
excandescenti, illi ferret manus auxiliatrices, omnemq. Vni propulset. Collocavit autè natura hæc
ipsam, quæ irascimur, facultatè in corde: ut media exquisitè esset inter rationè atq. cupiditates, quæ
in iecore sitæ, atq. illinc varias excursions facientes, admodum seditiosè existunt, rationiq. plurimū
negocij facessunt. Quocirca inter ipsas & Vni irascibilem, natura etiam Vallum quoddam firmissi-
mum, diaphragma nempe, interiecit, ne videlicet imparatam illè iracundiam opprimerent, insur-
gentesq. postea contra rationem, arcem illius expugnarent. Reperiuntur in ciuitate opificia hominū
varia: cum alijs, gratia exempli, conficiant panes: alijs culinariæ exerceant: alijs retrementa omnia ex-
purgent: alijs deniq. diuersas merces per totam urbem in cōmunem Vsum traducât. An nō etiam in
corpore humano Venterculus cibos concoquit, hepar sanguinem gignit, melancholicum succum ex-
purgat lien, vesica Vrinam, Vena per Vniuersum corpus habuit (veluti bauli quidam) sanguinè
copiosissimū riuant, arteria Vitalem spiritū, ac breuitur, nervi animalem, qui autor est motus & sen-
sus? Corpori itaq. nostri harmonia ciuitatis optimam refert constitutionè: imò Vero respublica, ciui-
tatesq. Vniuersæ, ad exemplum corporis humani sunt conditæ, cum arti natura ipsa tempore & di-
gnitate antecellat. Quemadmodum igitur si in aliqua ciuitate princeps quidem, ut par est, domine-
tur, ciues autè omnes, militesq. eius decretis audiant: atq. Vnusquisq. opifex suo rectè fungatur mu-
nere, salus respublice constat: labefactatur Verò, si cōtraria accidant: sic etiā quandū in nostro cor-
pusculo ratio ipsa refferit habenas imperij, affectus autè omnes atq. cupiditates obtemperauerint:
singulaq. particule pro dignitate sua munus excernerint, nec interim praua alimenta inperantur:

tandiu certe integrâ sanitate corporis animiq; perfruemur. Si verò aut ratio ipsa in consilium admittat cupiditates, aut irascibilis facies in vnum cum his aduersus rationem conspiret: aut ex organu que vsui communis inserviant, vnum, plura, vel omnia, præ se obeant functiones: vel deniq; materiam unde particulae alimentum sint cacochyma: pro cõcursu harum causarum necessum est aut mentis, aut corporis, aut vtriusq; morbum contrahamus. Atq; ita sanè varia in corpore morborum genera oriuntur, dissoluta vnde alterataq; varijs modis habitudine illa & temperie, quâ inter se mutuò vniuersa membra, dum naturali ordini respõderent, tuebantur. Quorû vniuersa curatio eadem adhibetur methòdo, quâ curari solent etiâ morbi Reipub. Quippe ut in hac peccata leuiora nunc vinculus, nunc virgis, nunc exilio, nunc successa auricula coercetûr: in graviora autè, laqueo, securus, flammâ, atq; feruenti oleo, acerbissimè animaduertitur: sic exiguos quidem affectus corporis, leuissimulus quibusdam præsidij, reputa purgatione, atq; interdum sola tenui victus ratione, curamus: cõtrariaque verò immedicabiliq; (cuiusmodi tum sphaceli, tum cancri existit) ferro, cauterioq; ne in sanas partes grassentur, exterminamus. Caterum quemadmodum ad stabilendam Rempub. plectendosq; facinorosos homines, leges fuerunt inuenta: sic ad cõseruandam temperiem corporis, rescindendosq; morbos, è cælo delapsa nobis est Medicina. Quo munere nullum hæcenus mortaliu generi à Deo ipso datum est maius, nec (si Galeno credendum sit) dabitur inquam. At verò quum hanc ipsam artem atq; industriâ medendi, olim sola experientia constantè, Hippocrates primus omnium methòdo tradidisset, reliquisset tamè in cultam, imperfectamq; postea superueniens Galenus, multum illam modum excoluit, eiq; extremû ornatum addidit. Qui cum ob illam quidem admirandam doctrinam ac sermonis fecunditatè, quæ planè refertus est, magno exciperetur omnium fere studio forû applausus: ob prolixitatè autem immensam (quæ in tanta vite breuitate est exosa) nonnulli à lectione istius abhorrent: equidem ut ad votum omnes eo fruerentur, vniuersa Viri illius opera in breuiusculam quandam periochen, verû admodum succulentâ, ea fide & diligentia cõtraxi, ut ex ijs quæ inuare lectores poterat, nihil prorsus omiserim: multa autè quæ deperata & peruersa in codicibus tam Latinis quam Græcis erant, accuratissimè restituerim. Ex quibus nostrum lucubratiõis placuit sub splendore Excellentie tue, illustrissime Princepi, partem maximâ edere, nempe quadraginta commentarios Galeni, qui in se omnes differentias morborû, atq; eorû curandorû generales methòdos cõtinent: cuiq; sperans fore, ut cum ipse inter omnes Italia Principes optimorû ingeniorû sis promotor & altor, etiâq; semper ceu propitiu quoddam sidus affulgeas, vel ex sola tui nominis præstatione, studiosi omnes ad eorum lectionè inflammarentur. Adeo siquidem tuam Celsitudinè, cum ob alias planè rerias virtutes, tum vel maxime ob ardentissimû istum sapientie amorem, quo semper accensa est, docti omnes vbiq; locorû suspiciunt, colunt, & venerantur, ut se nõ minus debere tibi, quàm ipsis Musis, vniuersi vno ore pronuntient: quæ (ut ego ror) opinione minimè hallucinantur. Siquidem nõ modò studiosi, sed artes etiam, atq; scientia vniuersa, si nõ maiore, at certè nõ minore ijs gratiam debent, qui sua munificentia fouendo ipsas, ut subinde crescerent, summumq; sue dignitatu suspitiũ attingerent, effecerunt: quàm illis, quorû industria primû inuenta, ac in vsus hominû adita sunt. In maximâ itaq; sibi felicitatè ascribitur omnia bonarû literarû studia, quòd hisce turbulentis calamitosiq; temporibus, dum Italia penè vniuersa varijs estuat dissidijs, versaturq; in assiduo strepitu armorû: dum optima quæq; instituta infirmis tutabantur pedibus: dum virtus pudorq; exulat omnis, macta sine clementissimû & serenissimû Princepi, qui explosa indigna, ea in suos sinus excipiat, exceptaq; aduersus sui iniurias omnes tueatur. Haud ab re igitur illustrissimus & reuerendiss. D. D. Franciscus à Bonadulla & Mendozza, sancta Romana ecclesia Senator virilantissimus, meusq; patronus amicis, nec non illustrissimus & sapientiss. D. D. Ioannes Furtadus à Mendozza, apud Venetos Orator Cæsareus, vterq; Celsitudini T. additissimus, nunquâ desinunt heroicis istis tui animi dotes magnificè encomijs efferre. Florentiamq; tuam istam florentissimâ urbem, nimium felicum vocare, quòd obgerit illi Princepi iustissimus, clementissimus, sapientiaq; simul & pietate integerrimus. Ergo si illustrijs me Herois, hæc nostras virgilia tuo patrocinio dignaberis, ego quidem indebor haud luisse meam operi. Galenus autè, ad pristinâ dignitatè quâ gerebat olim, dum in summa esset autoritate apud priuscos Imperatores, deesse sibi nihil prorsus existimabit: quin potius hærens apud C. T. anciam plurimis modis beatitudinè sua arbitrabitur. Vale. Venetijs, ex ædibus illustriss. Viri, D. D. Ioannis Furtadi à Mendozza, in hac Repub. Cæsari Oratoris longè dignissimi. III Idus April. M. D. X LVIII.

GALENI PER

GAMENI DE DIFFE-
rentijs morborum lib.

VERSUS tunc le sanos existi-
mant, cum optimè ad uitæ fun-
ctiones ministerio particulari
utuntur. At eam partem ægrota-
re arbitrantur, cuius operatio sit

*Sanitas in qui-
bus necessitas*

*Morbis est vel
operationis, vel
structuræ obla-
tio.*

*Sanitas definitur
apertitudine
operationis, mo-
derationis, existit*

*Morbis quoniam
immoderatio de-
catur.*

*Morbosum sim-
pliciter generat
tunc quod simpli-
cia elementa. Compositus cor-
poris uoluit esse
triplex.*

*Elementa corpo-
ris nostri mixta
inter se possunt
inter se tota per
tota misceantur.*

*Elementa prima-
ria sunt qua-
tuor.*

*Sanitas ex mor-
bore decurrit*

*Similium partium
necularum sim-
pliciter morbi qua-
tuor.*

*Dissimilium
partium morbi,
quatuor genera-
bus decurrunt.*

*Instrumenta pri-
ma sunt quæ ex
similibus par-
tibus, rursus sunt
diximus gratia
sunt constituta.*

que uena. At quæ rursus ex his constant, ut digi-
tus, atque hoc magis pæ, instrumenta secunda di-
cuntur. Verò utriusque instrumenti erunt ipsi morbi
communes. Aliud autem genus morbi, præter iam
dicta, nullum est reperire, quod sit proprium uel sim-
plicibus, uel cōpositis partibus. Est tamen unus
morbis cōmunis corporibus similibus iuxta
& dissimilibus, nempe unitatis diuorsum. Ad
reliquos tamen simplicium morborum in partibus
similibus differentias examinandas nos cōuertamus.
Igitur impanibilibus elementorum autores, duas
in similibus corporibus ægritudines statuebant:
nempe aut astrictiōne, aut relaxatione meatuum;
quarum singule, in alias rursus differentiis secantur.
Astrictio siquidem fit, cum aut totum corpus simul
cōtrahitur, aut soli obstruuntur meatus: relaxatio
autem, ubi uniuersum corpus simul in omnem par-
tem laxatur, aut soli aperiuntur meatus. Similiter
iuxta opinionem secundam, morborum partium simi-
lium duplex differentia nobis oritur. Nam interdum
quidem solis qualitatibus alterantur: interdum
autem, cum humorum affluxu: qui sanè secundus mo-
dus, tumorem conspicuè ex citat. Ceterum una &
item altera harum differentiarum, uarias differenti-
as fortitur. Vt autem ad partium instrumentalium
(quarum sanè imbecillitas uel ob meatuum ame-
tiam, uel ob intemperiem nascitur) discutiendos
morbos nos conuertamus, Totius instru-
menti functione tunc præcipue utiabitur, ubi pars
ipsa, quæ functionis est causa, ægrotat. Quam-
vis & reliquarum partium, illi inservientium, uellemen-
tes affectus, actionem ipsam impediunt. Obles-
siones igitur quæ omnino propria ratione, im-
mediateque operatione totius organi offendunt,
aut saltem impediunt, ægritudines sunt putandæ.
At si minime id per se ipsas molantur, sed ea solam
rationem, quod primi instrumenti officium opera-
tionis, causæ morbum sunt, non item morbi. Dupli-
citer autem solet uniuscuiusque morbus cōtingere in
partibus instrumentalibus. Nam aut sequi alios
morbosos affectus, aut contrahi à prima gene-
ratione. Porro ubi pars aliqua in tumore ànolli-
tur, atque idcirco meatus illius occluduntur, si quidem
talibus particula nullam habeat propriam operationem,
obstruuntur ipsa meatuum dicitur morbus duntaxat:
tumor uero nequaquam, sed obstruccionis cau-
sa. Ceterum si affecta pars aliquod minus proprium
obtineat, hac ratione tum obstruccionem ipsam, tum
particulæ tumor, morbus est appellandus. Quæ-
admodum (exempli gratia) si tunica albae uentris
quæ in gibbis hepatis est, adeo intrumescat, ut e-
ius cauitas obstruatur: tumor quidem ipse, morbus
dicitur quod sanguificatio obstruatur: obstruccionem
autem similitur, quod impedit distributionem. Si
quidem qui affectus primò lædunt operationem, ij
& sunt, & uerè dici morbi merentur. At operatio-
nis oblesio, passio aut symptoma, non morbus,
est appellanda. Qui uero ipsam induxit affectus,
morbis absolute uocatur: sicuti & causa morbi-
fica, quicquid ipsum morbum pepererit, si alia læsio
nem non adferat. At uelimus itaque exemplum mor-
bi, quod in genere formationis consistit. At in nume-
ro, duas differentias morborum assignaueramus:
cum scilicet aliqua particula crescat, aut supere-
bundat. Quarum differentiarum utraq; rursus in bi-

*Instrumenta se-
cunda quæ.*

*Sanitas cōtinui
est morbus con-
tinuus tam fini-
teris, quam dis-
similibus par-
tibus.*

*Similium par-
tium morbi, si-
cundum consti-
tutionem impa-
tibilis elementa,
astrictio & la-
xatio.*

*Similium par-
ticularum singu-
laris morbi sunt di-
plici, quatenus
aut solo quod ali-
tibus, aut acci-
dente hanc uen-
affluunt, affluunt*

*Instrumenti fun-
ctio quæ de-
catur.*

*Affectus prima-
ria laetitia fun-
ctionis sunt mor-
bi.*

*Causa morborum
quæ decurrit
Instrumenti alii
morbi dupliciter
accidit.*

*Morbis in for-
matione.*

*Functionis læsio,
non morbus, sed
passio aut sym-
ptoma uocatur.*

*Causa morbi
quæ fit decurrit.
Morbis in nume-
ro duplex, co-
muni utraq; diffi-
rentia huius
funditus.*

nas alias secatur. Siquidem eorū quę superfluit, nonnulla planē sunt ex genere naturalis: ut si cui se xus adnascatur digitus: uōnulla uerō toto gene re pręter naturam: ueluti si in uentre gignantur uermes, aut in uescia lapis. Similiter deficientiū particularum, nōnullę quidem penitus abolite sunt, nonnullę uerō ex dimidio pręcisę: utrang autē, aut natura, aut morbo. Ex his tamen, quę cumq; functionem impediunt, eadem ratione in morborū genere cōtinentur. Quęcumq; uerō par tem aliquam operationi dicantur, uel refrigerat, uel non facit ei alimentum transmittit, causę mor borum dicantur. Quędam tamen & morbi, & morborū causę censentur: ut si gurgulio radicu tus pręciderat. Nam & uocem perturbat, & pectus & pulmonem refrigerat. In magnitudine etiā uarij morbi contingunt: ubi scilicet totum corpus uel pars aliqua, aut in prima generatio ne, aut ob aliquem affectum pręter naturam, uel prodigiosam contraxit morbum, uel pręter modum est imminuta. Qui morbi in deprauata cō positura consistunt, uarias differēntias sortiunt. Alij si quidem sunt, ubi naturalis partiū situs ua riarur: aliq ubi ligamenta nimis soluuntur, ac re laxantur: aliq ubi illa impense fuerint astricta. Quippe immo dicat linguis uincula, loquēdi man dendiq; impediūt functionē: pudendorū uerō, ob auersum meatū, impedimento sunt, quo mi nus procul rectaq; excutitur semen. Reliqui autē est quintū agritudinis genus, nempe unita

*Corpus loci praefi-
sus perturbatur
cum potius qd
pulmonem refri-
gerat.
Morbus in ma-
gnitudine.*

*Morbi in depra-
uata compositione.*

*Unitatis solutio
verq; partibus
emittit morbus
cōmuni.*

*Solutio unitatis
solutio speciei di-
uersa, pro differē-
tiam particu-
larum.*

*Similitudinē mor-
borum cōpositio-
rum differēntia
quatuor, iuxta
causas uel parti-
culas elementa.*

*Affluxus humo-
rum generis qua-
tuor differēntias
morborum cō-
positorum.
Solutio cōmuni.*

*Inflammata si-
milis & exulce-
rata particula,
quę morbos si-
milis patiuntur.
Inflammatio
quid.*

mores, mutuo inter se cōmiserunt, raroq; repe- riri aliquē ipsorū purū atq; syncrētū licet, necēssā riō dicendum est, erysipelas, herpetem, carbun- culum, cancrum, atq; alios id genus tumores, esse cōpositas agritudines. Et quibus carbuncu- lus quidem semper cum ulcere inuadit, cętera ue- rō interdum citra ulcus infestant. Gignitur autē erysipelas a rufa bile, ab atra cancer, inflāmatio a sanguine, a pituita deniq; edema, existens tu- mor laxus & cedens. Qui humores tamēti spē- cie sint humidi, potentia tamen nō omnes bum- di sunt. Quippe atra bilis sicca est & frigida: fla- ua, calida & sicca: ut pituita, frigida & humida: ac sanguis deniq; humidus simul & calidus. Ignor- de morbis cōpositis similariū particularū dictū nobis cū sit, ad eos qui instrumentū discutiūt, sermonē iam conuertamus. Proprii dissimilariū parium dicuntur morbi cōpositi, qui plures atq; diuersas partes simul afficerint: ex accidenti au- tem, qui unicam tantū instrumentorū particu- lam occupauerint. Etenim si lippitudine obū- deat tunica incumbens corneę, cū lippitudo quidem sit inflāmatio ipsius partis, inflāmatio autem omnis exitar cōpositus morbus, nemini dubiū est, lippitudinē futurū etiam morbum cō- positū, tunice quidem ipsi propriū, ex accidenti uerō uniuerso instrumentum. Ceterū si pterygiū, suffusio, ac deniq; angulorū coarctatio simul ip- sum oculum presierint, cōstitutio talis totius o- culi dicitur agritudo cōposita, cū nimirum uno eodēq; tempore diuerse particule contri- rantur. Nilū autem refert si dixeris, unicam esse cōpositam agritudinem, an plures, sed in di- uersis partibus constitutas.

*Carbunculus in-
uadit semper cu
ulcere.
Tumorem prę-
ter naturam sin-
gula, sui humo-
ris tribuuntur.*

*Humores qua-
tuor, quales quis-
que instrumentū su-
pra dicitur.*

*Dissimilariū
parium morbi
cōpositi, quę fuit
dicenda.*

*Lippitudo est in-
flāmatio tuni-
cę incumbens
corneę.*

GAL. DE DIFFERENTIIS MORBORUM LIB.

Vnc uerō ad morborū qui secūdum sectam generosiorē partes similes inuadūt, causas discutendos nos cō- uertamus, idiq; al calore immodera- to suspicari. Vniuersa corpora plus

ex quo incalēscere solent, uel ex motu improbo, uel ex putredine, uel ex cōsortio alterius corpo- ris feruidioris, uel ex astrictione, uel ex alimento ad accendendam caliditatē accōmmodat. Ceterū ubi quę immo dica exercitacione usus fuerit, si calor inde ortus nō occupauerit totum corpus, latitudinē tantū inducit, uidelicet articularū & muscularū, ad quos pręcipuē mouendi munus spectat. Si uerō extendat per uniuersum corpus, febrem accēdit. Ex ira etiā, quę calor is iuxta cor- reit uelut quidā feruor, ubi si per totū corpus di- spersit, solet febris succendi. In tumorib; etiā pręter naturā, ubi humores putrescant, calor in- terdum cordi sensum cōmunicatur, ac deniq; ex- citatur febris. Quare hic uenit intelligenda scēda & tertia causa calor is pręter naturā. Nam ob putredinē, & ob uicinā partis cōturbatēntis, in his tumorib; febrilis calor accēdit. Quarta spē- cies causę consistebat in astrictione, & quidem merito. Nam si ob astrictam cutim cohibeantur dissilari ea, quę prius dissilari cōsueuerant, si qui- dem fuliginosa fuerint, in specus cordis cōuerſa, eos exurūt, protinusq; febrem accēdūt. Calido

*Calor immo-
di- cui a quibus ar-
tibus excutitur
huius pte.*

*Mouendi mo-
di- cui a quibus ar-
tibus excutitur
huius pte.*

*Febris ex atri-
tione quomodo
oritur.*

rum etiam alimentorū usus (in eo enim quātrū genus constituebamus) interdum febrem accendit: sicuti & acra medicamēta, siue remedia sint, siue delerētia & contraria. Non autem ex aquo omnes hāc ob causas febricitat: quōd nec semper illis cōtingat par quantitas aut aēuitas causae quodq; animantū corpora plurimū aliterum ab altero differant. Etenim ad hoc ut accendatur febris in corpore, oportet ut corpus ipsum sit accōmodatū & habile ad excipiendū febilem caliditatē: causa autē efficiens existat valida, tempusq; & patientis proximitatē fortia, ut uelociter in aēione immoretur diutius, & passuro corpore superior euadat. Porro causae quae in corpore humano praeter naturā oriuntur, causae antecedentes uocantur: procatarēticae uerō, siue euidentes, quae extrinsecus aduenientes occurrunt. Frigiditas enī plurimā existit causae ueluti frigiditū propinquitas, alimentorū quantitas atq; qualitas, adstrīctio enī atq; laxatio, oculū deniq; & motus immoderatus: quibus ex occasioneb; cōstat etiā ipsum ignē exingui. Prima igitur species causae curritur extrinsecus, siue contracta ipso, siue enī potentia, solet frigiditatem morbi inducere. Ob secundam uerō, nempe ob frigidiora alimēta, nōnullos correptos uidimus atronito aut epileptico morbo, aut alio quopiam modo refrigeratos: id qd ex ebrietate uel maxime accidere solet. Quāq; unū modicē hāuū, cum familiare alimētū sit, mirē calorem auget. In uniuersum autē omnes optimi cibi, qui animalī plurimū nutrimentū adferūt, si supra modum humanū, frigidus morbus generant: sicuti & cetera, quae natura refrigeratoria cum sint, similiter ingerūt. Iuxta tertium genus causae, nempe adstrīctionē, sepiusimē corporis habetur etiam refrigeratur: ut quae interdū fopores graues, ueterumq; & apoplexiam inducat. Adstrīctione autem tunc praecipue torquetur corpus, dum uenae ipsae & arteriae adeo turgent & intumescunt sanguine, ut nullus reliq; locus inanis, in quem, ubi dilatantur, ambientem aērem possunt excipere. Quo quidem dum defraudantur, naturae calor subito ferē exinguitur. Proinde qui sic sunt affecti, aētūtūm desituntur motu simul & sensu: id qd Hippocrates significasse uidetur, dicens, Venarum (hoc est, arteriarū) interceptiones itam uocem eripere. Eger cordis calor, per meārū gutturis cum ambiente nos aēre cōmercium habet. Quam uiam si percluseris, licet praefocaueris animal. Calor autē qui in omnibus est arterijs, per cor quidem, quatenus uis habet ad fauces, & per uniuersam cutem, in circuitū aērem transpirat: ac uenitrali quidem, dum attolluntur arteriae: purgatur uerō à fuligine, dum contrahuntur. Atq; utroq; horum, naturalis ipsius modus seruatur. Si igitur tali motionis uicissitudine ob adstrīctionē desituantur arteriae, necesse est calorem exingui, corpusq; omnino refrigeratū emori. Ceterū si corpus referunt fuliginoso excremento atringant, aut excita bitur febris, aut exinguit calor natus: sin uerō halituoso uapore sanguinis, aut fiet corpus ipsum plethoricum, aut eius calor increset. Sed quemadmodū adstrīctio sepius frigefactionis est

causa: sic etiā & rarefactio, ubi plus q̄ ex usu sit disipat dispergitq; naturam calorem, frigidus efficit corpus. At uerō perinde ac adstrīctio ipsa interdum uniuerso corpori, nonnūq; alicui eius parti accidere solet: eodem etiā modo habet & rarefactio. Porro quae extrinsecus admouentur, partem ipsam raram uel condensat reddere possunt. At uicula arctissima, & uita membrū priuant, & ipsum impense refrigerat. Sed iam de siccis affectibus opportuum est ut dicamus. Si quis multo magis distulerit, q̄ pro modo alimēti assumpti, utaturq; cibis siccioribus, facile in siccam aegritudinē delabatur: praesertim si curis & anxietas uis, necnō uigilijs torqueat. Sicca etiā remperies aēris, balnea quae deficcant uim obtrinent, necnō medicamenta, quae intrus & foris ad ministrata, exsiccant possident facultatē, similiter corpora excicant. Humidorū morborū omnes sunt causae cōtrariae: nempe maxima ciborū humectantū colluue, molliscula uiuendi ratio, animi summa tranquillitas, ac deniq; balneorum dulcis usus immoderatus, maximeq; post cibū. Ad idem facit desiderio uita, pluiarum copia, humida temporis constitutio, ac breuitas, humectantia medicamēta. Iam uerō causae cōpositae morborū, similiter cōpositae sunt. Si enim calida simul & sicca in unū aliquando cōspirent, calidus simul & siccus sequeretur morbus. Idem est cogitandū & in alijs cōmubanōib; ut sepius causis natura similes, corpus ipsum immutat. Pleurisy tamen uiribus pugnant cōtrarijs, ita ut aliqūd cōtingat corpus simul fieri calidū atq; frigidum, sicut & siccū & humidū, plus q̄ naturae cōueniat, etiamq; minimē id fieri posse uidetur: quae inaequalis intemperies uocā. Aduerendū autē eā rursus, corpora ipsa interdū à solis qualitatibus alterari, quandoq; etiā ab illis quidem, sed accedente aliquo affluxu, humidū quiddē specie, facultate uerō nō item. Flaua siquidem bilis potestate est calida & sicca: atra, sicca & frigida: sanguis, humidus atq; calidus: pituita deniq; frigida & humida. Quorū humorū singuli, interdū synceri & puri, interdū iniuncti misti, solent in imbecilliorē partē cōfluere: ob idq; tumores partū uariant. Etenim cum quatuor sint facultates, quibus quaelibet pars tum animalis, tum plantae, praedita est: attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix: excrementūq; omne aut qualitate, aut quantitate inficiunt: semperq; à seruatiōib; ad partem humiles praerulā. Etenim cum quatuor sint facultates, quibus quaelibet pars tum animalis, tum plantae, praedita est: attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix: excrementūq; omne aut qualitate, aut quantitate inficiunt: semperq; à seruatiōib; ad partem humiles praerulā. Etenim cum quatuor sint facultates, quibus quaelibet pars tum animalis, tum plantae, praedita est: attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix: excrementūq; omne aut qualitate, aut quantitate inficiunt: semperq; à seruatiōib; ad partem humiles praerulā.

Febrius est non conuincit ex aquo emittit.

Febri gignenda quae requirantur.

Causae autem dentes dicit, quae in corpore ardent: ut procatarēticae, quae adueniunt extrinsecus. Frigiditas enim medicamēta, causa.

Apoplexia uero de interiorum cōtrahatur. Epilepsiam uero de finis cōtrahatur. Vixum modicū fūmperit, mirē calorem auget. Cibi uero alij in plurimū immodicū fūmperit, frigidos morbos & cōtrahatur.

Arteriarū interceptiones uero uocem eripunt. Sufficit quoniam ad occidit. Calorem cordis uenitrali delatione arteriarum, purgari cōtrahatur uero de.

Atritis uero fūmperit gignit uero causa.

Rarefactio quae naturam refrigerat.

Admotu extrinsecus. Viscula arctissima, uita membrū priuant.

Sicca intemperies causa.

Humida intemperies causa.

Compositum morborum causa cōposita sunt.

Cōtrarij intemperies partū pro humorum similes. Inaequalis intemperies quae fit de omnia.

Humorū singulorum temperies.

Tumores partū uariari pro humorum differentia et quantitate. Facultates naturales sunt quatuor.

Excrementum omne qualitate aut quantitate inficiunt: semperq; à seruatiōib; ad partem humiles praerulā.

Cum est omnino imbecillitas a partē. Fervens membrum cōtrahatur à qui huius causis purgat uita.

Crura quippe, ob incumbentiū eis corporū potius, interdum in exteriorē, nōnūq̃ in interiorē partē torquentur: idq̃ pro natura ipsorū inclinatione. Nam quibus rectoria sunt, q̃ ordo naturæ postulet, magna ex parte sunt uarij: autē, quibus magis curuata. Voco enim uarium, cui in exteriorē partem crux uertitur: uariū, cui ē conuerso. At postea q̃ ad oleuerint, sepe ob repletionem immodicā, aut ob alimēti penuriā, figuratū naturalem permutant, idq̃ primaria ratio

Varij qui sunt, et qui dicantur.

Varij qui.

Elephantiasis Tabes.

Resoluit altera pars musculi, membrum trahitur a reliquis, qui in aliam versantur.

Conuulsus alterius pars musculi, ad se partē uolentem alteram trahunt. Conspirationis causa. Lamentis causa.

Numeri deprauati causa.

Magnitudinem partu quae causa possint augere, et auertere.

Compositio partu uariosa unde accidet.

Enterocolici generis causa.

Soluta unitatis causa.

Caries unde generatur. Collisum causa.

trinfecus aliquo uolento, ualido ac duro corpore. Ad solutionē etiam continui pertinent: & proprio & cōuulsio, hæc in neruis, illa in carne confistens: quæ causam suę generationis habet, & repentinam, ualidum argi in æquale mori. Virgitur paucis expeditam, omniū huiusce generis egritudinum causæ, nōnullæ quidem occurrūt extrinsecas, nōnullæ ab ipso corpore emanant. Porro extrinsecæ sunt, ea omnia quæ percutere, collidere reip̃ sunt apta. Quæ uerō a corpore emergunt, sunt immodice inordinatæq̃ animalis motiones, ac præterea humores uitiosi, erodendi uim possidentes. Hæc itaq̃ sunt simplices egritudines similibus partibus organicis cōmunes: ac præterea ipsarū simplices causæ. Compositas autem egritudinū causas, nō est admodū inuenire difficile, cum nimis ex his quas diximus, cōstituant.

Rapio. Conuulsio.

GALENI PERGAMENI de symptomatum differentijs liber unus.



Minis præter naturam affectus, aut morbus est, aut morbi causa, aut illius symptoma. Est autē morbus, affectus quidam præter naturam, functionē ledens. Cæterū differt affectus a morbo: nam ille quidem exstendit etiam ad sanos & neutros: hic uerō solum circa ægrotantes uersat, cum nimirū sanitati cōtrariū sit. At ab utriq̃ discedit, quod Græci patios, Latini passionē appellant. Est enim passio, motus qui a baltero fit in alterutrum u agentis motus dicitur actio: motus uerō, eius quod affectum est, passio. In summa, ipsū affici, quodammodo idem quod pati est. Differt itaq̃ ab affectu passio, ipsius tantū motionis ratione. Quandoquidem in ipso uerti & mutari, præterea alterari & moueri, passio habet generationē: in eo uerō qd manet, prioris affectus consistit. Proprie igitur affectus dicitur passio iam facta, nō autē quæ etiam fit. Sed quænammodū ad sanos & ægros ipse affectus extendit, sic etiā & passio: quod uerō nomine a morbo simpliciter differt. Rursus affectus ipse, alius quidē naturalem actionē efficit, alius uerō euerit & labefactat. Est igitur sanas, naturalis quidā affectus functionis autor: morbus autē, affectus præter naturā, oblixiæ functionis causa. At passio, motus est in materia, qui ab agente fit: actio uerō, ipse motus agentis. Quod autē suapte natura aliquid cōfert ad eius quod fit generationē, causa uocat: quæ quidē & ipsa multiplex est. Nam materia, utilitas, scopus, instrumentū, introitus deniq̃ unde proficiat motus, hæc omnia causæ dicunt. Quæ uerō nihil cōferant, sed tamen ab ip̃ quæ cōferunt sciunt nō possunt, hæc eius sine quo nō, rationē obtinent. Aduerte autē, aliquid fieri per se, idem esse quod primo: ex accidenti uerō, qd secundū. Vt, si quis digito unū calculū moueat, et quo moueat & alius, per se quidē dicitur mouere primū, ex accidenti autem secundū. Ad eundem igitur modū, qui affectus præter naturā suapte ratione actionem nō labefaciunt, sed per morbos a se producellos, ip̃ non morbi, sed morborū causæ, sunt appellandi. Morbi enim sunt, qui primo ledunt actio-

Affectus præter naturam est morbus.

Morbus est affectus præter naturam, functionē ledens.

Affectus est morbus uti differt.

Passio quid, actio quid.

Affici quodammodo est idem quod pati.

Passio ueritate in motu.

Affectus consistit in permanetia.

Passio uti differt, ut sanas tendit.

Sanitas quid.

Causa quid.

Causa multiplex ueritate.

Causa naturalis est quæ ab agente fit.

Primo per se, ex accidenti, quid sit.

Morborum causa.

Morbi primo ledunt functionē.

Actio-

Symptoma est quod sequitur morbum.
Symptoma largi semper quod sit.

Symptoma a passione et morbo quo differat.

Symptoma proprii dictum, est simplex.

Actionum lesio est duplex, altera ad animalis, altera ad naturalem functionem pertinet.
Actio animalis est triplex.
Sensibilibus animalis est quintuplex.

Motricis functionis nomen pro instrumentis datur.
Gubernatrix anima functionis est triplex.
Sensibilibus actio nomen lesionis est motus et particularis.

Tactus quod reliquum sensus, multo grauius afficitur.
Sensus reliqui ad tactum, ab externis contrahuntur duntaxat, idcirco ratio natus quod non patitur.

Sensus communis symptoma est reliqui videretur.

Tactus est omnis sensus communis sensus.

Motricis facultas est symptoma est triplex.

actionem. Porro quod morbum veluti umbra sequitur, id morbi symptoma vocat: quemadmodum functionis lesio. Est autem symptoma largi sumptum, omnis a naturali statu mutatio: ob id quicquid animalis prater naturam accidit, ea significatione est symptoma. Quamobrem morbus quadatenus est symptoma dicitur, sicuti & causa prater naturam. Differt autem a passione symptoma (tamen interdum in ideam coeant) quod passio quidem omnino in motu uelutur, sitque inter secundum naturam: symptoma uero non in motu tantum, sed in habitu etiam & permanentia & te possit, omnino prater naturam. A morbo uero differt, quoniam neque affectus necessario est, neque actionem ex necessitate laedit: quae sane ad constituendum morbum desiderantur. Porro symptoma proprie stricteque sumpta (de quibus agere est animus) differentia triplici continentur. Alia siquidem nostri corporis sunt affectus, alia functionum lesiones, alia omnia haec comitantur: ut sunt excrementorum immo dicitur excretionem, tum suppressionem. Cetera sub actionis lesione, priuatio quoque mihi inaudiat, quemadmodum immobilitas, insensibilitas, atque cruditas: quae quidem actionum lesiones sunt. Haec igitur symptomata differentias decem examinemus, ab actionis lesione auspicati. Actionum lesio duplex est: altera enim ad animale, altera uero ad naturalem functionem pertinet. Actiones siquidem duplices posuimus numerant, naturales uidelicet & animalis. Rursus animalis diuidi in sensibilem, motualem atque gubernatricem. Quorum membrorum singula rursus alia secantur. Sensibilibus quippe animae functio, quaeque differentias sortitur, usumque sollicit, olfactumque, gustumque, auditumque, atque tactum. Motualem autem facultatem, cum unicum instrumentum habeat, unum tantum habet motionis modum: uariatur tamen pro particularium instrumentorum diuersitate. Vltima uero animae, quam diximus esse gubernatricem, in imaginatricem, ratiocinatricem, ac denique memoratricem diuiditur. Igitur noxae omnium actionum sentiendi, communes quidem uniuersaleque sunt, insensibilitas, & difficultas sensus: particulares autem, quae in singulis sensibus reperiuntur: quemadmodum in oculis caecitas, & caligo: in auribus surditas & hebetatio: atque in alijs similibus, ubi uidelicet actio absoluta est, aut deprauata, aut diminuta. Ceterum tactus in actione sua, quam reliqui sensus, multo grauius symptoma, cum ab extrinsecis occurrantibus, tum uel maxime ab affectibus interioribus, solet recipere. Etenim alij sensus non ab internis, sed ab externis affectibus, in functionibus suis consistant: ac ne id quidem per se, sed ex accidenti, quod uidelicet in se habet facultatem tangendi. Est enim tactus omnibus sensibus quidam communis: reliqui uero quatuor, suo quisque tantum est proprius. Quisobrem oculi sapsissimè graui dolore cruciantur, consistit tactus tangendi. At uero uigilia & ueteritas, sunt ipsius communis sensus symptoma. Motricis facultatem triplex reperit symptoma: immobilitas, diminutus motus, ac denique deprauatus. Ceterum deprauatus motus, alius tremulus est, alius conuulsus, alius palpi-

tans, alius denique uibrans. Porro si coellatur uni uersum corpus, animaeque principes potentia simul sit impedita, id symptoma epilepsia uocat: apoplexia autem, dum totius corporis perit omnino motus, simulque principes actiones cohibentur. Haec itaque motuane actionum sunt uitia. Proximè est, ut gubernatricium functionum iam offensas tradamus, ac primò imaginatricis. Haec enim interdum tota corrumpti exsoluitur, quemadmodum in catalepsi: interdum autem uitatur, ut in delirio: est cum deficit atque debilitatur, quod in lethargo contingit. Sic etiam ratiocinatio, nunc exsoluitur penitus, ipsi sum symptoma est amentia: nunc deficit atque temitur, uocaturque id symptoma fatuitas: nunc laeditur ac deprauatur, quod symptoma uocat delirium. Pleraque siquidem in lethargo simul consistit delirium, tum parum probe imaginandum, tum parum aptè ratiocinandum. Est quando duntaxat in altero. Interdum quippe rano uitatur, imaginatio simul atque memoria laesa. Quemadmodum etiam ratio integra, contingit in imaginationem, tum memoriam uitari. Quod autem in memorandi potentia consistat uita, nemini opinor obscurum. De animalium itaque actionum symptomata dictum uobis cum sit, ad naturalem symptomata examini ad uos couertamus. Methodus autem eorum inueniendorum est, naturalium facultatum cognitio: in quarum singulis duplex reperitur symptoma, alterum abolire functionem, alterum non rite obire: quod quidem hoc est duplex alterum quod in diminuta, alterum quod in uitata actione consistit. Exemplum autem ponamus in coctione uentriculi: quae interdum quidem tota corrumptur, interdum remittitur ob imbecillitatem, interdum uitatur. Quorum primū symptoma dicitur cruditas: secundum, concoctionis tarditas: tertium praeterea & uitium uocatur. Porro appetitricium functionis symptomata sunt, abolire appetentiam, & immo cibi cupiditas. Circa nutritionis actionem, si scopum minimè attigerit, atrophia & phthisis accidunt. Vitia uero nutritionis sequuntur, leucae, ophiastis, alopecia, & reliqua id genus symptomata. Cum igitur naturales facultates sint quatuor, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix: sanè in singulis naturalibus organo, quatenus naturalia sunt, duodecim oriri possunt symptomata: tribus uidelicet in unaqueque facultate coeque: in animalibus uero, quindecim. Quod si animalis instrumentum simul & mouendi & sentiendi uires obtineat, duodeuiginti symptomatum formas habere poterit. Ventriculus igitur duodecim sortitur symptomata, quatenus est coctionis organum: tandemque quatenus pars similis, quae nutrimentum desiderat. Si quidem omnes particulae quae nutrimentum suscipiunt, duodecim recipiunt symptomata: neque tria (ut diximus) secundum singulas facultates, ubi uidelicet aut nihil trahunt, aut languide, aut uisiose: ubi id quod attractum est, aut non retinetur, aut languide, aut uisiose: ubi id iam retinuerunt, aut penitus crudum relinquunt, aut diminutè concoquunt, aut in alienam qualitatem coeuerunt: ubi excrementa ipsa expellere nequeunt, aut languide, aut perperè: hoc est, citius aut tardius, quam animalis expedit. Ex quibus

Motus deprauatus in Epilepsia.
Epilepsia quid sit.
Apoplexia.

Imaginatricis facultas symptoma.

Ratiocinatricis facultas symptoma.
Amentia quid sit.
Delirium.

Rationem interdum uitari, imaginationem atque memoriam laesam.

Naturalium facultatum singula duplex tribuitur symptoma, nempe ex abolire functionem, ex non rite obire.

Ventriculi actio non symptoma est sine cruditate, coctionis tarditas praeterea.
Appetitricium autem symptoma.

Nutritrix actio non symptoma.

Facultates naturales sunt quatuor.

Naturalium instrumentum simul & mouendi & sentiendi uires.

Animalis instrumentum quatuordecim uisiose possit symptoma.

Singularum particularium facultates quae nutrimentum suscipiunt.

Quatuordecim attrahunt, quatuor expellunt.

Quatuor concoquunt, quatuor in alienam qualitatem coeuerunt.

Quatuor expellere nequeunt, quatuor perperè.

Quatuor citius aut tardius, quam animalis expedit.

Et

unig accidit, particulas non nutrir, aut imbeciliter, aut perperim & uinofe. Quod uero in facultatibus (fimilarū particularū) dicimus, id enī intelligendū est in ijs quæ ad instrumentales ſpe-
 ctant. Porro alteratū facultas in uentre tunc abolita cenſetur, ubi cibus talis relinquit, qualis aſſumptus eſt. Imbecilla autem dicitur, quæ rarē concoctionē abſolutū: ſicuti deprauata, quæ in malignam qualitātē cibos ipſos permutat. At abſoluta concoctio dicitur, ubi cibus in qualita-

tem animā familiarē mutat. Anima duertendū tamen hoc loco magnopere eſt, alteri ſymptomati alterū nōnunq̃ luccedere. Si quidē in iſtum cōplectendū tēpus, cōtinuū ſequitur dimi-
 nuta cōcoctio. Præterea ceteris deſectionis cibo rum inſeparabilia ſymptomata ſunt, excremen-
 torum humiditas, alimenſis per corpus immi-
 nuta digeſtio. Corrupteſcē cibi ſequi neceſſariū quidem excrementorū factor, nō neceſſariū uerō, mordacitō & inſano. Atq̃ horū ſane omniū
 iam dictorū ſymptomati, quæ in actione obſer-
 ſa conſtitunt, ſicuti & aliorū duorum generum, ſciendum eſt morbos cauſas exiſtere. Sympto-
 matum quæ in corporū conſtitutū affectibus, pri-
 mæ differentiæ ſunt quatuor. Si quidem alia ad uſum, alia ad odorati, alia ad guſtū, alia deniq̃ ad tactum pertinent. Etenim quæ ad uſum ſpe-
 ctant, ea ſunt quæ cōſiſtunt in colore præter natu-
 ram, ſiue in uniuerſum corpus occupet, ut in æquatis ſiue aliquā eius partem, ut in carbuca-
 lis. At quæ pertinent ad odorati, ea in eſpiratu ac perſpiratu deprehendunt. ut ſi (gratia exem-
 pli) quod in diēſ expirat & corpore, ſiue per arte-
 ciam aſperā, ſiue per uniuerſam cutim, grauole-
 lens ac putre ſenſat. In guſtu autē ſymptomata ſunt, omnes ſapores qui ægris præter ſoliti acci-
 dunt: ut ſi alienas qualitates percipere ſibi uideantur. Tangibiles differentiæ ſunt, ubi ea quæ ſubſi-
 ciunt tactū, genuinam mutarunt conſtitu-
 tionē: ut ſi cutis quæ antea erat mollis, deprehen-

datur dura, rigidaq̃: ſut & conuerſo. Cū igitur omne quod iſturalē eſt, ex cōmodo temperatu-
 ra naſcitur: unig id quod præter naturā exiſtit, ex aliqua intemperie oriē. Quāobrem cū hęc omnia quæ diximus, priuſ præter naturā ſint, merito intemperie ſeruntur accepta. Atqui in-
 temperies omnis eſt morbus: ergo liquidō con-
 ſtat, has quatuor ſymptomati differentias, à mor-
 bi generationē cōtrahere. Quæ uerō ad excer-
 nuntur à corpore, uel retinent in eo præter natu-
 ram (hec enim ad tertiiū pertinebant genus ſymptomati) aut rota quidem ſubſtantia, aut quali-
 tanbus tantū, aut deniq̃ quantitatibz, à natu-
 ræ ordine digrediantur. Atq̃ ipſa etiā uel immu-
 diat ſequant morbos, uel mediāt. Inter cidentibz ſcilicet ſymptomatiſ alig. Iam uerō lux-
 morrhagia, quod ad excrement ſubſtantia pertinet, roto eſt genere præter naturā, ſitq̃ ſut aper-
 to ualiſ oſculo, aut rupto uale, aut eroſo. Eteū uulnū, ruptura, eroſio, propriū ſimilarū partiū ſunt morbi: at apertio oſculorū, ad instrumenta pertinet. Accidit enim interdum ipſe ſanguinis fluo-
 ob retenticiæ facultatis inſirmitatē: interdum quia expulſionē immo dicē mouet: nōnunq̃ ob utruſq̃ functionis noxam. Sic ſit etiā malē-

bre profluuiū, aut ob dictarū functionū ſympto-
 mara, aut quia ſanguis eſt nimis ſeroſus atq̃ ſub-
 tilis redditus. Sciendū tamen eſt, nihil eorū quæ tempeſtiue, hoc eſt, ad animalis cōmodum, circa corpus cōtingunt, etiā ſi roto genere præter natu-
 ram ſint, uerē dici ſymptoma (quale utiq̃ eſt id quod ſequitur morbum, atq̃ in leſione actionis conſiſtit) cū nimirū unumquodq̃ eorū ſit ele-
 gans & abſolutū opus nature, tamen ad alterū ſymptomati genus, nempe ad affectum præter naturā, reduci poſſit: ut ſi ſanguis per nares, aut hæmorrhoidas, cōmodē erumpat.

GAL. DE SYMPTOMATVM CAVSIS LIB. I.

de ſymptomatum cauſis lib. I.



Ni ſenſilī actione triplex ſymptoma-
 tum genus deprehendit. Vnū, cū primū ſenſus instrumentū quippiā perpeſſum eſt: alterū, cū ſenſum potentiā: tertiiū, cū miniſtrantium
 primo ſenſus instrumentū partium aliquā fuerit affectū. ut, in oculo primū ſenſum inſtrumentum eſt cryſtalloides humor, qui à coloribz alteratur. Vi ſenſienti eſt quæ à cerebro per ner-
 uum opticū, qui ſolus manifeſtum habet foramen, in ipſum deſcendēti, procedit. Illius uerō grata creatæ ſunt reliquæ omnes oculi partes. Quicquid igitur ex enumeratis ſit iſtum, animal
 uel malē uel nilil oſtino uidebit. Solet cryſtalli-
 nus humor octo interperaturis à nature uero diſce-
 dere. At facultas uioſoria oſendit, uel neruo affecto uel cerebro. Hæc autē, quatenus ſimilaria ſunt, octo morborū genericis cōſiſtant: quate-
 nus inſtrumenta, tum obſtructione, tum aliarū eorū innixu, atq̃ adeo diuorſio cōtinuū, qd quod tam ſimilaribus, q̃ ipſi inſtrumentalibus ſemper
 adeſt cōmune. Iam uerō ſi cryſtalloides humor peruertatur ad alterū angulorū, haud ita notata
 digna ſuccedet noxa: ſi uerō uel ad ſuperiora, uel ad inferiora declinet, tūc quicquid cernit, du-
 plum eſſe uidetur. Illa porro quæ ex uſu ſunt pri-
 mo inſtrumentum, uariis modis etiam cōtingit læ-
 di: utputa ſi albuminis humor, ſpirituiſque, qui qui ante cryſtalloidem local, uſque adeo copio-
 ſus ſit, ut uioſoriam facultatē impediāt: aut ſimili-
 ter ſi foramen rhagoidis uel relaxet, uel coarctet
 ur, magis q̃ expediat uioſionē: aut ſi in aliquā de-
 uellatur partē, aut deniq̃ ſi rumpat. Cæterū elaxatio illius, ſiue ab ortu ſit, ſiue poſtea præter na-
 turam acceſſerit, ſemper uſui in cū modat: adſtri-
 ctio autē & immanitudo, ſi quidē à nature con-
 tracta fuerit, acutiſſimæ uioſionis eſt cauſa: ſi uerō ex morbo talis coarctatio conſtingit, uioſionē
 impedit manifeſtē. idē nō quatenus coarctatio eſt, ſed quatenus à peſſimis cauſis inducta. At re-
 liquorū neutriū, ſiue à primo ortu, ſiue poſtea q̃
 quis genitus eſt, acciderit, uioſionē cōmodū nō
 ratu dignū adſerre poſſet. Etenim ubi altero oculo clauſo uidetur, dilatatur alterius pupilla: q̃ ſpi-
 rituiſque antea ambobz particulatim diſtributur, uniuerſus in unū cōfluat. Idcirco quibus ſuſſiſſis
 altero oculo clauſo pupilla clarior apparet, q̃ ſpe-
 rare debent fore aliquādo, ut uſum, punctuone facta, recuperent. Quibus autem nō dilatatur, q̃ omni ſpe occupatū eſt uſum ſunt deſtituti. Vnde
 liquidō

Symptomata du-
 o nō debet quæ
 tempeſtiue atq̃
 ad animalis cō-
 modū circa cor-
 pus cōtingunt, uel
 ſi ſi roto ſine
 genere præter
 naturam.

Senſienti eſt
 triplex ſympto-
 mati genus in
 ſupra adnotat.

Cryſtalloides hu-
 mor eſt primū
 ſenſienti organu-
 mentum.

Optici nerui
 inſit manifeſtū
 foramen.

Cryſtallinus hu-
 mor octo officiis
 ſolent interperatu-
 ri.

Uioſoria facultas
 oſendit, uel
 neruo affecto,
 uel cerebro.

Salutem con-
 ſtat eſſe cōmune
 morborum ſi-
 milaribus.

Cryſtallinus hu-
 mor perſe ſumant
 diuorſum peruer-
 ſum, uel uide-
 tur duplo.

Pupilla ſerena
 minus relaxata
 ſemper uſui in-
 cōmodat. conſi-
 ctio autē ſi quidē
 de natura ſit,
 acutiſſimæ uioſi-
 onis eſt cauſa: ſi
 uerō à morbo
 producta, lediſſe
 uſum.

Oculo altero
 clauſo, ut dilata-
 tur alterius pu-
 pupilla.
 In ſuſſum quæ-
 nam poſuit uſu-
 m recipere, q̃
 quæ minime.

Alteratū ſacul-
 tas uentriculi,
 quæ abolita
 & imbecilla, &
 deprauata dicitur.

Symptoma vnū
 ſymptomati alteri.

Deſectione ciborum cetera quæ ſequuntur.

Corrupteſcē ciborum quæ ſequuntur.

Symptomatum quæ in corporū conſtitutū affectibus conſiſtūt, alig. pri-
 mæ differentie ſunt quatuor.

Naturalis omnia ex cōmodo temperie naſcuntur.

Intemperies omnis eſt morbus.

Hæmorrhagia quæ modi ſunt.

*Spiritus anima-
lem a cerebro de-
mitti ad oculos.*

*Spiritus confusi-
tus coactisq;
plurimum colo-
re ad sensus fa-
cilitatem: ac dis-
solutus citius ob-
scit.*

*Albuginei hu-
moris visus.*

*Rhagoides tuni-
ca visus.*

*Pupilla coacta
non quando suis
liq; quando a-
gri coactione re-
cipit.*

*Rhagoides solu-
ta quando va-
sum exsiccatur.*

*Obiecta quæ
refracta viden-
tur.*

*Videre plures
flantia obiecta,
quibus contin-
get.*

*Ceratoides tuni-
ca.*

liqui dō constar, spiritū aliquē animalē a cerebro demitti ad oculos. Si ipsi pupilla amplior fuerit, spiritus implere illam nō potest: quare diffundit ipsū, dissoluit, dissipariq; est necesse. Si uerō angustior, coagur & costringit, ac densior sit spiritus. At coactis spiritus coactisq; ad facilitatē sensus cōducit plurimū. E diuerso dissolutus dissipatib; sentendi difficultatē inducit. Est autē albugineus humor ueluti propugnaculū crystallini, cuius etiam nonnulli essentia iuuat. Quam ob rem si immixtus quodammodo, ipse crystallinus arcescit, ac super ipsū rhagoides tunica corrugatur & cōcidit, sic ut uisio ipsa oblecta: nimirū ex terno lumine per exiguū mediū humori crystallino occurrere. Iam uerō instrumentum uisionis, citra tādū tolerare splendorē nō potest: ob idiq; rhagoides tunica illa est obiecta, nigra existens simul atq; cærulea, quibus coloribus oculus potissimū recreatur, quē infestant splendor. Verūm coarctatio pupillæ, quemadmodū ampli-
rudo, si quidem ab humiditate superflua trahat ortum, faciliem: sin uerō a siccitate quadam inextinguibili, desperatam curatioē fortitur. Porro si rhagoides tunica ita sua cōnuitate soluarur, ut tenuis ille humor prolabatur ad exteriora, maximē uisio la befactatur. Ad hæc, si humor ille albugineus seipso crassior sit redditus, exactā cernendi aciem multo obtusiorē reddet. Quod si plurimum aucta sit crassitudo, uisum omnino prohibebit. At si nō totum foramen a contento ibi crasso corpore obtenebretur, sed relinquat eius aliqua particula pura, uidere hiebit per illā externa res, idq; nullo deterius quā antea: sed unamquibet solam. At si in pupillæ centro exigua consistat suffusio, maneatq; partes quæ in circuitu sunt, pure: qui sic sunt affecti, quicquid aspiciunt, id ueluti fenestratū putant. Vbi uerō humor inter crystallinū atq; rhagoidē mediū, propriū colorem mutat, si quidem ad fuscum declinet, arbitrabitur quis se per nebulam, uel per fumum etiam uidere. Sin alio quouis colore inficiatur, huius quoq; imaginē, ea quæ spectantur, referet. Præterea, quibus adeo absoluta est cernendi facultas, ut ne minimū quidem uisibile eos latere possit, si uapores a uentriculo sursum ferant, hos symptomata suffusioni similia in festabunt. In uisum autē, uel parua, uel magnasymptomata accedent, pro ipsius magnitudine affectus. Cui spiritus animalis simul & multus fuerit, & æthereus, in res quæ porro distant, & uidere, & discernere potest. Cui uerō paucius quidē fuerit, sed purus, is ut res propinquas plane discernit, sic distantes handquā uidet. Quod si humidior simul fuerit & multus, res distantes uidet quidē, sed nō ad unguē discernit: quemadmodum qui humidior simul fuerit & exiguus, is neq; exactē, neq; porro uidere potest. Ceratoides tunice pars illa quæ pupillæ est obiecta, si crassior densiorq; sit, acie hebetē reddit. Si uerō humidior densiorq; fuerit, nō modo reddit uisum obtusum, sed etia efficit, ut qui sic est affectus, putet se per tenebras, aut nebulam, aut uaporē aliquē, aut per fumū res ipsas cernere. At si humores nō multitudine, sed colore peccauerint, secundū eiusdē coloris naturā ipsa cecutiencia obo-

rietur. Proinde qui morbo regio laborant, quicquid uidet, id pallere arbitrant. Quibus autē ceratoides pars insigniter ulcerata est, aut uulnē rara ulque adeo, ut ipsū uulnus ad interiora pertingat, si magna ex parte obcecant. Vidi tamen equidem puerū, cum iuxta pupillā punctus fuisset stylo, sic ut aquosus humor efflueret, ac tota omnino cornea corrugaret, uisum (incredibile quippā) recuperasse, instaurato scilicet paulatim humore qui per uulnus effluerat. Solus autē corneæ ipsius corrugatio (a quali senescute confectus solet semper accidere) similiter uisum offendit. Cæterū si pupilla simul sit immixta, scire licet, aquosum quoq; humorē immixtum existere: sin uerō equalis permanserit, ad solā ceratoidem affectū pertinet. Corneæ igitur morbi, si fuerint magni, in totū uisionē impediunt: maximē si uel phlegmone, uel suppuratione, uel scirrho (quatenus instrumentū est) infestetur. In hærens uerō membrana phlegmone obiecta, ex accidenti quoq; impedire potest uisionē. At chymosis, unguisq; nō ex accidenti, sed primaria ratione pupillā ipsam obscurat, quemadmodū genarum ingentes tumores præter naturā. Grauius auditio surditatq; animā euenire solet, aut ob auris partē aliquā, aut ob neruū a cerebro descendente, aut ob cerebrum ipsū, si ea in parte, unde neruus oritur, affectum fuerit. Igitur nerui cerebriq; offensa in his, haud aliter quā in oculorum affectibus, accidit. Reliquarū uerō partium noxæ, illis ad portione respondent: uerū non omnino similes læsio existit. Partes itaque ad auditum pertinentes, quatenus similes sunt, octo intemperaturis nexantur, ac præterea solutione continui: quatenus autem instrumētales, tum hæc, tum obstructionibus inuaduntur, ob tumorem aliquem præter naturam, aut ob sordem oburantem auditoriū meatum.

Cum autem lingua sit duplici facultate prædita, ac per unam quidem sentiat, per alterā uoluntariē moueat: contingit sanē ipsam aut minimē sapores percipere, aut deprauatē: idiq; ob tunicæ, quæ illam inuoluit, uel corporis ipsius, uel mollium neruorum, uel eius cerebri partis, unde illi exoriuntur, affectum aliquem præter naturam. Etenim deprauata saporū dignotio, ubi lingua alieno quoque humore fuerit imbuta, euenire consuevit. Nam quemadmodum per suffusionē, ipsa uisoria facultas foris uidetur ea cernere, quæ in oculo apparent: ita & gustandi uis, internam linguæ affectionem rebus sensibilibus tribuit: quemadmodū etiam, ubi sonum aures percipiunt, nulla re extrinsecus obstrepete, sed ipsa circa membranas motionē, phantasmata transmittente. Quod uerō spectat ad olfactum potentiam, odorandi sensoriū est principium anteriori cerebri uentriculorū: inferius autē natus odoratus simul & respirator. Si igitur uel contundat ipse, uel eius obstruatur meatus, idiq; uel ab humore aliquo, uel a tumore præter naturam, olfactandi facultas uel minus probē odores percipiet, uel eos omnino nō sentiet. Obstructiones etiam osium olfactoriorū, præterea cerebri membranarum, atque adeo illæ quæ in processibus anteriori cerebri uentri-

*Alterius partem
omnis obiecta
pallere.*

*Visum recupera-
sse potest, cui
albugineus hu-
mor effluebat;
omniū uero
corruhabatur,
Galenus uis
dit.*

*Chymosis
Vapores oculi*

*Auditio sympto-
mata ueluti pro-
focantur.*

*Lingua inaffo-
duplici facultate
tem, sensum
atq; motum.*

*Gustandi uis ob
querū partem
afficiū corrumpi,
aut intus pos-
sit.*

*Odorandi sensu
rum esse prin-
cipium anteriori
cerebri uen-
triculorum.
Nasum inferius
odoratus &
respirator.*

*Obstructiones
a quibus sit
labefacta.*

colorū oriuntur, ac deniq; insignes dictarū partium tum confusiones, tum sectiones, olfactricē uim maximē labefaciūt. Ob intemperiem enī iam ipsarū partū, solet fieri olfactus uinosus. Porro tactus (qui sensus communis est omnibus particulis sensibilibus) uaria symptomata recipit: inter quæ annumerat tum hæmodia, tum torpor. Est enim hæmodia dentū stupor, qui ob acidosis acerbosq; cibos magna ex parte oboritur. Torpor autē in toto corpore cōtingere solet, ex sententiā mouendi difficultate affectus quidam cōpositus. Qui quidē manifestē uidet tum a refrigeratione, tum a compressione corporū neruorum, ac deniq; a torpedine mæri animalis tactum, procedere. Vbi uerō circa aliquam luxuifcentiæ causam ultro torpor acciderit, tūc uel uitæ ignauiam, uel ciborum multitudinē, crassitiem, lentitudinē, aut solite secretionis suppressionem antecessisse necesse est. Igitur eius causā cōiuncta, affectus nerui est talis, ut facultatē illā a principiē parte missam, impedire possit. Atqui impedit, si neruus meatu aliquo præditus, uel obstructus sit, uel compressus. Si uerō meatū nō habeat, sed ut Solis radij per aquam, ætērniue transcut, eodem modo facultas a principio per neruorum corpora permeat, ipsa in transitu prædiētur, si ad immodicam crassitudinē neruus ipse peruenit: id quod illi cōtingit, aut crassius uicididit succis nutritio, aut uolētō frigore perfrigerato. Torpefunt etiā nerui, ubi uel laqueo, uel manibus confringuntur, aut extrinsecus a uicine partis phlegmone, uel scirrho comprimuntur: aut ubi luxuriæ fractiue ossibus sūt arctiores. Principij igitur stupidi sunt, deinde omnino & sensum & motum amittunt: quod ui tum ipsorū, dicitur paralytis, a corpore sola magnū diue differens. Si spīnx omnes occupauerit neruos, repente uniuersum corpus sensu & motu priuabit, succedetq; citissimā mors, quod prohibita sit respiratio. Si spīnx principij lēdatur, solæ partes capitis, quoad uixerit animās, & sentire & moueri possunt. Si tamen cerebrū quoq; noxa ipsa acciderit, qui sic afficiuntur, nō omnīū partū perit simul & motus & sensus. Viuere autem possunt utriq; tanto tempore, quanto uiuit hī qui præfocati strangulanti. Spina uerō in inferiori loco affecta, nempe sub ea neruorū propagatione, a quibus thorax attollitur, si quidem ingens fuerit affectus, partes inferiores omnes subitō & sentiendi & mouendi facultate priuanti. Si uerō nō ita uehementis affectus uideat, stuporem inducet. Atq; hī sanē mortē effugiūt, quando quidem in ipsis respiratio seruatur. At quibus quoniam spīnx uertebra affecta est, eorū manus omnino & sensum & motū amittunt. Vox autē omnibus illis perit, quibus ea spīnx pars quæ in ceruice est, fuerit insigniter lēsa. Porro quī nerui, dum rectē ualent, facultatē sentiendi de suppediūt, hīdē lēdūt ipsam sū affectū fuerit. Ceterū cum partes aliquæ per quem neruū uoluntariē mouent, per eundē sentiendū quoq; uim habeant, duplex necessariā noxa onet ex ipsius nerui affectu: quarū altera quod sensum, altera motū impedit. Interdum tamen quarundā partū motus uoluntarius exoluit, sensus per orius illarū: sicuti et cōuerso etiā

cōtingit sensum perire, incolumi functione mouendi: ut in lingua & oculis planē uidere licet, ac breuiter in omnibus partibus, quæ per diuersos neruos, hoc est, molles & duros, illas facultates recipiūt. At in quibus mēbris duri duraxat nerui inueniunt, per quos utraq; facultas deseri: ex ipsorū uehementi lēsiōne functiones ambob; labefactant. Nam si ablata cūc subiectis muscularis, qui nudus est, uideat immobilitas, sentiat tamē tangentes, exiguū ei accidisse noxā putandū est: nempe quod tantā animalis facultatis partē suscepit, quāta ad sensum excitandū sufficiat: ad musculi uerō motū, nō item: quippe tangendi sensus, pati aliquid, potius q̄ agere, deprehenditur: proinde ab exigua facultate functio eius perfici potest. At musculorū motus in agendo, nō in patiēdo, actionis efficacīā possidet. Is enim totū corpus transferre debet: quobrem plurima uadiget facultate animalī. Delectatio autē cōdolor omnibus accidit sensibus: sed in oculis minus q̄ in ceteris euidenter perspicit: in tactu & gustu, luculentissimē: ab nō deinceps in odoratu: atq; hunc tandem auditus sequit. Iam uerō affectio præter naturā uolenter affatimq; incidens, doloris (ut Plato inquit) est causā. Vbi uerō corpus ad naturalem habitū redit, uidet rursus affatim, oborū uoluptas. Porro uehementis eueniūt in tactu a naturali habitu transmutationes, ob uio lentem calidi frigidiq; occursum: atq; ob eas res, quæ contundere, secare, extendere, aut erodere possunt. Nam siccitas humorū, nisi calori frigoris iungant, occursum suo inferre uim minime cōsueuerunt. Ceterū lectio & ruptio dolorē inferit, nō ubi tacta est (nisi forte ex accidenti aliquo) sed ubi etiam nūm sit. Jam instrumentū gustandi, quatenus habet facultatē tangendi, a iam dictis causis diuellit: quatenus uerō ad gustum propriē pertinet, ab amaris, acidis, acerbis atq; acerbis: quandoquidem horū sū gula continuū diuiderē possunt. At ab humoribus acerbis resoluti uapores, uim olfactricem infestant: nam & ipsi continuū diuellunt. Auditū uox turbat aspera, grauis, maximatq; & celerissima: quæ modo dū omnis uolentis strepitus. Visum autē, illustrius: mi splendoris offendit corruptumq; candicis, qualis in sole cernitur, maximū ipsiū dolorem inferre potest. Post hos secundo loco molestus quidem est color albus, delectat uerō fuscus: nam ille uisum essentia dissoluit, licet eam cogit citra uolentiam. Color siquidē niger hoc nomine uisionis essentia aduerfat, quod cogat ipsam uolentius, quā ut eam reducat a d naturali habitu. Ceterū id quod nigerrimū est, splendidissimū minus uisum offendit, quia crassiori cōstit substantia, ob id minus efficaciter agit: cūm nimirum omnis res tenuis crassam acutius superet. Sic igitur sol ualde tenuis cū sit, protinus uisum dissipat. Quare si quis diu in dēssimū tenebris uersatus fuerit, postea luci restituitur, occębabitur in quodāmodo. Mētrō itaq; orbibus color, ut uisio-

Tactus inest omni
neruis sensibilibus.

Hæmodia uide
torpefieri.

Torpor, affectus
cōpositus, a quib;
causis oriri
solet.

Nerui ipsi sunt
ne foraminibus
præditi, an in
minori, Galenus
hæret.

Paralytis a tor
pore sola magnū
tūcine differt.

Spina quanta
uerebra affi
ctā, res solū ma
nu.

Vox quibus po
terat.

Motus quatenus
dum partē uol
untariū col
ne, priusq; illa
sensu, sicuti
construit ad quod
accidit in quib;
bus partē quā
per diuersos ner
ui uicinas fa
cultatē recipiūt.

Tactus pui
videtur prius
quā agere.

Tangendi fac
tū nerui ad
gustū similitudine
posse possit.

Motus uer
ma facultas in
desert.

Dolentia ex
dolor quib;
sensibus maior,
ex quib;
maior ad
sit.

Dolentia causa
Voluptas quā
do fiat.

Dolentia uer
causā, nec hū
ditas inferri
propterea ratione.

Costandi sensu
rium a quibus
nam afficiatur.

Olfactum aeris
vapores infestant.

Auditum quā
obstruunt.

Visum quā
afficiant.

Carulem color
est opacissimus
oculis.

Niger color quā
ratione res ad
aeris.

Tenuis res an
non crassam in
uitate superet.

Sol res uisum
dissipat.

Tenuis res an
non crassam in
uitate superet.

Sol res uisum
dissipat.

ut uisioni lucidissimus est, ira maximè quop
præbet uisionem: sed nō illa, quæ à sole disculsa fue
rit. Huic enim ut pote iam ægrotanti, contrariū
remediū (uidelicet color niger) est adhibendū:
ei uerò quæ fana, fed fatigata est, color cæruleus,
fuscusq; saluberrima fpeculaculā existunt. Porro
fuscus color, ex albo nigroq; contemperans na

nium utranque pro suarum affectionum modo perinde afficiat, atque orificium ventriculi, qui stomachus appellatur. Siquidem syncope, cardialgia, dyspnœa, aptœa, morbus, epilepsia, delirium, infantia, huius partibus occasione euenire solent, idque consensu legit. Abolitum uero, difficilem, et depravatam appetentiam, ipsa per se sustinet. Abolitum uoco appetentiam, dum quies nihil omnino appetit: difficilem, eam que est imbecilla. At

On ventricul
near affluen
majority legs of
rupina raiione
1 can't.

Nutritio facil-
liorem ad ali-
ter perfectam ani-
mationem quam
in planta.
Ventriculus pro
plantarum corpore.

Asperula emul.

Fumaric acid

*Appetentiam
vando aboleri
et ambocillam
dila, vel viles
continuat.*

Canina appet-
tencia à quibus
causis proficiat
tur.

Frigidis sacri ap-
petentiam extin-
guunt.

Serius falsi hu-
moris atq; balis
fi gignunt.

*Pariter cur à cap-
calore impediatur.*

1978.

Appetentia po-
tante quibus de-
tus aut pere-
at, aut minua-
re, aut depre-
at.

Color niger, fus-
cus, carnalisq;
discretus. Sub mi-
nuta visus can-
ferat.

Colores mediū,
ex contrarijs in
necris confusis o-
runtur.
Audiam bene af-
fectū, & agrotū,
quæ voces sint
infusa, & qua
trata.

*Sensuum qui
maiori voluptate
se fruuntur. Et
qui crassiora ob
iecta possideant.*

Vapor est exte-
rioris humor.

Conferunt qui fac-
ciunt deus.

*Pinguis succi, ex
asperata lenior*

Ventriculus in-
ferior v. superior
etc. TENA.

Oderandi vin,
naparraquedi in
ternei, vbi sunt
grana, fructus :
qui vbi delecta
biles sunt, cum
larum.

*Sensus intra se
nullam affectu
vehementem pa
ssionem.*

Grilled meat
beefsteak with

tionem compre-
hensionemq; co-
muniatur cogiti-
one data, volo-

1900

**Orventriculi ex
confusione et
senso predictum.**

biliosior: interdum etiā, cum ueluti feruet in eo natura ipsius humiditas. At prauas ponones nonnulla appetunt, pro uinoli humoris, qui in ipsis uincit, ratione. Est præterea & aliud symptoma nōnunq̃ oculū uentriculi infestans, nempe cardialgia uocata, quæ à mordacibus succis oritur. Bulimosa etiā, siue inextinguibilis fames, symptoma est eiusdem particulæ, ubi ipse enuria, imbecillitas, atq̃ refrigeratio afficitur. Murandum autē nō est, si ob oris uentriculi affectus, animalia maximis ipsidemq̃ uelimentissimis affectibus affligantur, cum nimirū pars illa per neruos quidem cerebro, per arterias autē cordi, uicino sibi, suas offensiones comunicet. At uerò singuli sensus in singulis particulam instrumentū à sensibilibus alterati, perficiuntur. Hanc uerò alterationē pars alterata sentit, eodē quod à cerebro suscipit facultatem, quæ ad ipsam per neruū deriuat. Quippe cerebrum nō ut sit sentiens instrumentū, sed ut sensum instrumentis uim sentiendi largiatur, à natura institutū est. Nam quod si singulis animalibus per neruos sentiendi facultatē transmittat, liquidō pater, ubi neruus aliquid hæc diffusus. Siquidem pars ea in quam neruus ille distributus est, protinus sensum amittit. Taceo sensus inter dormiendū, ut ociosos omnino esse, aut debilitate agere: quod tūc exigua facultas à cerebro in reliquis partibus defluit. Quiescit ita quæ per somnū animalis facultas, naturalis autē ualidius operari uidetur: cum tunc cibum multo melius coquat non in uentriculo modō, sed etiā per uniuersū corporis habitū. Est etiam rationi consonū, illud animalis membrū, in quo animalia rationalia, ueluti in arce habitat, aliquando quiescere. Cor siquidem exigua à modō libere quietē uidetur, quod longiori nō magnopere indigat. Atres aliter se habet in cerebro: quod quidem per uigilias officio suo semper fungitur, per somnū uerò fessatur. Quamobrem profundius uidetur dormire ē, qui fatigati multa exercitatione fuerūt: utpote quibus inter exercitandū plurimū facultatis à principio defluebat: quo circa cerebrū & requie & uirum instauratione indiget, tum ob facultatis, quam transmittit, inanitionē: tum ob labores, quib. per multas functiones defatigati est. Quænamodum autē exercitati & proniores sunt ad somnū, & grauius dormiunt: ita illi quoq̃ qui cibum ingesserūt. Atq̃ hi eodē grauiori detinentur somno, quod ingessu cibum multo suapte natura fuerit. Inde & ē qui plurimo se uino ingurgitarūt, aut balneis multis, calidissimis liberaliter circa caput sunt usi. Quippe lucis modū omnia implere cerebrū suo madore uident: qui alioqui nō est inutilis ei quem multa exercitatio & lassum & aridum reddidit. Etenim quod repletio capitis somnū cōducit, satis Aristoteles demonstrat. At uerò si à frigida multatq̃ opprima humiditate ipsum cerebrū, ueternos lethargicū somnū inducit. Igitur ea quæ duntaxat lument, nō ab re somnifera nominant: quæ uerò refrigerat, ea nec somnū cōducere, nec indolentiū inducere uerē dicitur: sed pro somno ueternū, grauēq̃ soporē: pro indolentia autē, uel abolitionē, uel difficultatē sensus efficiunt: aliq̃ ob frigiditatis excessum. Rursus sic-

citas immoderatio, & calor, ueluti in phrenitide, uigilias infert: quas neq̃ morositas, neq̃ solitudo peperit. Sed apoplexia etiā & morbus comitialis affecto cerebro fiunt. Verūm ut prolium sum somnus sentiendi functiones: ita apoplexia eas actiones quæ pendet à uoluntatis imperio, offendat. Ad hæc, qualis est insomnietas sentiens functionibus, talis est cōuulsio per morbū cōminale moribus uoluntatis. Porro cōuulsio quæ per totum corpus fit citra delirium, aut soporem, à spinalis medullæ, quæ in ceruice continetur, morbo dependet. Si uerò uel manus, uel crus, uel mūsculus distendatur, aut conuulsatur uolenter, ad illud semper neruum, qui partem mouet, referenda est uoxa.

GALENI PERGAMENI de symptomatū causis lib. II.

Q Vandoquidem iam exposuimus symptomata quæ circa sensum uersantur, operæprecum fuerit deinceps illa etiam examinare, quæ sub deprauato motu, seu cōmuni genere continent: cuiusmodi sunt, cōuulsio, tremor, palpitatio, singultus, rufsis, ructus, sternutatio, pandiculatio, & fridor dentū. Quorū fane nōnulla quidem nature sunt opera, sed coactæ ab aliqua causā præter naturam: alia morbos sequuntur affectus, nihil ad ipsorū generationem cōferente natura: alia deniq̃ à naturā à morbo simul cōueniunt ducunt originem. Porro nature opera sunt, sternutatio, tussis, oscitatio, pandiculatio, & singultus. Solius morbi, palpitatio, cōuulsio, resolutioq̃. Sicuti amorum cōuulsio, omnis torpor & tremor. Ad quorū fane omniū particularē propriatq̃ discretiā inuestigandas, sciendum est, quatuor esse facultates, quibus omnia quæ aluntur corpora gubernantur: attracticem uidelicet, retentricem, alteratricem & expultricem. Cum igitur iuxta naturā ex lege animal gubernat, nullus ipsarū motus esse symptoma censetur. Quod si quippiā in eorū præter naturā cōsistat, insurgatq̃ ad ipsum deſcendū expultricis facultatē aliqua, fit interitum ut ipsarū motus sensui minime percipiant, interim ut nō lateant sensum: utriq̃ tamen in naturam symptomaticam tranſeant. Igitur functionis à uoluntatis imperio prodeuntis noxa est, neruorum resolutio, cōuulsio, tremor, stupor. Ceterum si instrumentorū quibus respiratio perficitur, resoluti sint nerui, apnœa, hoc est, abolita spiratio: si uerò uocales nerui, aphonia, id est, uocis priuatio, uocatur. At lingua paralysis, et si sermone, uoluntatis opus, omnino tollat, nullū tamen propriū obtinuit nomen. Rursus ichuria, hoc est, suppresio, haud abſimile quiddam apnœæ significare uidetur: quæ per ipsam functionē, à natura, nō à uoluntatis imperio pendens, tollatur. Sed si quis inuitus cogatur mētere, uoluntariū functionis offensa est. Haud aliter alui exercitiū, si supprimant, ad naturalem suū deſcendant, idq̃ homine inuito, ad uoluntariam functionē noxa referri debet. At si paralysis totum corpus inuadat, symptoma ipsum apoplexia uocatur. Cōuulsio etiam ipsa pro uarietate particularū, uarias appellationes sortitur. Nam si man-

Cardialgia uocatur.

Bulimosa quæ dicitur.

Oris uentriculi cum principibus membris coniuncta.

Sensationes quæ modo fiunt.

Cerebrum quæ sunt conditum.

Cerebrum uim sentiendi participans per neruos largitur.

Facultas animalis per somnū quiescit: natura in operari uoluntatis.

Exercitati uel uigilantes, uel dormientes.

Cibo ingesto corpus ad somnū redduntur.

Cerebrum quæ possumus implere.

Capitis repletio cōducit somnū.

Veternus causa.

Lethargus causa.

Somnifera sunt humectantia.

Soporifica dicuntur quæ aeternum refrigerant.

Vigilias uel uigilantia uocatur: quæ calor immoderatus.

Apoplexia quæ est affectus sui.

Epilepsia quæ est cōuulsio sui.

Sensus deprauatus est symptoma.

Symptoma quæ ad uoluntatis deprauationem spectant, alia quæ dicitur natura, alia morbus sunt opera, fieri alia uoluntatis.

Facultas naturalis sunt quæ sunt.

Motus uoluntatis quæ sunt.

Apnœa quæ dicitur.

Aphonia quæ dicitur.

Lingua paralysata.

Ichuria natura seu frigiditas colicis.

Exercitatio inuoluntaria seu reflexa sunt.

Apoplexia est paralysis totius corporis.

Dentis frider.
Strabismus.

Conuulsio.

Singultus.
Inspirationis do-
pice respiratio.

Epilepsia.
Semper quæ fiat
modo.

Tremor omnis fa-
cili a plerumque
ne aut ab manu
habet.

Tremor fit, ipsi-
um membrorum
conuulsione
conuulsitate.

Tremorem esse
uoluntariam a-
ctionem sed con-
uulsam.

Animi affectus
tremulas fun-
ctiones efficiunt
ac simulat mor-
bi corporis.

Senectus et in-
temperies.
Tremore con-
uulsio multum ex
ueneribus corru-
piuntur.

Palpitatio quid
et quomodo par-
tis accidat.

si mandibulari musculi cōuellantur, stridor den-
ti si uero oculorum, tum peruersio, tum strabis-
mus, symptoma dicitur. Iam uero si rigido pe-
ne semen effluit, ueluti cōuulsio quædā ipsa go-
notheca existit: si nō riget penia, referri debet
ad retentricis facultatis imbecillitatem. Non de-
sunt & quibus uideantur linguas, tum du-
plex inspirandi aëris refractio, aliquando ex cōuul-
sione muscularū quæ inspirationi inferuunt, pro-
cedere. Epilepsia autē est conuulsio uniuersū cor-
poris. At stupor imperfecta quædam est resolutio
neruorum, efferit seque multum symptoma, cōuul-
sibus in unū pugnantibus morbo simul & facul-
tate. Omnes autē affectus qui neruos intendere
possunt, in duo capita reduci: plenitudinem scilicet,
atque etiam inanitionem. Ac phlegmone quidem,
plenitudine pariter ardentissime autem & aridissime
febres, inanitionē. Quod uero ad motum imbecillitatis pertinet naturalem, si
manū extendere, extensusq; immobilē seruare
ualeamus, animalis facultatis hæc functio est: qui
status, & motus & immobilis dici potest. Sin
autem supra ne aliquam solidam, re cū ualent
manū deponere, omnes muscularū actiones laxauerit,
hanc manus quietē neq; ad morbum, neq; ad
facultatē, sed ad innatam animalibus grauitatem
referre oportet. Quemadmodum autē extensa
manus duobus quæ ualentibus regitur morbus:
furium quidem scire te facultate, trahente uero
deorsum iuxta grauitatē: sic etiam tremor
perficitur duobus morionibus: una, qua cogitur
membrū ob grauitatem ad inferiora deliscere:
altera, qua sursum fertur ad facultatē. Pugnat
itaq; per tremorē manifeste facultas cum grauitate:
uicissimq; facultas nunc uincit, nunc imbecillitas
uincitur. Quobrem contrariū semper inter se
motū succedente, tremor fieri uidetur, cum sit
motus cōpositus, quemadmodum arteriarū pulsatio.
Patet ergo luxius quoq; symptomatici generatio,
& quod omnino cum conatu sit mouendi,
secundumq; uoluntatis imperiū, cum facultas
tamē infirmirate. Porro maximum onus
ualentem deicit facultatē. Inualem uero, nō
solum hoc, sed parua quoq; prosternt fascina.
Quod si ad multā imbecillitatem deuenierit,
ul sub proprio opprimitur corpore. Quemadmodum
autē animi affectus, qui motricem facultatē
imbecilliorē reddūt, tremulas functiones efficiūt
(ut in timore uidere licet) sic morbi corporis
in cōmodatē uiribus, tremoris symptomatici
inducunt. In primis itaq; & omnium maxime
officit facultati, quicquid in intemperie cō-
sistit. At senectus quoq; intemperies quædā est,
ad frigus & siccitatē procliuior. Quamobrem
senes facili tremore uexantur. Ex iuuenibus
uero corripuntur, qui uehementer fuerunt refrig-
rati, & qui multo meraco uino se repleuerunt,
aut multas subinde cruditates congesse-
runt, aut qui diu multis cibis ingestis, nullo
uili sunt exercitio, sed ignaui in ocio
uixerunt, aut qui intempestiue frigidam
aquam biberunt. Præterea crassi lentius
succū, facultatis meatus obstruentes,
tremorem efficere possunt. Palpitatio autē
est dilatatio præter naturam, omni parti, quæ
dilatationē suapte natura admittit,
accidere potens, aliarū uero nul-

li. At dilatari sunt nata, omnia quæ naturaliter
mollia existunt. Palpitatio itaq; nonnunq; cū
subiectis illi musculari, & uisceribus accide-
re cernimus: quemadmodū ipsi cordi & arteriis,
alio in eis præter pulsū (qui ab iuxta facultate
fit) deprensio mori. Cū autē palpitatio ipsa
celeriter oriatur & euascentia, necesse est illius
causam esse aëream essentia. Quæ quidem si pau-
ca fuerit & tenuis, illico a corpore defluet. Proinde
uidetur esse uapor crassus ac multus, idip-
sum ipsa cū in quo cōtinetur. Dilatat igitur, at-
tollit, atq; iussit partem, donec uiscerum explo-
sio, in cognatū sibi aërem expleret. Verisimile
autem est, refrigeratis quomodo libet partibus, at-
que interdum etiam obstruētis, palpitaciones acci-
dere. Porro uniuersus palpitatio mori, quo in
utranq; partē agi uidetur membrū, existit præ-
ter naturam: qua ratione a tremore distinguitur,
et quod etiam maiora intervalia, quā tremor ipse
se, sortiatur. At uero, ut in membrorū palpitatio-
ne sit motus paucus, paruus, & rarus: ita in
rigore sit multus, citus, & frequens. Atqui multū,
uoco ex ipso motionū numero: citum, ex morionis
impetu: frequentē, ex breui tempore quietis. Cæ-
terum motus hic nō est uniuersus præter naturā,
ut palpitatio & cōuulsio: sed potius totus ad ex-
pulsivam facultatē est referendus: est ipsam ir-
ritans causa, cogensq; ut uiolenter moueat, præ-
ter naturam esse cēlestat. Est itaq; rigor motus
quidam cōpositus ex causa præter naturam, & fa-
cultate animantis, sed in quo uirtus, quā in tre-
more, est uegetior. Ut autē exempla facultatis ex
pultrici proponam, uertus nō alio pacto ad fac-
tus additionē insurgit, quā ut retentam expel-
lat molem. Cū enim nouē mensibus sustineat
rum fortis grauitatē, tum ipsam ipsius extensio-
nem, atq; totum hoc tempore osculum ipsius adeo
exacte claudatur, ut ne speculi quidem aculeum
admittat: absolute pulsat, ad ipsius secretionē ac-
cedit, diuersa omnino cōstitutione affectus. Nam
fauces quidem ipsius antea clausæ, adeo patent,
ut facili per ipsas totus fortis erumpat. Tunc
uero plurimū antea extente, & contrahunt un-
disq; & fortis explodunt, ut q̄; celeriter ab uteri
cervice decidat. Corruptū uero factum enit illa
facultas ex pultrici, aut tertio, aut quarto, aut alio
quolibet mense, hanc aliter ut insitante pariendi
tempore, matricis fauces aperiens. Similiter etiā
uentriculus, ingessis cibis, claudat inferus oscu-
lum, ac nihil egredi sinat, priusquā accuratē con-
coctum fuerit: si modō nihil aliud interciderit
ipsam cogat functionē: quemadmodū corrupte
la factus in utero. Sic siquidem solet uentriculus
narantes cibos euomere: ad inferiora uero ten-
dentes, per inferiora decipere. Sine cibis etiā
insurgit sæpe uentriculi facultas ad uomitū. idip-
sum prauam aut bilem, aut pituitā, aut aliu huius-
modi succū, aut saniem. Iam uero qualis est per
nominationes in uentriculo expultrici actio, eius-
modi etiā per tussis, est in pectore, & in pulmonib.
beneficio spiritus qui ad exteriora uelementer
mouet. Nullū autē animal aut nauicare, aut uo-
mere, aut tussire didicit. Verū si causa præter
naturam, aut uentriculi osculum, aut respirationis
meatū obfederit, protinus animal uel uomitōe,

Palpitatio est
de uiscerum
motu a pulsio.

Palpitatio fit
in uapore cras-
so sicut et mul-
to tacto in pal-
pitante parua
la.

Palpitatio non
motu cūlis
præter naturā.

Palpitatio a tre-
more quæ dis-
tinguitur.

Rigor a defici-
mo non multum,
ei tunc atq; frequen-
tem.

Rigor est refren-
dus ad rem ex-
pulsivam.

Rigor est motus
cōpositus ex cau-
sa præter natu-
ram, & facultate
animantis.

Vteri cernien-
tia ex laxitate
opportuna.

Ventriculi retin-
tio, expultrici
facultas.

Sternutatio.
Nares sunt mo-
tus respiratorius

Tufus quid fit.

*Humores qui à
pectore educan-
tur facile.*

*Sternutatio, quoniam tufus, et
dolus à pectore
impulsi homo-
res euellunt.*

*Tufus miri con-
ducit caput.*
*Sternutatio im-
uat plurimum
caput, nisi ob de-
finitionem ac-
cedat.*

*Naribus prece-
dit vomitus.*
*Cerebri prece-
dit tufum.*
*Tufus remota
esse, quæ stertis
intercipiunt.*

*Tufus ob resi-
gerata organa,
stertus colubis
non prohibetur.*

*Spiritus colubi-
tus calidus in or-
ganum respiratio-
nis adtingit.*

*Atque in inter-
pores cutis nullo
efficitur dolore.*

*Dolor quando
accidit.*

*Inaequalis inter-
pores dolores so-
cum inducunt.*

uel tufus uexabitur. Ad horum genus refertur etiā sternutatio, quæ expelluntur quæ retenta in naribus hærent : quæ & ipsæ, miratus respirationis existit. Spiritus igitur uehementer motus, carū miratus expurgat, ribicunum exemplo, ribas fistulasq; expurgantur. Itaq; huiusmodi motus, naturæ opera existunt : annumerant tamen symptomatis præter naturā, ob causas naturā ipsam ut sic moueat cogentes. Tufus porro nihil est aliud, q̃ uehementissima effusio, quæ plurimus spiri-
tus celerrimè foras erumpens, impetu suo ex-
trahit explositq; excrementa, meatum ipsius obstruunt. Expelluntur autem facili, quorum nec nimis aquosa, nec lenta essentia fuerit. Cæterū illos humores qui in arteria contumaciter hærent, & qui difficulter expectorantur, magis euellunt sternutatio : utpote quæ ualidior, q̃ tufus, habent spiritus impetu, licet aliam generationis suæ causam fortiani. Quippe non ob ea quod asperis arterijs, sed naribus molesta sunt, spi-
ritus uolenter emittitur, cum quo ex prioribus uentriculis cerebri explodi nōnihil solet. Proinde tufus caput nō cōducit. Sternutatio uerò, uisi ob deflillationem acciderit, haud mediocre prædidi affert capiti repleto uaporib. Nec mirū uideri debet, spiritū unico impetu & ex pulmone & ex capite emitti : nam cū principii insur-
git, ut expellat quæ insistant nares, utroq; uirur expirationis meatu. Hæc igitur sunt facultatis à uoluntate pendentes symptomata. Vomitus uerò, quis illis proportionē quæ respondet, ad facultatē naturalem refertur. Ut autem uomitū natura præcedit, sic tufum ceruicis, exiguas ad tufum impetus. Porro quicquid spiritū interceperit, id tufus resicere oportet : siue humor sit à capite defluens, siue illap̃sa portio cibi uel potus, siue aliquid in asperis arterijs collectū, ut in peripneumonia, pleuritide, & in conuexarū ieci-
noris partium p̃ilegme, aut in gutturis ipsius asperantibus. Est & aliud tufus genus, quod accidit respirationis organis refrigeratis. Sed ita affecti nihil inter tufiendū expuunt : adeoq; est exigua ea tufus, ut spiritus colubitione suppri-
mi, & ne eueniat, prohiberi possit. Quippe auge in instrumentis respirationis calor, ob colubitam animā : spiritusq; sub thorace uolenter oppressus, in omnes arctos meatus penetrat. Hæc autē utraq; dum sunt, omnia leuigant, ad temperantēq; æquabilitatē perducit. Iam uerò intemperies ipsa, inter dū simpliciter qualitate, interdum duplici cōstat : nonnunq; eiusmodi qualitates comitatur id quod intemperatū est, ueluri ros quidam. Sedenim æqualis intemperies nullo dolore affligit, cū nimirum particulæ affectæ ad sit iam ueluri acquiritū quædam natura. Nullem autē corpus à sua ipsius natura infestat. Nam si quorū natura mutatur, corrumpiturq; dolore afficiunt : nō quorū iam mutata aut corrupta est. Vbi uerò in corpore quopiam sentiendū uī prædido, inæqualis suboritur intemperantia : quantal fuerit intemperici magnitudo, tanta etiā erit molestia. Quare per tales intemperantias inæqualitatē quamdam sentire se aiunt ægri, & p̃andulanti, omnesq; partes distendūt, scē tu endigrati. Distendunt autē maximè à somno exper-

recti, utpote carnibus uaporina excrementa sentientes, tum ob cōgesti cibi cōtione, tum ob lu-
iusmodi motionū quietē. Triplex autē in lassitu-
dine potest oriri sensus : cōrundens scilicet, tensi-
uus, & ulcerosus : idip̃ à causis præter naturā om-
nes corporis partes quassantibus, distendētib; exulcerantib;. Igitur ubi tendi uidet corporis mole-
lea circa quamp̃q; exercitationē, affectus is lassitu-
dine tensiois spontanea uocat : quemadmodū ob ulcerosa, ubi ulceris sensus transcurrere per cor-
pus apparet : id q̃d motis magis accidit, q̃ quies-
centibus, nisi admodū magna sit lassitudo. Per-
tertiū uerò lassitudinis genus, quo aiunt sibi quas-
sa esse ossa, ne minimū quidem motū tolerare æ-
gri possunt : sicut nec per lassitudinē ulcerosam, ubi nimilū increuerit. Cæterū quemadmodū ubi ulcerosus fit sensus horrent ægri, si cōmoueant : ita horrois affectus, si aliquis motus accesserit, in rigore transit. Atqui hæc omnia oriunt ab ex-
crementis mordacib;. Dissertūt uerò inter se ex-
crementorū multitudine & motu : propterea quod alia magis, alia minus erodant : quodq; ex corpo-
rib; ipsi; alia sint imbecilla, alia facilia, alia æ-
grius & afficiant & sentiant. Facit etiā discrimen causa, ubi citius uel tardius mouet. Ad hæc idem etiā homo, dum quiescit, solam interdū sentit in æqualitatē : dum mouet, horrore : dum uerò exer-
citatur, rigore. Quobrem sic affectus cōsultant medici, ut ab omni motu se abtineant. Quinetiā sol, balneū, exercitatio, ad motū excitant excrementa, alioq; quicquid entia : quemadmodū & ex animi affectibus ira. Porro à seipsis ad mortū excrementa insurgūt, si uel caliant, uel extenuent, uel in spiritū dissoluant. Causa itaq; emotio longe est molestior quiescente, præsertim ubi defertur per corpora sensibilia. Cū enim quippiam per hæc transiens, uolenter ad cutim fertur, in ipso per carnē cutemq; transitu necesse est ut stimulet, pungat, diuidat, uulneretq; partes om-
nes, quibus obuiū fuerit. Omnis autē causa mor-
dax moratq; siue frigidissima, siue calidissima fuerit, & horrore & rigorem animanti inducere potest. Cæterū febres tertianæ, ut omniū maxime biliosæ calidissimæ, ita præ cæteris maxime horrore possunt efflicere : quod fuerit syncyres, eō in ipsi; uehementior sit rigor. Porro ardentem febrem rigor superueniens soluit, quod bilis quæ interim in uenis cōtinebat, à natura per cures ad cutem decretoriē excutiat. Quare motio-
nis eius, rigor & symptoma est & signū. Nam lu-
iusmodi rigore affecti, postea sudant, & liberant à febre, nimirū eiecta bile. Quæ interdum etiā nō ad cutem, sed ad internas partes impetum faciens, uel uomitione, uel alui solutione deiciit. Sæpenumero & intrō & foras eadem die defert, ut simul & sudore & uomitu & alui deiectione bilis uacuet. Vbi igitur erodēs quippiā in particulis cōtinetur, contrahuntur sanē, præcipue si illud moueat : quare maximè ad eius expulsionē se-
stinant. Contrahunt itaq; atq; cōstringūt sese, mox quilibet impellit eam quæ cōtinet excrementi portionē. Atq; in hunc finē modū motus uniuersis particulis, totum corpus confusione quaffationeq; uexatur : qualis uidetur in ijs, qui sunt rigore correpti. Similiter etiā cōtinentur thoracis

*Exponit hūc
modum curæ
dant.*
*Lassitudinis
multiplex potest
ori
sen*

*Lassitudo
sensu spontanea
quæ.*
*Lassitudo
sensu motu
accidit, quæ
quiescentibus.*
*Lassitudo
sensu
dant.*

*Horror transi-
it in rigorem
sensu
sensu*

*Excrementa à
quib; causis
mouentur.*

*Causa emotio
longi est
molestior
quiescentibus.*

*Mordax motus
omnibus
frigidus
calidus
dant*

*Rigor ardentis
febris, ita
superueniens,
cur
soluit.*

*Constrictio
quæ
modum
corpi
dant.*

thoracis musculi, ea quæ carnibus ipsorum molesta sunt, per pulmonum arterias expellere properantes. At uerò uenâ illi ægri cum egeat reiectione sputi per regionem pulmonis, nec eam ob imbecillâ thoracis moliri queant, sibi æternitatem prouocant, naribus irritatis: urob uolentibus motione impetibus, æque expuant, quæ tuisiendæ autem renescere haudquaquam poterant. Illa autem tuisis, quæ ob interemptum organorum respirationis accidit, ad horrores rigorisq; genus pertinere uidetur. Vbi uerò quæ corpus infestant, humida suapte natura fuerint, per tuisam ac rigorem ab expultrice facultate impulsâ, ultra citroque ferunt, donec applicuerint ad cõuenientem euacuationis locum. Sin autem solus spiritus sine humore, immodice uel calidus uel frigidus per corpus transeat, in tunc horrorem excitat, ac nõnullumq; rigorem: nulla tamen sequitur cõspicua euacuatio. Cum igitur & frigida & calida causa possit excitare rigorem: calidæ quidem, si ærea fuerit, refrigeratio satis efficaciter auxiliatur. Si uerò sit humor, eam febris necessario sequetur. Curatur autem euacuatio. At frigida, si ærea fuerit, remediū est calfactio. Sin uerò sit humor, interdum sola cõcoctio sufficit, interdum uacuatio, nõnullisq; ambe cõueniant. Etenim citra febrem nonnulli oriuntur rigores ob pessimam uisus rationem, ubi quis per oculū se impleuerit, & subinde a cibo lauerit. Quia rigoris speciem uel res ignorarunt medici, quod homines pueri mori uel seculo, nec tam interempter uiuerent, nec tam crebro lauaret. Attamen rigor ille quo partes uehementer quatuntur & cõcitantur, ab frigidis succis nunquam excitari uidetur: quod nõ ob crassitudinē uehementer moueri nõ possint. Iam uerò si rigor per febrem nõ intermitteat acciderit, idq; ægro imbecillo, est letalis, ut inquit Hippoc. Si quidē in eiusmodi rigoribus insurgit natura contra res noxias, quod eas expellat: sed uicta cadit, extinguiturq; atq; hanc ob rem redditur perniciosum symptoma. Porro in quartanis febribus succus ex calido frigidisq; mixtus, rigorem excitat: quippe atra bilis suapte natura frigidus succus censet. Vbi uerò adeo putris effusa est, ut febrem inducat, quāta adfuerit illi putredo, tantus & calor inest. Cuius autem rigor a calido simul & rodētibus succis fiat, mirari haudquaquam oportet, si partes extremæ omnes refrigerant, declinante animali facultate unā cum sanguine ad interiora: qualem mortū uidere licet in cõpluribus animalibus affectibus. Quod uerò ad animæ essentiam pertinet, quæcunq; illa fuerit, & duobus alterū fieri oportet: aut quod ad omnes functiones ut primis instrumentis utitur & spiritu & sanguine, ac uel alterius, uel utriusq; calore: aut quod in his ipsis consistit. Per timorem etiam & spiritus & sanguis intus sese recipiunt: quo fit ut algcant partes in superficie positæ: idq; adeo interuenit uehementer, ut nõnulli rigore quoq; arripiantur. Per iram uerò solouitur ac dispergiuntur, proinde exteriora incallescunt. At agonia, affectus ex utriusq; cõsensus, inæquales habet motiones. Iam & cordis & arteriarum pulsationes, & minime, & per quod debiles in trepidantibus esse uident: sicuti in ira tunc maxime & qualidissimæ. At in agonia sunt inæquales. Per euectum diu, animalis facultas in pri-

mis quidē ad interiora mouetur, sed rursus astringitur redit ad exteriora. Nam si nõ redierit, nõ uerecidiā, sed timor censeferi debet. Vt autē in timore cõsertum, sic in tristitia paulatim ad interiora firmotus: magnitudine duntaxat ac uehementia, nõ toto genere differuntur inter se pathematia. Atqui nõnulli ob subitū timorem perierunt: id quod solet cõtingere, ubi debilis suapte natura animalis, sub ualida perturbatione cõsensit & extinguitur & suffocatur. Etenim extinctio, æscitum ex refrigeratione ortū consequitur: suffocatio autē, concursum sanguinis uniuersi ad ipsum principium. At ex iratis nemo mortuus est unquam: utpote quibus negi calor refrigeratur, negi robur dissoluit. Præ gaudio autē nonnulli supra modū pusillanimes animæ exhalantur, quemadmodum & timentes. Iam dolor ē diuerso cogens moueri animā, laud leuiora symptomata, q̃ maxime timor, inducit. Quippe laborantes decolores fiunt, refrigerant, cõcutiuntur rigore, tremunt, pulsus habet minores, exolutoiq; ac tandem similiter q̃s qui perterrentur, moriuntur. Nam dñi ipsi fugit infusus calor ad suū principium: animaq; simul & soluitur, & extinguitur. Per rigorem itaq; frigus non internatur, sed externatur partū sentitur. Quamobrem tunc nõnulli uehementi siti cruciantur, nimis ipsi interno calore feruato. Cõfiscatur igitur, pugnatq; per rigores cõtra ea quæ infestant, facultas, donec radicibus euellantur, excutianturq;.

* Ob incussiones autē uehementes, & quia etiā in intimo corpore cogitur, rursus magna ui caloris reuertit, leuiterq; a rigore accendit, in eo certamine letantiam habens auxiliatricē: unde & febres euadit uehementiores. Quod si aliquando in pugna defatigetur anteaq; dimouere res noxias possit, necessario mors subsequetur. At pruritui, qui excrementorum leuiter mordicantiū est sensus, eos uexare solet, qui aut balneo negligunt, aut stringentibus redunt, aut cruditatibus sunt repleti, aut prauis succis cibis uescuntur: sed præcipue affligit insectos plora uel lepra. Vt autē prædictorum symptomatum causas accuratius exponā, exiguam quidem est, tenuis, salis, & immota in pruritui. Exigua, tenuis, erodens, immotaq; in lassitudine ulcerosa. Multa, salis, crassa & immota in lepra, plorāq; Pauca, tenuis, mordax, ac breuiter mori possidens, in horrore. Si uerò ad uehementius moueat, aut multū abundet, aut sit mordacior, iam nõ horrore, sed excitare rigorem est natura. Pro intentione autē aut remissione ipsius causæ, interdum aut remittitur symptoma. Iam tuisis causa in pulmone, gutture & thorace cõsistit: æternitatemq; in naribus: singultus uerò, in uentriculo & gula. Atq; in his omnibus expultrix facultas, quæ excitat molesta, & ad motus uehementissimos excitat. Porro æternitatem ipsū nonnullū ex accidenti, humorū in pectore delutescentiū, remediū exiit, licet eius rei gratia excitari nõ fuerit. Similiter purgat uentre & gulam: quia ratione etiam singultus auxiliatur. Sed iam opportunitū est ut de his dicamus symptomatibus, quæ circa principes functiones uersantur. Quorū sanē tria genera deprehenduntur. Primū, ubi perit omnino functio. Secundū, ubi illa ob-

Tristitia quam moriens sentiat.

Timor subitus quādo perimit.

Extinctio quid. Suffocatio quid.

Tratorum cor nullum obiens. Gaudis fuisse nimiales exanimatos.

Dolor quales in decet symptomata.

Rigori exteriori res igitur, & interna insensibilis.

Rigori febri cum superueniat.

Pruritus quid. Et quæ insensibilis sit.

Pruritus causa. Vltima leuissimum causa. Lepa plorāq; causa. Horrore causa. Rigoris causa.

Strenuitas nimis quā ex acci densi conditio excrementis perhorrida, crassa, purgatq; uentre & gulam.

*Stalitia videri
à frigore.
Obstus à frigore
gignunt.*

*Apoplexia can-
sa.
Epilepsia causa.*

*Delirium quid,
et unde ortum
habeat.
Venenosum quid.
Mansa.
Melancholica
alienatio.*

*Venenosum gi-
gnenda requirit
tur phlegma
in cerebro, aut
in membranis il-
lus.*

*Ata bilis fidem
rationis occupat
tumorem, multu
biam, ac mortis
expectatione in
ducit.
Tumores perve-
re facient.*

*Hypochondria-
cum afflicum.*

latur. Tertio, quando in aliena speciem dege-
nerat. At perit quidem functio in stultitia, obli-
uione: qui affectus à frigore oriunt. Quippe
medicamentis quæ huiusmodi symptomata fa-
cere possunt, refrigerandi facultas inest. Hæc itaq;
symptomata cerebri corpus esse refrigeratū de-
clarat. Apoplexia uero epilepsiaq; ex subitanea
collusione pituitæ, repletis utriculosis cerebri,
nasci vident. Proinde horum symptomatum subita
est generatio & discussio, qualis esse per corpo-
rum interperies nō possit. At modica offendicu-
la, ac uelut torpores tum ranonis, tum memo-
rie, ob minorem refrigerationē eueniūt. Porro de
lirium omne, deprauatus est principis facultatis
morus, à prauis succis, aut cerebri intemperie or-
tum habens. Cæteri phrenitis dici, si febris ad-
sit: ut mania, si absq; febris accedat. Solæ autē me-
lancholicæ alienationes, à frigidiori succo pro-
duci solent. Nam phrenitis nō simpliciter ob ca-
lidos succos accidit, sed cum phlegmonē uel in
cerebro, uel in ipsius membranis producant. At
que deliria in acutissimarū febriu uapore oriun-
tur, mordacem calidumq; uaporem habent, cere-
brum occupant. In omnibus autē animi aliena-
tionibus, si timor atq; tristitia dū perseuerent,
atram bilem in causā esse indicium. Quod uero
atram bilis rationalem animæ arcem occupat, timo-
rem, mentis, ac mortis expectationē inducat,
nihil mirandū est, cum uidemus in rebus exter-
nis nihil magis nos, q̃ tenebras ipsas, perterrefa-
cere. Si igitur quippiam tenebris simile rationa-
li parti animæ circumfundat, hominē semper ti-
mere est necesse, ut quæ timoris causam semper
in corpore secum ferat: ut in statulento stilo mor-
bo, quem hypochondracum nominant, in dies
uidere licet.

GALENI PERGAMENI de symptomatum causis lib. III.

DEinceps autē de symptomatis quæ circa
tum actiōes, tum facultates naturales uer-
sant, dicendū est. Quandoquidē igitur cō-
coctio nihil est aliud q̃ alteratio secundū qualita-
tem, quā utriculus nimirū molis, dum sibi ci-
bos assimilat, nemo sanē negauerit alterationis
errorē fore cōcoctionis symptoma. Ceterū si nul-
la penitus alteratio fiat, hoc symptoma absolutē
uocatur cruditas. Si uero fiat quidem alteratio,
sed nō qualem fieri expedit, uocabit & hæc cru-
ditas, nō quidem tanq̃ priuatio, sed ceu uiniū cō-
coctionis existens. At uitiū ipsum, bifariam ac-
cidere solet. Aut enim tardē alterant cibi, ut uix pro-
priam transmutationē suscipiāt: aut corrumpun-
tur omnino, ut nullā cōcoctionē admittere pos-
sint: atq; huiusmodi sunt cōcoctionis noxæ. Qua-
rum causā cōmunis quidem est alteratiois po-
tentia ab scopo aberratio. Cuius aberrationis
duo prima sunt genera. Vnū, quod in potētia læ-
sa: alterū, quod in externo aliquo errore consi-
sit. Cæteri potētia bifariam laeditur: aut per suā
potētiā efficiunt, aut per aliquē morbum instrumen-
torū. Error autē externus tripliciter accidit. Nā
aut ab extremis utriculi, aut à cibis, aut à som-
ni tēpore oritur. Iam in propria efficiētia noxæ,
intemperies quædam agentū qualitatū existit,

Ad morbos instrumentorū pertinent tumores
præter naturā, abcessusq; & aliq; affectus cōfimi-
les, quibus si cruent utriculus, impedit facul-
tas eius cōcoctrix. Quod si cum interperie coit
ipsi instrumentorū affectus, utroq; modo facul-
tas illa patietur noxā. Atq; ob hæc omnes causæ
utriculus male cōcoquit, uel nullo extrin-
seco errore incedente. E cōuerso autē utriculo
nō male accide, incedit nō coquit animal, aut
propter ciborū portionumq; immodicā quanti-
tatem, aut qualitatē alienā, aut quia intempetū-
tate, aut nō recto ingerunt ordine, aut propter ex-
crementū inutile, aut somnū breuē. Ordine præ-
posterū uoco, ubi quis aut cydonia, aut punica
māla in primis ingerent, mox olera sumat ex oleo
& garo. Intēpitius autē dicitur, ut si in auro-
ra autēq; hesternis cibis descendit, aut cor-
pus fuent modicē exercitātū, grandiu sumatur.
Porro corruptelæ ipiæ, quæ quidē sum offe sunt,
ex calidioribus, magisq; sumis oriuntur ut cibis:
acidū uero, ex nq; qui frigidiores natura sunt, ma-
gisq; pituitosi. Similiter etiam & in extremis cōtingit.
Acidas siquidem creant, quæ pituitosa sunt &
frigida: fumosas, quæ biliosa & calida. Nec fecus
uenter, sub frigidioribus quidē mor-
bis, acidas: sub calidioribus, fumosas mutatio-
nis efficit. Tarda cōcoctio fit, quia cibi difficul-
ter corrumpunt: uel quia illos facultas nō supe-
rat: uel quia somnus fuit breuior, q̃ ut eos uincere
posset. Vbi uero citra corruptelā cibis omni-
nō cōcoctione priuat, sciendū est utriculū pla-
nē esse uictū, uel ab immodica multitudine, uel
ab ingenti frigore. Ad eisdem reducantur modos
quæ in uasis cruditate contingit: illarū etiam
quæ in tertii cōcoctione gignunt. Atq; hæc om-
nia indicant nobis præcognita cōcoctionis ratio-
ne. Cum enim temperet huiusmodi, quæ ex qua-
tuor elementis consistit, & quæ corporis utri-
culi proprietatē cōstituit, scruimus esse causam
alterationis ciborū, quodq; ad hanc rem nō me-
diocriter cōfert calidum elementū: facili nobis
uia ostenditur, quia cruditatis causas quoq; inueni-
amus. Igitur in uniuersis actionibus tria sym-
ptomata genera reperiunt. Quorū quidē primū
est, abolita actio. Secundū, imperfecta, dimi-
nuta: tertiū deniq; uitiosa seu deprauata. Vtri-
culi itaq; actione priuatur, ubi ne minimū qui-
dem immutat cibos. Imperfectē concoquit, ubi
tardē cōcoquit. Deprauatē uero, ubi cibos cor-
rumpit. Eadem enī habenda est ratio, & in cō-
coctione quæ fit in uenis, & in uniuerso corpore.
Porro ex uitiosa succu gignunt erysipela, can-
cri, gangræna, phagedæna, carbones, herpetes,
aliq; id genus affectus. Actio nutritoria autē
ad uicē, priuatio quidem actionis, atrophia est:
deficiens nutritio, gracilitas: aut uinosa, in leuicia,
& elephantiāsi consistit. Quorū sanē causæ, aliæ
ad potētiæ imbecillitatē, aliæ ad errorē qui circa
cibos committuntur: aliæ ad studia siue exercitia,
& ea quæ extrinsecus animalī accidunt, referuntur.
At uero imbecillitates potētiæ, quæ quidē
proprie sunt, similia intemperie: quæ uero nō
proprie, instrumentales sequuntur morbos. Error
autē circa cibos exhibitos, ad multitudinē, succo-
rumq; qualitatem refertur. Quædam modū & sta-

*Instrumentorū
morbi.*

*Cruditatis, aut
immodicæ in-
tētia causa, ab-
se utriculi.*

*Cydonia esse
elenda in vici-
nis.
Intēpitiositas
horum rjtu.*

*Corruptela
fumosa, acidula, à
quibus cibi gi-
gnantur.*

*Cōcoctio in tar-
ditate uide.*

*Alterationis ci-
borum causæ, est
temperies utri-
culi.*

*Symptomata ge-
nera tria, reperi-
untur: primū a-
bolita actio, secun-
dū imperfecta, ter-
tiū deniq; uitiosa
seu deprauata.*

*Succi uitijs
quæ affectus
producent.*

*Atrophia.
Gracilitas.
Leuicia.
Elephantiāsi.*

*Imbecillitates
facultatum
morbos signa-
tione.*

Caneris quid.

*Alterationis er-
ror est caneris
huius symptoma.*

Cruditatis quid.

*Cruditatis vi-
tium citius bi-
feram.*

*Facultas bifar-
mian laeditur.*

*Efficiens facultas
uē leuicia pro-
pria sunt intem-
peries.*

dia, & ea quæ extrinsecus occurrūt, ad ordinem præpositi, & intemperitiū usum pertinere videtur. Porro autē nō modō symptoma nosse, verū eius semper causam inuestigare. Nam si ventriculus ciborū causā nihil omnino cōcoxit, faciliē id symptoma corrigi. Si uerō ola extreme muni potentia lapsus, in lenteriam, aut in tympanitem mutabit. Similis etiā & in sanguificatione, & in concoctione illa quæ per totū corporis habitū fit, est inquisitio faciēda. Omnis autē in

*Intemperies am-
mō uolentiū de-
git uiri.*

*Ventriculus a-
stutus, cibi in
napores uolens
fit corruptus.*

*Acido à quibus
edentes rutilus*

*Restitui potest
a triplici sym-
ptoma tribu-
tur.*

*Ventriculi mor-
bi duplices.*

Singulus causa

*Singula expelli
illa, quæ ambu-
ta sunt in ipsius
ventriculi corpo-
re.*

*Piper si tenuis fu-
mator, postmodū
calida potio, sin-
gulum excitat.*

*Mania, expul-
trici facili at-
q; deprauatū
mouet.*

Lenteria causa

si in utroq; repant, ut in cholera morbo, utroq; officii accommodat. Attractrix etiā facultas, aut omnino nequit cibos attrahere (quod symptoma dicitur gulæ paralyticus) aut difficulter trahit, ubi incipit gula resoluta: aut deprauatē trahit: de quo motu iam sæpe diximus. Est cum ob innatū carunculam tota gula aut eius pars obstruatur: qui morbus instrumentalis uocal. Cū igitur ventriculus naturaliter habet, superius paribus ad sese trahit, atq; per inferiores deiecit. Vbi uerō præter naturā affectus est, etiam ab infernis assu- midatur. Siquidem nōnulli dysimio uomitione sunt redditi: sicuti & sterus, per letales uoluntus. Sane tamen est dicere, uentriculū per id genus affectus, nō trahere, sed recipere ab intrinsecis excrementa uolenter cōpressa. Ad quod lo- get contingere nō, quibus ob negocia non licet, quando expediens erat, deiecit. Nonnunq; etiā fit uoluntus, ulu intestina suo illo naturali cōstru- tionis motu priuati. Quinetiā indurati sterus, rumo resq; præter naturā, obitant aliquēdo, ut uel nihil excrementorū feratur deorsum, uel nō satis copiose deiciantur. In summa uerō, omnia symptomata intestinarū, ad ea quæ de uentriculo diximus, referunt. Alimentis per corpus digestis (quæ & ipsa naturale opus exilit) truncad amulum perficitur, ubi quælibet pars peculiarē sibi allicit cibum. Accidunt autē illi tria symptoma genera. Nam uel imbecillia est, uel deprauata, uel omnino cessat. Quorū sanē symptoma tum causæ dicuntur, aut transiensium partū intem- peries, aut instrumentorū morbi, aut digerendi alimentis prauitas. Ac per intemperies quidem, facultas re adiut imbecilla. Instrumentorū uerō morbi, alimēti meatus cōstringunt. Prauitas autem dicitur, si uel crassior, uel glutinosior sit cib- bus. Similiter impedit expulsiōnis excrementorum, triplices causæ inueniunt. Vna, cū partes quæ excrementa expurgant, sunt imbecillæ: alte- ra, uia rū angustia. Postrema est excrementi malitia. Imbecillitas intemperies parit, angustia uerō, uel obstratio, uel aliquis instrumentorū tumor. Atqui tumorū causā est humorū affluxus. Obstratio uel facit humorum uel crassitudinem, uel lentor, uel innatū tuberculū. Excrementorū autem malitia, est multitudo, crassitudo, & uiscositas. Per concoctionē in uenis factam, tria redunt excrementorū genera. Vnum bilis amara, quæ ab hepatis uesica expurgatur: alterū atra bilis, quæ à liene: tertium ueluti serum, quod attrahitur à renibus. Cū autem uia rū duo sunt genera: unum per quod excrementū trahitur, alterum per quod expellitur: utriuslibet angustia excretionem lædere potest. Nonnunq; etiam horū nullum est lesum, fed excrementū multitudine cū immo dca est, ut tota expurgari non possit, aut cum sanguine per totū corpus defertur. Huius uerō immoderationis duplex adestur causā. nēpe alteratris potentia malē affecta, & alimentorum prauitas. Jam uerō pallida bilis, si redundet per uniuersum corporis habitiū, regium morbi: si autē in una tantū parte consistit, erysipela & herpes excitat. Atram bilem, si in uniuerso adsit corpore, elephas: si in aliqua parte, cancer sequitur. Præterea, si per uniuersum corpus in-

*Cholera mor-
bus.*
*Attrahit fac-
ilitatē sym-
ptomata.*

*Voluntus morbo
affligente, uiri-
tutes ab intesti-
nis excrementa
suppresso recipit*
*Voluntus uide-
bitur uiri.*

*Digestibiles cibo-
rum symptoma-
ta, atq; ipsorum
symptomata cau-
sa.*

*Expulsiōnis ex-
crementorū non
restricendi, cau-
sa simplex.*

*Excrementorū
præparatiōis ve-
na cum sangui-
ne, tria genera.*
*Excrementorū
via duplices.*

*Bilis pallida
quæ morbus gi-
gax, per corpus
trahit.*
*Atra bilis quæ
morbus parat.*
*Purpura quæ
morbus signat.*

Serum sanguinis quoque affectum producat.

Nutritio est naturalis alimentis prima. Assimilatio alia ratio est.

Nutritio facilius symptomata.

Atrophia.

Edephas quid.

Alphi.

Alimenta ad suam naturam immutata carnis, et immutata ab illa.

Perficia planta. Conuenientia affinitas.

Alimenti prima ratio unde accidit.

Expultrix ratio qualem immo- di moueat.

Expultrix facultas exsiccit imbecilla, quod accidit.

Sanguinis excretionis omnes, istius excepta, prater naturam evolvant.

Sanguis quoque placent distare possit.

Vasa quibus modo disrupti possint.

creuerit, leucophlegmatia comitat. Sin autem in una parte, oedema. Serosa excrementa si redunt, ascitæ aquæ inter cutim inducitur. Quæ si unam aliquam partem inuaserint, in ea pustulas gignant. Pro miscella autem ipsorum excrementorum, uariis solent & morbi, & symptomata. Porro nutrario, ut naturalis ætionis est prima, sic per se necessaria existit: quippe quæ species alteratricis facultatis censetur. Assimilatio siquidem alteratio est: quæ quidem, licet nomen diuersum a nutritione fortis, idem tamen utriusque est opus. Nutritio autem a scopo aberrat, si uel nihil omnino agit, uel ab ætione perfecta deficit, uel uitiose agit: idque ob alteric facultatē, quæ sub alterationis genere continetur, uel ob materiz tum defectū, tum prauitatē. Ob defectū quidem, ut in atrophis, siue hæc ex defectu, siue ex priuatione dicant. Hic autem in atrophis defectus, non proprie ad cibū qui ingeritur, sed ad materiæ membrum dicatur, est referendus. At prauitas cibi, leucæ & elephatiasis, eiusque generis alios affectus gignit. Verū ubi caro nigra palliditas fuerit, elephas nominatur. Nec aliter affectus hic gigni solet, quàm leuce. Iam alphi haud diuersam a prædictis habent generationē. Cæterū per hos non caro uniuersa afficitur, sed corporis superficies. Vnde taxat, ueluti squamis quibusdam inspergit. Atque albi quidem ex pituita, nigri uero ex melan chólico humore prodeunt. Siquidem alimenta carnem maxime permutare ad suam ipsorum naturam possunt (etenim Persica planta, cum in Persia fuisset letalis, postea in Aegyptum translata, quod inerat noxum amisit) quanquā a carne enim, alimenta ipsa immutant. Omnis siquidem res, uel si longè potentior sit, ab illa cum qua uer satur, afficit. At non solū ob alteratricis facultatis imbecillitatē, pars aliqua alimento priuatur: sed etiam ubi attrahendi uis imbecillior fuerit, aut expultrix immodicè mouerit. Atque tunc ipsi modi cæ mouet expellendi uis, ubi retentrix potentia grauat, uel ob excrementorum multitudinem, uel a criminationem, uel ob propriam imbecillitatē. Tunc siquidem necesse est, ut cum eo quod redundat, simul etiam id quod utile est, excernatur: ut in lientia, dysentena, choleraque fieri contingit. Quod si expultrix facultas sit imbecilla, necesse est carnem tunc humidiores fieri, pluriusque excrementis impleri. At redundantia multorum excrementorum, ob alteratricis facultatis imbecillitatem accidit. Pro ipsorum autem excrementorum tum quantitate, tum qualitate, aliis aliter caro immutatur. Quod uero ad sanguinis excretionem pertinet, si excipias eam quæ formis per singulos menses accidit, reliquæ omnes toto genere præter naturam existunt. Profluvia autem utri, ubi modum in quantitate excesserint, tunc solum præter naturam censentur. Omnium autem sanguinis fluorum causa, trifariam potest accidere. Quippe uel faculas ora uasorum aperit, ut in sanguinis fluore è naribus est uideret: uel sanguis est malè affectus, uel uasorum aliquod etiam malè affectum, uel ruptum. Etenim uasa rumpi cōtingit, aut ob plagæ acceptæ extrinsecus, aut ob saltū, aut ob casum ab alto, aut ob nociferationē uehementē. Sanguinem malè affe-

ctum dico, uel cūm adeo uisiosus est, ut uasa quibus continet, erodit: uel adeo auctus, ut à uasis cōtineri nō possit. Vasa malè affecta dicuntur, si uel molliora, uel duriora, uel tenuiora fuerint. Si quidem quod immodicè molle est, facile ob imbecillitatē rumpitur: sicuti & ualde durum, quia nō facile multū extendi potest. At tenuis, ob liuissimum hæc utraq; affectiōnes, nō solum ab internis causis, uerum etiam ab externis ut pumpatur facile, est habile. Verū nō omnia uasa erodi similiter possunt. Nam durum crassumque, erosum est contumax. Similiter de refectione est dicendum. Nam uasa imbecilla, mollia & tenuia, prona sunt ut oscula ipsorum patet: robusta uero, & crassa & dura, sunt ad talem refectionē inepta. Cæterū reformatio accidit ab his quæ ora uasorum irritant, & a plenitudine grauant: sicuti quandoque a natura, cūm excernit ea quæ sibi molesta sunt. Sed iam de his quæ uomitu reſciuntur dicamus. Excernunt igitur hæc interdū, quod quantitate & mole sua uentriculum grauent: ut cūm plurimū cibi est ingestum: interdum, quod sua mordacitate contristant: ut si nutrimentū aliūm primum uel acidum, uel nidorofum, uel amarū, uel acre, uel uitium cōcoctionis euaserit. Eodem genere cōtinentur & biliosa, & pituitosa, & serosa excrementa, uel inibi nata, uel ex uniuerso corpore illuc cōfluentia. Tertium causarū genus uentriculum ad uomitū incitant, est quod haud quāquā irritans, in illo continetur præter naturā: ut uidelicet sanguis. Cōmunitur autē dicunt esse præter naturam, quæ etiam si sint concocta, minime possunt alere. Iam uero recrementorum ad infernas partes expulsiō, nonnunquā solum tempus præuenit, uel quia uenter copia multū cibi grauat, uel pinguetur, uel caturus ut à re mordente, quam ut alienam expellere nintur. At dicimus multū cibum, uel quia leuiter seipsa imbecillior est reddita: uel quia existit assumptū ali mentum immodicū: uel ob utraq; causam. Præter iam dictas causas, alimenta tum humidiora, tum uiscosiora ingesta, ipsam deſectionē accelerant. Quæ tum celerius delabuntur, cūm leuiter post eorum assumptionē deambulaueris. Cūm autem complura sint intestinorum uolumina, per quæ deſeri alimenta est necesse, cibi sanè ipsi ob grauitatē diu immorari nō possunt: quod si eorum quippiam in ipsis circumuoluntionibus fixum inhaereat, id subito ab actione intestinorum (quibus inest uis expellendi infestantia) propellitur. Tardus quæ pro consuetudine excernit uenter, aut ob intestinorum uel imbecillitatē, uel obtusum sensum: aut ob alimentorum tum paucitatem, tum qualitatem. Sed muscularum abdominis imbecillitas etiam deſectionē retardat, præsertim si duriora sint excrementa: quo tempore thoracis musculi etiam auxilio sunt. Pauciora quæ pro ratione assumptorum excrementa excernunt, ubi plus ex cibis per corpus digeritur. E contrario plura deſcunt quā pro portione ingestorum, interdum ob deſectū digestionis per corpus, interdum ob excrementi quædam è supermiis ad regionē uētris defluxa. Porro assidue excretiones, uel ob imbecillitatē, uel ob morsum eueniunt, Imbecillitatem intertemperies inducit.

At mor-

Sanguis autem quauis est, aut qualitate immodicus. Vasa quatuor inter male affecta dicuntur.

Respiratio uasorum ualde accedit.

Vomitum a quibus causis moueri possit.

Sanguis in uentriculo continetur præter naturam.

Deſectionem intantum causat.

Cibus multus quod placent distat.

Aluum tardius deſcendere quæ cōpōllat.

Excrementa ceterum plura, nec pauciora, quā pro ratione cibī assumpti, excernuntur. Fluxione effluua causa.

At mordicant humores contenti. Est & alius as-
siduus deiectionis modus, quæ fit ob sedis mu-
sculos relaxatos. Quippe huiusmodi deiectiones
à voluuntatis imperio nõ pendent: prouide &
intempestiuæ, & inordinatæ, & asiduas sunt. Iam
uero solet status in ventriculi spacijs oriri, cum
uel humores pituitosi illic contenti, uel cibi, in ua-
pores ab imbecillo calore soluantur. Etenim ut ab-
solutum frigus uaporem haudquæ excitat, sic
uellemus calor exactissimus magna ex parte cibum
ipsum cõminui, q̃ uaporis generationi conueni-
at: nisi fortè in sua pte natura sit statulentus.
Quemadmodum enim frigidissima cõstituit, ma-
ximè spirante borea, ætrem serenior reddit: ac
rursus calidissima constituit æstatis, efficit æ-
rem nos ambiens purissimū: mediæ uero cõsti-
tutionis nebulas parit: sic in animalis corpo-
ribus, à solo moderato, imbecilloq̃ calore, "sta-
lulentis gigni excrementū cõtingit. Hoc igitur
si per os excutiat, ructum efficit: sin autè per
sedem, statim molitur, interm sitrepit, interm
sine strepitu. Cum uero per neutrum defertur par-
tem, indolentis, symptoma ventriculi imbecilli,
produci: quæ enim mota per uacua intestina, in
illis uarios gignit strepitus: qui quidem eò acu-
tius atque tenuius resonant, quò purior spiritus
fuerit, magisq̃ per intestina tenuiora & superio-
ra delatus: eò autè minor, sed grauior resonatio
sentitur, quò spiritus magis ad inferiora intesti-
na descendit. Quod si intestina ipsa aliquâ hu-
miditate cõnectit, strepitus murmurantis ductus
gignitur, qui humidis excrementi deiectione nũ
ciabit. Si uero strepitus æditus, purus & clarus re-
sonet, aut intestini ipsius inanitione, aut in supe-
riori eius parte excrementa duci cõtineri signi-
ficabit. Qui strepitus cū fridore fit, is ad instru-
mentorum angustia, & instante spiritu, atq̃ pauca
humiditate procedat. Deductus à supernis parti-
bus in ventriculū fit, ubi facultas præualida, re-
dundantia excrementa expellit: interdum ubi a-
deo imbecilla existit, ut ne id quidem quod uile
est, ferre possit. Excretus id quod redundat, tum
per cruræ, tum per integrā ualitudinē: ut in mu-
lieribus singulis mensibus, & in his quibus aliqd
membrū est mutilatū: id quod etiam per definiti-
os circuitus cõtingere in alijs multis uidemus,
qui prioris uitæ exercitia, cum ignauo ocio mu-
tarunt. Atq̃ excrementū huiusmodi sola quanti-
tate est alienū. Altera qualitate aberrat, magnatq̃
ex parte in acutis morbis solet excreti per cri-
sim. Inter hæc duo excrementorum genera, est a-
liud tertium genus mediū: id in ventriculo semico-
ctus cibis. Hoc autè per lepticas affectiones
maximè excremitur. Cæterū nominant hepatici,
quos ob ictericis imbecillitatem infestat mor-
bus, etiā si nulla ad sit plegmone. Hepar igitur,
si quando alimentū, quod per meleraticas uenas
attraxerat, nequeat consistere, per easdem rursus
ad semicoctū ac simile alicui in qua fuerunt ablu-
te carnes nuper maceræ, respuit. Quod si ali-
mentū in hepate accuratè concoctum fuerit, ob
aliquid autè impedimentū distribui in corpus
nõ possit, ut ad * uentrem redeat est necessarium.
Quo tẽpore excretus sanguis apparet nigrior,
splendidiorq̃ uisio, qui naturalis existit: uapore ex

sanguine & atra bile cõmixtus. Etenim sanguis
solutus per se ob refrigerationē nigricans, tantum
abest ut splendorē illum acquirat, ut etiam cum
quem ab initio habuit amittat. Atra autem bilis
eo splendor exstiterit: quale maris mortui bitu-
men ludasici. Si quidem nõ ex refrigerato sangui-
ne, ut grumus, sed ex immodicè affato, seru-
dop, ueluti quidam cinis, gignitur atra bilis. Cæ-
terum ipsa est frigida, quia terrestris: nõ tamē ca-
loris experta: quemadmodū nec cinis, nec etiam
acerum. Igitur excrementorum excrementorū qua-
tuor sunt differentie. Prima est, ubi sanguis qua-
tenus dictū est, per circuitus quosdam emanat.
Secunda, cum ob imbecillitatem secinoris, haud
abissimis lauacro ablatū carum sanguis deſi-
citur. Tertia (quā nuper diximus) ex melanco-
lico splendentē sanguine constat. Ac per hæc
tres differentias, & multum est excrementū,
& affatum excremitur. Per quartam uero (quæ ex ul-
cere intestinorum oritur, præcipueq̃ dyſenteria uo-
catur) paulatim & breuibis intervalis deiectione
nem fieri cõtigit, nonnunq̃ synceri sanguinis,
nõnunq̃ grumosi: cum quo interdū puris quoq̃
nõnihil excreti solet: quemadmodū & rament-
ta, & partes quedam membranarū intestinorum
confimiles. Sæpenumero densum quoq̃ ster-
cus excremitur, cruentis guttis reſperſum. Eiusdē ge-
neris cum prædicta dyſenteria est tuncius uo-
catus, ob recti intestini ulcus eueniens: qui qui-
dem cætera symptomata dyſentericæ similia ha-
bet: tentionis uero uehementia, dyſenteria longè
superat. Vrinæ tum suppressiones, tum depr-
uatz expulsionis, excrementis quæ uel in uen-
tre retinentur, uel præter morem nature eſcuntur,
proportionē respondent. Supprimi igitur,
uel ob uesicæ imbecillitatē excrecere nõ poten-
tius, uel ob oſtoli ipsius angustiam. Quorū duo-
rum morborū ichuria est unum cõmune ſym-
ptoma. Est & aliud ſymptoma, cum nihil peni-
tus urinis in uesicam delabatur, abolita nimirum
renū aſtione. Alius itaq̃ affectus censendus est,
cū oppleta uesica, alius cū uacua, nihil urinis
redditur. Nam in ea affectione qua uesica est ple-
na, oportet ut oriſicium eius angustum, aut na-
turam imbecillam existeret. Oſtigitur sit angustū,
qua obſtruitur & cõnueit. Atq̃ obſtruitur qui-
dem à grumo, uel aſſo pure, uel lapide, uel cal-
lo, uel tuberculo, quod in meatu creuit: cuiusmo-
di in externis partibus omnibus accidere cerni-
mus. Connueit autè, aut ob tumorem præter na-
turam, cuiusmodi est pſillegmone: aut ob ſiccita-
tem ingentē, quales per febres ardentissimas gignit-
ur. Sunt uero depræditi quidam uesicæ op-
pleta habentes, qui uenit surgere à cona, uti-
lam exoneratæ, postea mœre nequeuerūt: qua-
lis etiam affectus uentri & intestinis solet inter-
dum accidere. Igitur iam dicti affectus, uim ex-
cremendi uirgūt, sua functione defraudat. Qui ue-
rò ab his internis partibus relinquunt, actiones effi-
ciunt obſiſas, torpidasq̃. Reliquos affectus ter-
tium genus ſymptomatiq̃ (quod in morib. depr-
uatis cõſiſt) comitari cõſueit: cuius multe ſpe-
cies habentur. Primum ſtranguriam appellat,
quæ uel ob imbecillitatem uesicæ, uel ob acre lo-
tium fieri uidetur. Secunda species proſtruo

Atra bilem ef-
ſe excrete ſan-
guis ſplendidi-
con.

Atra bilem gi-
gnit ex sanguine
immodicè affa-
to, efficit frigida,
non tamen calo-
ri expertum.
Cruentum ex-
crementorū diſ-
ſerit a quatuor.

Dyſenteria
ſigna.

Tinctionis oritur
ob uesicæ integri-
tatem reſiſt.

Vrinam uide
ſuppreſſam acci-
dit.

Ichuria, quorū
ſymptoma exi-
ſtat.

Vrina mouetur
ex quib. obſtrus
occafione, pſi-
ſit.

Vesica oſtendam,
qua ex cauſa ſi-
nueat.

Stranguria ſit
uel ob imbecilla-
tatem uesicæ, uel
ob acroty accu-
mationem.

Coryza.
Catarrhus.

Dysuria est
defluxus in eis.
Gravitas est de-
fluxus ad naves.
Rancore est ad
faeces defluxus.
Vna.
Anticida.
Fangitudo.

Vteri corpus à
quib. causis du-
tam possit.

Morsus va de rei
veri continet.

Morsus quibus
ex causis plus a-
que fluxus.
Maliore prosta-
tione.

Classis mulieres
Priapismus est
tumescere in
mor viris pa-
denda à fluitio-
ne spiritus utri.
Concretae spen-
ciae.

Colorem virgini
tenderet de rei
autem.

Figura parvi à
quibus causis vi-
detur.

Symptoma etiam
quodammodo
tunc est necessarium
sequitur. At quod
molestum.

grauedinis (hæc coryza, illa Græcis catarrhus di-
citur) cerebri causa existit: ut pars quidem si-
mularis uel à frigore, uel à solis ardore in intem-
periem adacti: ut instrumenti uerò, quatenus
inestatur à plenitudine. Ceteri defluxio fit, si
ad os excrementi defluxerit: grauedo, si ad na-
res: quemadmodum & rauceo, si ad fauces decu-
bat. Quod si fluxio gurgulione inuadat, aut uul-
pariet, aut ipsum in tumor æt tollet. In glandu-
las quæ ad finem oris utring adiacet, si decumbat,
antidas procreat: sicuti & paristhemia, inuadens
ea que illis proxima sunt. Ac desertur quidæ fluxio
à capite nonnunquam in uentre, nonnunquam in aspe-
ram arteriâ, utribusque maxime nocens. Quod uerò
ad uteri corpus spectat, si soli dū fuerit aut du-
rum, causa est, quæ supprimant menses. Duratur
autem uel illico à primo ortu, aut tractu temporis
post ipsum generationem: uidelicet ex intemperie
aut affectus alios præter naturam. At intemperie
uteri interdum à natura oritur, interdu sequitur
morbo, perinde ac densitas. Detinentur etiam
nonnunquam menses, ob materiam ipsam uacuandam,
ubi uel crassa est, uel uiscida: necnō ubi à crassius
humoribus uasa, quæ ad uterum descendunt, ob-
struuntur. Ad hæc, quæ uix nihil omnino exernat,
ob multas excretiones, & uictu tenui, & cum
ad alias partes repant humores. Mius exerunt
nequē, ob eandem causam, sed remissiores. Plus au-
tem, ob diuturnū ocium, & uictu opiparū. Cete-
rum deprauatæ uteri fluxiones (quod sympto-
ma fluxus mulieris dicitur) hūit expurgato per
hanc partē uniuerso corpore. Ac talem semper
speciem refert id quod exernit, quale est quod
in animali redundat. Est & aliud ex utero deprau-
atum profusum, ob affectum aliquē ipsū in se
stantem eueniē. Insuper interdum colubentur
menses sanguine, ob robustas uires in alias par-
tes irruente. Ad hanc autē sermonē pertinet me-
minisse mulierum minimè foratarū, quibus uteri
meatus coarctant. Iam priapismus est, cum inui-
to intumescit inflaturque masculinū pudendum:
cuius symptomatis causa existit statulentus spiri-
tus. Porro gonorrhœa si pudendo non intento
acciderit, retentricis facultatis in seminarijs uas-
is imbecillitate sequitur. Si uerò intento pu-
dendo eueniat, cōuulsiōi quodammodo erit asse-
ctus similis. Colorū uicissitudinem (ut summa-
tim dicam) faciunt facci à sua naturali specie ab-
errantes, aut in profundum subeūtes, aut cutem
ueluti illuētēs. Particulatim uerò cause, ob quas
fuccos ad huiusmodi mori motus, tam affectus
peruenire oportet, sunt affectus animi: æris
nos ambiētis uel ad calorē, uel ad frigus muta-
tio: corporis affectus uel calidiores, uel frigidiores:
res item sanguis uel paucus, uel plurimus, tum
foras elatus, tum intro reuulsus. Huc accedit etiā
quodlibet humoris uitium, ad suam ipsius speciem
uniuersi corporis colorem permutare potens. A
naturalī autem figura desectunt partes, immo-
dicæ uel replete, uel inanite, uel à proprijs sedi-
bus deturbate, aut reuulsi. Vt autē hunc iam cō-
mentarium claudamus, operæ precium mihi ui-
detur addere, quænam symptomata sibi mutuo
& necessariō succedant, & que item non neces-
sariō. Igitur id quod fit, uia ne ex causa fiat, an

ex pluribus, considerandum. Nam si ab unica
tantum fiat, necessariō cause efficienti succedet:
si à pluribus, non necessariō. Symptomata itaque
quod ab uno alio dependet, necessariō consequi-
tur illud. Vbi uerò aliz quædam cause ad secun-
dū symptomatis generationem accedunt, ipsum
non necessariō ad primū consequitur. Neque enim
crudelitatem (gratia exempli) inflatio ex necessi-
tate sequitur, uel mordicatio, uel nauſea: quanquā
tum horum, tum reliquorū symptomatum ferē o-
mnium nullum est, quod non aliquando crudi-
tates sequi uideatur. Verū & cruditas magnitudo,
& differentia, tum hominis natura, tum sensus
uel acutus, uel obtusus, item singulariū cor-
poris partū & robur & imbecillitas faciūt, ut a-
liis aliud symptoma cruditati sequatur. In sum
ma uerò, quæcumque pars cruditate fecerit, illa no-
xam percipiet, quæ maxime imbecilla fuerit. Pro-
inde nulliū symptoma necessariō sequi crudita-
tem, possumus asseuerare. Vbi autem alimentū
minimè per corpus digeritur, sine priuatio, siue
imbecillitas fuerit actionis, atrophiam necessariō
inducet, quemadmodū in singulis partibus
alteratricis potentiz noxa. Præterea expultricis
facultatis circa excrementa, aut sanguis quæ
potentia aberratio, necessariō producit prauū colo-
ris symptoma.

GALENI PERGAMENI de causis procatarteticis lib. vms.



Vas procatarteticum, siue externas,
siue præcipientes appellat, ut ma-
gis calor, frigusue ambiētis, aut
etiam aliquis animi affectus, inuali-
da foliū corpora cōmouent: quod pro-
inde à nonnullis nō causæ, sed morborū occasio-
nes uocant. Videmus etenim mille simul in thea-
tro sedentes, & quorum numero quatuor duntaxat
stuant, & in eis à febre una solus arripitur
quod nuper familiaris nostro Menandro conti-
git: quem nos secunda die inuisentes, iussimus
caput rosæco foueri, mox dormire, postmodū
impense lauari: ac sic tandem restitutus. Alios
etiam complures, ob æstum & labores febrientes,
reclamantibus ceteris medicis, plurimis ual-
neis ac uictu humidiori usus, similiter perſanauit.
Non desunt tamen, qui uaria connectentes
sophismata, quas nuper causas procatarteticas
diximus, eas morborū causas esse inficiantur: quod
uidelicet nec semper, nec omnia corpora lædūt.
Qui quidem nō secus habendi sunt odio, ac illi,
qui spinas & hamos in uis, per quas sunt transi-
turi homines, seminant. Nos itaq; horum impe-
dimentorum nonnulla iam rescindamus, aliqua
emendemus, alia conteramus, ut antiquam uiam,
quæ non ad ciuitatem, sed ad artem omnibus
scit utatibus utilissimā ducit, pergemus. Quod igitur
tum frigus, tum immoderatus calor, & cōstri-
ctus, & morbos gignere soleant, id inde natura-
rum nos docet: cum nimirum uel ipsa ani-
malia bruta, soleant lœta & regiones mutare, ut
æstate quendam calorem, frigus uerò hyemē de-
clinēt. Quod si hæc noxia quidem, nō tamē mox
uorū esse causas fateant, & nec semper, nec omni-
bus nocent, iam nō dēre, sed fere de nominibus

Cruditati nulli
necessariō sym-
ptoma sequitur.

Atrophia sequi-
tur necessariō a-
liumque defici-
tium.

Procatartetica
causa inualida
tantum corpo-
ra inuoluit.

Menandrum re-
sistit febri-
bus, quæ uariis
sunt Gal.

Nota motum
regionum, ut quæ
et frigus uocant.

disputat: quāquā nō sic quidem effugere poterūt quin conuincant, saltē illas esse causas nocumen-
ti nō, quibus nocent corpori. Sunt porro duae
primae causae maxime principales in uniuersum.
scopus uidelicet, siue finis, cuius gratia sūt
omnia quae fiunt: ac praeerea id, a quo ea fiunt.
Has dignitate sequuntur terna & quarta, instru-
menta nimirū quibus, & materia ex qua. Enim
in humanis artibus, nisi causae omnes cōspirent,
nullus unq̄ effectus abfolutus poterit. Nam nisi ali
qua esset lectica utilis, nunq̄ faber illā cōstrue-
ret. Sed si aliqua sit illius utilis, careat autē do-
labra, ferra, terebello, alijsq̄ suppellectilibz instru-
mentorū, nec sic lectica coagmentabit. Et si haec
illi omnia praestō sūt, & mox ligna deficiūt, neq̄
ita componetur lectica. Sed nec si instrumenta &
materia parata sūt, & utilitas urgeat, abit autē
artifex, quicūq̄ unquam compingi possit. In ijs ta-
men artibus quae casu fiunt, interdu finalis
causa desideratur, cū ea nullius gratia fiant. est
etiā ubi id per quod fiunt, abest. At nihil inueni-
re licebit, quod materia nō egeat, ex qua cōstet:
& efficiente, a quo fiat. Semper siquidem est ne-
cesse, ut sit cōuentus alicuius patientis, quod ui-
cem materij subeat: & alterius quod circa ipsū
agat, & efficiens rationem obineat. Hoc autē
nonnunq̄ instrumentū eget, si alicuius gratia o-
peretur. Interdu sine instrumento agit, ubi nul-
lus ligna gratia, neq̄ ex proposito agit. Vbi igitur ex
frigore uel æstu aëris ambientis aliquis laeditur,
aër ambiens dicitur causa effectrix: materia, corpus
affectum. Nullus itaq̄ effectus oriri poterit,
nisi efficiens & materia iungantur. Vnde oportet
ut haec utraq̄ aliquid ad generationē rei con-
ferat. Quae autem ad rei generationē cōducunt,
merito causae appellandae sūt. Repetire autem
licet praeter iam ductas, etiam alias causas, ac-
cidentales tamen: ueluti intermediū spaciū mi-
nimē impediens, quo faber indiget, ut circa li-
gnū agere possit: idq̄ non quā artifex est, sed
quā corpus, quod alium ab eo qui continet ma-
teriam circa quam operatur, occupat locū. Haec
siquidem ex accidenti dicuntur, & tanq̄ ea sine
quibus nō. Solidum quippe corpus interiectum
inter fabrum & lignū, impediens est, quo mi-
nus operari artifex possit. Quod si de medio tol-
latur, ex accidenti t consequitur, ut aër in illius lo-
cū succedat, cū nusquam in hoc orbe uacūū
possit consistere. Proinde cōstat fabrum aërē ex ac-
cidenti indigere. Similiter ambulationis causae
sunt, ipsius utilitas, uis animalis, atq̄ etiā crura:
at causae sine quibus id fieri nequit, aut circūfus-
sus cedens, paumentumq̄ renitens. Quod autē
ait Erasistratus, Si refrigerari feblicitandae causa
ipsa id abiq̄ patiente apto efficere possit, qui ma-
gis refrigerarentur, magis quoq̄ febricitaret. At
si frigus non omni corpori febre adferre potest,
sed illi tantū, quod ad eam excipiendam est habi-
le, utiq̄ non amplius erit necesse, ut qui frigue-
runt magis, magis quoq̄ febricitent: imō facile
nonnullos reperias, qui ne femina quidem febris
cōcipiant, siant tamē artonici, uel torpidi, uel tē-
muli, uel cōuulsi: ut accidit Alexandro, dum trisi-

no tempore in Cydno, Ciliciz flumine, selau-
ret. At uerō nec illud etiā reuera cōfici potest, ut
qui magis frigeat, magis quoq̄ laedatur: sicuti
neq̄ hoc etiā, ut si magis laedatur, magis febrici-
tet: cū aliquando cōtingat aliquē magis laedi,
qui tamen nō modō nō magis, sed ne omnino
febricitet. Idem enī dicens id ē de labore plen-
itudinisq̄. & alijs id genus causis, quae eodem
paralogismo, ab ordine procatarticarū febris
causarū exterminabatur. Sed cur interim operā lu-
dimus, dum laxetis Erasistratorū cōuellimus,
qui afferunt patiam potius prodendam esse, q̄
propriū dogma? Adeo enim stupidi simul & per-
tinaces sunt, ut enī omnes febres a phlegmo-
ne exoriri cōtentand: ob idq̄ nec potū frigidā,
nā qui ardenti febre tenentur, cōcedant: cū ta-
men ea opportune exhibita, nisi obiter uiscerum
inflammatio, ægri cōfessum sudent, liberiq̄ a mor-
bo reddantur. At si in Elefemenda lyppoliti pu-
rulentia, ab ea quae in sanis, & post solutas febres
conspicitur, essent exercitata, conuincerent.
Quippe in sanis, & ubi febres solutae fuerint, id
quod residet, album est, nec faetorem habet, nec
colorem, nec lentorem, qualis cernitur ubi phle-
gmone in suppurationem cōuersa soluitur. Sed
hęc etiā est summa impudentia Erasistrati, quid
cū fateatur repletionē plethorae efficere: hūc
uero, sanguinis parempsin ad arterias: atque
hanc deniq̄ phlegmoneū. nōlit tamen concedere
re, repletionē phlegmonis causam existere. Nam
& nos pari modo dicemus, quod qui plaga ho-
mini illata uenas colli fecit, non exire illi cau-
sa mortis: quoniam causa proxima fuit, non ille
qui perculsus, sed potius effusus sanguinis.

GALENI PERGAMENI de plenitudine liber unus.



Icū nullū est quod nostra tem-
pestate in ore ferē omnū medicorum
crebrius uerfct, q̄ plenitudinis uo-
cabulū: ita nec aliud facile mēuias,
quod magis ab eis ignoret. Vt autē
eos qui ignorantie tenetis occant, quibz ab
surda tuent dogmata, impræscientiā mīssos fa-
ciamus, cū ingenuis uerō ac ueritatis amore
flagrantibz cōfabelemur: duas in uniuersū no-
tiones, relationēque plenitudinis proponamus:
unam quidem, secundū robur utriusq̄ illius qui
talē plenitudinē defert: alterā, secundū excipien-
tis uasis capacitatē. Dem uerō sedulo pericrute-
mō, quāz sūt uniuersae nūmāis uires: & quo
modo plenitudo, quae secundū earū unāquāq̄
consistere potest, sit & agnoscenda, & curanda.
Postmodū, quot sint eorū humorū species, qui
uel uires aggrauent, uel a uasis cōtineri nō pos-
sint. Igitur in libris de Placitis Hippocratis & Pla-
tonis satis a nobis mōstratū est, quod alia ea uis
sit, quae in uenis consistit, alia quae per arterias, si-
cuti & alia quae per neruos diffundit. Vt enīam
docuimus, cor * facultatis arteriarū fontem atq̄
originē esse: neruorū autē cerebrum, sicuti iecur
uenarū. At in libris de Elementis ostendimus, sub
stantiā eorū omnū quae generationi & interitui
obnoxia sunt, a quatuor primis qualitatibus im-
mutari: & ex earum certa quadam temperatura,
omnium

*Erastrotasius in
seba. patiam
potius prodendam
esse, quā pro-
priū dogma.*

*Brigida oportet
ne excludat q̄
qui ardenti fe-
bre tenentur, nisi
viscerū inflama-
tio obstat, ab
afflicto uis libe-
ra.*
*Puru hyposta-
sis, dyscrasia.*

*Causa prima et
maxima princi-
pales in uniuersū
sunt, quae fiunt
sine gratia sūt
omnia quae fiunt.
Ereptore id a
quo fiunt: quae
posse sequitur
reliqua, uel
instrumenta si-
mil atq̄ mate-
ria.*

*Effectus nullus
abfolutus potest
in humanis arti-
bus, nisi causa
in uis omnes cō-
spirent, quod
causa quae fiunt
id cōueniat mi-
nimē necessariū
uideri.*

*Omnia eger
materia ex qua,
& efficiens a
quo fiunt.*

*Causa appella-
da sunt, quae ad
rei generationē
conducunt.*

*Causa acciden-
taria sunt quibz
operari nō licet.*

*Vacuum nūq̄
quam datur.*

*Brigida illi tantū
corpus sicut ad
ferre possit quod
ad eam excipi-
endam est habile.
Alex. idē tem-
pus corripit,
dum in Cydno,
Cilicia flumine,
se laenat.*

*Plenitudo q̄ de
plex, uis uas
tūc illi, qui
eam defert, alia
uero uas illi
lam uas uas illi
capacitatem.*

*Cor est arteria-
rum origo.
Cerebrum illi
sunt neruorum.
Hepar est uenarū
principium.*

*Essentiam facili-
tatem corporis
suum regunt,
ex tempore qua
tunc qualitas
cōstat, effigie
propter tempera-
mentum.
Facultas est cau-
sa effectiva.*

*Atque in seipsum
nihil potest, sed
si nec se continet
ne.*

*Ipsa omnia dis-
ponit.*

*Clonare videtur
dura, veni-
entiaque, ut cum
vires, quae mel-
lis, & cedrinae
essentia.*

*Plenitudo diffin-
ditur aliquo, di-
citur multa va-
sa.*

*Plenitudo gra-
uitas, et si non
dependat, ad vi-
res, sensum re-
fertur, maxime
autem ad natu-
ralia.*

*Plenitudo in-
tra vasa repen-
ti etiam in rebus
inanimatis.*

*Plenitudo intra
venarum vires,
quae ratione de-
prehendere quatur,
neque scriptis Ga-
leni, nec, ab ali-
is scriptis ro-
pore.*

omnium corporum substantiam, ac proinde virium
earum essentiam, quae corpus nostrum dispenfant,
constare: quippe quae non sit, nisi ipsius tempera-
menti quiddam proprietas. Porro vis ipsa siue fa-
cultas, causa effectrix existit, non materialis sub-
stantia, patibilisue. Facultas itaque erit alicuius ac-
tionis causa, quam mox necesse est esse motum
ab agente in id quod patitur. Sicuti & affectus
qui in patiente est, motus erit ab agente, in rem
patientem. Unde vires suam quidem ex alterius
comparatione notionem habent: essentiam ve-
ro, ex habitudine ad alterum. Quod autem in se-
ipsum aut agat, aut aliquid efficiat, omnem men-
tis captum excedit: sicuti etiam, quod seipsum ali-
quod continet. Quare non modum ex Hierophi-
leis muli, sed & ex Stoeicis iuniores, dum cōten-
dunt ostendere, quod spiritus atque ignis & sese, &
cetera elementa cōtineant, terra vero & aqua ab
his cōtineantur, nullam demonstrationem adferunt.
Nos quippe evidenter nunc scimus, a se nihil
ab igne contineri, ut potius ab eo universa solu-
vantur. Etenim quod durum est, renitensque ac
densum, vel primo aspectu ponitur contineri ac
densum, vel postea: contra vero, quod molle, cedens,
rariūque est, altero in digere a quo cōtineatur. Dica-
mus igitur, quoniam quicquid praeter multitudinem aliquid
nimis diffunditur aut dirumpitur, affectum talem
ad continentiam usque spectare, non vero ad ali-
quas vires: cum vero grauiatur, ad sensum fectri-
centiam. Nam neque ipsam omnino ad vires
pertinet omnes, cum naturalis potentiae haec
grauitatis affectus non sit. At vero plenitudinis ge-
nus, quod ex loci continentis capacitate cōmen-
suratur, non modo in animantibus reperitur, ve-
rum etiam in rebus inanimatis, quodammodo in
vestibus, vinculis, pellibus, vasibusque sitibilibus. Rum-
puntur siquidem omnia haec, ubi multa replen-
tur flauisola substantia. Porro cum quatuor sint
naturalis potentiae, attrahens, retentrix, altera-
rix, expulatrix: alia sunt inquirenda indicia ad co-
gnoscendam plenitudinem quae secundum earum
singulas accidit: nam nec grauitas in istis sufficere
poterit. Etenim imbecillitas ventriculus, ut sensi-
trix maxima est praedicta, quae sibi grauiam senti-
re possit. Iam quibus signis arteriarum plenitudi-
nem, quae ex collatione ad earum vires constat, pro-
be deprehendere liceat, in cōmentariis de pul-
sibus exposuimus. Venarum vero nec ego signum
aliquod unquam, quo id ex sciencia haberi possit,
praefixi, neque ab alio quopiam literis manda-
tum reperire potui. Vt autem de plenitudine aga-
mus, quae sigillatim quascumque particulas occu-
pat, sciendum est, ea membra quae parum sentiunt,
vel sunt sensus omnino experta, nequaquam parem
cum ventriculo aut vesica, excrementorum quae
in ipsis congelata sunt, sensum habere: sed aut om-
nino exigui, aut penitus nullum: exigui quidem,
ubi maxima plenitudo adfuerit: nullum, ubi
illa non multa fuerit. Nam in pulmone, ieco-
re, renibus, atque nonnullis ossibus, aliquis non-
nunquam oboritur alicuius ponderis sensus: quan-
vis certe potius ad membranas referri debeat, quod
eorum viscerum carnes. Ad secundum cerebrum,
perque manifestum sui sensum grauitas interdum
excitat. In partibus autem sensu vacuis, nullus

potest non modum grauitatis, sed nec alterius etiam
symptomatis sensus haberi. Atque sensu carere
videtur nonnulla ossa, adeps, & glandulae quae
sunt: praeter medullas omnes, sensus expertes
sunt. Cerebrum tamen atque spinalem medullam,
nonnulli in sentientibus particulas collocant. Tu-
tus tamen poterit quicquam de carne, quae gibba
iecoris pars constat, asserere, quod absque ullo
sit sensu, cum neruis illi nulla ex parte inferatur.
De parte autem illius causa, facile dubitatio exori-
etur, cum nerui qui iecori iuxta portas distri-
buntur, adeo sint exiles, ut contexere solam
membranam videantur. Grauitas igitur eviden-
tissimum signum illius est plenitudinis, quae ad vim
sensitricem spectat. Nam si in aliqua particula quod
sensu praedita sit, ulla humorum multitudine aggre-
getur, in ea statim grauitatis sensus quorundam excita-
tur. Nec tamen quoniescunt pondus loco alicui
indefertur, ibi etiam humorum multitudine aggre-
bitur: quandoquidem eius facultas sit imbecillior,
poterit vel ex ipsiusmet solidioribus membris
grauari, quemadmodum in corporibus resolutis
contingit. Siquidem praeter resolutionem imbecillio-
ribus rebus dicitur mulculis, sentit ille qui resolutus
est, in motu grauitatem insuignem: ita tamen, ut
infirmus mulculus sibi ipsi minime grauis videatur.
Grauitas quippe ab altero, & in altero, gignitur.
Potest itaque mulculus fieri se ipso inualidior,
imbecilliorque: ut vero sibi ipsi sit grauis, id fieri
nequit. Aget igitur, maioris perspicuitatis gra-
tia, ponamus nunc a spiritu per neruum delato,
moueri mulculum: a mulculo vero, nobis pri-
mum, cui is inferitur. Quia mora, articulus in ge-
nu, ubi crux uniuersum committitur, subinde etiam
mouetur. Quibus sic constitutis, quisque uere as-
serere poterit, & mulculum, & totam tibiam, in-
ualido spiritui esse oneri. Quocirca minime po-
test ex quibusque dignoscitur, quid sit quod primum
grauet, quodque primum grauetur: nisi prius scias
id, quod primum in nobis unquam mouet parti-
culam. Ad quod quidem vir tuum in discernendis
potentibus, quae nos gubernant, peritus, tum in
anatomie exercitiis, desideramus. Iam vero, ut
nulla est necessitas illis qui in obediens functio-
nibus ualentiores, quam prius foret, effectus sunt, hu-
mores aliqua ex parte accreuisse quod Erasistra-
tus existimabat: ita per necessarium uidet, ut si qui
ualidiores actiones habeant, eis uirum robur ac-
cesserit. Actionis siquidem fortitudo, ad uirum ro-
bur consequitur: sicuti & robur uirum, fortitudinem
comitat functionis. At a sanguinis multitudine,
obsequium nulla necessitas est futura: cum neque si
is maiori sit copia quam antea, ualidior ex necessi-
tate futurus sit homo: neque si minori, imbecillior: si-
cuti nec si equalis sit, necesse est illi uiribus co-
dem se habere modo. Liqueat itaque actiones ualida
propriam esse ac inseparabilem uirum uigentium
notam, sanguinis uero aucti nequaquam. Porro ubi
adeo est tensionis sensus, nec tam ex exercitatio pra-
cesserit, ibi necesse est plethorae esse cognoscim.
Sanguis autem auctus, non tam esse, ut uenae adhuc
tensa sint, nondum plethorae absoluit. Vt ue-
ro tensio, copia humorum propria uasa tenden-
tium assitit est: ita ulcerosus sensus, aeternum sequi-
tur qualitatem humorum, potestque uel ex foliis

*Sensu vacuas
particulas, nec
grauitatis, nec
propterea sympto-
matum sensus possi-
se sensum parti-
cipere.
Medulla omnes
insensibilis.
Iecori gibba in-
sensibilis esse.*

*Gravitas est cer-
tam modum il-
lus plenitudo li-
um quae ad vim
sensitricem spec-
tat.
Plenitudo ad
viros non requiritur
necesse est
maxima humorum
obediens.*

*Gravitas ab al-
tero quia altero
gignitur.*

*Actionum forti-
tudo ad uirum
robore consequitur.
Robur uirum for-
titudinem comi-
tatur functionis.*

*Altimus ualida,
non autem sua
gentis, sed uenarum
tensionis uirum
inseparabilis nota.*

*Ulcerosus sensus
aeternum sequitur
qualitatem hu-
morum.*

quandoq; motionibus gigni. Si igitur particula quæ distenditur, particeps sensus fuerit, necessum est, ut quæcunq; fuerit ea res, quæ eò ipsam distendit, ut capi nequeat, tensionis sensum in animante excitet. Atq; is affectus qui tunc mēbra occupat, tensio appellatur. Quæ si plurimū augetur, erit etiam necesse, ut quod tendit dūrum parat. Cæterū nō tantū ex ipso sanguine, sed ex quacunq; substantia humida & flauenta, possunt partes tensiuo affectu occupari. In uniuersum autem, id quod grauatur, multum: quod uerò

res uerò imbecilliores euadant. Fieri etiā potest, ut & dematur de uirili robore, & humores unā cum parenchymate, seu transfusione (quæ impraesentiarū molē carnus, pinguitudinisq; significat) uel plures fiant, uel pauciores. Horum itaq; utrumuis eueniat, necessariū euadent* functiones imbecilliores. * Arbitrari autē quādiu solida corpora optimē nutricantur, posse nonnumquā edī imbecilliorē motum, hominū planē ēt minime perpendentiū, facultatesq; per uniuersa solida corpora permeare. sed perinde ac fistulas, aut canales quosdā, sic spiritui uenas & arterias construentium. Hallucinant etiam, qui inter plethora indicia, corporis tumorem reponunt: quippe uenarū tumor poterit forsan ēt plethoricū signum, inseparabile, ubi corpus ita se habuerit, ut uel interna externis, neq; hæc illis caleant magis, nec præterea calor immodicus uniuersum corpus detineat. Carnis autē & adipis moles, eorundem multitudine indicabit: nō tamen plethoricæ plenitudinis quæ desiderat euacuationem, signum existet. Cū autē syncerus sanguis nunq; ita reperiat in uenis, quin illi aliquid aut bilis, aut pituitæ, aut ferrosi excrementi permistum sit: perinde sanē erit dicere, sanguinē ipsū augeri, ac si etiam humores dixerit. Venarū itaq; tumor, sanguinis plenitudinē indicat, si tamen is a nulla gignatur externa constitutione prorsus inualecente, aut ex fusione, aut ex ebullitione. Cauendum præterea erit, ne particula illa declinū fuerit, neue paulo ante cæteris uehementius mora. In summa uerò, plenitudo a uenarum tumore indicabitur, si omnes corporis partes eandem constitutionē seruauerint, idē cum mediocri calore. Cæterum tum tumor ipse, tum tensio, cū a singulis humoribus, necnō a statu excitari possint, plenitudinis quantitatē, potius quā in specificis differentiis declarant. Siue igitur sanguis eò incrementi peruenierit, ut citra

tunicarū tensionē, nature modum excedat, corporis grauis uideatur: siue ita sit auctus, ut uasa contentia distendat: utrinq; cerē & multū, & plenitudo dicitur: sed prior illa, secundū uires, hæc penes uasa uocetur. Iam rubor, si nec ex sole, nec ex balneo, nec ex immoderato exercitio, neq; ex calore, nec ex ira uerecundiaue, neq; ex alia deniq; occasione extrinseca oriatur, sed undequaq; corpus æqualiter fuerit affectū, sanguineq; plenitudinis nobis indicium existit. Omnem autem plenitudinē, quæ in uenis congesta est, facile motus arteriarū ostendit, ob mutuam uenarū consuetudinem: nisi ubi humores contenti in uenis, & maxime sunt crassi & tenaces. Plenitudinis autem species, ubi in uniuersum illa corpus dispergitur, his notis sunt distinguenda: Rubor plenitudinis sanguineæ attestatur: color uerò sup pallidus, flauusq; bili. Cū autē pituita nimis exereuerit, in album magis q; pro nature modo, color ipse mutat: quemadmodū in atrum, si bilis atra.

Opus tamen est, ut cum singulis horum humorum simul sanguis augeat: alio qui nō plenitudo aut plethora, sed cacochymia potius dicenda uenit. Cæterū si grauitas uel tumor præter nature modum accesserit, affectu talis, plethora appellabitur: ipsiusq; humoris incensēs species, ex colore

Tendi possunt particula a qua uel substantia humida & flauenta.

Mordicantium humorum quatuor, seruatum magis & minus differentia habentur.

Acres humorum particula exulcerat admodum, barres atq; rigorem excitant.

Viceris sensus neutrius plenitudo non est propria nota.

Symptomatum differentia nota.

Tensionis affectus quod indicat.

Asthinis languor, uires inane laboris ostendit

Facilitas per uenosa solida corpora permeare.

Tumorem corporis a m. amara esse signum plethoricum.

Venarū tumor quando sanguis plenitudinē indicat.

Plenitudo secundum uires. Plenitudo secundum uasa.

Ruber saltem sanguinis plenitudinem indicat.

Arteriarum motus, uenarū plenitudinem indicat.

Plenitudo sit citi quibus notis sit distinguenda.

Cacochymia quid.

*Pleuritidini per
petui adfice tu-
morem & pon-
dam.*

*Pleuritis in leuco
phlegmate di-
tatur folis per
venerem cor-
pus exuberare.*

*Pleuritis affert
duos, & tri-
duos & familia-
tes.*

Sopor vnde.

*Vigiliari can-
te.*

*Melancholicus
fuit diffidens, et
præter omnes tri-
stis inuoluitus.*

*Pleuritis in ore
ventri collecta,
appetentiam fa-
cit.
Bilis vtriusq; fa-
ciat.*

*Melancholicus
focius.*

*Pulvis diffi-
cultas pro va-
rietate humoru
asperitatem.*

*Sanguinis tem-
peria à diversis
causis variatur.*

lore diquidabitur. Quæ tamen bilis nec tumo-
rem, nec pondus (sola à plenitudine se iungi ne-
queunt) inferre potest. Nam antequam ita ex incre-
scat, alia illi superueniunt affectio. At si sola
pituita augatur (inter cuius species annueratur
humor qui crudus dicitur, fabamque imitatur
elucet, quæ alia pituita, crassior, ac minus statulen-
tus existens) dumtaxat in leucophlegmate solet
per uniuersum corpus exuberare. Sunt enim &
aliæ pituitæ species: dulcis nempe, acida & salia.
Verum ex dulci sunt somnolenti: ex acida cum re-
dundat, famelicus incalcescat, in uigiliis illabitur.
Falsa. Cruda autem, denegit appetentia, somnolen-
tibus etiam sunt. Si quidem si humefcat, refrigeretur
cerebrum, quod est sentendi principium, ita
nimis soporosa affectio oboritur: quemadmodum si
siccescat, atque incalcescat, in uigiliis illabitur. Pro-
inde omnes qui utraque bile redundant, insom-
nes degunt. Id tamen peculiare habent, qui atra
bile cruciant, quod difficile sunt, atque præter om-
nem rationem tristes. Vigiliæ itaque & somni cau-
sa, in cerebro ipso consistit: appetentia autem & il-
lus defectus, ad os uentriculi pertinet. In quo
quidem si colligat pituita, appetitiones excitat:
si flaua bilis, tum sitim, tum cibi fastidium pariet,
ostium fiet amarulentum. At si atra, morosi, tristes
atque formidabiles sunt, & sine siti. Saluam plu-
rimam illis facit: atque nonnulli eorum satis uident
famelicis, in quibus numerum atra bilis, acida qua-
litate fuerit affecta: id quod sanè contingit, ubi ipsa
malignior est redditur. Porro ubi ea ueluti fax
sanguinis permanet, neque exacerbat, satus
fuerit illam appellare melancholicum succum: non
autem melancholicum, siue atram bilem. Quod uero
ad pulsum pertinet, si in plenitudine flaua bilis
redundet, tales necesse est reddi pulsum, qualis ubi
eor callet simul & exaccat. Si atra bilis, quales
quum frigefcit & exaccat. Si pituita, quales
edi solent in humida frigidaque constitutione. Vbi
uero sanguis ex omnino secundum naturam lia-
buerit, nulla fiet in pulsu ab antiquo statu muta-
tio: alterantur autem, secundum ipsius sanguinis
mutationem. At uero ex ocio & humido uictu san-
guis humidior seipso redditur: ex ira autem, ex-
ercitatione, æstu, infectione, medicamentis ali-
mentis calfacientibus, necnon meraciori antiquioribus
uino, calidior efficitur: quemadmodum frigidior,
ex recenti frigore. Quod si quisquam alimentis
temperaturæ ficiore diutius utatur, quæ tamē
alia nulla intemperie teueantur, sanguis ficiore
euadet. Sed secundum etiam varias complica-
tiones causarum, in diuersas incidit sanguis co-
positas intemperies: idque citra miscellam aliam
in eo superuenit humoris. Quod si ob aliorum
quorum humorum mixturam, illabatur in intem-
periem, certe absque cacochymia consistere talis dyscra-
sia non poterit: aliam tamen octo differentias for-
tietur, sed diuersio modum, quam ubi ille solus &
per se fuerit talis. Verum an intemperies ad so-
lum pertineat sanguinem, an ad aliquem alium.
illi humor est permixtum, ex his quæ diximus, & ex
aliis multis signis, facile deprehendi potest. Fin-
gamus igitur homini qui febre est uacuuus, ue-
nas in tumore attollat, ac totum corpus rubicun-
dus euadere. Statim enim est expendendum, num

& causæ aliquæ occurrerint, ex illis quæ uim ca-
lescendi habent: & si hoc forte uideatur, præsti-
terit lusu scire rei dignotionem tantisper differre,
donec motio ab illis in corpore uniuerso excita-
ta coqueatur. Tunc autem, si qualem diximus, talis
lium appareat, sanguinem sanè in eo abundare, indi-
cium erit. Mox uero grauitatem, tensionem, pigritiam
ad motum, pulsum, uigiliam, somnum, appe-
tentiam, fastidium, præcedentem uim rationis, ex-
pedire reuolare ad examen, expedere etiam aliqua
excretio solita, illi suppreffa sit, aut exercitatio
neglecta: & alimenter pluribus, aut plurimi nu-
trimenti sit usus: uel si post cibum se præter mo-
rem lauerit: soliusque sit plethoricis morbis cor-
sippi. Quibus addenda est temporis & regionis
consideratio. Nam lyeme & vere, locisq; tum frig-
idis, tum temperatis, maior colligitur plenitudo:
minor uero locis & temporibus calidis atque
siccis. Sic etiam qui densa sunt cuti, frequentius
plenitudinem colligunt: sicut rarius, qui rara.

*Pleuritis ma-
ior colligitur ly-
eme & vere.*

GALENI PERGAMENI de atra bile liber unus.



Angus (qui humor omnibus ho-
minibus est non sumus) ubi uel ar-
teria, uel uena fuerit consueuerat,
illuc effundit uidetur: rubens sa-
ne magis è uenis, flauior autem ex ar-
terijs manans. Unde cum autem exeat, subito co-
ncreuit in grumulum: non solum extra corpus, sed
intra illud etiam, in quousque ipsius loco præter na-
turam cõtentus. Igitur magna ex parte in hoc hu-
more rubens color exuperat: & talis exactè opti-
mus sanguis exiit. Apparet autem nonnullum hoc
ipso flauior & nigror: sicut etiam ex consistencia
crassior atque tenuior. Quin & uidetur quandoque
in cõcreto sanguine tenuis quedam humiditas,
cõtracta à poro, inuolare. Interdum & piruofus
humor cum sanguine per uenas defertur. Ceterum
lux differentie humorum non mutant sangui-
nis appellationem. Est & alius quidam humor san-
guini crasso & nigro perissimus, qui tum per uo-
mitum, tum per deiectionem eximitur. non tamē,
est diutius æri ambiens expositus fuerit, omni
no densatur. Atque ipse humor aliquod à uo-
mitibus ac duis simul & acerbis sentitur: quan-
doque uero nullam qualitatē manifestam præ se fe-
fert. Cum autem sanguis maior ex parte dulcis es-
se uideat: pituita autem infipida, ueluti aqua: certè
si quando liumores sentiantur salii, morbofi es-
sunt. Euadat autem interdum ipsa pituita dulcis.

*Sanguis extra
sua uasa, subito
in grumulum can-
escit.*

Seris sanguinis.

Atra bilis.

*Salis humoris
esse morbofi.*

*Pituita omnis of-
fi debet colore al-
bo, minusque co-
ncreuit.
Bilium lili spec-
ies.*

*Bilis porri cyano-
rem refertur, in
uisculo quodam-
tur.
Bilis stragionis.*

ut quales sunt, tales permanant. Ut uerò ad atram bilem redeamus, ea, quia non concretis, à sanguine nigro distinguit: nō tamen ab ipsa quæ propriè excrementa nigra appellānt, eo nomine differunt. Hæc siquidem, cum bila sepius uomat

atque deiciantur, ab atra bile plurimū & facultate & qualitatibus differūt. Nam neq; acerbam saporem, neq; acidum manifestè participat: cum atra bila tum gustui, tum olfactui talis esse uideatur. Ad hæc, excrementa nigra minimè terrā fermentant, ut atra bila. Quæ quidem * hac in re cum sit aceto ſaccharino ſimilis, partim tamen crassitie ab eo ſimacimè diſcedit. Quamobrem, quibus corporis partibus pura & impermixta adheret, eas excedendo exulcerat. Acerū etenim quod tenuium fit partium, permeat: at bila atræ crassities, cum illi ſedem firmam exlubeat, corroſionis fit cauſa. Taceo quod nullū animal atram bilem guſtare ſuſtinet: ſicuti nec meram ſaliſuginem, in qua nullū animal degere poſſet. Cuius rei mare mortuū firmum indiſciū præbet. Pernicioſa itaq; illius generatio conſeſcit, cum ex humore atro ſupra modum aſiario cōtingat. Exterum ea bila atra, quæ ex ſtatu bile immoſcit aſtata ortum habet, nō hæc pernicioſior eſt aſſimanda, quāto ſtatu bila efficacior eſt ſanguinis ſedimento, quod amuræ aut ſacis inſtar generari eſt proſitum. Igitur ut exactè bila atræ humor ſemper excreat: ad perniciem animaduerti, ſic eorum quæ nigra appellānt euacuationē,

10 nō raro ſalubrem extitit cōperi. Porro ſanguis qui uena ſecta mittitur, nigror eſſe uidet in ſiccis calidiſſis temperantibus corporū: ſicuti & in huiusmodi anni temporibus, & regionibus, conſtitutionibus, uitæ ſtudij, uictus ratione, ac deniq; cibis crasſis & ſiccis: quales ſunt, lens, coſchlex, & carnes taurinæ hircinæq; præſertim ſale aſſeruatæ. Conſimilis enim naturæ eſt uinum nigrum, craſſumq; & auſterū. Pari etiā ratione, quæcunq; ægritudines ſunt ex calida ſiccāq; temperie, cuiusmodi ſunt febres ardentes, craſſum & nigrum ſanguinē gignunt. Vbi igitur per febres ardentes melancholicus humor in uenim ipſam propellitur, carbunculus appellatur produciſtur. Si uerò ad eam, citra febrim, decumbat, fueritq; permiſtus ſanguini, elephantem gignere eſt aptus. Sin autē ſolus exiſtat, ab imo quidem nigrū tumorē gignit, qui procedente tempore terminatur in cancrum. Ruſſus, ubi acrior & contumacior hic humor fuerit, cancrum exulceratum: ubi autem mitior, latentem & citra ulcus productum. Quippe omnes huiusmodi affectus, & præſertim cancer, ab humore melancholico oriuntur: cæteri ut à calidiori carbunculus, ita ab eo qui minus calidus eſt, oriiri cancer conſueuit. At ubi is humor niger, qualitates obtinuerit mitiores, nimirū permiſtus ſanguini, ſubrubescens elephantorū progignit: qui tamen proceſſu temporis longè nigriores euadunt. Sæpius autē natura, uſarum quæ ad ſedem ſunt, reſerans ue-

tiā, huiusmodi humorem exernit cōmiſtum ſanguini: ob idq; excretio ipſa hæmorrhoidis appellatur. Sæpenuſmero etiā eundem humorē ad crurium uenas tranſmittit, à quo dilatatz & diſtente, uaricoſe redduntur, & cutis quæ huius-

ſcemodi uenas attingit, temporis proceſſu nigrefcit. Quod ſi uenas illas turgentes melancholico humore quis moliatuſ excedere, periculum imminet, ne homo corripiatur melancholia: id quod fieri ſæpius eſt uſum, nō in uaricibus modò, uerumetnā in hæmorrhoidibus, quæ ex huiusmodi humore conſiſtunt. Quod igitur in uentis & arterijs humores omnes unā cum ſanguine continent, oſtendit ipſius uarietas, tum in colore, tum in conſiſtentia: id quod etiā ex quæ diximus, & quæ in libro de Natura humana, ab Hippocrate prodiſta ſunt, liquidò cōſtat. Qui huiusmodi mores quando temperamenti obtinuerint mediocritatē, animal erit ſanum: ægrotabit autē, ubi uel in omnibus uſuſ, uel in parte aliqua, uerò aliqua à naturæ modo receſſerit. Rationi autē eſt conſentaneum, ſimiles affectus oriiri in partibus quæ profundo in corpore deſiteſcūt, iſs qui in cute conſiſtunt. Cum itaq; ſtatu quidem bila in unam quampiam decumbens partem, generet eryſipelas: atra uerò, carbunculum atq; cancrum: mirū ſanè eſt nō deber, ſi utraq; in inſectis deſcendens (quandoquidem internæ partes nō ſortium conſuetudine ad amantiniam) aliās aliud ipſorum eo dant, ac nonnunq; proſius inſanabilem dyſenteriam efficiūt. Omnes ſiquidem exulcerationes ab atra bile ſunt inſanabiles: niſi quæ curationē appellet, ubi affecta pars tota circunquaq; ad partem ſanam uſq; diſſecta, abſcindatur. Quæmadmodū igitur inſectina circa alicuius auxilij ſpem ulcerant ab atra bile à ſtatu autem, diſcitur curationem admittunt: ſic in profundis ſitis accidit cæteris partibus, atq; iſs præcipue, quæ inſectis ſunt nobiliores. Adde quod inſectis mori curatio facilior eſt, eo quod medicamenta quæ inſiſcunt per ſedem, ſtatim locis affectis occurrūt: quod ſanè in cæteris partibus fieri facile nequit. Porro lien malè affectus, uel ex inflammatione, uel ſcirrho, uel imbecillitate, ad nigrius cōuerſus, colorē uitiouſum in toto corpore efficit. Quin & ipſe ſemper icore nigror exiſtit: & præſertim in animalibus calidioribus & ſiccioribus, qualia ſunt ferratos dentes habentia. Hoc uſuſ etiā uel elixit, guſtui quippiam acerbū reſert, ut icore nihil ſimile appareat. Vnde liquet icore expurgari à liene: qui nimirū atralut quicquid in ipſo ſanguine ſaculentum exiſtit: quale utique eſt ſex in uino, & in oleo amuræ. Ex hoc uerò quod medicamenta ſtatu bilem trahentia, auxiliantur eis qui regio morbo laborant: quæ autem aquam educunt, hydropes aſcitas euacuant: ſicuti & quæ nigra expurgant, elephantos & cancrum augeri prohibent: in conſeſſo eſt etiā, uinum quod purgantium medicamentorū familiarē ſibi humorē attrahere. Ut autē à liene reuertat: quandoquidē unāquaq; corporis partē proprius alit humor: animalū uerò ferratos habentium dentes lien acerbam aciditatem exhibet qualitatē: manifeſtū eſt, humorē qui illū nutrit, talem etiā exiſtere: non igitur erit aliam particulam excogitare, quæ melancholico humorē excipiendo ſit deſtinata. Iam uerò, per quas uenas à uentriculo in hepar alimentū ſuggerit, per eaſdē à toto corpore in illum etiā humor demittitur, tum in purgationibus quas moliantur medica-

Varici hæmorrhoides, ſi quis colubere tenui, periculi eſt ne hepar corripatur meliſſo ſua.

Eryſipelas. Carcinoculæ. Cancor.

Dyſenteria. Exulceratio in uis ab atra bile eſt inſanabilis.

Inſectis mori curatio, eor ſaculior ſit, quoniam aliorum uentrius particularum. Lien malè affectus, colore uitiouſum corpus uſtat.

Lien dicunt poſtquam quippiam acerbum reſert. Hepar à liene expurgatur.

Purgantium ne decantemur ſiſſa gula ſiſſa ſanabiles ſunt attrahere.

Liens uentri ab acido humorum, quem reſeruit. Venter deſcendit aliq; id humoris perſeſſum uenas, per quas ſunt ſuggerit alimentum ſuggerit.

Nigra excrementa quædam ab atra diſſerant bile.

Atra bila eſt acida, terramq; fermentat. Atra bila diſſerit ætate ab acido.

Atra bilis ex edat, corrodatq;

Atram bilem guſtare nullū animal ſuſtinet.

Mare mortuum nullum in ſe poſſit alit.

Atra bila quæ ſtatu præſtata eſt, eſt omnium pernicioſiſſima.

Atra bila ſemper ad perniciem excreuit.

Sanguis niger quibus ſecta uena vacuatur.

Melancholicum ſanguis gignit.

Tumor ab atra bile. Carbunculus.

Elephantiaſis.

Cancer. Cancer emulceratus.

Hæmorrhoides.

Varici.

menta,

menta, tum in ijs quas natura in morborū crisi-
bus efficit. Quinetiam in recte valentibus, non-
nunq̃ optimus sanguis ad uentriculum cōmeat,
ipsum uidelicet nutriturus: id qd in longis in-
dignis accidit. Porro cū natura quæ formā
& auger, prægnationis tempore optimū sangui-
nem attrahat, in uenis relinquatur uisiosissimus,
qui post partū tandem excernitur: quemadmo-
dum singulas mētib. qui nō solum quantita-
te, sed qualitate etiā superfluis atq; inutilis est.
At pituitosus humor, ex pituitosis cibarijs, in pri-
ma cōcoctione, quæ in uentriculo fit, generatio-
nem obtinet: ueluti biliosus melancholicusq; in
iecore. In cuius quidem cōctione pituitosus hu-
mor etiam in sanguinem uertitur. Quam ob cau-
sam nullum ipsi proprium instrumentum moli-
ta est natura, ad sanguinis expurgationē, quem-
admodum est utraq; uesica & lien. Siquidem hic
sanguis a bilioso humore & seroso expurgat:
lien uerō a melancholico humore. Itaq; pituito-
sus humor, qui in uentriculo gignitur, citis de-
feratur in iecur simul cum humoribus genitis ex
cœcibus & bibitis, ueni cum illis concoquitur,
in sanguinemq; mutatur. In uniuersum igitur, om-
nes qui ab humore melancholico proueniunt
affectus, statim inter inuita medicamētis eum lu-
morem uacuantibus ualide purgās, quo minus
augeatur prohibebis, usque etiam ad cancosos.
Nō est autē eadem bilis atra in ijs qui integra fa-
nitate fruuntur, & in nōnullis eorū, qui olim na-
turalem habitū sunt egressi. Porro medicamen-
ta singula prout quendam similemq; sibi suc-
cum eliciunt: non autem in naturā suam corpo-
ris humores permittant. Nam si medicamenta
morbo regio laborantibus propinaueris: quæ
uerō bilem educunt, his qui insistantur aqua in-
ter cutim: q̃minimū proprii humoris uidebis
utrobique uacuari: atq; in eod non solum nihil u-
ueris ægrotantes, uerū etiam q̃maximē lēsses.
haud aliter, quā si ipsi uenas incidere. Ad-
uerse autem columbas, atq; alia animalia plera-
que, destituta esse uesica felis.

GALENI PERGAMENTI

de tumoribus præter naturam

liber Vnus.



Nter ea corpora quæ naturaliter, &
quæ præter naturā se habent, terna
quædam est constitutio eorū corpo-
rum, quæ nō secundum naturā asse-
cta sunt. Siquidem qui crassior uel
gracilior est factus, nō ad huc naturalis habitus
fines egreditur: sed tantū alter supra naturā mo-
dum, alter uerō infra inuenit: uterq; autē secun-
dum naturā est minimē affectus: quanq̃ certē ho-
rum affectū nō naturalis, excessus quidē, præ-
ter naturā existunt: terminus autē eorum exce-
ssuum, est actionis obliuio. At qui tumorē ex a-
qua inter cutem contrahit, & qui ex tade euasit
gracilior, præter naturā sanē uterq; est affectus.
Igitur in præsentī libro, de tumoribus præter na-
turam, qui rum corpus uniuersum, tum quālibet
illius partē occupat, nobis differere est animus,
sumptō a phlegmone initio. Phlegmone dicitur
tumor carnosior particularū, ubi cum tensio-

ne, renitentiāq; necnon dolore pulsatiō & calido,
ruboreq; maiorem sibi tumorē contrahunt.
Ex quibus quidem signis sanguinē redundare
in inflammationē ipsā existimandū est. Cuius sa-
nē defluxus, priusquā sit impactus, facillimē lus
quæ refrigerat atq; astringit, repellat, præsertim
si tumor fuerit exiguus. Vbi autē fluxio impacta
iam tenaciter hæret, nullum ad astringentibus
& refrigerantibus auxilium admittit: indiget au-
tem uacuari. Iam uerō pars phlegmone obfusa,
nō statim ab initio sit immodicē calida, sed pro-
cedente tempore, pristina nimirū perspiratione
impedita, ex obstructione omniū meatū. Idcirco
si inibi sanguis iam immoretur, necessum est
ut omnino putrescat. Siquidem omnia corpora
simul calida & humida, in calidum locū coacta,
putrescunt promptē, si nec euacuentur, neq; re-
frigerentur. Quare & quæ ex ipsius putredine ca-
lidas nascitur, ei superuenit, quam antē habebat.
In uniuersum autē, nihil in inflammata parti-
cula permanere potest exactē secundum uaru-
ram se habens, inflammationē perseverante diu-
tius: sed omnia simul cum carne, cutis uidelicet,
nerui, tendones, membranae, atq; uasorū tunice,
fluxionē ipsam suscipiunt. Quare & ossa interdū
fluxio ipsa inuadit: licet & ab ipsis p̃ primō affe-
ctis, nōnunq̃ oriuntur: quemadmodū etiam a ner-
uis, ubi scilicet uulnerat. Cuius igitur, ubi secun-
dum naturā se habet, laxa est, in ijs qui crassi nō
admodum sunt: & locus medius, cui ipsa incum-
bit, exiit uacuuus. nec fecus ea quæ in carne sunt
spacia, conspicui inania. Omnia autē hæc per
inflammationes replentur sanguine, ex uasis qui-
dem per eorum tunicas resudante: in quacunq;
autē carnis particula, ad modū roris permisso.
Vbi uerō procedente tempore uicerit quidē na-
tura: fluxio autē omnis concocta fuerit, ac geni-
tum pus: extra carnē id pellitur a facultate, quæ
in ea est, expulsiuā. Quod si uel meatus natura-
lis conspicuus sit, uel locus rarus existat, pus fa-
nē partim perspirat, partim sensibilibiter effluit. At
si incumbens acutis densa durāq; extiterit, ibi pus
detinetur, atq; eam a subiecta ipsi carne dirimi-
re: deinceps & sua acrimonia corrodit, & florae egre-
ditur, nisi quis eam præuertat scarificare. Cæte-
rum natura a fluxione uicta, nō amplius ad pus,
sed ad alienam quāmpiam mutationē, aliās di-
uersim, proficisci sanguis. Porro dum pus cor-
pora excoriatur, continentiāq; subiectis ducit:
ac deinceps eo utiq; uacuato, quæ disident iu-
ter se, pristina constitutiōe nequeunt recupera-
re, in affectus uocal sinus. Qui nimirū nisi iſce-
lerimē percurratur, callum contrahit, proceden-
teq; tempore durus euadit, nec amplius subie-
ctis ipsi partibus agglutinari potest. Astringitur
tamen medicamentis, & uictus ratione exicat,
ita ut particula integrē esse sana uideatur. Nō so-
lūm tamen ex inflammatione gignuntur absces-
sus, hoc est, effusiones particularium: sed & sta-
tim a principio interdū proueniunt, propter hu-
morem aliquē, qui temporis processu excoriet,
atq; a cōcrentis continētia displicat. Prouide dūm
cū omni modum speciem humidiorū ac solidiorū
corporum intus habere apparent: & non raro
etiam animantia in ipsis reperiuntur, omnibus

Phlegmones cu-
ratis.

Perferre cali-
da & humida,
ut in calidum
locum impacta,
nec uacuatur,
nec refrigeratur

Ossa interdū
fluunt ipsam
suscipere.

Phlegmonia
generatur.

Ab hisse quo-
modo hant.

Sinus quid.

Animalcula in-
terdū reperiuntur
in abscessibus.

Menstruum san-
guinem quantita-
te & qualita-
te esse mutum.
Pituitam in ven-
triculo p̃cipu, at
postea in liam a
uero, in sangui-
nem uertit.
Pituita purgan-
da est multis de-
tum instrumentis
sui & na-
tura, ut reliquos
secrementis.

Melancholici af-
fectus quomodo
soluendi sunt.

Medicamenta
purgantia, sum-
mari sibi succos
attrahere.

Columbe carnis
felle resera.

Phlegmones ac-
cutis deſcri-
pta.

ferè quæ ex putredine ortû habent, simillima. Fi-
stula, sinus est angustus & longus, alijs sinibus si-
milis: qui sanè attingit, & rursum duducit etiam
ob excrementorû effluxum. Iam in atheromatis
reperitur quiddam pulvi confimile: in meliceri-
dibus, mellis ut feno, in steatomatis. Plerumq; au-
tem quædam tunica membranosa singula hæc
continet. At gangræna carbunculû excitantur,
cûm sanguis tanquam feruens & inflammatio-
nè propinquas, exiit cutim. Proinde & cum cru-
sta sunt, & bullæ ulcus præcedunt, quemadmo-
dum in ambustis. Quin & acutissimâ febrem in-
ferunt, atq; in dîscrimen uitæ trahûnt. Nigra au-
tem prorsus, ac cinerulenta, apparet crusta car-
bunculorû ulceris. nec tamen inflammationis cir-
cûstantis color, sicuti in alijs, ruber cõspicitur:
sed ad nigrius uergit, alio sanè modo quàm in
suggillatis, uel à gelu perfrigeratis. Non enim ue-
hementer luet, ueluti in illis, tumor: uerò habet
quippiam splendidum, quemadmodum bitumen
Iudacû. Huiusmodi siquidem est exquisita atra
bilis: unde & malignitas ulcerû quæ in carbun-
culorû sunt, accidit. Siquidè sanguis, uel statim ab
initio, uel in ipso feruore superafflatus, melâcho-
licus fieri uidetur. Verùm circa feruorem atra bi-
lis cancos constituit: atq; eos cum ulcere, ubi a-
criorem illam esse contigerit. Quamobrem & ni-
griores sunt colore omnibus quæ inflammatione
infectantur, & minus calidi. Venæ autè in his
repletur & tenduntur magis, q̃ in ipsis inflama-
tionibus. Ad hæc gangræna maximis succedit in-
flammationibus: quæ sanè mortificatione quædâ
affectæ partis existit: & nisi curetur celerrimè, us-
que adeo pars affecta extrahescit, ut inuadat alias
cõnnuas, atq; sic hominè perimat. Porro in natu-
rali statu, insensibilis nobis est arteriarû motus:
in inflammationibus autè, in eum dolore sentitur.
Arteria siquidem dum dilatur, corpora circû-
iacentia percutit: atq; ex eorû plaga ob inflama-
tionè dolemus. Quod si arteriæ tunc inflama-
tione urgetur, tunc ratione percussus simul
& percussus, geminatur dolor. Si fluxio biliosa in
aliquam partè decumbat, idq; ab exquisita bile
profecta, cutè exulcerat: si uerò sanies aquosa,
uel etiam sanguis habeat, minus erit acris, sed
particulâ magis in tumorè attollit, q̃ exulceret.
Hoc igitur erysipelas nominatur, alterum uerò
herpes. Humor autem à quo unumquodq; ho-
rum gignit, tum ex colore, tum ex caliditate par-
tis affectæ, facile dignoscit. Rursus, cûm fluxio
acris, hæc quidem minus, hæc uerò magis, talis
existat: sciendum est, ab acriori fieri herpetè ex-
cedentem, ab altera uerò mliarem. Atq; hæc sanè
fluxio pituitam habere mistam mihi planè uide-
tur: ut illa proficiat à meracissima bile: quare &
cum erosione oritur, affectu semper proximam
inuadente cutem. Verùm si ex æquo sanguis &
bilis cõmixta fuerint, huius affectus forma & na-
tura, in medio erysipelatis & inflammationis con-
sistet. Quod si alter ex humoribus longè exupe-
ret, ab exuperante affectus nomè sortietur, cum
adiectione ramen humoris admitti. Dicitur itaq;
quæ erysipelatis inflammationis particeps, flaua
bile superante: inflammatione uerò erysipelatosa,
uicente sanguine. Similis quoq; erit aliarû mi-

stionum interpretatio. Quatuor enim sunt affe-
ctiones, quæ assidue ex humorû fluxione oriun-
tur: erysipelas, œdema, inflammatio, & scirrhus.
Erysipelas igitur, ut dictum est, biliosa fluxione
exuperante oritur: inflammatio, sanguinea: œde-
ma uerò, tenui pituita: quemadmodum & crassa
& lenta, altera quædam scirrhorum species con-
sistit: namq; altera fax sanguinis efficit: quæ ipsa
rursus sanguinis fax, est duplex: altera enim ip-
ciem Hippocrates nigram nominat: altera uerò
& ipsa quidem est nigra, propriè tamen atra bi-
lis uocatur. Ictus itaq; canceri febres sunt: al-
terius uerò nigre, una quædam scirrhorû species:
quæ sanè ab altera quæ ex pituita consistit, colo-
re distinguatur. Atq; utrisq; cõmunia funt, maior
quam sit pro naturæ ratione tumor, tum dolore
uicane, tum durus: & quod utraq; species quan-
doq; ab initio gignat, quâdoq; ex permutatione
alicuius tumoris immoderatius refrigerat. Scir-
rhis propinquas sunt tum ecchymomata, hoc est
transfusiones, tum melasimata, siue denigratio-
nes. Qui affectus fuit sanguine ex ipsi uenis ef-
fuso, nunc tunc earum cõfusus, nunc ipsarû si-
nibus referatis. Quod si arteria ad aperta fuerit,
affectus hic aneurisma uocatur. Fit autè, ea uul-
nerata, eûm ad cicatricè superposita cutis deue-
nerit, arteriæ uerò ulcus permiserit, ipsa nequaq;
edolunnata, neq; ad cicatricè perducta, neq; car-
ne obturata. Ceterû tumor ille compressus digi-
to cedit. Cûm igitur sanguis quem arteriæ conti-
nent, tenuis & flauus exiit, ac præterea mistus
subtili spiritui & multo, proindeq; sit etiam calidior
eo qui continetur in uenis, adeo sanè in ef-
fluit, ubi uulnerat arteria, ut ægrè supprimi pos-
sit. Cedit etiam in œdematibus materia premen-
tis digitis, & pars ipsa foueæ modo excauat.
At in hoc affectu pulsus non adeo, ut percipitur
in aneurismate: & color albicanti existit. Ad hæc
œdema longè latius & maius est aneurismate: nisi
quidò grumus adnatus, coarctus ex aneurisma-
te, sphacelum, hoc est, syderationè efficiat. Sic e-
nim uniuersam solidorû corporû corruptionè
appello, ita ut omnibus quoq; insit. Gangræna au-
tem, solidorû corporum mortificatione, & ipsa,
uerò ossa nequaq; corripit, maximasq; sequitur
inflammationes. Repetendum autè rursus hoc
est: atram bilem, si quidem mordax decubuerit
in carnè, circumpositam cutem exulcerare: si ue-
rò mitior existerit, cancos circa ulcus inducere.
Iam uerò, qui affectus ex ulcere & tumore cir-
cumambiente consistat, phagedæna uocatur. De-
passitur etiâ & herpes circumuicinas partes: so-
lus tamen cutis exulceratio existit: phagedæna
uerò, unâ cum cute, attingit etiam subiecta. Quæ
ulcera omnia, cacœthæ, hoc est, maligna uocant.
Porro scabies & lepra, melancholici affectus, ad
solam cutem spectant: quemadmodum si in solis
uenis & carne fiant, nomen obinènt canceri. Præ-
terea elephas affectus melâcholicus est: à sangui-
ne quidem melancholico primam habens gene-
rationè: tempore uero procedente, atra bilis co-
pia sanguinè ipsam exuperat: quo tempore cor-
pus iam & grauer olet, turpesq; & deformatum
uidetur, atq; interdû etiam exulceratur. Iam pu-
dendorum tensiones præter naturam, quæ non
desistunt,

Ordema.

Scirrhorum spe-
cies dua.Fax sanguinea
duplex species.Ecchymomata.
Melasimata.

Aneurisma.

Arteriarum san-
guis qualis exi-
it.Ordema quous
de ab aneuris-
mate differt.Sphacelati.
Syderati.
Gangrana.Phagedæna.
Herpes depq; sibiCanceribus uelut
scabim.
Lepra.
Cancer.
Elephas.

Fistula quid.

Atheromata.

Meliceris.

Steatomata.

Gangræna.

Carbunculi.

Carbunculorû
descriptio.Atra bilis
quid.Cancro gignit
atra bilis mlior
uida, quæ si a-
crior fuerit, illi
producit cancos
ratos.

G'græna quid.

Dolor pulsatis
affligit inflama-
tas particulas,
ex arteriarû mo-
tione.Erysipelati.
Herpes.Herpes exulcerans
gignitur ab acri-
ori bile: ut mihi
uideretur, à muius
acris.Erysipelati piti-
tuosa est: tum
inflammatio ery-
sipelatosa.

Saryriasmus.
Priapismus.
Achor.

Ceria.

Myrmecia.
Acrochordones.
Ptychra.
Epypylides.
Formiculae.

Tubercula.

Bubo.
Phlegmola.

Serena.
Cherax.
Sarcocina.
Ramei carnos.
Jui.
Hydracula.
Epipylaria.

Asperitula.
Ramei vari.
osini.

Varici.

Bubonocela.

Epipylaria.

Hydrogrem.
sterei.

Epulides.
Parulides.
Thymus.
Yma.
Paraphilia.

Polypodes.

Encanthia.

Vagrus oculi.

Staphylocoma.

deficit, quidam saryriasmū, quidam priapismū appellant. Achor autem ulcus est in capitis cute, quod conq̄eres pituitae falsae, & nitrosae esse solem. Ac defuit quidem ab eo fames quaedam nec aquosa simpliciter, nec ita, ut mel, crassa. Ceria (quos fauos nominant) cum tumore quodā exiguo & plurimum foraminibus accidunt, in oleo quodam humore fluentibus. Quin & alij tumores praeter naturam lites minores per cutem sunt, nimirū myrmecae, acrochordones, ptychrae, & epinyctides: qui sanē affectus omnibus cogniti sunt. Non minus autē est notus furunculus: qui quidem mitis existit, si solam cutem obfoderit: malignus autē, si descenderit altius. Sic enim tuberculo est similis, ab eo sola duritie differens. Vterq̄ autē affectus misce cum inflammatione esse speciei videtur. His tertio loco succedit bubo, quarto is quem nonnulli vocant phlegmonem, caliditate simul & generationis celeritate id ab alijs tuberculis distinguens. Qui affectus glandulosarū partū est inflammatio. Haec autē partes ubi ad scitū deueniunt, in affectus struma & cherax vocatur. quemadmodū etiam ubi indurant testes, *serena*, & *ramei carnosus* dicitur. Cū autē in eorū tunica humor aquosus colligitur, hydrocele nominatur: a quo affectus, epiplocle & enterocle differunt: quod alterum omenti, alterū intestini cuiuspiam descensum in tunica testis significet. Quemadmodū autē unum quodq̄ doctorū nominū partis morbum indicat, a quo affectus cognominat: sic & *asperitula* recens nomē, hoc est, uariicosus *ramei*, in parte iam dicta declarat ipsum affectum consistere. Quāq̄ ueteres, & alias etiam surgentes uenas *asperi*, hoc est, uarices nominant. Fuit quippe in cruribus enas uarices, ob imbecillitatem uenarum quae inibi existūt, & tunc praeterit, cū sanguine corpus crasso reddat. Peritonæo uulnere, uel rupto, nec postea conglutinato, tumor quidā mollis eam regione occupat. Quod si id in inguine eueniat, tumor talis bubonocela nominatur. Si uero circa umbilicū, sic affectus *epipylaria* quidam appellat. Ceterū peritonæi solus nulla harum affectionū existit: sed & nerui propaginem musculi asici proflus est necessarium. In hydrocicis etiam copia quidem materiei eadem in regione aggregatur, aquosae sanē, in ascite statuosis, per tympanitem: pituitosae deniq̄ in affectu anasarca, & eo quem leucoplegiam appellant. Porro epulides, parulides, thymi, & alia id genus, carnes suppurulantes existunt. At uix, gurguliones, ronillae, earum glandularū quae inuicem in faucibus inuicem opponuntur: paristhima deniq̄, eorum corporū quae in ipsis faucibus sunt, inflammationes existunt. Polypodes autē, aut inflammatione, aut tuberculo, aut alia quapiam suppurulatione in nariibus consistente, gignuntur. Encanthus uero, in magnis oculorū angulis sit, tumor non toto genere praeter naturam, sed sola magnitudine. Vngues autem adnascentes quaedam sunt membra nec exterius adnatae oculis, quae ab ossibus circumbiente delata, usq̄ ad iridis coronā extendit. At quae uocant staphylocoma, haec quidē solo situ, licet uero dispositione ipsa, praeter naturā existūt.

GALENI PERGAMENI

de tremore, palpitatione, convulsione,
& rigore, liber vnus.



Eniles motus in sanis animalium corporibus, duplices genere existūt. Alij siquidem sunt secundū voluntatis imperiū: quos sanē a neruis & musculis editos, liberæ uoluntatis actiones mos est medicis appellare. Alij autem a corde & a tergo profecti, functiones appellantur uiales. Est & tertia in uicinis infensibus morus species, de qua impresentiarū differere nō uidetur expediens. Ceterū morus a neruis & musculis editus, quo manus atq̄ crura mouemus, in tremore & convulsione, morbofoiq̄ rigore, ac nonnunq̄ palpitatione, apparet. Et enim istiusmodi affectus, incompoliti exorbitantesq̄ sunt motus instrumentorū, quae dum integrē ualent, motus uoluntarios perficiunt. Tremor igitur, imbecillitate facultatis quae uelut atq̄ mouet corpus, efficitur. Etenim animalum partes graues cū sint, deorsumq̄ ferri naturae, ex se usquequaq̄ moueri nequeunt: sed facultas a principio musculis per neruos delata, quasi uehiculum quoddam atq̄ ala, motus ipsarum est. Quis si exactē defecerit, partes ut relaxatae resolutaq̄, deorsum uergunt, atq̄ in ista uis expilatāe concidunt. Vnde membra hoc pacto affecta, omni motu priuantur. Verū si facultas ad musculos per neruos fluat, exigua tamē & debilis, ut quantū oportet, membra corporis uehere, librareq̄, aut ueluti pondus aliquod ferre, non possit. membrum sic dispositū, cum tremore delinere necessariū conspicimus. Si quidem morus coactū uolentij, qui uires debilibus superat, sunt laudabilius tremulus: ubi consistit in oneri graui gestantibus. Pari quoq̄ modo si quis timore correptus fuerit, manibusq̄ siue quid agere, siue librare uoluerit, tremulus quod agendo, tremula quoq̄ crura incedendo ei ob timorem sunt. Timor quippe facultatis robur, nihil minus q̄ onus, imminuit. Consimili modo senes imbecillitatis causa tremuli euadunt: & quibus ob aegritudinē laborauit ipsius corporis robur, his laud sine tremore perficitur motus. Tremor itaq̄ est cōpositus motus, siq̄ ubi corpus propria grauitate deorsum uergit, sed rursus a facultate eleuatū sursum, particulis nimirū ipsis uiciū loca mutantibus. Differunt autem inuicem palpitatio & tremor, cū nimirum non eodem loco quo tremulus, palpitatio correpti afficiantur, nec eadē causa, nec praeterea idem sit utriusq̄ symptoma. Nullus enim tremor uisq̄, nisi membrū aliquod mouere praeelegerit. At membra palpitantia, et si reposita iaceant, nullō exagitantur motu, palpitant: id quod mirum esse non debet. Alia siquidem multa, licet immobilia uideantur esse, uirpote in eodem permanentia loco, mouentur nimirum. Vnde quippe in sublimi regione aeris suspensa, dum sese, quo minus ruat, iustinet, aliquo un motu uidet. Is igitur motus quae immobilitas fortasse tibi apparuerit ex duobus certis motibus, qui in contraria loca deducere corpus uehant, est mistus. Quorū sanē si alterū,

Motus sensibilibus duplex vnus uoluntarius, qui ad neruos et uires sensus. alius uitalis, qui ad cor et arterias pertinet.

Tremor quomodo fiat.

Motus uolentis, qui uires impetere possit, siue tremulus.

Tremulus autem aduocatur tremulus.

Tremor facultatis in robore uincit.

Sensu est tremulus.

Tremor est motus compositus.

Palpitatio est tremore quo diffinit.

Maneri multa quae profusa immota uidentur, ut autem quae in sublimi aeris regione suspensa.

nenipe motum sursum, sustuleris, reliquo deorsum deduci corpus minimo negotio uidebis. Ob id etiam stare quim incedere, si qui uiribus sunt imbecilliores, haud minus est laboriosum: cum statio sit quous motus. Sublata namque anima, quæ & mouet, & corpus erigit: corpus prius rectum, mox stratum facile uideremus. Quare non immerito monuit Hippocrates: Si æger se ipsum continere non possit, & ex lectica in pedes corruat, grauius est. Nam iacentem ad pedes delabi, facultatis extremæ laborantis firmissimum est indicium. Etenim stare, aut sedere, aut surgere non posse, graue certe est, sed eo sanè minus graue. At more uiuentis decumbere non posse, sed ceu demortuū inanimatumque corpus deorsum irrepere, extremū est malum. Quod autem ubi quis manum extensam aliquandiu in illa figura conseruat, aliquo motu moueatur, argumento sunt utraque genera muscularū simul & ex æquo tunc operantia. Liqueat itaque, ei qui nullo se mouere motu conatur, tremorem minime accidere posse. Palpitatio autem, partibus etiam motu carentibus euenit. Etenim supercilium, palpebrarū & oculis, sæpenumero, nulla concurrente uoluntate, attolluntur. Præterea in partibus palpitante affectus, eleuationes depressionesque apparentes, corporum quasi repletorum, moxque euacuatorū, extensiones & contractiones existunt: in tremoribus autem nec distenditur quicquid, nec etiam contrahitur. Extremum non omnia palpitant. Nertum siquidem, aut os, aut cartilaginem, palpitare non uideas, cum cauitate careant, quæ nunc distenta, nunc contracta, attolli cum distendantur, cadere cum contrahuntur, suis partibus possint. Est itaque palpitatio, dilatatio quædam atque contractio, præter naturæ ordinem. Tremor uero, partium quæ uicissim sursum deorsumque feruntur, motus inuoluntarius. Vnde perspicuum est, membra quidem tremula priore mutare locū: palpitantes autem partem, perpetuo eundem tueri. At uero spiritū crassum & uaporoſum in aliqua cauitate collectum, exitui prohibuit, palpitatiōis esse causam pronuncio. Nam quod palpitatio à spiritu oriatur, ceteritas ortus & solutioſus illius in dicat. Etenim corpus nostrū constituunt (ut nos Hippocrates docuit) continentia, & contra, & quæ feruntur impetu. Continentia siquidem appellauit solida: continent enim, ac liquida claudunt. Contra autem, liquida: nam liquida solidis continentur. Quæ uero impetu semper feruntur, spiritus: namque hi per uniuersas corporis partes facile permeant. Erant igitur spiritus quidē, sed crassus & uaporoſus, palpitatiōis causa. Nā si ille clarus, tenuis, purusque fuerit, citra ullū impedimentū transfluat: ac proinde partes nec replebit, nec euacuabit. Porro ut solis arteriæ inesse palpitatiōem minime uerum est: quod pro fitebatur Praxagoras: sic reperiri posse arteriam non dubito, quæ & palpitatiōis & cōuulsiōis aliquid sæpe ostendat. Iam uero palpitatiōe facile corripuitur frigidiores ætate. Ad hæc, natura corporis frigidior, regio frigida, hyems, mollis uiuendi ratio, crapula, & inuius immoderatus, cibi stultitudo & frigidi, omnia breuitur quæ

corpus absolute refrigerat, palpitatiōi sunt generandæ idonea. Sicuti illorum contraria, eandem submouere possunt. Calfactiō quippe attenuat spiritum, corporaque molliā simul & rara efficiunt, ut ille expirare possit. Verum refrigerantia condensant, congregant, ac corporis meatus ætiores reddunt: insuper crassum, deuſumque, ac turbidum efficiunt spiritum, qui sua crassitie, corporumque ipsum consentitū densitudine, retinetur, ut minime exhalare possit. Merito igitur ueteres, quæ contra palpitatiōem sunt uſi medicamentis, quæ attenuare & exalfacere possunt: cuiusmodi sunt quæ ex pyrethro, adarce & pipere cōstant. Aqueas quoque calidas ex terra prodentes, & præcipue nitrosas, sulphureas, bituminosasque commendant. Et aqua marina actu calida, muriatæ, marinæ uice uruntur, si mare abſit. Porro calore uero, non solum bibiti, sed etiam admortum extrinsecus, ad id optimū est medicamentum. Ceterū palpitatiōis generatio ex frigido duntaxat prouenit: tremor uero ob multas & alias causas fieri cōtingit. Nam dispositiō hæc, facultatis quæ corpus mouet est imbecillitas: sed causa quæ hanc ipsam imbecillitatē inducere potest, specie uariat. Aut enim alimenti defectu, aut exoluto uitali robore, aut uiolenta uehementique refrigeratiōe uirtutem occupante, aut repleto ne ipsam instar ponderis aggrauante, admodum imbecillis ad motū facultas rediatur. Vnde non sicuti palpitantibus, ita & trementibus una duntaxat medicamentorū species congruit, sed uariat. Ac pro differentia ipsius causæ, oportet per contraria semper medendi rationē uariare. Etenim mulierē quæ post partum nec secundas expellere, nec sanguinē expurgare poterat, indeque tremore correpta est, secta in malloleo uena, curauit Hippocrates. Quod autē sanguine exuberante, uenam incidere oportet, omnibus uerū esse arbitror, cum sanguis conneatur in uenis. Quod uero laborante matrice, in malloleo aut poplite incidere expedit, id docet cōmercium uenarū. Siquidem per uenas cōmunicantes semper uacuare est opus. Nam si uenas, quæ partibus affectæ non consentiunt, pertundas, minime affectum locum curabis, sed potius sanū offendes. In animalibus itaque motus uoluntarij opifex fabricatrix, facultas est, quæ uniuersas animalium partes gubernat. Huius autem instrumenta, nerui & musculi existunt. Igitur motu priuari, aut non pro dignitate moueri contingit membra, uel ob instrumentorū, uel ob facultatis affectus. Palpitatiōes itaque & cōuulsiōes, & membrorum resolutiones, instrumentorū uitiæ: tremores uero, uirtutis imbecillæ affectus existunt. A rigore autem distinguitur tremor, quod tremor quidem non sine consilio mouendi partem, contingat: quassatio uero, quæ uehementer rigentibus infidet, adeo uiolenter ualideque concutiat corpora, ut quietem agere minime queant, uel si quis uiriter illis resistat. Insuper tremor, uini duntaxat particule, rigor uero uirij corporis est affectus. Ad hæc, tremere quidem nonnullos, absque ulla refrigeratiōe sensibili, comperit est. At rigere, absque hoc ut uideatur corpus refrigeratum, est impossibile. Non tamē

Calfactiōem uero.
Refrigeratiōem faciliā.

Palpitatiōem quæ solam medicamentis.

Palpitatiōis ex frigido uero uero prouenit.
Tremor causa diuersa.

Tremor non solum ob partem uenæ, sed etiam per totam remota, si sit in malloleo uena curauit Hippoc.

Matrice laborante, uena facile sit in malloleo, aut poplite.

Palpitatiōis et cōuulsiōis uitiū.

Tremor, autem imbecillæ et afflicti.

Tremor uero sine consilio mouendi partem. Rigor si mouet.

Rigor autem tremor quæ differt.

Statio est motus

Iacentem in pedes delabi, facultatis extremæ laborantis firmissimum est indicium.

Extensam manum habentem, mouetur.

Palpitatio quibus partibus accidit, quibus minime.

Palpitatio est dilatatio et contractio præter naturæ ordinem. Tremor est motus inuoluntarius.

Palpitatiōis causa.

Continentia corpus nostrum sunt, continentia, contra, & quæ feruntur impetu.

Palpitatio quibus se facilius.

refrigeratū esse, & uideri, idem esse fatearis. Motus præterea in rigentibus, inuoluntarius omni no est. in tremenibus autem, non absq; imperio uoluntatis consistit. Porro ut motus aliquis dici rigor mereatur, opus est ut cum refrigeratione sensibili, inæqualis inuoluntariusq; totius corporis motus accedat. Quæ sanè quasiatio, si in nonnullis accessibus solæ superficiem concutit, nec uniuersum corpus commoueat, is affectus horror uocal. Horror itaq; talis duntaxat cutis, qualis uniuersi corporis rigor, affectus est. Cæterū impræsentiarū nō de rigore aut horrore qui sana corpora infestit, sed de illo qui ægris solet superuenire, disputare consilium est. Igitur morbosus rigor secūdm Hippocratis dogma, refrigeratio quædam est dolorifica, cum inæqua li totius corporis cōsultione. At uerō rigore affici, innati calidi affectū esse omnibus ferē in cōfesso est. Verumenimvero calidum hoc innatū, minimè gigni motu aut frictione arbitramur, sed corpus omni ex parte conspirabile, cōsulid leq; esse contendamus: calidum aut ipsū non a duentibus, nec animalis generatione posterius, sed primariū, primordiale, instrumū putamus. Natura itaq; animiq;, nihil aliud quā calidum est. Quocirca si hoc sponte semperq; mobile esse cognoueris, errare minime poteris. Quia igitur ratio ne is calor semper exitus mobilis, ea nimirum nec iorus solū, nec foras mouetur, sed alter ipsius motus succedit alteri: citō enim immobile ipsū redderet intus statio. foris autē, quies eum dissiparet. Nam calidū moderate extinctū, rursusq; moderate accensum (ut ait Heraclitus) semper mobile remanet. Accenditur igitur, ubi appetens nutrimentū uersus centrū inclinatur. Ex tinguitur autem, ubi foras & undequaq; disper gitur. Ac mouetur quidem ipsū innatū calidū a suo principio foras, caliditatis ratione: intrō uerō, atq; ad propriū principium illabitur, quia etiam frigiditatis est p̄ceptus. Hoc siquidem ca lidum, & mistum est, & ex calore frigoreq; ortū habet. At prima quidem calidi ratio spontaneē funpius in obilitatem includit, hacq; ad operandū maxime eget. Nihilominus tamen magnū quoq; a frigore adiumentum accipit. Nam cū innatum calidum & eleuare in altum, & secum alimentum rapere natum sit, certē si frigus latioem calidi non cōticeret, penitus euanesceret, atq; dissiparetur. Porro animal tunc sanum exi stimatur, ubi temperamentū, naturæ ipsius limi tes non excedit: hoc est, cū calor frigusq; tem peratura mediocri mutuo inter se miscentur. Si uerō altera qualitas immo dicat alteram superet, tunc animal laborare morbo, qui conueniens sit naturæ causæ superantis, necesse est. Etenim* in inflammationes, erysipelata, ulceraq; serpētia, nec nō carbonēs, omoesq; tum impense calidi, tum febriles affectus, dum uis calidi dominatur, utique sūt. At cōsultiones & tetani, palpitationes, stupores, & resolutiones, morbi comitales, atq; i 60 affectus qui homines attonitos reddunt, facultate frigidis dominantes oriuntur: inter quas affe ctiones rigor in uenarū, qui refrigeratio simplici ter non est, sed tantū secundum sensum. Fuit itaq; rigor innati calidi, uehementis, cōsentimū

affigens, ac uiolenta secundum sensum refrige ratio. Iam uerō quemadmodū quod in naturā haud latentiter reuertitur, est incundum: ita quod a natura pari modo recedit, dolorificum fuerit. Quare unum idemq; frigus, alius quidem dele ctasse, alius uerō tristitia affecisse credimus. Nam si frigus corpori extra modum calfacto, admo nim fuerit, id prorsus delectat. At si corpus suū naturā retinens, cōsentimū abunde refrigeret, 10 dolebit utiq; & tristitia afficietur. Igitur nec dum alimentū defectū moatū calidum obscurat, nec dum pabuli copia obruitur, nec dum ob imbeci litatem collabitur, rigorem fieri contingit: sed quones ipsū ualidum existens, incenditur, ac dein cōticeretur, reprimuntur: quod solet flamma ubi cōsentimū aqua illi instillatur. Calor itaq; per rigores, nec substantia nec robore latus, ad uni uersas corporis partes extendi fertur: propterea impeditus autē, uersus principium propriè con surgit, inibi permanere non ualens (substantiæ enim semper mobili quies mors est) seipsumq; congregans, ac uelut in spirā contrahens, & qua liter quidem, nō amplius tamen circa uiolentiā, extenditur. Vbi uerō ex aliens instantibus relati uantibusq; rebus occurrit, ac nunc pellit illas, nunc pellitur, idq; impulsibus & cōflictibus ua rijs, tunc sanè corpus mira quasiati one ob dupli cem illum atq; inæqualem motū, haud citra do lorem concutit, quandiu molestantia adfuerint.

30 Concussio igitur, quasiatioq;, necnon omnium membrorū tremitus, omnisq; irregularis, inordi natus, inuoluntariusq; motus, ob calorē inna ti, factū iam uaporosi, inæquales, ualidos, uiolentosq; occurfus atq; resulationes, rigoris tem pore perficiunt. Quobrem corpus in rigorib; rursus inalefcit ex actūs, q̄ cum naturaliter se ipsum habebat. Sudores quoq; effundunt ē corpore. Etenim ubi post multos cōflictus mole stantia fuerint explosa, ex actūs iam perspirauit corpus, tribus de causis illi caliditē est necesse: nempe quod calidū undaq; spiratioe priuātū, in profundo collectū fuerit: quodq; postea uelie menter ad exteriora se extendendū: ac tertio deni que, quod per occurfus illos, cōflictus, atq; uiolentos motus, natura calor reaccendit. Itaq; sēpe in huiusmodi reditu de profundo calidū quasi ebulliens, cōsentimū humidū quoddam effundit, quod sudor ē uocamus. Ob idq; in rigore refrige rari, nec rursus calferi, prauū est, calidūq; fuc cubuisse portendit. Est autē rigor indicii maxi mū exquisitæ tertianæ, quæ ab ingenti oritur ardore: etenimq; ab ardente continua deficit, quatenus in ea incendiū ipsū facit intermissio nem. Nam & sitis in expugnabilis, & refrigerationis cupiditas, & bilis syncere uomitus, uo minūq; peractō quies (quæ omnia signa sunt ca loris exuberantis) comitant exquiritā tertianā. Febribus etiā ex ingenti ardore cōtinuis, solet ri gor superuenire, easq; soluere. Præterea acce talisq; medicamentū ulcers admodū, primō do lorem, mox horrorem, ac demum rigorem indu cit. Inflammationi etiam in abscessū tertianā, 40 ritur quod, rigorem horroremq; necessariū accidere no oimus. Ad licet, res auditu uisūq; formidabilis, inter dum horrorem, rigoremq; inducit. Ex qui

Incundum quid
Dolorificū quid.

Rigor quando
obicitur.

Mobili substantiæ
quies mors
est.

Inalefcit cor
pus a rigore vo
luntarius quā
antea, tremore de
cansu.

Rigenti non re
calferi, prauum
indicium est.

Tertiana quo
modo ab ardore
continua defi
cit.

Rigor solet fe
bri ardenti sol
uere.

Arta uictri ad
motū, rigori in
ferunt.

Rigor accidit in
flammati in
abscessū con
uulsa.

Formidabilis
inducens horro
rem, rigoremq;.

Rigor causa.

bus utiq; liquet, non frigori duntaxat rigore tribuendum esse, cum ab alijs causis, & præcipue ab acris & calido humore delato per sensibilia corpora, interdum proficiatur. Cæteris neq; frigidum humore, neq; acrem, ad rigoris generationem simpliciter excellere, sed proprium modum ipsorum utriq; necessariò inesse oportet. Modus autem fuerit aut copie mensura, aut humoris qualitas, aut aliquis corporis locus, in quo illum aggregari conveniat. In quere quoq; moriq;, atque ipsius morionis modo, haud parua differentia oboritur. Vbi igitur flaua bilis non per uasa, sed per carnes mouetur, manifestè gignit rigor. Hoc namq; solo febres ex ingenti ardore à tertianis differit, quod illæ quidem in uasis bilem continent: hæ autem, extra uasa diffusam per sensibilia corpora. Per quæ quidem dum bilis fertur, accedine sua tristitia inferens, dolore excitat. In hoc autè duo quædam eueniunt, nempe ut sanguis contrahatur in profunditatem corporis, ob idq; exteriores partes refrigerentur: & ut ille eadem corporis partes quæ à bile punguntur, impellant ipsam facultate expultrice, donec ab omnibus profligata partibus, per sudorem aut uomitum, aut deiectione exterminetur. Hoc etiam ipsi qui non concocerunt, aut malis succis repleti sunt, aut in sole æstiuo, uel balneo diu sunt immorati, aut seipso exercuerunt, coningit. Horum aliqui horrore confestim, ac dein rigore correpti sunt. Verum non solum mori dæx causa, sed uelementer mota, si rigor fieri debeat, desideratur. Atq; hoc sanè tam frigide quam calidæ causæ est commune, quod utraq; corpus cum dolore commoueat. Idcirco per quartanas atq; tertianas febres, quæ à contrarijs oriuntur humoribus, rigor tamen inuadit. Etenim ut atra bilis est frigida, sic flaua calida existit. Cæterum nò solum ex atra aut flaua bile, sed ex piruita ultra modum frigida (quam uitream appellauit Praxagoras) rigor fieri consuevit: idq; in mulieribus quoque, & quæ in ocio uitam traducit: qui rigor tamen uelemens non est, & qui quiescentibus, nullò modo motis corporibus, ipse etià conuenit. His autem qui simili affectu correpti sunt, in principio quidem medicamentum diutius peperon propino: subinde uerò nostrum ex calamintina: deinde ex succo Cyrenaiico, castoreoq; compositum, quod quartanæ exacerbationibus maxime confert, præterit quando ingens rigoris impetu ægri afficiuntur. Porro qui quartanis correpti sunt febribus, usq; ad ossa sibi penetrare rigore affirmant: & talem, qualis per immensa frigora, dum iter facerent, eis accidebat. In rigore autem qui tertianas, paritq; modo ab ingenti ardore ortas comitatur, quasi ab acutis tenuibusq; acubus se perungi tæntur. Nunc uerò de consuetudine nihil dicamus. Voluntarij omnes motus, per musculos absoluntur. Vbi igitur musculi in propria retrahuntur capita, ad eas singule partes, quibus natura infixi sunt, retrahuntur, cõuellanturq;. Verù si passio aliqua suboritur, quæ in tensione ipsos ad ducat, hanc sequitur motus similis quidem naturali, inuoluntarius tamen: atq; hæc passio cõuulsio appellat. Nam tendi cõtrahiq; musculi in proprium princi-

pium, secumq; illam corporis partem, cui est insertus, reuellerè, bene ualentibus consuetudinis commune profectò est. At si mutò id agatur, præter naturæ ordinem dispositis, minimeq; sanis cõtingit. Tenduntur autem nerui, perinde ac cithararum chordæ, interdum quidem plurimò uimoribus imbuti, interdum à causis extrinsecis arefacti. Euenire etiam potest, aliquam corporis partem aut ob inflammationem, aut aliqua alia de causa, uelementer affectam, neruos sibi uicinos unà secum reuellerè. Porro in febribus ab ingenti ardore contractis, consulsionones accidunt, ob solam siccitatè insignè uniuersū neruosi generis: in phrenum de autem, ob principij neruorum inflammationem. Cæterum cum corporis partes antè tenduntur, symptoma dicitur emprothotonos: cum uerò posterius, opisthotonos: ac cum in utriq; latus ex æquo inclinant, retanus. Igitur consulsionones à siccitate ortas, minime curandas susceperis. Nam qui his sunt affecti, cinisimile intereunt. Quæ uerò uel ab humorum copia, uel ab inflammatione trahunt ortum, his, si plenitudinem uacues, aut inflammationi cõmodis remedijs succurras, mederi poteris.

GALENI PERGAMENTI de morborum temporibus lib.



Vod in animalibus etiam, idem tempus in morbis significat. Etenim quemadmodum ipsi nos geniti ad uigorem usq; augecimus: inde iam conrabescere incipientes, ad extremam usq; corruptionem declinamus, si omnes ætates pertransierint simas: ita singuli morbi à prima ipsorum constitutione ad statum usq; incrementi, donec pro augmenti prioris portione decrescerent, in totū dissoluant. Hoc tamen discrimen interest, quod animalibus quidem, cum sint corpora, proprij generationis tempus præscribitur est, quo omnes ad uitam necessariæ partes figurantur, formanturq;: morborum autem, cum sint accidentia corporū, nullū huiuscemodi tempus est præfixit, sed à prima statim generatione augescunt. Figuratione itaq; generationemq; proprietates corporū postulat: accidentia autem ipsorum, cum nullam figurationē desiderent, statim ubi geniti sunt, ad incrementū festinant. Siquidem phlegmone (exempli gratia) cum primū inciperet esse, huiuscemodi speciem habere uidet, qualem habebit ubi erit maxima: sola autem magnitudine differt. Porro pars phlegmone obflecta, calidior si ipsa euadit, cū tremore maiori, item dolore & rensum. Sed hæc parua primo aditu sunt: inde autem ad magnitudinem quandam nò omnibus & qualem incrementum. Postea uerò aut discuntur remedijs tumor ipse præter naturā, similis illius dolor atq; calor resoluitur, aut certè in pus conuertitur. Tempus itaq; nullū inflammationis generationi singulariter proprium tribuitur, ab eo, quod augmenti est, diuersum. Febris etiam (qui calor præter naturam est) propriū distinctumq; generationis tempus nò habet. Sed ubi corpus primū calidius quam antea febrili calore fieri coepit, inde aliud atq; aliud tēpus affectionis incrementū excipit, usq; ad per-

Troia uerumq;
interdum ab ho
mostrantibus, u
teris à siccitati
bus causis or
tor.

Emprothotonos
Opisthotonos.

Tetanus.
Consulsio à siccitate non re
spici curantiam.

Tempus morbo
rum cõparat
atq; animalib.

Tempus morbo
rum ab ætate aut
malis, quomodo
de differant.

Morborum gene
rationis non esse
certū quiddam
tempus præscri
bitum.

Phlegmonem ani
dixit.

Febris quid.

Rigor febri flaua
bile fertur
per membra seu
fibulas.
Ardens febris
quomodo à ter
tiana differant.

Rigor extrema
per accessiones
uide accidit.

Rigor fit à cau
sa non quiescent
tef soli mota.

Piruita vitrea
inducit interdum
rigorem.

Rigorem ex
frigida lunari,
curatis.

Quartanis ex
combustionem
medicamentis ex
siccitate Cyrenaiico
Cretastoreo aut
lunari.

Tertiana rigor
qualis.

Motus uolunta
rii à passione si
mit.

Consulsio quid.

*Vigor in singulis
rebus, est magni-
tudo summa.*

Initium morbi.

*Incrementum.
Status.
Declinatio.*

*Circum quatuor
dies.
Circum tertiam
m.
Circum quatuor-
decim.*

*Tertiana febris
descriptio.*

ad perfectum vigorem, quem in singulis rebus summam esse magnitudinem intelligimus. At vero principium specie quadam ab incremento post ipsum, diuersum esse demonstrare conabimur. Etenim initium unicuiusque morbi esse censuerit ueteres, non primum illum simplicemque infulem dixit, sed temporis longitudinem latitudinemque notari dignam ipsi tribuerunt. Post principium ipsum, collocarunt ascensum: dein, statum: ab hoc, declinationem. Ex quibus sane temporibus circuitus morborum constant. Ipsorum autem circuitum nonnulli stantibus horis uiginti-quatuor, quoniam dantur uocantur: alij quadraginta octo, hoc est, duabus diebus & noctibus, uocantur; tertiani. Alios (quos appellant quaternarios) septuaginta duorum horarum tempus describit. At hi circuitus omnes, aliquando ad integritatem perueniunt, ut in quotidiana, tertiana, & quartana febris: interdum ad declinationem solum, uel propius ad integratam, uel longius ab illa, accedunt. Igitur in auspiciis tertianae febris (quam exempli gratia propono) horror medio cras oritur. Dein cum maiori horrore extrema omnia refrigerant. Postea uero & frigore & frigore concutuntur plurimae corporis partes. Quo tempore pulsus durior, minorque prius, redditur, necnon in contractione uelocior. Præterea quæ post contractionem ferè maior contingit: post dilationem, eodem cum illa modo: sæpe priori æqualis, etiam aliquando maior. Atque hæc sanè in quibusdam tertianis, circulo duarum horarum æquinoctiali solè sæpe contingit: in alijs autem longiori uel breuiori intervallo. Inde pulsus maior simul & celerior, densiorque fieri incipiens, sensum singula commemoratis incrementis. Statimque uel calidiores quam antea redduntur. In summa, in æqualitate quæpiam non me diocria in corpore per hoc tempus exuperat. Atque hoc sanè est secundum tempus à primo illo, in quo ex priori statu fuit uniuersum corpus refrigeratum, pulsusque in contrariam constitutionem mutatus. Vbi uero febris ad integritatem desinit, tunc habet ad naturalem statum reuertitur, si qua fides habenda est sensibus. Primum itaque tempus totius periodi est, quo corpus cum prædictis mutationibus pulsus inaleant. Aliud ab hoc secundum est, quod pulsus & calore in contraria mutatur, donec tota corporis moles æqualiter conalescat. Post hoc tertium, quo calor enannum augebit, pulsibus magnitudine, celeritate & frequentia ei respondentibus. Quarta constitutio post tres commemoratas conspicitur, omnibus iam dictis æqualem sibi magnitudinem pro sensus nostri iudicio seruans. Ad hæc quinta alia, cum iam calor manifestè decreuit: halitus autem per cutem excreuit, pulsusque ad naturalem habitum redit, reiciens omnia, quæ præter naturam in magnitudine, celeritate, frequentia, duritieque cõquisierat. Hoc tempore plurimæ ipsorum fuscior oritur. Post hoc autem, intermissionis, siue interualli tempus succedit. Igitur primum tempus integritatem coherens, quod frigor sensum præbet, principium uocetur. Secundum uero, quod rigor paulatim deponit, tempus inæqualitatis dicitur. Ab hoc tertium, æqualis in-

crementum. At quartum post hoc, consistit. Quintum imminutionis. Sextum denique integritatis. Quod igitur sex hæc temporum differentie: in tertianarum aliarumque intermissionum febrium circuitibus reperiantur, id sensu uel multitudine imperita iudicat. Nulli tamen obstat & alium quodammodo febris circuitum in duas, fed maiores partes diuideri: unam, primæ accessionis à primo insultu ad extremam usque remissionem: alteram, quæ in declarationis & infusus secundæ accessionis medio consistit. Quod igitur ab Hippocrate dictum est, in accessionibus abstinendum esse, pro accessione intelligendum existimo tempus à primo insultu, usque ad ipsam declarationem. Porro clarioris doctrinæ gratia, omne id quod accessionem sequitur, remissionem uocabimus: quæ in intermissionibus febribus, remissio ipsa ablatio etiam dici meretur. Diuisimus itaque febres de finientem ad integratam, quotidianam, tertianam, quartanam quæ singule sex distinctæ fortissimi tempora. At uero quæ non intermissionem integram, in quinque tantum soluantur, ab eis nimirum sola integritate remota. Quarum sanè nonnullæ quoti die accessionem habent: quædam tertio quoque die. Quæ uero quarto habent, non frequentem, sed raro emenire uidetur, utpote quæ magno ex parte ad integritatem desinant. Ad hæc, febrium quotidianarum, tertianarum, & quartanarum, quæ ad integritatem non desinant, duplex species est. Quædam namque magnitudinem, celeritatem, frequentiam, atque duritiem pulsus deponunt: quædam autem reliqua tria ad naturalem statum deducunt: at cõseruant celeritatem, hæc magis, illæ minus. Verum in quibus febribus citra sensibilem systolen, accessionis insultus accidit, tria tempora in unum recidere est necessarium, totumque id usque ad statum fieri incrementum. Nam ubi non adfuit conspicua systole, ibi nec inæqualitas adesse potuit. Statum uero nunquam desuisse memini: sed semper sensibilibus æqualitate in omnibus febribus aliquandiu permanisse. Insultu etiam milies sine dictis conspexi symptomatis. Quibus febribus nullus circuitus adeit, ut ipsæ quas synochas uocant: nec accessio quædam omnino est, nec prædictæ partes. Attamen hæc quoque secundum diuersa tempora totius morbi particularibus obnunt, alijs modis innouescentes, & per accessionum tempora. Sed nunc tantum de febrium circuitibus, ipsi non complicatis, sed simplicibus, nobis habetur sermo. Aduerte autem, aliud esse misceri, aliud inter se complicari. Semitertiana quippe, ex miscella & temperamento quotidianæ & tertianæ febris oritur. Potest tamen ipsi semitertianæ copulari alia simplex febris, uel tertiana, uel quotidiana. At huiusmodi uarietatis minime ad hunc librum pertinet. Ceterum cogniti singularem febrium temporibus, faciliè complicata tempora cognoscemus. Igitur de simplicibus dictum abunde cum sit, de cõmissis deinceps differam: in quibus interdum horribilis insultus quidam contingit, omnes principii peculiare notas habens, præter rigorem: quæ interdum & huiusmodi imaginem representans. Siquidem uelentis horror, uel aliquod rigoris initium, uel paruus rigor uideri potest. At exacti rigor, qualis in ter-

*Tertiana non in
intermissionis re-
peritur tempora
quæpiam.*

*Castitatem
febrium, si remittit
locumque speciem.
Quartana uero
intermissionis, sa-
to inueniuntur.*

*Synochæ febris,
nullum circuitum
adest, nec prædic-
ta nec, accessio-
nem.*

*Mixtionem fe-
brium differre ad
complicatis ex
rationem.
Semitertiana
ex quibus consistit.*

*Tertiana accessio
fuit ipsa a febre
describitur, quia
hæc reperitur
et in alijs in-
termittentibus
et in alijs.*

Rigor vehemens
non adest nisi ad
laesum febribus.

Semiteretiana fe-
bris accessio nam
quæ integræ de-
finit.

Semiteretiana fe-
bris unale fe-
bris maxime Ro-
ma.

Tertius morbi et
pota quatuor.

Principium mor-
bi ad præsidia fe-
renda, videri præ-
bet indicat videri.

Principium mor-
bi totum est ante
cruditatem.
Inflammationis
quatuor tempo-
ra describuntur.

rianis quartana est, febris miscellanea, cuius-
modi semiteretiana exiit, non recipit. Vbi igitur
signa quædam secundum temporis, febris hæc præ-
monstrant, initium rursus alterius mutationis hor-
rificum efficit, quod nonnulli repetitione appel-
lant. Aliquando hoc secundo molitur: quibusdam
tertio facit. Deinde viæ quælibet simplex
redditur, adfectus statim incrementis. Hæc febris ad
integritatem nunquam definit. Nam permultum tempo-
ris usque ad vigorem habet, declinationem sine
perspiratu sensibili: tantum abest, ut integræ cum
sudore solvatur. Quemadmodum igitur à primo
insultu accessio ad vigorem usque, multo tempo-
re peruenit, sic à vigore paulatim minuit: ideoque
postmodum altera accessio aduenit, horriffica que-
dam illa, sed quæ non item cum priori repetitio-
nes habeat. Porro hæc accessio ad vigorem etiam
longo tempore ascendit, nec exiguo inclinat: at-
que ob hoc ipsum tertio die, eadem quæ primo
accessio inuadit: postea rursus quarto, similis ei
quæ secundo habita est, idque perpetuo ordine.
Hanc igitur febrem, quæ maxime inualefcit Ro-
mæ, uoco semiteretianam. Sunt et alie differen-
tiæ particulares febrium, multique alij circum-
stantium modi, differentiæ particularibus uariantes, quos
ex industria omitto, cum nihil cõferentes ad præ-
sentem cõmentationem. Atque hæc tenus de parti-
cularibus morborum temporibus.

GALENI PERGAMENTI

de totius morbi temporibus li-
ber vñus.



Otius etiam morbi tempora, simili-
ter ac animalium ætates, conside-
ramus. Quorum unum quidem &
primum, generationi ipsorum tri-
buitur, incrementum secundum,
tertium uigori, quartum denique declinationi, si ægri
salui futuri sint. Nam si uel in ascensu, uel statu
decesserint, liquet talem morbum non omnia
tempora pertransisse. Ridiculum autem fuerit,
primum tempus primæ accessionis, totius mor-
bi principium exilimare: cum nimirum princi-
pium morbi ad præsidia ferenda, utiles præbeat
indicationes. Ad id principium respiciens Hip-
pocrates, ait: Incipientibus morbis, si quid mo-
uendum uidetur, moue: cõsistentibus uerò, præ-
stat conquiescere. Præterea nõ minus absurdum
fuerit, morbis qui intra diem soluantur septi-
mum, & ipsi qui prorogantur in annum, æquale
principium tribuere. Ostendimus autem primo
libro de Crisibus, totius morbi principii, ipsius
cruditatem exilire. Porro inflammationis princi-
pium, totum illud tempus existit, quo sangui-
nea substantia pars aëscia repletur. Cum autem
influxus cessauerit, & quod in particula continet-
ur, putrefieri inceperit, calor quidam ob putre-
dinem nascitur, & fusio magis propter calorem:
unde etiam spiritus generatur, atque ob hæc am-
batio, particula magis quam antea distenditur, et-
iam si nihil infuset. Hoc igitur secundum tem-
pus, est inflammationis augmentum. At cum lu-
mor in pus iam uertitur, maxime tunc dolores
partem ipsam corripunt. Nam in puris genera-

natione dolores, febribus magis quam prius, infes-
tant. Vocatur autem hoc tempus ægritudinis
uigor. Quod si humor in pus mutetur, uel diger-
ratur, maiorem tumorem atque tensionem effi-
ciat: huiusmodi est declinationis principium.
Sic itaque in inflammatione tempora diuiduntur:
nec fecit in febre, quæ ab illa trahit oriundæ. At
quæ ab humore citra inflammationem oritur, mole-
stiam humoris cruditatem pro initio habet.
Hi ubi concoqui incipiunt, initium finitur, atque
ascensus sine incrementum aduenit. Vbi uerò
maximè cõcoctio perficitur, uigor adest. Quam
declinatio est uicibus sequitur, dum symptoma-
tum magnitudo, & humorum copia est repres-
sa: restat autem humoris modicum, adhuc cõco-
ctionem desiderans. Vicerum quoque eadem
habentur tempora. Primum namque sanies aquo-
sa, iucosior & tenuis ab ipsis defluunt. Dein pau-
ciores atque crassiores. Postea iam pus tenue. Po-
stremo minus quidem copia, sed crassius, & al-
bidum magis redditur: quemadmodum appa-
ret etiam in pleuritide & lippitudine. Quare nul-
lus morborum solutorum existit, qui non hæc
quatuor percurrat tempora. Non tamen ex quo-
dam alio quæm cruditas & cõcoctionis indi-
cij, quæ ex recementis deprehenduntur, cogni-
tio ipsorum constat. Etenim fluxionum quæ ex
cerebro per palatum & nares fiunt, non secus
quàm lippitudinis, initium quidem est, cum a-
quei, tenuis, nec nõ copiosi & acres, qui fiunt
humores apparent: nam extremam hæc crudi-
tatem significant. At cõcoctionem portendit,
crassior & minus acris, modicus humor de-
scendens. Iam uerò quædam illi in ætatibus, nõ
ipsum uigorem modum, sed omnia quatuor tem-
pora latitudinem habere compertimus: sic etiam
particularium accessionum, ac totius morbi uni-
uersa tempora, latitudinem momentaneam for-
tiantur. Vigor itaque rum accessionis, tum totius
morbi, sensibilis tempore abfoluitur. Igitur uni-
uersis morbi proprii quoddam tempus ge-
nerationis existit, interim sensus manifestum, in-
terim minimè. Post quod rursus augmenti tem-
pus aduenit, * nec id sequè manifestum in omni-
bus. * Post hæc uigoris sequitur tempus, omni-
no sensibilis. Quod si salua futura sit, declina-
tio etiam tempus sequetur, & hoc sensus subie-
ctum, cum nimirum amplam latitudinem ha-
beat. At uerò morborum qui non soluantur, di-
plex natura est. Nonnulli enim ipsorum præpa-
rationem habent, ubi exactè illam abfolutam
sint consequuti: alij ex eorum natura sunt, qui
soluantur: id quod eis in ægri perniciem accidit.
* Hoc autem contingit tripliciter. Nam aut pro-
pter ægrotantium imbecillitatem, uel propter
propriam uehemetiam, uel propter utranque,
prius perierunt, quàm soluantur. In uniuersum
autem, nemo seruari potest, nisi natura supera-
uerit morbum: nec perire, nisi illam morbus pro-
strauerit. Igitur morbi singuli ex sua quidè natu-
ra magnitudinem quandam possident, quæ uel su-
pra vires est, ut eas opprimat: uel uiribus ægri im-
becillior, ut ab eis superet, omnibus pro be eueni-
entibus. Proinde cum supra vires fuerit, homo
propterea morietur. At morbi tempora tunc partim
simili

Febrim ab hu-
morum putre-
re ortum tem-
pora describun-
tur.

Vicerum tempora.

Tempora morbo-
rum nõ abinde
cognosci, quia
ex cruditate &
cõcoctione indi-
cij.

Tipora uniuersæ
morborum la-
titudinem mo-
mentaneam for-
tiantur.

Morbi cuiusque
generationis pro-
prii quoddam
tempus.

Tempora totius
morbi quatuor.

Morborum qui
non soluantur,
natura duplex.

Seruari uero
potest, nisi natu-
ra superauerit
morbum, nec perire,
nisi illa mor-
bus prostrauerit.

simili modo cum prædictis sumunt, partim dissimili. Siquidem initium similiter in morbi genere ratione constituitur. Ascensus autem, haud in coctionis, sicut in his qui superfluit sunt futuri, sed in crudioris signis, letalibusque consistit. Ex bene colorata urina, & mediocriter crassa, omnium optima exiit, quantum ad colorem & consistentiam pertinet. Conuenient autem præterea, uel eneoema, uel nebulam, uel hypostasin salubrem adesse, utcumque morbi natura postulauerit. At cruda urina est illa, quæ nec suspensum quicquam, nec subdilatam, nec nebula habet: imo quæ nec crassitiem aliquam, nec pallorem assumpsit, sed alba est, & consistencia tenuis, æque speciem referens. Quod si aut nubecula, aut eneoema, aut hypostasis nigricare uideatur, talis urina est letalis: quemadmodum si quæ dâ similia fursuri, uel lamis, in ea uideantur. Iam uero si aut furtiva sit, aut pinguitudine oleaceam in se contineat, mox tem minatur. Hæc igitur sunt urinae, magni morbi 20 nâ. Magni etiam esse morbum cognoscet, si spiritum pleuritidis & peripneumoniam laborantibus, uel nigrum, uel * fuluolum uehementer, uel spumans, uel impensè fartidum fuerit: uel nihil omnino expuatur: idque ingenti dolore, uel spirantibus difficultate hominè affligent. Respondent his & alij morbi, qui iecur, uentriculumque exercant, eodem letalium signorum genere cõprehensi. Vnde in huiusmodi morbis uigorem similiturum eo qui salubrium est, determinare nõ licet. 30 Nam illic maxime accessiones statum definiti: hic uero nõ licet maximas accessiones similiturè determinare, cum morbus quidem ipse à principio incoctus persistat: uero intellectum maximam capere oportet. Porro in inflammatione quæ terminatur, puris generatio, uigoris terminus est: in ea uero quæ nõ finiet, homo etiam in eius ascensu mori potest. Cetero uires ualidissima usque ad extremam phlegmonis magnitudinè sufficere possunt: quæ magnitudo extrema, uel in gangrenam, uel in putredinè terminatur. Iam uero uno eodemque tempore duobus tribusue morbis homo infestari potest: quorum alius iam inclinat, alius principij tempus adhuc, uel augmenti primordia occupat: tertius plurimum auctus est. Deinde hominè mori contingit, non propter inclinantem, uel nunc incipientem, sed ob uehementer auctum. Quia de causa, tria facultatû nostrorum corpus reguntur principia, summè considerabis, quoniam statum sit prædita. Dico autem hæc, cerebrum, cor & hepatis. Deinde de aliis quoque uniuersas particulas, ex singulis principijs ortas, nempe neras, uenas, arterias: ad hæc illas, quæ naturæ quidem propria habent, sed ab omnibus principijs regunt. Nam ex hac speculatione, primum, siue unius, siue plures, in homine morbi sint, inuenies. Proximè est, cuiusque propria tempora ad prædictorum inuentionè necessaria inspicere. Etenim circa initium & fines, omnia imbecilliora sunt in uigore fortiora: quæ hæc intercedunt, medio consistunt ordine. Igitur in uigore, quod mitigandi uim possidet, in curatione præpollere debet: in principio & fine, quod uehementiam habet. At media tempora, pro summo rationem proportionem capiantur. Neque enim quam

quis uictus rationem instituat, inuenire poterit, neque unquam nutrire, sine certa temporû distinctione. Etenim si uigoris temporî, etiam sine alimentis exhibitione sufficere possit æger, optimè sanè fuerit, donec morbus inclinet, à cibo abstinere. Si uero sufficere citra cibum nõ possit, prorsus ab initio in quolibet tempore, quod alimentum admittit, alendus est. Atque hoc remissionis est tempus. Voco remissionè modò, secundam partem totius circuitus in duo uniuersa diuisi, nempe accessiorem & remissionem.

GALENI PERGAMENI de locis affectu lib. I.



Ro differentia partû humani corporis, uariari affectû curationem cõtingit. Partes igitur quæ in superficie corporis sitæ sunt, unâ cum affectibus quibus uexantur, faciliè sensibus deprehenduntur. At quæ in imo corpore delinunt, exercitate cogitationis uirum desiderant, cum in partium actione & usu, tum uel maxime in arte secandi corpora, quæ nimirum nos docet accuratissimè proprietatem essentiae uniuscuiusque partis. * Si igitur inter rursuendum, bronchium aliquod expuatur (est enim id natura cartilagineum) maximò sanè ulcere affligi possumus existimemus. Nam tamen alpera arteria similibus sit ex bronchijs cõpacta, tam grandis tamen exulceratio, sine præmatura morte in illa gigni nõ potest. Nec uero tantum ex proprietate essentiae, sed ex magnitudine etiâ excrescentie, affectus locus discernitur. Vi, si unâ cõtusi excreuerit aliqua portio uasis grandisculæ (quod aliquando contingit) tunc certè credendum est illam educi à pulmone. Quiddamquidem uenæ quæ in asperam arteriam diffeminant, minutissimæ sunt, & capillorû instar. Similiter si pædynteriam tunicae aliquam corpuscentiorem alius aliquando reddiderit, non ab re conijciæ ulcere crassiora intestina torqueri. Necnò ex rebus naturaliter in particulis quibusdam contentis, creberrimè sedes affectû cognoscitur. Vi, si urina per uulnus reddatur, uesi cam: sin uero sterus, intestinorû aliquod: at si cibus, uentriculum liquet esse conuulseratam. Similiter etiam si uulnèro thorace, spiritus per uulnus effluerit, indicat membranam cingentem costas, solutam esse. Præterea sanguis eiectus saliendo, arteriam esse uulneratam denunciat. Qui quidem arteria rum sanguis, eo qui à uenis effluit, calidior, tenuior atque flauior apparet. Ex adherentibus etiam rebus, affectû sedis notè petuntur, cum nimirum & ipse etiam essentiae proprietatem obtriant. Huius generis est ramentû quod quidem ostendit illius partis ulcus, à qua reijcitur. Nam si id cum sono excernatur, nixæ meatu: si tussien do, spiritalium instrumentorû si per uomitum, gule aut uentriculi: si cum alui excrementis, inre stinorum ulcerationè significat. Est præterea & alius dijudicandi modus impetus à rebus alicubi cõtenti præter naturâ. Vi, si in uelica aut renib, cõtineat lapis, in thorace pur: aut deniq; aliquis humor molestus in animalis corpore, illic genitus, uel adueniens extrahitur. Fingamus igitur

Vitæ ex rebus
du ratione, cõst
tui uenæ, spiritus
morbi tempora.

Curatio affe
ctû variatur,
pro differentia affe
ctuum partis
cularum.

Artificandi cor
pora, docet nos
proprietatem ef
fentiae uniuscuius
que partis.
Ergo, proprie
tas.

Magnitudo ex
creta, substantia

Re naturaliter
in particulis quo
busdam continen
ta.

Sanguis arteria
rum calidior,
tenuior.

Re omnia
præter naturâ.

Urina optima
qualis.

Urina crudior
dicitur.

Urina letalis
dicitur.

Spumans
signa.

Principia facul
tatum nostrorum
corpus reguntur,
tria.

(gratia exempli) aliquē tribus diebus non reddi
disse urinā. Ad hęc, euident quiddā tumor circa pu-
bem emineat, euidētē repletionem uesicę indi-
cans. In primis eīm cōsiderandū est, num resolutę
excrettricis potētiz nomine id accidat, an ob
obstructū urinarīū meatū: nam utrumq; potest acci-
dere. Prius tamē reuocare in memoriā oportet,
musculū qui claudit collū uesicę, ab actiōe quie-
scere, dum fungit uesicā suo munere. Cuius qui-
dem musculi actiō, paret uoluntatis imperio. At
uesicā ipsā, utpote naturaliter agens, minimē uo-
luntat obsecūdat. Inest etenim illi, quādamodū
ceteris ferē omnib. partib., facultas quędā ex-
pulsitrix, quā uinitur, dum cōtrahitur ab excremen-
tis. Quę sanē excrenendi uis, si aliquando fuerit
affecta, fieri potest ut supprimatur urina. Proin-
de si hominē sic figuraueris, ut decius sit collū
uesicę positus, ac manibus pubis tumorē preffe-
ris, tandem reddetur lotium. Quod si sic facien-
do nihil omnino promoueris, nō resolutū tam
uim, sed urinę fistulam contempnā esse, suspicari
oportet. Quippe musculis et circumdatus, si re-
soluatur, nō cohibiti, sed pręter uoluntatē emis-
si lotij, est causa. Trisariam autē cōtingit obstrui
collum uesicę. Aut enim corpus ipsius in tantū
tumorē attollitur, ut meatus inde occupetur: aut
aliquid ei pręter naturam, ut caruncula uel cal-
lus, innascitur: aut deniq; a re quāpiā aduenien-
te, meatus ipse obstruitur. Porro corpus eius ad
magnitudinē insignem attollit, si uel inflamma-
tione, uel scirrho, uel a bescitio, uel alio quouis ru-
more fuerit affectum. In meatu caro quidem o-
ritur, si pręcesserit ulcus. Obstruitur meatus, uel
a lapide, uel gramo, uel pure, uel crassio lentoq;
humore: quę omnia distinguere oportet, ex prę-
sentibus pręteritiq; accidentibus. Sit igitur ali-
quis puer, qui perpetuō pudendū scalpat. Eius
autē urina fit aque similis, in qua sabulosa quę-
dam subsident: dein uerō repentē supprimatur
urina: nunquid optima ratione conieceris, huius
lapidem incidisse in collum uesicę? Itaq; supino
collocato puero, ut crura reliquo corpore sint
sublimiora, multifariā ipsum cōcuties: sic enim
feceris, ut lapis ā meatu recedat. Quibus pera-
ctis, iube ut puer urinā conetur reddere. Quod
si profluxerit, notitiam causet, ac simul curatio-
nis modum te inuenisse, ne dubitaueris. Sen su-
tem nihilominus supprimať urina, tunc demissa
ænea fistula, simul lapidem ā uesicę collo repe-
les, & euocabis urinā. At nulla lapidis nota prę-
cedente retentū lotium, si sanguis simul cum uri-
na profluxerit, argumentū est grāmū aliquē exti-
tisse ipsius obstrucentis causam. Quāq; fieri
potest, ut ob ulcus uesicę, citra sanguinis profu-
sionem, paulatim grumus concreseat. Potest etiā
cōtingere, ut sanguis ex renibus per ureteras in
uesicam defluens, grāmū efficiat. Ad hęc igitur
omnia, sicuti etiā ubi pus, uel aliquid lentus hu-
mor meatū urinę obstruit, haud inutilis est æ-
nea fistula immissa. Sic etiam ubi ob carūculam
ab ulcere innatam, uesicę ceruicem obstructam
esse putamus, & ex pręcedentibus ulceris notis,
& ex eo quod immissa ænea fistula urina uacua-
tur, id intelligere possumus. Quippe demissa fi-
stula, dolorem mouet in ea meatus parte, ubi ul-

cus esse cōtingimus: fractaq; sub fistula carne, se-
quantur cum urinę excretionē, & cruor & car-
nis fragmenta. In omnibus igitur his artificiosa
coniectura nobis perij utilis est, ut quę inter ex-
actam notitiā, & omnimodā ignorantiam,
media quodammodo existimet. Ceterū cuiusli-
bet partis usus, magnificē ad affectōrū locorum
cognitionē conducit. Etenim actiō, motus par-
tium factius est: at usus, omnibus inest, uel ni-
hil etiā agentibus. Hinc itaq; excretionis urinę
actiō, ā compressionē uesicę, opululantibus etiā
abdominis musculis, ubi urinam admodum exi-
guam continet, aut uesicā ipsā est infirma. Re-
liquę autē partes omnes, ad actiōē sunt utiles.
Porro si uesicā minimē in tumorē extēdit, urina
reddi nō possit, nec cessum est uel ureteris, uel re-
nes obstructos esse. Quapropter hic rursum in-
tueri oportet, num anteq; supprimeretur urina,
aut la pidis, aut inflammationis, aut alterius ca-
usipiam malā accidentia pręcesserint. Neq; in te-
rim negligenda est uniuersi corporis dispositio:
ut possumus planē discernere, num in ipsis reni-
bus, ā lapide, uel crassio humoribus, fuerit ob-
structio oborta, an in uocatis ureteris. Cū igitur
singulę actiones corporis, peculiariter fornan-
tur organa, quibus obeuntur, sanē actionē lædi
est necesse, instrumentum efficiēte ipsam, quomo-
do libet læso. Verū interdu facile affectus pro-
ductus soluitur, ita ut simulatę opifex causā se-
mota fuerit, procius ipse conquiescat. Interdu
uerō usque adeo pertinaciter hæret, ut perma-
neat diutissimē, etiā ablata causā. Accidit autē
nonnunq; ut efficiens causa pertransiens, nō fir-
mum faciat effectum: ueluti cū suffusioni simi-
lis oculi imaginantē, collecto in ore uentriculi ali-
quo tenui excremento, unde uapores sublati ad
oculos, similes imagines mouēt, quales per suf-
fusiones cernunt. Oportet quidem oculos per
tricipes fieri eius dispositionis, quę inest uen-
triculo, si uidendo debeant hallucinari. Itaque
necessum est ordini semper ab instrumentō actio-
nis oblatę. Dein autem inuestigare, quismā sit
ipsius noxę modus: num uidelicet dispositio
ipsa sit permanens, an adhuc in generatione cō-
sistens, nec nata perseuerare. Quod si nūc quoq;
fiat, utrum causa quę effectum producit, conti-
neatur in ipsā parte, an per ipsam transcat, inue-
stigandum. Etenim arefactio immodicę humo-
re, quem crystalloideum uocant, perseuerans erit
oblatio, & essentia ipsius proprius affectus. Si
uerō crassus humor in pupilla conlisterit, essen-
tia quidem nondum * est læsa, uerūm acciden-
tis causā in oculo consistit. Tunc autem per
ipsum transire dicitur, cū euaporans humor
in uentriculo continetur. Non autem necesse est
ad hoc, ut pars aliqua esse affecta dicat, in essen-
tia ipsius permanentē esse dispositionē. Nam ubi
uicemens dolor aliquid intestinum infestat,
firmato in una quapiā parte dolore, ut quasi per
forari uideatur, quo pacto quis uel nequiq; in-
testinum affici dixerit, uel in eo affectum nō con-
sistere? quīs huiuscemodi dolores interdum ex-
creto quodam humore uitreo, uel temporis mo-
mento soluantur. Is igitur humor uisibilis, causā
illius doloris exiit. Id siquidem quo tangente
aſſicimur,

*Vrina suppres-
sa qua sint conside-
randa.*

*Musculus uesicę
collum constrin-
gens, agit uolun-
tari.*
*Vesica non pae-
ret uoluntati im-
pero.*

*Vrinā suppres-
sam ob resolutū
rim excrenandū
quomodo resolu-
turi oporteat.*

*Obstruitur col-
lum uesicę trisa-
riam.*

*Lapidē inco-
mmodū collo uesicę
medicā.*

*Ænea fistula ad
quid utilis.*

*Caruncula collo
uesicę innata car-
gumena.*

*Cruetella au-
sistula.*

*Vrina excre-
ta ā quibus fiat.*

*Actiōē labi et
necesse, uicem-
mens efficiens
ipsum quomodo
libet læso.*

*Oculus color-
tibus qua sint
sideranda.*

Humor vitreo.

*Confectio, quo
tangente quid
afficitur: abla
to autē, affectus
fidetur.*

*Dysenteria cau
sa morax cau
sa humor.*

*Morbus unius
procurat ab in
itio eandem sibi
ipsi naturā atq
essentiam feriat,
nec differt
nisi magnitudi
ne & sibi ab ali
to & maximo.*

*Morbus exiguus
sibi unus a
natura.*

*Dysenteria est
viciū inter humo
res.*

*Actio nulla la
datur, nisi pars
quā aliam efficit
afficiatur.*

*Agere quid dica
tur.*

*Morbus genera
dos.*

Morbus quid.

*Affici quādo di
citur caput.*

*Aggravare quā
do dicitur co
pus.*

*Corruptionis ri
borum tres diffe
rentia.*

afficitur, & quo separato quiescit affectus, cau
sam esse, omnibus in cōfesso est. At uerō ipse af
fectus, nonnunquā a causa alioq. erit: sed ita o
ritur, ut sublata causa effectrice, haudquāq. per
manentē habeat dispositionē. Interdum autem
partim iam factus est, partim etiam nō sit. Sepe
numero etiam si fieri desinat, utpote ablata cau
sa, perseverans tamen permanet dispositio. Veti
ti in dysenteria, cuius affectus, mordax humor
existit causa: utpote qui ab initio extergat, abra
datq., ac dein temporis tractu ulceret intestinū.
Quod si anteaq. produxerit ulcus, * perfluere is
humor desinat, affectus ipse nōdum dysenteria
uocabit. Sin uerō ulcus iam intestinū exerceat,
etiāsi humor siniat, uō ob id finitur affectus.
Hoc autem summopere uenit considerandū, o
mnem morbū protinus ab initio, ubi primū cor
pus ipsum limites temperatur, quæ sanitati de
betur, excesserit, eandem sibi ipsi naturam atque
essentiam fortiri, nec differre, nisi magnitudinē,
at iam absoluto & maximo. Si quidem res simila
res, cū nullam figuram naturalem desit, erant,
morbū ab initio eadem essentia constant. Dis
similares uerō, & quibus uariā est forma, ut do
mus, essentiam generatione posteriorē habere
poterunt. Quam itaque causæ agunt in cor
pus, ipsa species affectus ab initio est eadem, ta
men ob exiguitatē nō planē cernitur: sicuti neq.
in laxo cōcauitas, quā unica filla produxit. Cæ
terū id genus affectus exigui, separatis efficiē
tibus causis, licet a natura uincuntur. Illi quippe
duntaxat externo egent auxilio, quos ob ma
gnitudinē uincere natura non potest. Igitur ubi
primū mordax humor aliquod intestinū ero
serit, quō id quod iam factum est, nōdum apertē
uideat, nihilominus dispositio ipsa sub dysen
teriz specie cōprehenditur. Sit autē hoc initū uiz
ad inueniendās affectus sedes, nullam actionē
laxā, nisi pars quæ illam efficit, afficiatur. Verū
ut affecto & actio diuersæ sunt uoces, ita diuer
sus quoq. earum est usus. Id si quidem a gere duci
tur, quod ex seipso motum obnnet. Affici uerō,
quod motum habet ab alio. Cū itaq. duo sint
motus genera, alterationis & lationis: ubi ad
permanentem dispositionem alteratio peruenerit,
fueritq. dispositio præter naturam, morbus
uocatur: quia per abusionem nōnulli eam dis
positionem affectum nominent. Distinguenda ta
men est interim propria & primaria affectio, ab
ea quæ per cōsensum accidit. Ut autē recta prop
riaq. nominū appellatione utar, affici quidem
caput, quando condolecit uentriculo: ægrotat
uerō, cū proprio morbo laborat. Similiter uen
triculū affici quidem dicemus, ubi a uitiosis mo
lestis humoribus: ægrotat uerō, aut per intem
periem propriā, aut cū inflammationē, uel ulcus
uel abfcessum habet præter naturam. Porro
corruptionis ciborum tres primæ ac ueluti gene
ralissimæ sunt differentie. Vna quidem per pro
prios uentriculi morbos, altera a uitiosis humo
ribus in ipso collectis, tertia ab alimentorū qua
litate inducitur. Licet itaq. uitiosum ad cōco
nionem, uentriculo nō primariā, sed secundariā ra
tione affecto, minimēq. circa actionē propriam
hallucinante: quemadmodum ubi uitiosi cibi &

corruptioni obnoxii ingerunt. Si igitur quilibet
fumolus ruetum emittat, igneo quodam calo
re uentriculū eius esse dicemus prædixi. Ad dein
de rursus distinguendo inuestigabimus, utrū ab
intemperie corporis ipsius uentriculi, is calor o
riatur: aut a fluxa bile, ealy uel in ipsius spacio cō
tenta, aut in tunica ita, ut uix abtergi possit, de
missa. At ne hic quidē cessabimus. Nam rursus
querere oportet, an iocinore malē suo officio
fungente, huiusmodi humor accumulatus, is ex
uniuerso defluat corpore: an etiā in ipso met gi
gnatur uentriculo. Ergo si in uentriculo cibi in
fumolam qualitatem mutantur, idly non ex sua
iporū natura, causam calidā: si uerō aciescit, eam
frigidam esse est necesse. Ut discernas autē, nem
intemperie aliqua, an uitiosus quilibet humor
uentriculi corpus infestet, offere oportet cibos
qui suapte natura q̄maximē corruptionis modo
aduenerunt: ut panē aur chondrum illis, qui in
sumū transmutare cibum consueuerūt: mel autē
his, qui a cibo acidum saporem percipiūt. Dein
considerare excrementa, tum ea quæ uōmunt,
tum quæ deiciuntur per alium: nam humor ali
quis cum illis quidē biliosus & calidus, cum his
uerō pituitosus ac frigidus excrementur: an nullo
uacuato humore, ipsa exiguum quādam mu
tationem obtineat. Quippe ubi * citra humoris
abfcessum igneo calore uentriculus infestatur, pa
nem aut chondrū abq. humore uidibus deici
perq. exigua in ipsius facta trāsmutatio. * Quod
si humor quoq. prauus in ipso uentre cōsistens
corrumpat cibos, uidentur n, ubi deieci fuerint,
in huiusmodi humoribus submergi, & ipsius ac
tione manifestius alterari. Id quod a uomitione
etiā clarius discernitur, si laborans fit pro
clius ad uomitū. Nam cogere cum qui nequeat
uomere, abfurdū est. Atq. hæc ita deprehendun
tur, si in spacio uentriculi noxius cōnneat hu
mor. Si uerō in tunica sit imbibitus, ut ad cali
dam nauē quædam inanitas (hoc est, citra uomi
tum) sitisq. uehemens consequi, ira a frigido ci
borum cupiditas excitatur. Porro calida dispo
sitione, ubicunq. fuerit, semper refrigeranda est. At
quouisq. aut quo modo, aut qua materia refrige
rare conueniat, quos affectus cōmonstrat. Iam
uerō ipsa qui a cidū ructū ædunt, auxilia medica
men diatrion prepercon, aut aliud simile ex aqua
uel uino epotū. Alijs autē qui nidorofum, tum
abfynthiū, tum hiera picra est ex usu. Quo quidē
medicamine (hiera uidelicet, quæ ex aloë
cōstit) in potu exhibito, quosdam olim colicos
persanauit, quibus mordaciū humorū defluxus
in intestinū, cōnclauerat affectiōne. Cæterū in
testinorū proximæ uentriculo partes, exhibitus
tum cibis, tum potibus: quæ uerō nō ita multū
a sede distant, clystis promptius curantur. Fin
gamus rursus per uentrē deici excrementa quæ
dam, aliquādo quidē ramenta, aliquando cruen
tum aliquid, similis aliquādo hæc ambo: tunc
sanē intestinū ulcere affectum esse, dubitauerit
uemo. At uerō utrum in exilibus intestinis, an
crasius, ipsum ulcus cōsistat, id ex ralsura, & ex
tus tempore, & ex missione cum itereore, distin
guere oportet. Si quidem infimæ partiū ulcera,
nullas omnino ulcerum habent notas alius excre

*Rostris fumo, seu
figurat ignis
calorem uentri
culi.*

*Anteferre in ven
triculo cibis, ab
causam frigidā.
Nulla adeo fa
mois uel acida,
quid æquum,
considerandum
ne, ad uerūq.
causam perueni
gandum.*

*Ventre nemo re
greditur, nisi
sit ad uomendū
perueniū.
Nauis inanitas
indicit calidū
focum imbibit
um uentriculi
tunicæ.*

*Cupiditas cibi
mole excitatur.
Locus afflicus
quid indicat.
Diatrion pope
ron ructus acido
conferit.*

*Fiera picra qui
bus conducit af
fectibus.*

*Intestina supra
mā cibo corpora,
cassia propius
clystis curant.*

*Vitru obfideat
ne tenuis inte
stina, an crassā,
quomodo distig
ferendum.*

mentis admittas: earum uero partium, quæ paulo altius sunt fixæ, ulcera, mistas quidæ cum stercore notas habent, sed id leuiter duntaxat. Quæ admodum si multo sint sublimiores, uehementior erit mixtura. Principi uero in supremis intestinis ulceris notæ stercorei accuratè misceri. Potest ex uno quandoque indicio simul & locus & dispositio deprehendi, aut locus unà cum causâ.

*Lorum nota
rude sumatur*

*Alia lesa parti
afflictâ indicat.*

*Excrementorū
speciem parti afflic-
tâ indicat.*

*Parti indicat
partem lesam.*

*Doloris singuli
affectû possunt
parti ostendere.*

*Accidentia pro-
pria indicant lo-
cum afflictum.*

*Peripneumonia
indicat in ma-
nibus rubet.*
*Affectum nota-
re de deprehenditur.*

*Lapis in quo
signatur parti-
bus.*

*Abscessus cum
signatur non po-
test.*
*Dolor nec pul-
mo nec lorum
partem.*
*Hæmorrhæ
signatur cum febre
suppuratiua in
inflammatione
dicit.*

*Affectum pro-
pria signa que
sunt.*

*Affectum per
cistam
signatur quando
dicitur cerebrum.*

Cæterum locorum notæ, & ab actione lesa, & excrementis, & positi, & doloris proprietate, & proprijs accidentibus delesumani. Affectu uero, & ab excrementorū specie, & loco natura, & doloris proprietate, & proprijs accidentibus. Actio itaque lesa, affectum parti indicare potest, hoc modo. Si enim accidens aliquod circa ceruicem ossium euenit, oculi affici cōbit. Excrementorum species parti affectū indicat, uel quod sint ex essentia illius, uel quod ab ea conne in. Positi etiam affectū parti cōmonstrat. Durus quippe in dextra præcordiorū parte tumor, nō lenis, sed ie coris affectu est notat: in sinistra autē, nō hepatis, sed splenis affectū indicat. Ad hæc, si membrana se tunicæ frustulū uoluerit fuisse reiectum, aut gulæ, aut uentriculi: si rursus, gutturis, aut asperæ arteriæ: si excreandum, faucium: si cum urina, eius situlæ: si à sede, alicuius intestinorum: si per mulieris pudenda, uterū affectū portendit. Singuli etiā dolores, pro positi uarietate, possunt affectum ledere ostendere. Nam si apparentibus per uomitū ulceris notis, in anterioribus partibus circa præcordia sentitur dolor, uentriculum: si uero in posterioribus circa dorsum, gulam exulceratam esse est indicium. Ex proprijs accidentibus etiam innotebit affectus locus. Nam uero uentriculi affecto, fastidium infestat. Per hepatis uero imbecillitatē, excrementa alui, a quæ in qua carnes nuper machinæ ablute fuerūt, asini mutantur. At in peripneumonia, maxillæ uidentur rubere. Quinetiam propriæ ipsorū affectu notæ, in excrementis deprehenduntur: si quidem ramentū, ulceris: si in urina sabulosum residet, la pidis: cucurbitæ uero seminis excrementa similia, latorū uermiū indicia sunt. A locis etiam ipsi, morborū indicia sumuntur, eo quod quibusdam solis morbus ille accidat, quibusdam uero solis nunquā eueniat. Quippe soli oculi suffusio ne laborant. Lapis in uesica & renibus duntaxat nascitur: atque ut nonnullis placet, etiam in colo. Lumbici in intestinis gignunt. Rursus imposibile est, ut cor abscessum sustineat: aut pulmo, aut ligamenta, dolorē. Ab accidentibus quoque proprietate affectuum indicia oriuntur. Nam quibusdam per tabicis morbo, ungues adunci euadunt. Intermittens horror cum febre, inflammationis ad suppuratiōem transiens indicium est. Lingua nigricans ardens febrem portendit. Paucæ tamen affectu sunt notæ, quæ nō simul affectum sedem ostendant. Cæterū ut actionum notæ affectū duntaxat partem, sic differētia eorum, ipsius affectū declarant. Ea igitur sola sunt affectu propria signa, quæ per accidens ipsos se quantur. Porro cum ob uapores uel etiā humores ipsos ascendentes ad cerebrū, mens laetatur, nemo ipse dixerit cerebrum tunc laborare primogenio affectu: quanquā omni affectu carere,

ipsum haudquaquā defendi potest. Quare dicendum est, illud per cōsensum, siue cōfortij lege affici: hoc est, ab altera parte talem affectu non recipere. Sunt præterea nonnullæ actiones, quæ idonea indigentes materia, ipsam ab alijs partibus preparat accipiūt. Quæ de re interdū optima ratione cōtingit, nulla existente in actionis cuiuspiam proprijs instrumentis noxa, actionē ipsam perire, defectū scilicet eius materię, ex qua fieri cōsuevit: ueluti in uoce accidit, cuius quidē materia essentia exsistit. Hæc autē sit cōtra cōtra thorace ab intercostalibus musculis. His igitur nihil agentibus, animal uocē amittit, & quidē nullo interdū in proprijs uocis particulis apparente affectu. Sunt uero hæc partes, tres cartilagineæ à tribus cōsue musculis, in quos inferuntur uel uel demissi à cerebro. Est præterea in gutture ligula, siue epiglottis, maxime propriū uocis ipsius instrumentum. Et enim cecidit quidam ab alto, ita ut dorsū intus affligeretur. La terio die exiguum admodum uocem emisit. Quarto deinde die omnino obmutuit: resoluta simul fuerūt & crura, manibus prorsus illæsi. Sed nec spirationem amisit, nec difficulter spirabat. Nam cum tota sub ceruice spina esset ei resoluta, accidit thoraci, ut & septum transversum, & musculi superni, numero quidem sex, mouerent. Quippe nerui ex spinali medulla, quæ in ceruice est, in ipsos descendunt. At nerui musculorū intercostalium, qui flatum efficiunt, omnes affecti erāt. Vbi igitur sedata fuit spina inflammatione, à septimo die uox restituta est iuueni, & crura motu sua facultate, antea intercepti, recuperatæ. Huiusmodi ergo noxæ speciem, magis propriæ per cōsensum euenire dixeris, si ubi ab humoribus in uentriculo contentis, exhalantibusque, caput dolore tentatur. Iam uero, ut ad crura facultas quædam, quæ cōtra essentia substantiam defendere ob phlegmonem prohibita est: sic ad oculos, cum essentia, ubi obstructi fuerint uisoris meatus. Ad guttur autem, quia materia peruenit per illam phlegmonem dorsū resolutionem, sufficiens tamen ipsius quantitas nequaquā accedit. Qui uero ob intercostalium musculorū perfora non obmutuit, is totū uocis materiam amisit. Porro quemadmodum crura resoluuntur ob inflammationē spinae, ita etiam guttur, uocalibus siue recurrentibus neruis (quos ipse inueni) aut incisis, aut laqueis interceptis. Atque idem est modus quo lædunt gutturis musculi, siue recurrentes nerui, siue qui iuxta arterias sunt, astutentur. Vtrique enim animalis facultas desideratur, siue qua moueri nemo potest pro uoluntatis imperio. Incisis præterea musculis qui epiglottida mouēt, animal etiā eua dit mutū. At laqueus collo circumdatus nō solum reddit animal mutum, sed etiam suffocat, ipsum respiratione priuando. Aspera autem arteria, si dissecetur, uoci quidem nocet, sed animal non priuat respiratione. Angina uero, cum sit interonarum gutturis partium inflammatio, strangulationi proportionē respondens, respirationē tollere potest, ipsius meatum obstruendo. Idcirco uocalis instrumentum maxime proprius affectus est. Qui autē ex affectu loci notitia ipse curationē in uenerim, ex hoc exēplo perdiscis. Occurrit mihi

*Vocis materia
est effluens, que
fit cōtra cōtra
thorace ab inter-
costalibus muscu-
lis.*

*Vocis propria in
stramenta sunt
tres cartilagineæ
que cōsistunt
Laryngi, et præ-
terea epiglottis.*

*Affectum per
cistam signatur
dicit.*

*Resurrectus nec
non mouet Cel-
sianus.*

*Moueri pro
uoluntate imperio
nemo potest, si
ne facultate ani-
malis.*

*Angina est in-
flammatio inter-
narum gutturis
partium.
Loca affectu pri-
uata que uocem
Gutturis quæ
respirationem ob-
struunt.*

olim

olim quidam, cui sensus trium digitorum manus, iam triginta diebus perierat, prorsus illarum motione: nec iuuabatur quicquam ad medicamentis ipsi maiori admotis. Cum igitur intellexissem ex illo, cum proficisceretur Romam, se decidisse ad uehiculo, ac initium dorsi tunc sibi coeuium fuisse, nec multo post accidisse digitorum affectum: coeci inde, * in primo statim exortu nervi post septimanam uertebam, partem aliquam ob ictum fuisse inflammata, eamque iam induruisse in scirrhum. Quippe nervorum qui a ceruice prodeunt, ultimi pars * humilior, quae descendit per cubitum, in curtem minorum digitorum disseminatur, ac praeterea per medii digiti mediam partem dispergit. Quam obrem illi spinæ parti, * quæ affectæ particulæ principii in se continebat, congruenti medicamento cum focurrissem, digitus suum sensum restitui, cum maxima spectantium omnium admiratione. Quo autem modo sensus digitorum perierit, motu prorsus illarum, iam audies. Sennere enim, ueluti quiddam pati est: moueri autem, ceu quoddam est agere. Quam obrem ut quis moueatur, opus est robore: at ut sennat, uel minima facultas est sana. Ob idque necessum est, ut sensu ipso deperdito, simul exoluatur & motus, ubi per unum eundemque nervum ambe perficiuntur actiones. Porro omnis uoluntarius motus, ad musculorum officium pertinet. Quippe nullo nervorum per se, sine musculo, ullam huiusmodi in animantis particulis actionem efficere possit. Ceterum ad partes mouendas musculi ipsi aliquando quidem * immediate perueniunt: aliquando oero per medios tendones: quales sunt illi qui mouent digitos. Si igitur affici musculorum nervus contingat, digitorum motus peribit: si oero eos qui ad curim pertingunt, tangendi sensus corumpitur. At ubi tota resoluitur membra, cum uidelicet comune principium est laxis, simul & motus & sensus pereunt. Ac tunc locum primario affectum, ex latorum nervorum multitudine duntaxat inuenire poteris. Accidit autem interdum, ut dextra tantum pars ipsius spinæ afficiatur, altera omnino illæsa: aut e contrario, ut illa manente integra, sinistra affectu sustineat: atque hac ratione nonnunquam tota pars sinistra resoluit, dextra illæsa manente: nonnunquam contra, dextra pars duntaxat & afficitur & resoluitur. Vbi uero non affecta spina, tantum unus nervi processus est laxis, eas duntaxat partes resolutioni occupat, in quas ille nervus est distributus. Itaque si spina fuerit affecta, aut aliquod nervorum principium, coeuius illarum tota medeni ratio est: alioqui frustra circa resoluta membra occupaberis. Iam oero ob frigoris immoderatam, interdum sedis musculi resolui solet maximè, siue federit quis super lapide frigido, siue in aqua frigida supra modum fuerit uersatus. Quia sane resolutionem sequi inuoluntaria excrementorum defectio. Qui igitur in anatome exercitatus fuerit, accurateque procedentia & praesentia accidentia norit, ac sic ad curandorum morborum experientiam methodo & ratione peruenit, is inueniet & locum affectum, & ipsam dispositionem. Ut autem affecti musculi, uoluntarias sic uelicia, necnon in testina oblecta, naturales actiones laedere possunt: eo quod ipsi

contra his excernantur ea quæ coeui tenent. Ac disserunt certe plurimum naturalia ab animalibus in instrumentis: quod naturalibus quidem, cognata actionis uis insit: animalibus uero instrumentis à principio, uelut lumē à sole, ipsa defluat. Quæ obrem solis partibus quæ & sentiendi & mouendi uim habet, accidit, ut ipsis interdum haudquaquam affectus, nihilominus eorum actio exoluatur: quod naturalibus instrumentis minimè solet accidere. Quoties enim horum actio laeditur, semper ipsa prima afficiunt. Ceterum animalibus instrumentis omnibus, * naturalis quoque dispensatio adest, cum nimirum & arteriarum & uenarum admiculo in digesta, ad essentiam propriam seruandæ. Proinde alterari ad uicinis, ipsi ut naturalibus: aliterationem uero sentire, ut animatis euenit.

GALENI PERGAMENI de locis affectu lib. II.

CAPVT I.

Res sunt excitationis modi circa affectum locorum notitiam. Quorum unus circa singulas corporis partes, alter circa causas & dispositiones, tertius circa differentiam ac odientium uersatur. Igitur à locis sumitur modus, ubi dicimus: Affecto cerebro luitur: eodem accidentia sequuntur. À dispositionibus & causis sompnus, exultit talis, ut si dicimus: Inflammationis feorism, aut refrigerationis, huiusmodi modi sunt accidentia. Ab accidentibus, ut cum dicimus: Hoc doloris genus hæc dispositiones, aut hosce locos portendit.

CAPVT II.

Hallucinatur autem Archigenes, ubi dolorem stupidum neruis tantum euenire ait. Quippe stupor à frigida dispositione oritur, non neruorum duntaxat, sed etiam uenarum, artenarum, carnis, membranarum, tunicarum, & cutis. Quod si ubi id quiddam hæc omnia per neruos sensum habent, ad neruos illam dispositionem refert, cur non reliquas omnes dolorum differentias, proprias esse neruorum ait? Etenim dolor, tristis est sensus: quæ admodum ipsa uoluptas, blanditas. Quod si rem accuratus inspicere, haudquaquam doloris species dicendas est * stupidus dolor: sicuti neque species ulceris inflammatorum ulcus: sed utrobique diuina dispositionis coeuius adest. Etenim stupor refrigeratio est insignis: idcirco corporibus ita dispositis & sensus & motus difficultat in ducit: quæ admodum completa refrigeratio, & sensum & motum omnino tollit. Quod autem stupor dispositio nis, non doloris aut sensus sit nomen, Hippocrates docet, ubi ait: Stupor enim medicis dolorum solueri potest. Porro coeuietas uehementer particulas, atque eos qui torpedine animal domat diluc uiuit, tetigerint, infestare solet etiam stupor. At quibus membrum aliquod stupidum fuerit, si quicquid tetigerint, obicuro & lebeti sensu percipiunt, neque moueri possunt. Si uero moueri cogantur, dolent. Ceterum circa hoc quod moeror tenet, affectum ipsum sensum haud obfure perferunt, sed tunc minimè dolent. Stupor itaque non particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere quidem omnibus potest partibus, ab ijs tamen duntaxat manifeste senti-

H h

Instrumentum naturalibus uel instrumentis à principio, uelut lumē à sole, ipsa defluat. Quæ obrem solis partibus quæ & sentiendi & mouendi uim habet, accidit, ut ipsis interdum haudquaquam affectus, nihilominus eorum actio exoluatur: quod naturalibus instrumentis minimè solet accidere. Quoties enim horum actio laeditur, semper ipsa prima afficiunt. Ceterum animalibus instrumentis omnibus, * naturalis quoque dispensatio adest, cum nimirum & arteriarum & uenarum admiculo in digesta, ad essentiam propriam seruandæ. Proinde alterari ad uicinis, ipsi ut naturalibus: aliterationem uero sentire, ut animatis euenit.

Excitationis modi circa affectum locorum notitiam, tres modi.

Archigenes opinatur, ubi dolorem stupidum neruis tantum euenire ait. Quippe stupor à frigida dispositione oritur, non neruorum duntaxat, sed etiam uenarum, artenarum, carnis, membranarum, tunicarum, & cutis. Quod si ubi id quiddam hæc omnia per neruos sensum habent, ad neruos illam dispositionem refert, cur non reliquas omnes dolorum differentias, proprias esse neruorum ait? Etenim dolor, tristis est sensus: quæ admodum ipsa uoluptas, blanditas. Quod si rem accuratus inspicere, haudquaquam doloris species dicendas est * stupidus dolor: sicuti neque species ulceris inflammatorum ulcus: sed utrobique diuina dispositionis coeuius adest. Etenim stupor refrigeratio est insignis: idcirco corporibus ita dispositis & sensus & motus difficultat in ducit: quæ admodum completa refrigeratio, & sensum & motum omnino tollit. Quod autem stupor dispositio nis, non doloris aut sensus sit nomen, Hippocrates docet, ubi ait: Stupor enim medicis dolorum solueri potest. Porro coeuietas uehementer particulas, atque eos qui torpedine animal domat diluc uiuit, tetigerint, infestare solet etiam stupor. At quibus membrum aliquod stupidum fuerit, si quicquid tetigerint, obicuro & lebeti sensu percipiunt, neque moueri possunt. Si uero moueri cogantur, dolent. Ceterum circa hoc quod moeror tenet, affectum ipsum sensum haud obfure perferunt, sed tunc minimè dolent. Stupor itaque non particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere quidem omnibus potest partibus, ab ijs tamen duntaxat manifeste senti-

Stupor itaque non particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere quidem omnibus potest partibus, ab ijs tamen duntaxat manifeste senti-

Stupor itaque non particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere quidem omnibus potest partibus, ab ijs tamen duntaxat manifeste senti-

Stupor itaque non particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere quidem omnibus potest partibus, ab ijs tamen duntaxat manifeste senti-

Stupor itaque non particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere quidem omnibus potest partibus, ab ijs tamen duntaxat manifeste senti-

Stupor itaque non particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere quidem omnibus potest partibus, ab ijs tamen duntaxat manifeste senti-

Sentire, est uelut si quiddam pati.

Moueri, est uelut si quiddam agere.

Sensu amissum, cur motum perierit, ubi per uoluntatem ueritatem, actum per se.

Neruum nullum esse, nisi motum praesentem.

Spina interdum dextram, interdum sinistram partem resoluat.

Medeni ratio non esse, cum uelut ad affectum originem. Si in musculum resoluat, si in uenam ducit.

ri, quæ & suos affectus percipere, & moueri pro voluntatis imperio sunt nati. Iam uero ex carne (quæ nusquam sola ac perse reperitur) ligamentisq; & tendinibus per ipsam disseminatis, musculorum essentia cõditur: quæ ut permanere possit, uenis indigebat, arterijsq;. Verum circa dolorē pulsare, ad iolas arterias pertinet, animali etiamnū rectē ualente. Vbi uero ingens inflāmatiō est ob ortu, uel erysipelas, uel abicessus, arteriarū pulsus cum dolore sentitur: cum per bonam ualutū dinē, nec cum dolore, nec sine dolore ipsū difficeremus. Etenim duabus præcipue occasio-
nibus uehemens dolor particulis inflāmatis in-
fertur: * nempe cum mouentur, & cum à re qua-
pali premuntur. Proinde inflāmatiō musculi,
duplici nomine, ob dilatatas arterias, dolorem
percipimus: & quod moueant illæ, & cõpriman-
tur ab adiacente carne, atq; ipsam simuliter cõpri-
mant. Quinetiā sine musculo, arteria inflāma-
torij affectum sustinens, ipsa per se cum dolore
pulsat. Quod si aliquod per id genus affectus,
stupidus esse pulsus ipsi ægro uideatur, tunc sci-
re licet, dispositionē in musculi neruis ita cõsiste-
re, ut ad resolutionē tendat. Nam dispositio stu-
poris, media est inter resolutionē & integrā ua-
litudinē. Ceterū neq; in peripneumonia, neq; in
lateralis morbo pulsantis potest dolor contingere-
re idq; ob partium naturā. Pulmo siquidem, len-
sum non habet: morbus uerò lateralis, mēbranæ
cingentis costas affectus est. * Cuius quidē pars
illa quæ costas adliæret, necessariō cõprimatur:
* quæ uerò inter costas est collocata, comprimi
nequaq; potest, sed inflāmatiōnis duntaxat ratio-
ne dolet. Siquidem in eo spacio arteriæ cõsi-
stunt, per musculos intercostales dispersi: idq; al-
tius, q̃ ut membranā cingentē costas artingant.
At inflāmatiō interdum intercostalibus muscu-
lis, dilatatio arteriarū dolorem necessariō infert.
Proinde æger pro magnitudinis inflāmatiōis,
sentit in parte inflāmata ipsū dolorē pulsa-
tilem. Igitur pulsantis dolor (qui uehementes
partij sensibilibus inflāmmationes sequitur) arte-
rias ipsas primario affectu molestat: per consen-
sum autē ceteras partes sensibiles, eo quod à ui-
cinorū contactu premantur. At neq; in hepate,
neq; in renibus unquam huiusmodi pulsatio
percipitur: quoniā nullus per totū corpus ipso-
rum, sicuti nec per pulmonē, neruus disseminat.
Quia uerò membrana quæ corū uiscerū quodli-
bet ambit, & per quam dispergitur neruus, sensu
prædita est: ob id nimium in ipsa grauitatis
sensūs percipitur, ubi tumor aliquis præter natu-
ram illa infestauerit. Etenim membranæ, curas,
a densiq;, cum his partibus nullæ insunt arteriæ,
ubi inflāmatae sunt, nō pulsant, sed extensio
dolorē cruciatum. In uniuersum autē, primas
doloris species sunt duæ: una quidem, dum subitō
temperies mutatur, altera, dum cõtinuatā solu-
tur. Siquidem pars intenta, aut cõpressa, aut con-
tusa, aut uulnerata, dolet ob cõtinuū diuortiū.
Cæterum nō eandem doloris speciem excitant
mordax humor & plurimus: ille quippe rodēdo-
rem, hic uerò tendendo dolorem infert. Quantā
autē uim habeat intemperantia ad inducendum
dolorem, ex ipsa licet planē rependere, qui uehe-

menter refrigerati, ad ignem manibus affatim cal-
facere tentant. Quippe intolerabilem sentiunt
dolorem, præcipue iuxta unguium radices. Si-
militer etiā per dolores uocatos colicos, ubi frigi-
dissimū aliquis humor (qualis ille est quē utreum
Praxagoras nominat) in quopiam intesti-
no crassioris est impactus, adeo torquetur ægri,
ut uideantur sibi circa ureterarū regionem terebro
perforari: id quod olim mihi etiam cõdigne
cæteri iniecto oleo rutaceo, cum id paulo post
conarer excernere, excreui lumorem uitro fuso
perfimilem. Sunt & alij dolores, per quos palus
infixus uidet, qui & ipsi corpus affectū crassum
esse significat. Differūt autē inter se, aut multitu-
dine, aut crassitudine, aut rei dolorē faciētis po-
tentia, siue ea humor fuerit, siue spiritus flatulen-
tis. Siquidem paucus plurimo, & tenuis crasso,
& permansis moto, ac denique minus refrigera-
ns, eo qui uehementissimū refrigerandi uim
obtinet, minore soler excitare dolorem. Igitur
siue clauo transfixus esse, siue terebro perforari
locus uideatur, is dolor ad crassum intestinū est
referendus. Atqui leuissimodolores, ab eo
quo lapis impactus est, discerni nō possunt, nisi
quis accidentia quæ postea cõsequunt, expecta-
uerit. Vtriusq; tamen doloris sunt cõmunia præ-
sidia, & quidē calorifica in primis, siue ea extrin-
secus adhibeant, siue ea incipiant. Deinde, nisi
mitigatus dolor fuerit, eorum medicamentorū
quæ dolorē obtundere possunt, aliquod adhi-
bendū est: cuiusmodi existit, quod à Philone in-
struitur. Verū si lapis dolorē excitauerit, ipse in-
terdum solus, interdum unā cum cruore excernit,
in uniuersū subsident fabulosi quædā. At si in eo
lo affectus cõsistat, nihil horū uideatur: pro-
tinus inflātiō quadam & extensio, & status com-
plures, & tormina, & excrementa stercibus plena
cernunt. Ea autē licet discernere, si & super aquā
natent, & bubulo stercorei simulentur. Quinetiā
40 cibi tum cupiditas, tum concoctio, deterior eua-
dit, & præcens, & præcedens, & quæ sequet. Ven-
triculū namq; malè affici accidit, ut qui parti pri-
mario affectæ cõtinenter adhaereat. Insu per colli-
cos nominatos affectus magna ex parte præce-
dit cruditas, & spiritus flatulentis, & uomitus, &
nausea, quæ multo tempore inanis permanet, &
in præcordijs mordacitas, & fastidij, & indigen-
tia plurima. Igitur id genus dolores uehemen-
tissimi, cõsistunt in crassius intestinis permantibus.
Qui uerò minores sunt, ex duobus alterū necesse-
sariū est: aut quoddā in his ipsis sunt, sed à leuiori
causā orti: aut quoddā in tenuibus intestinis cõsi-
stant. Porro qui mordaces dolores sunt, nō à mor-
daci humore intestinū erodētē fiūt. Vnde dy-
sentiam semper huiusmodi dolores præcedūt, ut
pote per quā intestina ulcerent. Cæteri dyfente-
ria illa, quæ ueluti faculentū sanguinē excernit
abundantissimē, iccinoris affectū censet esse sym-
ptoma. Ea uerò per quā syncerus multusq; san-
guis excernit, plerumq; uniuersum corpus eua-
cuar, haud secus q̃ hæmorrhoides, aut muliebres
profluuij. Vt uerò ad dolorū differentias reuer-
tur, punctorius dolor potissimū circa membra-
nas cõsistit. Quāobrem lateralis dolor, puncto-
rius esse censet. Iam uerò læmodia, siue dentiū
stupor,

Care per se reperi-
tur non quid.
Musculi compo-
siti.

Pulsus doloris
cui quando sentitur.

Dolor inflāma-
tiō musculi unde
accidat.

Semper est diffi-
cilio media inter
resolutionem
& integritatem
uoluntatis.

Pulsantis dolor
nec in peripneumonia,
neque in
pleuritide oritur.
Pulsus caret sensu.
Pleuritis quid.

Pulsantis dolor
quas inflāmmationes
trahit sequatur,
& quibus nō acci-
ditur partibus.

Extensio doloris
quæ afficitur
partes.

Doloris species
primas sunt duæ.

Intemperies do-
lores infert.

Colicus dolor
ortus ab humor
uisceris, impactus
in aliquo uisceris
na crassum.

Oleum rutaceo
adhibet dolor ad
ruendum.

Dolores qui le-
uiter mouent,
ergo minus
insistant.
Cogni ueritatem
doloris, nō de-
syntomaticum.

Dolores uisceris,
et ceteri qui ab
impactu lapidis
ortus sunt, cõmuni
sunt præsidia
calorifica.
Philone.
Colicus dolor
ortus à lapide, &
quæ diuina.

Colicus dolor
quæ præcedit
symptomata.

Dysenteriam à
hecto uisceris
præcedunt.
Dysenteria hæ-
morrhoidalis.

Dolor puncto-
rius.
Hæmodia.

stipor, folis dentibus & gingivis accidere solet, ubi quispiam & austeros & acidos cibos ingesse rit. Cæterum complura alia dolorū generā sunt ab Archigene prodita, sed quæ prius intelligi nequeant: qui sane uir, ita omniū affectuū proprietates descripsit, ac si omnes ipse fuisset perpeffus: quod non uerisimile est. Præterea ubi ait, hemibracis sphacelos circūscribi, hoc est, submoueri à dissectione uasorū, minimè declarauit quid sit sphacelos esse: de cuius uocis significatio uarij uarij opinant. Dem dolorē pulsatorum & turgidum inferri ab arterijs cōtendit, ubi ipse per hemibracis sphacelos de primogenia affectione laborat. Est autē turgidus dolor, qui à parte primariò affecta, uelut à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transfertur.

Id quod nō solum in hemibracia, sed in cephalura etiā solet accidere. Sed neq̃ illud etiā est uerū, affectos nervos protinus intorqueri, indurari: cum reperiant nōnulli affectus, per quos laxiores euadunt nerui, quemadmodū per atrophiam conspicuum est. In inflammariis autem & tumoribus præter naturam, manifestè intenduntur nerui. Cæterum inflammariis partibus, præter tensionē accidit ut rubescant, renitentur, intumescant & dolcant. Aduerte tamen interim, propriæ actionis læsionē, esse singularū partium proprium symptoma. Porro consualiones neruorum, Hippocratis testimonio, & à plenitudine, & ab inanitione oriuntur, cum nimirum nerui per eas dispositiones inmodicè tēdi possint: quemadmodū chordæ in cithara, quæ à contrarijs aëris statibus, sine humidis fuerit ille, ut rigare ipsas impleatque possit, siue uehementer aridius, ad uisimā tensionem perueniunt. Quamobrem citharistæ, ubi instrumenta post uisum reponunt, solent chordas ipsas laxare. At quod Archigenes dixit, profundos esse dolores neruorum: id ab accidenibus quæ plurimis neruorum eue niunt, est sumptum. Etenim cum uenæ quidem semper priores in superficie consistant: deinde post eas arteriæ, quibus tandē nerui subdunt: id circo laborantes tensionē in imo sentiūt. Quamq̃ multum tendones (quæ corpora sunt neruosa) nō profundos, sed in superficie dolores habent, si quando ipsos sic quoq̃ tendi contigerit: ut sanè illi qui extendunt digitor, Minimè autē neruus accidere potest affixus dolor, ut falsò proficitur Archigene, cum magna ex parte dolores ipsorum ad infernas supernasq̃ extendantur partes.

Iam uerò membranarū dolores in latitudinem protendunt: uidenturq̃ esse æquales, quod nimirum illarū corpus æquale existat. Semper tamen ubi intenta particula sensu acutiori est prædita, ibi uehementior infertur dolor. Ad hæc pleuriticoꝝ nōnulli iugulū dolent, porrecta in hūc locum succingente costas membrana. Aliquid do ad præcordia deſcēdit dolor, percepto ipsius sensu in septo transuerso, utpote qd̃ necessariò cœteræ pleuritici respirat, idq̃ magis q̃ cæteræ ipsius thoracis partes. Vbi enim uelut radix doloris consistit in latere, rum laborantes, musculi qui illuc sunt, respirare pigritant: ac proinde soli sepro transuerso respirationis munus cōmittunt natura: quemadmodū in bene ualētibus, qui

leni, ac minimè uolenta utuntur respiratione. Igitur cum in internis partibus lateris inflammatio aliqua oritur, sepius transuersum intentum impensius dolet. Cū uerò in supernis, tunc iugulum potius dolor infertur. Vbi ingens in hepate inflammatio oritur, aut ubi ipsū est induratum, dolor qui tunc iugulum in dextra parte infertur, cauz uenæ magis, q̃ membranarū tensionem sequitur. Quod autem membranarū quæ ossibus adiacent, dolores profundi sint, & ueluti dolentium ossiū quandā imaginē referant, haud quidem mirandum est. Proprius autē arteriæ uenæq̃ dolor, extensis secundum longitudinē corporis, uelut chordæ cuiusdam speciem refert, nullam grauitatē inducens. Porro ulcerosus dolor non solum ad cutem, sed ad imas quoq̃ partes, ut ossa, extenditur. Pruriginosus autē ad solam pertinet superficiem: nō tamen primariò, pro ratione ipsius propria, sed per accidenē, * quod nimirum cutis omnes sibi subiectas partes ipsitudine su peret. Horum ergo dolorū uterq̃ propriæ dispositionis est accidentis. Sunt autē ob quosdam humores acres tantumq̃ ipsi inter se, quantum dispositiones à quibus oriuntur, diuisi. Verū quia crebrò dispositio pruriginosa, ulcerosam antecedit, necnon soluta quicquidē ulcerosa in pruriginosam fieri transmutatio assolet, inde est quod de ipsis scripserit in distinctē atq̃ confuse Archigenes. Qui quidem ubi etiam ait, * pungentē dolorem in profundo esse, perperam hallucinatur: quandoquidem ad membranas si, non ad imas partes propriè pertinere uidet. Similiter ubi infixum dolorem uocat, cum sinus accesserit, sermo illius absurditate nō caret. Quippe sinus cauitas quædam est, cum partem internā cōiunctarum, altera distat ab altera. Vbi igitur fluxione impletur, ita ut adiacentes partes tendant, tunc tensionum dolorem sentiunt laborantes, nō quidem longo spacio porrectum, sed proprijs limib⁹ circūscriptum. Præterea dum ait, hepatitis dolorē inlatentē, hoc est, eodem in loco permanentem, existere, an nō etiam ueris cōtraria profert? Siquidem hepatitis dolor, si quispiam alius, uicina corpora ad consensum perducit. Nam & adiugulum usq̃ porrigitur, & spirandi difficultatem creberrimè infert: atq̃ inter dū rursū quoque, & dysenteriam excitat: nec raro notlas costas infertur. Porro inter uehementer respirandū nonnūq̃ grauitatē in dextra præcordiorū parte sentimus. Cæterum si id citra febrem eueniat, aut obstrucone, aut dura dispositione hepatis laborare conſequo. Nam ubi inflammatio infestatur, tunc febri adesse est necesse.

CAPVT III.

Igitur ad inueniendas affectas sedes, in primis quærere oportet, an singulorū locorū, quomodocūq̃ afficiantur, propria signa inueniri possint: an pro affectu ratione alterent. Deinde, utrum iugulorum in affectum propria sint signa: an circa quamlibet partem uarietur. Postea uerò expedit, loci simul & affectus memores, signa ipsa perstringere. Veluti si ira acciderit, ut pulmo inflammatione laboret, rana spirandi difficultas orietur, tantaq̃ angustia, ut suffocari laborantes uideant, ac rectū sedere conent: quæ affectus

Dolor ab inflexione in toto hepate.

Dolor membranarum ambus tum ossa.

Dolor arteria et uena.

Dolor ulcerosus et pruriginosus.

Cutis superat omnes subiectas sibi partes ipsitudine sua.

Dolor pungens.

Sinus quid.

Dolor tensionis quando accedat.

Dolor hepatitis rina corpora ad consensum perducit.

Hepatis inflammatio necessaria ad febrem.

Pulmonis inflammatio symptoma est.

H h

sphacelos.

Dolor turgidus.

Nerui in quibus læsentur affectus, & in quibus tenduntur.

Alibi uisus est affectus partis symptoma. Consualiones oriuntur à plenitudine, et ab inanitione.

Citharistæ chordas instrumenti laxant.

Nerui subduntur arterijs & uenis. Tenduntur sunt neruosa corpora.

Dolor neruorum non est affixus.

Membranarum dolores sunt laxi & æquales.

Pleuritis de inflammatione thoracis ipsa proficitur à solo sepro transuerso.

40

50

60

Orthopnea.

Etum vocat orthopnoeam. Quinetiam calidam sentiant* expirationē, idē maxime si erysipelatice particeps ipsa inflammatio fuerit: quāmobrem ubi plurimū efflant, iuuantur, inspirareq; abundanter frigidum aērem desiderant. Spūū uerō ipsū modō hoc, modō alio expūant colore tinētum. Insuper grauitas cuiusdā thoraci incumbens sentium leuēmentum xgri percipiunt, ac dolorem ex imo ad ipsūm peruenire, & ad pectus, & ad spinam. Præterea febris acuta ipsis ad-

Pleuritidis que ad hunc symptoma.

Inflammatio omnino ex affluente sit sanguine. Spūū pleuritico- rum spūū de uersa.

Thoracū partes inflammatae ex purgari per osse rari auctum.

Cerebri ementia per quas purgari auctum. Sed et affectum de quoque possit.

dices esse pleuritici. Quod si rursusendo nihil omnino expuat, fieri potest ut nihilominus pleuritici sit ille quidem, sed inflammationē habeat in eōtā a deō & impactā, ut nihil ab ea foras exire possit. Fieri quoq; potest, ut ob leuapne inflammationē dolor in iam dicta sede excutitur. Ceterum ex differentia pulvis, ex deiectionibus, ex tumore præter naturā, ex granitate & pondere, ac deniq; ex alijs notis, quæ leuapne inflammationē saepe solent accidere, securari affectū a pleuritico licebit nobis discernere. Verū in huiusmodi dispositionibus, solidum firmiter discernendi indicia, per omne tempus morbi, a pulsu sumendum est: deinde tractu temporis, reliqua etiam consideranda. Nam & linguae, & uniuersi corporis color alterat, ubi hepar uisum est. Sicuti rursus thorace affecto, incretior tussis, atq; spūa cernuntur. Distinguentur tamen sunt interm affectus qui primarij dicuntur, ab ijs qui per consensum alijsunt. Nam si in pleuritide nobis peripneumonia delirium aliquod incidat, existimandum est principem animæ sedem, in qua & scientia, & opinio, & cogitatio consistit, consensu thoracici, atq; ob eam necessitudinem affici: in alijs autem affectibus, ut in lethargo & phrenitide, minime consensu, sed labore affectu primario: undiq; uerō affici, ubi propriarij ipsius functionum aliqua oblecta fuerit. Propria enim functiones dico, quæ a nulla alia parte ut intermentum, sunt. Nam reuera & uidere animam, & audire, laudatq; negandum est: sed uidere oculis, & audire auribus. Atqui ut cogitet, reminiscat, existimet, eligat, neq; oculis, nec lingua, nec alia quapiam parte utitur. Vnde quod dux sensus & uoluntarij motus sedem habeat in cerebro: quodq; cerebrum contineat meninges, alibi a nobis est declaratum. Si igitur per solum consensum cerebro affecto, illa pars quæ primitiuo affectu laborat, curata fuerit, primumq; cerebro propria aliqua dispositio eueniat, nullū in ipso accidens relinquet. Quod si ex consensu permansens aliqua in ipso dispositio remaneat, oī solum partem primario affectu, sed capiti quoq; remedia adhibenda sunt. Quapropter exacte definiere, utrū cerebrū, an membranæ ipsius primitiuo affectum, laud magnam utilitatē asserere potest, cum in utraq; dispositione capiti succurratur eadem medendi ratione. Præcipue uerō danda opera est, ut morbi essentia deprehendamus: qua cognita, facile nobis licebit per contraria curationem moliri. Itaq; nō tantū affectum locum, sed causam etiam inferentē noxam, cōsiderare oportet. vt, exempli gratia, delirium est eius actionis symptoma, quæ a loco mentis compote prodit: similiter sopor stupidus: sed a contrarijs causis oriuntur. Siquidem & uigilias, & delirium, causa potestate calida efficit. At quotquot somnolenti soporosis affectus existunt, omnes a frigida causa proueniūt: id quod ex medicamentorū natura planē discere licet. Quippe frigida stuporem soporemq; calida uerō uigilias & uarias motiones inducunt. Tenuis etiam uictus ratio, & uinum meracius, uigilias pariuur, præcipue si uinum ipsum fuerit suapte natura calidū, ut etiā antiquius ualde. Etenim calida causa motum ex-

Interuenit affectus a pleuritico quoniam de se natus.

Hepate affectu alterari uisum corporis color.

Affectus primarij ut qui per consensum accidunt, distinguendi affici. Animæ primarij sedes quibus per se quod per consensum laborant.

Propria functio sensus cerebri quæ ducuntur.

Originalis motus & sensus consistere in cerebro.

Affectum per consensum auctum.

Cerebri & eius membranarum affectibus causis facientes molendo ratione.

Effluuaia morbi in primario est quæque. Cerebri uicem per cerebrum a motu de se. Delirium & uigilias a causa calida auctum. Soporosis affectus a causa frigida.

Vindicta uictus rationis.

*Calida cur uigilias
hinc efficiant.*
*Frigida cur gi-
gnant soporem.*

*Affectus proprii
quando potan-
dum sit.*
*Affectus per con-
sensus quando
datur.*

*Accessione febris
inmoderate, cur
eius correptione
sopore.*

Soporis causa.

cirat, ob id uigilias affert: frigus autē otiosum,
& ad motiones pigrum reddit animal: quā rati-
o ne somnum soporemq; conciliat. Ignari qui hæc
intelligit, cum per ardentium febrium uigorem,
hominem uidet iam febre, & dormire & recte sapere,
in capite nullam propriam esse dispositionē, sed à
febris abundanti calore delirium fieri, pependit.
Quippe tunc affectus proprius purandus est, cum
permanere in parte quamlibet conspicitur. At ubi
pars aliqua simul cum alia sic afficitur, ut irritata
quidem una, altera infestetur uicem hemetibus
remissa uero irratione, quiescat, eam per consensum
affici purandum est. Sic etiam cōringit, ut cum
febrium accessiones inuadere incipiunt, sopore
laborantes grauentur: quod eo tempore cerebrum
sit uehementer refrigeratū, alioqui paratissimū,
ut uoxam eiusmodi libeat, cum nimirū frigidiori
intemperie sit præditum. Gignitur autem sopor,
uel ab intemperie frigida, uel à pinita in cerebro
exuperante.

GALENI PERGAMENI de locis affectis lib. III.

*Remediorū in-
uētiō quæ ex ue-
ra demonstrati-
one paratur, in
iis quæ raro con-
tingunt, longi ex
peritiæ præstat.*

*Affecta sedes ubi
deprehenduntur.*

*Memoriam ex-
actam restitue-
re, quæ sint con-
sideranda.*

Itaque ad cognoscendās affectas sedes, curan-
dos illarum affectus, accurata inquisitione
est opus. Cæterum per artis exercitacionem
comperi, eam remediōrū inuentionem, quæ ex
uera demonstratione oritur, in iis quæ raro con-
tingunt, experientie longè præferre. Nam expe-
rimēta duntaxat scētantes medici, non ea quæ
raro, sed quæ crebro accidunt, memoria & imi-
tatione assequuntur. Quocirca dispositionū ra-
rō cūuenientium, nō solum curationem, sed præ-
uenientes etiam notiones ipsarum, negligunt.
Ego uero semper inuestigare studui, quænam se-
des uel afficeretur ipsa, uel alteri consentiret.
Cumq; eam inuentam esse arbitrer, tunc ad di-
spositionem eius inuestigandam, atq; ex utriq;
totius curatiōis generis indicatiōē sumendam,
ac deniq; remediōrū qualitatē, quantitatem,
idoneamq; materiam comparandam, me accin-
sit: haud neglecta interim, ætatis, naturæ, tem-
poris, regionis, aliorumq; id genus omniū con-
templatione. Deprehendi autem possunt affect-
as sedes ab excrementis, atq; ab iis quæ affectus
partibus adnascuntur, necnon à functionū no-
xia: quibus connumeratur & color præter natu-
ram, figuratq;. Verū ubi nulla mihi patēret aliā
uia, sola functionis lesio fuit satis, ad inueniendā
affectarum particularum.

CAPVT II.

Cū autem exoletam cuiusdam memoriam
restituere conar, primum quidem apud meip-
sum inuestigabo, quænam pars effe affecta, cui
localia adhibere præstidia, prius uidelicet uni-
uersi corporis uacuatione præmissa, quod præce-
ptum est in morbis omnibus obseruandū. Dein-
de, quæ uia & ratione inueniem singula reme-
diorum. Cæterū affectam sedem eam ipsam exi-
stimauī, quæ principis animi uis cōtinetur. Medi-
camenta autem ea adhibenda esse, quæ huius se-
dis dispositioni reuertantur. Cum igitur huius
inquisitionis gratia cōsuluissem epistolam quan-
dam ad Mariū, ab Archigene scriptam, in qua

iubet, deprauata memoria, ratio capiti affigi cu-
curbitulas, nō iniuria sanē inconstantiū hominū
sum demiratus: quod nimirum neglecto corde
(cui memoria ipse, seu opus cognatus tribuit) ad
caput remedia trāserent. Nam quid per immor-
tales deos ex affectōrū locorū notitia (quæ ipse
ad medendi rationē ait maximè necessariam exi-
stere) consequemur utilitatis, nisi ab ipsis ad re-
mediū inueniendū ducamur? Ad hæc, si affectio
10 quæ oblectat memoriam, exultat frigida & sicca,
nullū usum adferat cucurbitulæ ad mortē, siue ex
inca prius curæ, siue integra, administrantur. Si
quidem detracta sanguinis, quæ sit, ubi scarifi-
cata prius curæ fuerit, ad extremū ducit pericu-
lum. At citra ullā scarificationē cucurbitulæ ad-
hibet, solus excitandi caloris gratia utiles esse
censetur: quippe attrahunt ad sese humores ex
imo, id quod magnopere aridæ dispositioni ad-
uersatur. Porro rationalem animæ uim in cere-
bro uirilem, irascibilemque, in corde: appetitiuā
deniq; in iecore sitam esse, nemini nō persuasum
existimo: id qd uel ex uulgaris sermone India
discere licet. Farū siquidē auiat carere cerebro:
timido & pusillanimi, cor deesse. Tityo uero iecur
ab aqua erofum, nō solum potest, uerum etiam
pictores, sculptoresq; fingit. At uerū, quæ
admodum si ratio laxatur, sēpenumero contin-
git laxa memoriā: sic si memoria uitetur, ratio
ipsa quodāmodo etiam labefacta, utpote actio-
nis utriusq; noxa procedente ab eadem disposi-
tione: quæ ubi uelentius intendit, simul cum
memoria ratio quoq; omnino deperditur. Ac ra-
tio quidem affectio stultitia uocal. Sic in lethar-
go etiā, in omnibusq; soporosis affectibus, utraque
simul perditur actio. Quod autē affectus
hi à frigida intemperie oriunt, quæ animales ac-
tiones omniū torpidas reddit, sanē id uel ex
animalibus ipsis, quæ per frigora latere cogniti, sa-
tis liquidō cōstat. necnon ex frigidis tum medi-
camentis, tum cibis. Lactuca quippe graues indu-
cit somnos, si multam quis ipsius quantitatē in-
gesserit. Verū & capitis grauitates, quæ sine mor-
daci uicissitant dolore, somnū soporemq; concil-
liant. quibus apoplegmanismi magnificè opitu-
lari uident. Igitur ut capitis ardor uigilias, sic re-
frigeratio inducit soporem. Item biliosi caliditatis
morbi, uigilias, deliria, pleritides: contrā pitui-
tosi frigiditatis, ignauitatis soporemq; efficiunt. Nam
quod ad uigilias soporesq; per morbos perti-
net, calida frigidatq; intemperies primū sibi facul-
tatem uēdicat: altera uero ab hac, ad humiditatem
ariditatemq; referi. Balneis siquidē, eō quod mā-
defaciant caput, soporiferæ sunt. Nuda secus ui-
ni moderata potio, omnesq; cibi humectantes.
Ex ætatis etiam, pueritia quidem ob humorem
est somnolenta. Senes uero ob ariditatem, uigilias
uexantur. Omnia igitur hæc argumentō esse pos-
sunt, ad animi ignauitatem inducendam, humidita-
tem præter naturā obtinere secundas partes, frigi-
ditatem uero priores. Cæterū ut humiditas sola,
si abundet, longos profundosq; somnos in-
ducit: ita ariditas sola, uigilias. Quod si frigus cū
humore intendatur uehementer, soporē si stupore-
mq; constituit: sine hoc uero memorie nocet,
stultitiāq; inducit. Cū itaque non solum in

*Archigeni in
Epistola à demo-
strato Galeno.*

*Memoria obla-
ta à causa frigida
et sicca, cucurbitulas ad-
ministrari non esse
ex usu.*
*Cucurbitula, sine
scarificatione adhibita, solum
excitandi calori-
is gratia salu-
taria.*

*Animæ facultates
singulas quæ
sedes tribuuntur.*

*Tityo animum in-
iur ab aqua
cor erofum.*

*Ratiōne lesa,
sape memoriam
leui contingit, ut
e conuersa.*

Stultitia quid.

*Frigida intem-
peries, animales
actiones omnes
reddit torpidas.*

*Lactuca soporē
gignit.*

*Apoplegmanismi
quibus affe-
ctibus consistit.*

*Vigilias quæ mor-
bi infertur.*

*Balneis cur sopor
infertur.*

*Vinum modice
sumptum inducit
somnia.*

*Pueri cur somno
liberi.*

*Senes cur uigilias
uexantur.*

*Stultitia unde
oritur.*

frigidiore humiditate, uerumetiam in ariditate & calore, nō parū secundum magis & minus, discrimen sit: nihil mirū, si multifarie inueniantur causæ quæ animales actiones ledere possint. Impraesentiarum autem, clarioris doctrinæ gratia, rationalis animæ actiones, principales: irrationales uerō, morales uocentur. Cū autem bilis sit fieri cōtingat intemperies prædictas, duplex quoque erit utriusque dispositionis modus: unus quidem, in humidis ficiet humoribus: alter in corporibus solidis, si quando in eandem intemperiem cum mollibus, solidæ partes inciderint. Præterea quibus ipsæ intemperies inter se sint contrariæ, * sit tamen ex ipsis interdum mixtum quoddam temperamentū: ut in uigilanti sopore, in quo pituitosus biliosusque humor exuperat. Ita in calida frigidiq; cōtrarietate, eosdem quoque modos inuenire licebit, tum per simplices intemperias, tum per cōpositas ex ambabus. Quod si in solidis corporis partibus mixta ex cōtrariis dispositione fieri fateamur, tres sic prodibunt in utraq; cōtrarietate intemperies. Igitur huiusmodi affectus omnes capiti aduenire solent, sed inter se differunt, nō solum missionis uarietate, aut eo quod magis minusue intendunt, uerumetiam quia interdum afficiunt uentriculi cerebri id genus intemperantius, interdū uerius eius uia, aut humiditas disperfa per corpus cerebri. Accedit ad hæc quartus quoque modus, cū uidelicet ipsummet corpus cerebri intemperatū reddat.

CAPVT III.

Quorum igitur uel memoria, uel intellectus perit (intellectus enim amissio, stulticia est) somno non obseruare oportet. Præterea, utrum excruciant quippiam, uel ex naribus, uel ab ore, quod à capite deliatur: an arida huiusmodi partes sint. Quippe ex his dispositione ipsam consequi coniectura poterimus. Vbi igitur uel perit, uel grauius læsa est memoria, frigida est omnino intemperies cerebri: quocirca callescere ipsum oportet. At uerō excicare, uel humectare, nō necessarium est: sed si humiditas copuletur, arescere: si ariditas, madefacere. Cæterum si inter hæc medium obtrinet, ipsum est seruandū. Interdum uerō ubi principales actiones sunt læsæ, febris quoque accedit: ut in phrenitide & lethargo. Interdum sine febre adeit uitium: ut in mania, & melancholia: id quod modò per cōsensum, modò primaria affectione cerebro laborante, accidit. Et enim ubi propriis accidentibus exprimitur huiuscemodi uitia, permanentia sunt, nec alijs præcedentibus superueniunt, primogenia dicuntur esse. Vbi uerō propriis accidentibus minime limitant, nec perpetuo permanent, atque alias affectiones sequunt, per cōsensum ipsa euenire dicimus. Nec interim latere non debet, ubi quis lege cōfortij afficitur, stare adhuc affectio, quod deletis efficietibus eam causis, ipsa quoque simul deletur. Sin autē consentientes partes permanent iam habent dispositione, quæ causa efficiens cōquiescat, ipsa tamen permanebit affectio. Quod autē in cerebro cōsistant omnes principalis animæ uirtutis affectus, pro confesso habet omnes medici, qui studio ueritatis tenent: sicut & quod omnes nerui qui uolūtatē imperio au-

diunt, à cerebro ducant originē. Cōuulsiō siquidem uniuerso corpore, omnes profecto autumant, talem quampiā affici partē, quæ ut in arbo re caude ramorū, sic ipsa sit cōmunis omnium neruorū origo. Si igitur partes omnes quæ infra faciunt sitæ, cōuulsiæ sint, primas spiniales medullæ partes affectas esse putandū est, ac proximè illis opitalandū. Si uerō simul cum uniuerso corpore facies quoque cōuulsa uideatur, * uō modò spinialis medullæ exortum, sed etiam cerebrū ipsum, à quo nerui faciei oriunt, curamus. At uerō si crux tantū, aut altera manus cōuulsiōne tenetur, totius membri cōuulsiō neruorū, qui ad ipsum feruntur, principij affectū esse declarat. Cæteriū cum omnis motus à uoluntate profectus, attractus musculi in cas quibus innascunt partes, fieri uidet: nec fieri possit attractio, nisi ad eam originē retrahatur muscularis, cōstat cōuulsiōne in cōuulsiis partibus factam, hac sola ratione à motu naturali differre, quod præter uoluntatē sit. Porro ipsam cōuulsiōne neruorū, ob plenitudinē uel inanitionē fieri, quæritissime professus est nobis Hippocrates: id quod uel si fidelis instrumentorū (quæ ob utranq; intemperiem ambientis aëris, humidam nempe & aridā, adeo tenduntur ut disrumpant) liquidō cōstat. Si igitur cōuulsiō fiat uel à labore, uel uigilijs, uel tunc, uel solitudine, uel anda æstuantij sebre, qualē est uidere in phreniticis, causam eius ariditatem, inanitionemq; recte putaueris. Sin uerō temulento cuiuspiam, ac omnino pleno homini cōuulsiō accedat, nō ab re ipsam à contraria causa iudicabis ortum habuisse. Atqui in inanitione contraria est repletio. Iam cominalis morbus cōuulsiō est omnium corporis partium, minime quidem perpetua (ut in emprosthoro, opisthorono & terano) sed quæ ex temporū accidit intervalis. Nec solidū hac re, sed mentis quoque & memoriæ, ac sensuum obliuio, à iam dictis cōuulsiōnū generibus differt. Vnde constat in cerebro hunc affectum consistere. Cæteriū uelox eius discussio, crassum humorem spiritus maris in cerebri uentriculis obstruente, hunc maxime affectum uentriculis declarat: neruorū principio seipsum quantē, quod excutiat id quod inest. Itaque non ab ariditate, inanitioneue, sed à crasso & uiscido humore, impediens animalem spiritum, quo minus deferatur in corpus, hanc affectionē gigni, argumento est, quod subito & fiat, & soluitur. Siquidem breuis tempore fieri nō potest, ut uel cerebrum, uel tenuior ipsius membra, ad tantam ariditatem perueniat, ut corio simile quippiam pariat. In corpore itaq; cerebri, anima suam sedem sortitur: in quo etiam sit tum ipsa ratiocinatio, tum recordatio sensibilibus imaginum. Primū autem instrumentū ipsius animæ, tum in sensibilibus actionibus uniuersa, tum in his quæ à consilio & uoluntate proficiunt, spiritus est animalis, qui in cerebri uentriculis continetur, sed præcipue in postremo: quoniam nō contemnendus sit medius uentriculus, quæ amplecti multis rationibus cogimur, ut duos anteriores deferre. Satis tamen fuerit ad curandonem, nosse sedem affectam esse ipsū cerebrū: atq; in eius uentriculis humorē crassum & uiscidū cō-

Neruum omnis à cerebro duci aut gustus.

Cōuulsiō quoque differt à naturali motu.

Cōuulsiō sit ob plenitudinē uel inanitionem.

Epilepsia est cōuulsiō uiciorū corporis, quæ ex temporum accidit intervalis.

Epilepsia consistit in cerebro. Epilepsia uidebitur.

Anima collocata in ipsius cerebri corpore, ut quæ sit ratiocinatio, tum in sensibilibus actionibus uniuersa, tum in his quæ à consilio & uoluntate proficiunt.

Anima primam organum, est animalis spiritus, qui in cerebri uentriculis continetur, sed præcipue in postremo.

Affectus principales. Affectus morales.

Vigilanti sopore.

Caput quatuorplex afficit.

Stulticia est intellectus amissio.

Memoria ex læsa, uel grauius læsa, causam esse intemperiem frigidā cerebri, quæ calescit ad gli.

Affectus primogeni sunt permanentes, nec alijs præcedentibus superueniunt, primogenia dicuntur esse.

Anima principalis facultatis affectus, consistit in cerebro.

prehendi, nunc pituitosum, nunc melancholicū. Pituitosum in pręsentia humorē appello, in quo humiditas frigiditatis: ut melancholicū, in quo siccitas & frigiditas dominatur. Ac pituita quidem unum genus est, quod quotidie uel screando, uel uomendo, emungendo educitur, uaporoso spiritu pleni, ut ne sensū quidem lateat ipsam esse dissimulare. Alia uero pituita, similis quidem uidetur, licet fortassis nō similis existat: qualis est nunc crudus humor, qui in urinis subsidet: tam in qui a Praxagora vitreus uocal. Ex quo genere uidetur esse & salua, quę neque fluida admodum sit, neq; aquosa. Verū salua nō unica duntaxat qualitate gustum solet afficere, nedum uniuersam pituita. Sic atra bilis quoq; ob substantię uarietatem nō obscuras differentias sortitur. Nam alia est ueluti trax sanguinis, quę admodum spissa existit, facibus uini haud ab similis. Alia uero, q̄ superior efficitur est multo tenuior: atq; uomentibus ipsam & olfacientibus uidetur acida. Hęc etiam attolunt in bullas terrę, campis radit, atq; fermentat. At illa quam feci uini similem esse dixi, in terrā effusa nō inducit feruorem, nisi fortē in ardenti febre ipsam pręfassa cōtingat: nec ulla etiam acida qualitate participat: quare iudiciū meo potius melancholicus aut succus aut sanguis, q̄ atra bilis, dicenda est.

Igitur ut crassius pituita succus, ita hic quoq; comminatus murib; solet effigere, ubi in meatibus uentriculorū cerebri retinetur, siue in medulla sit, siue postremus. Vbi uero in ipso cerebri corpore abundat, eam insanire speciem, quam Gręci uocant melancholicam, inducit. Quęmadmodū aliter atrę bilis succus, qui pręfassa atra bile nascitur, serina gignit deliramenta, modō cum febre, modō abique illa, in cerebri corpore abundans. Atq; hanc ob causam plenitudo nonnūq; est mitior, ubi ā pallida bile ortū traxit: interdū uelut mētiō, ubi atra bilis eam peperit. Deliria autē quę per febriū uigores accidunt, nō propria cerebri affectione, sed per cōsensum fiunt. Quā obrem sic delirantes, minimē appellamus phreneticos: quia phrenitico infans nū quiescit mirigato febrium uigore. * Quęmadmodū igitur phreneticorū febris, unū quoddā ex symptomatibus dispositionū cerebri iudicat, sic ardentū febriū symptoma delirij est: quod nimirū sit elatis ad cerebrū malis uaporibus * calidis. Haud secus gignitur ea affectio, quę suffusioni est per similes, ā uentriculi dispositionibus ortum trahens. Nanq; uentriculo cerebri, cerebrolū uentriculus, suās affectiones trāsmittit, idē propter neruorū ā cerebro ad os uentriculi descendentiū magnitudinē: per quos etiā sensus luic particule, q̄ illi reliquarū corporis partiū, acutior est. Quocirca fracturas quidem capitis, ubi ad membranas usq; perueniunt, biliosus uomitus: capitis autē dolores quomodocunq; fiant, nauſea stomachij morbus consequitur. Hypochondriacas uerō & flatulentas uocatas affectiones, melancholica comitat tristitia: haud secus q̄ acutę febres delirium, & * nonnullas oris uentriculi dispositiones, affectio suffusioni per similes. Sic neruorū partibus inflammatis, promptius q̄ reliquis, delirij superuenire solet: idē ascendente

ad caput, interdum per cōtinuas partes solo calore, interdum spiritu uaporoso, uel fumo, uel fuliginoso.

CAP. IIII.

Igitur crassi humores qui in cerebri substantia abundant, interdum ei ueluti instrumentali, interdum ut similari nocent. Cū enim merus obstruuntur, ut instrumentali: cū uerō alteratur temperamentū, ut similari. Proinde rectē ab Hippocrate dictum est: Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiunt: & contrā, morbo comitiali laborantes, melancholici euadunt. Atque horum utrumlibet magis accidet, prout uel in hanc, uel in illam partem infirmitas repit. Si enim in corpus, epileptici: si uerō in mentem, melancholici euadunt. Cū autem non solum ab atra bile, sed etiam ā pituita morbus comitialis oriatur: sciendum est, solum eum qui ab atra bile ducit originem, in melancholicam transire posse. Etenim cū anima ipsa, aut temperamentum actiuarum sit qualitatū, aut ab ipsarum temperamento mutetur: bilem ipsam ubi cerebro, ueluti parti instrumentali, nocet, ad cerebri corpus conuerti ait: id quod in obstructionibus fieri constat. Cū uerō temperamentū mutando, ei ueluti similari nocet, ad mentem eam repere dicit. Accidit autem cerebro, ut nonnūq; uniuerso in uenis sanguine melancholico effecto, ob cōmune utrum, ipsam quoq; ledatur. Nunquid uerō, totius corporis sanguine prorsus innocuo, solus is qui in cerebro contentus est, alteratur: idē bifariam fit. Aut enim aliunde in ipsum deriuatur, aut in ipsomet melancholicus humor genitus est, cū uidelicet internus calor aut staua bilem, aut crassum atrumq; sanguinē superaffusa. Si igitur uniuersum corpus redundet melancholico sanguine, curationem ā uenę sectione auctipari oportet: si uerō cerebrum tantum, exger tunc (quod ad hanc dispositionē pertinet) sanguinis detractio non indiget: quous ob aliā causam sanguis detrahi possit. Verū uerō melancholicus sanguis uniuersum corpus, an solum cerebrum occupet, sic discernendum est. In primis uniuersi corporis habitum, qualis nam sit, accuratē consideres uelim: meministi q̄, quod molles, & candidi, & obesi, nequāq; humore melancholico possident. Macri uerō, & nigri, & hirsuti, & quibus late sunt uenę, aptissimi sunt, ut huiusmodi in ipsis humor accumuletur. Firij interdum, ut * admodum rubicundi, affatim melancholicum temperamentum cōtrahant: atq; post hos etiam flauī, si præcipue uigilijs, & multis laborib; & solitudine, & tenui uictu educati fuerint. Cuius generis etiam hæ notę existunt: si hæmorrhoides aliqua sit restituta, aut cōueta aliqua sanguinis euacuatio: aut usus fuerit æger cibis melancholicis succi. Porro qui sanguinem melancholicum gignunt, hi ferē sunt: caprina bubulajq; caro, magisq; lircinę & taurinę: sed maxime asinorū & camelorum carne: uerū uulpinę & caninę. Magnū ad huiusmodi sanguinis generationē momentum adfert etiam * leporis esus, sed multo magis aprorū. Limes quoq; sanguinē melancholicū pariant, si frequens sit eorum usus. Præterea omnium animalium terrestrium carnes sale conditę: necnō

Cerebri quando afficitur ut instrumentum, & quando ut pars similis.

Melancholici magna ex parte epileptici sunt, & e converso.

Atra bilis quando in cerebri corpore, & quando in anima repit.

Melancholicus sanguis in quibus membris habet, & in quibus omnium maxime accumuletur.

Cibi melancholicum succum gignentes.

Pituita dissimulata.

Atra bilis spissa.

Epilepsiam fieri ā crassa pituita, uel ā melancholico succo uocato in meatibus uentriculorū cerebri.

Melancholicus de uenarum, Mena canis.

Phrenitidis diffinitio.

Phrenitico infans quomodo ab ardenti febre delirio differt. Delirium ardentem cum febre quomodo fiat.

Oris uentriculi uisus acutior sensum quā reliqua corporis partibus.

Constitutiones atq; necessitudines cerebri cum uentriculo, rade innotescit.

Hypochondriaci afflicti quomodo fingantur.

aquatilium carnes, ut thunni, balenæ, uinali marini, delphini, canis, atque cetaceorum omnium. Ex oleribus autem, brassica ferè sola, gignere sanguinè id genus confuevit: quemadmodum & arborum germina, ubi uel muria, uel oxyhalme condiuntur, præcipuè lentisculi, terebinthi, rubi, canirubi. Leguminum uerò omnium maxime lentes inter melancholicos cibos annumerantur: mox fursuraceus panis, & qui ex rypha & uitiatis feminibus factus est. Præterea uina crassa, nigraque, aptissima sunt, ut ex ipsis humor melancholicus fiat. Verus etiam caleus, si supercalfactus in ipso corpore fuerit, facit huiusmodi humorè procreare. Sunt etiam nonnulli, qui per febriles morbos contraxerunt melancholicū succum. Ad efficaciorē autem notitiā, nō parū confert anni tempus, ac præterita præsensque ipsius constitutio: necnon regio, & laborantis ætas. His itaque omnibus præ-

Veni modum
in cubito per-
dendū qd effi-
quod sanguis me-
lancholicus ab-
ducit per uenas
sua corpora loca
bitum.

meditatis, si existimas in uniuersi corporis uenis contineri sanguinem melancholicū, quō certiorē habes notitiā, cubiti uenam secā, præcipuèq; mediam, quæ cōmunis est, & ei quæ humeralis dicitur, & ei quæ per axillam ad manum fertur. Quod si tum fluens sanguis nō uideatur melancholicus esse, supprimatur cōfestim. Si uerò talis appareat, uacua quantum pro laborantis corporis habitu satis esse coniecieris. Est præterea tertium melancholicæ generis, morbi comitalis exemplo, ubi ortum à uentriculo suscipit: solentq; medicorum nonnulli hanc dispositionem, hypochondriacā, flatulentimq; morbum uocare. Quem sanè (ut Dioscori testatur) sumpto cibo concoctu difficili, statim ructus à cidus comitatur: cum eolg status & ætus. Ad hęc fluctuatio in præcordijs, non nō alio, sed ubi cibos uenter complexus fuerit. Interdum etiam uentriculi ne hementēs dolores, qui nōnullis ad dorsum usq; extenduntur. Cæterū ægri cibis concoctis quiescunt: moxq; alijs ingestis, eadē reuertuntur symptomata, quæ interdum ieiunio, interdū etiam à cœna affligunt, ita ut ægri uomant cibos rudos, & piruitam subamarā, calidamq; & adeo nonnunq; acidam, ut dentes torpere uideantur. Atq; horū plurima statim ab ineunte ætate eueniunt. Ut cuiusq; tamen acciderint, omnibus protelantur. Cuius morbi causam, calorē immoderatarum uenarum melaericarū, obstruccionemq; earundem, à crasso sanguine ortam, idem Dioscori assignat. Videtur autē in ipso uentriculo per huiusmodi affectus, infirmario quædam consistere: sanguis autē in parte inflammata contentus, & crassior esse, & atra bili similior. Quo quidem exhalante ad cerebrum, melancholica eueniunt circa mentē symptomata. Frequentissimè etiam uidemus, flaua in uentriculo bile contenta, caput dolore affici: illa uerò electa per uomitum, alio doloře compescit. Atq; inter optimos medicos conuenit, nō solum hæc accidentia, uerum etiam epilepsiam, aliquando capiti à uentriculo oriri. Cæterū melancholicos ut nunq; deferat timor: ita eorū phantasmata præter naturā, non semper eodē genere cōtinentur. Siquidē alius se teitā factum purauit: atq; idcirco obuiantibus cedebat, ne collideretur. Alius, ne Arta, qui mundū sustinere dicit, grauatus sub tanto one-

Hypochondriaca
ac flatulenta
melancholia quæ
à uentriculo ori-
tur signa.

Hypochondriaca
melancholia
causa.

Epilepsiam ali-
quando oriri
à uentriculo.

re, illum à sese excuteret, atq; ipse cōmueretur cum eo, pertimesceret. Differunt porro inter se melancholici: nam omnes timent, merent, uitā damnant, odio habent homines, sed nō omnes mori cupiunt. Quippe hoc ipsum nōnullis melancholicæ caput exiit, quod pertimescunt mortem. Sunt qui simul & mortem metuunt, & mortem sibi confiscant. Quemadmodū igitur extet nā tenebræ pauorem inducunt, sic atræ bilis color, mentis sedem tenebris funilem reddens, timorē efficit. Siquidem tum humores, tum ipsa temperies corporis, possunt animæ actiones mutare, id quod à nobis est demonstratū in eo libello cui titulus est, Quod mores animæ corporis temperiem sequantur. Ergo si circa uentriculū prima inceperint ipsius morbi symptomata: quibus auctis melancholica sequat affectio: deinde alii denecbione, uomitu, proba cōfusione, ructibusq; leuetur is qui laborat, hypochondriacā statuofumq; ipsum morbū uocabimus. Accidentia uerò ipsius dicemus & mentiam, & merū. Vbi uerò propria melancholicæ accidentia esse auctiora uidentur: circa uentriculū autē aut nulla, aut perexigua cernunt: haud ab re existimaueris, primum in cerebro affectionem consistere, ob atram in ipso bilem cōgestam. Quem morbum minimè inuenerat, frequentibus balneis, uiscig humido & boni succi, nullo alio prædicto adhibito, ipse aliis curauit. Nam ubi diuturnus ipse morbus est factus, fortiora remedia postulat.

Melancholia
omnemq; de-
re comit.
Melancholicus
strenuus uita.

Atra bilis ueni-
mentis causat.

Hypochondria-
cus morbus qui
diuturnus.

Melancholia
reueret qui re-
bus rationis co-
raria Galen.

CAPUT V.

Morbis comitalis, similiter ut melancholia, tribus clauditur differentiis. Verū omnibus cōmune est, quod afficiunt cerebrum, siue primaria affectione, siue consortio lege. Prima igitur differentia exiit, ubi affectus in ipso consistit cerebro: id quod pluribus epilepticis accidit. Secunda, ubi ab ore uentriculi per cōsensum dispositio ascendit ad cerebrum, quemadmodū per suffusiones contingit. Tertia deniq; sitzard, cum à parte alia quas ipse affectus incipiens, inde, sentiente id ægro, ad cerebrum usq; perperat. Quale genus morbi ipse à bluc adulescens primum uidi in puero tertiumdecimum ætatis annum agente: qui sanè narrabat, dispositionē ipsam à crure initium capere: mox illinc rectā ascendere per femur & eminentes ei lumbos, ac per latus id, ad ceruicem, donec perueniret ad caput: quod cum primum tangeret, ipse huiusmodi sibi consistere. Interro gantibus autem medicis, quale esset quod ferebatur ad caput, nihil habuit quod responderet puer. Alius tamen compos mentis dicebat, ueluti frigidam quandam auram existere. Vnde ex duobus alterū Pelopi præceptorū placuit: aut quod qualitas quedam, alteratis per continuationē partibus, aut spiritalis substantia transmitteret. Nec mirandū esse dicebat, tam ualidam uim esse humoris, in affecta particula præter naturā genito, ut cum per nociofarum ferarum uenens componi posset. Etenim ubi pluzalangium momordit aliquem, quous paruū existat animal, existimare tamen debemus, uenēū ex ipsis ore, primō quidem in superficiem, dein uerò in totū corpus deferri. Præterea maris tururis, sicut & terreni scorpionis aculeus,

Epileptici
feruntur.

Cura huius
epilepsia habet
sequat. reser.

Pelopi Galen
præceptor.

Phalangium
non
fuit.

Tortura mor-
tuorum aculeis.

Scorpionis aculeus.

Scorpionis venenam refrigerare

Ita a venenatu bestie particula quomodo sint curanda.

Apoplexia convulsiones quam obrem fiat et afflicto per os fingum.

Singultus quomodo excutitur.

Convulsus epilepticus causa.

Lethargus. Apoplexia causa.

Apoplexia occipite, periculi magnitudo ex incunctis respiracionis colligi debet.

Nervi ardeant a cerebro, maxime lufi principum motus largiantur.

Soporose afflicti omnes causi fiunt in cerebro.

aculeus, quibus in extremam illam acutissimamque partem finiatur, ubi nullum foramen est, per quod venenum deici possit: necesse tamen est, ut ex cogitemus substantiam quandam inesse illi, aut spiritalem, aut fluidam, quæ ut mole minima, ita facilitate est maximæ. Siquid enim cum nuper fuisset quidam ietus a Scorpione, videor mihi esse (inquit) percussus grandine: eratque omnino frigidus, frigidusque sudore persusus. Quippe ubi ex ista parte per totam ipsam celeriter distributa fuerit venenitas, contingit eam, eodem rursus contraria, in singulas subsistat ei partium recipi: mox ex illis in alias cōtinuas, donec in aliquo pervenerit principem: quo tempore, mortis periculum instat. Ad hanc rem in primis conferunt vincula paribus superius insecta, absconditque partium venenatarum. Nō qui eodem rusticum, qui epoto è uiperis medicamentis, rescisso prius digito, easit: sicuti et alii quendam, qui sola sectione, citra medicamen est liberatus. Sed epilepticū illum puerū medici quogue sanarūt, primò quidem uniuersum eius corpus purgantes, dein medicamen ex thapsia & sinapi, parti primò affectæ adhibentes, ac supra illam medium membrū ligantes. Quod uerò ad causam pertinet, ob quam in huiusmodi per cōsensum affectibus, epileptice cōsultationes fiant: probabile sanè mihi uidetur, quemadmodū frequentissimè singulū fieri uidemus affecto stomacho, ita hanc oriri dispositionem. Etenim cum uentriculus ciborū mole grauiatur, aut ubi à corruptis cibis mordicus infestatur, singulū haud dubiè corripitur. Imò uerò acris humor ipsum uentriculum mordicans nō singulū modo, sed cōuulsione etiam, per uniuersum excitat corpus. Quo eiectione per uomitum, illico cōuulsio sedatur. Quo minus mirandum est, si neruorū principii motu huiusmodi concutiantur, ut à se expellat, quicquid fuerit id, quod à parte primò affecta, ad ipsam transmittitur. Vbi uerò deperdit sensu quis cōciderit, nō accidente motu, quo uel cōuelli, uel salire uideatur, affectum ipsum oriri à frigore censeo. Quo in genere continet lethargus. Apoplexiæ autē, quod subito eueniat, aut frigidum, aut crassum, aut uiscidū quippiā, quod asitum principes cerebri uentriculos impleat, nō torius substantiæ intemperie, causam esse, est perspicuū: ueluti lethargi, phrenitidis, manix, melancolicæ, stultitiæ, amissæ memoriæ, sensuum hebetationis, & resoluti motus. Porro in omnibus his affectibus, in quorū numero apoplexia cōtinetur, periculi magnitudinē ex nocimento respiracionis cōgere oportet. Siquidem in cunctis soporosis affectibus, etsi corpus nec moueatur, nec sentiat, sola tamen spiratio, quæ muscularū * thoracē uentilū est munus, seruatur. Porro muscularis uniuersis, principum morbus ab innatis ipsis neruis accedit, qui à cerebro initium primariū sortiuntur. Quamuis enim ex medulla spinali permulsi oriri nerui uideant, ut tamē quamlibet illa, cerebrum ipsi omnem suppeditat. Cum itaque spirationem uelēmētē impeditam cōspexeris, nō paruum in cerebro moribundā dispositionē esse coniectis, præcipuè in soporosis affectibus, qui omnes consistunt in cerebro.

CAPVT VI.

Affectus uertiginosus siue primariū, siue lege confortij accidat (quod solet ob cōsensum uentriculū) ad cerebrum ipsum pertinet. Quo detenti, uel à minima occasione lieberant, adeo ut interdum cadant, si uel ipsi unico duntaxat circuitu in gyrum agantur, aut quippiam aliud circuitoriarū uiderint. Est autem rationi cōsonum, huiusmodi affectionem fieri, elato per magnas illas arterias, quæ plexum retiformē constituunt, uapido calidoque spirante, atque cerebrum ipsum replente. Fieri etiam potest, ut inæqualis intemperies cerebri, huiusmodi spiritum gignat.

Vertigo et cerebri pertinet.

Vertiginis causa.

CAPVT VII.

Cephalæa (qui affectus ad cerebrū etiam pertinet) est capitis dolor diuturnus, difficulterque solubilis, qui à parua occasione uelēmentes possidet accessiones, ita ut qui eo torquetur, neque spiritum, neque uocē, neque luminis splendorem, neque mortū perferre possit: sed tranquillitatē, obcurumque cubiculum querat, idque ob doloris uementiam. Ad hæc, accessiones huiusmodi, ueluti in comitali morbo, intermissiones habent, interceditque tempus, quo perfectē liberari uidentur ægri. Dissert autē à cephalalgia, quod in hac nō uique adeo imbecillæ reddant partes affectæ, ut in cephalæa, licet in utroque affectu caput minimo negotio afficiat. Sunt tamē nonnulli, quibus caput apertissimè est ut impleatur: atque uniuersi quogue corporis habitus ad ipsum implendū idoneus. Alii, omnes capitis partes aptas habent, ut afficiantur. Quibus, ubi uisio uictu urantur, accidit ut cephalæa arripiantur. Quo minus mirandum est, si horum alijs membranis cerebri continentes, dolore afficiantur, alijs pericranij duntaxat. At quibus intra caluariam est dispositio, ipsæ ad oculorū usque radices, ipse dolor extenditur: quod nimirū à cerebro, & ab utraque membrana, necnō à uasis quæ in ipsis sunt, ueluti germina quedam illuc deducant. Sed & eorū quibus dimidia capinis pars dolore infestatur (uocantur autē ij hemicranici) alij extra caluariam, alij in capitis intimis partibus dolore percipiunt. At uerò dextram capitis partem à sinistra distinguunt futura per longitudinē ipsius exportectā. Sub qua, intra capitis ossa, linea mediū cerebri diuidens manifestē protenditur: ad quam etiam peruenit anteriorum duorum uentriculorū septum. Ea porro corpora suapte natura idonea sunt ut ipsi caput impleatur, in quibus uapores calidusque spiritus gignitur: aut quibus biliosa excrementa cumulat in ore uentriculi. Atqui spiritus, dolores tenuesque pariunt: biliosa excrementa, dolore mordaci afficiunt. Dolores à plenitudine inducti, grauius sensum præ se ferunt. Quod si rubor adsit & calor, calidos in causa esse humores est signū. Sunt quibus caput assidue dolet, ubi uel liberalius umō ingesserint, uel meracius: idque magis, si suapte natura calidū fuerit. Præterea intimi odores omnes, atque in uniuersum odorata omnia, capiti dolorem conciliant. Nonnullos autē ob sensus exuperantiam dolor infestat: quemadmodū in ore uentriculi accidit.

Cephalæa quid sit.

Cephalalgia et cephalæa differentia.

Caput intra caluariam dolens, biliosus, rigens ad radices oculi rursus extenditur.

Hemicranici qui dolent.

Caput quod impleatur facit.

Odorata omnia conciliare dolorem capitis.

CAPVT VIII.

At uerò si aliquādo per totū corpus, neruorū

Suffusio quomodo differat a vaporibus ad oculi et reserui cule clata.

forum uisus similia. Ceterū uisū ob humorum in uentriculo contentorū uinum oborta, utrique oculo similiter accidit. Quæ uerō per suffusiones apparent, nec incipiunt simul in utroque, nec similiter. Præterea, si tribus quatuorue mensibus suffusionis accidentia apparuerint, pupilla autē pura splendidaq; cernatur, at uero uentriculi nati affectum ne dubites. Si uerō non ita multum temporis intercesserit, querendum est in primis, num ex quo incipit affectus, singulis diebus 10 perpetuo hæc apparetur perleuerarit. Nam assiduitas suffusionē portendit: intermissio autem, quod malum à uentriculo prodierit, suspitionē excitat. Idē magis, si perfectē quis concoquens, nullū sibi uisum apparere fateatur. ac multo magis, si cū apparuerint tales imagines, mordicus in ore uentriculi doluit: maxime uerō, si post hæc, uenendo electa re mordente, mitigata accidentia fuerint. Quinetiam si à uentriculo symptomata id exoriantur, medicamine ex aloē po 10 tui dato, minimo negotio curatur, accedente simul proba coctione. Vbi uerō altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut nō exactē pura conspiciat, suffusionis esse initium censendum est. Similia quoque suffusioni accidentia in quibuscūq; phrenitidis speciebus (affecto scilicet cerebro) sæpenumero euenire solent. Sunt etenim phrenitici quidā, qui de his quæ oculis offeruntur, rectē (quantū ad sensitiuum noniam pertinet) iudicant: cogitando uerō, à naturali iudicio aberrant. Alii rursus, cogitatione quidem salutarum minime, sensibus tamen hallucinantur: id quod mihi olim congnisse uidetur, cum ardenti febre laborans, & illo coos uellem, & in uentibus festucas colligerem, idē animo constans. Sunt præterea qui simul sensus & cogitationis uirno laborant. Porro ubi in cuiuspiā cerebro biliosus succus abundat, accedit febris ardens, ab illo oritur tunc fumus, ueluti in lucernis ab oleo: qui, per uasā quæ ad oculum tendunt, delapsus, carū 40 imaginum in ipis esse causa censetur.

CAPV II.

In lingua etiam, interdum morū ipsius, interdum sensum, interdum uinari quoque tactum cōtingit. Non tamē alio gustus, atq; alio tactus neruo utitur. Si quidem nerui à tertia coniugatione orti, qui in linguæ pelliculam disseminantur, nō solum tangendi, sed gustandi etiā uim obtinent. Crebrius tamen læditur gustandi quā tangendi facultas, cum ad gustum exacto iudicio sit opus. Etenim tangendi sensorium, crassissimū: ut cernendi, tenuissimū est. Auditus uerō sensoriū, ut in tenuitate à uisu, ita sensoriū gustus in crassi 50 rudine, à tactu secundum locū obtinet. Olfacien di uerō sensorium, in illorū quatuor medio consistit. Igitur cum posterior cerebri pars tam dextra quā sinistra afficiatur, ne apoplexia hominem rapiat, timendum est. Vbi autem altera tantum, in paralyisi finiri solet: quæ interdum alteram solum linguæ partem moru destituit, illa solum ipsius tum gustu, tum tactu: interdū partes sub capite constitutas, modō has, modō illas. Cū autē à parte anteriore cerebri facies suos neruos recipiat: à posteriore uerō omnes partes quæ sub capite sunt: à qua etiam oritur septima coniuga-

Lingua recipit ab eodem neruo tertia coniugatione, qui in illam descendunt, simul gustu & tactum.

Sensoria, quæ quibus sensibus sunt crassiora, aut tenuiora.

Facies uide sunt nerui recipit.

tio neruorū, qui inserti in mūsculos lingue, uoluntarium illius motū perficiunt: non ab re quidem anteriore cerebri parte altera affecta, sola linguæ morio uitio carebit: reliquæ uerō faciei partes omnes, in altera parte, dextra aut sinistra, sensu & uoluntario moru destituent. Quemadmodū si afficiat posterior pars cerebri, reliquarū partū faciei in eodem simul & moru & sensu, solius linguæ motus uitabit. Quod si aliquando tota anterior cerebri pars afficiat, supremū ipsius utrūq; ei cōsentire necesse est: atq; cogitandi quoque actiones uitari. Proinde qui ita est affectus, nec sentit, neq; mouet: spirandi tamen facultas haud quāq; in illo læditur: uocaturiq; hic affectus caror, siue sopor. Quis uehementer inspirationē op 10 primat, apoplexia nominatur. At soluta apoplexia creberrimē solet paralyisi succedere. Sopor uerō finitio, magna ex parte bona ualerduo subsequitur. Fit autem sopor, Hippocrate autore, affectus mūsculis temporis, atq; in acutis morbis. Inter soporē & apoplexiam, morbus comitalis est mediū, conuulsionē uni uersio corpori inducens: sed in paralyisim non definit. Quorū trium morborū, frigidus, crassiusq; ut atq; omnino uiscidus humor est causa. Verūm & in sopore, & in morbo comitali, uentres magis, cerebri corpus minus: in apoplexia uerō, corpus magis affici solet. Atq; in sopore anterior pars magis, in apoplexia & morbo comitali utraq; afficitur. In catalepsi & uigilanti sopore, posteriora cerebri magis læduntur. Quum autem esse aliquo terebra perforato, mediū uentriculus fuerit attritus, is por hominem occupat, sed neq; cōuulsionē, nec difficilē inspiratione oborta: hæc enim apoplexia, illa morbo comitali est affinis: laud secus q; catalepsi, soporū, seruata secundum naturam spiratio. Verūm ut in sopore clauduntur palpebre, ita in catalepsi manent aperte. Iam uerō uehementēs dolores sopor sequi consuevit, cōcedente uidelicet robore animalis spiritus, quod primum animæ instrumentū exiit in uentriculis cerebri: indeq; fluens per neruos defert motum & sensum in uniuersas corporis partes. Igitur affectum linguæ, alij quidem illi cōmunes sunt, 20 ob cōmercium quod habet cum cerebro & neruis. alij ipsius duntaxat proprii sentiunt. Quæ admodum ergo consortij lege, per septimū neruorū coniugationē motus ipsius uitatur: si sensus impediri potest per tertiu, quæ & mollis est, & in pelliculā illius, sicuti septima in mūsculos, disseminatur. Quod uerō ad proprios illius affectus pertinet, sicuti mūsculorū eius, ut simulariū, intemperantie motum impediunt, ita ambientis ipsam extrinsecus membrane intemperies, & tangendi & gustandi simul sensum uitat. At instrumentalium affectionū speciem & referunt in inflammationē, scirrhi, ordematā, erysipelatā, sup 30 puraciones, & alia id genus: de quibus, quæ uisus & tactu discerni possunt, nihil in luce cōmentarijs dicemus. Vt autem de ipso auditu nōnihil inseramus sermoni, si illuso apparente auris sonamine, sola audiendi facultas læditur, neruum propriū esse affectū, licet existimare. Vbi uerō reliquæ faciei partes simul cum functione audiendi lædunt, in cerebro esse dispositionē præter na-

Caror Sopor.

Apoplexia soluta, i. uel paralyisi succedere.

Sopor fit astrictu mūsculis temporis. Epilepsia.

Cerebri corpus magis afficitur in apoplexia, quā in morbo comitali, & sopore: in his aut uentriculus magis.

Catalepsi dentis dormitus aperte palpebre. Sopor consuevit sequi robustiores delat.

Animalis spiritus est primum instrumentum animæ.

Lingua proprii morbi quæ sunt.

Audiendi facultas uide possit lesionem accipere.

*Nervorum ter-
tia coniugatio in
quas partes di-
stribuatur.*

turam, est utrimusque ipso uel ut similari, uel ut in
strumentali parte affecto. Memineris aut uelim,
temporū maxillarumque musculis, item labris &
nariū pinnis, sensum & motū: linguæ uerò, omni-
nibusque oris partibus, sensum duntaxat, à tertia
cerebri coniugatione oriri: à secunda, oculorum mu-
sculis motū, ut à prima, oculis ipsis cernendi sen-
sum suppeditari. Vbi igitur uniuersæ particulae,
quibus à tertia coniugatione inferuntur nervi, obli-
scantur in altera tantū parte uidentur, cōmuneu nervū
primariū affectū esse putandū est. Se uerò utraq;
simul partē igitur cōtingit, nō nervi proprius, sed
loci cuiuspiā in cerebro, à quo nervi procedunt,
est ipse affectus censendus: ac tunc sanē omnes
uicinas partes simul affici cōsequeretur: prout &
quartæ & secundæ coniugationis nervi: unde se-
quitur, ut oculorum quoque partes lædantur. Quod si
unus duntaxat uel musculis, uel nervus, quoquo
modo siue primaria affectione, siue per consen-
sum, affectus fuerit, pars ipsa in aduersum trahit-
ur musculū. Nam resolutio musculi qui dextrā
partem labii mouet, ipsa ad sinistram flectitur. At
si is qui sinistram mouet resolutus, ipsa trahitur
ad dextram. Haud secus & totam mandibulā, &
nariū pinnas, & genas quæ à lato mouentur mu-
sculo, in aduersam partem flecti cōtingit. * At la-
tus musculis nō recipit nervos à tertia coniuga-
tione: sed nervi à ceruicis uertebribus procedentes,
in illū ferē totū disseminant, exigua ipsius parte,
sublimioris, excepta, in quā deferuntur nervi à
quinta coniugatione. CAP. III.

*Resolutio ali-
cuius portio
musculi, pars ip-
sa in contrarium
trahitur.*

*Latus musculis
unde nervus re-
cipiat.*

*Angina aliquan-
do ab uertebra
lataci accide-
re.*

*Spina partes al-
terius præstan-
tibus cōstituta.*

*Septū transuer-
sum solum per-
cere lenem respo-
naturum.*

*Gibbus unde
accidat.*

*Spina proprio si
labores afficiat,
quid accidat.*

Porro ubi afficiunt priores uertebrae spinæ, li-
cet raro, euenire tamen interdū angina potest,
idquæ in pueris magis quàm in adultis, nimis ob ipsas
uertebrae ad interiora luxatas: quemadmodum
Hippocrit, secundo de populari morbo. Cæ-
terum per huiusmodi anginas guttur nullo pro-
prio affectu laborat. Cū autē ipse partes, quod
fuerint altiores, eo sint præstantiores: sane quod
affectu fuerit inferior primis duabus uertebribus,
eo inferet multo minores noxam. At nervi septi
transuersi, sub quarta & quinta uertebra oriuntur.
Ab eo autē solo fit spiratio * lenis, accedente igi-
ter costaliū musculorū actione, ubi uehementior
est opus respiratio: quæ si uehementissima
requiritur, supermos etiam musculis concurrere
oportet. Porro ubi unica duntaxat uertebra, aut
etiam duæ, aut tres, sese consequentes inuicem,
distrahunt, ea parte spinæ causam cōtingit. Vbi uerò
inter districatas uertebrae, uel una, uel plures,
illæse manerint, sic affectus gibbus accidere so-
let. At si in alterutram partē, uel dextram, uel sinis-
tram, distrahatur uertebra, illudem in obliquā spi-
na torquebitur. Cæteri alia sequuntur symptoma-
ta, ubi proprio affectu laborat spinalis medulla:
scilicet, ubi una uel plures uertebrae afficiuntur luxan-
tur. Nam cū proprio affectu spina ipsa affligit-
ur, citra uertebrae aliquā luxationē, si quidem
in altera duntaxat parte afficiat, omnium inferiorum
corporis partium, quæ à regione nocuementi consi-
stunt, tam sensus quàm motus læduntur. Si uerò utraq;
pars sit affecta, omnes partiumque tam in dextrā,
quam in sinistra regione, et quæ affecta est subie-
ctæ, simuliter resoluuntur. At luxata uel ad gibbū,
uel ad concauū uertebra, fieri potest ut nulla o-

mino partium inferiorum, uel in sentiendi, uel mo-
uendi functione, aliquod unum percipiat. Per an-
gulas tamen luxationes spinæ, subiectas om-
nes particulas lædi est necesse. Paulatim uerò fa-
cta luxatione, atque in orbem magis, nihil notatur
dignum partiumque, quæ cōmota uertebrae
subiciuntur. Sed in obliquis luxatio, igitur omnino
eas partes, ad quas nervi ex luxatis uertebribus
procedentes, perueniunt: idque magis in ceruice, in
thorace minus, sed multo minus in lumbis acci-
dere solet. Siquidem in ceruice, uertebrae inter se
cōnexæ, æqualiter utraq; foramine consertit, un-
de de nervis procedit: in thorace autē, superior ma-
gis, inferior minus: sed in lumbis, totus nervus
ex superna excidit uertebra. * Quare in eis trans-
uersis uertebrae luxatio, una secū trahens & me-
dullam, & nervū, illarum seruat naturalem ortū
ipsius. In ceruice autē, ex loco medio inter duas
uertebrae procedentes nervi, per obliquas luxa-
tiones, in ea quidem parte, ad quam spina desile-
scit, opprimuntur: in altera uerò tendunt. Rur-
sus tensiones quidem, atque ingens quod inflama-
tio accesserit, cōuulsio comital. Ad cōpressiones
uero earum partium, ad quas opprellus nervus de-
scendit, sequitur resolutio. Igitur per eas quas nu-
per diximus uertebrae luxationes, reliquæ faci-
ci partes omnes, nec in sensu, nec in motu no-
xam subeunt. Sole autē genæ læduntur, ut quæ mo-
uentur à lato musculi. * At uertebrae solent luxa-
ri, aut ob calum, aut incitum, aut tumore præter na-
turam, neruosa corpora uertebribus atque medullæ
cognata extendent. Ut autē præsentiarū ali-
quid de angina dicamus, Hippocrates affectus
omnes, qui cō spiratione difficili, guntur aut fau-
ces insistant, synanchas, hoc est, anginas appel-
lat. Ac sunt quidē anginae genera quinque. Primum
est, ubi inflammantur fauces: hoc est, interius oris
locus, ubi & gula & gutturis partes extremæ
cōiunt. Secundū est, ubi nec fauces, nec reliquæ
oris partes, nec enā externarū partium ulla inflama-
tio uidetur: laborant tamen suffocationis peri-
culum in gutture fœnit. Tertiū, ubi extrinsecus
circa fauces inflammatio apparet. Quartū, ubi gut-
turis partes tam externæ quàm internæ, similiter in-
flammatæ uidentur. Quintū denique, cū ad ante-
riores partes, colla luxantur uertebrae: id quod sa-
ne cōtingit, uel solis musculis qui cum ipsis cō-
municant, tumore præter naturā affectis: uel nato
ibi tuberculo, uel gula pariter uinata, nonnunquā
musculis quoque qui gulam gutturis iungunt, pro-
prijs aliquando gutturis musculis, qui ipsam
aperiunt, oblaesit. Hi igitur affectus omnes diffi-
cilem respiratioem efficiunt, minime tamen in di-
scrimen suffocationis adducunt. At ægri & diffi-
culter deglutiunt, & dolent, tum præcipue, cū eis
potus per nares resiliat. Nullo autē spiritali in-
strumento nec primario nec per cōsensum affec-
to, fieri minime potest ut spiratio lædatur. Quo
circa ex sola ipsarū specie, alio nōnihil & de affe-

*Angusta luxa-
tione spinae sunt
uicissim, quæ
in obliquis atque
paulatim sunt.
Luxationis spina
obliqua.*

*Luxatio uertebrae unde pos-
sit accidere.*

*Anginae genera
quinque.*

ista sede, & de ipsa dispositione, consicere licet.
Quippe si uideatur laborans, inter spirandū, totum
mouere thoracē, ut in parte quidē anterio-
re, ad iugulum inter utroque latere, ad ceruicē in par-
te posteriore ad scapulas usque, motus ipsius acci-
dat: tres ex huiusmodi spiratione dispositio-

nes significant. Vna est flamma in corde & pulmo-
ne caliditas. Secunda, in altero spiritualium instru-
mentorum angustia. Tertia, facultatis musculorum
mouētis debilitas. Cum igitur huiusmodi spirationē
cōspexeris, in primis arteriis pulsationē per-
pendere oportet: hæc enim quātas sit calor, indi-
cat. Deinde spirationē ipsam expendē, an multa,
an frequens, an exustians fiat. Postremo thoracem
in pectore tange, quem si præter cetera ar-
dentē inuenieris, iam omnes copiosi caloris no-
tas te habere ne dubita. Quibus ex abundantia
accedit faciei, oculorumque rubor, capitis ardor,
sitis uehemens, lingua arida, salebrositas. Vbi ue-
rō incendij signis modū seruantibus, thorax di-
latatur uel uoluntate, angustiam in spiritalibus in-
strumētis esse portendit. Solet autē imbecillitas
accidere spinæ, interdum cerebri uitio, utpote à
quo & sentiendi, & mouendi facultatē recipit:
interdū ipsa duntaxat spina primario affectu la-
borante, idque peculiari intemperiem, ut toti spi-
næ, uel diuersis ipsius partibus aduenientem. Igitur
ob ipsius imbecillitatē spinæ, omnibus thoracis
partibus solet aer inspirari, uel nullo ardente
calore aëris ad id cogente. Si quidem ubi ani-
mans quiescit, uiresque ualidæ sunt, liberam respi-
rationē solum septū transversum efficere solet.
Vbi uerō id ob imbecillitatē, spirā diuini per-
ficere nequit, inter costalium musculorū tunc con-
currit auxilium. Quid si præterea maior animal
egeat spiratione, tunc superni musculi omnes,
quorū maximi scapulas secū manifeste mouent,
ad spirandi actionē desiderantur. Ceterū tametsi
per spiritaliū organorū imbecillitatē totus tho-
rax moueatur, dilatenturque narium pinnae, dila-
tatio tamen thoracis est minor, q̄ in ardentibus
febris in quibus, si uires ualeant, totus tho-
rax plurimū dilatari cōsueuit: minorque etiā q̄ in
angina, & dyspnoea, & peripneumonia. Quippe
hoc morbo affecti, & maxima, & frequentissima
spiratione utuntur. At quemadmodū ob infirmi-
tatem omnium organorū respirationis, sic ob ui-
uius quoque particulæ imbecillitatē, omnes tho-
racis partes dilatari coguntur. In uniuersum au-
tem, unica per eundem actionē, solum musculū qui
ipsam efficere solet, aut neruū ipsius, esse affectū,
purandū est. At ubi plures actiones uiuatae sunt
in diuersis locis, accidit interdum omnes muscu-
los, quibus perficiuntur, ab aliqua cōmuni cau-
sa esse oblectos. Fieri etiam potest, ut neruus ali-
quis, qui musculis illis cōmunis est, afficiatur. Ve-
rū si ex anarome, ad quā particulam porrigant
tunc singuli nerui ab spina procedentes, didiceris,
affectas sedes q̄ facillimē inuenies. Sic enim cum
ex refrigeratione primarū uertebrae spinæ, à
quibus quatuor nerui ad caput ascendunt, ut peri-
cranio sensum largiantur, cuiusdam olim caputē
a facie tunc: affecta sede explorata, illij remedijs
adhibitis, cum subito perfrangimus.

CAPVT III.

At uerō sanguis ē uentriculo gulatū, uomi-
tione: ex spiritalibus partibus, tusei: ex faucibus
& gurgulione, sicutur: ex ore, simplici expulsi-
one expelli, apud omnes medicos in confesso est.
Nos uerō sanguinē qui à cerebro assatim descen-
debat ad fauces, tusiendo educi spenumero ui-

dimus: quippe subito gutturi irruēs, tusiim mo-
uere potest. Quare diligenter oportet huiusmodi
di affectus distinguere. Ceterū cōtingit pleriq̄,
ut uel crosta, uel excreta, uel rupta uena, sanguis
tusiendo, assatim cōfertimq̄ enascitur. At si ip-
sum aliquod simul educitum fuerit, efficacissi-
mum est indicij, ipsum educi à pulmone. Haud
secus, si bronchi pars quæpiā, aut arteria, aut ue-
næ tunica, aut etiam pulmonis ipsius caruncula
reiciat. Quippe nihil horū accidit ipsi, qui ex tho-
race sanguinē tusiendo producit. Iam uerō nul-
lus dolor infestat eos, quibus à pulmone sanguis
erumpit: utpote qui duos neruos perq̄ tenuēs à
sexta neruorū à cerebro ortorū cōiugatione reci-
piunt, extrinsecus per membranam ipsam con-
tingentē dispersos: qui intrinsecus haudquāq̄ per
uisceris profunditatē extendunt. Verū thoraci
multi ab internis, multi etiam ab externis par-
tibus adueniunt nerui, quibus faciliē dolores per-
cipi possunt. Præterea thorax quidem est muscu-
losus & ossulentus: pulmo uerō & laxus, & tursus
à cōruiione. Proinde thoracis dolores intensio-
res sunt, pulmonis remissiores. Cum igitur do-
lente parte quapiā thoracis, sanguinē quis spu-
do reiecerit, nec multū, nec rubrū, sed nigrican-
tem grumofumq̄, huius thorax primaria affectio-
ne inestatur. At sanguis affecto thorace per pul-
monē educitur: ut in suppuratis affectibus pus,
quod inter thoracē & pulmonē deprehendit: ad
eundemq̄ modum, quod in pleuritide coloratū
spitum emitti solet, per pulmonē excernit. Por-
rō ulcera quæ sanguinis reiectioni solent super-
uenire, in pulmone quidem aëre curationē ad-
mittunt. At in thorace disrupta uasa, à quibus san-
guis expulsi, magna ex parte conglutinantur.
Inuestigandum uerō est, num ob adhaerentē
sanguinē, uel in ipso nerui meatu, uel in illa
oris parte, qua ad nares foramen tendit, sanguis
aut emungatur, aut secretetur. Ex uentriculo eni-
m cruor, epota hirudine, euomitur. Qui cruor ta-
men est tenuis, sanieq̄ speciem referēs, siue ex
uentriculo, siue ex naribus, siue ex ore feratur.

CAPVT V.

Quod nō sit eadem res, uox atq̄ sermo, nemi-
nem ignorare existimo. Vos siquidem uocalem
instrumentorū est munus: loquela uerō, eorum
quæ sermoni sunt deputata: inter quæ lingua
principaliū obtinet: cui nō parum conferūt & na-
sus, & labra, & dentes. Sic etiā uocis instrumēta
sunt guttur, & ipsum mouentes musculi, ac ner-
ui qui à cerebro ipsi mouendi uim deferunt. Igi-
tur si uel claudentes, uel apertēs guttur muscu-
li, immobiles reddantur, qui sic afficitur obmu-
tescet. Vbi uerō uel difficulter mouent, uel palpi-
tant, uel tremunt, uel aliter afficiuntur, pro af-
fectionis ipsius modo uox ipsa laeditur. Quid si
alius quapiam ex mouentibus guttur musculis,
quoquo modo laedatur, uitabitur quidem uox,
sed exiguam. Quippe sic affectus, neq̄ obmutet
o mino, neq̄ parum habebit uocem. Vt autem
ex musculis guttur mouētibus, præcipui
habentur ij, qui ipsū & apertunt & claudunt:
ita ex uocalibus neruis, ij quos recurrentes uo-
cant: qui & ipsi, sextæ cōiugationis pars sunt ner-
uorum, qui à cerebro oriuntur: quædam modū &

Calorem copiosum
nota.

Angustia spiri-
taliū instru-
mentorum quod
inducit.
Spina ualde ac-
cedere imbecilli-
tati solet.

Narium pinnae
dilatantur per spi-
ritualium organo-
rum imbecilli-
tatem.

Sanguis qui
parte iulius ex-
citur.

Sanguis à pul-
moni reieci, in
dicitur.

Dolor non infes-
tat eos quibus à
pulmone sangui-
s erumpit.

Pulmonis dolo-
res esse remissi-
ores sunt, quàm
thoracis.

Sanguis, affecto
thorace, per pul-
monē educitur.

Pulmonis uoca-
lis aëre curationē
admittit.

Sermonis organa
sunt.

Vocis instrumē-
ta.

Vox quæ ex ca-
sa ferretur, aut vo-
tari possit.

alii, qui quidem per ipsum dispersi, differunt ab illis, eo quod dā nervis sextæ coniugationis, nō in ceruice, sed cūm ad thoracis regionem pervenerint, separant. Per vulnera igitur recurrentes nervi refrigerati, tantisper vocem impediunt, donec calfacti, naturalem temperiē recuperarint. Præterea vitari vocem* in acumen & magnitudinē haud obscurē cōtingit, ubi fauces etiā si suis muscularibus contendī & cōtineri nō possunt. Item gravissimē laxatur vox, cūm membrana faucibus gutturisq; connata, multa humiditate rigatur.

Reverberatio nervi refrigerati, vocem impediens.

Vox acuta & magnitudo quando vitatur.

Vox rade efficitur rauca.

Angina affectus vocis simul & respiratorii.

Vox qui affectus vocis incumbeant.

Efflatio quomodo fiat.

Athous inter se cōmunitur, sunt quoque circa respiratiōnem.

Expiratio, Efflatio.

Efflatio streperet.

Vox. Loquela.

Difficilis respiratio, in qua omnes thoracis mōventur musculi, à quibus causari possit, innotescit.

Quod etiā destillationes eadem ratione vocem raucum efficiant, nemo nō intelligit. Vehemens quoque exclamatio similiter vocem offendit. Ceterum cūm gutturis musculi interni inflammantur, angina is affectus dicitur, quæ simul & vocem, & spiratiōnē laxat. Idem quoque in universum facere solent omnes præter naturam tumores, siue in spiritalibus ungs exoriantur, siue extrinsecus ipsas cōprimant. Sic enim gula quoque, ubi inflammatio est affecta, ut comprimat alperæ arteriæ tunicam, quia cartilaginū ipsius extremitates, figmōides dicitur, iungunt, & spiratiōnē & vocis noxiā afferre cōsuevit: quæmadmodū & uerberatur ceruicis in anteriorem partem luxatio. Igitur omnes huiusmodi affectus voci accidunt, propriæ ipsius instrumentis unio aliquo laborantibus. Sunt autē affectus alij, cūm peculiari sua materia priuati: quæ sanæ est, generaliter quidem loquendo, expiratio: secundum speciem uero, efflatio. Quæ quidem sit, cūm spiritus animam foras effertur, cōcurrentibus ad hanc actionem intercostalibus muscularibus. Proinde accidit, ut per uehementia thoracis vulnera, atq; omnino ipsius in altera parte resolutiones, in primis quidē semispirans, ac mox animal seminocale euadat: idq; per accidēs. In apoplexia uerō, sopore, morbo comitiali, uigilanti sopore, cōmuni ratione earum actionū, quæ ab imperio uoluntatis proficiunt, uocem laxat contingit. His itaq; quinque actionibus consequentia quadam inter se cōuenientibus, expiratione, efflatione citra strepitū, strepenti efflatione, uoce, & loquela: si earum prima laxatur, reliquæ omnes laxari necesse est. Vltima uerō laxa, reliquæ haudquāq; laxantur. At cūm secunda, tres oblatuntur reliquæ. Cūm tertia, dux ultimæ. Cūm quarta, sola postrema. Atque expirationē efficiunt uniuersi thoracem contrahentes musculi: efflationem (quæ uehemens expiratio est) intercostales maximē: strepentem efflationem, hī qui in faucibus sunt: uocem uerō ipsam, gutturis musculi absolunt. At lingua articulat uocē distinguens, loquendi usum largitur: ad quam rem nonnulli conferre uidentur dentes, labra, narium foramina, palatum, gurgulio, mediocriter ipsius lingue uinculum. Quorū aliquod si fuerit uiniatum, uinari quoque sermonem ipsum contingit.

CAPV VL

Ut autē ad causas dyspnæ explorandas rus sus hic sermo redeat, si uideris aliquem respirantem ægre, ita ut inter respirandum thoracis omnes mōueantur musculi, pectusq; etiā unā cum scapulis attollatur: certè ex tribus unum cōiungere oportet, aut uirum imbecillitatē, aut uirum

spiritus angustiam, aut uehementem in corde & pulmone caliditatē. Quamuis interdu dux, ac nōnunq; (licet rarō) tres quoque etiam diētus causis concurrere possunt. Atqui tribus quidem simul cōiuntibus, proximam mortē inmere oportet. Vbi uerō dux fuerit, difficile est ægrum seruare. Sed una duntaxat infestabit, peculiari opus est finitione, ut sciztur, feruorib; ne æger, an ipsi malo succumbat. Igitur ubi uires duntaxat fuerint infirmæ, ad tria mouentiū muscularū genera uenire, eosq; omnes ad motionē excitare solent, uno genere uehementē mouere nequeunt. Quippe si septum transversum solum, ueluti cum secundum naturā se habet, sufficiens mouere posset, utiq; nec intercostalibus, nec superioribus muscularibus indigeret. Quoniā uerō imbecillum est, omnes sensim cōmouet: sed nec frequentem, nec admodum raram actionē efficit. At plurimū aucto in spiritalibus instrumentis calore, omnibus quidem thoracis muscularibus agit animal: sed uelox, frequens, & uehemens, est eorum actio, si citra uirum imbecillitatē ipse calor infuset. Virum autem imbecillitatē, ubi nō accesserit nimia caliditas, nec uelox, nec frequens omnino comitatur motus: proinde non ita multum omnes thoracis partes potest distendere. Præterea ubi ob plurimū calorē spiratio est difficilis, spiritus quidam calidus, feruensq; efflat. Vbi uerō ob solū imbecillitatē, nulla facta per os efflatio, spiritus per nares tantū emittitur. Quid si per inspiratiōnē cuiuspiam nariū pinguis manifestē dilatari uideantur, id sanè efficax roboris prostrati est indicij. Ob spiritali uerō instrumentorū angustiam, totus quidem thorax plurimū, celeriter atq; frequenter distenditur. Ceterū qui sic laborat, absq; ulla efflatione expirat. Si uerō simul conuenienter in spiritalibus instrumentis, & calor, & angustia (quod solet in peripneumonia) tunc sanè nec maxima, nec frequentissima, nec enī celerissima spiratio sufficere potest: sed furgere tentant ægri, quod sic melius eis thorax dilatari uideat. Similiter solent respirare & hī, quibus asperæ pulmonis arteriæ, plurima defluxione oppletur: at neq; efflatio, nec calidum emittunt spiritū. Purulenti enim totius thorax attollitur: sed neq; ab eis sit efflatio, neq; spiritus emittit calidus, nisi fortē adurens febris accesserit. Verū hī q̄ celerimē suffocantur, tum ob plenitudinē ipsam, tum quod uires omnibus purulentis necessariū imbecilliores reddantur. Contrā autē per anhelantes affectus, humoribus crassis & uiscidis in ipso pulmone impactis, permanere possunt uires robustæ & constantes. Ad hæc, si tuberculū costū difficile aliquando fuerit in ipso ortum, thorax maximē dilatabit, sed non trahet ita multum spiritū, ob idq; crebro & spirare cogetur, uerū absq; efflatione, quæ sanè aucti caloris est propria. Magna porro interdū sit respiratio, ob magnitudinē dilatationis, quæ thorax molitur: interdū uerō ob inspirati aeris multam efflantiam. Igitur quicumq; sine aliqua spiritalium instrumentorū angustia, per febres ardentius distendit spirant, hī inspirati aeris quantitas, magnitudinē dilatationis thoracis proportionatè respondet. Quibus uerō ob tumor uel angustia

Narium pinguis manifeste dilatata inter respirandum, robore prostratum indicat.

Nelli qui spirare solent.

Purulenti quibus fas respiratio.

Purulenti cuius quædam suffocantur.

Tuberculum in pulmone ortum, qualem respiratiōnem efficit.

Aeris inspirati quantitas in quibus nam respiratione distendit thoracem, et in quibus nam respiratione.

gustia sine et summo calore in spiritalibus est, in his, thoracis quidem dilatatio fit maxima id uero quod inspirat, nō solum dilatationē proportionē nō assequitur, uerum etiam minus, si secundum naturam inspirari solet, attrahitur. Ceterū

Inspiratio sublimis quæ.

Spiritus magnus et rarus delirium indicat.

Spiratio exigua simul et raris, quid significet.

Spiratio frequens quid indicet.

Apnoea.

Animal nō potest vivere si ratione priuatum. Latentia animalis.

Transpiratio fit per arterias.

Pulmo aliquem re cruciatur.

Tuberculum in pulmone ortum quæ indicet.

Puritas thoracis ceteris indicat.

rō concoctum est, plus atq; crassius, & cum mitiori tuisi expuere solet. Quippe bifaria accideret potest, ut uehementer tuliendo pauca quis expuat: nemp; ea ob lentum crassiusque humorem, aut ob impenitē tenuē. Si quidem tenuis humor cum subleuatus est, inter tuisendum a spiritu diuisus refertur: lentus uero, aut omnino crassus, difficulter effertur, utpote qui nō tam facile a corporibus, quibus impactatus est, abstergi, neq; a quouis spiritu, nisi a uehementi & multo, potest impelli. Igitur spiritū quod neq; liquidū, neq; aquosum admodum fuerit, neq; crassum etiam, aut lentū, id facile effertur solet, maximē ubi uires ualidæ fuerint. Porro ubi cum spiranda difficultate, cui & angustia & grauitas coniuncta est, a-

cuta quoq; febris incidit, is affectus est infamario pulmonis. At si intolerabile incensū fuerit, angustia uero, grauitatēq; sensus minor, erysipelas ipsum uexare censendum est. Vexatur etiam pulmo interdum inæquali, sicuti & equali intemperie, citra humorū affluxum. Igitur inæqualis tuisim exoritur: æqualis uero, si moderata sit, spirationis continenter uariatur. Si autē uehementis, idq; uincente calore, frigidi aëris & potius cupiditatem inducit, ac tractu temporis in febrem decurrit. Per frigidam autem intemperiem, contraria euenire solent. Quippe si modū seruauit, calidi aëris, & calidæ delirij potius exoritur: si uero modum excedit, replet uisum ipsum fluxionib;. Ob ruptionē etiam uasorū, contingit sanguinem in pulmones transillere, atq; excitare tuisim. Ar ruptiones in eo deprehēdēt, tum ex multi sanguinis effusione, tum ex magna, notabilisq; aliqua causā, quæ subito adueniat. Sicut autē causæ prægressæ, alise ab alto, colico, iracundia, exclamatio, atq; alia id genus. Contingit quippe interdū uasa disrumpi, ubi nō præmissa leuitatione pulmonis per præcedentes exclamationes, uehementē aliquis exclamare contendit. Ad hæc, nulla extrinsecus manifesta adueniente causā, sanguinis abundantia potest in pulmone uas rumpere, si minimē extendi possit aut ob frigus a uicinis contractū, aut ob innatā temperiem. At uero ubi oscula reseruantur uenarum, calidæ præcedunt semper dispositiones. Quæ uero erosio uasē aliquo astatim accidit sanguinis euacuationes, eas præcedere solēt exigua ipsa, ac res in pulmone fluxiones a capite. Nō nunq; uero & pulmonis aliqua pars, aut crustula simul effertur uidetur. Distinguntur autē ulcus pulmonis ab ulcere asperæ arteriæ: & gutturis, rum ob ea quæ cum spiritu excernuntur, rum ob spiritū ipsius quantitatē. Siquid per ulcus pulmonis, plurimū spiritū reijcitur: a partibus autē illis exulceratis, admodum parum excernitur. Præterea pulmonū ulcera nō comitat dolor: ea uero quæ guttur & asperam arteriā infestant, dolorē quidem inducunt, nō tamen nimis uehementem.

Pauca cum magna tuisi respiciunt dupliciter.

Pulmonis inflamatio.

Pulmoni erysipelas.

Pulmonis intemperie æqualis et inæqualis indicatio.

Rupta esse uasa in pulmone uide deprehēdēntur.

Pulmonis uasa a quibus rumpi solent, posita sunt.

Pulmonis ritus ab uicere asperæ arteriæ et sua cum, quomodo distinguatur.

Corinnati caloris signa.

Verum enim uero pulmo nunq; uehementi dolore cruciatur: ar grauitatis sensum, atq; aliquando extensionē, uel ad pectus, uel ad spinā (quandouidem inde suspenditur membrana ipsam ambiens) percipere potest. Sepenumero etiam pulmone affecto, ægri molestant angustia, atq; ob id crebro celeriterq; respirant, & thoracē uehementer attollunt, sed nō ita multū aërem attrahunt. Hæc si citra febrem acciderint, aut tuberculum, aut plenitudinē crassiorū humorū in eo consistere ostendunt. Ceterū si inter respirandum ægri minimē uideant stertere, indiesq; augeatur symptoma, crudi tuberculi ortū suspicari oportet. Si uero sterrendo strepitū fecerint, lentorum crassiorūq; humorū pertinaciter impactorum multitudinē, pulmonis bronchia molestante est indicij. Quod si illico ab angustie sensu quis difficulter respicit, fluxionem uel a cerebro, uel a uicinis sedibus, irruere in pulmonis bronchia significat. Porro si ubi uehementis putrefcit pleuritis, remissa iam febris exandescētia, in imo thoracis æger delectam grauitatem percipiat, ac per uarios decubitus, maximē dum repente ab uno in alterum latu conuertitur, ali quid transfluere sentiat, puris multitudinem ibi contineri, coniectura est certissima: præcipue si nihil penē expuerit laboris. Si uero citra febrem serosus aut pituitosus humor subito in thoracis spaciū defluens, excitauerit spirandi difficultatem, æger tunc tenuis spiritum, idq; ab initio quidem exiguum, sed cum uehementi tuisi: ubi ue-

GALeni affectu lib. V.

CAPVT I.

Dinceps autē symptomata quæ cordi primario affectu, & per cōsensem accidunt, cōsideranda. Cor igitur innati caloris ex-

*Principia nostri
hermantia.*

*Animal mori
non posse, nisi
perit cor afflic-
tum.*

*Corde temperat
esse necessariam
corde et hep-
tatis aut bo-
rum, aut.*

*Latitudo nec mo-
nem, nec sentire,
nec al.*

*Respirationi
que confertur.*

*Mortem contin-
gere posse ob im-
morem grauem
et voluptatem
immensam, atq;
etiam maiorem.*

*Magnitudine
viri ob nullam ani-
mi perturbatio-
nem succubum
quoniam.*

Syncope duplex

*Repente mori
quod succumbit.
Palpitatio
cordis.*

*Corde vulnus
aut ad ventrem
resque perit
monstrum per
misi animal.*

stir fons & origo: quemadmodum sensus & mo-
tus, cerebrū: ac hepar deniq; facultatis nutritico-
rit: a quib. sanē tribus principijs animal guber-
natur. Ceterū animal omnino mori nō potest,
nisi prius ipsum cor afficiatur: ad cuius intempe-
rantias immodicas mors necessāriō sequitur. Si-
quidem cūm singule partes peculiari temperie
cordis (sua actione perficiant, hac protectō pe-
reunte, actiones quoq; ipsarū petire est neces-
se: ac proinde cerebri etiā & iecoris. Horū uerō tem-
perie deperdita, nō oportet cordis simul actionē
perire. Nam etiā sensu & motu uoluntario fir-
diturū animal, nec nutrirur, uelut in latenti-
bus, nihilominus uiuere ipsum posse, quādiu
cor illeuim permanens, haud inficiandū est. At
uerō si cor respiratione priuatur, hominem ilicō
petire est necesse. Porro ad ipsam respirationem
conducit thoracis musculi, in quos nerui à cer-
uicis medulla orti, motionis principij deserunt.
Qua quidē facultate morrice, quā à cerebro in-
fluit, musculi si priuentur: ut uidere est per uehe-
mentes apoplexias) perit opus respiratiois. At
uerō quia ratione homines per somnū spirāt, re-
liqui musculi omnibus, prater eos qui ad tho-
racem pertinent, tunc seruantibus, eadem per mi-
norem apoplexiā, atq; alios ei uicinos affectus,
spirare possunt. Verū per uehementes superari
principij lēssiones, tota respiratio resoluitur: unde
cordis quoq; temperies corrumpitur, penitus ne-
cessariō animal. Ex iecinoris etiā affectu mori
aliquādo cōtingit, alia tamē ratione, * atrophia
uidelicet. Quare in huiusmodi affectib. uita pos-
set longius produci. Mori etiā contingit non-
nullos ob syncopam uitio stomachi ortā, ac ue-
hementem dolorē, & timorē grauem, ac deniq;
uoluptatē immensam. Etenim quibus uitale ro-
bur infirmū est, animi uerō affectiones, ob impe-
ritiam, fortes, & facile animæ subitanea resolu-
tur. Atq; horū aliqui etiā ob meretriciam pene-
runt: sed non illic. At uir magnanimus, ob nul-
lam animi perturbationem unij succubuit. Pro-
prio autem affectu laborare cōtingit cor, uel ob
simplicē intemperiem, siue inxqualis, siue xqua-
lis ea fuerit: uel ob inflammationem, uel erysipe-
las, idq; dum fieri incipit. Nam illic, antequā au-
geantur lēuissimodum affectus, animal ipsum cor-
rumpitur. Quos sanē affectus cardiaca sequitur
syncope: quemadmodū stomachica eos, qui os
uentriculi afficiūt. Hæc tamen enām cōsistente
corde accidunt. Igitur exiguae quidem cordis in
temperantia, pulsus arteriarum, pro sua quæq;
natura, uariant: maiores uerō, per proprias quē-
dam similariū partium intemperies, subitā mor-
tem nō inducunt: per eas autem quæ ad partes
instrumentales pertinent, subitō enecare possunt,
sed præcedentibus signis quibuscūdam, quorum
unum ab Hippocrate est dictū: Qui si sepe & mul-
tum exoluuntur sine causā manifestā, q̄ repente
moriuntur. Est præterea & alius affectus, palpi-
tatio uidelicet cordis, aut per se eueniens, aut cō
suspensione quadam, quōd in humore cor ipsum
mouetur. Inflammatio autem manifestē corde gla-
diatores uidemus, haud aliter q̄ qui syncope car-
diaca pereunt, obijisse. Si ad uentrem cordis, præ-
cipueq; sinistrum, aliquando penetrauerit uul-

nus, pronus cum multo sanguine uitam exha-
labat animal. Si uerō nō ad uentrem usq; pene-
trat, sed in cordis substantia consistat uulnus, ex
ita affectus aliqui, nō solum ea die qua uulnerati
fuerūt, sed sequenti quoq; nocte poterūt uiue-
re: qui oborta deinde inflammatione fuerunt ex-
tincti. Ceterū quandiu uixerūt, mentis compos-
tes inuenti sunt. Vnde euidens testimoniū sume-
re potest ea secta, quæ negat rationalem animā
uim, in corde consistere. Palpitatio autē uisceris
huius, plurimis per integrum ualerūdini accide-
re est uisā: quos omnes detractio sanguinis iu-
uit, unā cum extenuante uicibus & medicinæ ra-
tione. Eorū tamen qui affectū sic fuerunt, nullus
ad senectutē peruenit. Panniculus ambiens cor
quomodoq; affectus, nullū affert periculum,
nisi ipso inflammatione affecto, cor cōsorsit lege
afficiatur. Porro supercalidū cor, spirationem
efficit magnā, densam & celerrimā: calidūq; sem-
per spiritum reflat. Contrā refrigeratū, exiguum
reddit spirationem, & raram.

CAPVT II.

Similiter etiā thorax (propriū ipsius respi-
rationis organū) aut primariō, aut per consen-
sum afficitur: à cuius quidem affectibus neces-
sariō respiratio uiuatur. Igitur ubi dolorificus af-
fectus infestatur, exiguum densamq; reddit spi-
rationē: id quod etiā uicinis partibus, & his quæ
simul mouentur affectus solet accidere. Quippe
interdum lēdatur respiratio, thoracem non labo-
rantem proprio aliquo affectu, sed uel neruo ali-
quo orto à spina, uel spina ipsa affecta. Eorum
uerō affectuum qui propriē ad thoracem perti-
nent, quidam in ipsius musculis, quidā in mem-
brana costas succingente cōsistunt. Igitur inter-
costales musculi, qui in ima parte cōstitunt, gra-
uiori q̄ externi dolore ob inflammationes cru-
ciantur: facileq; membranae subditæ suam af-
fectionē cōmunicant: quemadmodū ubi ipsa pri-
maria aliquando affectu infestatur, intercosta-
lium musculorū partes internæ, similiter ei cō-
dolēscunt. Verū exquisita pleuritis sit, ubi suc-
cingat costas membrana primario affectu labo-
rat. Proinde dolor, uel ad iugulum, uel ad præ-
cordia potest extendi: ad iugulum quidem, supe-
rioribus eius partibus: ad præcordia uerō, infe-
rioribus inflāmat. Vehemens quoq; febris, hu-
iusmodi inflammationē sequitur: quia sedes af-
fecta & parum distat à corde, & cum panniculo
involvente ipsum, ac septo transuerso, cognationē
habet. Iam uerō inflāmati intercostales musculi,
minus: cingens uerō membrana, magis & ten-
dit, & indurat arteriā. At in peripneumonia, nul-
la apparet talis durities. Porro effusa in uacuita-
tem thoracis sanies, in asperas pulmonis arte-
rias recipit: ac dein per tuisim excreta, naturā hu-
moris qui peperit inflammationē, declarat. Ete-
nim si bilis abundat, pallidū aut flauū: si atra bi-
lis, nigri: si pituita, spumofum, & caudicis: si san-
guis, rubrū spurū reijciunt. Quōd uerō ex fluor a-
cis capacitate aliquid expuat, hinc liquet manife-
stissime: quōd si per uulnus thoracis penetrans,
aqua multā infundat, moxq; transfundendo expuat,
ager uel ex sapore mulsam esse deprehendit.
Præterea in eo ipso spacio, quod inter pulmonē
atq;

*Rationale an-
ima uo consistit
in corde.
Palpitatio uer-
da conditio p-
sternum, animi
que uultu, et
medicina rati.*

*Cor in calidum
respirationem,
qualem etiam si-
ritum.*

*Thorax propri-
respirationis in-
saturam.*

*Thorax dicitur
congrui dicitur
et respiratione
uim.*

*Pleuritis respi-
sua quādo sit.*

*Pleuritis quā
adfectu synco-
mata.*

*Sputum de
reueria, pro
reueria, pro
reueria, pro
reueria.*

atq; thoracem est, purulentis & pus continere, & ipsum rursusde expuere, haud obscurè cernunt. Nec uero defendi potest, sanguinem in ea uena quæ circa spinâ est, contentum, regurgitare ad cor, ut inde ad pulmones feratur: quod ex Erasistrati sermone colligit. Nam eî coterio, uena hæc, à dextra cordis auricula exorta, sanguinè secû deferit, qui omnibus thoracis partibus, quæ circa costas * inferiores cõstitunt, alimentum præbeat. Etenim superiores quatuor nõ ab * ea, sed à uena perreptante ad iugulû, nutrimentû suscipiunt. Pus itaq; in thoracis capacitate contentû, expirationis tempore in pulmonis asperas arterias transmittit. Si quidem respirationis actio ad ipsum thoracem pertinet, pulmonem nullam propriam habente monouè quippe qui per consequentiam dilatato thorace, pariter ipse attollit: eo uerò cõstricto, spongiorû manibus cõpressuræ exemplo, rursus in sese residet. Proinde thorax u vehementer cõstrictus, humorè qui in uacui-
tate subdita continet, in asperas eius artenas cõ-
pimit. Nisi uerò thorax admodum uehementèr
pulmonè omni ex parte compressent, humor in
asperarû arteriarû ora recipi haudquaq; poterit.
Quamobrem quò robustior fiet compressio,
animali adiunxerit rufum naturæ, quæ naturale est
symptoma, æternutatio, singultus & nausæ, cõ-
symptomè. Verum quia uiribus opus est, quibus exci-
tetur huiusmodi naturale symptoma, contingit
frequenter per suppuratos affectus intire æ-
gros, uiribus antea prostratis, quod à ualidissi-
ma celeritimaq; cõstrictione thoracis fiat rufus,
quam uires adeò imbecillæ præstare nequeunt.
Porro insepabilia lateralis morbi symptoma-
ta sunt, febris acuta, dolor, perinde ac si locus dis-
tendat, uel pungatur: spiratio frequens & ex-
igua, pulsus paruus, arteriam & duram, & quo-
dammodo tensam indicat, rufus magna ex parte
cum coloratis sputis, nonnunq; uerò sine his.
Atq; has sanè incoctas uocant pleuritides, quæ
uel celeritè hominè rapiunt, uel longo tem-
poris spacio finiunt. Sunt præterea aliq; laterû cum
febre dolores, per quos spiratioè exigua reddi
est necesse, sed nullum spiritû redditur: ut in ea ra-
tionalis pleuritide sine sputo cõtante discurrere ui-
deatur. Verum hi faciliè ab illis discerni possunt,
quod in his quidem nulla omnino tussis mole-
stet (quemadmodû in illis, qui abig; sputo insep-
tantur pleuritide, in quibus sicca adeit tussis) neq;
tensionè, neq; ullâ duritiè pulsus referat, nec per
inde acuta febre laborent, nec deniq; adeò diffi-
cultate spirant. Sunt etiâ nõnulli, qui extrinsecus
presso inflammato loco, dolere sese fatent. Atq;
ij per spiritû purgantur minime quia ab initio ni-
hil eius succi, qui excitauit inflammationè, per-
uenire ad spaciû thoracis consueuit. Ad inflama-
tionem concoctâ, nisi pus prius discussum fuerit,
ad cutem usq; attollitur, inciditurq;.

CAPVT III.

Terminû quò thoracis pars inferior finit, an-
triqui phrenas uocatur, fortè quia eo inflammato
mens læditur. At Plato ipsum septû appellat,
quod irascibile animi facultatè, quæ in corde
est, ab appetitoria, cuius sedes est in iecinore, dis-
tinguat, separatq;. Cæteri recentiores septum

transuersum id nominant, ut Aristoteles succi-
sturû. Qui sanè muscularis spirationi instrumentum
cum sit, nõ immeritò, si afficiat, ipsam lædit
spirationè. Antea tamen q; quib; ob affectum se-
ptum delirio, frequenter atq; exiguum: insepanta
uerò delirio, multa uarietate in æqualem spiritû
reddit. Delirare tamen solent nõnulli, ob utrum
cõtinent in ore utrimq; sicuti per febres arden-
tes, pleuritidè, & per pneumoniâ. At quæ ob se-
ptum transuersum deliria oriuntur, nõ multû à
phrenitide distant. Etenim per ceterarû partium
affectus, & per arduas febres, mitigari solet de-
lirium, quoties morbus declinare uidetur. Phre-
nitidis autem propria præcipuè nota est, ne in
declinatione quidem febris, delirium quiescere,
cum nimirû non per consensum sub huiusmodi
morbo cerebrû, sed primaria affectione laboret.
Proinde paulatim affectus hic gignit, nec repen-
tè subitaneus alienat ægri, ut in aliis parui affe-
ctibus, quinetiam prius q; inualescat morbus,
precedunt ipsum nõ pauca accidentia phreniti-
ca: caputa immensè uigilat, aut somnus imagi-
nibus uariis turbatur, aut deniq; rerum omnium
quæ faciunt, agrestis quædam obliuio. Interdum
enim, qui phrenitici euadit, maiori cum tumultu
aut temeritate respondet, cum antea tamen
fuerint mansueti. Atq; ij omnes, potu exiguo u-
tuntur. Nonnunq; occipit dolore insepant. Cui
uerò ad phrenitidem iam proximè accedunt, o-
culi euadunt eis uehementèr squallidi, aut ex al-
tero ipsorum acris lachryma effunditur, ac dein
lippitudo innatat, & uenæ intumescunt sangui-
ne, linguasq; stylarè naribus: quo tempore ni-
hil quod exactè ad prudentiâ pertinet, respon-
dent, & floccos uellunt, & festucas carpunt, atq;
aridiori febrî, cui non ita magnè in alterutram
partem mutationes accedunt, torquent. Ad hæc
lingua quocq; illis aspera est, nõnulli audiri sol-
luntur, atq; interdum iactè cograbundi. Quin-
etiam dispositione dolorifica affecti, uel acius
premente aliquo, eam haudquaq; leniunt. Ergo
hoc modo per cerebri affectum, paulatim phre-
nitidis gignitur. Ab aliis uerò partium nulla, per
petuum deliriu oriri potest, dempto solo septo
transuerso, cuius uisio excitat delirium, parum
à continuo distat phrenitide tamen distinguitur,
& ex symptomatis, & ex sanguinis destilla-
tione à naribus, ex ipsiq; spirationis specie. Si
quidè spiratio phreniticior è magna, & ex lon-
gis facta intervalis: inæqualis uerò, ubi à septo
delirium oritur. Cæteri præcordia * reuelli, septi
transuersi licet ab initio affecti, propriû indicii
est: id quod affecto cerebro, posterius accidit, ui-
delicet non incipiente affectu, sed ubi formatus
iam fuerit. Calor quoq; circa caput & faciem, ue-
hemèrior est q; qui ob cerebri uisû delirant.

CAPVT IIII.

Illius partis quæ inter fauces & os uentriculi
media est, & quæ œsophagus, Romacius, & gu-
la dicit, duplex est usus. Vnus, quod ueluti uia fit
eorû quæ deuorant: alter, quod circa urisq; pro-
gressum, tam deuoratorû, q; eorû quæ à uentricu-
lo in os reuolunt, aliquid moliri uideatur. Nam
cui geminè in fine et tunice, altera ad cibi potusq;
deglutitionè utitur: altera ad eam, quæ uisum do-

Deliria quibus
ex causis oriantur.

Deliria ex septo
transuerso orta,
non multum à
phrenitide dissi-
tant.

Pleuritidè præ-
cedentia sympto-
mata.

Phrenitidis iam
incipiens sympto-
mata.

Delirium uisû
perpetuum, ex quo
per phrenitidè,
& quod oritur
à septo transuer-
so.

Deliriu à septo
transuerso uisû,
quoniam à phre-
nitide distinguitur.

Œsophagus.
Stomachus.
Gula. Vnde da-
plex.

Gula cæcæ
duplex fuit do-
ta.

Gula affectum
genera duo.

Gula inflammata
in indicia.

Inflammata est
per partem doli,
ubi sunt sanguines
mucosae
regatur dolor,
ubi ab agendo de
sternitur.
Gula frigida, cum
inductio esse videtur,
ad deprimendos affectus
alios.

Refertur rasti
qua re à ruptio
ne atq. erosione
differt.

Videm unde fiat.

sit, expulsiōnem. Proinde rationi est consonum,
duo esse affectuū ipsius genera: unum quidem
quod veluti uix tum ingessorū, tum uomitione
reictorū, ei accidit: alterum uerō, quod ei, ueluti
utriusq. actionis instrumento, euenire potest.
Constat itaq. eorum duorū usum, alterum qui
dem semper esse necessariū, alterū propter occa-
siones quasdam. Igitur eorū symptomatū quæ
gulam tanq. uiam infestā, genus unum est, cum
ob tumore aliquem præter naturam, angustior
10 ipsius meatus redditur: alterum, cum perficere
propriæ actiones nequit. Accedit etiā gulæ an-
gustia alicuius, ubi à uertebri intro luxata com-
primitur. Vbi uerō gula inflammata, non à uici-
nis partibus cōciliata, sed propria familiaritū an-
gustia torquetur, grauisissimū tunc inter deglu-
tiendū infestat dolor, accedente quoq. perq. diffi-
cili transiit, præsertim si supinus, qui laborat,
iaceat, deglutire quippiā conetur. Nam erecta si
gura transglutitio multo facilius perficit. Nec ue-
10 rō puro latere uos, partū inflammatarū nullam
tū dolere, ubi suo munere fungitur: contrā, mi-
tigari dolorē, ubi ab agendo destitit. Cum au-
tem gula sentiendū facultate sit prædita, ipsam
quoq., ueluti autætarium indicium, in usum euo-
care oportet, quod plenius affectus illius digno-
scant. Quare iuuat egros interrogare, quidnam
deglutiendo sentiant. Quippe imbecillitatē nō
tunq. percipere se fatentur, ut longo uix tempo-
10 ris spacio per gulam transiit ingesta. Interdū ea
in media uia lærere & coerceri uiuit. Horū pri-
mæ actionis infirmitatē: alterum, particulæ cu
iustipiam angustiam indicat. Verū utriusq. dis-
crepantia ex reliquis accidentibus intelligere licet.
Nam in imbecillitate quæ ex sola intemperie
citra tumore sit præter naturā, ingessorū in transi-
tu tarditas, & æqualis, & sine dolore, & in supi-
no quidē decubitu, maior: ceruice uerō erecta,
minor, sine ullo angustie sensu, accidere solet.
Vbi uerō cum tumore cōiuncta imbecillitas est,
40 unam quamplurim partem angustiorē ceteris
efficit, atq. per eam ipsam tardior erit transitus.
Quod si tumor fuerit inflammationis aut erysi-
pelatis participes, accedet ei dolor & sitis, & mul-
ti caloris sensus, febrisq. nō admodum ardens,
quæ siti proportionē haudquāq. respondeat. Si
uerō tumor aliquis ex nō ita calidis fuerit, tum
citra febrim, & calorē, & sitim, deglutitionis inæ-
qualitas aderit, retentis cibis in parte aliqua. Por-
rō affectus dolorificus gulæ, iuxta dorsum quo-
que sentitur, cum gula in cumbat spinæ. Iam ue-
10 rō sit ob ruptū aliquod uas ipsius gulæ, sanguis
aliquando uomatur, dolor statim sentitur iuxta
locum ubi talis ruptio cōtingit. At refertur ore
uasis, nullus percipitur dolor: quare à rupture
atq. erosione uasis distinguit: ac præterea, quod
neg ictus, neq. casus hanc profusionē præcessit,
id quod rupto uase uidere est. Quāq. ob solam
sanguinis plenitudinē, uasa interdum disrumpi
possunt. Quæ uerō per erosionē sit cæcissio san-
60 guinis, ulcere præcedente contingit. Fit autē ul-
cus, uel ruptio uasē, uel uitiosorū humorum in-
fluentia: id quod in cute quoq. sæpe numero ac-
cidit.

CAPVT V.

Os uentriculī (quod ueteres ob accidentia quæ

inducit, cor nominabant) nō solum syncopam,
sed cōsulationes, sopores, morbum comitialē,
atq. melancholiam inferre solet: necnō sympto-
mata, qualia per suffusiones infestant. Quos qui-
dem affectus omnes, consentientibus ei ceteris
partibus, in ipso fieri contingit. Quippe ad pro-
priam eius rationē pertinet, tum fastidire, tum
natantes cibos corrumpere. Nam si cibi in uen-
triculi fundo firmantur, præcipuē si suapte natu-
ra nō facile corrumpantur, ne uirū ex illis acci-
dit. Porro cūm grammicis quidam iuuenis,
quoties uel nimis uementem docebat, uel cogi-
tabat, uel esuriebat, uel irascebatur, morbo comi-
tiali, ob nimis acutū sensum oris uentriculī, corri-
peretur, tertia uel quarta hora panē optime præ-
paratū ei exhiberi iussit, solum quidem si uō fite-
ret: si uerō siti cruciaretur, ex uino madidum, &
quidem albo, modicēq. adstringente. Nam lu-
luscēmodi uinum, ut uires adit uentriculo, sic
minimē tentat caput, quod solēt uina uehemen-
tia. Dein uerō singulis annis bis, aut ter, picrā ex
aloe ei exhibens (quod quidem medicameu to-
tum uentrē ab excrementis liberat, ipsūq. ad
actiones proprias corroborat) ita restituit homi-
nem, ut reliquā uix integra sanitate frueretur.
Cōplures etiā nō solum insomnia & somni tumul-
tuosi molestant, sed amentia quoq., propter ui-
tiosum humorē collectū in ore uentriculī. Iam ue-
rō stultitiam illū hypochondriacū morbu, om-
nes professi sunt, tristinā, desperationē atq. mor-
tificationē inducere, nihilq. ad melancholiā acciden-
tia reliqui facere. Laborantes autem eo morbo,
post cruditates, dictis accidentibus multo uehe-
mentius cruciant: ac quidam ipsorū quoq. sple-
netici fiunt. Quocirca consiendū est, ex hoc
etiam uiscere uitiosam saniem in uentriculū transi-
gari. Ergo ea accidentia quæ cerebrū afficiunt,
uel oculos, uitiosorū humorū uaporationem se-
quuntur. At syncopa quæ uitio stomachi, hoc est,
oris uentriculī, accidit, ob dolorem ipsius propi-
etatem exolutionē inducit, fortasse uerō eius quoq.
intemperie ad cor perueniente. Quemadmodū
ubi cor uehementer intemperatū est, uires agmi-
uatim cadant, oportet. Similiter etiam citra, hoc
est, picrā, mulieribus accidit, ore uentriculī affe-
cto. Nausea præterea, cardialgia & singultus, in-
ter liuius partis affectus debent annumerari.
Afficitur autē uentriculī uniuersa capacitas, simi-
libus dispositionibus quibus & os illius, cæterū
nō perinde uehementib. At quia cōsitionis opus
perficit in partibus ori subditis, necessum est eas
ipsas partes, cum malē dispositæ fuerint, cruditas
10 causam existerē. Quod uerō sanguis à iecin-
ore atq. liene effluens, uacuari per uentriculū pos-
sit, hæc de hac re latius alibi sumus dicturi.

CAPVT VI.

At icteri duplex etiam genus morborū acci-
dit: unum à sola intemperie, citra tumore præter
naturam: alterū, ubi unā cum intemperie, tumor
quoq. adeit, ut inflammatio, erysipelas, scirrhus,
inflatio, & obstructio à crasis & uiscosis humo-
ribus, in extremis uasorum partibus, quæ à ue-
na portæ exoriantur, facta. Verū ita in his labo-
rans grauiatē percipit in dextra præcordio-
rum regione. Quod si halitusosus quoq. spiritus,
cui

Or uenter
hæc uisum
hæc symptomata.

Or uenter
affectus pene-
trant.

Vinum album,
modicēq. citra
gros, uiscidū
uentriculū, & in
uicini uires co-
pant.
Pierā ex aloe u-
sit.

Hypochondria-
ca melancholia
symptomata
signa.

Syncope uis
auertitūm ac-
cidit, quoniam
uires coarctat.

Oris sunt in
uentriculū affe-
cti.
Nausea.
Cardialgia.
Singultus.

Sanguinem à
iecinore & liene
uacuari per uen-
triculū possit.

Icteri de picrā
non morborū
causa.

Hepatica excrementa quæ dantur.

iecut esse affectû existimabis. Nominant autem præcipuè hepatica, quæ ob imbecillitatē ipsius deiciuntur. Vt autem tenes excrementum & sanienem referens, infirmi iecinoris signere sanguinem non ualentis: ita id quod similatur faci, superflantis sanguinis hepatitis est indicium. At uerò nonnulli primò quidem sanienem, & cruentam quædam: dein tractu temporis, crassum ac melancholicū sanguinē: postremò atram quoque bilem, atque synceram, deiciunt. Qui affectus inter-
10 dum ob frigidam intemperiem, citra febrem, incipit: ac tunc quidem tenuis sanies excernitur: dein uerò progressu temporis, corrupto in uiscere sanguine, febris solet superuenire. Porro nonnulli eorū qui ob frigidam intemperiem labi-
rare incipiunt, nō solum nō amittunt obli-
quiditatem, uerum etiam multò magis quæ antea appetunt. At calidas intemperies nunquā comitatur cibi cupiditas, sed fastidiū graue, sine uehemens, febris insignis, atque prauorū humorū uomitus.
15 Sciendum autē est, singulis nostrī corporis partibus quatuor naturales facultates inesse: quarū prima appellatur attractrix, quæ peculiares parti succos, alendi ipsam grana, & appetere, & attrahere potest. Altera deinde est, quæ alteratrix dicitur, quæ succus attractus, similis euadit ei quæ nutritur particulæ. Huic aliz duæ ministrant: re-
tentrix nempe, quæ suo munere fungitur, quando pars succū attractum concoquit, donec eum in suam ipsius naturam cōuertent: & expul-
10 trix, quæ post absolutam cōfectionē, excernit id quod inutile est, atque excrementum uocatur. Si igitur in iecinore attractrix facultas quomodocumque afficiatur, cibum quem cōfecit uentriculus, atque in chylum conuertit, relinquere, ut liquidus excernatur per aluum. Atque hoc sanē ipsius facultatis affectus erit signū. Si quidem quicquid ab aliquo proficiatur, tanquā à causā, id enī esse illius signum constat. Vbi autem hepar integrè ualet, melarei uenis ueluti quibusdam manibus, quæ
20 ex uentriculo ei cibum afferant, utitur. Ceterū ubi uel inflammatio uel erysipelas afficit mesenterium, nō solum qualia per iecinoris imbecillitatem excrementa deijci consueuerūt, planè excernuntur, sed apparet etiā ueluti ab inflammatione, sanies quædam illis admitti. Vt autē nō potente ob imbecillitatē hepate succū à uentriculo attrahere, attractrix facultas afficitur: sic ubi retinere nō ualet, retentrix uis infirma putanda est: ob idque primò quidem cruenta sanies excernitur, dein crassior & faculentior. Similiter aliz quædā excretiones contingunt, nō quidem ob imbecillitatem, sed ob expultricis facultatis robur, ratione plenitudinis, idque interdum per integram ualitudinem. Sic plerumque pars aliqua cum affecta est, per hepar purgatur, uimque ipsius iam robustioribus facta. Quemadmodū autē retentrix facultas dum imbecillior est, ac rem quæ ipsam grauat, retinere nō potest, eius expultrix id quod inestit euacuat: sic infirma expultrix, retineri quædam res solēt, facultate retentrice nō uisquæ deo grauata. Nam in quolibet instrumento aliis aliis facultas uel sit fortior, uel imbecillior, facta relatione ad actionem. Etenim omnis particula, secundum temperamētū quod ei * perpetuū inest,

Calidas intemperies nunquam comitatur cibo cupiditas. Facultates naturales quatuor inesse singulis parti corporis partibus.

Facultatem singularem lesionem in hepate, quæ signa indicent.

Signū alieuius dicitur, quod ab eo proficiatur, tanquā à causā.

Parses aliquas purgari interdum per hepar.

*Particula omnis agit secundum proprietatē tem-
peramenti.*

agit, proprietatē. Iam uerò interdum etiam con-
tingit, ut ob folliculi fellis imbecillitatē, ad se bilem minimè attrahere ualentis, impurus uage-
tur sanguis per uniuersum corpus, aliaque oriat
morbī acuari species præter illas, quas superius
exposui. Qui folliculus sic etiam nonnunquā im-
pletur, quemadmodū urinz uesica, ut euacuari
nō possit, aut quia obstructus est, aut quia secre-
toria ipsius facultas est imbecillior. Veluti etiam
cū obstructus aut infirmus uasis, quæ ab ipso
extenduntur in hepar, biliosum humorē interdum
attrahere nō potest. Proinde excrementorū pro-
prietatem in morbo regio consideranda, per quā ne-
cessariū est. Porro quibus citra febrem morbus
regius accidit, urgente in dextra præcordiorum
parte grauitatis cuiusdam sensus: is omnibus a-
periens obstractiones cibis & ponibus, & medi-
camentis excruciantibus, deinde medicamentū
quod bilem ducere possit, exhibens, eorū pluri-
mos una die sanitati restituit. Qui uerò purgatio-
ne liberari nō poterūt, is rursus ualentior ad
aperiendum data potione, medicamentū quod
uicementis purgaret, exhibuit. Sic, ut sub purga-
tionis fine, cœculea magis quæ flaua bilis cum acri
mordacitate fecerneretur. Atque in his coniecti fel-
lis folliculum similiter affici, ut solet urinz uesi-
ca, ubi magna humoris copia distenditur, quam
excernere nequit, interdum ob excretorie fa-
cultatis imbecillitatē, interdum quod ob grauē fo-
mum, uel negotia quæpiam, ultra quæ par est, uri-
nam suppressim, dein ab ea prosternali, mirū in
modū intenta. At folliculus fellis, * cū iuuetur
nihil ad excretionem à facultate animali, unicū
habet imbecillitatis principium, ueluti cætera
quoque naturalia instrumenta, à partis intempe-
rit ortum.

Morbū regū causā.

*Excrementorū proprietates in re-
gio morbo consi-
deranda.
Regū morbi ab
qui febre cona-
denti curatio.*

GAL. DE LOCIS AFFECTIS LIB. VI.

CAPVT I.

Ien autē, cū ex hepate sanguinem melan-
cholicū trahat, quo ipse postea nutrit, sanē
si in eo facultas attractrix facta sit imbecil-
lor, sanguis ex iecinore impurus in uniuersum cor-
pus transmittitur, ac proinde color nigrior eua-
dit. Quinetiā exemplo hepatis, sæpenumero ex-
se reijcit excrementa quædam: ita ut per uomitus,
cui nausea accedit, nonnunquā excernatur melan-
cholicus sanguis: qui interdum etiam solet per
inferna descendere. At huiusmodi uacuatione
suppressa, nonnulli melancholici tristitia afficiuntur,
cibosque audissimè cōspiciunt: idque præci-
puè, si ualde fuerint acida, quæ excrementa ad
uentriculum transferunt. Si autē alia melancholi-
ci humoris corruptio accidat, subuertit, deijci
appetentiā uidebis. Quod uerò induratio ipso,
aqua inter cutē etiam posuit, consentiente ieci-
nore, iam antea est dictū. Quinetiā laborante ali-
quando utroque uiscere, regū morbū euenire cō-
spicimus, nigriore quæ pro cōsuetudine sub se quæ-
te colore, ita ut uideretur flaua bilis esse fulgini
admista. Quemadmodū autem uisiosa aqua &
frigida, * si conferunt & intempestiue bibatur,
solet aqua inter cutem inducere (nocet enim sic
tingere interioribus partibus, maximè uerò is, qui
20

Lien sanguinem alium melancholicum.

Lien induratus, ubi cōsuetudinem iecinore, aqua inter cutē arripit.

Regius morbus per uisum.

Frigida intempestiue caliditate sili aqua inter cutē efficitur, præcipue si uisiosa fuerit.

quæ tum temporis fuerint imbecilliores) sic ob efferigeratum unâ cum tumore lienem, ut puta si adsit (cirrhus: uel circa tumorem, ut per iam nuper dictam aquæ potionem, aqua inter cutem enim euenire consuevit. Cæterum nisi ad hepatis usq; ipsa refrigeratio peruenierit, aqua inter cutem subsequi potest minimè.

CAPVT II.

Dysenteria exquisita, intestinorū ulcus existit. Quis sanè affectus, non gignitur affatim, aut subitò, ut ille quem uitio hepatitis accidebat diximus: sed protinus, quidem ab ipsius initio, bilis mordax excernit, quam deinde interaneorū abrasio nes sequunt: postea uerò paulūm cruoris denſi simul uidetur, quādo uidelicet ipse affectus iam esse dysenteria censeat. Item itaq; huiusmodi abrasiones solæ excernantur, considerandum est, num pingue quippiam simul cum eis deſciatur: ita enim ulcus in crassis intestinis consistere, existimandum est. Vbi uerò cruorē quoq; excerni uidetur, intueri oportet, utrum in reliquis excrementis adeo permixtus sit, ut uniuersus uniuersis misceatur, an pars eius aliqua reliquis super-

natur. Et enim si admixtus sit, in superioribus: si uerò supernatur, in humilioribus intestinis ulcus esse portendit. Idem etiam & in abrasis excrementis uidere est, uerū oō ita manifestè, ut in cruore. Similiter crustula, quodnam intestini sit ulceratū declarant, tum ex efficienæ proprietate, tum ex modo, quo uel miseri reliquis excrementis, uel uni eorū parti supernaturae uidentur. Nec uerò mediocriter cōducit ad curationē, nosse in qua intestinorū parte consistat ulcus. Nam si in superioribus intestinis sit, ab epotis medicamentis præſidium petendum est: sin uerò humilioribus hæreat, clysterem subicere magis conuenit. At huiusmodi dysenteria, ab ijs quæ ab hepate proficiunt, sic discernitur. Nam ab iniurio tenuis sanguinis ab hepate excernit: deinde aucto malo, crassus humor facibus uisui haud absimilis. Præterea, in hepaticis excrementis nihil abrasum expellitur, atq; interdum duorum, aut trium dierū intervallo, supprimitur euacuatio: dein rursus malum reuertitur, atq; excernunt excrementa prioribus multo peiora. Id uerò per intestinorū ulcera haudquāq; apparere: quippe in ijs neq; affatim, neq; ex longis temporis intervalis, laborantes deſcere consueuerunt. Porro ulcera quæ in recto intestino oriuntur (tineſmū uocant) uehementi quidem tensione, & prompta deſcendi cupiditate infestant, paucis admodum frequentibus excrementis: quæ quidem ab initio pituitosa & pinguis, progressu uerò temporis, etiam ramenti ipſe denſiunt: sed per totum morbi spaciū, ijs quæ à supernis descendunt, minimè miseri uidentur. Iam uerò ut doloris colici, nephritici distinctio, in initio difficilis est, sic circa id tempus, non ita magna præſidia diſtincta desiderat. Cæterū & nausæ, & uomitus, per id genus affectus urgent: sed multo grauiorē, & magis assiduū, dolere colo. Eorum itaq; ita laborantes pituitosa quædam, atque corrupta: hæc in re longè superantes nephriticos: ac retinent etiam magis excrementa, ut ne flauū quidem, neq; etiam suūm excernere possunt.

Sæpenuero ueluti circuire uidetur dolor, modò hanc, modò illam partem infestans. Nephritici uerò dolores eodem in loco stabiles, infestant iugiter. Cū itaq; dolore in loco fuerit altiore renibus, manifestum colicæ indicium portendit: si uerò circa sedem renū infestet, et, urinæ considerande sunt. Nam nephritici ab initio dilutius puras reddunt urinas: dein frequentibus diebus, crassum aliquid in ipsis subsidere uidetur: demū arenosæ minguntur. At in colica, si quid ab alio deſciat, id statuosum quodammodo est, & sæpenuero aquæ supernaturare consuevit, similem habens bubulo stercore consistens. Queniam cruciatus colici, quām nephritici, multo magis leniuntur mitigantur clysteribus. Atq; interdum euenit, ut frigidū aliquo humore simul eieſto, illico quiescant. Quare ipsūm perſectū mitigant, ut etiam curantur atq; prognoscit. Nephritici itaq; dolores, cum urina exuente lapide, simul & soluant, & locum affectum indicant. Ut autē perſenare dolore utraq; pars eodem auxilio indiget, sic tempore subsequente ad præseruationē oportet diuerſa præſidia adhibere.

Cū autem omnia intestina ordine quodam à uentrículo ipſo deſcendant, atq; omnium supremum, ieiunum sit: drinde, quod tenue uocatur: postea cæcum, quod usq; ad infernas partes extendit: drinde colon, quod ad superiores reuertitur partes, ita ut sæpenuero hepatis & lienem attingat: satis mirari non possum, quod pacto uehementissimos quoq; dolores, quacūq; in parte consistant, ab omnibus colo tribuantur. Ignite ob frigidum crassumq; aut etiam humore uisidum, aut ob stultentiū spiritū, in corpore crasso densior aluius intestini inferioris genū, sed egredi nequeunt, excitari dolor consuevit: ueliens quidem, ob intemperiem atq; tensionē corporis in quibus hæret impactus: longus uerò, quia difficulter uacuat. At dolor ille acerbissimus, quem ileon, uoluulū & chordapſon uocant, sublimiores intestinorū partes infestant, adeoq; impellit ad uomitum, ut nonnulli stercore per os redditentes, miserrima tandem morte moriantur. A quo affectu uix aliquis unquam euadere potuit. Itaq; nō ab re uisum est medicis antiquioribus, uel ab inflammatione, uel ab obſturbatione aridi stercoreis, oriri huiusmodi tenuiū intestinorū affectū. Sunt & alia symptomata, quæ & intestinis & uentriculo simul affectis euenire credunt: ut quas lenterias cælicas nominant, ubi materix ipſæ minimè mordaces existūt. Et eorum ut mordaces ob mordendi uim omnia intestina ad excretionē excitant, sic nō mordaces, intestinorū imbecillitate sequuntur: quæ retinere contenta ne exiguo quidem tempore possunt.

CAPVT III.

Igitur si nephritis repente incidat, lapide nota tu digno, uel in renū aliquo, uel in ureteris enā impactō, dolorem excitabit haud absimilem collo: uerū distinguet ab eo, per illa quæ in capiti præcedenti accidere colo affecto iam diximus. Vbi uerò ex ijs quæ in urinis resident, aut ex lapide excreto, discerni ipsi dolores possunt, quæ si non nullus locus relinquatur. Porro ubi dolor alterius ænis, cum horrore inordinato & uario,

Aquam inter cutem perſectū ad hepatis refrigeratio peruenierit.

Dysenteria quæ in intestinis.

Dysenteria causata.

Intestinorū quædam excretionē sunt, crassiorē autē, an tenui, ab excrementis dignoscatur.

Intestini supremum excretionē, epotis medicamentis præſidium petendum est: sin uerò humilioribus hæreat, clysterem subicere magis conuenit.

Tempus dysenteria.

Colicum dolor nephritici, ut ca principia, ut diu in se mediū de ratione considerare.

Colico dolore nephritici quædam distinguitur.

Nephritici & colici quædam.

Colica excretionē quædam.

Intestinales ordo.

Dolor colicum.

Ileus, Voluulus, Chordapſis.

Voluulus Labiæ, ramentum uic alium quædam existit, Voluulus causa.

Lenteria cælica.

Nephriticus dol-
or cum horrore
inordinato, ac
febre etiā inor-
dinata affligit,
quando abscis-
sam significat.

Renis exulcer-
atio iudicia.

Caruncula cum
urina excreta ef-
ficitur, vix
etiam renem
facit notā.

Pila similes ex
cremita, quā in
renis cremita,
in renis signa.

Diabetes.
Dysacur.

Vesica non tra-
hit a renibus.
Interstina non
trahunt a reni-
culis.

Diabetes causā
est imbecillitas
renum.

Appetentia ca-
nina.

Appetentia ob-
stī animalis o-
pus.

necnon inordinata febre affligit, si per primum decubitu atque in alterum latus permutatione, in ipso rene dolente suspensū cuiusdam pōderis sensum per percipiat, abscissum iam concretū esse coniectare oportet. Quod concocto, pus mistum ut laborantem a dolore liberat, sic ulceris in rene periculum affert: quod nisi illico cicatrice inducatur, egregie curationē recipiat. At perseverantis ulceris nosse ex urina laud obsecrare deprehenduntur. Adde quod laborans creberrime in affecto rene dolorem sentit: atque interdum cum urina exiguum pus veluti ab ulcere excernitur. Similiter ramentū nonnunquam cum urina excerni videtur: atque interim sanguis quoque, qui erosio iam ulceris est indicium. Quamvis rupto aut referato aliquo vase, sanguis potest etiam profluere. Verū efficacissima exulceratio renum est cōiectura, si exiguae quaedam carunculae cum urina excernantur: utpote quas renū essentia partes, easque ob vehementer ulceris erosionē auulsas esse constat. Atque una cum lono excernuntur pilis similia, probabilis mihi visum est, ea in renis, quod in renum capacitate, gigni: idque ex crassa lentaque materia, quam calor calciscit excoctumque: cuius sane affectionis per diuretica speravi curationem futuram, nec unquam spes me fecerit. Iam vesica, ubi longo tempore aeres per ipsam urinā transeunt, ulceribus affligi solet. Est et alius renū affectus, quo tenuis sanies sanguinis mingitur: cuius qui dem existet causa, aut ipsorum imbecillitas renū, aut maxima relaxatio eorum meatuum, per quos ex uena causa in renes percolatur urina. Atque ad renes quoque pertinere la affectus videtur, quem alij matellae hydropem, alij profluuiū urinā, alij diabetes, alij dysacurion vocant: qui certe gravissimē accidit. Quo morbo affecti, inexplicabili siti vexantur. Quare & exuberanter bibunt: & reddunt totum id quod biberit, minime a sua qualitate mutari. Hicigitur renū vesicaeque affectus, similis est leuitati ventriculi, intestinorumque. Igitur ut ex uentriculo iecur per mesenterij venas, veluti arbores a terra per radices, alimentū ad sese trahit: sic etiam renes sibi quicquid in renis est aquosum, alliciunt. Carterū vesica nō trahit a renibus: quemadmodum neque intestina a uentriculo: sed renes quidem per ureteras excernendo in vesicam mittunt: uentriculus autē in ieiunū, per intestinū ab Herophilō dictū dodecadactylum. Proinde diabetes causa, renū imbecillitas, nō potentius diutius continere urinam, censenda est. Verumenimvero obijciat aliquis: si imbecilli sint renes, qui fieri potest, ut urinam ad sese tantē celeriter attrahant? Cui quidem responde- re licebit: quemadmodum canina appetentia, in uentriculi ore consistens, nō potente ipso sustine- re pondus deuoratorij, multa impetuosē ingere- re, eademque celeriter excernere cogit: sic in renibus etiam feroci humoris cupiditate, una cum auriū imbecillitate accidere. Vnde & humidita- tem affatim trahere, & eam mox in vesicam pel- lere, ipsi renes coguntur. Quod autē urinā suā repente euenire possit, leuitas intestinorum nō possit, veluti nec canina appetentia: ob id sit, quia cupiditas quā cibum appetit uenter, animale of- ficiū exiit, quo citra sensum nostrū fungi ne-

quā potest. Renum uerō desiderium est natu- rale, neque ab ipso sensus nostri afficiuntur. Proinde cum ad statū peruenit, ne sensum quem dem uer, quemadmodum a ppetentia canina. Porro la- borantes uehementi siti, quatuor accidentiū dis- crimina a potione subire solent. Vnū, & quidem primum, uomitio est alterū, uelox per aluū excre- tio, aut fluore, aut leuitate intestinorū: tertium, quod potius diutius quā par est, in uentriculo manere: quartū denique est diabetes, siue urinæ profluuium. Occurrit interdum a affectus alius diabe- tis similis, & quidem ob ciborum multitu di- nem, qui nec erudi permanent, nec desiciuntur per aluū, nec plenitudinē gignunt, nec etiam probē alere possunt, sed discutiuntur, dissipantur. Cuius ut erior est, quā displaci, euen- tus, ita faciliore curationē admittit. Quippe si prius quā ad summū peruenit, ipsum cognō- ueris, haud ita difficulter curabitur. Atque is af- fectus, a ceteri dissipatione ortū ducit, omnibus partibus attractrice, appetitricemque facultate seruantiibus. At uerū ingenis sitis, quae citra dia- betem accidit, causa est uentriculus, aut calida, aut frigida, aut utraque intemperie la borans: maxi- me uerū eo ipsius: proxime uentriculo liepar, sed maxime pars cuius sima, simul inflammatis me- scatis uenis, & ieiuno, & uentriculo, atque cum gu- la, pulmone. Quarum partium incendium mar- cor ut plurimū comital. Diabetes itaque proprius renum affectus existit, qui caninē in ore uentri- culi appetentis proportionē respōdet, acceden- te praeterea reneritici facultatis imbecillitate.

CAPUT III.

Vesicae superueniunt symptomata, partim cō- muna ceteris, ueluti omnes ipsius praeter na- turam tumores, dolores, & quae hos gignunt dispositiones: partim ipsi propria, ut ichuria, hoc est, urinæ retentio: itaque, hoc est, stili- cidium urinæ: praeterea immoderata urinæ pro- fusio. Quae quidē euacuationes vesicae cum me- tu utuntur, ipsa haudquaquā a flecta. At uerō stil- cidium urinæ, si ob urinæ acrimoniam fiat, sym- ptoma uesicae est, affectus uerō minime. Si uerō aut ab ulcere, aut ab imbecillitate procedat, in uesica affectu consistit. Carterū cum ab intem- perie uesica sit imbecillior, propria ipsius actio le- ditur, quae est urinæ excretio: ad quā animal ex- citari solet, cum uel a multitudine cōtente in ipsa materia uesica grauat, uel a mordacitate conuel- litur. Quinetiā instrumentales affectus interdū imbecillitate inducere possunt: praeterea omnes intemperantiae, praecipue illae, quae saepe nō nul- lis eueniunt, cum frigore corripiuntur. Ad haec, ichuria symptomata superuenire solet uesicae, tan- quā mendi instrumenti: interdū quidē, cum cir- ca id quod in ea cōtinetur, cōtrahi nō potest, ut ipsum exprimat: interdum etiam, obstructo in se- riori meatu: aut a crassissimis humoribus, aut a lapide impacto. Atque accidit nonnunquam uel ab insi- ma- nione, uel ab alio id genus tumore, ut angustior reddat meatus, uel etiam omnino obstructi. Scien- dum autem est, non uesicae, sed mendi munus, ueluti enī desicendi, nō intestinorum officium, pendere a uoluntatis imperio. Quippe uesicae of- ficiū unicum est, cōtractio. At musculus qui

Strimem uen-
mitter, quatuor
accidentia di-
scrimina a ppet-
entia canina.

Sitis ingenis
causa.

Diabetes, pro-
prius renum af-
fectus est.

Ichuria.
Stranguria.

Stillicidium ur-
inae quando in
prima rebus
quidē affligit
in uesicae
causa.

Mendicium in-
ueni uesicae pro-
pter instrumenti
imperio.
Dei uesicae in-
ueni, non uesicae
uoluntatis im-
perio.

urinae meaturum in circuitu ambit, in origine ceruicis uesicæ positus, instrumentum est, cuius opus ab electione excitat. Similem quoque & actionem & usum habet musculus, qui recti in ætini partem extremam ambiens: proinde ipsi resoluunt, neque urinam uesicæ, neque alius stercore, retinere possit: sed præter uoluntatem, & utraq; paulatim effluunt. Quare suppressio urinae fieri nequit ob affectum spinæ, aut neruorum ab illa in dictos musculos extororum (quod nonnulli putarunt, credentes uesicæ officium à uoluntate pendere) sed ipsius inuoluntariæ excretionis. Atqui ut nonnulli tam urinarum, tum excrementorum alui deiectionem totam ab electione procedere existimantes, hallucinati sunt: sic rursum alij, his è diuerso totum hoc opus naturale putantes, ab scopo aberrarunt. Etenim cibi à uentriculo in jejunum transmissio, tota naturæ opus est: uoluntatis autem, extensio digiti. At si uis detectio, & urinis redditio, utroque instrumentum propriis suis facultatibus operante, perficitur. Rectum enim intestinum, atque uesica, naturali facultate uruntur: musculi uero, ea quæ animalis & uoluntaria uocatur. Quippe musculi qui solent cohibere fluorem, ab opere quiescunt, & abdominis musculis munere suo fungentibus: maxime uerè medij. Quum igitur uesicæ corpus ita fuerit affectum, ut quod in ea continetur exprimere nequeat, urinis supprimitur, uocaturque symptoma id ichthuria. Accidit enim interdum, propter ipsius sensum obstruunt, ut non reddere urinam, citra tamen expultricis facultatis laxationem: nimirum si proprii uesicæ nerui afficiantur, neruus musculi ceruicem eius contringentis, munere suo fungentibus. Qui quidem si resoluuntur, urinis præter uoluntatem excreantur. Ob spinæ etiam luxationem & interiora, supprimi aliquando urinam consuevit: orta uidelicet phlegmone in affecta particula. Quædammodum uentrebris ad externas partes luxatis, inuito urinam profluere uidimus, ob resolutum neruum musculi uesicam ipsam elaudentis. Retenta etià longo tempore urina, uel ob somnum diuturnum, uel ob negotij urgentis, ipsa uesica extenditur, atque urina supprimitur, contractricis facultate propter tensionem immodicam læsa. Præterea ob sanguinis grumum & pus crassiusculum, interdum rennetur urina. In pueris etiam, quos lapis in uesica cruciabat, uidimus sæpenumero ipsam urinam supprimi. Eos itaque, resupino figurato corpore, adeo conculsumus, ut si meatu lapis dimoueretur. Cæterum grumum uocatum, non solum eos qui in uesica, sed multo magis illos quoque qui in intestinis, uentriculo, atque thorace nonnunquam continentur, animi defectu, & color pallidus sequi solet: pulsus uerò paruus, obscurus, & frequens apparet: laboransque ipse, cum anxietate resoluitur. Sunt autem ad intentionem affectus sedes, non solum præsentia symptomata, sed præterita etiam inuestiganda. Nonnihil etiam confert quæntissem puris (si quando excrematur) & misturam eius cum urina, considerare. Nam si pus cum lotio exactè permixtum sit, à suprenis alicunde partibus effluit. Si uerò sine urinis excrentur, in uesica consistere suppurationem indicat. Sed quod mediam inter hæc conditionem

seruauerit, id à renibus descendisse, certum iudicium est. Similiter expendendum est, si rupta uomicam, cum uotis effecti loci, ulceris aliquod quoque signum appareat. Nam & hoc, aut exactè, aut mediocriter, aut omnino nihil cum urina miscetur. Atque uocatum quidem ramentum, ulceris: effluens uero propter eas, affectus partis proprium iudicium est. Quippe partes à uesica auulsi, lamis à renibus uero, sunt cerunculi similes. Similiter ubi ex sublimioribus pars aliqua affecta est, excrementa cum urinis eieci inuerti, & ea suspensa partium essentie comparare oportet. Igitur cum urinis expurgantur gibbæ hepatis partes, atque omnes quotquot his superiores existunt: per sluum uero pars iecioris sima, intestina, uentriculus, lien. Præter hæc quædam sunt purgationes, sed raræ: ut quum thorax & pulmo per sluum purgatur: quæ sub septo transuerso sunt positæ partes, per urinas. Vidimus etià nos pulmonis uomicam expurgari similiter per urinam: eieci uidelicet pure, à pulmone quidem per laeum arteriam, in finitum cordis uentriculum: à corde autem, per arteriam magnam, ad renes: atque illinc tandem per ureteras ad uesicam. Etenim ut à concaua uena, ita ex magna arteria, rami ad renes descendunt.

CAPUT V.

Uteri affectuum plurimæ differentie existunt. Siquidem mulierum quæ histeri eis dispositionibus corripuntur, alix quidem sine sensu immobiles in eam, cum obscuro paruoque pulsu, uel omnino sine ullo pulsu. Alix autem sentiunt, atque moueri possunt, integræ ratione fruuntur, sed tamen deliquio animi, distinctib; spiratione laborant. Alix denique erura finitibus & brachijs contrahunt. Porro nonnulli & explorandum, numpentus respiratio perierit, flocculos laneæ capræ, suspendi coram naribus iubent. Alij poculum squæ plenum ori uentriculi imponit. Quippe immortum omnino seruari humorem stant, si spiratio tota sit intercepta. Etenim in confesso est, & spirationem à uita, & uitam à spiratione separari non posse: adeo ut uiuentem non spirare, & spiritum non uiuere, sit impossibile. Quid si in animalibus, quæ in lateribus delitescunt, nulla appareat respiratiois nota, neque ob id mirari debemus, quum uidelicet ea animalia sint frigida. Quippe maximus usus respiratiois est, ut intus calor & refrigeratione & uentilatione seruetur. Quare haud ita difficile fuerit pendere, exiguum illum calorem in eis derelictum, arteriarum cordisq; motu seruarique actio à quibusdā medicis transpiratio uocatur. Similiter etiam, pretereunt ob uteri affectum spiratione, quoniam uniuersum corpus refrigeratur, (id quod perspicuum est) fieri potest, ut nullo attracto per eos spiritum, aut reddito, transpiratio, quæ per arterias fit, perseueret, licet adeo interdum exigua, ut sensum omnino effugiat. Accidit autem uteri suffocatio magna ex parte uidiis mulieribus: his præsertim, quæ quom antea probe repurgantur, præterea, atque uiuorum congressu fruuntur, his omnibus postea priuantur. Quare uerisimile est, ob retenta menstrua, uel semem cohibita, eiusmodi mulieres uteri dispositionibus infestari: idq; fortasse magis ob se-

Ramentum est
signum ulceris.
Essentia proprie
tas, affectus par
ti indicat qd.

Partes à uesica
auulsi, lamæ à
renibus sunt ea
cerunculi similes.

Partium singula
per quas res
piratione peruen
tur.

Pulmonis uomi
cam aliquando
per urinas per
trem.

Arteria magna
ramulis inuerti
ad renes.

Uteri affectuum
plurima differ
entia.

Respirationem
perire omni
us, aut non pro
pter quibus mo
di deprehenda
tur.

Spiratio à uita
separari non po
test, nec à respi
ratione, ipsa ui
ta.

Respirationis
nota.

Latentiam ani
malis calorem,
motu cordis &
arteriarum ser
uatur.

Transpiratio
per arterias.

Uteri suffocatio
est quibus præ
cipue accidit.

Uteri affectibus
ob retenta men
strua uel cohibi
tis semem solent
accidere.

Musculus uesi
cæ atq; sedo a
q; secundum
uoluntatem im
perium quibus
resoluitur, excre
menta retinere
non possunt.

Ichthuria quan
do accidit.

Urina suppressa
causa.

Grumum ut cor
poris præter na
turam continet
ur, qd; signum
est symptoma
tis.

Uteri affectuum
inuestigandum
est, utrum ipsi
us esse possint
causam.

Semen muliebre quale.

men tetentum. Nam quum muliebre semen humidius atq; frigidius sit, ipsum excerni oportet, praeteritum si copia redundet. Nec feceri etiam in uris. Sunt quippe nonnulli eorum, quos protinus a iuventute, concubitus imbecilliores reddit. Alij, nisi assiduè coant, capitis gravitate instentur, cibos fastidiunt, febribus sunt obnoxij, deterius coquunt & appetunt, ac denique torpore, pigritia, ac melancholicis accidentibus molestantur. Proinde ex retento semine, quam ex sup-

Semen retentū nonnulli viros quoque symptoma ta indicat.

Semen retentū quoniam mīstrum quibus infertur grauiora symptoma ta.

Libidinis indolēgere multum modesti viros uoluptatem grauiora.
Diogenes Cynicus.

10 prehis mensuris, uidetur mihi longe maior noxa euenire posse corporibus, eorum praeteritum, qui suapte natura uictiosis abundant humoribus, plenij sunt, et in ocio educati: quijque quum antea nihil secissent ad libidinem reliqui, astatim continere corporum. In quibus sane conicio, naturalem excernendi ipsam cupiditatem, laetisonis causam existere. Etenim quum tale & tantum ipsum semen euaserit, neminem non ad sui exertionem u i quodam stimulat. Ob idij planè constat, mode

15 stos uiros, non ob uoluptatem, sed ut ab impedimento praeseruentur, indolere libidini, perinde ac si nulla sit ei coniugata uoluptas. Ita Diogenes Cynicum narrat, uirum aliquoq; mortaliū omnium (quod ad continentiam pertinet) constantissimū, libidini tamen nauasile operam, non ad coniuncta illi uoluptate, ueluti bono aliquo, dilectum, sed ut noxam, quae a retento semine promerere solet, arceret. Eum namque meretrix adire pollicita, quum diutius cessaret, ipse manu p-

Animalia omnia quo pacto excrementa ad veniunt.

Phalangi ictus.

Scorpion ictus.

Torpedinaria piscatorum manum reddit torpidam, per multam indolentiam.

Heracleus leprosus.

Veneris retentio, quomodo distinguatur ab alijs quoque praeter corporis suum interuicium.

20 dendi admota, semen excussit, ac uenientem deinde mulierculam remisit, inquit: Manus hyme-nem celebrando praeuiepit. Sic etiam arbitror animalia omnia excitari ad coitum, non quod existiment uoluptatem boni cuiuspiam speciem praeter se ferre, sed ut semen, quod retentum ipsa molestat, excernant: haud secus quam deiciendi ster-

lerali assumpto ueneno fieri cōtingit) deinde corpus aut liuens, aut nigricans, aut narium appareret, aut diffusus, * aut grauem reddat odorem putredinis, hunc uenenum sumpsisse aiunt. Igitur si eiusmodi affectibus nos insectari fateamur, qui ex nobis meritis accepto suae originis impetu, si miles sint ijs qui epoto ueneno eueniūt: nihil mirum fuerit, si etiam uitariū semen, aut menstruum, huiusmodi, quum retinetur, aut putrescit in corpore, grauiā symptomata inducat, ijs praeteritum, qui ut afficiantur, sunt apti. Siquidem quamquam uiu habeat afficiendae rei apertum, in canibus licet nideret. Quum enim reliquorum animalium nullum rabie arripiat, solus canis eo affectu corripitur, tantaj sit in ipso humorū corruptio, ut uel solum eius spurum, si humanum corpus congerit, rabiem excitare sit potens. Quod uero ad gignēdos uteri affectus maiorem uim habeat semen quam menstruum retentum, uel ex hoc liquet, quod dum supprimunt menses mulieribus cōiugatis, est pluribus accidentibus infecturum, nunquam tamen aut spiratione priuantur, aut animi deliquo laborant: quod solent nonnullae uidup, licet quae ut antea, aut paulo minus, quod pertinet ad menstrua, purgentur. Quae sane symptomata Plato exponere cupiens, sic in Timaeo edidit: Ea pars quae in mulieribus & uterus & uulua nominatur, quum sit animal auidum generandi, si intempestiue diuini infecundum man-

30 serit, admodum indignatur, erransq; per totum corpus, ac meatus spirituum obstruens, respirare non sinens, in extremam anxietatem adducit, & alios morbos complures excitat. Hec Plato. Ceterum illius agitationis uteri, quam mulieres percipiunt, nō est causa ascensus eius usq; ad regionem diaphragmatis, ut nonnulli putarunt. Nam si aliquid ex utero uideat ascendere, id perexiguū est. Sed uteri ipsius tensiones esse potius in causa dixerim, cur tangentibus obstetricibus, modò sursum, modò retrahi in latere uideatur. Nam simul cum utero, ceruicē quoq; ipsius retrahi necesse est. Quum igitur ad uterum multa admodum uenarum ora perueniant, per quas ex cōcausa uena sanguinem attrahere potest, * sane ob plenitudinem tam earum, tam uinculorumque ex illis dependit, contingit uterum fusciorē, aut etiam ad latus retrahi. Siquidem omnis conuulsio sit aut ad plenitudinem, aut ab inanitione. Plenitudo quippe, repleta corpora & in latum, & in profundum extendit, sed longitudinē reddit breuiorem. Quod autem breuiora sunt, eō magis ad suam originem retrahuntur. Dum itaq; descendens sanguis ad uterum, ingredi ad ipsius interiorum capacitatem non potest, ant quia crassior est, quam ut uisiorum ora permeare possit: aut quia clausa sunt orificia, multiplicatus in uenis, eas exēdit, atq; uulua ipsa uincula madafacit: ad quorum omnium tensionem, continuū uterum retrahi est necesse. * Qui si undiq; trahatur aequaliter, recta erit & sine inclinatione ipsius transmaratio: sin uero inaequaliter, ad partem achemen-

Afficienda ut aptitudo, manū obtinere ad excerpendum affectum.

Causa salutaris corporis corruptio, quoniam quatuor huiusmodi excrementa est potens.

Plato.

Veneris non ascendere ad regionem diaphragmatis per ueni infusa accendit: sed in ipsa, tum ipsa uulua tendit, quia tunc uulua retrahi.

Conuulsio enim sit aut ad plenitudinem, aut ab inanitione.

Vteri peruer-
siones ad super-
flua sequuntur
menstrua.
Nova quæ ab his
vteri peruer-
sione videtur, ne
lesit, ad retin-
endum semine oritur.

Menstrua defe-
cerunt mulier-
e, seu latiosius uter
prægnans, nec
exilis per-
peta.

Menstrua defe-
cerunt, quæ pu-
ella deprehend-
untur, an sit
gravidula mulier
nec ne.

Colon in utero
suppuratum inter-
duum iuxta bu-
lbum.

Suppresso men-
se, quæ sequuntur
symptomata.

Menstrua fluxu
ita immolui,
quæ sequuntur
symptomata.

absurda est dixisse videbitur. Igitur peruerfiones uterico quæ diximus modo, ad suppressa sequuntur menstrua: eas tamē ob hoc, accidentium quæ in animalis corpore apparent, causas esse, nequam purandum est. Quæ uerō citra peruerfionem, aut menstruum retentionem, uiduas molestiant noxæ, hæc ob retentum semen euenire purantur. Ceterum pro multitudinis, qualis atque ratione, tum mensurorum, tum seminis, aliis aut accidentium specie oriri solent. Etenim noxia causa uniuersum corpus refrigerare potente, adeo uehementer omnes partes refrigerantur, ut & respiratio, & arteriarum pulsus, sensu deprehendi non possint. Quæ si uel crassa fuerit, uel acris, conuulsiones: si uerō atrox bilis naturæ referat, mæstiam inducet: quemadmodum animi quoque deliquit, & ad fortes extensiones, & refrigerationes, & oris uentriculi affectus, subsequi consueverunt. Porro si mulier nec prægnans, nec puerpera, lac possideat, menstrua ei defecerunt. At nullo in mamma lacte apparente, menstrua suppressa hisce notis deprehenduntur. Grauitas totum corpus infestat, necnon fastidium, atque inæqualis horror. Quod si citra horrorem inæqualitas aliqua fuerit, atque fastidium, appetitui mulier quædam aliena, atque (exempli gratia) extinctos carbones, iube ut obsterit uteri ceruicem tangat. Nam si citra duritiem clausi inueniatur, eam prægnantem esse coniicies. Si uerō etiam durities adsit, affectum aliquem in utero esse portendit. Oportet itaque specularem obstericem, ad quam partem uel declinet, uel retrahatur uterus: nam in ea parte affectus uteri sedem esse coniicies. Atque in quibusdam feminis, eius partis dolor cum grauitate, nonnihil potest significare: quinetiam in coxam dolor interdum transit, & crus ipsum, quod est regione est, per incesum claudicat. Quod si longiori tempore suppurantur menstrua, nullamque medicus mulieri uacuationē promoueat, tumor aliquis præter naturam, in libus interdum oritur, ostendens nimirum esse internis partibus quampiam esse inflammata. Nonnulli panus in extrema illam parte excitatur, ueluti uirga quoque eodem in loco nonnuquam oriri solet. * Qui panus in quadam muliere fuit suppuratus, aded ut opus fuerit sectione. * Iuxta hanc ipsam partem uidimus colon intestinum et suppuratum, et sectum: interdum ignorantibus medicis imperitiis quidnam inciderent, interdum intelligentibus quoque. * Ceterum quationes suppurati contigit colum, semper facile curationem receperunt: uti uerō sectiones, ægrius conglutinantur. Itaque symptomata huiusmodi consequenter sequi suppressa menstrua: ac præterea lumborum, & colli, & sinapitis dolor, quod ad oculos uisus radices extenditur: item febres ardentes, & nigricantes urinae, cum rubra quadam sanie, perinde ac si aquæ, in qua nuper macerata carnes ablutæ fuissent, ut lignum sit, aperto fluxionis meatu: ac reliquo conceptu spatio & contracto, & ad apertum iam meatum, quicquid intus continetur, pellente. Retentio sit, quum clausus manet meatus, & cōtenuus a continente haudquaquam impellitur, sed potius per contractionem comprehenditur, & retinetur. Hoc modo cōtenti in causis instrumentis humores, per integram ualitudinem natura-

attollitur, corporis robur proflernitur, uitiatur ciborum tuum concoctio, tum cupiditas. Sed accidit interdum feminis muliebri uocatum profluium, uel uero haudquaquam affecto, quum uidelicet uniuersum corpus per ipsum interdum purgatur: quemadmodum per renes quoque aliquando solet uacuari. Id uerō potissimum fit, si mulier laxa sit carnibus, & pituitosa. Atque id quod ex cernitur, nonnuquam rubra sanie est, interdum aquosa, & fupallida. Quod si purus fuerit sanguis, qualis ex disiecta uena profluit, diligenter animaduertere oportet, num ei osio sit aliqua in utero. Ea uerō magna ex parte in ceruice ponus quam alibi contingere solet: discerneretur per excretam sanie, si fuerit infusa: si uerō circa os ceruicis cōstitit, non solum per hanc, sed per tactum etiam cognosci potest. Atque prægnantes quoque, quum ora uenarum in ceruice aperuerint, ex cernunt sanguinem. Ergo si mulier utero graui, subdixit extenuent mammae, abortu sequitur. Atque geminis ferens, si altera mamma extenuetur, altera mittit: & omnino si de extra mamma extenuata est, marē: si sinistra, feminam edet. Mares siquidem dextris, feminæ magis continentur sinistris uteri partibus: atque raro aliter accidit. Si mulier prompē quidē conceperit, dein secūdo, aut tertio, aut quarto impregnationis mense fatum eiecerit, circa uteri acetabula humorem pituitosum abundare, atque idcirco uenarum arteriarumque eius loci ad ora uasorum in uterum descendentium, nexum debiliorem esse, conuincendum est, ut factum ob grauitatem ferre nequeat, sed abruptum faciliē,

CAPVT VI.

At colis ulcus deprehenditur ex dolore instans ipsum: necnon ex his, quæ familiaria ulceri, unum cum urina purgantur. Ceterum hæc ab his quæ a uelica ex cernuntur, miscella modis distinguit. Nam quod ex cole defluit, in primo statim exitu excussum, urinæ præuenire cōsuevit. Quod uerō a uelica emittitur, urinæ admistum uidetur. Quinetiam aliud in utero meiendū mordicus dolent pudendorum ulcera, præcipue quum uel crusta, uel sordibus solutis, pura remanserint. Porro gonorrhœa est feminis aliudua excretio, & inuita, quæ sit cole haudquaquam extenso. Priapismus uerō est permanens colis tumor extensus in longitudinem atque circulum, nullo stimulante ad libidinem aut desiderio, aut acquisito calore, ut quibusdam consuevit accidere, qui supini decumbunt. Igitur quemadmodum omnia corporis nostri excrementa, duobus modis uacuuntur (interdum enim a cōtinentibus ipsa corporibus ex cernunt, interdum sponte profluunt, eoque ob imbecillitatem ab ipsis retineri nequeant corporibus) ita de semine quoque dicendum est. Nam in huiusmodi omnibus, ut ex cernere tempestiue, ita continere, naturæ est officium. Verum secretio sit, aperto fluxionis meatu: ac reliquo conceptu spatio & contracto, & ad apertum iam meatum, quicquid intus continetur, pellente. Retentio sit, quum clausus manet meatus, & cōtenuus a continente haudquaquam impellitur, sed potius per contractionem comprehenditur, & retinetur. Hoc modo cōtenti in causis instrumentis humores, per integram ualitudinem natura-

Profluium mulieris causa.

Prægnanti si extenuentur mammae, abortus sequitur.

Mares continentur dextris, feminæ sinistris.

Colea uelica uel deprehenditur.

Excreta a cole & uelica, quomodo distrahenda.

Gonorrhœa est feminis aliudua excretio, & inuita, quæ sit cole haudquaquam extenso.

Excretio corporis dicitur, modo uacuatur.

Excretio quomodo fiat.

Retentio ut fiat.

liter & excernuntur, & retinentur. In illis autem qui prater naturam se habent, retentio quidem, ob excreticis facultatis imbecillitatem: excretio uero, ob retentis infirmitatem euenit: uel ob dispositionem aliquam, quæ huiusmodi secus quam naturalis ipsa excretoria uis, partes mouere possit. Id quod in feminarijs uasis uidetur licet, ubi quis uel comitali morbo, uel consulsione uiolenter fuerit correptus. Cæterum uidemus alias quoque partes, ut manus, pedes, aut digitos conuelli, modo simul cū totius corporis consulsione, modo ipsi solis affectis. Quare minime præter rationem fuerit etiam in feminarijs uasis, & quidem interdum solis, eiusmodi excitari dispositionem: quemadmodum & gonorrhæam, quæ urinx, quam quis inuitus emittit, proportionem respondet, quum retenticiem uidelicet facultatem reolui contigerit. Gonorrhæa igitur instrumentorum feminis est affectio, non pudendorū, quibus ceu uia per quam excernatur, utitur semine. Priapismus uero planè colicis est accidens, quamquam ad arterias eius potest referri: utpote quæ solæ interdum huiusmodi habeant præter naturam dispositionem, quali affici consueuerunt, quū naturaliter totus coles intenditur. Atqui à spiritu ipsū in tumorem attolli, manifestè patet ijs, qui celeritatem eius, & quum iterum refidet, perpendunt. Quippe nullus humor tam subito in alterutram partem mutationem efficere possit. Quum igitur pudendi corpus sit undique fistulosum, faciliè à uaporofo spiritu per arterias affluente, ubi quæ libidinis impetu stimularunt, aut dum ob supinum decubitum calfacti sunt lumbi, extenditur: glande ipsius semper magnitudinem æqualem seruante, quod fistulosus in ipsam neruus non ingreditur. Natura etenim corporis partes fingens, perfectiōis, fecit ut ipsæ citra doctrinam, proprias actiones aggraderentur. Quippe omnium quæ à cōsilio & uoluntate pendunt actionum instrumenta, esse per se docta uidentur: animaliaque omnia simulatque genita sunt, & spirant, & uocem ædunt. Quare mirum esse non debet, genitales partes, eas actiones, quarum gratia à natura sunt institutæ, protinus ab initio cognoscere. Vterus siquidem, quum semen genitale conceperit, donec fuerit perfectus factus, exactè clausus permanet: perfectio uero facta, plurimum aperitur, & deinde facta apertus excludit. Populares autem hæc, propter crebrum euentum, contemunt: utpote qui nihil quod reuera sit admirabile, sed ea dumtaxat, quæ rara uident, prosequuntur admiratione. Quid autem in rerum natura potest admirabilis contingere, quàm quod nouem perpetuis mensibus clauditur os uteri adeo exactè, ut nec spicilli quidem acumen admittat: perfectio autem facta, usque adeo distenditur, ut totum animal per ipsum egredi possit? Ne igitur dubites pudendorū uim per se doctam esse aut fistulosum hoc, neruofumque corpus, ubi ad coitum infurgit animal, à naturali facultate, quæ ipsum potest antellere, orotini distendatur. Cuius rei simile, & in corde, & arteria planè uidere est: nisi quod horum morus perpetuus existit, quia necessaria nobis est eorū actio: si fistulosus uero neruus non semper mouetur, sed quum usus requirit. Quum ergo sic fuerit ex-

tenus, sequitur atque illum replet ex arterijs spiritus: quemadmodum pulmo thoracem, ob eam quam habet ad ipsius motum consequuntionem. Atque eam actionem satis est ut ad neruum, quàm ad arterias referas: quum præsertim omnes functiones, ex propria partium essentia, non ex earum situ, prouenire, rationi consonum sit. Arteriarumque nullam aliam in pudendo habent actionem uim, quàm in uniuerso corpore: licet calfactis lumbis par sit, ut arteriæ calidiores reddantur, & magis etiam pateant ipsarum ora. Quamobrem non exiguum rursus spiritus effluunt, in fistulosum neruum effundunt: qui paulatim impletur, collem extendit, ita ut tota ipsius essentia consistat in fistuloso neruo uideatur. Ex dictis igitur constat, uel ob arteriarum ora immodicè patefacta, uel uaporofo spiritum in fistuloso neruo oriturum, priapismum oriri. Cæterum ab utriusque ipsū fieri posse existimo, crebris tamen ob arteriarum ora patentia. Porro medicamenta excitanda: turgentia uim obtinentia, tunc epota, tum pota lumbis admoda, calida & uinosa, & flatulenta sunt: quemadmodum contraria omnia, minime status excitant, & potius refrigerant, quæ calfaciant. Sunt præterea alimenta quædam, quæ quod plurimum gignant feminis, excitare ad libidinem possunt. Iam uero qui quum plurimo semine abundent, à concubitu abstinent, huiusmodi priapismo uexari solent, præsertim si ueneris imaginibus molestantur, nec studeat ut multa exercitatione sanguinis abundantia dissipent. At cantores & athletæ, qui iam inde ab initio nullam uitæ partem ueneris illecebris contaminarunt, nullam admittentes eiusmodi uel cogitationem, uel imaginationem, nec pudenda & exilia, & rugosa fieri, ueluti senibus, consueuerunt. Siquidem præter cætera quæ accidere solent ijs, qui protinus iuuentute prima immodicè sese per miserant libidini, id etiam euenit, ut horum loco rursus uasa, amplius patentia, maiorem ad se sanguinis copiam alliciant, & eorundem cupiditas magis increseat. Ignauia siquidem (ut inquit Plato) exoluit: propriæ autem officii exercitatio, robur augere solet. Sic mammae quoque, in ijs quæ non dum impregnatae fuerunt, contractæ permanent: uel alijs uero à partu infantulos suos lactantibus, uastissimæ euadunt, atque ita magnè permanent, lac fundentes quandiu lactum lactauerint: quo ablato, haud ita multo post à lactis generatione desistant.

GALeni PERGAMENI DE differentijs febrium liber I.

CAPVT I.



Porriæ ac maxime principales febrium differentie sunt, quæ sumuntur ab ipsa febris substantia, quæ in calore præter naturam consistit: ut si dixerimus, febrium aliarum quidem mordaces, aliarum uero sunt mitæ. At reliquæ differentie, ab accidente aliquo deducuntur: ut quid dicimus febrium aliarum pallidas, aliarum rubras, aliarum liuidas. Porro differentie caloris præter naturam, & ex eo quod magis & minus, & ex materia in qua calor accenditur, et ex modo morus cuiusdem caloris, sumunt. Sunt autem omnino euidentes, quæ

Priapismum ad uerum priapismum referendum esse, quia ad arterias.

Lumbi incalefcentibus, uerum priapismum reddunt.

Priapismum in ta in neruo fistuloso consistit.

Medicamenta excitanda: turgentia quædam uidentur.

Alimenta uero.

Priapismum qui solent uexari stercentem.

Cantores autem quum uisita secula erant lenes concubatores.

Pudenda uero reddenda ex rugosa.

Ignauia robur exoluit.

Exercitatio uero augere solet.

Mammae.

Febrium differentie maxime principales sunt, quæ sumuntur ab ipsa febris substantia.

Febrium differentie ab accidente aliquo deducuntur.

Febrium differentie ab accidente aliquo deducuntur.

Febrium differentie ab accidente aliquo deducuntur.

Stomachum reuerenti sinitur per consulsiones.

Gonorrhæa instrumentorum feminis est affectio. Priapismus, colicis est accidens.

Colicis est spiritus intendit.

Glandem priapismum semper magnitudinem æqualem causat. Vterus uero citra doctrinam aggraderetur. Quippe omnium quæ à cōsilio & uoluntate pendunt actionum instrumenta, esse per se docta uidentur.

Populares rationem quæ reuera sit admirabile, sed ea dumtaxat, quæ rara uident, prosequuntur admiratione.

quod in eo quod magis aut minus calor est accens, consistunt. Quo in genere differentiis, confuse uerunt medici magnam ac paruum febrem uocare, improprie quidem rei quali, non eam quanti tribuentes. Quæ uero à caloris materia ducentur, maximè propriè differentiæ caloris præter naturam sunt. Atque hæc æternario numero amittuntur. Nam ut incallescit ipsius cordis corpus aut qui continentur in uentriculis eius humores aut sola quidem æræ spirituality substantia sufficere in caluit humores autem & solida corpora incallescunt quidem adhuc, nondum autem sunt calefacta. Multa siquidem est in arteriis omnibus, spirantibus per infinita foramina, æræ substantia sanguini, ac nihilominus in corde ipso, ceu* confluxibili & conspirabili cum uniuersis arteriis. Incipit itaque hic præter naturam calor, quæ nominamus febrem, aliis ex alio eorum, que nuper diximus: spargitur autem, atque una cum patiente afficit duo reliqua genera. Facillima igitur ab humoribus ad spiritum caliditatis transumptio: non æquè autem promptè una cum spiritu, accenduntur humores. Corpus etiam solidum, humoribus atque æræ substantiæ facilius impartitur calorem, quam ipsum ab eisdem suscipiat. Omnis siquidem substantia tenuis, promptius alteratur quam crassa. Est autem tenuissima quidem æræ: crassissima uero corporum solidorum: media humorum substantia existit. Cæterum solidas partes, continentia humores, contenta: spiritus, impellentia appellauit Hippocrates.

CAPVT II.

Quod igitur ex laboribus, ira, tristitia, solis ardoribus, frigore, uigiliis, cruditate, ebrietate, & crapula, nonnulli febricitare cernantur, omnibus est in confesso: quemadmodum etiam, quod pestilens æris constitutio febres conciliet quodlibet periculosa sit conuersatio cum laborantibus pestilenti morbo, quom nimirum is non se fore sit contagiosus, quam scabies aut lippitudo. Sed neque tutum est cum his qui tunc correpti sunt, conuersari: neque (ut summam dicam) cum illis qui spiritum putrem reddunt. Iam uero qui confusæ exercina omiserint, & alii morborum generibus, & febribus maximè corripiuntur. Pestilens etiam, uisio cibi, medicamentis, gustus citra canis fydoris ortum, atque alia id genus complura, similiter febres accendunt.

CAPVT III.

Igitur calidum, frigidum, humidum, atque siccum, corporum elementa existunt: ex ipsorumque temperaturis primi constituntur morbi: quorum unus est febris, ubi in corde quædam præternaturam caliditas generatur. Ad differentiæ caloris, à triplici differentiæ materie desumebantur. Si quid uel in ipso corpore cordis, uel in humoribus, uel in spiritu, calor præter naturam accenditur. Principiunt autem causæ quedam consimiles, in omni febrium constitutione, quatenus dictum est. Sed neque sat est, si calor aliquis dicatur esse præter naturam, ad hoc ut dici febris mereatur: oportet siquidem prius ut cor illo incallescatur: alioqui calor à sole aut ab igni indutus, febris esset dicendus. Porro ira cunctia est ueluti fer

uor quidam, ac motus uehemens potentius irascibilis, in corde* delitescens. Simul autem cum eo seruire calit aliquando spiritus, aliquando substantia sanguinis. Quod si ira conrigerit, ut ea corpora que in se admitterent caliditatem, longè eam tempore retinere sint apta, licet motus cordis sedet, in hisce tamen permanet calor præter naturam, atque inde hominem febricitare est necesse. Huic uero modi autem febris habet originem à motu atque seruire nariuæ caliditatis. Quæ autem ex tristitia fit, ex solo motu, non autem ex seruire gignitur. At illius quæ labor sequitur, principium est musculorum, neruorum, copularum, & articularum motus immoderatus. Ea siquidem primò, calorem quendam concipiunt. Deinde uero continuatim calor ascendit ad cor, ac tunc homo necessarîo febricitat. Quæ autem ex densitate cutis accenditur febris, qualis maximè conspiciatur atque tristitia corporibus accideret solet, modo da cibus in corpore coaceruato contingit. Semper enim corpora animalium dissilant, id est duplici modo: nempe effusus ad exteriora uaporosus fuliginosusque fluitantibus, ac rursus intus attractis refrigerante ac uentilante narium calorem æræ substantia. Quum igitur uehemens aliqua causa eum ipsam condensans, metus angustiosus reddiderit, facilius in plethorica dispositione incidit corpus, si & uaporem & optimum, quod effluit, extiterit. At si fuerit modax & acie, nonnunquam febre corripiuntur: quo tempore etiam calor maximè augetur, refrigerio extrinsecus adueniente priuatur. Acris autem ac mordax superfluitas* effluit his, qui aut natura uisiosos habent humores, aut prauis cibis utuntur, aut facilius cruditate uexantur, maximè si potu eiusmodi cibos etiam uisiosam biberint. Idem his quoque accidit, qui supra modum laborant, aut uigilant, aut cogitant, aut medicamina acuta iugiter sumunt. Eorum igitur qui cruditate patiuntur, si quidem qui prauis succis redundat, ac male dissilant, aut in tempestiue laborant, aut balneis superfluis utuntur, faciliè corripiuntur febribus. Qui uero boni habitus sunt, integreque dissilant, & quiescunt, re gionem uentriculi & hepatis caliditatem, impossibile est ut febricitent. Nam in eisdem ceteris uentriculi & hepatis partibus, quicquid corruptum est, ac paulatim coquitur, redditurque optimum: sicut & his qui se moribus uehementioribus torquent, aut æstiuo sole, aut balneis calidis dulcium aquarum utuntur, quicquid uitiatum est, recipitur in corporis habitum. Quibus uero corrupti cibi descendunt in uentrem, * eos febres non corripiunt, nisi ob alias causas: ueluti si defatigati sint ob crebriorem deficiendi necessitatem, aut uentrem inflammatione tentauerint. Porro per obstructions meatuum, & humorum conspurationes, ob putredinem solet febris oriri. Promptissime namque putrescunt omnia calida & humida, in calidis locis contenta, nisi diffusi ipsa & refrigerari conigerit. Quæritur in altera plenitudine quæ ad uires dicitur, succi citò ad corruptionem decedunt, * quum nec uincantur, nec concoquantur à faculitate, utpote imbecilla existente. Propriè etiam quicunque cibi

Febris à ira
du quando ge
gnatur.
Febris orta à tri
stia.
Febris à exco
ritio immodica.

Febris à cu
tis densitate.

Dissili animæ
tra corpora du
plici modo.

Afflictionem co
ritu, quando fe
bris superatur.

Cruditatem pa
tientis, qui nō
facili in febri
modis, & qui
ægr.

Febris uiri fa
cili ob obstru
ctiones meatuum
Putredinem faci
le calida & hu
mida, si concu
sa in calidis lo
cis nec dissilant,
nec refrigerantur.
Plenitudo ad
uires.

glutinosi atque crassi sunt, & ratione putredinis magis morbifici existunt: quandoquidem succi ex ipsis geniti, longe prompiores sunt, ut & in meatibus harent, & impingantur. At aeres & attenuantes cibi, quod mali succi sint, febres etiā accendunt. Partes etiā quæ experiuntur inflammationem, ratione putredinis similiter febres inducunt. Impactus siquidem in eis qui influxit humor, si natura calidus sit, nec dissiliet, acutius putrefcit. Stigitur fluxione ipsam exquirit amarabilis pepererit, caliditas erysipelas partem occupat: si uero sanguis, phlegmonosus: at si ex utriusque miscellaneus humor, uel sit erysipelas inflammationis particeps, uel inflammatio erysipelas: nomen quidem ab humore excellenter suscipiens, cognomen autem ab altero. In hisce autem omnibus consortij lege febris accenditur. Nam proxima pars calefactæ particulæ, simul cum ea calfit, donec ad cor* dispositio ipsa peruenierit. Etenim in carbunculis id quod continuum existit, similiter cōcalefcit. Fiant autem ex sanguine quidem fati calido, & ad atræ bilis naturam, propter aduersionem, conuersio.

CAPVT III.

Calidiores aëris ambientis status, per inspirationem quidem manifestè cor calidant: corpori autem extrinsecus circumfusi, totum ipsum calidius reddunt: sed præferunt arterias, ut quæ ipsius substantiæ aëris ambientis aliquid ad se alligant: cum quibus omnibus affici etiam cor esse necesse: & quum calidius impendio fuerit, ipsum primum atque præcipue, calorem febrilem suscipere, ac deinde uniuerso corpori communicare. Pestilentis autem febris, inspiratio aëris uitari & putridi, maxime esse in causa uidetur. Fit aliquando etiam ob eos qui sunt in corpore humores ad putrescendum paratos, quum exiguum aliquam occasionem ad febris originem ab aëre ambiente accepit animal. Aëris autem putredo accidit, uel ob cadauerum multitudinem minime remoratorum: uel ob lacuum, uel paludum æstiuo tempore euaporationem. Cæterum nulla causa sine patientis aptitudine agere potest: alioqui ex æquo omnes afficerentur ab eadem causa. Quæ igitur uitiosis fucis redundant corpora, obstructis sunt, atque inerti uictus & exercitij ratione educata fuerit, ea sanè per pestilentes cōstitutiones ambientis, statim à prima inspiratione initium putredinis fument, ac plurimum in malo prouehentur. Quæ uero contrario modo disposita, nonnulla quidem nihil, nonnulla uero adeo exigui lëssionis percipiunt, ut minimo uergo cor reuertit ad naturalem habitum possint. Iam uero quum aëris temperatura, ad caliditatem atque humiditatem immodicam fuerit conuersa, pestilentes morbi exoritur: qui ea tantum corripit corpora, quæ ut afficiantur, prompta & idonea erunt. Etenim ea corpora quorum dispositiones consentiunt causis moribificis, facillimè contramittuntur: quorum uero renitiuntur, ac relictantur, quandoque uiribus ac magnitudine contrarietas ualeat, tantum inuicta cōtingit permanere ea corpora. Quum enim corporum dispositiones dissimiles ac multiformes existant, quædam faciliè alterantur, ac aptiùs ad causam in ipsa operante quæ

dum insuperabiles atque impatiibiles permanent: quædam ægrè patiuntur. Est autem ipsius medicus opus, correctiuū errorum omnium, qui circa humanum corpus contingunt. Quare in his omnibus prima esse debet, atque communis intentio, ut corpus quammaximè purum sit, ac perspirabile: secunda autem, ut præpotenti causæ aduersetur, quammaximè feripoterit. Nam quibus horum contraria insunt, corripuntur celeriter, ac crimèly laborant.

CAPVT V.

Igitur omnes pestifera febris à putredine originè ducunt. At ephemera, minime putredinem humorum sequuntur. Sed qui quidem ex solis incendio febricitat, ab agentis causæ caliditate affici naturæ est aptus. Qui ex ira, huic feruore quidem fieri caloris qui in corde constitit, est necessarium: uon tamen etiam putredinem. Sic & ei qui supra modum exercitatus est, uelientior calor præter naturam sine humorum putredine in corpore accenditur. Cui autem cunis adstricta est, quum prius acriorum superfluitates expirarent per eam, posteaquam sunt retentæ coaceruatæ, in febrem incidit, nulla interueniente humorum putredine. Porro quæ tumoribus inguinum superueniunt febres, omnes (auctor Hippocrate) perniciosæ sunt, exceptis ephemeras. Sunt siquidem quædam febres è genere ephemerae, superuenientes tumoribus inguinum: quæ quidem ab eis differunt quæ ex humorum putredine eueniunt, quæ uel in aliquo uiscerum, uel in causis & maximis uasis radicem habent suæ generationis. Quandoquidem quæ inguinum tumoribus ephemerae superueniunt, cōcalefaciunt semper partes uicinas, donec usque ad cor febrilis calor perueniat: quò tamen putrida fuligo non peruenit, fed ibidem, in loco inguinis circumscripita remanet, sola alteratione per continuum facta, atque usque ad cor ipsum extensa sola caliditate. In putredine autem quæ aut in uisceribus, aut in magnis fit uasis, quidam ueluti fumus, ex putrescentibus fucis ad uentriculos cordis attollitur. Præterea in tumoribus inguinum omnes simul, collecti humores putrescunt, siue per unum, siue per duos continuos dies, utpote in uno eodemque loco compacti qui in uisceribus sunt, uasis quæ magnis, quum perpetuo fluant, suoy contractu uicinas ad putredinem trahant, spatio temporis putridum calorem accendunt.

CAPVT VI.

Humorum autem putredo, quæ in uasis fit, similis est ei quæ in inflammationibus, abicessibus, atque tuberibus accidit, duplex existens secundum genus. Nam aut fit uincente natura: ut omnimodo superata, aut adeo imbecilli reddita, ut nullam amplius in putrescente excremento ad optimum moliri possit transmutationem: quod quidem tertium genus putredinis ex duobus primis constat. Per abicessum igitur, integrè superante natura, optimum conficitur pus, aspectu album & crassum, & quaque uerum sibi simile: læue autem tangenti, ac minime fortidum. Nam si semiputridum fuerit, æritum in tali transmutatione genus, quod paulo ante diximus,

Inflammati
particula cor si
bre, accendunt.

Caliditas erysi
pelas ex phle
gmonosus a
do insistent.

Carbunculi ori
untur à feruore
ex melanchol
ico sanguine.

Aer inopertis
calidior, quod
in corpore no
stra meliorat.

Pestilens febris
causatur inspira
tione aëris uiciat
ex putredine, uero
in uasis fucis
in corpore,
ad putrescentia
habili.

Causam nullam
posse agere, absque
patientis cor
poris aptitudi
ne.

Pestilens febris,
quæ corpora fa
ciliè ex quâ dis
positione corripit
autem.

Aeris cōfusi
o calidus et hu
midus, pestiferus
est morbi origo
na.

Corpora tantum
tenent causam
moribificam, fa
ciliè corripuntur.

Corporum dis
positiones disti
nctas.

Corpus omnia
pestilens autem
debet uel
de purissimum
et maxime in
perspirabile, si
causa propin
ta contrarietur.

Pestilens febris
omnes à putre
dine oritur.

Ephemerae uo
no fieri uel
interdum po
tredinis.

Ephemerae su
peruenientes in
moribus ingui
num, quando
à putredine disti
tant.

Putredo homi
num quæ in uo
sis fit, conuergit
duplîciter.

Pus laudabile
quale est de
beat.

mus, fit: quod si secundum magis & minus, varias differentias sortitur. Quotcumque autem in abscessibus putredine sunt differentie, tondem & in febribus quæ ex putredine succeduntur, sunt eorum quæ in urinis apparent, formæ varietates. Optima uero urina quæ ex putrescente humore perficitur, qui adhuc concoctionem à continens uasculis suscipiat, est quæ albam, leuem, æqualem, & minime fœcidā habet hypostasim. Pessima autem est, quæ in omnibus maxime cōtrario modo se habet. Quæ uero intermedia existit, quantō ad alterā propius accesserit, tantō aut melior est, aut deterior.

CAPVT VII.

Porro febrium ephemerarum hoc unum est præcipuum atq; inseparabile indicium, quod ab aliqua manifesta causā principientem (quam procatartica uocant) oriatur. Non est tamen id signum earum proprium. Nam & aliarum quædam, à causā manifesta gignuntur, quæ nimirum præcisit. Inseparabile uero & cō proprium ephemerarum est, urine statim primā die concoctio: pulsusq; ad magnitudinem & celeritatem effatu dignam accedens, ita ut frequentia à proportionē deficiat secundum externam quietem. Est autem & magis inseparabile & proprium, quod nullo modo ad celeritatem ea pars pulsus, quæ dicitur systole, tendit: & si aliquando contingat, hoc, minimum ac uix perceptibile existit, parumq; à naturali tenore mutatum. Sed & caliditas sanitas, proprium atque inseparabile est huiusmodi febrium indicium. Inseparabile quoque, æqualis atq; incompressus ascensus, in calore simul & pulsibus: non tamen proprium, quum & alijs quibuscumq; adfit: sicuti etiam consistente febre mediocriter. Neq; enim hoc etiam est ephemerarum proprium, quamquam eis maxime inest. Proprium præterea inseparabile: ephemerarum indicium est, cum sudore, aut rore, aut aliquo optimo uapore inclinatio, quam sequatur integritas. Atq; hæc quidem est communis ephemerarum febrium dignotio. Earum uero quæ ex aduerbo ab ephemeris est distinguuntur, quedam in putredine humoris consistunt, quedam solidas animalis particulas occupant. Atque hæc sunt medici febres heclicas appellatæ, uel quia firmæ atq; fixæ, perinde ac habitus, sunt: uel quia corporis habitum comprehenderunt: sic enim partes solidas uocitant. Primum aptum & proprium, non tamen inseparabile, putridarum febrium est signum, quod nulla procatartica causā eas antecedit: id quod necrit aliorum generum inest. Quandoquidem ephemeræ omnes oriuntur à procatartica. Hæclicæ autem, quando sine his gignuntur, minime ab initio inuadunt. Vbi quæ igitur citra manifestam, principientem causam cepit febrile, scire oportet eius febri causam in humoribus esse. Interdum tamen aliqua ex procatartica causā sui ratione febrim accendit ephemeram: succedit autem altera ex putredine humoris, ubi quod afficit corpus, & impurum, & superflui humoris colluie redundans fuerit. Successione autem ipsius, una quidem propria inseparabilis dignotio habetur, quod febris ephemerā ad integritatem non

definat. Contingit uero aliquando, ut per uigorem ephemeræ, cum multo magis per declinationis initium, signum aliquod permutationis cernatur: uidelicet si ea tranquillitas abfit, quam adesse oportebat. Initium autē fumere à rigore febrem, ubi nec insolaris, nec præcisit aliqua refrigeratio uehementis, putridarum febrium est proprium signum, non tam inseparabile. Si quidem non inest putridi febribus rigor: sicuti neque horrores. Præterea inæqualitas pulsuum atq; caloris, siue in principiis, siue in augmento contingat, huiusmodi febrium est signum proprium, sed ne ipsum quidem inseparabile. Multo autē minus inseparabile existit, quod accensionis ipse habeant plures ueluti insalutis: id quod superetacerbari uocamus: quemadmodum & pulsuum compressio, quæ putridarum febrium est propria (nisi aliquis symptomatis ratione citra febrem ea accidat) non tamen inseparabilis. Maximum etiam earum febrium quæ à putredine oriuntur indicium est, mordacitas & acrimonia caloris, quæ perinde ac fumus nares & oculos, sic ipsa erodere tactum uidetur. Sed in principiis quidem accensionum, utpote in quibus calor adhuc suffocatur, superfluitatib; succeduntur intus, non statim ea qualitas, adnotā manu, discernitur. Arper moram, prædicta caliditatis species effertur ex penitioribus partibus. Proprium præterea inseparabile putridarum febrium est signum, uelocitas systoles, quæ manifestius quidem in crescentibus febribus, non obscurat autem in incipientibus & consistentibus fit. Comitarur autem hæc febres, in initijs quidem, pulsus paruus ac uelox: quum uero constitunt, uelox simul & magnus. Sic & quæ circa externam quietem uersatur frequentia, in huiusmodi febribus deprehenditur manifeste. Cuius similia neque in ephemeris, neque in heclicis cernunt. Maximum uero & harum febrium indicium existit urinx cruditas: eandemq; est proprium, imbecilla concoctio. Neque enim unquam magnum aut effatu dignum concoctionis indicium per huiusmodi febres in primis urinis apparet, si quidem excipimus eam, quæ fit ex ephemeris febribus, permutationem. At uero pulsus durus nullius generis febrium, quatenus febres sunt, est aut proprius, aut inseparabilis. Comitarur tamen magna ex parte heclicas febres: nonnunquam uero etiam duo genera alia, symptomate aliquo interueniente. Quippe durities accidit arteriarum tunica, aut ob congelationem, aut tensionem, aut siccitatem. Congelationem igitur, uehementiores algores efficiunt: tensionem uero, inflammationes, & duri tumores, & neruorum dispositio inflammationibus correspondens. At siccitatem, euacuaciones diuturnæ, & longi temporis fames, & diutinx febres ardentis. In uniuersum autem, quæcumq; solidas animalis particulas uehementer excant, sicuti & heclicæ febres, arteriarum duritiem efficiunt.

CAPVT VIII.

At uero heclicæ febres magna quidem ex parte ardentibus febribus solent superuenire, uisq; adeo productis, ut humorem in corpore cor-

Ephemeram permutari in putridam, quibus distinguatur indistinctum.

Putridarum febrium calor cit mordax & acrim.

Putridi febrius adisti uelocem systolem.

Putridarum febrium pulsus.

Putridarum urinx qualitas.

Febrium nulli, quatenus febri adisti pulsus dantur.

Durities uelut accidit arteriarum tunica.

Hæclicæ ardentibus febribus solent superuenire.

dis contentum absumpserint: quanquam fieri etiam potest, ut magna adhuc eius portio setetur. Ceterum illæ non tantum hæctice sunt, sed etiam tabidæ. Quæ uero manente adhuc humiditate gignuntur, ubi cordis occupauerint corpus, hinc maxime succeduntur, quemadmodum lucernæ flamma ex ellychnio. Alio autem modo febres hæctice oriuntur, ubi statim ab initio inuadentes, similem ortum cum ephemeris habent: uidelicet aut ex ira, aut tristitia, aut lassitudine insigni, aut ardore solis contractum. Quæ igitur sic gignuntur, non à modum ægrè curantur. Quæ autem perueniunt ad tabem, ipsæ, ubi iam exquisitè conflantur, & iamdudum inceperunt, ut medeamur est impossibile. Si quidem earum natura calida est & sicca, quum per eas tale quid perpetiatur cor, quale lucernæ ellychnium, dum plurimum est exustum. Dissert autem tabida febris à tabe, siue marasmo. Marasmus siquidem etiam absque febre in decrepitate ætate solet accidere, extincto naturali calore: id quod nihil aliud existit, quam mors, quæ ferè sine sensu doloris, ac secundum naturam, ex siccitate contingit: sicuti & ipsi qui præter naturam tabescunt, altera species marasmi accidit, quæ à Philippo ex morbo senectutis uocatur. Tabida uero febris non tantum sicca, sed etiam calida est passio.

CAPVT IX.

Hæctica igitur quæ in tabem incidit, febris, cognita promptissima atque facillima existit. Nam priusquam pulsus atque calorem perpendas tactu, uidebis oculos immodicè concauos, ac ueluti in foueas quasdam reconditos, exhausto iam uniuerso ipsorum humore, ita ut osium, quibus palpebræ cohererent, eminentiæ cerentur. Sordes præterea in ipsis facie ostenduntur, & quædam uelut squallida dispositio, qualis maxime inest ipsi, qui toto die sub solis ardore per puluerem uter longum fecerunt. Quinetiam in eis est coloris flos uitalis extinctus: frontisq; & faciei cutis rigida, ex siccitate, & squallida. Ad hæc, sic affectu frequenter palpebras contrahunt, dormitantium instar: non tamen affectus eorum est somnus, sed potius uigilandi impotentia. Præ macie etiam sunt illis collapsa & concaua tempora: nihil in eorum corporibus cernitur præter cutem atq; ossa. Pulsus autem tenuis, durus, debilis, atque frequens apparet. Caliditas uero, quum primum admouetur manus, languida est: paulatim autem acredinem, atque erosionem ostendit: ac magis, quum plus tangendo immoraberis. Porro marasmus tunc incipit, dum cognatus humor, qui in medijs partium simularum spatij inspersus est, & ex quo primum uniuersæ partes nutriuntur, periclitatur circa corpus cordis non amplius adesse. Quandiu enim pars aliqua humoris illius conseruetur, solum febris hæctica existit, nondum etiam tabida. Vbi uero res eo discrimine iam peruenit, ut nihil ex tali humore super sit, tunc exquisita tabes existit. Est autem hæcticorum omnium dispositio difficilis, ubi præterierit principij tempus: quod non dierum aut horarum numero, sed ipso dispositionis modo determinandum est.

Ceterum quum naturalis temperies cordis primum inuerti in ceperit, neque natiua humiditas protinus dissipatur, neque uirtus laborat plurimum: sed primo fit ueluti quædam effluencia ipsius humiditatis: quo tẽpore facili est eiusmodi febrem sanare, tanquam nihil adhuc uirtute perperit. Tantum autem uirtus laborat, quantum siccitas & caliditas in ipso corde inualuerit. Iam uero, quæ febris æqualiter ab utraq; distat, ab ea scilicet quæ exquisitè tabida existit, & ab illa in qua nihil est adhuc tale, mediam quodammodo se habet ad curationem, dubio ad partes ambas momento inclinans. Quæ autem tabidæ proximior existit, est uicinior periculo, quum quæ alteri primæ magis adheret, non par uiam salutis spem possit nobis promittere. Finis igitur aliquem esse corrupti febre, quam præcesserat conspicitur: & procatartice caute. Si enim febris ipsa ad sequentem diem extendatur, neque integrè desinat, neque exasperetur magis, ariditatem tamen maiorem in corpore repræsentat, talem hæcticam fore tibi suspicandum facit. Quod si & in tertio die sine cibo permanere uoluerit æger, donec tertiæ accessionis præterierit horas suspectas, nihil esset tu dignum priori accesserit febrî, aut imminutum fuerit, sed tantummodo quædam exiguæ reliquæ primæ febris procedant, permanenti quum ariditate corporis, & caliditate, quæ primo quidem tactu mitis sentitur, processu uero acris, mordax & sicca: huiusmodi febrem hæcticam esse existimandum est. Maximum uero & indubitatum erit eius nature indicium, si cibum homini post suspectas horas obtuleris. Statim siquidem una uel altera hora post cibum exhibiturum, quicunque ægrotantem tetigerint, alteram febris accessionem opinabuntur adesse. Omnibus namq; hæcticis febribus hoc proprium inseparabile adest indicij, scilicet quod altaro cibo accendatur calor, pulsusq; ad magnitudinem & uelocitatem augeatur, sic ut uideatur oborta esse incompressa quædam accessio, hoc est, libera ab omni inæqualitate, qualis comitarialis febris solet. Nam tamen in alijs nonnullis febribus huiusmodi *insultus incompressi cernantur, q; tamen absque cibo solent accidere. In febribus autem hæcticis nunquam aliqua accessio conspicitur, sed perpetuo cernitur una febris continua, ut illa quæ synochos appellatur. Eam tamen quandam ueluti flammam plurimam admouenti manum possidet occurstantem: pulsusq; ædit celerrimos, frequentissimos, atque maximos. In hæcticis autem febribus, neque multa occurrit caliditas, pulsusq; tantò minores, rariore, atque tardiores sunt ipsi, qui per synochos fiunt, quando enim caliditas ipsa est minor. Commune itaq; omnibus hæcticis febribus est, quod pulsus, & semper à principio usque ad finem æquales existant. Proprium autem est tabidarum, siccitas. Nam sine siccitate sæpius hæcticæ febres consistunt, quum minimè in tabem degenerant. Iam ceteras febres quæ incompressas accessiones fortuntur, omnino comprehensio aliqua comitatur, dum cibus ingessus fuerit in accessionis principio, Hæctica autem, post

Tabida febris.

Hæctica febris interit ab initio immadida similitudinem habentes ephemerarum.

Hæcticarum nonnullas quodam facile, aliam ægrè curari non recipere.

Marasmi.

Tabida febris à tabe quomodo differat.

Tabida febris uisitata.

Marasmi quomodo incipiat.

Tabes exquisita quando discatur.

Hæctica febris inuaginata.

Hæctica febris post sumptum cibum ex acris fore, ex contrarijs equalis.

Hæctica febris nulla adest accessio. Synochos febris uel tota uel breuiter tantum.

Hæcticarum pulsus æqualis semper à principio usque ad finem est. Tabidarum febris non propriè est siccitas. Hæctica febris aliquæ facies continet.

post cibum assumptum, quendam uelut incon-

*Febri cuiusque
alteram pulsam
post cibum ma-
gnitudinem at-
que uolentiam.*

cussum insulsum fieri contingit, qui tamen non
est accessio, sed incrementum caloris, atque pro-
motio pulsus in magnitudinem atque uolentiam,
qualis cuiusque alteri post cibum solet accedere.

Quamobrem alteratio ipsa tandiu perdurabit,

*Hectica flatum
ab initio, quo
preboscantur.*

donec distributus cibis appositus, humectauit
rit cordis ariditatem. Postea uero corpus ad pri-
stinum reuertetur statum, in quo antea quam ci-
bus exhiberetur, conspiciebatur. Quod si rursus
nutrire uelis, uel in diuersis temporibus, senties
semper calorem post cibos adactum: pulsus au-
tem (ut dictum est) alteratos: utpote quibus idem
uidentur accedere, quod calci & lapidibus calefac-
tis, quorum nimirum caliditas arida, per aquae
assumptionem, & ab humida substantia nutritur. Hu-
miditas enim caliditas, quam sicca, uires habet non
parum euidentiores. At uero siccam in hectica
febris esse caliditatem, quae consequitur ra-
bes, hinc constat, quod nullus eorum qui habitu
corporis sunt humidiori, statim ab initio huius-
modi febre correptus fuerit. Quicunque autem
sunt natura sicciores, ac praesertim si temperiem
etiam calidiorem fortiantur, uiraciter elegerint
in laboribus, uigiliis, curis, tenuis uictus ratio-
ne, hos statim ab initio solet hectica febris inua-
dere, ex ira, uel tristitia: ac magis uixit, statim
temporis calido & sicco, ac loco praeterea con-
simili. Ac terminus talium hecticarum principij
est, si eo tempore, quo solent pleniter ad inte-
gritatem desinere, non solum istis nihil tale acci-
dat, sed siccitas etiam manifeste intendatur. Al-
ter uero cuiusdam ueluti ipsius augmenti, atque
integritatis perfectionis terminus, est tertii dici ac-
cesso. Nam si tunc nec altera accessio superue-
nerit, neque agrotus ab his febre fuerit, adacta in-
super siccitate, proculdubio hic hectica febre la-
borat: quae progressu temporis citius ad tabidam
conuerteretur, nisi recte curenur. Terminus autem
permutationis ipsius ad tabem est, dum pulsus
debilis simul atque durus sentitur: qui quidem ne-
cessario etiam erit paruus & frequens: non ta-
men propterea febris dicitur tabida, sed ob id po-
tius, quod debilis atque durus existit. Debilitas
siquidem, uel elementem sequitur febris intempe-
rantiam: durities autem, ariditatem. Si igitur
huiusmodi affectus cor occupauerit, hinc febre
tabida necessum est animal laborare. In eam-
dem uero incidunt febre ex ardentibus atque acu-
tis febribus plures, qui recte curati non sunt: quibus
quum egerent portione frigidae, non solum eam
non biberunt, sed nullum etiam aliud refrigerans
medicamen applicauerunt thoraci & praecordiis.
Quin etiam hepatis ac uentriculi inflammationi-
bus, nisi recte curenur, tabes superuenire con-
suevit, affectione ipsa cordi communicata. Si qui-
dem tabe corripitur cor, interdum quidem ex se
ipso, sicut per excaecationem, uel ementesis at-
que diuturnas tristitias: nonnunquam uero ex
ardentibus febribus: aliquando autem ex pul-
monis ac thoracis affectibus, ac praesertim ex em-
pyemate & phthisi, atque adeo ex diuturnis nobi-
lium partium inflammationibus. Similiter in lien-
teria & diarrhoea, si uel ab initio statim, uel pro-
gressu temporis, febris inuaserit, tabide postea se-
bres succedunt. In uniuersum autem, quando-

*Tabida febre
tunc laborat
animal, quo ca-
lor hecticum iam
ipsum cor occu-
pauerit.*

*Tabes quibus
solet superue-
nire.*

*Tabes corripi-
tur quibus, ex cau-
sa prius.*

cumque praexcitatum cordis corpus febrilem ca-
liditatem susceperit, & quae cum difficultate ex-
tinguatur, tabida occupatur febre. Quare & quia
arteriae circumstantibus partibus calidiores sen-
tiuntur, maximum sunt hecticarum febrium in-
dicium. Vbi igitur sola per seipsam consistit hec-
tica febris, peripneumonia est, an sit absolute heli-
ca, an simul & marasmodus. Vbi uero hectica fe-
bris una cum putrida coit, longe difficilius cogno-
scitur: quamuis ex artularum perseverante calo-
re, motusque celeritate & frequentia, eam discerne-
re possumus.

*Hectica misse
n interdi cum
putrida.*

CAPVT X.

Porro qui ex febre solis inciderunt in febrem,
his cutis magis ad calorem & siccitatem, quam
pulsus ad febrilem uergit dispositionem: nam &
minus sibi undi sunt istae, qui aequalem habent ca-
liditatem: & quamprimum minus admoventur,
ingens calor percipitur. Contraria res se habet in
istis, qui ex cute densata & adstricta laborant: nam
in eis reaccenditur calor. At qui ex febre solis
agrotant, his maxime deuri caput uidetur: plusque
ex balneis frigidis unctans & delectationis per-
cipiunt. Oculi quoque in eis rubicundiores & ca-
liores cum quadam ariditate uidentur, si qui-
dem sine grauedine ac destillatione affligantur.
Est autem minus calida cutis his qui ex frigiditate
febricitant, corpusque eis in maiorem tumorem
attollitur: ac nullus in fronte squallor, qualis illa
qui ex insolatione febricitant, sine plenitudine capi-
tis. Si quidem magna ex parte his solet caput
pleri, nisi quis purum, materisq; inunilis expert
corpus possideat. Solis quippe his caput calidius
contingit, sine aliqua plenitudinis noxa.

*Febri ex insola-
tione.*

*Febri ex cute
adstricta.*

*Febri ex frigide
diuturna.*

GALENI PERGAMENI DE
differentiis febrium Lib. II.

CAPVT I.

Superest autem nunc, ut de differentiis febrium
quae ex humorum putredine oriuntur, si-
militer disseramus: idque ubi admonuerimus
prius, non sat esse (quemadmodum multi opinan-
tur) ad omnium febrium generationem, si in cor-
pore amara bilis redundet. Alioqui laborantes
arquato morbo, ad unum omnes maximis cor-
riperentur febribus: id quod nequaquam con-
tingit, priusquam bilis quae in illis copiosissima
est, computrescat. Absurdum etiam est credere, in
quarantia & quotidianis febribus exquiritis, ac-
ceruari bilem amarant, quemadmodum in ter-
tianis, atque in causonide, quum in illis nullum ta-
lis succi uestigium adfit. Etenim febres tertianae
magna ex parte in corporibus natura magis bi-
liosis sunt in aetate uigenti (quae omnium bilio-
sissima est): tempore aestiuo (in quo dominatur
is humor): in locis praeterea quae calidam & sic-
cam temperiem possident, in similibus aeris ambien-
tis constitutione: ac breuiter in homine qui la-
boribus, curis, uigiliis, atque tenuis uictus ratio-
ne, eademque calida & sicca, ac denique medicami-
num calidissimum & exiccantissimum immodico u-
su, fuerit commacerratus. Quotidianae uero, natu-
ris in quibus pituita superfluit, sunt familiares:
in hyemeque praecipue, atque in omni locorum &
temporum statu frigidiori atque humidiori gi-
gnuntur. Ex aetate porro, senilem atque pueri-

*Tertianae febres
quibus natura
magis sunt fauor-
abiles.*

*Quotidianae fe-
bres quibus na-
tura magis sunt
familiares.*

lem infestant magis: praefertim si accedat otiosa uita, quam crapulae comitantur: atque etiam si post pituitosos cibos quipiam balneis utatur. Neque etiam in qui quotidiana febre teneantur, amaram euomunt bilem, nec per uentrem inferiorem aut sudores illam excernunt, quod in febribus contingit tertianis. hae siquidem flaua bile putrescente gignuntur. At quotidiana ex pituita, quemadmodum quartanae ex atra bile, ducunt originem. Proinde corporum naturae magis ad atram bilem procliuem, ex atrabitis, praecipue declinant: ex anni uero temporibus, maxime autumns: ac breuiter uictus uniuersus frigidus atque siccus, quartanis febribus originem praestant. Quare & rigor qui utrunque genus febris antecedit, haudquaquam similis est: sed qui in tertianis quidem accidit, repraesentat sensum calidius effusum, ueluti rei cuiusdam pungentis, ferientis: qui uero in quartanis, tanquam refrigerantis. Porro febres intermittentes, quae nimirum ad integratam desinunt, atque non habent ab humore qui per omnes corporis partes suo motu deferretur. At in continuis, humor delinquit atque conuenit in uenis.

CAPVT II.

Intermittentium igitur tres sunt omnes numeri differentiae, quotidiana, tertiana, & quartana: quotidiana quidem, ex pituita; tertiana autem, ex flauae bilis: quartana denique, ex atrae putredine propagata. Continuarum autem quae ex flaua bile proueniunt, duplex species habetur: una quidem, earum quae appellantur synochi: quarum uniuersum tempus unica accessio existit, a principio usque ad finem extensa: altera uero earum quae idem cum genere nomen habent, continuari dicuntur, atque in pluribus particularibus circuitibus continentur. Earum igitur quae appellantur synochi, tres differentiae connumerantur. Nam earum quaedam a principio ad finem usque perseverant aequales: quaedam paulatim augentur: aliae decrescunt, atque minuuntur. Vnde nonnulli primas quidem huiusmodi acmaticas, secundas epacmaticas, tertias paracmaticas, hoc est, uniformes, iuualescentes, & decrescientes, nominant. At continuarum duae sunt differentiae primae. Si quidem earum nonnullae quidem, tertio quoque die inualescunt exasperanturque, referentes naturam tertianae febris: aliae uero etiam die intermedio exacerbationem faciunt: neutrum tamen harum ad integritatem desinunt. Earum igitur continuarum quae die intermedia accessione faciunt, nonnullae quidem formam quotidianarum seruant, nonnullae accessiones simillimas facientes: aliae uero, quomodo duas dissimiles faciant, simillimam primae tertiam efficiunt, atque secundae quartam, instar duarum tertianarum progredientes. Haec igitur ex biliosa magis, alterae uero quae singulis diebus similem accessiorem faciunt, ex pituitoso humore consistunt. Est & tertium genus febrium continuarum, quae perraro tamen eueniunt, quarum accessiones quartanarum figuram progredientes ostendunt, nec desinunt tamen integre. Quemadmodum autem febris tertiana aliquando sit duplex, & aliquando tripliciter hae etiam non duplex modo, sed triplex potest esse adde.

CAPVT III.

Quae igitur a flaua bile perferibiles corporis

partes delatae oritur febris, ea cum rigore inuadit, atque ardentis febris similitudinem gerit, & biliosis uomitibus, aut diarrhoeis, aut sudoribus, uel horum quibuscumque, uel omnibus simul, soluitur. Huius febris accessio duodecim ad summum horarum aequinoctialium intervallo finitur. Vocamus autem ipsam exquisitam tertianam, quae in temperatura laborantis biliosa, & anni tempore, & regione, & uictus ratione, calidius & siccis consistit. At uero copiosior bilis, ea quae pauca est, longiorem facit accessiorem: tenuis autem, crassa breuiore. Sic & uigor, maior quidem, breuiorem: imbecillior autem longiorem. Praeterea corporis dispositio, rara quidem breuiorem, densa uero longiorem. Tempus autem intermissionis in hac febre, nullum habet humoris putrescentis ex pulsu perceptive in indicium, in die aut nocte, quae consequatur accessiorem. Quomodo uero parumper succenditur, uix agnosci potest in primis diei aut noctis subinde sequentis partibus: manifestus autem circa fines ipsius diei uel noctis: atque adhuc manifestus die proxima, quae uel delictet antecedit accessiorem diem uel noctem. In illa uero iam signum euidentius apparet, ac multo etiam magis accessione iam in capite: atque adhuc plus inualescente febre. Quam uero iam consistit, minus quam quomodo augebatur: multo igitur minus ubi iam declinauerit.

CAPVT IIII.

Est & alia exquisita simplicitatis febris, quae ex putrida gnosia pituita ortum habet, per sensiles a natura partes impulsae. Incipit autem a generatione extremorum, & horrore magis quam rigore. Cum difficulter per eam accenditur calor, ac longum consumit tempus dum inualescendo peruenit ad summum. Quoniam uero in ex quo constituitur humor, frigidus est & humidus, ac praeterea lentus & tenax, idcirco exagrandi accenditur, ac tarde mouetur, sapientius in foraminibus haeret. Opprimat autem atque aggrauat aliquando uirtutem: unde inaequales ac debiles magis, paruorum effici pulsus, qui primum accessiones inuadunt, atque in primis incrementi partibus. Fiant & in biliosa febre circa accessiorem principia, singuli quos diximus pulsuum affectus: in ea tamen statim desinunt: cetera uero, necnon inaequalitas, plerumque tali febre inuadente non adsunt. At postquam cessauerit rigor, non multum post calor accenditur, ueluti ignis effusus, purusque, omnino fumosus fuliginis expertus. Pituitosi autem humoris caliditas, ignem humidum ex accessu lignis uindictis reicit. Idcirco & exiguae euacuationes ab ipsis, & accessiorem spaciolum longius producit: neque intermissionis tempus est adeo ut in tertiana synceram, sed humoris putrescentis seruat indicium. A tamen quam exquisitam suam naturam seruaerit, plerisque & mihi non raro uidetur habere puram intermissionem. Hae febris, naturae consequitur corporum, & tempora, & loca, & status, atque, & uictus rationem, aliisque omnia prorsus alumna pituitae. Accenditur autem singulis diebus, etsi minus calida sit, quam biliosa tertiana. Haec enim, quam humor libeat minimo negotio inflammabilem, facilius quiescit ex eo esse uerit, totum propter subtilitatem in accessione expurgetur, ad priorem quandam integri-

Tertiana febris
Symptomata.

Tertiana ex quo
sita qua.

Accessione febris
quae facit
breuiorem,
longiorem.

Quotidiana febris
descripta.

Tertiana ex
quotidiana de
serui potest sua
sua causa.

Quotidiana et
tertiana febris
descripta, quae
in accessione de
clinantibus, ut
expurgatur in
tegit, ac euacua
ta tertiana.

Tertiana sunt
a flaua bile co
puescentia.

Quotidiana sunt
a pituita.

Quartana fe
bris quae origi
nem praestant.

Rigor qualem ter
tiana, quartana
na.

Intermittentium
febrium ex qua
tornantur differ
entia.

Intermittentium
febrium tres dif
ferentia.

Continuarum
species duplex.

Synochi triues
sunt tempore
tunica accessio.

Synochorum tri
differentia.

Huiusmodi fe
bres.

Acmatica fe
bris.

Epacmatica
febris.

Paracmatica
febris.

Continuarum
duae differen
tia.

Continuarum
quae tantum reperi
potest.

integratē terminari uidetur: atq; exiguū quoddam uestigium post paroxysmum, patridē caliditatis relinqueret. Quae aut ex pituita febris accenditur, in accessione declinationibus non expurgatur integrē, neq; parum relinquit eius quod ueluti succendit uidetur: ac proinde intermissio eius longe deterior est, ac secundae accessiois multo magis festinat insulsum.

CAPVT V.

Tertium febrium intermitentiuū genus est exquisita quartana, quum ex solo atrā bilis humoris gignitur, qui frigida & sicca constat temperatura. Succenditur autem paulatim, ueluti lapis alius, aut corpus similitur frigidum atq; siccum. Vbi uero aliqua ex co blāma fuerit accensa, nihil humidum, aut semicombustuū in accessione relinquit: atq; idcirco ex hoc humore, quum ex pituita, plures euacuaciones oriunt, inter missioq; exquisitē pura uidetur: quandoquidem quicquid attrā bilis a cecum fuerit, exhauritur atq; discutitur. Quamobrem in sic affectu talis est rigor, qualis nō, qui uehementi gelu frigsūt. Hanc autem febrem necessariō antecediunt, quae cumq; atram bilē accumulāt. Ceterū accessio ipsius, quod quidem ad longitudinem pertinet, similis est tertianae: nonnūquā etiam & longior, quum uidelicet exquisita persistit, nempe ad frigidiorē humore producta. Pro multitudine autem & qualitate humoris, uigore & imbecillitate potentiae, necnon ipsius pētorantis dispositione, per omnes febres folēt longitudine accessiois uariari. Si igitur neq; putrescat, neq; uehementer per partes sensiles deferatur, melancholicus humor, nunquam efficiet exquisitum quartanum circuitum. Iam uero, regij quidem morbi passionibus, diuturni melancholici spēs affectus, & colores in roto corpore sordidi: herpetibus uero atq; erysipelatibus, quae ex flaua bile gignantur, cancri & phagedaenae, proportionē quadam respondent. Verū neq; in his, neq; in alijs attrā bilis affectibus necessariō febricitat, nisi prius atrā bilis putrescat. Nec per quippe natura suis uiribus freta, quicquid optimū reddi potest ex succis, id nutriri dū paribus conatur assimilare: excernere autem, quod talem correctionem nō recipit. Quod si quando ob occasionem aliquam id ipsum nequeat expellere, necessum est, ut diutius delitescens in animalis corpore, corrumpatur. Sic igitur nō qui morbo regio, atq; atrā bilis passio inest, quando biliosi humores superabundantes, diutius corpus obfederint, febri superuenire cōsueuit. Sed neq; ob redundantem pituitam febris unquam accenditur, nisi prius co putruerit. Ob pituitam aut uisum est sapius, quod impossibile arbitrabatur ueteres, hori absq; febre rigorem.

CAPVT VI.

Ex genere quotidianarum est febris quam Hepialam uocant, ubi simul & febricitat, & riget regij, atq; eodem tempore in toto corpore utrunq; sentiunt affectū. Oritur autem haec febris ab humore illo, quē uitrum Praxagoras uocat, quib; est species quaedam pituitae, satis frigidus atq; tenax exsistens. Siquidem omnis frigidus atq; humidus succus, ad pituitae appellationem refertur. Cuius tamen plures sunt differentiae. Est nanque una species pituitae, usque adeo frigida, ut

quā detinetur alicubi, doloris acerbissimos excitet. Atq; haec sanē uitro fusio est perissimilis. Est & alia pituitae species haudquaquā exacitē frigida, quam pleriq; cum scraetū expuunt, sensibilem habere dulceduem. Accedit tertia species pituitae, quae sentitur expuentibus acida: estq; minus frigida, quā quae discit uitrea: magis uero quā dulcis. Praeter has species, est falsa aut ob putredine, aut ob serosū humiditatis mitionem: ex qua quidem febricitantes non rigent, sed tantummodo horrent. Acida uero ac uitrea pituita, si per partes sensiles deferatur, rigores citra febrem inducit. Quod si modica aliqua in ipsis fiat putrefactio, febrem Hepialam conciliat. At si uehementius putrescant, rigor quidē antecedit, febris uero sequitur, a multitudine caloris frigida materia deuicta. At putrescente dulci pituita, rigor minimē antecedit febrem.

CAPVT VII.

Porro si pituita putrescat miscetur amarq; bili, duplex uero causa, sic etiam dispositio iungetur. Alter siquidem humor affertur quondae accessio-nem, alter uero tertio quoq; die. Itaq; alter quidē dies duas accessiones habebit, alter uero unam duntaxat: nisi accessio-nē tempora feli mutuo cohaereant: cohaerentibus siquidem fiet una febris confusa, quae neq; purae tertianae, nec quondianae formā prae se feret. Quoniam uero utriusq; febris duplex species est, quatuor ex ipsis fient cōiugationes. Una quidē in qua tertiana quondianae intermittit miser. Altera, in qua tertiana quondianae continuae iungitur. Tertia, in qua quondiana intermittens, tertianae continuae miscetur. Quarta deniq; in qua permixta quondiana cōtinua tertianae continuae. Harū uero nuper dictarū coniugationum omnium, duae sunt differentiae: quum aliquando quidem in eandem horam accessiones occurrant: nonnūquam uero diuersis temporibus superueniant. Ceterū ex accessio-nis forma, non ex periodorum simili proportionē, cognoscenda ipsa febris uenit. At quae singulis diebus accenditur atq; intermittitur febris, ea amphimerina, hoc est, simpliciter quondiana uocetur. Quae uero intermissionem non habet, continua quondiana dicatur. Idem etiam & in alijs febribus est faciendum iudiciū. Iam uero ex quondiana continuā, & tertiana intermittente, hemitritaxi natura constat. Quum igitur tertianae insultus cum rigore inuadat: quondianae autem continuae, sine rigore: sanē si ambe in unam horam (quod interdum per hemitritaxum contingit) coaspirent ex quo, febris constata ex utraq; horrore prae se feret, rem quidem rigore minorem, sed maiorē refrigeratione. Quocirca dimidiata hemitritaxi portio nem ex utraq; larum febrium (dico quondianae continuae, & intermittentis tertianae) occupabit. Est autem hemitritaxi duplex generatious modus. Nam aut illarum febriu accessiones in unam eandem horam cōeunt, quod altera quidem anticipe, atq; altera prorogetur: uel statim ab ipso initio ambe febres miscentur & confunduntur. Quae igitur fit, in unum tempus conspirante utraq; accessio-nē, unum duntaxat hemitritaxi naturae paroxysmum fortitur: altera autem omnes, a principio aggritudinis usq; ad finem: quae febris maxime ab

Quartana exquisita gignitur ab atra bile.

Quartanarum rigor qualis.

Hepialam fieri etiam a pituita acida.

Tertiana febris ex quondiana mixta, quae tunc coniugatio potest.

Amphimerina febris.

Hemitritaxi constitat ex quondiana continua, & intermittente tertiana. Hemitritaxi tandem cum horrore.

Hemitritaxi duplex generatious modus.

Rigorem absq; febre aliquando ex pituita acci-tum.

Hepiala est ex genere quondianarum. Hepiala oritur a uetrea pituita.

Pituita species quatuor.

omnibus hemitritixos uocatur. Qui autē intermittens tertianæ & quotidianæ continuæ formam per se cognorit, facile complicatas per symptomata propria distinguet. Porro quænam ex eis complicatis citius sit habitura finem, ex ipsarum specie, accessionis prolixitate, magnitudinē, præterea ex morē, motu, reditu periodorum, necnon ex concoctionis & cru litatis iudicijs, coniecturandum.

CAPVT VIII.

Febris igitur quæ ex intermittente tertiana, & quotidiana continua, composita est (quam hemitritixum uocamus) aut fluam bilem habet exuperantem: atq; ob id, in ea sunt tertianæ febris accidentia maiora: aut hæc quidē parcior, pituita uerō abundantior existit: ob idq; quotidianæ continuæ affectus firmitior: aut neuter horum humorum alterum uincit, sed ambo æquipollere uidentur, id quod in exquisitis hemitritixis, hoc est, semitertianis, contingit. Ergo si in multione ipsa præualuerit febris tertiana, horridior sit tota febris, & nonnihil sibi in inuasionē rigoris associat. Consetum uerō & feruidior est huiuscemodi febris, & incendij plus habet, magisq; ad summum festinat: & aliquid bilis per uomuum, aut per aluum, aut per sudores excernitur. At si altera ex pituita febris sit præpotentior, tunc frigus uehementius extremas occupat partes, & pau-
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
1000

Hemitritixum
exquisita quo-
modo constituitur.

Hemitritixum
non requisita
quodam modo
constituitur.

Hemitritixum
est continua.

Citiusne febris
nec horrorem,
nec rigorem faciat.

rus, ex duabus ipsam febribus generari, quarum altera sit intermittens, altera uerō continua. Proinde tertiana mista quotidianæ continuæ, hemitritixum producit: quam febrem neq; utraq; continuam, neq; utraq; intermittens efficere potest. At uerō si quotidiana intermittens, miscetur tertianæ continuæ, oriri poterit continuo simul atque horrida febris. Hæc tamen contrario modo se habebit quàm prior: quoniam continuam quidem ex bile obnubet: horrorem uerō, ex pituita: reduplicaciones autem, ex pugna mutua, ac tunc præsertim, quum humores æquas uires habuerint. Porro quæ de biliosa & pituitosa febre simul mistis conscripsimus, ea transferentes ad melancholicā, poterimus ipsius cum utraq; illarum cōmitionem & confusionem similiter coniecturari. Voco enim complexionem, dum inuadunt differentibus horis: confusionem uerō, si eodem tempore inceperint. Tres itaq; simul febres complecti quispiam & cōfundere poterit, ipse per se, ex his quæ diximus, contemplationem exoritur. Nam horum omnium principium, fons, atq; elementum est, singularem febrium formam atq; figuram exquisitè cognoscere: id quod persacile existit, quum tres tantum existit numero: nempe quæ ex amara bile, & quæ ex atra, & quæ ex pituita gignitur. Quare singulæ duas habent differentias, continuæ scilicet intermittens: ita ut omnium quæ ex humorum putredine oriri habent, fiant sex numero differentie. Quod si quæ alia accesserit particularim præter has differentias, ea uel ex multitudine humoris, uel ex quantitate uel ex qualitate putrefactionis, ac præterea ex modo motus, & particula in qua putredo consistit, habebit originē. Iam uerō quæ intermissionem habuerint minorem febrem, nempe accessione ipsa in longius tempus producta, ex sanè extēse uocantur: quæ tamen in eo quod magis aut minus, uarias differentie recipiunt. Ex accessionibus autem & intermissionis spacio, opportunum ad exhibendum cibum tempus cognoscitur.

CAPVT IX.

Quum autem oriri soleant ephemeræ, sanguinem non putrefacto, sed tantummodo calefacto: in uehigando nobis iam est, si putrescat & illud aliquando contingat, quænam species febrium gignatur. Porro ab aliena caliditate exoritur putredinem, rectè professus est Aristoteles. Vocat autem alienam, exter nam: non familiarem, neq; naturam. Hæc siquidem coquere nata est, illa uerō corrumpere, * quod est putrefacere. * Incalescit autē exter no calore sanguis, & in solari deustione, & pestilenti aëris statu, atq; in febribus uniuersis, quacumq; ex causa nascantur. Vbi uerō in aliqua corporis parte sanguis plurimus accumulatus, eiusdem partis uim superat, corrumpi cōsequitur: præsertim si in paruis uasis propter crassitudinem cōspicitur, aut ob multitudinem impingatur: quemadmodum uidere est in uniuersis inflammationibus: in quibus sanè duabus de causis ipse sanguis corrumpitur: & quia scilicet non diffatur, & quia a natura non uincitur. Nōnumquam itaq; sanguis in inflammatis particulis subire poterit putredinem: ex qua simpliciores quidem, quàm ex alijs humoribus febres oriuntur, similes

Hemitritixum
est.

Febris
pituita
est
pituita
est
pituita
est

Putredinem
virescentem
est
pituita
est
pituita
est

Ephemeræ
tendunt
verò
in
pituita
est

Putredo
de
aliis
nata
est
pituita
est

Calor
naturæ
est
pituita
est

Sanguis
quod
de
exteriori
est
pituita
est

Sanguis
in
inflammatis
partibus
est
pituita
est

Febris
a
pituita
est
pituita
est

similes

similem tamen accessionū proportionē seruantes, qualem tertianæ febres ostendunt. Sic enim in his qui laterū inflammationē patiuntur, est obseruatum: quo tempore maximè rubidum expuunt. Quod si sanguis supra modum affertur, pars quidem eius subtilior ac pinguior, omnino in fluxum bilem conuertitur: crassior autem, in atram: quod in his tumoribus, qui carbunculi appellant, uidere licet. Igitur pro uarietate humorum in quos cōuertitur sanguis, febres etiam, sola bonitate uel malitia differentes. Ille siquidem quæ sanguinis consequuntur transmutationē, sunt simpliciores, tum in reliquis, tum in caliditatis qualitate mitiores. Nam et si se plurima manu tangenti offert, et tamen omnino mitis: si cuti quæ in balneo contrahit. Semper enim multitudo febris caliditatis, in multitudine effusius consistit. Quod uerò tangenti manui calor molestus sentitur, id prouenit ex humoris acre digne. Si gravior est & uapidus, & minus infusus uidetur, à sanguine proficitur. Qui uerò molesti, rodentes atq; mordaces existunt, consequuntur utriq; bilem. At ubi in primo occurrit, aliquod magis uaporosum q; acre, se repræsentat manui, sed per moram paulatim crescit mordacitas, eaq; admodū inæqualis, perinde ac si per cribrum excolari uideatur, ex pituitæ putredine oriri talem febrem ne dubites. Indaganti autē mihi, cur in febris alius calor æqualis occurrit: quæ uerò ex pituita ortum habent, talem caloris inæqualitatē ostendūt: tenuitas & pituitæ crassitudo, quæ dissoluta ægrè, uisa est esse in causa. Siquidem ex eo humor, sicuti ex alijs omnibus, ea pars prima omnium expirat, quæ iam attenuata fuerit: uix autem attenuatur, quod ualde crassum existit. Quod si etiam natura frigidū fuerit, tunc difficultas augeatur: ac proinde nō totus humor, nec ex omni parte æqualiter, sed ex illa tantū, in qua putredo inualuerit, efflatur, atque attenuatum effertur.

CAPVT X.

Solent autē per circuitus affligere, quæ admodum febres, alij etiam morbi particulares: ut lipiudines quædam, nonnullig aurium, capitis, necnō articulum dolores. Vt igitur per hosce affectus uidere licet, uenas quidem in partibus quæ exacerbantur in tumorē attolli, atq; inflammationē augeri, doloresq; intendi, ac deniq; affluxum materij inutilis ad exteriora fieri: sic etiā in interioribus oportet imaginari ea omnia, quæ cum minimè cadunt sub sensum nostrum, eandem tamē cum illis perpetuā analogiam fortuntur. Itaq; in laterum & pulmonis inflammationibus, circa accessionū quidem principia, tumores in crescit: in declinationibus autem, euaporant, & submittuntur. Porro alibi à nobis est proditū, esse quatuor naturales potentias, à quibus dispensant tum plantæ, tum animalia. Quarum prima quidem est, similis attractrix: secunda, eorundem retemrix: tertia post has, altera: quarta deniq; alienorum expultrix. Duplex autem est in omnibus rebus alienum: alterum quidem qualitate, alterū uerò quantitate. Accuratur autem hoc, ob earum potentiarum quæ in membris sunt, uel imbecillitatē, uel robur. Ete-

nim si quæ ualentes ipse partes extiterint, & meatus qui inuitem materiam deducunt, secundum naturam se habuerint, tunc membra sanitate fruetur. Vbi uerò plus assumptū fuerit, quam alterari possit, omne id quod superfluum est, uirtute expultrix trufum, excernitur. Quod si licet imbecilla fuerit, in eodem residet loco: ac si multum sit, granat, distenditq; sin acre, exedit, ac mordet: sicuti & quod calidū est, calfacit: quod frigidum, manifestè refrigerat. Solum autem sæpe excrementum ab alijs in alias partes transfuerit, fortioribus nempe id semper à se pellitum, suscipientibus autem imbecillioribus. Qui motus nō cessat, donec in eas quæ omnium imbecilliores sint, obrerrans humor incidit. Hinc uerò ad fortiores relabi est impossibile. Idcirco per plethoras atq; cacochymias, imbecilliores particulæ infestari solent uapre fluxionū affectibus. Nihil igitur mirum, uel cerebrū, uel uniuersum caput, excrementū in se collectum, ad partes imbecilliores expellere, ueluti ad aures, oculos, tempora, labra, dentes, malas, palatū, gingiuas, gurguliones, paristhmia, atq; deniq; ad glandulas illic consistentes. Quod si ex his nihil imbecillitatem pariat, ad pectus, pulmonem, fauces, gulam, uentriculum, ipsa fluxio delabitur. Sic uti igitur causa talium omnium morborū frequenter est caput, ita & eas quæ in iecinore ac hepate sunt inflammationes, alique partes uicinas, uel etiam ex remonibus aliqua una, uel plures, generant, augent, immittunt, ac per circuitum exasperant. Qui igitur nescius non fuerit, primam inflammationis originē, ex fluxione in hepate incipere, suum ortum transisse: ac quod deinceps exacerbetur, causam in ipsa parte patiente consistere: utiq; is non mirabitur in febris quæ accenduntur ex hepate, ordinis proportionem. Consistit autem materia inutilis interdum quidem (quatenus dictum est) impulsā ad infirmiores particulas, interdum ab illis attracta. Etenim calor natura est aptus ad conciliandas ac recipiendas fluxiones. Proinde in corporibus plenis, aut in quibus excrementa redundant, magna portio ad eas desinit partes, quæ in caluerint uehementius. In his autem quæ superfluitatibus uacant, admodum pauca. Nō parum uerò & ad partes dolentes humoris solet confluere. Videntur itaq; manifestè, fluxionū cause quæ ex ipsis partibus laborantibus originē trahunt, esse duplices: quarum altera est, in ipsis accessu caliditas: altera, excitatus dolor. At uerò quod melius sit, aut deterius, quod influit, ex partibus mittentibus pendet: quod plus uel minus, tum ex his quæ mittunt, tum ex eis quæ recipiunt. Hæ igitur sunt differentie fluxionū, quæ sine partū, quæ fluxiones admittunt, imbecillitate consistunt. Aliæ uerò, & propter harum imbecillitatem, & propter earum robur, quæ excrementa transmittunt. Cæterū omnes quæ citra uulnus & contusionē, partibus adueniunt inflammationes, excrementis quæ à fortioribus membris propulsantur ad infirmiora, gignuntur. Vbi autem cōstipata excrementa in particula inflammatione putruerint, calor quidam præter naturam accenditur, qui ab inflammatione membro in alia illi

Sanitate quando fruetur membra.

Excrementa semper à fortioribus ad partes uicinas imbecilliores trahit.

Febres ex hepate accensæ.

Fluxio sine humoris ad dolentem particulam.

Inflammatio particula quando superueniat si bene.

Sanguis supra modum affertur partem perueniunt in fluxum: crassior, in atram; subtilior, in bilem conuertitur, atque tamquam spiritum per uenas sua febris accendit.

Febres potius ex calido duplici ratione.

Principia febrium inæqualia: est calorem talium obliquum.

Affectus infirmiores per circuitus.

Naturales potentie: quibus disponantur completa, cum animalia sunt quatuor. Aliam duplex.

Excrementa quando accensæ in circuitu.

uicina, atq; ab his in alia, successione quadā extenditur, donec ad cor aliquando ipse calor perueniat. Porro ubi superfluitas quæ ab una in alteram partem transferitur, adeo copiosa & uitiosa est, ut facultatem recipiens particulæ opprimat dissoluatur, sic ut iam nequeat uincere, quæ antea uincebat: tunc certè necesse est, ut ipse etiam putrescat sanguis: id ratione duplici, * & quia humor, qui à proprio calore nō uincitur, nihil amplius superest, nisi ut in putredinē transeat: & quia cum superfluitatibus putrescentibus simul ipse putrescit. Quod si nec tanta, nec tam uitiosa ipsa superfluitas existat, ut facultatē omnino dissoluat, atq; feriam compellat, semiputris ac semiuitatus in tali statu reddetur sanguis, ob cōmercium quidem putrescentiū excrementorum, ad putredinē raptus: tantū uerō in natura sua perseverans, quantū ab ea, quæ exornat ipsum potentia, uincitur. Vincunt uerō res liabear, qui in prima putredine accenditur calor, acrior atq; mordacior est eo, qui naturalis existit. Tantum autem augeatur, quantū natura superfluitati suppeditat. Hæ si quidem ad eum qui ab ipsis calor augeatur, ferē similem quandam rationem habent, quam ligna ad ignem. Etenim licet minime in infinitū usq; tempus ad alterationem sufficiunt: sed est quidam transitus terminus, cōm tandiu possint exuri, quandiu aliquid natiui caloris habuerint. Qui ubi consumptus ex toto fuerit, tunc ardere iam desinit: & quæ supersunt reliquæ, cineres appellantur. Eodem igitur modo putrescentium humorū caliditas permanet, donec prorsus fuerint assati. Parum autē reliquiarū terrestriū restare ex humoribus est uersimile, quoniam in eorū substantia humidum & nō siccum preualet elementū. Cum itaq; seruantes in putredine humores à calore extenuentur, substantia ipsorū, ubi febres cōsistunt atq; declinant, in ambientem aerem discuntur: superfluitas autē, uel exigua remanet, uel nulla penitus: ex crassioribus quidem humoribus, pauca: ex ferrosioribus uerō nulla. Quod si nullam imbecillitatem pars inflammata contraxerit, neq; iterum superfluitates accedant, ægrotudo finietur, nec rursus homo febricitabit. At si illæ mittantur de nouo, aut ne mittantur quidem, sed adit sola potentia imbecillitas, hominē secundo febrere est necesse. Fingamus enim, primū quidem ualidā esse facultatē facultatē: interm uerō easdem in partibus, quæ prius transmiserant, acruatas esse rursus superfluitates, & quantitatem & qualitate pares, q̄s quas antea immiserant: certè nemini dubiū est, quin eodem quoq; circuitu ad eas excellendas, uersus imbecilliora membra, mouebantur ipse immutantes partes. Si quidē uis excretoria tunc primū excitatur ad proprium opus, quando aut multitudine superfluitatū grauatur, aut qualitate pungitur. At uerō cum in lippitudine quæ per circuitus accedit, medici qui se oculos uocant, semper oculos negotiū facessant, nos aliquando purgatione, aliquando balneo, interdum meri potione, interdum missione sanguinis, atq; interdum clystere usi sumus. Quia inuoluta nonnullū statim est subsecuta sanitas, nonnullū post curā rationem capiti ad-

hibitam. Nam quandiu humor qui ad caput effluit similis fuerit, eademq; dispositio capitis, tandiu superfluitates æquali tempore, & similes & æquales acruabuntur, similesq; oculos exasperationes orientur. Quod igitur connegit in oculis, idem in pulmonis, cerebri, lateris, & aliarum partium inflammationibus accidere potest, si illis quæ superfluitates transmittunt, sint eodem tempore imbecilliores. Mirandum autem non est, si non isdem status temporibus eadem excrementa acruentur. Nam cum is qui pro alimento sanguis defertur, non semper usquequaq; sit similis, nec item nutriendarū particularū eadem dispositio: aliq; aliud sufficit tempus ad colligendam tantam superfluitatem, à qua quidem ubi primū membri natura laceratur, cogitur eam tanquam alienum onus protrudere. Sed neq; ob accessionū impartitatem mirari oportet. * Nam si non eadem est nec species, nec multitudo superfluitatū, non oportet eas similiter omnibus aut accendi, aut discuti. Nam quæ plura & frigidiora, tenaciora & crassiora excrementa sunt, faciunt accessiones longiores: quæ autē pauciora, calidiora, & subtiliora, breuiores. Præterea rarior quidem corporis habitus, breuiore sui ratione accessiones reddit: densior autem, longiores. Quinetiam potentia robur, minus diuturnas efficit accessiones: imbecillitas autem, in longius tempus producit. Longissima itaq; accessio fiet ob materię inutilis multitudinem, crassitudinem, lentorem, facultatis imbecillitatem, ac meatuum angustiam. Breuissima autem, propter materię inutilitatem, paucitatem, potentia uigorem, ac laxitatem meatuum. Cum igitur primæ accessionis tempus adeo breue fuerit, ut antequam superueniat secunda, iam prima quiescit, omne id temporis spacium, quod secundæ principii & primæ finem interiacet, sine febre est. Si uerō secunda inuadere anticipauerit priusquam omnino prima soluat, nihil interuenit medium. Hoc autem fit, cum facultas membri recipientis superfluitates, sanguinem in se contentū, quemadmodum antea, cōuincit. Quod si quando imbecillior reddatur, non solum materia inutilis, sed sanguis etiam cum ea corruptetur & putrefiat, ex eoq; accendetur febris: atque hinc oriatur aliud principium earum, quæ per circuitum sunt, accessionum. Si igitur caliditas ab excrementis orta, etiamnū perseueret, duplex febris seuicem complectentium species gignetur. At si illa cessauerit, membri uerō fluxionem recipientis dispositor remaneret, quæcumq; de parte mittente prius exposuimus, eadem de hac quoq; intelligantur. Nam & ipsa aliquas in se superfluitates gignet: idq; duplici ratione, quemadmodum illa, & quia uitiosum sanguinem continet, & quia facultas eius est imbecilla. Eodem modo si ex aliqua quauis causa membri uis adeo debilitetur, ut is qui adiacet sanguis, illi sit potius oneri, quā nutrimento: cōtinget ut corruptatur, aut si calidior sit, putrescat. Nam si frigidus fuerit, & pituitæ naturam gerat, non subit, sed tempore ad eandem ueniet dispositionē. Porro si eas quæ in ipsa genitæ fuerint superfluitates,

*Sanguis quidē
necessariū potius
stat.*

*Excrementa
fuerit calidū
præter naturā,
quæ a diuersis
ignem.*

*Febres per circuitū
sui mouent, ubi
de accedat.*

*Excretoria
facilitas
tunc quando
mouetur.*

*Lippitudinem
accidentem per
circuitum
de curari. Gale
nos.*

*Accessionem in
partes uide et
cetera.*

*Accessiones
longiores aut
breuiores sunt,
unde accedat.*

*Accessio longior
ma à quib; sit.*

*Accessio breuior
ma quando non
tingat.*

tates, nequid erit particula aut coquere, aut ad aliam partem detrudere, tale si bñpñ febrivm principium constituet, quale ea quæ transmittit alteri, affert. Nequit autem aliis superfluitates transmittere, aut ob propriam imbecillitatē, aut propter recipientis robur, aut deniq; ob conspiciendū meatum, quæ fieri à lentis & crasis & multis humoribus consueverunt. Quæcumq; autem naturales meatus obstruxerint, hæc necessarid putrescunt tempore, atq; etiam in causa sunt, ut in ea parte multitudo coaceruetur excrementorum, cuius solitam evacuationem & distillationē prohibent. Vñ igitur cum illis putrescūt & alia quæ postremā acervantur, ita timē simul omnia in membro febrilem caliditatem accendunt. At uerò, ubicumq; accenditur atq; augetur caliditas, illuc ab alijs partibus sanguis solet cōfluere. Quo igitur tempore cōfluit, illas quidem priuari sanguine est necessarium: quod uerò paritur membrum, grauius & distendi: ipsūq; confluentem sanguinem alterari, & quod alijs quæ iam putruerunt superfluitatibus permisceatur, & quod distat, urpote impactum, non possit. Proinde fit, ut instat lignorum humidior, quæ super exiguum flammulam projicitur affatim, succendatur. Quod totum est accessiois principium. Vbi autem caliditas iam materiam conuicerit, id tempus augmentū uocatur. Vbi uerò calore per uniuersum corpus disperso, inflammari humores ad summum feruorem perueniunt, id accessiois tempus, dicitur consistens. Hinc igitur, si humores fuerint tenuiores, potentia robusta, corpus rariū, maxima humorū putrescentium pars in sudorem resoluta euacuatur. Sin uerò hi crassi fuerint, & uis expultrix infirma, necnon meatus angusti, nihil quidem de fluxit sensibile: sed id solum, quod ita est extenuatum, * ut in subtiliori uapora naturam transierit.

Accessiois febri-
lis tempora de-
scribuntur.

Declinatio acci-
sionis febri-
lis, quæ
humorū effusio-
nis diffinitio

Atque id sanè tempus declinatio appellatur, humorum effuscentiā distillas quidam existens. Cæterum cum in parte adhuc remaneat affectus, uelut in ipsa aliam gigni superfluitatem, cum nimirū id quod denuo ad ipsam trahitur alimentū, non conficiatur exquirere uniuersum. Quæ quidem superfluitas rursus à putridis excrementis in parte relictis, necnon proprio ex uirio, initium putredinis suscipit: cumq; satis caluerit, rursus ad ipsam influit, quemadmodum antea, ex reliquis animalis partibus sanguis: ac sic eodem rursus modo, principiū, ascensu, status, & declinatio, alterius fit accessiois. Nec hoc per circuitus definit fieri, quando in particula gignente superfluitates perueharit affectio: quæ quidem existit duplex: altera quidem, imbecillitas partis, à qua superfluitates gignuntur: altera, quæ ex ipsdē quotidie genitis ducit originem. Impossibile autem est solui remanentem illam dispositionē, si uniuersum corpus multis ac uarijs excrementis repleatur fuerit: ac multo etiam magis, si his accedat omnī, per quos excrementa membri excreantur, astrictio meatuum. Sanitas autem succedet, si & meatus aperti sint, & facultas uegetior, & corrigatur affectus partis, uniuersūq; corpus nec multis nec uitiosis humoribus opprimat. Nam

Affectio partis
duplex.

Accessionem cir-
cuius quidē de-
finit, & quomodo
perueniat ad

quandiu hæc perdurauerint, tandiu accessionis circuitum perueharit est necesse. Quemadmodum in mulieribus accidit, in quibus quandiu æquales ac similes menstruorū causæ persiste-
runt, idem circuitus seruabitur. Earum igitur febrivm, quæ per circuitum accessiones faciunt, nescio an aliqua fuerit nobis ommissa causa: alia-
rum autē quæ carent ordine, nonnullæ ex trans-
mutatione humoris, nonnullæ ob uictus erro-
rem, ad talem dispositionem deueniunt. Maxi-
mè autem transmutatur, atq; in alteram transit naturam sanguis, dum putrescit. Nam pars qui-
dem ipsius una fit flaua bilis: alia, nigra. Quanti-
um uerò in ægotanti corpore humores muan-
tantur, tantum etiam accessionis circuitus. Quæ-
cumq; autem circa uictus rationem errata ab æ-
gotantibus fiunt, ordinem circuitum peruertunt. Sepe uerò ob complicationem circuitū, quæ à medicis ignoratur, uidentur absq; ordine
accessiones ægotantium fieri. Reliquum est id febrivm genus, quæ synochi nominantur, quarum uniuersum tempus unica accessione fini-
tur: quæ uel semper in eodem uigore persistit, uel minuitur, uel augetur, donec finiatur. Hæc uerò omnes ex tali causa ortum habent, qualem Praxagoras exstima-
bat, humorum uidelicet in causa uena putrefactionem. Quamquam absolutior & uerior hic erit sermo: Quæcumq; per circuitus aliquos ægritudinū accessiones fiunt, ex
membrorū dispositionibus ortum habent, quæ uel mittunt, uel recipiunt, uel generant, uel attra-
hant superfluitates. At quæ circuitum non ha-
bent, in his nulla est corporis pars, quæ præcipue sit offensa. Qui autem in uenis & arterijs om-
nibus continetur humores, præcipue qui in
maximis & plurimo calore abundantibus deli-
tescunt, aut ob aliam quamuis causam, quemad-
modum in ephemeris, aut ob putrefactionē fer-
uentes, febrem accendunt synocham, quæ à prin-
cipio usque ad finem nullam habet intermissio-
nem: ac tandiu perueharit, hominemq; deurit, donec humores ipsam gignentes, aut cōsuman-
tur penitus, aut coquantur, aut utrunq; patiantur.

Sanguis putre-
scens, in alia uia
transit.

Circuitus ordi-
nem quæ perue-
harit.

Synochæ rati-
onem ipsam
uicem accipio.

Circuitus fieri-
tis morbis, ex mor-
borum disposi-
tionibus uariar
si uidentur.

Synocha genera-
tio.

GAL. DE DIFFERENTIIS FEBRIVM LIB. II.

de marasmo sive tabe, liber.



Marasmus est uicinis corporis interitus præ siccitate. Cum autem interitus bisariam dicatur, tum de eo qui fit, tum de eo qui iam factus est, sanè secundum prius significatum oportet appellationem accipere. Similiter etiam marasmus, hoc est, tabes dupliciter dici poterit, nempe cum iam aliquid tabuit, uel cum adhuc tabescit: de qua quidem significatione secunda, improprie dicamur nobis est sermo. Porro cum genera uicinis sint tria, uidelicet animalia, stirpes, & femina, ac propter hæc etiam fructus: tabem quidem esse horum affectum, proprie loquentes dicimus: quamuis per translationem & cæteris etiam interitus, cum ex siccitate proueniunt, cōmuniter tabem appellent. Cum igitur primi & simplices modi quibus omnia uicinia intereunt, sint quatuor, siquidem & elementa substantiæ eorum quaternio etiam nume-

Marasmus est
uicinis corporis
interitus præ
siccitate.

Marasmus est
duplex.

Vicinis genera-
tio.

Tabes quatuor
est affectus deca-
tor.

Interitus modi
sunt quatuor.
Elementa trans-
lationis sunt qua-
tuor.

ro ambiuntur: tabesceunt sanè ea dicimus, quæ
ex siccatate intereunt. Quod si hæc tantum ha-
beant, quod siccentur, altera uero contrarietas
quæ inter calidum & frigidum interdic, intra
suos terminos maneat, simplex ea tabes erit. At
si uel caloris uel frigoris accedat immoderatio,
iam modus in interitus, duplex & compositus
erit. Simplex itaque tabes inedijs solet superuenire,
tam eorū qui in ediam sponte tolerant, quam
eorum qui præ alimentorum penuria, fame con-
ficiuntur. Illa uero cui frigus accessit, solet seni-
bus euenire: uel etiā illis, qui malo quodam af-
fectu senectuti simili detinentur. Ea autem quæ
cum calore est, in febris locum habet, quæ he-
ctice nominantur. Nec uero impræsentiarū de
partibus loquimur, quæ ex aliquo symptomate
arcescunt: sed potius cum totum corpus hoc se
habuerit modo. Quocirca si tabes affectio est
uniuersi corporis, ea fieri nequit, nisi animantis
principium etiam affectum sit. Quin etiam fie-
ri non potest, ut alius affectus totum ipsum ani-
mal occupet, ab alio uero principium ipsius de-
tineatur. Ac proinde necessum est, ut in rabidis,
ipsius cordis corpus arcescat. Quocirca si inue-
nimus causas omnes, quibus cor arcescere pos-
sit, facile tunc nouerimus, an omnes tabidi insu-
nabiles sint, an ex ijs aliqui potius sanari queat.
Optimū autem lūius instituit principium erit, si
perscrutati fuerimus omnes causas senectutis:
quandoquidem ea inter omnes partes usquea-
deo eustari minime potest, ut esse secundum na-
turam uideatur. Si quidem incurabilia sunt om-
nia naturæ opera, utpote habentia necessariū
sua generationis ordinem. At non eo modo di-
cimus senescere esse secundum naturam, quo ali-
cui augeri (sunt enim hæc naturæ opera. senec-
tus autem non opus, sed affectus quidam nec-
cessarius consequens illa) uerūm hoc nomine,
quod nullum unquam sit uisum animal, quod
ortū fuerit, quin idem sit setio obnoxius. Quan-
quam non desunt nostris his temporibus philo-
sophus quidam, qui librū ædidit, quo docebat,
quæ quis posset ratione seruari penitus senij ex-
pers: qui tamen, posteaquā ad octogesiū usq[ue]
annum prodixit uitam, adeo gradus & exicca-
tus effectus erat, ut uerè faciem illam exprime-
ret, quam descripsit in libro prænotionum Hip-
pocrates. Num igitur propter id siccescunt tum
animalia, tum plantæ (quod nonnulli affirmant)
quia insitum animantibus calor, ueluti ignis qui
dam, ex ea materia in qua accensus est, suum in-
crementum sortitur? Etenim illi semper affixus
est, nec unquam inde sciungi potest, unde etiam
sua omnia habet. Plantæ igitur, animaliaq[ue] om-
nia, quando recens genita sunt, admodum lū-
mida exsunt. Quam obrem calor (ut illi aiunt)
in ipsis tunc ueluti suffocatus obrutusq[ue], præ hu-
moris copia, uix se potest exire: nimium cal-
iginosus, tardus, ad motumq[ue] piger cum sit. Pos-
tea uero ipsam humiditatem progressu tempo-
ris superat, & cuncq[ue] materię præest: quo tem-
pore iam purus æthereusq[ue] redditus, suas om-
nes expedit functiones edit. Itaq[ue] usq[ue] ad æta-
tem uigoris relucet, augeturq[ue]: cuius magnitu-
do ipsissimū tunc atrolitur. Mox uero inopia

alimenti contingit, ut contabescat paulatim: at-
que id ipsum exiit senectus. Sed & paulo post
extinguitur penitus, id quod mors est. Hic itaq[ue]
sermo omnibus fere tam philosophis, quam me-
dicis recentioribus placet, licet uerus omni ex
parte non sit. Hallucinantur namq[ue] dum flammā
ignis omnino cum calore animalium cōferunt:
idq[ue] minime animaduertentes, quod ortus flam-
mæ est ex materię interitu, de qua ea est accen-
sa. Animalia uero, non sic suum, ab eo illa ef-
finxit, insitum habuere calorem: sed potius ut ab
eo augeretur regereturq[ue]. Nec ullum est tem-
pus, quo innatus is calor per uniuersum cal-
or materiam nō diffundatur, uires non modò eas
cōtineat, quibus animal formæ, uerūm & alia
præterea plures: quippe & alimentū attrahit, &
materiam dispensat, apponit, uit, assimilat, om-
niaq[ue], ut in summa dicam, circa sibi congenerat
materiam perficit, contrā quam flammā faciat.
Nam quæ unquam flammā, materię cui annexa
est, adauget? uel quæ etiam materię potius ali-
menta assimilat, quam eam sibi? Et quæ tot ex-
cogitauit modos, ut eam tueretur materię? Itaq[ue]
cū illi qdē natuum calorem esse naturam fa-
teantur, non rectè faciunt flammis cum com-
parantes. Nam quod ait Hippocrates, cum calorē
nos interficere, qui genuit corpora: certè si liber
illi referri ad Hippocratem debeat, locus is re-
quirat expositionē. Verum siquid est, corpo-
ra ob innatum calorem senescere interireq[ue]:
quod ramen, quem illi aiunt, aeris nō est. Neque
enim ut flammā ligna, ita innatus animantibus
calor, eorum corpora absumit. Quod fortassis
exemplum illis congrueret, qui ob febrilem cal-
iditatem intereunt. Porro natura, quæ tum ani-
malia, tum plantas procreat, omnino corpore
aliquid principii, ad illorum generationē assu-
mit: cui nihil sit, quod unquam possit sui or-
tus iniriū habere, ab eo, quod penitus est non
ens. Inde uero ex orsa, semper in eum scopum or-
dinatē tendit, quod in ea procreante situm ab
initio sibi propulerat. Id autē est, perfectum il-
lud reddere, quod ab ea gignitur. Sanè perfectū
est, quando nulla suarum functionum deest illi.
Ipsarum autem functionū complures duriori-
bus instrumentis egent. Vnde postea fit, ut mul-
tæ in animantibus partibus dure cadant. At
principium generationis ipsarum, contrā quam
in animali perfectio, necessum est ut sit molle, ut
& apte cōpingi, efformariq[ue] possit, & ad omnia
tractabile sit suo conditori exhibeat. Ac proin-
de, quanrūcūq[ue] semen sit durum, molli tamen
planta editur, moderato nimirū modis humo-
re prius macerata, ut pro semine fiat natura. Ita-
que si opus est, ut generatio animalis a substan-
tia molli sua habeat exordia, quæ ut absoluitur,
ita durefcit: necesse utiq[ue] fuerit, ut in prima ele-
mentorum unde illa constituitur, temperie, tum
humidum, tum siccum præpolleat. Ceterū hu-
midum quidem ipsum est aquicum: siccum autē,
naturaliter aut est terricum, aut igneum. Fieri uero
minimè poterat, ut statim à primis exordiis,
plus terrenti cōmiseretur, cū opus esset prin-
cipium animalis fore humidum: reliquū igitur
solum est igneum, quod in prima animalis gene-
ratione

Tabes simplex
quæ dicitur.

Tabes compo-
sitæ quæ.

Tabes simplex
inedijs solet su-
peruenire.

Tabes compo-
sitæ quibus super-
uenire consue-
runt.

Tabes fieri non
potest, nisi ani-
mantis prin-
cipium affectu sit.

Senectus uideri
non potest.
Incurabilia ef-
fe naturæ opera.

Naturæ opera
quæ.

Senectus.

Senio animalia
ortæ esse emana-
obnoxia.

Calor uisibilis
quomodo exiit
ut inueniatur
in corpore.

Senectus quid
mors.

Flammā ignis
non esse conge-
randam cum ca-
lore animalis.

Caloris uisibilis
et flammæ quæ
ignis uisibilis, dis-
similata.

Caloris opera.

Caloris uisibilis
effe naturæ opus.

Calor qui ge-
nerat corpora, se-
ruat non.

Senectus ob in-
natum calorem
corpora.

Nihil ex nihilo
fieri.

Principium ge-
nerationis per-
ticulari, nec ne-
cessariū sit hu-
midum.

ratione & formatione, obinet principatum. Si igitur fieri posset, ut natura cum animal, uel plantam, ad consistendi uigorem perduxerit, a iam rursus elementorū dispositionem, proportionem uiribusque aequalē, apponeret, sic tantummodo sua illi fabrica posset exers tam seniti, q̄ interius perdurare, si tamen custodire sapientis alicuius uiri mox demandata fuisset: alioqui si malam adhibuisset uictus rationem, ab interitu immunis non esset. Nunc: uerō postea quim prima elementa generationis tam animalium, quam plantarum, nec transferri, nec transmutari possunt: idcirco necessum est, post consistendi uigorem corpus semper ficescere, quamuis non amplius egeat, ut idipsum patiatur, cum iam illa uisui non sit, ut ficescat. Verūm ætas inclinatio- nis, quæ ficitatem quidem, quamuis exiguam, habet, multos læt, ac si nondum aliqua tabes sit. Senectus autē, quæ ab ea non genere, sed tantū magnitudine distat, facile deprehendi potest. Hęc igitur causa est, quæ uniuersam animam tractu temporis ficitatem præstat: perspicuē ostendit, senium nec euitari, nec etiam largiri posse. Etenim uniuersa ætas, quæ uigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem fines, inter eorū ætatem qui iam declinant, & eorum qui senescunt, humorum est excrementorum exuperantia. Vnde quidam decepti, statuerunt senium esse humidum. Ceterū & omnes actiones statim in his fieri imbecilliores, manifeste uideri possunt: atq̄ etiam uia ad mortem, quæ latebat in inclinantibus, iam omnibus sit cōspiciua. Quamobrem senectutis tabes nequit ulli ratione dissolui, licet ipsam plurimum remori possimus: quod minus ad gerocomicem, hoc est, ad ætem fletū curaticem, spectat. Quæ quidem hoc sibi proponit, ut quoad etus fieri potest, obstitat, prohibeatq̄, quod minus ipsum cordis corpus eousque arecat, ut ab omni opere uacet. Si quidem uitæ terminus uacuas cordas est ab actione, cum impossibile sit mori animal, quando diu cor sua actione moueatur. Quare si posuit subitanea corporis ipsius cordis humidior fieri, uel per louē etiā iecinoris, poterit senectuti obstiti. Si uerō nemo est, qui queat iecur uel cor humidiora reddere, quam ipsa sint ex se, sed potius semper tempore procedente ea necesse est iudies ficiosa fieri, cum etisq̄ arterias & uenas, senium quodam proliberi nō potest: potest tamen detineri, ne citō ingruat, idq̄ humectante adhibita uictus ratione, qua nimirum augere possumus illam humiditatem, quæ in corde iecinore est dispersa. Calm autem cor (cui ualentissima est attractrix facultas) sit origo pul- atq̄ arteriarum, quemadmodum uenarum atq̄ sanguinis hepar: contingit utiq̄, ut hæc uiscera nunquam moderatis alimentis desituant, nisi cum ualida sanguinis penuria uniuersum occupauerit corpus. Vnde ubi corpus ex longo morbo extenuatum fuerit, putandum nō est, cor quod atq̄ etiam iecur, esse pro aliorum proportionē extenuata. Ceterū uerā tabes, similiter partes omnes occupat, propterea quod etiam ꝑ principia ipsā. Atq̄ hæc tabes in ætatis quidem, est senium: in ijs uerō qui præter

naturam affecti sunt, febris tabifica, & alia præterea affectio, quam senectam ex morbo cōmodē appellauerimus, idq̄ longē melius quam Philippus, qui eam etiam tabidam febrem nominat. Nam neque febris unquam huiusmodi erit affectus, ubi cor frigidius reddidit est, quā ratio naturæ postulet. Quod autem per eam affectum sit talis ipsius cordis temperies, indicio est pulsus rarus & paruus, similiterq̄ spiratio rara si mal & parua, necnon qui expiratur aër, minimē calidus. Quæ sanē tabis species sit, febribus ob intempestiuā immoderatamq̄ refrigerationem in eam transeuntibus. Est & alia tabis species, quæ dicitur torrida, sicuti & tertia, quam quosdam appellat. quarum illa quidem ortum habet à calore, febribusq̄ ardentibus, maximē uerō ubi habitus fuerit ficior: hæc autem gignitur, quando dō ijs qui correpti fuerint deliquo animi, ubi uehementiam periculi effugerint, aliquid ex eo affectu remanet, ita ut adhuc defectum illum animi sapiant. Est autem duplex ipsa extenuatorum affectio: una quidem, ubi is humor solidorum corporū perijt, qui eorum proprium est alimentum, & præterea molliores carnes liquatæ sunt: altera uerō, dum solidiora etiā cor pora sunt exsiccatæ, quæ utiq̄ & prima, & similia appellantur. Hęc igitur nequit curari, sicuti nec senectus. Altera uerō periculo quidem non caret, non tamen eousq̄, ut nullo modo curari possit. Igitur humectare oportet tres illas species tabis iam dictas: & hoc est illis commune, quippe quæ cōmunem ficitatē fortiantur. Sed earum una eget ut caliat: ea nimirū, quam com parauimus senectuti. Altera uerō, quam esse torridam diximus, refrigerari postulat. At tertia, quæ habet animi deliquum coniunctum, si nō dum facta sit, sed etiam uim fiat, ita ut humiditas solidis membrīs innata absumatur, miscellaneam curationem desiderat. Conspiciuā autem humectare reficereq̄ exsiccatos uidetur balneū, ut facili possumus in ijs obseruare, qui ætate sub sole uel iter faciunt, uel alio quopiam modo exerceantur, aut exsuntur. Hos enim omnes, atque etiam eos qui sicculosi sunt, humidos reddit, & iter libera. Sed & alios omnes quocunque modo exsiccatos, siue ex uigilia, siue ex curis, siue ex uenere, siue ex edulsijs, uel medicamentis exsiccatibus, siue ex ira: hos inquam omnes madescentē fouereq̄ balneum uidetur. Cum autem sint tres differentie febrium generalissimæ, in præsentia quidem omittamus diarias: conuertamus uerō sermonem ad eas, quæ ab humoribus proficiuntur: & ad illas etiam, quæ quiddam in habitu sint, hec tice nominantur. Illis igitur quæ ex putrescentibus humoribus accenduntur, si concocti iam fuerint, balneum remedio est. Hęc tice uerō quæ solæ consistunt, nec aliud quodpiam genus febres secum habent, balnea quouis tempore conferunt. Sin autem illæ secum febrem aliam habuerint, ex ijs quæ ab humoribus peudent, cum q̄ concocti iam fuerint. Eadem etiam tempora purandum est esse cōmoda, ad propinandum frigidam: præterquam quod si in hoc aberrauerint, ad minimē fiet sine magno incommodo. At balnearum usus in iam dictis febribus

Tabes, quæ ex morbo uero accipitur, non est tabida febris.

Senium ex morbo quomodo introducat.

Tabes torrida, uel quæ accipitur, Tabes in capite quando accendat.

Extenuatorum affectus aut duplex.

Tabes incurabilis in quamuis sit.

Tabes uniuersa quomodo fiat curanda.

Exsiccatos manus sibi uidetur reficere balneum.

Balnei usus.

Febrium tres differentie generalissimæ.

Putrida febribus, post concoctionem humorum, balneum remedium.

Hecticæ febribus, quibus alia non copulatur, balnea quouis tempore conferunt.

Senectus necessaria corpus potest consistendi uigorem.

Senectus ab inclinatione ætatis, non genere, sed magnitudine differt.

Senium nec euitari nec largiri potest.

Senium uniuersa potest uigorem et frigida et sicca.

Senis ab inclinationibus, quibus, non potest distinguere.

Gerocomia.

Uita terminus uacuas cordas est ab actionibus.

Senectus quo a ratione possit abstinere.

Senium detineri potest, ut citō ingruat, idq̄ humectante adhibita uictus ratione.

Cor sit origo pulsum & arteriarum.

Hepar est sanguinis atq̄ uicinis & uenarum.

Tabes uerā morbo ex quo omnes partes occupat.

Ephemera quædam cum hec- tica habent nece- sse fore: quoniam aqua est in- terpres prop- riæ.

Prigida potui- tis in hec- tica incommo- dat.

Hectica febris ex- gressu, præter- ita esse et in- commo- dat.

Hepter ventri- culis, quæ ra- tione febrem he- cticam inferat.

Pulmo cur hec- ticam febrem non- gignat.

Hectica febris quæ tantum- modo reliqua vi- scera attingat.

Balnea tam co- lida, quam frigi- da, siccitate co- forant, et in- flammationem reddunt, quæ sitis vac- uis, atque sitim a- ffectibus abigat.

Hectica cui ery- sipelatosus affec- tus sit commo- tus, curatio.

procul est ab omni periculo, nisi forsitan virium imbecillas sit suspecta. Cæterum quedam ex diarhis febribus, cum hec tica cõmunione quan- dam fortiuntur, quæ sanè statim in prima die ex- actè discerni nequeat, sed circa secundam, vel om- nino tertiam. Quo tempore, ubi quis primò eas novit, intrepide offerre aquam frigidam pote- rit, cum nimirum tunc & vires validæ sint, nec desit adliuc corpori sanguinis copia. Vbi uerò immoratur diutius fuerint, tunc sanè vires imbe- cillores redduntur, & sanguis exiguus fit: unde duplex ex parte frigida aqua frigidam inco- modum. Primò, quod interitum dum aquam bibunt, percutitur & refrigerat aliud membrum. De- inde, quod qui aquam exhibent, nisi debitam men- suram sint assequuti, præter alias particulas il- lam etiam refrigerabunt, in qua est situm princi- pium generationis febris. Vbi uerò supraquam par sit cor refrigerat, si natium suam adhuc hu- miditatem servet, vires concidunt. Si efficiatur siccitas, ab eo affectu arripitur, qui similis senio existit. Sed eodem ipso tempore, quo a primò si- gna febrium hecticarum fuerint conspicua, ex- pedit ut refrigerantia medicamenta adhibean- tur extrinsecus, & super ipso febris * foco, & ori- gine. Porro cor primò, si plus æquo incalcescat, hecticam febrem affert. Dein uerò iterum hoc ra- men non habet ex se, pennde ut cor, sed ob id, quod illud secum in consortium trahit. Mox uerò ventriculus, & post hunc quæcumque alia, con- forti lege, possunt secum cor calcare. At pul- mo hecticam febrem non gignit, propterea quod hoc viscus humidum est, & per inspirationem assidue refrigeratum, non facile in similem occa- sionem incidit. * Vt plurimum autem secundum reliqua viscera febris hectica gignitur, infuso bi- lioso humore in ventrem ipsius loci patientis. Cuius itaque sola febris consistit, absque ulla alte- rius morbi mixtura, balneum expositum, non se- cus ac cætera siccitates, quæcumque vel calidæ fue- rint, vel frigidæ. Nam id sanè mirum balneis inest, quod tam calidis profuit, quam frigidis siccitantibus: quemadmodum & illud, quod eos siticulosos efficiat, qui sitis sunt vacui: a siticulo- sis uerò sitim abigat. Quandoque tamen cum he- ctica tabificaly febre adest etiam erysipelatosus affectus: qui exigit, ut prius cibo & potu, & ipsa etiam quæ apponuntur exteriori, refrigeretur. Quo tempore omnino est superandum a bal- neo, frigida autem confertim in ipso morbi vi- gore viriliter exhibenda: a cuius tamen usu ab- stinendum est in principio, nisi nos forsitan ipse cogat ægrotus, quippe qui sit assuetus potui fri- gida, nec sitim perferre velit. Exteriori autem sunt applicanda ea quæ refrigerant: quæ si nihil pro- fecerint, cogendi ut illa etiam intra corpus assu- mant. Præcipue uerò illis profuit molles lactu- cæ, recentesque, solummodo in frigidam aquam demersæ, ac ita assumptæ: vel si placet, prius a- ceto diluto intrinsece. Extrinsecus etiam eiusdem lactucæ succus utiliter adhibetur, sicuti & sem- peruivæ & intybi. Præstantissimum uerò ad id etiam est medicamen confectum ex succo uivæ acerbæ, necnon portulacæ, cui parum albæ fari- næ miscetur. Quod quidem exceptum duplici

linto, præcordijs est præstendum, donec te- pescere incipiat. Dein uerò, ipso ablato, alterum admoventum est. Nonnunquam & oleum imma- turum miscemus, vel rosaceum, præsertim uerò si aliquid inflammationis detinuerit præcordia. Sciendum tamen est, fieri non posse, ut ubi ery- sipelatosus visceris dispositio constituit, ea sit fe- bris exquirat hectica. Siquidem exquisitè febris hectica est, quæ nullum habet particularis acce- sionis principium, nullum incrementum, nul- lum vigorem, nullam inclinationem. Solummo- do autem hectica febris potest assumptu cibum, perinde ut calx, inaspera aqua, effervescit. Quod incrementum si abstergeris, semper æquales per- manent. Tabi igitur torridæ, quæ ab ardentibus febribus suam ducit originem, obstitit reme- dijs refrigerantibus, quæ tum exteriori secundò locum affectum administrantur, tum interiori accipiuntur. Cum uerò senectus quæ ex morbo est, inuasit, ea quidem quæ absoluta est, nequit curari: quæ autem non est perfecta, eò tamen ac- cessit, ut ferè iam facta sit, hunc solum habet cu- rationis scopum, quem refectorem & nutritio- nem vocamus. Nam corpora solida, dum are- scent, cibis sanant. Cum autem alimentum om- ne, non ipsum per se deferatur ad alendas parti- culas, sed potius ab eis trahatur: ob ardentem uerò atque frigiditatem, in tabidis sint illæ ad tra- hendum inuálidæ semimortuæque: utique alimen- ta desiderant, quæ facile possint attrahi, ut imbe- cillitate attrahentium virium, suppleat prom- ptitudo materiæ. At ea sunt tractu facilia, quæ tenuioribus partibus constant, suntque natura ca- lida: quæ sanè cum difficultate nutriunt, cum ali- mentum omne debeat esse crassum & lentum, ut & permaneat diu, nec facile possit diffari. Quare aliquod inuestigandum est, quod in me- diocritate consistens, mediocriter utraq; possit præstare. Ac mihi sanè nihil ad hæc omnia facile videtur præstantius, præcipue si quis ore apprehensa mamma muliebri, lactet. Quod si id fieri nequeat, bibat saltem lac asininum, dum adlu- calet, temporeque brevissimo aeri expositum fue- rit. Quæ quidem alimentorum ratio tribus illis speciebus marcoris convenit. Quin etiam ptisa- na & alica illis ex usu sunt: aceto tamen condiri debent, ut facilius distribuatur. Porro mel, ut frigidioribus affectibus prodest plurimè, sic ca- lidioribus obest humopere. Quare torridæ qui- dem febris inimicissimè est: ipsa autem qui leni- affectu expositi sunt, utilissimè. At illis qui ra- beant ex defectu animi, nisi obiter ventriculi ratio, poterit coctum vel solum, vel alijs inter- mistum cibis offerri. Opportunum balnei usus, optimum erit auxilium etiam ad alimentorum distributionem. Erit tamen administrandum, ubi cibus concoctus fuerit, nec longior inedia præ- cesserit. Iam & vini potus, ut summo pere frigi- dæ tabi prodest, sic torridæ fugiendus est. At ea quæ in animi defectu consistit, sicut asse-

Hectica exquir- ta nec principium nec incrementum, nec illud, nec de- clinationem particu- larum accipit nisi fortiter, sed situm de post assumptu cibum effervescit.

Tabi torrida quæ ratione ob- stitatur.

Senectus ex mor- bo absoluta quæ dem, est incurabi- lis: non aliter tamen assit, quæ ob- stitatur.

Solida corpora dum arefcent, cibis sanant.

Tabida partia quæ facilius possunt trahi.

Alimenta tractu facilia quæ.

Alimentum om- ne esse debet crassum & lentum.

Lac muliebri- bus ex manu- uisum, cum modestum of- ferat cibum nutri- mentum.

Lac asinini ta- bidis utilis.

Ptisanæ.

Alica.

Mel cum marcori sit utilis.

Balneum quan- do admodum de- bet trahi.

Vinum quo tabi confertur.

etus medius & miscellaneus est, sic in hoc mediam ratio- nem obit.

G A L E-

GALENI PERGAMENI

contra eos qui de typis sine circumscriptionibus scripserunt, liber.



Periodus.
Circuitus.
Typus.
Ordo.

Accessionem futuram cognoscere, seu febrium esse maximam vel.

Bi quid specie idem, rursus aequali sit tempore totum ipsum curculū, Græci periodum, siue circuitum, atq; inter eos nonnulli, typum etiam atq; ordinem vocant. Ceterum cum nihil utilius sit, præsertim in febribus, quam futurarum accessionum principia prænosce-
10 rum ægro proderit per totū ipsius morbi spacium, qui nominū dispensatione neglecta, statim a morbi initio, artificiali quadam coniectura poterit id ipsum assequi. Quod si quis prima statim die pervenire ad talem cognitionem nō possit, poterit certe secunda, vel tertia, vel quarta. Si quis uero sit, qui neg in hac morbi specie non uerit, is non exiguum artis partem ignorat. Etenim tum alia, tum febrium accessiones, uel quotidie, uel tertio, uel quarto quoque die inuadunt. In plurimis siquidem morbis, ubi sanè maxime utilis sit futura accessionis prænotio, ex uel alternis diebus fit, uel quotidie, in paucis uero quibusdam per quartum. Qui uero præter has tres periodos, & quintanam, & sextanam, & septimanam, aliasq; innumeras esse arbitrantur, præterquam quod inaniam producūt, infinitosq; coguntur dare quodorum complexus, nunq; poterunt futuram accessionem prænosce-
20 re. Porro quis fuerit huiusce attonitæ sectæ autor primus, ignoreo: dicam tamen, quidō primū illam explicari audierim. Deceserat paulō antè de uita Antoninus, qui Adriano in Imperio successerat. Regnabat autem Seuerus, qui seipsum nomine murato, Antoninū appellauit: Lucium uero, quem Imperij participem fecerat, Seuerum appellauit. Ceterū præstat illorum absurditatem ne meminisse quidē, Pythici præcepti memores, Esse par-
30 cendum tempoti. Nos uero in præsentia diem, uel tempus id uniuersum dicimus, quod diem atq; noctem complectitur. Quia ratione dicūt annū consistare diebus trecentis & sexaginta quinq;, & quarta unius parte. Horæ itaq; quatuor & uiginti diem absolunt: duos autem, octo & quadraginta: tres, duo & septuaginta. Typis autem nomina indita sunt, non ex diebus ipsos complentibus, sed ex accessionū reditu. Tertianā quippe appellamus, ubi accessio tertio quoque die inuadit, duobus interim absolutis: quartanā, in qua uidelicet quarto, in hac quoque tribus iam perfectis: sūm alijs quoque secundum eandem rationē. Si igitur periodum inuenieris typi alicuius, quatuor continentem completos dies, illum quintanā dices. Neg enim est idem, accessionē quinto oboriri die, & esse quinq; dierum circuitum.

Tertianā quæ dicitur.

Quartanā quæ dicitur.

Typus febrium uel utantur sit.

Voluerim intermissionem typi singuli, quot expleantur horæ.

GALENI PERGAMENI

de typis lib. vñus.



Ypus est ordo intensionis & remissionis: periodus uero est tempus in tensionis & remissionis, quod in morbis existit. * Pauci autem ex affectibus carent typo: ut atrophæ,

neruorum resolutio, elephantis, & quicunq; his proportionem respondent. Plurimi uero affectus typum quidem præ se ferūt, uerū rarius. Porro omniū maximè febres typos admittunt, ijs continuas exceptis, quæ uel remittunt nunq; uel inordinate existunt. Typorum itaq; alij quidem sunt primi, alij uero secundi, alij permanentes, alij mobiles, alij simplices, alij compositi. Primi igitur sunt, qui breuem habent inuasionem, longam autem remissionem: quales tertiani & quartani existunt. Secundi uero, qui longam habent inuasionem, breuem autem remissionem: ut quondiani & ualde extensus semitertianus.

At permanentes sunt, qui ipsius horis perpetuè inuadunt: remittuntq;. Mobiles uero, qui diuersis semper horis accedunt. Ex quibus qui præueniunt, & celerius horas præoccupant, proleptici: qui uero tardius morantur, hysterici nominantur. Simples sunt, qui unum tantummodo insultum faciunt. Compositi, qui ex pluribus inuasionibus & remissionibus consistunt. Ceterum compositorum quidam ex homogeneis, id est, genere similibus: quidam uero ex heterogeneis, hoc est, dissimilibus cōstant. Ex genere quidem similibus, cum quondianus typus (exempli gratia) simplex, duplici quotidiano implicatur: aut duplices tertiani, aut tres tertiani existunt: uel rursus duo & tres quartani. Ex diuersis autem genere, cum quondianus (exempli causa) tertiano connectitur, aut tertianus quatrano. Etenim quondianus est, qui quotidie unam inuasionē longitudine cōmensuratam, unamq; similiter remissionem efficit. Tertianus autem, qui tertio quoque die, unam inuasionem & remissionem similiter cōmensuratam adducit. Quartanus deniq; qui quarto quoque die suam inuasionem & remissionem molitur. Atq; eadem intelligantur de quintano & septimano, & si quis alius typorum ordo inueniatur. Porro quondianum con-

sequitur typū, humiditas habitus, uomitus pituitosi, sitis nō admodum intensā, totius corporis grauitas, somnus grauis atq; profundus, pulsus magnus, rarus & laxus, facies subliuida, laxa & præmolli, & quæ multam præ se ferat materiem tam prauitatem, tum mutationē. In hoc etiam typus plenior diuor euadit. Quod si protrahat diuinus, tremuli & ueternosi sopores sequuntur, & thoracis fluxiones, & aquæ inter cutem affusiones. Potissimū autem hi stoma cho malè affecto constituantur. Tertianū uero comitatur sitis intensā, ætus, acris atq; biliofus uomitus, inædignitas, querulitasq;. Vt plurimū autem rigores hunc præcedunt, nonnunq; uero etiam refrigeratio. At pulsus in his qui tertiano typo uexantur, paruus & frequens sublequitur. Noctes, quæ accessionis dies præcedunt, molestæ admodū sunt. Vbi autē morbus produci-
60 tur, non amplius molestæ

Typus accessio-
nem quid.
Periodus accessio-
nem quid.

Typi carentes
febris.

Typorum differe-
ntia.

Typi primi.

Typi secundi.

Typi permanen-
tes.

Typi mobiles.

Typi proleptici.
Typi hysterici.

Typi simplices.
Typi compositi.

Typus quon-
dianus.

Typus tertianus.

Typus quartanus.

Typum quon-
dianum quæ cō-
sequantur.

Quondianus la-
boribus sitis
inducitur letis.

Quondianus typus
remittens male affectu
constat.

Tertianum typum
quæ cōsequantur.

existunt, sed febrem ipsam compescunt. Qui uero ita febricitant, quandoq; a tertiano in semitertium transeunt. Hic autem tertianus typus omnium minimè uexat, præsertim si æstate fuerit contractus. Quod sane indicauit Hippocrates, dicens: Tertianæ exquisita septem circuitibus, qd longissimè est, iudicatur. Rard autem diuturna fit, nisi deficiente autumno, aduenienteq; hyeme signatur. Urinæ sunt fluxæ, necnon uigiliæ instant. Omnia autè quæ comitant tertianam, eadem & semitertianæ contingunt, cum eiusdem generis ambæ participes sint, tertio quoque die molèsses remissioni & accessioni repetitiones. Propriū autem semitertianorū typorum existit inuasionū extensio, & quod plerumq; cum refrigeratione, & statu nōdum completo, rursus accessiones infestant. Atq; semitertiana periculū semper minatur, eo quod nō solum os uentriculū & neruosis partes attingat, & in uniuersum eas adluat, quæ media cōpōsitione cōstituit, uerumetiam ueternosos inducat spores, & cum delirij uigiliæ annexas: nōnunq; & resolutiones, quas syncope comitant: linguæ etiam ualidè sicet, atq; animi defectum efficiat, ea quæ sunt in profundo uellementius cōmouens. Vt autè summatim dicā, typus hic ferus est, periculumq; undecunq; portendens. Quandoq; autè primo die cōstituitur, quædammodi exteri inter: interdum uerò & a secundo & tertio incipit. Oritur autem nonnunq; a tertiana producta: nonnunq; etiam solutus, in tertianam degenerat: interdum uerò & in duas tertianas & quotidianas, ob longitudinem inuasionis, dirimitur. Plerumq; autem, qd attinet ad naturas, uirilem corrigit: quod ad ætates, florentem maximè. quod uerò ad anni tempora, in autumno præsertim, quādo & ualde periculosus existit. At nō perpetuò continuus est, sed & intermittens quandoq; inuenitur. Habet autem & tres, quod ad eius magnitudinē, differentias: alia siquidem semitertiana est exigua, alia media, & alia magna. Exigua igitur est, quæ circa uiginti quatuor horas torquet. Media, quæ circa triginta sex. Magna, quæ circa quadraginta octo: quæ & cōtinuè febrī est propinqua. Porro Agarhius a relatione ad tertianā, semitertianā fieri censet. Etenim tertio quoq; die utrisq; sunt inuasiones. Quartanū uerò typum rigores quidem ualidi consequunt, & uomitus pituitosi, & lenis inflammatio, & tumor: nonnunq; & abolita appetentia, & saluæ copia. Interdum etiā ex contrarijs appetitus intensus. Quandoq; & tussicula simul adest, si corporis labitus corrumpatur. Idcirco typi quartani difficile solubiles sunt, ceterisq; omnibus diuturniores, ita ut usque ad bienniu perdurent. Cum autem inualefcit quartanus typus, ipse sibi inter cōplicatur, ut duas & tres quartanas efficiat, aut ad aliquam etiā deueniat continuatē. Rursus uerò cum moderatior fit, in unam conuertitur. Interdum autem & ob symptomata quæ complicantur ipsi, ad eo periculosè huiusmodi febres euadit, ut ad phthisim tandem, aut ad aquæ inter cutem affusiones perducant. Frequentiores autè sunt quā alij temporibus in autumno potissimū, quo etiam tempore soluiuntur ægrè. Quæ uerò ætate sūt,

omniū minimè infestant, & magna ex parte alijs precedentibus morbis superueniūt inordinatè. Quandoq; etiam, sed raro, ab initio consistunt. Ceterū pulsus eis qui tertiana laborant, nō tantum magnitudinē exiguis fit, quantū ijs qui uexantur quartana: neq; usque adeo in tumorē attollitur, quantū illis qui quotidianam occupant. Naq; in hoc typo, pulsū quēdam mediocritas inuenitur. Est autem quandoq; et in accessioni instij rarior eo, qui secundum naturam est. Verū præter has tres, inueniunt etiam febres quæ typicos dierū morus seruant: sicut & alij typorum prorsus expertes, præter unam. Quæ igitur seruant typicos dierū morus, uel ante horas cōsuetas corripunt, uel retardant. Sunt autè inordinatæ, sed præter morus formam. Quare interdum præoccupant, interdum tardius morantur, at citra ordinē utraq; præter id tamen quod modò inordinatè moueat, modò sistant, nusquam autè ordinem habeant, ubi etiam a nullo impediuntur: uerū manente semper dierum figura, quam solę particulares inordinationes comitentur. Quæ uerò omnino typorū expertes sunt, & præter omnes dierum enumeratos, & adhuc citra dierum ordinē fiunt. Quædam enim inuasiones adducunt, quædam existunt prorsus inordinatæ. At speciei huius differentias plures esse cōtingit. Licet itaq; modò prædicto cuiq; speculatur, necnon utrumq; uoluerit, prædictorū typorū proprietates complicare. Porro ex typis duplicantur iij qui primi appellantur: ut quotidianus, tertianus atq; quartanus. Quotidianus itaq; duplex est, qui diebus singulis similiter bis inuadit, & bis remittit. * Duo autè tertiani sunt, qui per singulos dies diuersis accessionibus sibi inuicē succeduntibus, tertio quoq; die apprehendunt. Quartani uerò, cum die uno salubri succedente, duobus deinceps frequentibus diebus cōtingat febricitare, in singulis inuasionū horis seruati figuris, quæ nimirū ex quaternario circitu sunt æstimandæ. Quotidianus uerò tertiano adiungitur, cum primo quidem die bis inuadit, & bis remittit: de autè sequenti, semel: tertio uerò, rursum similiter primo. Quartano autem quotidianus miscetur, cum primo quidem die bis inuadit, duobus sequētib; semel: quarto uerò die, bis, primo similiter. Porro quotidianus, tertianus atq; quartanus, inuicem cōmiserunt, cum dies quidem prima tres habet inuasiones, & rōndem remissiones: secunda unam: tertiam duas: quarta tres: quinta unā: sexta duas: septima rursum tres: atq; in reliquis diebus idem cum primis ordo seruati. Tertianus autè quartano iungit, ubi prima dies duas inuasiones adducit, rōndem remissiones: secunda uerò nullas omnino: tertia unā: & quarta unam similiter: quinta unā: sexta nullā prorsus: septima duas: atq; in sequētib; pari modo. Cōmiserunt adhuc tertianus typus, quartanus & quintanus: cū scilicet primo die accessiones cōtingant, secundo quæuerint: & tertio tertianus, quarto quartanus, quinto uerò tertianus simul & quintanus inualefcant. Sed aliter etiā quodammodo huius typi inuasio cōtingit, in eundem nihil minus typi ordinem incidente, tertianus cum semitertiano cōiugatione.

GALENI

Hemitertianæ ad se quatuor conuertuntur tertianæ

Hemitertianæ typus propria

Hemitertianæ typus est ferus, periculosus, unde cōp. portendens.

Hemitertianæ quædam magna sit similitudo.

Hemitertianæ aliæ quædam intermittunt.

Typum quartanum quæ consequuntur. Quartani typus accurata descriptione.

Quartanæ ab initio moriuntur.

Typi admodum duplicantur qui sunt. Quotidianus duplex. Tertianus duplex.

Quartanæ duplices.

Quotidianus qui tertianæ adiungitur.

Quotidianus qui quartanæ adiungitur.

Quotidianus qui tertianæ & quartanæ adiungitur.

Quotidianus qui tertianæ & quartanæ adiungitur.

Tertianus typus qui quartanæ adiungitur.

Tertianus typus qui quartanæ adiungitur.

Tertianus typus qui quartanæ adiungitur.

Tertianus typus qui quartanæ adiungitur.

GALENI PERGAMENI

Ars medicinalis.

CAPVT I.



Res sunt omnes doctrinæ quæ ordi-
mini inhærent. Prima quidem ex no-
tione finis, quæ per resolutionem fit.

Secunda ex cõpõitionis cõstituit eor-
um quæ per resolutionem inuenta
fuerunt. Tertia ex definitionis dissolutione, cui

nunc incumbimus. Ex quibus sanè primâ, quæ
oritur à finis notione, & ex qua omnes artes via
quadam atq; ordine constituuntur, neminè an-
te nos scripsisse comperimus. Hic itaq; definiti-
um faciemus doctrinâ, quæ quantû ab ea quæ
ex resolutione consistit, & dignitate, & ipso do-
cendi ordine linquitur, tantû & ad totius compen-
dium, & ad singulorum memoriam præstare
inuenitur. Sufficienter siquidem, ac facillimè
cõmendantur memorie uniuersa, ex definitio-
nis dissolutione: quoniam totius artis capita in
se optima definitio cõplectitur, quam quidem
substantialia emellant: ex a duobus distinguen-
tes eam ab alijs, quæ notionalia uocantur. Illæ
siquidem ab ijs quæ accidunt rebus definitis, hæ
uero ab ipsa essentia cõstituuntur.

Quid sit medicina. Cap. I.

Medicina est scientia salubrium, & insalubriû,
& neutrorum. Nomen autem scientiæ cõmuniter,
non propriè, accipere oportet. Porro salubre
ipsum, insalubre & neutrum, unumquodq; tripli-
citer dicitur: hoc quidem, ut corpus: hoc autem,
ut causâ: hoc uero, ut signum. Etenim corpus
quod natura suscipere sanitatè est aptum, & cau-
sam quæ eandem efficere aut cõseruare, & signû
quod potest indicare, hæc omnia salubria Græci
appellare consueuerunt. Eadem ratione & sus-
ceptiua in orbem corpora, & eosdem efficien-
tes cõseruantesq; causas, & signa indicantia, in-
salubria uocant. Nec aliter corpora neutra, cau-
sas, signâq; dixerunt. Cæterum secundum qui-
dem primam rationem, atq; præcipuam, causam
salubriû est medicina scientia. Propter eas
autem, & aliarum: secundo autem loco, insalu-
brium: & tertio, neutrum. Et post hæc eodem
modo corporû, primò quidem & hic, salubriû:
secundo loco, insalubrium: tertio, neutrorum.
Idem & de signis dicendum. In actionibus au-
tem prima quidem est corporum cognitio, quæ
habetur ex signis: post hæc, earum quæ in ipsis
cognitio causarum.

Quot modis dicatur effectuum, indica-

tium, & susceptiuum. Cap. II.

Sed quoniam & effectuum, & indicantium, &
susceptiuû, dupliciter unumquodq; dicitur, hoc
quidem simpliciter, hoc uero ut nûc: nosse opor-
tet, amborû esse medicinz scientiam. Ipsum ue-
rò simpliciter, duobus dicitur modis: & quod
semper, & quod ut plurimû & de quorum utroq;
medicina pertrahat. Neutra uero, & causâ, & cor-
pus, & signum, & quod simpliciter dicitur, &
quod ut nunc, tripliciter unumquodq; appella-
tur: hoc quidem, quia neutrius contrariorû est
particeps: hoc uero, quia utriusq; atq; hoc deni-
que, quia aliquando huius, aliquando illius. Ho-

rum autè ipsorû secundum, rursus duobus dici-
tur modis: aut quia utriusq; contrariorû ex æquo
participat: aut quia aliquando plus alterum. Pri-
mû igitur de corporibus ipsis dicemus, qualia
nam sint, & salubria, & insalubria, & neutra: post
hæc de signis & causis discretemus.

De corpore salubri.

Cap. III.

Salubre simpliciter corpus est, quod ab ipso
naturæ ortu bonam temperaturâ sortitur in sim-
plicibus ac primis particulis: estq; in his quæ ex
illis constant instrumentis cõmensuratum. Salu-
bre uero nunc, est corpus, quod in præsentî est sa-
num. Est uero & hoc, eo tempore quo sanû ex-
istit, bonam habens temperaturam & cõmen-
surationem: non tamen optimam, at sibi propriâ.
Ipsius uero salubris simpliciter corporis, sem-
per quidem est tale, quod optimè temperaturam
ac maxime cõmensuratum existit: ut plurimum
autem, quod à cõstitutione optimâ, non ualde
admodum deficit.

De corpore insalubri.

Cap. V.

Insalubre uero simpliciter corpus est, quod ab
ipso ortu naturæ, uel in cõsimilibus, partibus ma-
lam temperiem possidet: uel in instrumentibus
incõmensurationem, uel utriusq; uitium. Insalu-
bre uero ut nunc, est illud, qd eo tempore, quo
tale dicitur, ægrotat: uel in cõsimilibus prauam
temperaturâ, uel in instrumentalibus incõmen-
surationem, uel utriusq; uitium tunc habens. Est
uero & semper insalubre, quod ex ipso naturæ
ortu uel pessimam temperiem possidet in sim-
plicibus & primis particulis omnib; uel in aliqui-
bus, uel in ijs quæ obtinent principatum: uel in
instrumentarijs incõmensurationem existit, idq; uel
in omnibus, uel in nõnullis, uel in illis quæ prin-
cipatum obtinent. Vt multû uero insalubre est
corpus, quod ab huius quidè uitio recedit, noni-
dum tamen mediocritatem attingit.

De corpore neutro.

Cap. VI.

Quoniam uero & neutrum corpus dicebatur
tripliciter: unum quidem, quod neutrius erat ex
tremæ dispositionis particeps: aliud, qd utrius-
que: aliud, quod aliquando huius, aliquando il-
lius: iuxta primû significatû, neutrû erit corpus,
quod exquiratè mediû est & saluberrimû & insa-
luberrimû corporis: & illius, hoc quidè simplici-
ter tale, quod ab ipso naturæ ortu, ita est cõstitu-
tum: hoc autem ut nunc, quod in præsentî tem-
pore, exquisitè medium existit, & saluberrimû,
& insaluberrimû corporis. Ipsius uero simplici-
ter, semper quidem tale est id, quod in omnibus
statibus perdurat tale: ut multum autem, quod
nonnullas recipit mutationes. At iuxta secun-
dum significatû, neutrum erit corpus, quod
ab ipso ortu naturæ, contrariarum simul est par-
ticeps dispositionum, aut scilicet in una parte,
aut in duabus differens. In una quidem, si
secundum alteram oppositionem effectiuarum
qualitatum bonam habuerit temperiem, uel et-
iam secundum utramque, sed in formatione, uel
magnitudine, uel numero partium, uel finis, de-
linquat: aut contrâ, in his quidem rectè se ha-
beat, uel omnibus, uel quibusdâ, peccet autem
in ipsâ temperie. In differensibus uero partibus,
& iuxta omnes oppositiones potest quicq; simul

Doctrina ordi-
nis a sunt res.

Doctrinam à fi-
nis notione or-
tam, uero ante
Galenum expo-
sunt.
Doctrinam defini-
tione uero ante
Galenum in arte me-
dicinali.

Definitio opti-
ma, ut si caput
totius artis cõ-
plectitur.
Definitio est do-
plex substantia
in cõnotionalis

Medicina est
scientia salubriû,
insalubriû, &
neutrorum.

Salubria quæ di-
cantur,
insalubria quæ
sint.

Neutra qua-

Simpliciter do-
modis duobus.

Neutra dici tri-
pliciter.

Salubre simpliciter
corpus quod
sit.

Salubre ut nûc,
quod sit corpus.

Insalubre sim-
pliciter corpus,
quod sit.

Insalubre ut
nûc, quod sit cor-
pus.

Neutrum corpus
quod sit, iuxta
primum signifi-
catum.

Neutrum iuxta
secundum signifi-
catum quod sit.

esse particeps cōtrariorum. Et semper quidem est tale, quod per omnes ætates in eodem perseverat statum. Vi multū uerō, quod aliqua ex parte evariat. Ita etiam & nunc neutrū erit corpus iuxta secundum significatū: quia uel parte in una, hæc quidem sibi salubria sunt, illa uerō insalubria: uel in differentibus ita afficitur partibus. Iuxta tertium significatum, neutrum erit corpus, quod aliquando quidem salubre, aliquando uerō insalubre existit. In uno autē tempore, quod ita est neutrum, * exactē quidem consistere nequit: latius uerō si accipitur, potest.

De signis salubribus. Cap. VII.

Salubria signa
quæ sint.

Insalubria signa
quæ sint.

Neutra signa
quæ sint.

Signa præcōi-
tina indicatū
esse: videtur qd
quæ memoria
subiungunt.

Salubrium cor-
porum dignitas
non ualde peten-
da sint.

Sunt autem ex signis, salubria quidem, quæcunque præsentem indicant sanitatem, & futuram prænuntiant, & præteritam memoriæ subiungunt. Insalubria uerō, quæ & præsentē indicant ægritudinem, & futuram prænuntiant, & præteritam memoriæ subiungunt. Eadem ratione neutra dicuntur, quæ neutram dispositionem ostendunt, prænuntiant, & memoriæ subiungunt: quæq; parum quidem salubrem, partem insalubrem dispositionem indicant: & quæ aliquando quidem salubrem, aliquando uerō insalubrem. & hæc quoque secundum tria tempora, ueluti salubria & insalubria, appellantur. Dicuntur autem nonnunquam & uetustioribus medicis hæc omnia, signa prænuntiatiua, quamuis sint præsentium & præteritorum indicantia. Porro usus non parvus ex prænuntiatiuis atq; in dicationis accedit: minor autē ex his quæ memoriæ subiungunt.

De signis optimæ constitutionis.

Caput VIII.

Salubriū autem corporū dignotiones sumende sunt ab ijs quæ secundum essentiam rationem eis insunt, & ab ijs quæ necessariō sequuntur ipsā functionibus atq; symptomatibus, quæ propriè accidentia appellantur. Ab essentia quidem ipsā, eorum quæ optimè habent constitutionem, cōmensuratione: consimilium quidem, in caliditate, frigidityte, humiditate, & siccitate: instrumentorū uerō, in quantitate ac numero eorum ex quibus consistant: ac præterea formatione, sita partū singulari, & totius instrumenti. Ex his uerō quæ necessariō consequuntur consimilia, quantum quidem ad tactum attinet, à mediocritate quæ in mollitie & duritie consistit: quantum uerō ad aspectum, à colore optimo, & laxitate atq; hispiditate mediocritate. In functionibus à perfectione, quam ipsarum esse uirtutem dicimus. Ab ijs uerō quæ instrumentarias sequuntur partes, à cōmensuratione & pulchritudine omnium totius corporis instrumentorū: ac præterea, ab earū quæ ipsis insunt, uirtute operationū. Optimæ igitur constitutionis corporū signa indicatiua sunt hæc. Eorum autem quæ ab ipsa deficiunt, & adhuc tamen salubria existunt, nonnulla quidem in consimilium temperatura uinum ali-quod parum habent: nonnulla uerō in instrumentariorū uel omnium, uel aliquorū cōmensuratione, & hoc quoque perexiguū. Sunt quæ in utriusq; uinum aliquod habent. Vinorum uerō genera, eadem sunt his quæ uirtutem perficiunt: temperatura quidem in consimilibus: numerus autē, & formatio, & magnitudo, & situs, in instru-

mentarijs: utriusq; uerō cōmunis unitas, quā ipso rum continuitate uocamus. In his autem ipsis generibus sunt corporū insalubrium uitia, secundum utrumq; salubritatis significatū. Terminus autem qui utrumq; distinguit, est operanonū laxisio sensibilis. Etenim quæ simpliciter insalubria sunt corpora, distinguuntur ab id, quod faciliè à causis morboficis superantur: & quoniā in uigore operationū deficiunt plurimū. In medio autē salubrium & insalubrium collocantur ea, quæ neutra exquisitè appellantur, & cum latitudine quadā. Quo fit, ut tota sanitatis latitudo in tres partes, quarum singulæ latitudinem habent non paruum, diuidatur. Erit autem prima quidem salubrium corporum, secunda neutrorū, tertia insalubrium. Post hæc deinceps sequitur quæ iam ægrotant corpora: quæ sensibilibus operationum laxisionibus distinguuntur. Hæc autem omnia sensu iudicantur, non ipsa natura rerum. Signa itaq; sanorum corporum, siue ex salubria, siue insalubria, siue neutra existant, quantitate distant: differunt, duobus inuicem contrarijs terminis à nobis cōstitutis, optima uidelicet cōstitutione corporis, & nuper genito morbo: ac deinceps considerantibus, utri eorum sint uiciniora, quæ ad examen corpora ueniunt. Quæ enim proximiora sunt optimæ cōstitutioni, salubria: quæ uerō ab hac longius distant, atq; ad ea quæ iam ægrotāt, magis accedūt, insalubria: quæ autem intermedia, atq; æqualiter ab utriusq; distare uidentur, neutra existunt. Optimæ igitur cōstitutionis corporis indicia explicauimus. Eorū uerō quæ ab ipsa deficiunt, tandem sunt numero genera, quæ in magis & minus fecari possunt.

Quorū sint differentie partium. Cap. IX.

Partium uniuersæ differentie sunt quatuor. Siquidem earum nonnullæ principia quedam existunt: aliquæ ab ipsis originem habent: aliquæ neq; aliarum gubernatoriū præsent, neque aliunde gubernantur, cum insitas habeant à natura potentias, à quibus reguntur. Quedam uerō sunt, quæ insitas simul & aliunde emanantes fortuntur. Principia igitur sunt, cerebrum, cor, hepar, atque testiculi. His uerō & originem debent, & famulantur: nerui quidem & spinalis medulla, cerebro: cordi autem, arteriæ: hepati, uenæ: ut testiculis feminaria uasa. Quæ autem à seipsis gubernantur, sunt cartilago, os, copula seu ligamentum, membrana, adenes, adeps, & caro simplex. Reliquæ uerō partes, cum uia cum ijs habeant ex seipsis regimen, arterijs, neruis, & uenis iussu perindiguerunt. Capillorum autem atque unguium neq; regimen ullum est, sed generatio tantummodo.

De signis cerebri. Cap. X.

Cerebri autem naturam, quinq; indiciorum genera ostendunt. Primum quidem, totius capitis dispositio. Secundum, sensibilibus operationum uirtus & uitium. Tertium, actiuarum. Quartum, earum quæ principatum obtinent. Quintum denique, naturalium. Est & aliud sextum genus præter hæc dicta, alteratio quæ extrinsecus aduenit. Porro totius capitis dispositio, ex magnitudine ipsius atq; figura sumitur, nec uon ex capillis.

Insalubria simpliciter corpora faciliè à morboficis causis superantur.

Sanitatis latitudo de uarijs in tres partem diuiditur.

Ægrotantia corpora à causis sensibilibus operationum laxisionibus distinguuntur.

Salubria erit salubria corpora, quæ optimè distentur.

Partium uniuersæ differentie sunt quatuor.

Principia partium sunt cerebrum, cor, hepar, atque testiculi.

Capillorum neq; regimen ullum est, sed generatio tantummodo.

Cerebri naturæ quinq; indiciorum genera ostendunt.

De par.

De paruitate & magnitudine capitis.

Caput x. i.

Caput magnū
quādo sit bonū
indicium.

Parvū igitur caput, utiōse constitutionis cerebri propriū indicium est: magnū uerō non necessariō indicat bonam cerebri compositionē: sed si quidem ob infirmitatē robur, quæ multat ac optimam materiam aformari, eueniat, optimū signum est. At si ob materię tantū multitudinem, haudquāq̃ bonum. Distinguenda uerō sunt hæc, & ex figura ipsa, & ex his quæ ab eo habent ortum. Ex figura quidem, si sit cōcinna: semper nanq̃ hoc, bonum signum exiit. Ex his autem quæ ab eo ortum habent, si ceruici ualide insideat, aliq̃s ofusibus optimē confert: atq̃ omnis præterea subtilitas boni sit habitus, ac robur habeat intentum. Propria autem capitis figura est, ueluti si excogitares sphaeram exquisitè rotundam ex cera cōstructam, paulatimq̃ utrinq̃ depressam. In hac enim necesse est, ut posteriōres prioresq̃ partes plus gibbæ fiant, q̃ sphaeræ cōueniat: quæ uerō utrinq̃ consistunt, magis rectæ. Quod si ea quæ secundum occiput eminentia aliquatenus minuat, simul intrinsece oportet nervos, atque ceruicem, unā cum ofibus aliq̃. Nam si secundum naturam cōstituerint, materię defectū, nō uirtutis imbecillitatē, contingit. Illis uerō nō rectē se habentibus, principium est debile. Vt plurimū uerō exiit optimū signum figura concinna parencephalidis, quam nōnulli medici posteriōres cerebrum uocant, ut est reuera posterior, distinctum labdoide futura. Est uerō hæc pars principii spinalis medullæ, ac proinde neruorum omnium, per totū corpus animalis, actio- nibus subseruientium. Ipsa siquidem cerebri pars posterior, per seipsam, paucos admodum sensitiuos possidet nervos, plurimos autem actiuos. Anterior uerō contrā, sensitiuos quidem plurimos, actiuos autē perpaucos. Quare ubi utraq̃ fuerit optimē affecta, robustas ha habebit eas, quæ ab ipsis pendent, deriuationes. Eadem quoq̃ distinctiones faciendæ sunt ad partes capitis anteriores, quæ etiā ad posteriores. earundemq̃ paritatem, magnitudinem, & figuram, necnon sensus ibi collocatos, uisum, gustum, & odoratum, expendere oportet: siquidem sese inuicem indicant attestanturq̃, & quæ a principijs oriuntur, principij uirtutem & uitium: & principium, ea quæ ab ipso nascuntur.

Capitis natura
la figura, quādo
nam esse debeat

Parmentheria.

Labdoide futura.

Cerebrum est
principium spinalis
medullæ.

Principia & ea
quæ ab illis oriū-
tur sese inuicem
attestantur & in-
dicant.

Principalium
anima actiōnū
singula quāsi
significata.

De operationibus obtinentibus principium. Cap. x. i.

Earum autem operationū quæ obtinent principium, uirtus ac uitium, sunt ipsius principij seorsum tantūmodo indicia. Voco autem operationes principium obtinentes, quæ a solo principio proueniūt. Sagacitas igitur, subtilem cerebri substantiā indicat. Tarditas uerō intellectus, crassam. At discendi facilitas, formatū facile susceptum. Memoria, stabilem atq̃ firmam. Difficultas discendi, formatum non facile susceptum. Obliuio, fluidam. Mobilitas in opinionibus, calidam: ut stabilitas, frigidam.

Signa bonæ temperaturæ cerebri.

Caput x. i. i.

Si quidem cerebrū fortitur bonam primarū quatuor qualitatū temperiem, omnia quæ di-

ximus, habebit quādam moderatā. Excremen- ta quoq̃ quæ ab eo expurgantur, moderatē se habebunt, atq̃ ab his quæ extrinsecus alterando oc- cursant, nequaquam ledetur. Talibus igitur ca- pillis capitis, cum adhuc sunt infantes, subfusi: cum uerō pueri, subfusi: cum iam adoleuerint, flauī sunt: medijsq̃ inter omnino crispis & le- nes. Nec uerō caluescunt facili.

Signa calidi cerebri. Cap. x. i. i. i.

Signa calidi cerebri sunt, in his quæ circa ca- pur consistunt, rubor & calor maior, & quæ in oculis uisuntur uenæ, conspicuæ magis. Capilli quoq̃ in his statim in lucem æditi "celeriter ge- nerantur: & cum plurimū in calore & in edictis temperatura recesserint, nigri & robusti & crispi sunt: cum uerō non multū, subfusi quidem ab initio sunt, deinde nigricant: ac progredienti- bus ætatem, caluitiū patiuntur: eoq̃ magis, quōd temperies plus æquo calidior fuerit. Excremen- ta uerō quæ per palatum, & nares, & oculos, & aures purgantur, pauca & concocta ipsis exi- stunt, si integra sanitate fruuntur. Si uerō eis ca- put replatur, plura quidem in ipsis excremen- ta, sed nō concocta, gignunt. Implet autē aggra- uanturq̃ eorū capita, & calfacientibus nam abis, tum pontibus: necnon ab odoribus, hisq̃ omni- bus, quæ extrinsecus nobis occurrant: in quorū numero est ær circumflans: ac tunc præcipue, si nō solū natura calida, sed etiā humida, ipsa cor- pora exierint. Breuib. autē somnis huiusmodi temperaturæ cōtente sunt, nec pfundis admodū.

Cerebri calidi
indicia.

Cerebrum calidi-
di & quibus fa-
cile impletur.

Calida & ha-
mida corpora si
minus breuib. sō-
mnis sunt.
Cerebri frigidi
indicia.

Cerebri frigidi
præditi faciliē à
frigidi causis la-
duntur.

Cerebri frigidi
præditi summo-
lentiores sunt.

Cerebri sicci in-
dicia.

Cerebri humidi
indicia.

Cerebri calidi
& sicci indicia.

Frigidioris uerō quādam oportet cerebri indi- cia sunt, plura in proprijs meatibus excrementa: capilli recti, rufi, stabiles, & qui longo post na- tumatem tempore nascuntur tenues, atq̃ ab ini- tio malè nutriti. Porro quibus tale cerebrum ob- tigit, faciliē à frigidis causis leduntur: quo sanè læsionis tempore destitutionibus & grauedini- bus corripuntur. Sed nec partium quæ iuxta ca- put sunt calor magnus aut rubor, nec oculorum uenæ illis conspicuæ insunt. Sunt autē quodam- modo somnolentiores.

Signa sicci cerebri. Cap. x. v. i.

Sacrioris autem cerebri indicia sunt pauca su- perfluitates effluentes, & sensuum perspicacitas. Sunt autem ad uigilias prompti, & capillos ha- bent robustos, crispis ponus quim rectos, & qui celerrimè eis genitis innascuntur. Citò au- tem caluescunt.

Humidi cerebri indicia. Cap. x. v. i. i.

Humidioris uerō cerebri indicia, capilli planti, quodq̃ minimè calui fiant: sensus turbulenti, mul- tudo excrementorū, somni multi & pfundi. Atq̃ hæc quidem simplices sunt intemperies.

Signa calidi sicci cerebri. Cap. x. v. i. i. i.

Qui calido & sicco sunt cerebro, superfluitati- bus carent, sensibus uigent, plurimū uigilāt, atq̃ citò sunt calui. Prima autē capillorū generatio in illis celerrima est, ac plurimū alimento abun- dans. Capillos uerō habet nigros & crispos. tan- gentibusq̃ caput sentiuntur calidi, rubicundiq̃ sunt, usq̃ ad consistentiæ ætatem.

Signa calidi & humidi cerebri. Cap. x. i. x.

Si uerō humiditas caliditati iungat, sed parā

*Cerebri calidi
& humidis indi-
cia.*

utraq; qualitas mediocritatem superet, adest color bonus coloris, & quæ in oculis sunt uenæ, magnæ. Præterea excrementa plura, & mediocriter cocta, & capilli recti & sublaui: nec facile calui fiunt. Implentur uerò atq; aggrauant eorū capita a calidis. At si humectentur, tunc multo magis: & præcipue ubi multitudinem excrementorū redundant. Quod si plurimū caliditas atq; humiditas creuerint, ijs caput est morbis obnoxium, excrementis abundans: ac facile a calfacientibus & humectantibus letidur. Proinde Aufer semper talibus aduersatur: atq; optime in Aquilone se habent. Hi nō diu uigilare possunt, & eū se ad somnū conuerterint, simul graui somno tentantur & uigilant, & somnia habent imaginationibus plena. Visus est eis turbulentus, nec satis sensibus uigent. Pro ratione autē ipsius qualitatis in missione excellentis mediocritatē, solent etiam signa ipsa excellere.

*Cerebri calidi
& humidis pra-
dictis, ut aduer-
satur. Noster, sic
confert Aquila.*

*Cerebri frigidi
& sicci indicia.*

Signa frigidi & sicci cerebri. Cap. xx. Frigidū uerò & sicca cerebrī intemperantia, frigidum & minimè coloratum, sui ratione, caput efficiunt. Qui autem sic sunt affecti, in oculis nullas habent uenas conspicuas, facileq; a frigidis causis læduntur. Quare & inaequali fanitate fruuntur.

De sensibus. Cap. xxi.

Sensus autem eorū, in iuuentute quidem omnes uigent, atq; omni uitio carent: sed progrediente ætate citò marcescunt. Vt autem summam dicam, omnia quæ ad caput pertinent, celerim illis marcescunt: quamobrem citò cani fiunt. Capilli uerò ipsis quidem genitis, uix exeunt, & malè nutriuntur, & rufi sunt. In progressu autem ætatis, superante magis frigiditate caliditatem, quā si siccatie humiditatem, non caluescunt. Contrā uerò, si contigerit siccatē quidem plurimum dominari humiditatem, frigiditatem uerò parum calori, calui fiunt hi.

Signa cerebri frigidi & humidis.

Caput xxii.

Humidæ uerò & frigidæ cerebri temperaturæ, graues somnos conciliant, sensuum hebetudinem pariunt, uim excrementorum accumulānt, caputq; reddunt frigori & plenitudini obnoxium. Sic affecti, defillationibus & grauēdibus facile corripuntur: at minimè calui fiunt.

De oculis. Cap. xxiii.

Qui oculi ragentibus manifestè calidi apparent, & facile ac crebro motu mouentur, & uenas latas habent, ij calidi omnes sunt. Frigidi uerò, his cōtrarij. Et humidis quidem, molles, multatq; humiditate referri: sicci uerò, duri simul & aridi. A similibus autem fuae temperaturæ causis facile offenduntur: iuuant uerò à modico contrariorum usu. Sed hoc quidem cōmune in omni cūsculone partis temperiei dignotione meminisse oportet.

De magnitudine oculorum. Cap. xxiiii.

Magnitudo oculorum quidem, ubi concinnitas adstet, & operationum uirtus, multitudinem bene temperatæ substantiæ ostendit, ex qua sunt conformati. Quæ si desint, multam quidem substantiam, non tamen bene temperatam indicat.

De paruitate oculorum. Cap. xxv.

Paruitas uerò oculorū, adiuncta quidem concinnitate, atq; operationū uirtute, paucam quidem, sed bene temperatam substantiam ostendit, ex qua sunt conformati. Si uerò inconcinnitas adstet, atq; functionum uirium, paucam simul atq; uitiosam materiam demonstrat.

De colore oculorum. Cap. xxvi.

Glauci oculi, qui pura humiditate ac nō multat præfulgēt, tales sunt ob splendidi luminis abundantia. Cōtrā uerò nigri, & q intermedias naturā seruāt, causas quoq; intermedias sortiunt.

De glaucedine & nigredine oculorum.

Caput xxvii.

Glaucus igitur oculus fit, uel propter magnitudinem, uel propter splendorem crystallini humoris, uel propter situm prominentem, uel propter tenuis & aquei humoris, qui in pupilla existit, paucitatem & puritatem. Omnibus autē huius in unum cōiunctis, fit glaucissimus oculus. Si uerò aliqua adstint, aliqua desint, tunc maior minorue glaucedo contrahitur. Niger uerò oculus fit, aut ob paruitatem crystallinoidis, aut propter profundū situm, uel quia splendidus ac fulgidus exquisitè non est, uel quia tenuis humor uel superabundat, uel impurus existit, uel propter unam ex hisce causis, uel propter omnes fieri cōsuevit. Tenuis igitur humor quō magis ad aque naturam accedit, & superabundat, humidiores ostendit oculum: quemadmodum si crassior ac rhinor fiat, sicciorem. Crystallinoides autem humor, si quidem durior exstet, sicciorem efficit oculum: si uerò mollior, humidior. Sic & si plus modico tenuem humorem excesserit, sicciore: si relinquatur ab illo, contrarium.

De cordis temperaturis. Cap. xxviii.

Vnamquāq; partem calidiorem aut frigidiorē dicimus, nō alicui rei alteri, sed ad seipsam, eam comparātes. Si enim utcūq; existerit cor natura frigidissimū, multo sanè calidiorem temperiem fortietur calidissimo cerebro.

Signa cordis calidi. Cap. xxix.

Calidioris igitur cordis, * quam pro naturali symmetria, indicia quædam sunt inseparabilia, & propria, magnitudo respirationis, pulsus uelocitas & frequentia, audacia, & ad actiones natura prompta. Quod si multum in caliditate excesserit, tunc furiunda quædam iracundia, & temeritas adstunt. Est autem his thorax hirsutus, & præsertim pectus, & quæcūq; hypocondria partes proximiores. Magna uerò ex parte calidi cordis temperies uniuersum corpus calidū reddidit, nisi leuiter uehementius obstitit. Est præterea & latitudo thoracis, caliditatis indicium, nisi & hic quoq; cerebrum plurimū reluctetur: cui spinalis medullæ magnitudo proportionē respondet. Tantæ uerò erunt magnitudine uertebrae, quāta spinalis medullæ: quare & spina uniuersa. Cōpingitur autē thorax ad eam spinæ partem, quæ * iuxta metaphrenū, hoc est, dorsum, edistit, tanq; ad naui carinā. Quare necessariò eius longitudo æquabitur dorso. Latitudo uerò erit pro uertebrae ratione, quando ad proportionem crassitudinis earum fuerit compactus. Cū uerò cordis caliditas superans perfecerit ac dilatauerit

*Oculorum par-
uitas quid signi-
ficiat.*

*Oculi glauci &
nigri uide fili.*

*Glaucedinis ocu-
lorum causa.*

*Nigredinis ocu-
lorum causa.*

*Cor frigidissimū
est calidum ce-
rebrum.*

*Cordis calidū in
dorsū.*

*Thoracis latitudo
quæ ad se carinā
reluctatur indicat.*

*Oculorum tem-
peramentis quo-
modo dignoscantur.*

*Oculi à simili-
bus temperatu-
ris suis causis læ-
duntur facile: in-
uant uerò à
modico contrariorum usu.*

Oculorum magnitudo quid indicet.

dalaruerit in primo sui ortu thoracem, erit eiusdem caliditati proportionē respondens. Quare quā caput paruum, thorax autē latus extiterit, maximum hoc tibi fuerit cordis caliditatis indicium. Quum uero magno existente capite, paruus fuerit, propriūssimum hoc tibi sit cordis frigido-
ris signum & argumentum. Si uero capiti fuerit proportionē respondens, tunc alijs signis de corde distinguēs, ex ipsius thoracis amplitudine uel huiusmodi.

Signa cordis frigidi. Cap. xxx.

In frigidiore uero corde pulsus minores existunt, quā modo naturæ conueniunt; non tamen necessariō tardiores, uel rariore. Respiratio autem, si quidem tantō thorax minor extiterit, quantō cor frigidius, pulsus erit proportionalis. Si uero maior fuerit, quā pro frigiditatis portione, non solum minor, sed etiam tardior & rarior ipsa respiratio erit. Sic affecti, sunt naturaliter timidi, pusillanimesq; atque tardius ipsius glabrum fortiturnt.

Signa cordis sicci. Cap. xxxi.

Cor autē siccus, pulsus duriores efficitur atq; non promptam excitat, sed ferinam, quæq; facile compesci non possit. Magna autem ex parte sic affecti uniuersum corpus siccus existit, nisi hepar obstitit.

Signa cordis humidi.

Cap. xxxii.

Cordis uero humidioris signa, pulsus molles, & mores ad iram quodēdū procliuēs, sed talem, quæ sedari possit: at uniuersum corpus humidius existit, nisi hepar obstitit.

Signa cordis calidi & sicci. Cap. xxxiii.

Calidi & sicci cordis pulsus duri sunt, magni, ueloces, atq; frequentes: similiterq; respirationes magnæ, ueloces atq; frequentes. Multo autem magis ad uelocitatem ac frequentiam uergunt, thorace cordi non aucto proportionaliter. Sic affecti, per cunctis, pectus habent maximè hirsutum, & hypochondria. Ad actiones autem sunt prompti, iracundi, & celeres, moresq; se ferunt tyrannicos. Sunt etenim ad furorem faciles, inexcitabilesq;.

Signa cordis calidi & humidi. Cap. xxxiiii.

Si uero caliditas cum humiditate præcellat, minus quidem eis quos antea diximus, hi sunt hirsuti, ad actiones uero nihilo minus prompti: non tamen ferus ipsis est animus, sed ad iram tantum procliuēs. Pulsus uero magni ac molles, uelocesq; & frequentes existunt. At respiratio, si thorax quidem cordi fuerit proportionalis, eandem cum pulsibus speciem seruabit. Si uero minor extiterit, tantō alius uelocior atq; frequentior erit, quantō & thorax minor extiterit. Quod si multa hæc fuerit uersio in ipsa temperatūra, atq; in humiditate præcipue, præter ea quæ diximus, continget etiam ac putredine morbi, his, qui in ipsa fuerint, humoribus corruptis ac putrefactis. Expirationes autem maiores fient, ac uelociore lussuratio-
nibus: necnon arteriæ contractæ uelox.

Signa cordis humidi & frigidi. Cap. xxxv.

Qui humidior & frigidior sunt corde, pulsus molles fortiturnt: minimeq; audaces, sed timidi & segnes existunt. Tales etiam possident glabrum pectus: minimeq; iracundiam conferunt,

ad quam etiam non sunt admodum prompti.

Signa cordis frigidi & sicci. Cap. xxxvi.

Frigidius uero atq; siccior cor, pulsus quidem duriores reddit & paruos: respirationem autem, si quidem thorax paruitatē cordis frigiditatem proportionalem habuerit, moderatam si uero maior extiterit, raram & tardam. Hi uero præ omnibus minimè ad irascendum sunt prompti: quum autem coacti fuerint infanti quibuscumq;, retinent iracundiam. Habent autem maximè omnium pectus glabrum. Ceterum quæcunque de moribus, siue nunc, siue quousq; alio sermone explicata sunt ad temperaturæ cognitionem sciendum est, ea nō de optimis moribus, aut uitiosis, qui ex philosophia hominibus adueniunt, sed de infirmis unicuiq;, naturalibusq;, à nobis exposita fuisse.

Signa calidi hepatis. Cap. xxxvii.

Hepatis calidioris indicia, uenarū latitudo, stauilis abundantior: in cōsistēte uero ætate, etiam atræ calidior ipsius sanguis, atq; eadē ratione uniuersum corpus, nisi cor obstitit. His uerō & hypochondria hirsuta.

Signa hepatis frigidi. Cap. xxxviii.

Frigidioris uero, angusta uenarum, pituita abundantior, sanguis frigidior, adeoq; totius corporis habitus, nisi calēat à corde. Venter illis glaber est, atq; hypochondria.

Signa hepatis sicci. Cap. xxxix.

Siccioris autem, sanguis quidē crassior, & minimè abundans: uenæ duriores, & totius corporis labitus siccior.

Signa humidi hepatis. Cap. xl.

Humidioris autē, sanguis quidem copiosior, humidiorq;, atq; uenæ molliore: ita uero & uniuersum corpus, nisi cor relucetetur.

Signa calidi & sicci hepatis. Cap. xli.

Calidioris uero simul ac siccioris hepatis signa indicia, hypochondria plurimū hirsuta, sanguis crassior & siccior, stauilis bilis plurima: consistēte autem ætate, etiam atræ: uenarum autem latitudo & durities. Sic uero & uniuersum corpus: se habet. Nam quæ ex corde caliditas originem duxit, potest obuiare eam, quæ ab hepate nascitur, frigiditatē: sicuti & frigiditas caliditatem. Siccitatem uero non potest humidus cor ad habitum contrarium perducere. At media inter has quæ dictæ sunt, ea quæ ab hepate humiditas nascitur. Magis enī à cordis siccitate superatur, quā siccitas ab humiditate: minus autē a caliditate: ad huc uero multo minus a frigiditate. Hæc enim inter omnes qualitates quæ eueniunt ab hepate, facillimè superatur. Vbi igitur in unum conuenerint utriusque principij temperaturæ, totum exquisitè secundum illas afficitur corpus.

Signa hepatis calidi & humidi.

Cap. xlii.

Humidius autem, ac simul calidius hepar, minus quidem quā calidius & siccus hirsuta hypochondria reddit. Plurimum uero sanguinis, & uenas amplas, habitumq; calidior em, et humidiorē facit, nisi obstitit cor. Si uero amplia in ambabus qualitatibus à naturæ modo recedat, à morbis qui ex putredine ac uitiosis humoribus fiunt, sic affectus minimo negotio corripit, præsertim si plurimum augeat huiusmodi caliditas uero, non ira. Sin autē contrā, minimè humoris uitio laborat.

Mm

Cordis frigidi indicia.

Cordis siccioris indicia.

Cordis humidi indicia.

Cordis calidi & sicci indicia.

Cordis calidi & humidi indicia.

Cordis frigidi & humidi indicia.

Cordis frigidi & sicci argumenta.

Mores ipsi sunt duplices: neque paucis & natura ratione infici.

Hepatis calidi indicia.

Hepatis frigidi indicia.

Hepatis siccioris indicia.

Hepatis humidi indicia.

Hepatis calidi & sicci indicia.

Hepatis calidi & humidi signa.

Hepatis humidi & frigidi indicia.

Signa hepatis humidi & frigidi. Cap. XLIII. Humidius autem atque frigidius hepatis habet hypochondria glabra: sanguinem uero, accedente ad pituita naturam gignit, cum uenarum angustia. Sic & reliquum afficit corpus, nisi si corde ad contrariam transferatur naturam.

Hepatis frigidi & siccis indicia.

Signa hepatis frigidi & siccis. Cap. XLIII. Frigidius & siccus hepatis, parum sanguinis, et exiguae uenae exhibet corpori: ipsiusque frigidius reddit, & hypochondria glabra, nisi & hic cor do minerur.

Testiculorum temperaturarum signa.

Signa calidae, frigidae, humidae, & siccae temperaturarum testiculorum. Cap. XLV.

Temperatura uero testiculorum, calida quidem, proclius ad uenerem, masculorumque productrix, atque fecunda. Eadem celerrime generales partes obsepit pilis. Frigidior uero ceteraria efficit. At humida, multo & humidio semine abundat. Sicca, paucum & modicè crassum generat semen.

Testiculorum calidiorum & frigidiorum indicia.

Signa calidae & siccae temperaturarum testiculorum. Cap. XLV.

Calidior uero & siccior, crassissimum semen habet, & fecundissima est, ac celeriter ab initio pronus ad coitum excitat animal. Sed & haec genitales partes citissime hispidae sunt: atque omnes quae circumstant, supra quidem, usque ad umbilicum: infra uero, usque ad media femora. Petula igitur est, & ad libidinem prona, eiusmodi temperaturae statim uero saturatur, & si cogatur, offenditur.

Testium calidiorum & humidiorum indicia.

Signa calidae & humidae temperaturarum testiculorum. Cap. XLVII.

Sin autem caliditas humiditati iungat, hirsuti quidem testes minus, plus uero semine abundanti non tamen plura ceteris appetunt, sed minori detrimenti propter modum ueneris indulgent. Quod si caliditas & humiditas abundanter exuperauerint, non sine detrimento à ueneria abstinent.

Testium frigidorum & humidiorum indicia.

Signa humidae & frigidae temperaturarum testiculorum. Cap. XLVIII.

Si uero frigidiorum & humidiorum temperaturarum testiculorum habuerint, partes circumpositae glabrae sunt, & tardè rem exercere uenerem incipiunt, nec prout ad actum huiusmodi sunt. A quo sum uero et tenue ipsa est semen, infœcundumque, et foeminarum generatiuum, uel omnino non generat.

Testium frigidorum & sicciorum indicia.

Signa frigidae & siccae temperaturarum testiculorum. Cap. XLIX.

At frigidior & siccior temperatura, similia quidem in reliqua est antedictae: crassius tamen in ipsa semen existit, atque paucum omnino.

Maximèque substantia ex quibus constat.

Detotius corpora habitu. Cap. L. Totius corporis habitus in illa maxime consistit rectis partibus, quae primè oculis subijciuntur. Sed uero haec, musculi, qui omnia ambiunt ossa, existentes quaedam carnes compositae, ex prima et simplici carne, et praeter ea fibras, quibus innascuntur. Propria siquidem musculorum substantia constat ex his duobus. Quae uero ad ipsa uasa perringit, uelut rursus quidam sunt, non substantiam complent, sed ea subministrant, ut in uita permaneat.

Temperamentum moderatum indicia.

Signa moderatae temperaturae. Cap. LI.

Moderatae temperaturae indicia secundum totum animalia habent, sunt color quidem ex rubeo et albo commistus: capilli flauis, & ut plurimum medio crasse crispis: caenotantistis mediocritas in qualitate et quantitate. Medium namque est exqui-

sitè, ac ueluti Polycleri regula, huiusmodi corpora, inter omnes excessus, eum ad quod ipsi & dicantur, & cognoscantur.

De corpore calidiore. Cap. LII.

Quaecunque autem in caliditate à medio recedunt, non tamen in humiditate, uel siccitate, haec quantum ad caenosum genus attingunt, uident quidem tangentibus calidiora tantum, quantum & eorum temperatura calidior. Tanto uero magis hirsuta sunt, quanto & calidiora, & minus pinguedinis habent. Colorem autem rubrum, & capillos nigros sortiuntur.

Temperatura calidioris indicia.

Signa frigidae temperaturae. Cap. LIII.

Frigidiora autem temperaturarum indicia sunt, pilorum priuatio, pinguitudo, & occurrant frigiditytas. Color autem, uel cum capillis, rufus, & ubi frigiditytas excesserit, liuidus quodammodo existit.

Temperatura frigidiore indicia.

Signa siccae temperaturae. Cap. LIII.

Siccior temperatura tanto gracilior & durior est bona temperatura, quanto maior est siccitas.

Temperatura siccioris indicia.

Signa humidae temperaturae. Cap. LV.

Humidior autem temperies, carnosior atque mollior existit.

Temperamentum humidioris indicia.

Signa calidae & siccae temperaturae. Cap. LVI.

Calidior simul & siccior, magis hirsuta, necnò calida & dura existit: quae pinguedine caret, tenuis est, & capillos nigros sortitur. Si uero multum in caliditate excellat, color quoque niger illi adest.

Temperatura calidioris & siccae indicia.

Signa calidae & humidae temperaturae. Cap. LVII.

Calidior autem & humidior temperatura, mollior & calidior & caenosior tanto existit bona temperie, quantum & utriusque qualitatibus aucta fuerit. Quod si plurimum augeatur, citò similiter à putredinis corrumpit morbo. * Si uero parum quidem humidior sit, multo autem calidior, molliores quidem parum huiusmodi sunt, his qui bonam habent temperiem, & magis carnosius non parum uero hirsutiores, & tangentibus etiam non parum calidiores. Nigri uero etiam sunt capilli, & caro pinguedine caret. Sin autem paulo quidem calidior, multo uero humidior, mollis haec caro est, & multa: colorque miscellaneus, ex albo simul & rubeo: tangentibus paulo calidiores apparent. In summa autem, omnibus temperaturarum fluctationibus, semper excellentis qualitatia indicia eminebunt.

Temperatura calidioris & humidioris indicia.

Signa frigidae & humidae temperaturae.

Cap. LVIII.

Frigidior autem atque humidior temperatura, si parum quidem utraque augeatur, capillis nuda est & alba, mollis, & crassa, & pinguis. Si uero magis excesserit, reliqua quidem sunt secundum proportionem qualitatum auctarum: color autem, nana cum capillis, uisus. Quemadmodum si plurimum utraque augeatur, liuidus. Si uero qualitarum augmentum inaequale fuerit, eia quae superauerit, indicia eminebunt.

Temperatura frigidiore & humidioris indicia.

Signa frigidae & siccae temperaturae. Cap. LIX.

Si autem frigiditas una cum cum siccitate augeatur aequaliter, natura dum ac tenue & glabrum corpus sic affecti sortiuntur, ac tangentibus frigidum pinguedo tamen ipsa, et si graciles sint, per carnes dispersa inest. Capilli autem & color, frigiditatis modum, ac proportionem sequuntur. Vbi uero calida & sicca temperatura, per decrementum

Temperatura frigidiore & siccae indicia.

crementi tempus, in frigidū & siccum labitur habetum, gracies hinc hunc, & duri, atq; atra bilis in eis dominatur: & ob id nigri simul, hinc sunt equidant. In uniuersum autem, si membrum facile frigeat, uel frigiditatis, uel raritatis est signum: si uero non facile, uel caliditatis, uel densitatis. Si a defecantibus offendantur, atq; aridum & siccum, nec facile mobile fiat, siccitatis: quemadmodum & si ab humectantibus grauitur se habeat, humiditatis. Porro pauca simul & dura caro, membrum siccitatis efficitur multa autē & mollis, humidus. Sic & intermedia spacia corporis simularum, ut plus uel minus humidie substantie in se continent, uel crassius uel tenuius, uel humidius uel siccus, mēbrum ostendunt: humidus quidem, ubi subtilior & plurima est humiditas: siccus uero, ubi crassior simul & minor. Ipse enim solidae partes, quæ uerē solidae sunt ac primæ, nullo modo effici humidiores possunt: inter ceptra autem in ipsa spacia, hac uel illa humiditate cōplere possibiles est. Hoc uero est proprium partium simularū alimenū quod ex appositione fit, & non per uasā attractū.

Signa siccitatis uentriculi. Cap. l. x.

Ventriculi indicia sunt, eius quidem qui natura siccior existit, si celeriter sibi hūdi fiant, & paucus eis porus sufficiat: a pūrimo autē aggrauentur, fluctuantibusq; infestentur, aut superfluet id quod abundat, cibisq; deficiantur siccioribus. Signa humidioris uentriculi. Cap. l. x. i.

Humidioris autem, si uerē sibi hūdi fiant, & super abundans humidū facile tolerant, & cibis humidioribus gaudeant. Signa calidi uentriculi. Cap. l. x. ii.

Calidior uel o natura uentriculus, melius quidem cōcoquit quā apparet: multo magis quæ euagunt dura, & non facile alterationem suscipiunt. Nam quæ facile alterantur, in eo corrumpuntur: gaudetq; calidus porus ac cibis, nec a frigidis ullam percipit noxam, si modicē ipsa uat. Signa uentriculi frigidi. Cap. l. x. iii.

Frigidus natura uentriculus, ad appendum quidem plurimū uiget, ad concoquendum autem, minimē: tales præterim cibos, qui & frigidi sunt, & non facile alterationem suscipiunt. Citō itaq; in ipso accescunt: ac proinde acidis ructibusq; uentriculus abundat plurimū: gaudetq; frigidus, sed ab eorum usu immo dō offenditur. Sic & ea quæ extrinsecus frigida occurrant, nequit longiori tempore tolerare: quemadmodum neq; calidus calida. Male uero temperatur, quæ morbi ratione uentriculū occupant, hoc differunt ab his quæ naturales existunt, quoniam contraria, non autem similia, appetit, quemadmodū naturales. Defin. a corde & pulmone profecta.

Cap. l. x. iiii.

Nec uero tantum uentriculus sibi hūdos, minimeq; siccitatem reddit, & frigidi calidū potus appetentiores, sed ea quæ uisera quæ in thorace sunt, ut cor atq; pulmo. Ceterū qui ob horum siccitatem caliditate, plus inspirant, & longius expirant, atq; ærē in thorace percipiunt non sicut qui uentriculi ratione in hypocondrijs caliditatem patiuntur. Præterea bibentes, non statim quiescunt, & frigidus potus magis eorum sitim restinguit. Refrigerat autem eosdem & frigidi æris inspiratio, quæ nihil illis iuuat, qui uen-

triculi ratione sunt sibi hūdi. Si qui contrario modo se habent, sensibilibiter a frigida inspiratione leduntur.

Signa pulmonis frigidi. Cap. l. x. v.

Et hoc maximū sit frigidū pulmonis indicium. Vt etenim frigidum inspirantes, manifestē dolorē sentiunt atq; frigiditatem, ita & caliditas est ipsi amica. Sed & pituitosa excrementa rumloquētes, rum tubiles rescitunt.

Signa pulmonis siccitatis. Cap. l. x. vi.

Pulmonis autē siccitatis excrementis uacant, & pituita: uocemq; claram efficiunt: quemadmodum humiditatis obscuram eam reddunt, ac rauram. Et quom uehementius aut acutius loqui suaderint, tunc intercidunt excrementa.

De uoce. Cap. l. x. vii.

Non tamen ipsa uocis magnitudo a caliditate, sicut neq; paruitas a frigiditate oritur: sed altera quidem alperæ arteriæ latitudinem sequitur, & uehementiorem efflatum: paruitas uero, a contrarijs procedit causis. Quare nec semper, nec primō, sed ex accidenti, & solas naturales temperaturas, non autem aduentitias, uocis magnitudinem aut paruitatem sequitur. Quia enim talia instrumenta temperaturatur ratione suat facia, ad hęc autem con-

sequitur huiusmodi uox: ob id nimirum contingit, ex uoce de naturalis temperie rationari.

De leni & alperæ uoce. Cap. l. x. viii.

Nam lenis uox, arteriæ lenitatem consequitur, sicuti & alperæ alperitatem. Lenitas igitur arteriæ, moderatam temperiem sequitur, ut alperitas siccitatem. Alperitas quippe fit a duri corporis inæqualitate. Arteriam uero duram, simularum partium, ex quibus constat, siccitatis efficiunt: inæqualem, dispersit in eisdem humiditatis defectus.

De uoce acuta. Cap. l. x. ix.

Eodem modo neq; acuta naturaliter uox, siue angustia faucium, nec grauis, sine latitudine fieri potest. Angustia igitur ab infusa atq; innata frigiditate nascitur: latitudo autem a caliditate. Porro cumq; facultates uirtus & ultimum, a temperie ipsa, æu a causa præcedente, exoritur.

De homine pituitoso bilem uocente.

Cap. l. x. x.

Vidi equidem hominem, cuius totus habitus pituitam præ se ferebat, quondam tamen biliosum comedebat humorem. Censui itaq; inspicienda alui excrementa esse, in quibus minimē appareret bilis. Quare coniectura quadam comprehendit, eum meatum, qui biliosum humorem egurgitat, non minimū ipsius partem ad imum orificium uentriculi, quod Græci pyloron uocant, effundere, ut in quibusdam animalibus cernitur. Plurimum itaq; ad eorum quæ latent sensu cognitiōnem conducit, ea quæ ex sectionis inspectione habet peritia, operari non uimq; argui utilitatem inuenio.

Quomodo cognoscatur ægrotantia corpora. Cap. l. x. xi.

Vbi igitur iam corpora ægrotant, ipsorum partes quæ quidem subiiciuntur sensui, sunt dignoscendæ: ex eorum quæ in sunt ex secundum naturam permutatione, in magnitudine, colore, figura, numero, situ: & ea quæ est secundum duritiem, molliem, frigiditatem, & humiditatem, differantia. Quæ autem usum effugiant, ex operationum læsionibus, aut ipsa quæ excrementum, aut dolori-

Pulmonis frigidi indicia.

Pulmonis siccitatis indicia. Vocem rauram quæ effluat.

Voci magnitudinem ex paruitate ad quæ obsequatur.

Vox lenis alperitatem quæ consequatur.

Vox acuta grauis, quæ respirantibus, uirtutemq; facultatem a temperie ipsa auerit.

Bilem ex pituitosi nonnisi a se solis uocant.

Ægrotantem partem arguere de ratione.

Solidas partes ne possit uel modo humidiores effici.

Solidiorum corporum alimentum quod fit.

Ventriculi siccitatem indicia.

Ventriculi humidioris indicia.

Ventriculi calidioris indicia.

Ventriculi frigidi indicia.

Insperies morbi, a naturalibus uirtutibus, quæ differunt.

Sitis a uisibilibus thoracis uirtutibus quomodo differunt, quomodo a illa quæ excrementum uentriculū.

bus, aut tumoribus præter naturam, aut horum quibusdam, uel omnibus.

De signis patientis cerebri. Cap. l. x x i l.

Igitur cerebri ægras dispositiones, aut ex definitione speciebuz, aut sensum, aut imaginationum lesionibus, aut actuum qui secundum electionem fiunt, aut ex ijs quæ excernuntur per palatum, uel nares, uel aures, aut ex dolorum, qui ei eueniunt, differentijs, cognoscere oportet.

Signa cordis patientis. Cap. l. x x i i l.

Quæ uerò in corde fiunt, ex difficultate anhelitus speciebus, & tremulis motibus, qui ipsi contingunt, & pulsibus quoque eius & arteriarum, & ex iræ exandescens celeritate uel tarditate, & ex febribus, & refrigerationibus, & in colore differentijs, enij, quibus conficiatur, doloribus.

Signa patientis hepatis. Cap. l. x x i i i.

Quæ in hepate fiunt, ex defectu humorum atque abundantia, & ad id, quod præter naturam est, euerfione, & colore malo. Sed & ex grauitantibus, & tumoribus, & doloribus, non modò his qui in eo ortum habent, uerum & ex illis, qui consortij lege proueniunt: ut per aliquam difficultatem respirationis, aut etiam tussis speciem.

Signa patientis uentriculi. Cap. l. x x i v.

Sic & uentriculi affectus agnoscitur, ubi in coctione, & appetitu humidum uel sicci alimentum, uel superfluitatium excretionem, delinquitur. Nec secus ex lingulibus, eruptionibus, nauasum, uomitibus, & ipsis eorum quæ uomuntur, speciebus.

Signa patientis thoracis. Cap. l. x x v.

Thoracis dignoscuntur affectus ex spirandi difficultatibus, rufibus, & doloribus qui in ipso fiunt, & ex eorum quæ cum tussis expiuntur, differentiis. Sic & asperæ arteriæ ægritudines, spirationes difficiles, & tussis, & dolor in loco, & quæ expiuntur, & uocis offensiones ostendunt. In uniuersum autem, ex tumore, dolore, operationum laxatione, & excrementorum differentiis, omnium partium affectus noscuntur. Tumores igitur præter naturam, in inflammationibus, scirrhis, atque ijs quæ uocantur œdemata, explorandi sunt. Dolor autem, quemcumque obfiderit locum, aut solutam conuulsiuit, aut subitam alterationem, indicat. Soluitur autem continuitas iucisione, exfione, fractione, & tensione. Alteratur uerò substantia à caliditate, frigidityte, humiditate, & siccitate. Tripliciter autem igitur operatio: aut quia de biliter, aut quia uisioso, aut quia nullo fit modo.

At uerò quæcumque excernuntur, nonnulla quidem sunt ueluti partes locorum patientium, non nulla uerò ceu excrementa. Etenim quæ in ipsis naturaliter continent, singula propriam facient indicationem.

Signa futuræ ægritudinis. Cap. l. x x v i.

Eorum autem indicia, quibus ægritudinis periculum imminet, mediam formam habent inter ea quæ sanis & ægrotantibus accidunt. Siquidè sanis omnia secundum naturam insunt: præter naturam uerò ægrotantibus, quatenus ægrotant. In confinio autem horum, indicia neutrorum consistunt. Quocirca dispositiones corporum, quæ circa sunt in morbum uidentur, sunt ex neutrorum genere, simulque etiam quæ ipsa indicant signa. Primò siquidem hæc sanitatem ostendunt, secundò autem ægritudinem. Ac proinde eadem signa se-

cundum habitudinem, quæ ad aliquid est, neutra & insalubria dicuntur: quæ uero præter naturam dispositionem ostendunt, neutra: quæ uerò futuram præmoustrant, insalubria. Eadem uerò ratione, & quæcumque ægrotantibus signa salutaria apparent, dicuntur quidem salubria, quia futuram sanitatem ostendunt: ægra autem, quatenus præter naturam indicant ægritudinem. Nec in ambiguo est, quòd quæ sunt utrorumque indicantia, neutra dicantur, secundum unum quoddam neutrum uocabuli significatum. Quum igitur eorum signorum quæ futuram ægritudinem indicant, duplex sit differentia, prius ea pertractemus, quæ quantitatibus, uel qualitatibus, uel temporibus, non autem proprijs speciebus, ab eo quòd secundum naturam, euariant: ueluti ciborum appetentia inuenta, uel dissoluta, uel quæ non seruat consuetum tempus, aut quæ ad edulcia uou uisitata ferunt. Ad hoc etiam genus pertinent excretiones cibus superfluitatum, quæ aut pauciores, aut plures, aut humidiores, aut duriores existunt. Sic humidiorum excrementorum uel defectus, uel præter consuetudinem abundantia, aut in colore, aut in consistencia uarietas, aut in excretionis tempore. Præterea uigilæ plures, somnijque: aut non consueti tempore obui. Eodem modo porus plures aut pauciores, calidi aut frigidi insolens appetitus, ueneriorumque immodica aut intempestiua concupiscentia. Ad hæc plures aut pauciores sudores his qui sunt opportuni, & ad motus torporis uel non uerè tæneant, tarditas, exolatio de insignis. Huc pertinet mensuræ uorum suppressio, uel immodica, aut diminuta euacuatio. Similiter de fluxu hæmorrhoidum est distinguendum. Quòd si non eadem quæ prius ex cibo potibus uoluptas capitur, est futuræ ægritudinis signum: quemadmodum heberud mensuræ sensuque minimè naturalis aut obliuio insolita, somniue turbati imaginibus. In summa uerò, quæcumque secundum naturam inerant, hæc quidè supra modum aucta, hæc uerò imminuta, hæc reperiuntur quibusdā, aut qualitatibus, aut quantitatibus immutata, futuros morbos prænu-

ciant. Porro morbus uentris, uel in ore uentriculi, uel in aliquo intestinorum, aut quum alius subducitur, aut quum uomitus excitatur, aut quum mingitur, siue alius dolor mediocris, ex genere quidem existit eorum quæ præter naturam: non tamen qui sic se habent, egrotare dicuntur: si cuti nec qui capite grauantur, aut dolent, aut uigilant: quum nondum solite ipsorum impediuntur operationes. Hic siquidem in huiusmodi operationibus terminus est. Atque idcirco in eo quod ad aliquid, eandem dispositionem ægram atque neutram dicemus. Nam pro uigote potentia, quæ uel facile sustinet, uel uincitur, uaqueque ex his quas antea diximus, uel morbus est, uel dissolutio neutra. Sic & quæcumque in sensibus, non in eo quod magis aut minus inuicem differunt, sed toto genere sunt præter naturam, siue morborum existunt, quandiu modica fuerint, ac nondum sufficiunt hominem à consuetis operibus amouere. Ea autem contingunt, ubi sensus ipsi circa sensibilia propria palam hallucinantur.

Signa corporum ægrotantium. Cap. l. x x v i i l.

At quæ iam in ægrotantibus signa uident, nonnulla

Arque indicia futuram indicant totum signorum naturam duplex.

Morbus sanis prænucciatur à natura ordinis recessit.

Cerebri morbi quomodo digni fuerint.

Cordis morbi unde noscuntur.

Hepatis affectus unde sint cognoscendi.

Ventriculi affectus quo pacto deprehendendi.

Thoracis affectus quo pacto deprehendendi.

Dolor quid indicet.

Solui uisitas quomodo possit.

Operatio tripliciter videtur.

Excrementis differentiis.

Morbum sanis signa indicantia ex naturæ genere consistunt.

Signa salubria.
Signa pernicio-
sa.

Excrementa
quod indicent.

Decorritiva acci-
dentia.

Salubrium cau-
satum differe-
tia duplici.

Conseruatrices
causa quod sint.

Corpus necessa-
rio alterantia
quod sint, et quot
numero.

Ab corpore affe-
ctus.

Morbi
Quatuor.

Somnus.

nulla quidem salutem, nonnulla mortem porten-
dunt. Ac prima sane salubria: secunda uero, gene-
re quidem ægra, secundum speciem autem, pern-
iciofa dicuntur. Sumuntur autem, ut dicamus uni-
uersaliter, ex operationum uirtute ac uitijs: secun-
dum partem uero, ex particularium operationi-
bus: quarum genera prius diximus. Porro excre-
menta, quando quidem coctionis & cruditatis
signa continent, fieri non potest quin omnino si-
gnificent, aut naturam materiei, aut materiam
naturæ, aut neutrum alteri dominari. Salubria
igitur signa dicuntur, superante natura: insalu-
bria uero, deuicta. Neutra autem, quæ pugnas ha-
bent æquales. Cæterum quæ manifestam coctio-
nem indicant, ex salubribus sunt: sicuti quæ cru-
ditatem, ægra. Quæ uero neque coctionem nec cru-
ditatem, ex uentorum natura existunt. Sunt ue-
rò & neutra, quæcumque nunc quidem hoc, nunc
uero contrarium significant: ueluti denigrati di-
git. Ac talia sane sunt decorritiva accidentia.

De causis salubribus, insalubribus, atque
neutris. Cap. lxxix.

Quoniam uero causas hæc quidem salubres,
hæc autem insalubres, hæc denique neutra: primum
de salubribus differemus. Cæterum quando quide-
m nonnullæ earum conseruatrices, nonnullæ
effectrices existunt: tantumque tempore & dignita-
te priores conseruatrices, ab illis nobis est auspi-
candum. Quum igitur non unum tantum sit sa-
luum corpus, sed plura, in eorum singulis propria
erit causa conseruatix. Si quidem omnis causa,
in eo quod ad aliquid, est. Hic igitur denud sum-
endum initium ab optima corporis constitu-
tione: & quæ illi salubria sint, considerandum.
Eorâ autem inuentionem ipsius rei natura indicat.

Quot modis alteretur corpus.

Cap. lxxx.

Secundum quot igitur corpus nostrum altera-
tur modis, tot causarum conseruatricum gene-
ra habebit: quas liquet etiam correctrices existe-
re. Alteratur autem corpus, à nonnullis quidem
necessariis, à quibusdam uero non necessariis. Ne-
cessarii enim alterant, quæ nulla ratione euitari
possunt: non necessariis autem reliqua. Nam aë-
rem quidem ambientem semper attingere, com-
edere, bibere, uigilare, & dormire, est necessè: en-
sus autem, & exitialibus feris occurrere, non li-
tem. Quare iuxta primum causarum genus uer-
satur pars corporis conseruatix, circa secundam
autem minime. Quot igitur sine ea quæ ex neces-
sitate corpus alteratur, distinguentes, proprium
in singulis eorum causarum salubrium genus in-
ueniemus. Investigatur unum ex ambientis aëris
admixtu. Alterum, ex motu & quiete totius corpo-
ris, & singularum particularium. Tertium, ex som-
no & uigilia. Quartum, ex his quæ assumuntur.
Quintum, ex his quæ excernuntur & retinentur.
Sextum, ex animi affectibus. Ex his itaque necesse
est aliquo modo affici corpus. Ab aëre quidem
ambiente, quia uel calit, uel frigefit, uel exiccat, uel
humectatur, uel secundum horum panit cor-
iugationem, aut in tota alteratur substantia. Ex
motu uero & quiete, quum utraque modum ex-
cesserint, aut calidum, aut frigidum, aut hu-
mectum, aut exiccant, uel aliquid secundum ho-
rum patiens coniugationem. Sic & ex somno &

uigilia ipsum pari est necesse, iuxta eandem ra-
tionem. Præterea & ex animi affectibus, & ex his
quæ assumuntur, aut excernuntur, aut retinentur.
Hæc si quidem omnia, partim quidem euidenter,
partim uero per alias causas medias, alterant cor-
pus, & sanitatē corrumpunt. Omnia igitur nunc
dicta genera materiei quædam sunt salubria cau-
sæ. At usu opportuno adhibito, causæ sunt
conseruatrices, atque salubres: si uero à modo ab-
traherint, redduntur insalubres. Quocirca singu-
larè earum rerum, quandoque salubres, quandoque
insalubres sunt, quum ad aliquid referant. Quis-
pe ubi motum corpus desiderat, exercitatio quide-
m salubris, otium uero insalubre existit. Quum
uero eger quiete, otium salubre est, in salubris au-
tem exercitatio. Eodem modo de cibis & potu-
bus, ac de alijs omnibus statuendū. Horum nan-
que singula, quando ut necessitas corporis exi-
git, cum mensura, & opportuna qualitate adhi-
bentur, salubria sunt. At quum circa omnem ne-
cessitatem, ac præter modum afferuntur, in salu-
bria. Atque hæc duæ sunt circa salubre & insalu-
bre intensiones: scilicet, quæ adhibetur, quali-
tas, & quantitas. Non est autem rationi con-
sonum, enim temporis occasionem, quæ in his
dicta sunt, continetur, uel non tertium aliquod ab
eisdem diuersum, introducere. Nam si tanta & ta-
li sit allata eger corpus, nemini dubium est quin
etiam in tempore opportuno afferatur. Si quidem
inde temporis occasio est nata, quod fluxile &
transmutabile mortale corpus quum sit, pro mo-
do transmutationis, alia alio tempore auxilia po-
stulet. Optima igitur corporis constitutioni, quæ
circumsusus aër optimè temperatus fuerit, om-
nium earum rerum, de quibus nuper sermonem
fecimus, quantitas moderata conuenit. Quum
uero aër à temperie recesserit, tantum illas à me-
dioritate euariare oportet, quantum fuerit aëris
ab optima temperatura recessus. Hi uero medio-
ritatis termini existunt: in aëre quidem ambien-
te, ut neque horreat propter frigus, nec sudet pro-
pter æstum. In exercitijs autem, quum primum
lassari cuperit corpus, confestim quiescat. At in
cibis, coctionis perfectio, & excrementorum mo-
dus, in quanto & equali cōueniens. Aequalis uero
in his quodsi modo est coctioni appetitus. Opti-
ma quippe natura, quantum appetit, tantum etiam cō-
quir. Sic & somno modum ipsa natura præstari
his, qui optimam corporis constitutionem for-
tiantur: nam si tunc à somno excitantur, quum
corpus ampliori quieui non eger. Quumque talem
uictus rationem adhibuerint, nullum est in eorū
excrementis delictum, quæ uel per uentrem, uel
urine meatum, uel per totum corpus vacuantur.
Liquet igitur ipsos cauere debere ab immo-
dici animi affectibus, ab iracundia uidelicet, tristitia,
furore, timore, & inuidia. Hæc si quidem alterant,
atque à naturali statu corpus immutant.

De ueneris. Cap. lxxxi.

Venerorum uero iuxta Epicuri sententiam,
nullus est usus salubris. Ne uera autem confert,
si tantum interualli in eorum usu adhibeatur, ut
nec resolutio aliqua percipiatur, & ipse seipso ho-
mo quodammodo leuior factus, ac melius spirare
uideatur. Tempus autem ad uiuendum oppor-
tunum, quum in omnium rerum circumstantiis

Vigilia.
Animi affectus.

Salubrium cau-
satum materiei
quod sint.

Intensiones circa
salubre insalu-
bre, sunt quali-
tas extenden-
dum & quan-
titas.

Medioritatis
terminus in aë-
re quibus uti cer-
pi debet.

Natura optima
quantum appeti-
tu, tantum con-
quir.

Veneris quare-
non sit salubre.

Veneris usus
apertum quod sit.

exquisita mediocritate corpus fuerit constitutum, ubi scilicet nec supra modum plenum, nec uacuum extiterit: aut in calore, aut frigore, aut siccitate, aut humiditate excesserit. Quod si aberrare contigerit, parvus sit error. Melius autem illi calefacto magis quam frigefacto, & pleno quam uacuo, & humecto potius corpore, quam excicato, uti ueneris. Horum autem singulorum quæ dicta sunt qualitas, in ⁴ optima corporis constitutione est eligenda: exercitij quidem, in quo totius corporis partes æqua proportionem mouentur, ita ut non aliæ quidem ultra modum fatigantur, aliz uero citra. Cibi autem & potus optimam habeant temperiem. Eadem in reliquis etis est ratio habenda. At si ab optima constitutione aliquid defecerit corpus, non autem uehementer, & hæc quæ ipsius sanitatem conseruant causæ, ad proportionem mutabuntur. Sed quum multa sint huiusmodi corpora, per singula genera est scotum dicendum. Quod igitur in partium similitudine temperie euarij, instrumentarium autem partium seruat cõmensurationem, duplicem habet salubrium causarum formam: alteram quidẽ earum quæ ipsius conseruant temperiem, alteram uero earum quæ ad optimam transferuntur. Quæ itaq; ipsius temperaturam conseruant, tantum à causis optimæ temperatæ naturæ distabunt, quantum & totius corporis temperatura ab illa euariabit. Calidiora siquidem corpora, calidiorẽ uictus rationem postulant, frigidiora autem frigidiorem, sicciora sicciorẽ, & humidiora humidiorẽ. At secundum coniugationem, calidiora & sicciora, calidiorẽ simul atque sicciorẽ: eadem in reliquis quoque coniugationibus proportionẽ seruata. Recte siquidem causarum utitur materia, qui naturales earum potentias agnouit: uidelicet quod motus, alimenti penuria, uigilie, excretio, & omnes animi affectus, corpus excicant: atque hæc contraria existunt, humescant. Ita uero & calfacientia, & refrigerantia uiræ instituta, & ciborum, ac potuum, utij simpliciter dicam, omnium quæ corpori asseruntur, materias quas nocens atque potentias, salubribus utitur causis, similia similibus adhibendo, si quidem eandem in qua acceperit, seruare corporis temperiem sit animus. Quod si permutare, atque ad melius eam traducere studeat, alterum est hic salubrium causarum genus, his quidem quas nuper diximus, contrarium: æqualiter uero declinans ad alteri partem à bene tẽperatis & medijs, quæ optimis naturis cõueniunt. Calidior siquidẽ & siccior temperatura, à calidioris ac siccioris uictus ratione, ad exactissimum bonæ temperatæ habitum non transferuntur. At talium erit usus necessarius, quæ tantum eis quæ probè temperata existunt, frigidiora atq; humidiora sint, quantum & uatura naturam, in caliditate & siccitate superabat. Nam tale causarum genus iustis corrigij intemperantias: alterum uero de quo supradiximus, temperaturam conseruat. Est autem utriusque uicissim apud medicos usus necessarius. Nam quum plurimum suppetit oculi, corrigere oportet, ac sensum ad meliora transferre. Neque enim natura patitur repentinas alterationes. Hominem autem occupationibus necessarijs districtum, in eodem præstat habitu conseruare. Por-

ro quæ similem habent in omnibus corporis partibus intemperiem, eadem egent procuratione: dissimili, quæ dissimilem.

De causis salubribus partium instrumentarium. Cap. LXXXIII.

Instrumentarium autem partium causæ salubres, quatenus & hæc ab optima constitutione de linquunt, ita & inuicẽ distabunt. Aliæ namque sunt salubres erroribus qui in formatione consistunt: aliæ ipsæ qui in magnitudine, uel numero, uel positu. In formatione igitur plures contingunt errores: nam & figura partis, & si qua in ea cauitas est secundum naturam, uel meatus, uel orificium, uel asperitas, uel lenitas, si quidem parum à naturali symmetria recesserint, salubrium corporum retinent appellationem: si uero amplius, insalubriũ. Quod si tantus fuerit recessus, ut operationi asserat detrimentum, iam egrotare dicentur. Secundum quantitatem autem, excessus atque defectus ad eandem ducit differentias. In numero uero, siue una, siue plures, quæcunque ex similibus partibus fuerint, aut deficiat, aut superabundent. Ex hoc genere etiam sunt, quæcunque in nobis substantia præter naturam consistunt. Reliquum est aliud genus, quod ad firmum cuiuslibet simplicis attrinet partis, in quo & ipso quatuor sunt omnes differentia. Prima quidem, quæ optima existit. Secunda, quæ parum euarij, ob idij salubre adhuc efficit corpus. Tertia, quæ in salubre, quando amplius à modo recesserit. Quarta, quæ iam ægrum recessu plurimo reddit. Quæcunque igitur partes in figura delinquant, ueluti quæ blasæ, uaræ, & oblique appellantur, hæc, quum fortis nuper natus atque tenellus est, formatione & ligatura, ad naturalem habitum traducuntur. At si iam aucto infante, ad duritiem peruenerint, emendari non possunt. Sic errores quidem qui ad cauitatem attinent, quum adhuc augeri perseuerat, correctionem admittunt. Quum autem iam ad ultimum peruenerint, nullus est remedio locus. Cauitates igitur quiete atq; alligatione parue redduntur: magnæ uero, partium operatione, & retentione spiritus. Sic & quæcunque foramina, orarij. Et quidẽ quæ naturalem magnitudinẽ partes exuperant, quiete, ac cõmoda ligatione, miuores reddunt: augentur autem & naturali motu, & frictione moderata, & quibuscũq; alijs plus sanguinis cõciliare ualentibus. Deficientes autem partes, quæcunque ex sanguine duxerit originem, corrigi quidem non est impossibile. Quæ uero ex femine, prope modum impossibile existit. Licet tamẽ aliquando loco earum alia facerẽ, quæ usum haud dissimilem præstent. Earum uero omnij uatura simplex est, medicus autem ministrat. Porro quæ numero excedunt, his ablatis, causa salubris existit. Inspicere uero oportet, in quibus id fieri possit. Nam si impossibile appareat, transponere tenendum est. Eadem est & eorum, quæ in situ iniusta sunt, emendatio. Nec uero in ambiguo est, quod duo sepius aut tria uitia, eandẽ possunt partẽ cõprehendere. Reliquum est id morbi genus, q̃ similibus, & instrumentalius partibus existit cõmune, unitarijs diuortium.

De causis salubribus ceu ad eos, qui morbo tenentur. Cap. LXXXIII.

Salubrium causarum, aliæ quidem occurrunt

* in

Optimæ constitutæ à natura omnia requiritur mediocritas.

Existantia corporis quæ sunt.

Similia similibus, esse adhibenda, dum seruare corporis temperiem sit animus.

Intemperantia quando ad uicissimam traducenda, & quando de se conseruanda.

Errores in formatione, quos pluciter corrigi re possunt.

Partes ex sanguine creatas potest corrigi, si dissoluantur: ex femine autem uitas, re insalubres, esse fieri impossibiles. Naturæ esse officium generare non particulari modo naturæ inueniuntur.

* interperiei iam gentis: alix illi quæ in generatione consuevit illa, quæ futura est. Igitur harum quæ sunt postremæ, hæc quidem in præsertua artis parte continentur, hæc uero in salubri. Primæ autē illi inter omnes, in curatiua tantummodo: at illæ quæ inter utraq; collocauimus, in præsertua simul & curatiua. Si quidem factam iam ægritudinem curare oportet: eam uero quæ nondum adest, sed futura est, prohibere ne fiat, ab ea quæ est in corpore dispositione. Eius autem quæ adhuc sit, quod quidem factū est, curare expedit: quod uero futurum, prohibere ne fiat. Prohibebitur autem, sublata ea dispositione * quam sequi morbus natura est aptus. Talis etenim dispositio, causa antecedens dicitur. At facta iam ægritudo curabitur, soluta ea dispositione, à qua primū læditur naturalis functio. Quæ sanè ipsam dispositionem, morbi causam uocamus.

De communissima infatione curatiua. Cap. LXXXIII.

Curatiua
scopus.

Curatio uero utrum præcipuum cōmuni-
mum habet scopum, nempe tollendæ disposi-
tioni contrarium. Ex hoc siquidem genere sunt cau-
sæ illæ omnes, quæ sanare efficiunt: particula-
rit uero, ex unicuique dispositioni contrariis. Cal-
ido igitur affectui, causa frigida contraria exis-
tit, frigido autem calida: eademq; in cæteris pro-
portione. Etenim si omne immoderatum præter
naturam est, moderatum uero secundum natu-
ram: necesse est omnino, ut immoderatum ab im-
moderato cōtrario, ad mediocritatem trahatur.
Cæterum secundum potentiam, non secundum
imaginationem, calidatens refrigeransq; & alia
id genus, sunt accipienda. Fingamus itaq; in hu-
moribus putrescentibus febrem accendi. Indica-
tio in huiusmodi affectu, est euacuatio simul &
alteratio: hæc quidem, quæ putredinem finiat, ma-
nente adhuc substantia: euacuatio uero, quæ ro-
tam ex corpore substantiam putrem educat. Sed
dicta quidem alterationis species, concoctio exis-
tit. Euacuationes autem sunt, & per sangui-
nis emissionem, & clysteris usum, & per urinae
vias, atq; eam quæ per cutim fit transpirationem:
ac præterea per eam quæ fit ad partes oppositas
attractionē, atq; ad alias propinquas deriuationem.
Nam & ad hoc ipsam genus pertinet citare
menstrua, hæmorrhoidesq; aperire, ac deniq; ex-
purgare per palatum & nares. In uniuersum autem,
si unamquamq; prius effectricem causam re-
siderimus, deinde uero ad illam quæ ab eadem cau-
sa facta est, ægritudinem accesserimus, causam
salubri inuentionē habebimus. At secundum
compositas intemperies, ex simplicibus compo-
sitis cōmonstrabit salubria præcepta. Etenim si
decem quidem gradibus ad caliditatem maiorem
ea quæ naturæ contrariet, labatur corpus, septem
uero ad siccitatem maiorem, tunc salubrem cau-
sam in huiusmodi affectibus esse oportebit, de-
cem quidem gradibus frigidiorē, septem uero
humidiorē. Quod si particula affecta in pen-
tioribus locis sit hoc, machinari oportet insuper
tale remedium salubre, cuius uis nequaquā ite-
re antea exsoluatur. Si itaq; calidius esse oportu-
erit eo quod est moderatū, non solum tantam
habeat caliditatem, quam antea exiguit morbus, sed
ultra eandē mensurā tantum addiciatur, quantum

ex situ, ut pertingere possit ad locum patientem,
sit necessarium. Si uero frigidus, nō simpliciter tan-
tum frigiditatem oportet augere, sed & materia
quosq; prius animaduertenda est. Si enim crassa sit,
non admodū poterit penetrare ad profunda: sed
potius contrariū præstabit effectum, ipsando su-
perficem, atq; densando. At si tenuioribus parti-
bus couler, poterit sanè plurimum subire profun-
dum. Idem ita humectantibus atq; exsiccantibus
accidit, in quibus crassum & subtilitas partiū
substantiæ inspicunda uenit. A situ itaq; loci, itue
nit indicatio salubre remediū. A formatione autē
& situ simul, quando effluxus sensibiles, atq; ad a-
lium locū foraminibus parietes habuerint, aut his
omnino caruerint. Quos enim effluxus ad prin-
cipales effert partes cognouerimus, auertemus,
atq; ad illas impellemus, quæ minime principatū
obtinent. Porro causarum quæ intemperatam
efficiunt, curatio fit per euacuationem. Nam ipsæ
intemperatæ, sola alteratione sanantur.

Curatio solutionis continui in parte
carnosa. Cap. LXXXV.

Cōtinuitatis aut solutionis curatio, intentio-
nem quidē habet unionē, quæ in partibus quidē
instrumentariis impossibilis est, in fibrillaribus ue-
rō non semper possibilis. Quandoq; uero, sicuti
in carnosiss, sanitas cōglutinatione perficitur. Ip-
sam uero antecedit, si uulnus maius extiterit, parti-
cipat applicatio distantium, quæ ex formationis ge-
nere existit. Vi autē hæc ipsa firma & stabilis fiat,
al ligatio cogens in unum, & fibrulæ & futurae uti-
les sunt. Coalescere autem facit ea quæ distant in-
uicem, ac pristinam restituit unionem, ipsa natu-
ra. Nostrum uero opus est, primū quidem appli-
care extrema distantia partium: secundū autem,
quæ in unum coacta sunt, sic cōseruare. At tertio,
cauere ne quid labris intercidat ulceris. Quartū
deniq; ipsam partis substantiam cōseruare salu-
brem, id quod per mediocriter exiccatia fieri. Hæc
igitur est solute cōtinuitatis curatio, quam ipsa
sola seorsum in carnosa parte constitit.

De solutione cōtinuitatis in ossē.

Cap. LXXXVI.

At fractio est in ossē cōtinuitatis diuorsū: quod
quidem quantum ad intentionē primū, insaniabi-
le est: quō uero ad secundam, quod modum recipit
curationē. Prima igit intentio est coaltus partiū,
qui ob ossis duritiē fieri non potest. Secunda, ali-
gatio, quæ fit callo supernato partes fractas cir-
cumligante. Calli autē generatio, quā quidē ex ma-
teria & à natura fit, est & ad alia cōmunis. Qua-
tenus uero formā ossi uicini habet, ex eiusdem fit
alimento. Molle uero & puerile os coalescet & po-
test, sed perraro fit talis affectus, quin alio cietur al-
teri. Magna enim ex parte adiacetes musculi, uni-
cum corporibus alijs, per fracturam ossiū patien-
tur. Quocirca & curatiōnis intentio orit duplex,
quarū altera quidem circa ossa, altera uero circa
corpora adiacentia uersatur. Quam igitur fractura
relinquitur, callo adueniente fiat, ad huius autē ge-
nerationem, proprijs ossis alimentis superfluantem
naturæ suggerere oporteat, quæ quidē superflui-
tas in qualitate & quantitate debet modum feru-
re, talis certē uictus ratio adhibenda est, quæ ita
xurū quibus sanguinē tantum ac ralem præparat,
qualis & quibus generis callo fit opportunus.

Auertendū ef-
fectum est à par-
tibus principa-
libus ad igni-
biles.

Via in parti-
bus instrumen-
tariis solutio est
impossibilis.

Vicinit carni
soluit, quæ pra-
cedant.

Vicinitatem præ-
stare naturæ.

Soluta parte
substantia con-
seruare mediocri-
tatem existan-
tia.

Fractura quod
pertinet ad in-
tentionem primam,
est incurabilis.

Calli generatio

Ossa puerilia
coalescere possunt.

Fractio offici-
um ossis man-
festat.

Fractura sani-
tas fit callo ad-
ueniente.

Fractura quæ a-
lii uictus ratione
conueniunt.

Immoderatum
omne est præter
naturam.

Pueri puerile
indicat da-
mna.

Alteratio parti-
um humorum
cuius est.
Euacuationem
speciem.

Affectus in alio
fuit, reuoluen-
torem medica-
menti vim re-
quiere, quæ ex
sua ipsi natura
potens.

De punctura nervi & tendonis.

Cap. LXXXVII.

Punctura nervi, cur ad extirpandam clivisionem sit prompta.

Nervi uero & tendonis punctura, propter sensum uehementiam, & quoniam hæc pars principio cōtinuatur, prompta est ad excidendā cōnuisionem nervorum: ac tum præsertim, quum nil extrorsum expirat, obcecato cutis uulnere. Aperiendum est igitur, atq; excidendū substantia tenui, quæ usq; ad ima nervi oblaxi possit descendere. In simplicibus igitur huiusmodi affectibus, salubrium causarum forma talis existit. In compositis uero complicatur ulceribus, prima quidem cautio necesse non differentia ulceris, sed est aliteris aggritudinis genus, in quo facta est substantia tactura. Curatio autem in morbo duplici, duplicem exigit intentionē. Nam continuatus solutio, unitate: substantiæ autem iactura, generatione indiget. Quod autem primū quidem hunc affectum oporteat sanare, ac dein unitatem restituere tentare, ipsa natura rerum nos docet. Vbi uero repletum uiscus iam fuerit, ad æqualitatemq; perductum, cure inducendum est: id quod si fieri non possit, saltem carne quæ cuti uicina sit, communendum. Est autem huiusmodi, quæ & sicca, & calli similitudinem præ se fert. Ad cicatricem igitur inducendam, necessaria excicantia erunt, ac sine mordacitate asfringentia medicamēta. Sic et si forditas aliqua fuerit adnata, intentio abstergeri erit. Præterea si inflammatio aliqua uel atrinio, uel scirrhus, uel tumor mollis & laxus, uel interperies unā cum ulcere admissi, prius quidem eorum curationi insistentum est, ac dein ipsum ulcus curandum.

Cautio curatio nervi.

Cicatrix inducenda, sicula desiderari.

Vitrioli ad sit tumor, hoc prius curandus est, quum sciccuratum sit.

Veneris membris curatio.

Obstructionis curatio.

Lapide in vesica curatio.

Peristri excruciantia educta in vesica ad medicamentum sensu abusu.

De speciebus morborum qui iuxta formam non contingunt. CLXXXVIII.

Quod uero ad figuræ permutationem pertinet, in iis sanè qui adliuc crescunt, possibile est plurimarum partium per uersionem corrigere: in eis autē qui iam sunt aucti, minimè. * Scopus igitur in iis quæ curationē recipiunt, est, in contrariū per uersionis adducere. Si uero fractione aliqua non rectè conformata, alicuius membri figura uitiata fuerit, cui substantia callosa in nasci peruenit, si quidem hæc adliuc recens extiterit, perfringere os compactū oportet, ac rursus rectè affirmare, deinde callum superinducere.

De obstructione. Cap. LXXXIX.

Est uero & obstructio ex eodem morborum genere, sitq; ex crasis & lentis humoribus, animum & ipsa scopum habens morbum contrarium, uidelicet apertione. Cause autem salubres sunt, abstergentia & incidentia medicamenta. Quæ uero sit ab stercore duro, interspecifico intestini, obstructio, primū quidem habebit duritie remedium, ex humidis pinguibusq; clysteribus: postea demum ab acerbis euacuatione exposcet. Quæ autem a lapide sit in uesica, subito quidem illius transpositionem requirit: integre uero sanantur gratia, incisionem & extractionem. At humiditatis quæ præter naturam continetur sanatio, in * exacta totius euacuatione consistit: quæ admodum etiam in suppuratis. Immodica autem repletio, immodica euacuatione curatur. Quæcunq; igitur in pulmone uel pectore cōtinentur, * educuntur quidem per tuium, sed a medicamentis extenuantibus. Quæcunq; uero in hepate,

uel uenis, uel arteriis, uel renibus: aut per urinā, aut per * inferiorem uentrem. Sed per urinā quidem, ab iis quæ uehementer extenuant: per uentrem uero, ab eis quæ attrahendi aut aperirendi orauim habent. Quæcunq; in superiori uentre comprehenduntur, per uomitum: sicuti quæ in inferiori, per subductionē. At quæcunq; sub cute, per sectionē, uel ignem, uel adurentia medicamenta. Sic aliquid etiam, quæcunq; in aliqua naturali cauitate, ut in thorace. Vt autem summam dicam, quicquid præter naturam in aliquibus partibus continetur, eius sanationis intentio, est ablatio: uel si fieri hæc non possit, transpositio. Quæ uero non sunt ex genere præter naturam, at quoniam nate dmanantur, in his scopus detractio existit. At inuentio eorum, quæ ad ipsorum sanationem perducunt, partim quidem ex affectu, plurimum uero ex ipsi affectus particulis sumitur.

De asperitate & leuitate. Cap. XC.

Quæcunq; uero partes, quod exasperate sint, naturalem amiserint habitum, iis leuitas naturalis restituenda est: ossa quidem lenigando, asperam uero arteriam uel linguam leniendo, humidis quæ nihil mordent, atq; leniores habeant. At quibusq; leuitas inest non naturalis, cognata asperitas reuocanda est medicamentis quæ sufficienter abstergeant, asfringantq; parum. Quæcunq; uero uel obstructiones, uel angustie meatuum, alios morbos sequitur, eorū curatio prius est perficienda. Quod si nonnulla ex proximè dictis unicum complicitur, uarias habebunt indicationes. Si igitur in particulam aliquam tanta sanguinis copia confluxerit, ut uierse ipsius uenæ intumescant, & distendantur, nonnulli in spacia uacua & intermedia transfundant, iulus quidem affectus sanatio scopum habebit euacuatione: aut, ut aperiuri uerum uocabulo, detractiōem: quandoquidem morbus est immodica partis repletio. Itaq; necessarium est ut superfluas euacuetur, aut retrocedant, aut per ipsam patientem particulam. Retrocedet autem, uel impulsu, uel attracta, uel transmissa, uel uno aliquo horum modorum, uel omnibus. Per locum uero patientem uacuabitur, partim quidem manifestè, sensibilibiterq; partim uero resoluta in uapores. Si igitur uniuersum corpus plus æquo plenum fuerit, per patientem locum minimè euacuare expedit. Nam si scarificationibus, aut sectionibus, sensibilibiter aliquid euacuemus, plus ratione excirari doloris attrahemus in partem. Si uero calfacientibus conemur discutere, maior copia coloris ui ad partem trahetur, quàm dispergetur. Quod si hæc in re laboremus, ut retrocedat id quod in fluxit, corpus quam plenu sit, non admittet. Vt igitur fieri hæc ambo possint, in primis euacuare uniuersum corpus oportet, dein autem id quod in partem inluit, ad contraria loca retrahere. Quod quidem ubi fecerimus, prius repellemus a parte, quum aggrediamur discutere. At quò mitiora præstita fuerint, eo erit longè aptior uacuatio. A patiente uero loco repellemus, astringendo, atque refrigerando. Quin etiam loca inanata attrahunt ad seipsa quæcunq; reperciuntur. Vasa præterea, ui medicaminum asfringentium corroborata, a se ad alia remittunt. Si igitur superfluum omne hac uia retrociserit, bene

Diurnica quæ hæc esse debet.

Castorei in quibus uis medicamentis.

Aspera quibus sunt leniganda.

Lenia quibus exasperantur.

Vacuatiōem per partem locum non efficiendi, uacuo corpore pleno existente.

Inflammatiōem per partem locum non efficiendi, uacuo corpore pleno existente.

Reperciuntur fieri per attritionem ex ipsa sententia.

ferta

setes habet. Si uero aliquid fuerit retentum in parte, id lentum & crassum esse, ob idque agere solubile, consistere oportet. Potest etiam, uel si influens humor non sit eiusmodi, effusus tamen esse ad intermedia spatia: quo tempore euacuanda est per ipsum locum affectum: imponentibus nobis particula superiacentibus ea, quae repellent humorem uim habeant. Maxime uero euacuanda quod in spatia ista delitescit, & scarificationum auxilio, & medicamina quae discutient uim habeant. At quia discutientia omnia uires calidas habent, effectus autem huius temperatus est mordere, ubi caliditatis modum exceperit: cauenda ex eis sunt uehementissime calida, ac tum praesertim, quum parientia loca in superficie obstruerit. Neque enim parius excitabitur dolor, si praeter proprium affectum, insuper mordetur. Taceo etiam dolorem omnem irritare fluxiones. Quod igitur mediocrem caliditatem obtrinet, in hunc dolorem sedare, ac multo magis si humidum fuerit. Et quidem quicquid per summam haeret, potens est id medicamen digerere, * etiam si ualidas non fortitur ad discutendum uires. Quod si summam quidem partes omni noxa caruerint, id uero quod euacuari oportet in penitioribus partibus haereat, intendenda atque augenda discutientia medicamentum est calor: quum dubitandum sit, ne prius quam profundas partes attingat, interius uires amittat. Nec tamen ex eo superiores partes aliquem dolorem sentiant, quum omnes uacent affectu. Quare duo haec simul inuicem ad calidiorum pariter atque acutum medicamentum usum, & summam partes quae tolerant, & profundae quae egent. Hanc igitur indicationem a situ partis desumebamus. Porro affectuum partium, in quibus retinetur superflua fluxio, nonnulli quidem rari, laxi, & molles natura existunt: nonnulli autem densae, pressae, ac durae. Priores igitur euacuantur facilius, reliquae autem medicamentis ac uia uacuandibus, ac praeterea tenuiores partibus habentibus, egent atque magis, quod profundiores sunt habuerint. Haec igitur tibi rursus sit indicatio, una quidem a particulae patientia substantia, altera uero a formatione & situ. Finiamus enim in hepate esse proximè dictum affectum, in angustia uasorum sinibus, impactis humoribus, qui uel lentis & tenaces uel craui existant, uel superabundant nonne in promptu est, primam quidem crassitatem unam cum lentore & tenacitate, citra ac portibus extenuantibus, ad subtiliorum partium substantiam transferri oportere? Secundò autem, non per angustiam autem inuisibilibus meatibus, sed per latiores etiam, quicquid inibi infestum est, euacuandum esse? Sunt enim in hepate uenae, non minus amplitudine quam numero, insignes. Terminantur autem, haec quidem in gibbis, ad uenam caui hae uero in cauis, ad portam. Unde haud difficile tibi futurum est, ubi uicem praesi constitutis humoribus fuerint, eosdem expedire euacuare: trahendo quidem ad uentrem, cum hia quae arrahendi uim habent medicamentibus, quicquid ex ipsa, in uenis ad caua hepatis pertinentibus acceruat sunt: ad uirum uero meatibus promouendo, per caua uenarum, quicquid in uenis ad eam pertinentibus haerent. Est & alia indicatio ab hepate sumpta, ueluti a uenarum principio. Nam quum non tantum se-

Discutientium quae uehementissime calida sunt, in quibus sit usus cauetur.

Discutientium calorem intradendum effluuiis humorum uacuandis partibus haerentibus.

Partes quae non uacuantur facilius, quae uero uacuandae sunt.

Hepatis obstruere curatio.

Hepatis caua & gibba, quae partes uacuandae sunt.

Hepatis uenarum principium.

ipsum regere natura sit aptum, sed largiatur etiam uirtutem ueniuerendū est, ne si eius uigor fomentia & cataplasmatia relaxantibus exoluta fuerit, & ipsum primum ad proprium opus, & omnia subinde uenae, ratione illius, imbecilles reddantur. Quare in curantibus, eius aliqua ex astringentibus medicamentis semper miscere oportet. Sed quoniam in profundo admodum loco situm est, dubitandum erit, ne adstringentis medicamentis uia debilitetur, nisi ab aliqua altera subtili partium substantia, qualis aromatis est, trahatur. Melius uero fuerit, si & ipsum medicamen astringens, etiam aromaticum fuerit. Nam si duae habuerit natura infusas qualitates ac potestates, ualentius operabitur, ita ut euacuet quod praeter naturam in ipsum membrum confluxit, feruet autem humorum modum continentem naturam. Explorandum itaque est, num quid ab humoris confluentia qualitate, temperies eiusdem membri sit alterata: ut hanc ipsam curantes intemperiem, sanitatem parti restituamus. Curabimus autem, contrariam ex aduerso afferentes qualitates: quantum unumquodque calidius aut frigidius reddidit est, tantum refrigerantes, aut calfacientes. Quare & hic rursus agnoscenda est ipsa secundum naturam temperies.

De morbo secundum numerum.

Cap. xci.

Quibus autem aliqua particula deficit, in ista quidem scopos est efficere alteram, subministrando naturam, eo quo diximus modo. Quibus autem redundat, hanc rescicare oportet aut scalpello, aut igne, aut caustico medicamine. Haec igitur omnia sanare * ferme possibile est: at generari non omnia possunt. Quaedam uero sunt, quae effici generari nequeant, pro istis tamen licet alteram substitueret: quemadmodum ossis ex toto sublato, carnosum quendam callum inducimus, qui processu temporis duriore naturam contrahit, quibz ab initio carnis imitaretur substantiam. Vbi uero parte quacumque sublata, neq. eandem secundum speciem substantiam, neq. similem efficere possumus, teruius nobis scopos est, inuenire decorem quemdam quemadmodum in mutationibus.

De morbo secundum magnitudinem.

Cap. xcii.

Communicat autem hoc genus totum cum eo quod ad magnitudinem pertinet. Nam quodcumque ex eo est secundum naturam, illi propinquum existit. Id uero tantum seculum est, quod inter minime naturalia connumeratur. In quo quidem prima intentio est ablatio. Secunda uero, si illa sit impossibilia, transpositio: quemadmodum in suspensionibus. Quaecumque autem non integra partibus, sed earum tantum particulis, aut deficiunt, aut excedunt naturae modum, rescilio quidem, uel generatio, in ista quae deficiunt: ablatio uero & ablatio, in hia quae superabundant, scopus est. Quare neq. in istis altera intentio, neq. medicamentum forma est diuersa.

De morbo secundum situm. Cap. xciii.

Sed iam ueniendum est ad reliquum salubrem causarum genus, quod ea corpora emendat, quae in situ sunt uinaria: ueluti luxationes, & in seroto inrestitutum. Quae sunt uicia contingunt, partim ex uolentia tensione atque impulsu, partim

Hepaticus medicamentis aliquando astringentibus adueniens est. Quia aromatisa uim abducunt.

Intemperies effluuii per contrariam naturam.

Redundantes partes rescicari tripliciter possunt.

Mutilis membrum arte conuolandum esse dicimus.

Luxationum causa & curatio.

*Theſſalus ex
ſturbat duos
tantum ſimpli-
ces morbos in
una ſeſione.*

*Differentia ſpe-
cifia.
Animalis differ-
entia propria.*

*Deus animal ra-
tionale immor-
tale, deſignat Ga-
lenus.*

*Uſus cuiusq;
rei eſſe primum
quod a quo or-
dinandum eſt ad
eius ſalem quoniam
inquiſitionem.
Inſtrumenta cu-
rationis duo:
ratio & experi-
entia.*

*Methodo inque-
ritur quid ſit.*

*Experientia a-
morboſos, non
forteſſe duos
taſes facere
deſiderat.*

mani corporis cōtemplatione poſthabita, nullaq;
uſus demonſtratione, ille ſapientiſſimus Theſſalus,
duos tantum eſſe morbos ſimplices tradit in uni-
verſum, nempe fluxum & clauſum: ex quibus ſi-
mul cōiunctis, gignit tertium unum compoſi-
tum: non intelligens ſe differentiis quandam mor-
borum, nō numerū, in medium adferre. Atqui mi-
nimē conuenit, quum de animalium numero que-
ritur, unam differentiarū oppoſitionem produ-
cere: alioqui duo ſic unuerſa animalia erunt:
ut, grana exempli, rationale & irrationale. Proin-
de ad ſpecies quæ in ſubſtantia, non quæ in differ-
entia uerſantur, reſpicere oportet eum, qui nu-
merum morborum ſit traditurus. Porrō non om-
nis differentia generi addita, ad ſpeciei conſtitu-
tionem conducit aliquid: ſed quæ ex generis
propria diuiſione naſcitur. Hæ ſiquidem differ-
entia ſunt, quæ ſpecies conſtituunt reliquæ omnes,
alienæ. Extem proprie animalis differentia exi-
ſtunt, mortale & immortale, rationale & irratio-
nale, manſuetum & ferum: aliaq; id genus. Mol-
le uerō ac durum, graue & leue, rarum & den-
ſum, magnum & paruum, animalis differentia
non ſunt, ſed ſubſtantia. Itaq; etiam ſi cum anima-
li uel molle uel durum componas, ad ſpeciem con-
ſtituendam nihil ſane contulerint. Sin uel ratio-
nale & immortale, uel rationale & mortale, ani-
malis adiectionis, efficitur iam illic Deus, licet homo.
Ira uerō & ſi rationali animalis duas illas differen-
tias peculiare addideris, quæ ſunt, grefſile & bi-
pes, ſic quoq; hominis ſpeciem effeceris. Unde ſci-
re nō poſſet, ut uilius rei ſpecificas differentias in-
ueniat quia, niſi prius ſubſtantiam illius aut de-
ſcriberet, aut oratione circumſcriberet accuratē.
Si quis igitur tradere de morborum numero iu-
ſtitur, is nō debet ſtatim in prima differentia ſub-
ſistere, ſed diuiſa illa procedere, donec ad aliquam
inſimularum ſpecierū, & quæ in aliam diſtrahi am-
plius non poſſit, peruenerit: id quod facere illi ran-
tium eſt promptum, qui in diuidendi arte magno-
pere fuerit exercitatus. Peccauit etiam uel grauif-
ſimè Theſſalus, quod ne principium quidem in-
demonſtrabile, ac per ſe notum attigerit, illius rei
quam pertrahendam ſuſcepit. Principium autem
intelligo, quæſite uniuiuscuſq; rei propriam eſſen-
tiam: à qua neceſſario eſt ordinandum, quā ad in-
uentionem ſpecierum & differentiarum, tum uel
maximè (ut ait Plato) ad diuiſionem, atq; ad om-
nem cuiuſq; rei abſolutam inquiſitionem. Sed
nec ratione, nec experientia, ad ſuſcien-
da ſua dogmata uſus unquam eſt Theſſalus: quæ quidem
duo inſtrumenta, iſe quoq; opmē inuenta fuerint,
apud homines ſolent ſemper patrociniari. Cæte-
rum in his commentariis animus nō obis eſt agere,
nō de experientia quæ ratione nō uſitur, ſed de iſe
prædiſtis, quæ methodo & ratione inueniuntur.
Etenim methodo quippiā inquirere, inuenireq;
ex aduſu oppoſuit ei, quod eſt fortuito & teme-
re. Eſt ſiquidem illud, cum uia quadam & ordi-
ne, quippiam inueſtigare. Experientia autem ame-
thodos, non artem, aut ordinem certum, ſed ran-
tum fortune uniuius ſauorem, ad rei inuentionem
deſiderat. Qua quidem proſus neglecta, nos de-
monſtrari omni inſtitamus, quæ à principiis in-
demonſtrabilibus, & per ſe notis, intellectuſq; obie-
ctis, nunquam uon proficiſcitur. Nam quod in-

tellectuſ ſe uno occuſſu non exhibet, id proinus
controuerſum exiſtit, demonſtrationemq; deſide-
rat: nec arte ullam à tali principio incepiſſe con-
uenit. Quandoquidem igitur morbi curationem
inuenire eſt propoſitum, laud dubiè neceſſe eſt,
prius morborum numerū ſciri. At quoniam ſci-
ri nequit, ut aut differentias generis illius mor-
bi, aut ſpecies inuenias, ipſo quod diuiditur uon
plane explorato: oportet proſectō nunc, etiam
quid morbus ſit, enarrare, quō ſic diuiſionem
eius ritè adeamus. Id uerō ſit eodēmodō, nobis à
cōmuni norione auſpicatis, fine qua inuenire pro-
poſite rei ſubſtantiam non licet. Vt igitur ubi ci-
tra offenſam omniū partium actiones obeſit, ho-
mines ualere ſe dicunt: ſic dum naturalium cor-
poris actionum ſenſerint quamplurimè uel malè
geri, uel proſus non geri, & agrotare ſe illa cor-
poris parte exiſtimant, cuius actionem obſeruaſſe ui-
dent, & medicum de remedio conſulant. Ac ta-
les ſunt uniuerſis hominibus notionēs & ſanita-
ris, & morbi. Ergo accepto illo, quod omnes con-
ſentire, principio, nempe id in medendi metho-
do propoſitū eſſe, ut ægra corpora in ſanitate re-
ſtituamus, hoc eſt, naturales partium actiones, ſi
quæ obſerue ſint, emendemus: claritatis gratia oc-
culum proponamus, cuius nimirum particula
opus eſſe ut uideat, inter omnes homines conue-
nit. Nec uerō refer, partem ne, an particulā, quiſpi-
am oculum dicat. Si quidem quicquid totū com-
plet, atq; integrat, id, corporis totius, quod com-
plet, particula ſue pars nominal. Eſt namq; pars
ex iſis quæ dicuntur ad aliquid. Quippe pars to-
tius integritatis pars dicitur: æque proſectō ut to-
tum integritatis per elationem ad partes & par-
ticulas ſuas nominatur. Ceterū ad rerum, nō no-
minum differentia, in omni cōmentatione prin-
cipium ſumendum eſt. Eſt itaq; uifio, oculorum
actio: quemadmodū locutio, lingue: inceſſus, au-
tem, crurum. Ipſa rursus actio, motus eſt actiua.
At motus eſt prioris habitus immutatio. Qui qui-
dem actiua dicitur, quum à ſe editur: paſſiua
uerō, quum ab alio poſito extrinſecus, exciatur.
At uerō immutatio prioris habitus dupliciter ſit:
nempe aut in qualitate, aut in loco. Ceterū quæ
circa locum uerſatur, latio dicitur: alteratio au-
tem, quæ in qualitate conſiſtit. Porrō inſtrumen-
tum appello eam animalis partem, quæ perfectè
aderte actionem poteſt. Qua ſignificatione oc-
ulus par animalis, & particula, & inſtrumentum
uocabitur. Cornea uerō tunica, particula qui-
dem & pars: at inſtrumentum nō item. Simili mo-
do & quæ rhagoides, & quæ arachnoides, & quæ
amphibleftroides dicuntur: quarum nimirum
ſingula, primum quidem ac maximè, oculi parti-
culæ ſunt: & quia is etiam faciei pars eſt, itidem
& illæ faciei partem, ſed ſecundaria ratione.
At uerō ſimilarem partem appellant, quæ undi-
que in particulas ſimiles diuidi poteſt: ueluti ui-
tæus humor, & cryſtallinus, & tunicearum pro-
pria cuiuſq; ſubſtantia. Eſt itaque inſtrumentum
oculus, actio uerō uifio: una ex iſis particulis ſi-
milaribus, ac primum inſtrumentum uifionis,
cryſtallinus humor. Id namq; eſt, quod alterati de-
bet ab aliquo extrinſecus occurrentiū colorum,
ut animal uideat. Alterari uerō nō poſuit, niſi pu-
rum omnino, perſpicuumq; eſſet. At parum ita,

*Natus cōmuni,
Valere & agro-
tare quando ſe
dicat homines.*

*Pars quæ di-
citur.*

*Viſio eſt oculor-
um actio.
Actio quid.*

Motus duplex.

*Immutatio du-
plex.
I actio.
Alteratio.
Inſtrumentum
quid.*

Oculus tunica.

*Similari parti-
cula quæ dica-
tur.*

*Cryſtallinus hu-
mor primum in-
ſtrumentum vi-
ſionis.*

pellucidumque esse non posset, sine eo quod nunc
obtinere temperamento. Quippe ostensum est, un-
quamque rem tale esse, qualis est propter calidam,
frigidam, humidam & sic temperatam. Ideo si quis
horum magnopere immutatus sit, aut plane non u-
debit, aut male uidebit animal. Vbi igitur neutrum
videre oculum cernimus, qui tamen probe ante-
ea cernebat, subito nos accingimus ad ipsius læ-
sionis causam inuestigandam, quum sine causa ni-
hil in natura rerum contingat. Causa inuenta, ne-
cessario fatendum est, aut morbum ipsum eam esse:
aut, si morbus læsio actionis exstiterit, affectum qui
huic officit, morbi causam exstiterit. Dubitauerit
tamen aliquis, ipsum uel oculi affectum, qui quo cer-
nendi actio uitatur, dicere morbum debemus:
an ipsum actionis uitium. Quodcumque tamen ele-
geris, necessarium est ut de sanitate enuncies, & qui-
dem multo antea, contraria: nempe eam esse in-
columem oculi actionem uel affectum, qui uisio-
nem absoluit. Sanitas quippe & morbus, maxime

*Sanitatem ex
morbo sub eo-
dem genere con-
trari.*
*Contraria quæ
dicantur.*

*Affectus corpo-
ri exstiterit fun-
ctionis causa.*

ris præter naturam se habentibus, qui actionem ali-
quam uitiat, morbum (si placet) uocemus. Ipsum
uero functionis uitium, insigne quoddam morbi
symptoma. Quæ alia ratione accidunt, eum co-
lores, ea symptomata etiam, sed familiaria propriam
posuit quæpiam uocare. At quæquam ab his genus
sit insalubrium siue morbosicæ causam. Quæ-
rum ea quidē, quæ in ipso corpore animalis con-
sistit, internas siue antecedentes: quæ uero extrin-
secus accidunt, externas aut procatarticas appel-
labimus. Vt autem hæc exemplo clarescant, phleg-
monem esse pedis morbum cōstitutum: læsum
autem ingressum, esse insigne ipsius morbi sym-
ptoma. At rubor, tensio, renixus, & tumor præter
naturā, diuersa quædam symptomata nomen in-
ter. Porro sanguinis redundantia, phlegmones
causa interna dicatur. Sic ut externa, quæ præce-
dit abundantia ciborum. Cæterū nullus affectus
dici morbus meretur, nisi alicuius partis actionē
uitet. Quod autem postulat curationē, aliud pla-
ne non est, quam affectus qui uitiat actionē. Ete-
nim quod primum, maxime omnium desideramus,
id naturalis est actio. Vt igitur totam particu-
lam actionis tantum gratia requiramus, eodem
(arbitror) modo & ipsius partis naturalem con-
stitutionem, etiam actionis grana desideramus.
Porro quæ constitutionē ipsam uide actio nasci-
tur, necessariō sequuntur, sanis quidem nobis, ac-
cidentia: ægrotantibus, symptomata nuncupan-
tur. Atque hæc quatuor genera sunt omnium, quæ
in nostro corpore habentur, siue secundum natu-
ram nos, siue præter naturam habeamus: actio-
nes, constitutiones, quæ hæc præcedunt, quæque
etiam sequuntur.

*Morbus est af-
fectus præter na-
turam functionis
uicium.*
*Symptoma
duplex.*

*Causa mor-
bi.*
*Causæ mor-
bi.*
*Causarum
differentia.*

*Accidentia ex
symptomata
quædam des-
erunt.*

*Remota quæ
in nostro corpo-
re habentur quæ
tuor.*

GAL. DE METHODO MEDENDI LIB. II.

40
50
60
Rgo affectus qui actionem uitiat, morbus
uocetur. Hunc si quis sequitur, symptoma.
Quod illum excitat, causa. His ita distinctis,
inspicienda diligenter est nominū diuersitas, quæ
agritudinibus imposuerunt ipsorum primi auto-
res. Partim namque læsa particula fuerunt indita,
ut pleuritis, id est, punctio lateris. Peripneumo-
nia, id est, pulmonū phlegmone. Ischias, id est, co-
xæudicū morbus. Podagra, id est, pedum uitium.
Neplritis, id est, renū affectus. Aethritis, id est,
articulorum uitium. Ophthalmia, id est, oculorū
phlegmone. Cephalalgia, id est, capitis dolor. Dy-
senteria, id est, intestinorū tormina. Subinde ab ip-
so symptomate, ut illeus, hoc est, uoluitus. Trive-
sus, id est, desidendi ægidia cupiditas. Spasmus,
id est, cōuulsio. Palpos, id est, palpitatio. Tremor,
id est, tremor. Paralytis, id est, resolutio nervorū.
Apepsia, id est, cruditas. Dyspnœa, id est, difficultas
respiratio, uel inordinata spiratio. Apnœa, id est,
spirandi defectus. Agrypnia, id est, uigilia. Para-
phrosyne, id est, delirium. Coma, id est, sopor. Se-
pe ab ambobus simul: ut, Cephalalgia, hoc est, ca-
pitis dolor. Oralgia, hoc est, dolor aurium. Cardial-
gia, id est, oris uentriculique quod uenter appellabit
eor) dolor. Odontalgia, id est, dentium dolor. Hy-
sterialgia, id est, uteri dolor. Sæpenumero à causa
putata, ut Melancholia. Nonnunquam à similitudi-
ne ad aliquid extra positum, ut Elephas, Cancer,
Polypus, Staphyle, id est, uua, Leuce, id est uili-
go alba.

Morbus.
Symptoma.
Causa.

*Morborum no-
mina indita à
læsæ particula.*

*Morborum no-
mina sumpta
ab ipso sympto-
mate.*

*Morborum no-
mina sumpta à
partis affectu,
et symptomate.*
*Morborum no-
mina sumpta à
causæ quædam,
uel ab aliqui
milia.*

go alba. Myrmecia, id est, formica. Atleroma, id est, ruber, cui puliculis quid simile inest. Steatoma, quod aliquod seuo simile continet. Staphylo ma, id est, oculi morbus, cum in summa tunica quiddam acino simile eminet. Meliceris, hoc est, capitis ulcera, sanie inhar mellis fundenta. Anthrax, id est, carbo. Alopecia, id est, aree in capite. Ophiolias, id est, uitium serpentis formam representans. Sycofis, id est, ficus. Satyriasis & priapismi, pudendi erectiones præter naturam. Ipsorum uero morborum, qui neque locum affectionis nomine repræsentant, nec causam quæ eos efficit, per pauca sunt nomina, phlegmone, gangrana, scirrhus, erysipelas, apostema, œdema, empyema, ulcus, exanthrema, catagma, spasma, rhegma. Coloboma, id est, mutilatio. Dothien, id est, furunculus. Ionthos, id est, uarus. Phyma; laxarum partium phlegmone. Quamquam horum quoque nonnulla, partim locum corporis, siue particulam afflictam, subindicare uidentur, partim præ prægnantia symptomata uominari. Porro ulcera (quod unitatis solutio est in carno sa parte) differentie particulares partim ab ijs qui primis eas sanauerūt, dicuntur: partim ab ipsis qui idem affectū sunt, ut telephium. Cancer autem, à similitudine ad animantem. Phagedæna herpes ip. à symptomate. Verum phagedæna quidem, ulcus depascens est. Herpes autē nō semper existit ulcus. At quotiescūq; cum exulceratione inuadit, ritu serpentis bestia, ad uicinas partes progreditur, easq; depascit & populatur. Cautum uerō ulcus, & fordidum, & cruentū, & purum, & æquale, & carne excrescens, hæc magis proprias appellationes fortiantur, non tamen similes omnes. Nam æquale, canum, & supercrescens, à propria differentia: at cruentū & purum, & fordidum, non à proprijs differentijs, sed ab externis symptomatis appellantur. Tres igitur esse in corpore affectus præter naturam, ostensum iam est: causas uidelicet, morbos atq; symptomata. Causas, ueluti redundantiam & corruptelam. Morbos, ut phlegmonē, ulcus. Symptomata, ut prauum colorem atq; fragilitatem. Diuersa ab ijs sunt quæ immodicē excernuntur à corpore, aut retinentur præter naturā, & functionū uitia: omnia scilicet cōmuni nomini appellata symptomata, ceterū non unī generi subdita. Quippe affectus quidam corporis est uitiosus color. Quod excernitur autem, aut retinetur, affectus non est, sed affectum sequitur. Similiter actio uel laxa, uel integra, affectus sanē non est: particule autem uero eduntur, necessariō comitatur affectum. At œdema quidem & phlegmone, ex ijs sunt, quæ absolute dicuntur esse. Eodem modo & redundantia, si ea sit sanguinis: & corporis pallor. Actio uerō ex eorum numero nō est, quæ esse absolute dicuntur, aut cerē nō similiter sicut iam comprehensa. Sequi dem nullo temporis spacio eius partes manent, sicuti nec fermonis, nec ullius morus: sed horū quilibet in generatione consistit. Cum uerō duplex sit ipsius motionis genus, unum in loco, aliud in qualitate: prius latius, secundum alteratio dicitur. Ac omnis quidem actio, motus est actiuis: omnis alteratio, eius quod alteratur, motus est pas-

sius: patitur namq; quod alterat. Ergo affectus dum alteratur, mouetur: ubi uerō à motu cessauerint, iam alterati sunt, nō autem amplius alterantur. Quicquid enim quocūq; modo se habet, aliquo omnino affectu est præditū. Quod autē in constanti, ægredi solubili affectu uidetur, iam quodam affectum est. Sanē alteratus qui uigrescit alteratus est, qui obniguit. Itaq; alteratio, generatio est qualitatis. Nam quæ absolute dicitur generatio, ad substantiā uia quædam est & progressio. Aliqua igitur in generatione, alteratione, & ut semel dicā, motu, suam essentiam obtinent: aliqua * permanentē habent substantiam. At sanitas quidem & morbus, & quæcūq; symptomatum causarūq; affectus uel habitus sunt, ex permanentium numero existunt. Actiones autem omnes alterationesq; circa rem quilibet, in generatione propriam essentiā sortiuntur. Porro corpus ipsum, secundum quodcuq; mouetur, secundum idem patitur: motusq; eius passio, siue passio, est. Etenim prisci, motus omnes, etiā si naturales existant, tūc actūs sint, pathe, hoc est, passionēs uominant: sicuti actiūs motus, actiones. Nos autē contrariū sanitatis affectum, à quo lædi functionē diximus, tantū morbum uocamus, siue diutinus hic sit, siue breuis, siue momento duret. Ex reliquis affectibus præter naturā, eos qui hunc præcedunt, causib; rationē obtinent, causas tantū dicimus, non pathe. Qui illum sequuntur, si actionū offensæ sint, & symptomata, & pathe. Eodem modo, & immodicas uel inanitiones uel retentiones. Qui uerō affectus sunt, ueluti uitiosus color, supra affectionis & symptomatis appellationem, etiā affectus, uel affectiones uocamus: ita nimirū ut sunt. Omnī igitur horum cōmune id est, quod præter naturā sunt. Propriū autē morbi quidem est, quod actiōi in cōmodet: symptomatis, quod morbum sequatur: causa deniq; quod præcedat. At uerō medicorū proprium est munus, ut morbos adimant: quibus sanē sublati, non modō actionis uitium euanescit statim, sed reliqua etiā omnia symptomata. * Quisquis igitur ex ijs quæ particulis naturaliter insunt, tum eas quæ aliter accidunt, tum proprias functionis causas distinguere nescit, qui obsecro fieri potest, ut is dispositionem inueniat, à qua primū læditur functio? Etenim quæ fortuito corporis accidunt, etiā si millies sint alterata, nocere actioni non possunt, quandiu à quibus sicbat, omnia naturā sua seruauerint. Horū uerō si uel unum quoduis alteratū fuerit, actionē quoq; ipsam statim in sanam ladi est necesse, in quantum ab eo est, cū secundum naturam se haberet, adiura. Fieri autem nō potest, ut omnium morborū numerum methodo is comprehendat, qui numerum omnīū actionis causarum, corpore secundum naturam se habente, non norit. Qui autem omnem morborum numerum methodo non inuenit, hic maxime labatur oportet in ipsis medendi suspicijs: cū cōstet tot esse medendi rationes, quot morborum id ex existunt. Verum enim uero primus omnium ille affectus investigandus est, qui dicitur functionis effectrix causa. Hunc sanē euacratā nos diximus esse calidi, frigidi, humidi &

Nobis quid ad se ipsum dicatur. Alteratio quid.

Generatio est ad substantiam progressio.

Pathe.

Causa symptomata.

Medici munus.

Medendi ut esse rationes, quot morborum idea consistunt. Functio causa.

N n

Vlex quid.

Vlexum varia nomina.

Phagedæna quid. Herpes duplex.

Affectus præter naturam sunt tres: morbus, causa symptomata.

Actio cur non dicatur esse absolutā.

Motus duplex.

Actio quid. Alteratio quid.

*Functiones obia
à corporibus si-
milaribus.*

*CrySTALLINUS hu-
mor est instru-
mentum visus.*

*Hypochyma, a-
culi intus cum in-
strumentis, est mor-
bus.*

*Similares parti-
cula solent esse
interpenetrata
mutatis, aliis
humorum afflu-
xibus, tunc ita
dam ali afflu-
xibus.*

*Morbis instru-
mentalibus quatuor
plex.*

*Solutio continui
est communis mor-
bus similaribus
et instrumentalibus
et partibus.*

*Experientia soli
qui debent in-
cumbere.*

fici, ex intemperie quorum, primus morbus in
particulis similaribus nascitur. Cùm autè à simi-
laribus ipsi, corporis functiones edantur, me-
rito instrumentis singulis unica tantum est attri-
buita similans particula, à qua perfici ipsa actio
possit. Reliquæ uerò quæ cum hac quoduis in-
strumentum absoluit, in aliquem usum illius quæ
prima existit actionis causa, sunt cõstitutz: quæ
& ipse retinet suas peculiarias actiones. Etenim
instrumentum visus, est crystallinus humor. Reli-
quæ uerò partes, eius grana sunt facit. Singulæ
tamen earum aliquam seorsum actionem obtinent:
ac uena quidè & arteria, & nervus, toti animanti
cõmunem: membranalibus autem oculi omnes,
cùm sint nutrimentum participes, prædicte omnino
sunt naturalibus facultatibus, ac proinde etiam
functionibus quæ ab ipsis proficiuntur. Quo-
ties igitur crystallinus humor intemperie labo-
rat, omnino læditur oculorum functio. Non est ita
men affectus, eorum, ut organa sunt, morbus.

At hypochyma, hoc est, suffusio, nullius simili-
arum morbus existit, sed oculi totius, seu instru-
menti. Ad eundè modum si in finibus uenarum, quæ
sunt in cauo iecinoris, obstructio aliqua oriat,
digestio quidè in corpus per has morabitur: gri-
tudo tamen totius hepatis, seu instrumenti cen-
setur, nulla similitudo eius partium adhuc æ-
rogante. At si intemperies uenas illius infesta-
uerit, ipsarum quidem illarum morbus primus erit,
ex accidenti uerò etiam iecinoris. Solent autè simi-
lares particule, octo intemperatibus secundum
nudas qualitates cruciari: nempe quatuor qui-
dam simplicibus, quatuor autè cõpositis. Quod
si ad intemperiem accedat & humorum affluxus,
tunc et rursus intemperies orietur. Duplex itaq;
erit morborum genus: alterum in partibus simili-
aribus, alterum in organiciis. Quod igitur ad parti-
culares similes pertinet, circa intemperantias
uersat. Quod uerò ad organa, unum quidem in fi-
gura, aliud in particulari numero, tertium in ma-
gnitudine, quartum denique in posita spectatur.

Vtrarum uerò partium, id est, similarium & instru-
mentalium, cõmunis affectus est, unitatis diuor-
tium. Quare sex in uniuersum morborum genera
existunt. Vnum, quod similarium est proprium,
nempe intemperies. Quatuor, instrumentorum cu-
iusq; . Et cum his sex, quod utriusq; partibus est
cõmune, ipsius unitatis solutio. Porro omnis me-
dendi methodus, seu iuncta ab experientia proce-
dit. At medicorum plerique non tantum experientie
applicites animi (per quos tamen licet eis eade-
re in probos medicos) sed perfectioris etiam ra-
tionis cupidi, cùm aut nō quæ citra demonstrati-
onem sunt enunciatæ, credant, aut uitiosas fal-
lantur demonstrationibus, non solum nihil exco-
gitant boni, fed etiam quæ per experientiam co-
gnita sunt, corrumpunt. Proinde talibus experien-
tiae ut incumbant consulo: cùm non leue in istis pe-
riculum sit, qui supra uires aliquid molitur, ne
& id non consequantur, & quæ intelligere alii
possent, omnino omittant. Itaq; cõmittendum
non est, ut utraq; simul miscantur, & quæ per
experientiam inuenta sunt, & quæ sola ratione in-
uestigata: sed cùm utrunq; seorsum sit tractandū,
pōt ambo coniungantur. Etenim tota Empiri-

corum ars, observatio quædam est & memoria
eorum, quæ usui sunt inter se habere cõsecutio-
nem aliquam. At ex ipsa rei natura ordiri, atque
ab ea, quod sequens sit, inuenire citra experien-
tiam, id est in dicatione inuenire. Voco autem in
dicationem, ipsam ueluti cõsecutionis imagi-
nem. Omnis itaq; medendi methodus donec ad
oprarum finem perueniat, per indicationes pro-
greditur. Quisquid enim quicquid ab experien-
tia est seu iunctum, id totum in dicatione uocatur. At
finis propolite tractationis est, inuenire cuiusq;
morbis remedia. Huius autem inuentionis prin-
cipium, est ipsius morbi cognitio. Ergo primū,
quænam generalis, cõmuniq; morborum om-
nium indicatio sit, inuestigandū est. Ab hac dein
de ad alias speciatim est descendendum, donec
finem eum consequamur. Porro quæmadmodū
hominibus uniuersis inest quippiam cõmune, cu-
ius nimirum ratione omnes dicunt esse homines,
ita & uisus inest in morbis. Vt enim Socrates atq;
Plato, specie quidem sunt unus homo, numero
autè uarij: sic, mea quidè sententia, morbus qui
utrunq; eorū infestat (sit febris, exempli gratia)
genere & specie erit unus, etsi duo numero exis-
tunt. Id quod Plato significare uidentur, dicens:
Multa unum esse, & unū multa. Rectè igitur ab
antiquis philosophis dictum est, aliud numero,
aliud specie, aliud genere esse, quod tamen idem,
rum unū est. Cùm igitur omnis affectus præter
naturā, functionē lædens, sit morbus: necessum
haud dubie est, omnes id genus dispositiones,
quatenus tales sunt, uel genere uel specie unum
morbum existere. Quamobrem, unū genere, spe-
cie ac numero dici & esse qui non intelligunt, si-
no (quo nullum est animal stupidius) mihi stoli-
diores uident: nam hic, aliud esse unū quidè spe-
cie, numero autè aliud, cognoscit. Quæcumq; ue-
rò de morbo dicimus, eadem & de optima uale-
tudine, & de alijs etiam dispositionibus, intelligen-
da ueniunt. Nam quæmadmodū hominis nomen
est unū in uniuersis hominibus, morbus in om-
nibus morbis: sic sanitatis denominatio, una ea-
demq; est, in omnibus illorum cõstitutionibus,
qui prospera sanitate fruuntur.

GAL. DE METHODO MEDENDI LIB. III.

S igitur indicatio quæ ab ipsa rei natura pri-
mum oritur, quid agendum sit inuenit, ne-
cessè est remediis inueniendis inueni-
tum, ex morborum ipsorum natura sumi. Cete-
rum in dicatione ipsa, quæ à morbis sumitur, prin-
cipium tantum est, unde medendi ratio promo-
uet, non autem ipsius artis medicatice pars: aut
certè nec magna, nec propria, sed quæ etiam ple-
bi est cõmunis. Quamobrem eum solum esse me-
dicū existimamus, non qui nouit, quidnam mor-
bi prima indicatio distet, sed qui illa perficere
poteat, quæ à tali præscribitur indicatione. Si igitur,
si per experientiam ea inuenit, obseruator est
Empiricus est uocandus: si ratione quædam &
methodicus, & methodicus, & dogmaticus.
Empiricus quippe per experientiam inueniri
omnia cõtendit. Nos partim experientia, partim
ratione: cùm uel illa inuenire omnia queat,
nec

*Empiricorum
ars quid sit.*

Indicatio quid.

*Multa unum ef-
fecit uisus multa.*

*Idem q; unum
quod multa dicit
sunt.*

Morbis quid.

*Alia uisus ef-
fecit uisus multa.*

*Alia uisus ef-
fecit uisus multa.*

*Morbis quid
est uisus in uis
uicis uicis.*

*Morbis quid
solum existens
dicit.*

Empiricus.

Logicus.

*Destrinam rem-
peticā, legiti-
mā esse constan-
dendam, sed for-
tem vitandam, tra-
dendam.*

*Salutariū con-
tra speciei.*

*Vermis cani cu-
rationis duplex
scopus.*

*Instrumenta in
veniens reme-
diorum esse duo,
experientiā at-
que rationem.*

*Impetūs circa
dolorē in vni
medicamēta cō-
traria mōstrat.*

*Oleum cauo vl-
ceri adorsū si-
mili medicamen-
tum est.*

nec sola ratio. Verū cōsūmā mīsamq̃ tradendū
esse doctrinā nō censemus: sed scēorum empiri-
cam, & scēorum logicā: quā facili apparet, quā
utraq̃ earum um̃ habear. Igitur unitatis solutio
(quā in offe quidē fractūra, in carnosa autē par-
te ulcus dicitur) unitiōē postulat: quemadmodū
& vulnus, & rupsiō, & consūlio. E quibus
vulnus quidē, solūmo quēdā ex vulnerando in
carnosa parte relicta est: rupsiō autē atq̃ consūlio
citra vulnurationē accidit: aoprior quidē,
carnosae partis diuisio existit: secunda autē, ner-
uosi. Hic itaq̃ omnibus unio moleuda indica-
tur: quae an praestari ubiq̃ possit, an in multis nō
possit, hoc utiq̃ internoicere, primū iam artificis
est. Si quidem hoc ipsū primū artis est opus, ut
intelligas, sperare ne id quō tendis debeat, an se-
cus. Eius rei duplex cognitio est, nec potest addi
tertia. Altera per experientiam, cui longo usu est
opus: altera per ipsū rei naturā. Hęc si quidem,
tum cuiusq̃ substantiam particulae, tum actio-
nem, tum usum, sumūq̃ estimabit. A quibus pro-
cedens, nō solū quod sanari nō potest, prae-
uidebit, sed etiam quod recipere sanitarum po-
test, de inueniendis et remedijs deliberabit. Cō-
stat autem quod si simplicissimis auspicabit. Por-
rō nihil est simplicius ulcere, quod in summa car-
nosa parte cōsistit. Huius ergo, q̃ quidem ulceris
ratiō sit, unus curatiōis scopus, unio est.
Sin autem cum cautate adit, erit duplex affectus:
nempē ulcus, quod est unitatis solutio: &
cauitas, quae ex amissa aliqua animalis propria
substantia contracta est. Ac proinde duplex enī
proponit eius curatiōis scopus: nempe ut in-
ducatur cicatrix, & impleatur cauitas. Horum ra-
men alterum sepe fieri nō potest: utputa, cū
nō modō carnem, sed etiam illi subiectum os,
perire cōtingit. Quippe impleri ad unguem hu-
iusmodi minime potest: cicatrice induci, facile
potest. Inuentionis autem, ut aliarum rerum, sic
remediōrū omnium duo nobis sunt instrumenta:
videlicet experientiā & ratio. Ceterū quā so-
la experientiā utantur, cūm uideant, cui aristolo-
chia ulcus carne nō impleuit, huic thus confer-
re: cui autem thus nō contulit, ei irim admodum
esse utilem: iudicant nō omnes ab omnibus me-
dicamentis similiter affici, ac proinde quampluri-
ma eiusdem speciei medicamenta sarcoica tu
unū confundunt, quod nulli corporis naturae de-
sit, quod sit ex usu. Atq̃ hi quidem stirpissimē
hallucinantur. Primō quidem, nam solius com-
positiōis quae ex similibus specie medicamen-
tis constat, nō eius quae ex contrarijs initur,
insistunt methodum. Dein autem, quia in eius
miscellā multitudine, unū fortasse medicamen-
tum laboranti prodesse poterit: fortasse neque
unum quidem: cōtrā uerō septem aut octo ob-
esse: ita ut pluribus numeris eiusmodi medica-
men obfit, quā proficit. Ac proinde, quod qui-
dem ad hanc rem pertinet, in plura mihi ignora-
re, quā nouisse uidentur. Etenim oleum cauo
ulceri infusum, aduersissimū omnium medica-
mentū est, ipsūq̃ & fordidum, & fatidum red-
dit. Quod si tempus quoq̃ anni calidius sit, ac u-
rio mali succi homo laboret, aut sit natura obno-
xius fluxionibus, aut in uictus ratione delin-

quat, nimenandum est ne pars illi ex computrescat
ex usu olei, quae fuerit exulcerata. Periculosus est
etiam, & cerē siue solius, siue in oleo solutae, u-
sus. Hae itaq̃ putrefecere ulcus faciunt. At si tera-
ginem, ad leuorem usum, interspergas, ea quidem
nullo modo putrefaciet, dolorem tamen & mor-
sum nō paruum inferet: praeterea exedat, ac phle-
gmonem excitabit. Quod si largius utare, etiam
consuulsionem acceriet. Quoniam igitur neq̃ o-
leo, neq̃ terugo, neq̃ cerā, cauum ulcus per se
implere carne potest: consistat quod ex ipsa qui ex-
perientiā proficiet, nemo usq̃ miscebit illa: id
quod faciet rationalis inter epidē, uidelicet haud
ignarus, ex duobus temperamentis immo dicis,
contrarijsq̃, confici unum modicū posse. Nō est
ergo difficile, ex oleo, cerā, & terugine, medica-
mentū sarcoicū, & moderate sicum conficere:
quale ulceri cauo est aptissimū, cui quod modicū
criter exacerari potest. Omnis igitur quae praeter
naturā est cauitas, repleti postulat: quare & quae
in carnosa accidit parte. Ipsa uerō repletiō, inue-
nie nōdōrū remediōrū finis, quō tenditur, est. Cae-
rerū ut illa qui implent inuenias, & multa ra-
tione est opus, & multiplici particulatim indica-
tione, & methodo rationali exacta. Quā quidē
destrutum uulnus medicorū cūm sit, etiam oculo-
rum doloribus illa medicamentā adhibet, quae
ex opio, mandragora, & hyoscyamo parantur,
maximam planē oculorū perniciem: utpote quae
nulla re alia subian ad praesens speciem doloris
praestant, quā quod ipsum sensum exstinguant.
Nos uerō, dolores oculorū grauissimos, aut bal-
neo, aut uini potione, aut fomentis, aut misfio-
ne sanguinis, aut deniq̃ purgatione sanauimus.
Vrigitur ad caui ulceris curatiōē reuertit, in eo
sanē proponitur nobis, ut quae perijt caro resti-
tuatur. Scire autem oportet, generandae carnis
materiam, sanguinem bonum existere: opificem
uero atq̃ autorem, naturam illius, uidelicet corpo-
ris, cui caro superinduci debet. Porro natura
cuiusque corporis, calidi, frigidi, humidi & siccī
temperatura constat. Quare perspicuū est, iustum
horum temperamentum in subiectis particulis,
quibus deficientem carnē sumus restituri, opi-
ficis habere rationem. Ac primū quidem in om-
ni cauo ulcere haec duo consideranda ueniunt:
iustā ne sit temperie id quod subiectum est: nem-
pe an secundum naturam se habeat (similariū
quippe corporum sanitas, iusta est quatuor qua-
litarum temperies) & an sanguis qui induit, bo-
nus ac mediocrius existat. Nam si horum alteru-
rum sit uisiosum, multi affectus praeter naturam
constiterint. Verū si & sana fir pars, & sangui-
nis cōfluxus citra omne uitium: nihil obest quo-
minus prima carnis generatiō cōtingat prope-
rē, idq̃ nullius externi medicamenti ope. Cete-
rā quia in ipsa primae carnis generatione du-
plex excrementū oritur: alterū quidem tenuius
(quod in ulcere sanies dicitur) alterū uero cras-
sius, quod nuncupatur fordes: atq̃ ex tenui qui-
dem, ulcus humidum redditur, ex crasso autem
fordidum: duplicibus sanē medicamentis est
opus: utriq̃ ut humidum ulcus est, siccantibus:
ut fordidum, quae ipsum expurgent. Ergo cūm
nullo unquam tempore natura cesset, certē nec

*Cera r̃suo cauo
ulceri restitū pe-
riculosa.*
Astragali vi.

*Temperamentū
natum medicamē-
tū est: immo
dixi atq̃ contra-
rii posse.*
*Sarcocismū me-
dicamēto uul-
ceri aptissimū
confici ex oleo, ce-
ra & terugine.*

*Oculi pernici-
sissima esse, quae
medicamēta ex
opio, mandrago-
ra, & hyoscyamo
constant.*

*Oculorum dolo-
res quoniam me-
dici restitū Ga-
lenū sanant.*

*Carnis generan-
da materia est
probus sanguis:
opificis, ipsa na-
tura.*

*Natura cuiusq̃
ex primarijs qua-
litatibus temper-
tis constat.*

*Sanitas similariū
partium est
quatuor quali-
tatum iusta tem-
peries.*

tempus ullum erit, in quo nō ambo hæc in cau-
ulcere colligantur. Quare nec tempus ullū erit,
in quo nō utrumque medicamentū genus, & sicca
& expurgans, desideretur. Sed nō lat est inueni-
se genus medicamentū, nisi eius speciem eius dis-
quas. Cuius quidem inueniendi petenda est ex
cōmentarij medicamentorū simplicium, ubi ni-
mirum omnī medicamentū temperaturæ, gra-
dus, & differentias tradidimus. Debet autē me-
dicamen producere carni cōueniens, ex ipse
est, quæ primo ordine tum detergunt, tum siccit:
qualia sunt, thus, hordeacea, fabacea, & erui fari-
na, iris, aristolochia, cadmia, panax, atq; pōplo-
lyx. E quibus aristolochia quidē & panax, tum
ceteris plus siccant, tum natura magis calent.
At hordeacea fabaceæ farina, multo lūa minus
siccant, ac minimē calida existūt. Thus uerō mo-
deratē calet, minus tamen illis siccant. Erui fari-
næ & iris, horum, atque aristolochiæ & panacis,
medium locum fortuntur. Cetera rursus in hu-
mida corporis natura carnē producere potest,

*Sarcenicum me-
dicamentū prima
gradu debet de-
tergere, & sicca-
re.
Sarcenica molli-
camia quæ fuit*

*Thuris faculta-
tas.*

*Naturaliter si
habentia corpo-
ra, sibi similia
postulant: præ-
ter naturā autē,
contraria.*

siderat. Quippe si commissæ simul sint cutis org,
nulla intercedet curis diuersi generis: quemad-
modū in eo repleto, planioy reddito, in quo scili-
cet oræ ulceris se non conungunt, sed totius ul-
ceratæ partis cuticula amissa est: quā utiq; prius
restituere, q̄ ora lūngantur, oportet. Quoniam igit
in simplici ulcere sola diuisio proponit, diducta
labra coniungi, coniunctaq; manere oportet. At
uerō ex diductis corporibus, alia quidem per se,
alia aliorum corpore coniuncta manent. Per se qui-
dem, quæcumq; secum cōcreuant, coalescuntq;
ut caro, & quæ ex carne constant. Aliorū autem
ope, tum quæ colligantur, tum quæ uinculo ali-
quo continentur: ut ossa, & quæcūq; sunt dura. Ex-
cit, sicuti in cavis ulceribus, ut producta caro,
ita in simplici ulcere, ut oræ ipse mutuo coale-
scant, natura opifex causa: ita, ut si quæ disident,
in idem adamusum componas, cetera omne reli-
quam extrinsecus molitionē coalescant. Quæ di-
ducta sunt, in idem adduces, aut uinculo ex duo-
bus inijs circumdato, aut sutura, aut fibulis im-
positis: aut horū quibuscūq, aut omnibus. Ex-
pedit autē, quod circumijci, nec molle nimium
sit, quō uidelicet ratō cōtinuat: nec rursus ita du-
rum, ut premendo offendar. Circūductio etiam
ipā, nec ita laxa sit, ut nihil efficiat: nec ita uehe-
mens, ut dolorē premendo excitet. Hæc itaq; me-
dendi ratione, quale diximus ulcus simplex colli-
bit. At si ob magnitudinē eius, uel ob intercederi
tem saniem, uel ob dolorem, aut insignem imbe-
cillitatem particulæ, uel deniq; ob inclusum ær-
rem, distinctæ partes exactē ad imū uelq; coniu-
gi nequeant, eiusmodi sanē ulcus ex sola partiū
commissione agglutinari omnino non potest.
Quare medendū prius est illis impedimentis, ali-
quo medicamēto siccante: quod quidem si qua
sanies iam subsit, absumat eam: & si qua in ua-
cua loca influxura est, hæc prolubeat. Etenim
medicamen glutinatoriū, aut omnino carnis ge-
neratione nō eget, aut planē exigua: & ac proinde
plus siccet oportet, q̄ quod carnē producit. Præ-
terea, cū carnis productiū medicamentū fa-
cultate extergendi opus habeat, qua non modō
redundantiam humoris siccet, sed etiam expur-
get sordes: glutinatoriū certē nec deterget, nec
expurgat, sed contrā prorsus substantiam om-
nem in idem cogit: cuiusmodi facultatē habet
medicamenta ca, quæ austera, & asstringentia uo-
cantur. Quocirca, ubi carnē gignēde studemus,
maximē cauendū est à medicamento astringen-
te: utpote quod sordes ulceribus arctius affi-
gat, quā ut facile possint elui. Vinū igitur omni-
nis ulceris, quatenus ulcus est, optimū medica-
mentū existit. Porro ipsa medēdi methodos pro-
cedet nobis bellissimē, si de singulis simplicibus
scorsim aliquod præceperimus: pōst uerō de cō-
positis omnibus alteram aliquam methodū ex-
plicauimus. Quam quidem si ingrediamur uisū,
omne ulcus tum siccari, tum debere astringi in-
ueniemus, uon tamen detergeri. Contrā, caui-
tatem in carne, siccari quidem postulare & ab-
stergeri, minimē autē astringi. Ceterū quātō cor-
poris natura est humidior, tantō medicamentis
minus siccantibus eget. Quātō autē siccior, tan-
tō rursus quæ uehementius siccet, magisq; astrin-

*Diducta por-
ta in uisū quibus
molli postulat ad-
ducit.*

*Glutinatorium
medicamentum
plus siccet, oportet.
quā quod
carnē producat.*

*Asstringentia
medicamenta cor-
rupta, ubi cor-
nē producere dē-
bent.*

*Vinum autem ul-
ceri optimū me-
dicamentū est.*

*Vicis omne sim-
plex tum siccari
tum astringen-
de bene.
Cauendum uero
se siccandum &
asstringendum.*

40

50

60

*Vicis propria
curatio uisū pro-
ficacior.*

*Genitura cor-
rupta, quatuor
qualitates sunt
causæ.*

*Vicis simplex si-
lam aut glutina-
mentū desiderat.*

Vlcus in humi-
dori natura mo-
no succidendi of-
ficio succuri an-
ti valentius.

Vlcus cum cau-
sa non pletur, quod
possunt.

Cutis similis
in qua perit, res-
trum non possit.

Cutis pignora
tate.

Cicatrice indur-
torum medica-
mentum quale
viam effi debeat

Cicatrice indur-
torum medica-
mentum quale
viam effi debeat

Excrefcentia
carum in vlcere
a vlcere sit
causa medica-
mentum excludit

Natura opera
quae
Carne minuen-
tia medicamen-
ta.

Carne excre-
ntia medicamen-
ta reddi mian-
tia a vlcere sit
causa medica-
mentum excludit

Natura opera
quae
Carne minuen-
tia medicamen-
ta.

Natura opera
quae
Carne minuen-
tia medicamen-
ta.

gant, desiderat. Iam vero ulceri mediocriter ca-
no, statim quicquid uolumus applicamus, siue
siccum id, siue humidum medicamentum exstat. At
in uulnibus quorū maior profunditas est, id
nō licet. Et enim & cerussa & lithargyros siccat,
astringunt modicē: ad ulceris tamen fundum
uis eorum nō peruenit, nisi humori cuiuspiam mi-
sceantur. Porro quomodōdū cauum ulcus ut
repleatur, carnis generationē (cuius materia san-
guis est) postulat: sic pleni, ut perducatur ad ci-
atricem, generationem cutis, quae ex carne est,
nō unionem tantum, desiderat. Verū caro eadē
specie cum ea quae perit, gigni in cauo ulce-
re potest. Cutis talis omnino, qualis erat quae pe-
rīt, prius restitui non potest: sed simile quid-
dam cuti, & quod officium eius suppleat, potest.
Et enim cum cutis carne ipsa tum scicior, tum
densior sit, certē si resiccamus & astringimus
carnem, persimilem illam cuti reddemus. Ceterū
multo siccius quod cicatrice inducat, quā
quod aggluet, esse oportet medicamentum.
Quādoquidem glutinatur, solum id proposi-
tum est, ut eius quod secundum naturam est, re-
dundantiam cōsumat: qui autē cicatricem indu-
cat, nō hoc modō, uerum etiam ut ei quod se-
cundum naturā se habet, aliquid dēdat. Gallā igitur
imatura hoc loco, & malicorium, & Aegy-
ptiacae spinae fructus, modicē siccantia pharmaca
sunt. Chalcitis, & res ursum, & res squama, & mi-
sy, multo his ualentiora existunt: misy quidē &
chalcitis, praeipue minor autē res squama: sty-
gia hoc minus usum, praesertim si ablatus fue-
rit. Sed hoc quidē ad speculationē de cōponē-
dis medicamentis pertinet, quae medendi sequit
methodum: quomodōdū ipsam praecedit, simpliciū
pharmacorū notitia. Deinceps autē aga-
mus de excrefcentia carnis in ulcere, quae mor-
bus in magnitudine existens, primū omnium sui
ablationē indicat. At haec, sola uehemētē siccat
tamen medicamentorum ope perficitur, haud item
naturae opera: contra quae in carne restituenda, aut
glutinatione res habuit: haec enim ipsius natu-
rae sunt opera, nec aliud medicamenta inhiunt,
quā submouere illa, quae actioni eius obstant.
Porro medicamenta carnē minuentia, proxima
tum his sunt quae ualenter detergunt, tum ipsae
cicatricem inducunt. Ceterū misy & chalcitis, si
humidae naturae applicentur, potius carnē exedēt,
quā cicatricē inducant: nisi forte in pollinem
admodū tenuem redactis, parcesime illis quis-
piam utatur. Nam sic imposita, partibus cicatri-
cem cōsiliant. Quod si minuire quae supercre-
re studemus, liberalius sunt imponēda. Aerugo
autē, magis adhuc quae haec, minuire carnē potest,
ita ut genus eorū quae cicatricē inducunt, pro-
fus egressa uideat. Iam uerō si exuras haec omnia,
ut minus acris, sit etiā ad cicatricē inducendam
ipsa reddenda aptiora. Si uerō etiā laues, adhuc eua-
dent mitiora. Hoc autē semper curantius animo
habeat, nō omnē naturā eadē remedia requi-
rere: sed infirmiores, mollioresque, mitiora: ual-
diores sicciore, ualēnora. Quare natura acri
in primis uenit consideranda. Cum autē cuiusque
naturae proprietates ineffabiles sit, nec exaequā
scientia cōprehensibiles, ac praeterea cuiusque ho-

minis propria curatio habeat, is erit optimus cu-
iusque partialis aegritudinis medicus, qui iam
eam methodis cōparauit, ex qua & dignoscere
naturas possit, & cōsuetura cōsequi, quae sint cu-
iusque propria remedia. Verū legimus ulceratū
partū temperamenti, quoties eas uel carne im-
plere, uel giunare, uel cicatrice inducere studeat,
maior nobis sollicitudo erit. Nam si ipsa exulcerata
caro calidior sit, aut frigidiore aequo, uel me-
dium exigit, quae nō modō moderate siccet, sed et-
iam in tantū calfaciat, refrigeretue, in quantum
subiecta caro a naturali suo recessit habitu: cū
fieri nō possit, ut in ulcere nō carnis productio,
uel sinus impletio, uel agglutinatō, uel cicatri-
cis inductio, rectē unquam cedat, nisi subiecta ca-
ro pro naturali modo se habeat. Vt igitur si phle-
gmonē unā cum ulcere urgetur, priusquā haec el-
set discussa, nemo id uel carne implere, uel gluti-
nare, uel inducere cicatrice tentaret: ad eundē
(arbitror) modū, etiā si sine phlegmone sola im-
temperies subsit, nullū horū fore prins sperabi-
mus, quā illa fuerit sanata. Cauenda tamen sunt in
terim immo dicē cum calfacientia, tum etiā refri-
gerantia. Ergo hyoscyamū, mandragorā & ci-
trā, ceu supra modū refrigerantes herbas uita-
bis: tamen siccat ex quoque, quantum sit ulcere ex-
usia. Refina uerō & pix, & asphaltus, quāquā
modicē siccant, immo dicē tamen sunt calida: ideoque
eis solis utetur nemo, nec aliter, nisi admissis cū
leuiter refrigerantibus, unū ex omnibus medi-
camentis fecerit, quod sit temperatū. Inspectiunda quoque
est & acri non circūdantis temperies. Siquidem
ueluti medicamentū quoddam is etiam corporis
nostris forissecus incidens, ubi immo dicus ca-
lore, uel frigore est, sanationē morat. Danda igitur
opera est, ut medicamentū eius excessus occur-
rant. Ideoque Hippocrates in calidioribus anni tem-
poribus, ipsi quibus frigidiore facultas sit, medica-
mentis utitur, calidioribus per frigidiore. Iam ue-
rō quomodōdū humidior natura, humidiora,
sicciore sicciore medicamenta exigebat: ita nūc,
calidior calidiora, frigidiore frigidiore requirit:
contrariā scilicet semper ipsi, quae praeter naturā,
& quae secundū naturā sunt, indicationē praestā-
ribus. Quippe quae secundū naturā sunt, similis
sibi indicantia sunt: quae praeter naturā, cōtrario-
rum: si modū illa seruari, haec submoueri est ne-
cesse. Quod uerō ad cōtrarias indicationes per-
tinet, si quantum acri temperamentū iusto est hu-
midius, tantū particula iusto sit sicciore, tale adhi-
bendū est pharmacū, quale si ulcus in mediū tem-
peramentū particula, corporis medio criter tem-
peratū cōsisteret, adhiberemus. Sin autē particu-
la fuerit sicciore iusto, quae corporis temperamentū
sit aequo humidius: utique in tantū intendi siccita-
tem medicamentū cōueniet, quantum particula cō-
trariā, rōnis temperamentū excedit. Veluti
si exulcerata pars, quatuor numeris sit sicciore
medio temperamento: acri autē natura gradibus
tribus humidior: manifestū est, particulam quae
eius exulcerata est, siccius uno gradu desiderata
tūram medicamentū, quae sit temperata particu-
la. Simili modo & de alijs excrecentiis licet ubi
ratiocinari. Porro sicciore particulae sunt, quae
minus carnosae existunt: cuius generis sunt, quae

Medicamentum cuiusque
morbi aptum,
quasi dicitur.

Vlcus resli cura
ri non possit, ni-
si subiecta caro
pro naturali mo-
do se habeat.

Vlcus resli cura
ri non possit, ni-
si subiecta caro
pro naturali mo-
do se habeat.

Vlcus resli cura
ri non possit, ni-
si subiecta caro
pro naturali mo-
do se habeat.

Naturaliter se
habentia corpo-
ra, similia sibi:
praeter naturam
autem, contraria
postulant.

Sicca partes
quo sunt.

circa digitos articulosq; habent: præterea, quæ circa uires, nasum, oculos, & dentes consistunt: atq; ut semel dicam, ubi erubescit cartilagine, & membranulæ, & ligamēta, & ossa, & nervi ad sunt: a deps uerò & caro, uel omnino nulla est, uel per exigua. Ordo autē curandi ulceris fordidi & caui, à forde expurganda oriet, cum nec glutinari quicq; nec carne impleri possit, priusquā purum fuerit. Secundū locū exigit cauitatis sanatio. Tertiū, cicatricis obductio. Quod si unā cum illis 10 uel phlegmone, uel erysipelas, uel gangræna, uel intemperies aliqua simplex cōpositaue, partem infestā, nisi quæ prius eam sanauit, ulcus imple-re carne nō poterit. Carnis siquidē generatio, ex subiecta, quæ sana est, ortū ducit. Ex ea uerò quā premit phlegmone, quæq; intemperata est & ægrotā, gigni caro noua non potest. Etenim iusta subiectæ carnis temperies, causæ rationē habet: ut quæ cōderescere fecit, quod ulceratū est, faciat, & cauitatē impleat. Puritas ulceris, rationē eius 20 sine quo nō, atq; hanc sordes interpellans, curationem morā. Habet autē & ulcus ad cauitatē, rationē eius sine quo nō: quandoquidē si ulcus cicatricis fuerit obductū, nō amplius cauitas imple-ri carne poterit. Ergo si phlegmone, & caui-tas, & ulcus, & sordes, in eadē particula simul ad sint, primō phlegmonē, secundo loco fordem, ter-tio cauitatē, & quarto ulcus sanare oportet. Cæ-terū affectus unde primū maximeq; imminet

affectu liberū, siue recena, siue antiquum sit, can-dem semper curationē desiderat: nihil tempore prium iudicantē discrimine eo, quod à tempore sumitur. At si cauitatē alitē reconditā sub cure ha-beat, considerare oportet, utrum ea in superiore parte sit sita, ut sanies ex ea prona effluat: an in inferiore, sic ut illic sistat. Eius igitur cui effluxus patet, eadem quæ aliorū curatio est. Cui nō est, huic ipsi moliamur effluxum quendam oportet. Eius duplex ratio est: aliās tota cauitate defiecta, aliis in fundo tantū aperta. Quando uerò harū alterutra sit incunda, docebit tum lo co uel ipsa na-tura, tum uerò ulceris magnitudo. Si namq; & lo-ca ipsa periculosam sectionē faciunt, & ulcus ma-gnū fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin contrā se habeant, pericindere præstat. Deliga-tio uerò eius incipiat quidē superne, sed finiat in frā, ubi scilicet parit effluxus. Iam uerò trāuersa ulcera, quod eorū labra, magis dīfideat, ita selety abint, diligentius cōiungi possunt: ideoq; tum futuris, tum sibilis, in eis est utendum. Quæ uerō per longiorē mē musculorū sunt facta, hæc si duplici initio deliges, nec futuris egebis, nec si-bilis. Sin aliter deligare placebit, uel sibilis, uel futuris utere. Sufficiet autē paucissimē omnino futuræ. Et magna quidem ulcera, iis quæ ualen-tius siccant medicamentis curabis. Parua uerò, uel quæ moderate siccet, abundē sanauerint. Cæ-terū profunda ulcera, eadem etiā sunt magna, uoluntq; tum à duobus initis deligari, tum uerō nec labra sua præpropere glutinari. At quæ profunda multa, longaq; sunt, ut duplici ratio-ne sunt magna, sic duplicē quoq; præstant indi-cationem. Itaq; & quæ ualentius siccant possunt, & nec immaturē labra coniungas: & ut à duobus initis deliges, & ut alius futuris consuas.

GALENI PERGAMENI de methodo medendi lib. IIII.

Si itaq; unum morborū genus, diuortium conuincit uocatū: quod quidem in carno-sa parte, ulcus: in ossē, fractura: in neruo, cōuulsio appellatur. Eiusdem generis sunt aul-sio, ruptio & contrusio: illa quidem in ligamēto, hæc in uasis musculisq; ex uiolento ictu, uel gra-ui casu, uel alio quopiam ualente motu excita-tæ. Ecchymosis uerò ut plurimū unā cum con-trusione & ruptione incidit. Fit autem aliquando & ex oris uasorum a pte, quæ anastomosif dicitur, & ex ea quæ diapedinit uocant, & ip-sam existentē solute continuitatis aliam spe-ciem. Iam uerò & ex erosione etiam soluitur in-terdum in animalis partibus cōiunctas. Verū is iam mistus affectus est. Porro eorūq; intrinse-cus ab ipso animali proueniat, a iustis succi est so-boles: sin extrinsecus, aut à ualentibus medica-mentis: sin ab igni. In uniuerso autem, sim-plices affectus à cōpositis distinguere oportet, cum simplici morbo simplex curatio à disribenda 60 sit, composito uerò non simplex. Igitur omne ul-cus, aut solū atq; per se, nullo nec cum eo simul inuadente, nec ipsū præcedente, aut sequente alio affectu, partē infestat: aut cum alio quoq; uno, pluribusue coniunctum: quorum alij, non modō statim ab initio excitarūt ulcus, sed nunc etiam

Vicinis foridus et
caui cordis me-
thodus.

Carnis genera-
tionem ex subie-
cta carne, si san-
a sit, fieri.

Puncto capite
musculi, si cōuul-
sio erit, ut in
mediculis sin-
dendans esse co-
gitans, et si san-
guis in.

Sanguis in flava-
tem immutatus,
supponit, si per
transversum to-
tus vas præci-
datur: uel in ca-
uam tunc pissa
sanari nō possit.

Nervus quando
transuersum secū-
dum.

Luxatio cum vi-
cere quando de-
bet infans a
vulnere.

Differentia uel
line potest, quod
per se consistere po-
teat.

Vicinis simplicis
differentia pro-
pria uide jamā
tar.

Effluxus molis
de ratio in ip-
so uero quæ ap-
erit expurgari
possunt.

Deligandi vici-
ni ratio.

Transuersa ul-
cera diligenter
quoniam uel in
genda est.

Vicinis solutio.

Vicinis.
Fractura.
Cōuulsio.
Aul-sio.
Ruptio.
Contrusio.
Ecchymosis.

Anastomosif.
Diapedesif.

Erosionis causa.

etiam maius efficiunt: alij, eius siue quo uon, ut ad curandi opus, rationem obtinent. Cæterum qui ulcus maius efficiunt, submouendi è corpore sunt, aut perueniendū id, quod inducitur, in eodem. Hoc autē, si affectus exiguis sit, fieri libet facile: si uerò magnus, duco ad cicatricē ulcus non poterit, priuilegiū illi affectui subueniē fuerit. Ergo omne ulcus subiectū sibi carni præ datum naturali dispositione, optat: & ne quid alienum inter oras cōglinuandas interfit, quod curationē morari possit. Subiectæ uerò carnis affectus, causæ rationē obnnet, ad id quod efficitur. Quippe ex hac, & per hanc, tum quæ dissi dent, glutinantur: tum quæ causæ sunt, carne imple ntur: quare pro natura sua se habere oportet, quō uicē utraq; cōmodē perficiant. Rectē autē il la se habuerit, si propriū temperamentū tueat. Itaq; necessum est ad ulcera tum glutināda, tum carne implenda, temperatam esse subiectam car nem. Nec sat hoc ipsum uidetur esse, nisi enī qui affluit sanguis & probus sit, & quantitate mediocri. Quippe ægrē sanabimus, rebelliumq; ulcerum, alia ob intemperie carnis exulceratæ, alia ob affluētē humorē sunt talia. Caro autē ipsa interdum solis caliditatis naturæ modū egreditur, interdum accedente tumore præter natu ram. Iam humor consuetus, aut qualitate aut quantitate, è naturæ modo didicet. Inuertum uerō miscetur dīctorum affectuum, aut ali quī, aut etiam pariter omnes. Ac carnis quidem intemperie, si squalens siccāq; uideatur, aqua temperata fouens humectansq;, donec rubeat, attollatq; in tumorem, corriges. Si uerò ultra perfuderis, id quod attraxisti euocabis: ac proinde nihil proficietis. Quinetiā medicamēta humidiora, q̄ sanæ carni, adhibeant. Si uerò humidior q̄ pro naturali labitu caro fuerit, contra rariā ineunda est, ac medicamentorū fiscalitas ad siccitē transferenda: aqua uerò uallatenus ad mouenda: sed si lauandum ulcus uidet, uinū, aut poscā, aut decoctū aulteris cuiuspiam herbæ, præparandum. Eodem modo & calidiorē q̄ par est, carnis habitum refrigerabis, & frigidiorē cal facies. Agnosces uerò horū utruq; partim colore, partim tactu, partim laborāna sensū. Quippe aliis uisionem se sentire fatentur, aliis manifestum in particula frigus: gaudētq; uel frigidis medicamētis, uel calidis. Et alijs quidem rubor leuis infidet, alijs color magis albidus. Partim por tō quæ cum aliquo præter naturam tumore exulceratæ sunt, earum prius sanandus est tumor. Vbi labra tantūm ulceris decolorata durūse plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam usq; carnem. Cōm uerò altius id malum serpit, deliberatione est opus, excidendū ne omne sit, qd præter naturam cernitur, an temporis spacio curandum: quā in recertē consulendus etiam est æger. Iam uerò si prauus humor in particulas cōfluens exulcerat, nec uberior sit uisito, nec multum excellat malignitas, aucti hunc, atq; repel li cōueniet: attritus scilicet, refrigeratiq; pars particula, quæ ante exulceratā consistunt. Inchoan da etiam deligatio est à laborante particula, deducen dūq; uersus sanā. Quæ autē ulceribus ipsis ad mouenē phar maca, siccant ualentius oportet,

quā quæ simplici applicantur ulceri. Quod si fuit, cōpesciq; medicamentis influxum nequeat, causa eius inuestiganda est, atq; hæc prius adimenda. Ac si quidem ob partis, quæ fluxum reci pit, imbecillitatē aliquam id conngat, huic nimirum medendum est. Imbecillitas autē partis, omnino ab intemperie nascitur: nō tamen ab omni, sed ab excellentiori, quæ sanē per contrariū est abigenda. Vbi igitur intemperie ipsam sanaueris, te ad curandū quos uerteres: intem perie nunc curata intemperie, q̄ si incidisset citra ul cas. Si uerò ab alia quauis particula, uel etiam à toto corpore, uin olus aliquis humor influxerit exulceratis particulis, medendum in primis est ipsius fluxionis radici. Ita igitur & uarices, quæ sæpe supra exulceratū locum sunt, prius sanabimus, ut deinde mox ulcus sanemus. Aduertendū autē est interim, nullam primū uarū causā, quā procacitatis uocant, nisi etiamnum affectum producant, esse curationis indicatricē: sed huius indicationem, ab ipso affectu innum habere. Siquidem à nullo eorū, quæ adhuc non permanent, indicano non sumitur, utiq; uisufurum sit, potest. Est tamen utilis causāq; procacitatem cognito, ad noscendos affectus eos, qui tum rationē, tum sensum latent. Est itaq; ei quidem præsentis curatio: futuræ autem, prouidentia. Quod uerò nec nunc ledit, nec læsurū ti metur, id ab utroq; artis munere, tum eo quod curat, tum eo qd prouidet, excipit. Quare nec indicano ab hoc ad curandam ulla, nec prouidentia ratio sumit. Si igitur à procacitica causā indicano curationis non sumitur, utiq; manifestum euadit, quod ab ea quæ præsens est, sumitur. Cæterum prospectrix pars artis, est duplex: altera, quæ morbosum affectum iam præsentem submouet: altera, quæ illum qui uondum urget, prohibet. Potrō cōtingit ulcera uō sanescere, inter dum quidem ob labra ipsa pēsimē affectā, inter dum ob intemperiem particulæ, ab ipso uulnere præter naturā: nonnunq; ob intemperiam quidem, sed quæ cum tumore aliquo sit cōiuncta, nō tamē qui omnino sibi labra excidit potest. Fieri etiam potest, ut superiacet uarix, uel auctior len, uel aliqd uinū iecunior, uel imbecillitas exulceratæ particulæ (quæ ipsa quoq; intensā quædam est intemperie) uel totius corporis cacochymia, uel plethora, ut ulcera minus sanescant, prohibeat. Quare causā ipsā, quæcūq; illa sit, circuncidenda uenit. Iam uerò ulcus omne cacothē, hoc est, malignantis naturæ, continū & cauum sit est necesse, cū ex erosione nascatur. Nunq; autē id genus ulcera, sicut uerq; alia ulla, calido acriq; medicamēto exalperet, priuilegiū uniuersum corpus à recrementis liberet: quemadmodū faciebant impetiginosus Theasalus. Quippe eiusmodi medicamenta omnia, curantibz ritu ad se trahere à toto corpore sunt inabilia. Itaq; nisi id prius uacuatis, materā fluxionis acni medicamēto relinques. Etenū quod nec rectē sanare oculū ante rotū caput, neq; hoc ante totū corpus, ulla ratio ne licet, tum philosophis tū medicis ualentibus, qui methodo mederi sunt soliti, est in cōfesso. Voco autē methodū, certam quādam uniuersalemq; uiam, quæ sit omnino

Imbecillitas par tis ab intem perie nascitur.

Varices prius sanandæ esse, quoniam uicē ab eo fluxum recu puit.

Indicatio uirtutis nulla sumit ne à causā uō perma nentis. Procacitica causā uō cōfessū uis.

Indicatio curationis à causā præ sentis sumitur. Prospectrix artis pars duplex.

Vlra sanescere quæ prohibeant

Vlcus curando quæ requiritur.

Vlcus carnis cur tabernaculi

Carnis siccitatem intemperie, quomodo corrigenda.

Carnis humiditatem intemperie, quomodo corrigenda.

Carnis intemperie quomodo corrigenda.

Vlcus labra quando excidenda sunt. Ager quid sit consilium.

Humor in partem calidissimam exulcerat, quomodo auctiūdo & reprimendū sit: & quæ ratio.

*Methodus est cer-
ta quædā et vni-
uersalis via, om-
nium particulari-
um communis*

*Vitæ cacoethis,
qua ducuntur.*

*Vitæ diuturni-
tatis est facta vi-
tæ indicatio.*

*Vitæ omnis, quæ
viciū est, et sa-
næ, mediocri-
ter excitari po-
tuit.*

*Putredinem ori-
ri a calido et hu-
mido.*

*Pus mouetur
qua sentit.*

*Inflammationi
per adhiben-
tiam cataplasma-
ta calida et hu-
mida.*

*Hordii farina
dolori mitigat.*

particulariū cōmunis. Ceterū notitiā quan-
dam habere oportet, tum similis, tum dissimilis,
qui methodo quidulā molitur. At uerō, etiāsi
in singulis morbis priuata quædam esse metho-
dus medendi uideatur, cōmune tamen genus in
omnibus unum existit. Quippe in omnibus cu-
rationibus, unum est methodi ipsius principium,
quod ab affectus indicatione sumitur: utique etiā
quæ ab eo principio ad finē usque perducit, est in
omnibus particularibus similis. Quæ igitur ulce-
ra, omnibus ritē decenter factis, nō sanantur,
ea medici cacoethē, hoc est, maligna, contuma-
cia, rebellisq; uincunt. Protrahuntur autem,
ubi quis illas, perinde ac si tantū ulcera sint, me-
detur. Ceterū ex diuturnitate ipsius ulceris, indi-
catio curationis nō sumitur, sed ex ipsius particu-
larē affectu. Si ergo tantū exulceratæ partes af-
fectæ sint, si eas curaueris, cōtinuū sanaueris ul-
cus. Sin uerō uniuersum corpus prauo succo re-
dundet, si hūc euacaueris, idem haud dubiē me-
lieris. Ac signū quidem uitio si succi, est ipsa diu-
turnitas ulceris: inuentio autem eius quod expe-
dat, non ex diuturnitate, sed ex succi uitio sugge-
ritur. Quare tria hęc sibi mutuō colligunt, signū,
affectū, & curatio: si genus quidem, ipsa diuturni-
tas: affectus, succi uitium: curatio, eius uacua-
rio. Veteres autem, utpote breuitatis studiofissi-
mi, prætermisso medio, interdū tertium statim pri-
mo subijciunt. Veluti Hippocrates fecit, cūm di-
xit: Tum ab inueteratis ulceribus confert ut al-
bidus sanguis effluere facias, utcumq; id oppor-
tunum uidetur: non utiq; curationem indicante
diuturnitate, sed sanguinis uitio. Porro omne ul-
cus, quā ulcus est, ut sanetur, mediocriter exciri
postulat. Si uerō etiam habeat secum affectum
alium cōiunctum, primō quidem illius curatio-
nem: secundō autem, suam propriam requirit.
Sed de curatione ulcerum, sic uerba fecit Hippo-
crates: Quodcumq; ulcus cæsum, peruerfime ac-
cuto telo est diuisum, medicamentū enacmon, &
siccans, & quod suppurari uetet, admittit. Sin ca-
ro aliqua telo tum confusa, tum cæsa sit, huic ita
medendum est, ut quicellerrimē suppuret. Nam &
minus phlegmonē urgebitur, & necessum est
carnes, quæ cōtuse cæsiq; sint, putrefactas & in-
pus uersas, liquare, postea nouam carnē produci.
Quo quidē sermone non docet, oportere omnia
ficcari, præter ea quæ sunt cōtusa. Porro omnia
quæ putrefiunt, ex calido & humido sic affi-
ciuntur. Ideoq; etiā ea cataplasmata quæ ex hor-
dei farina consistant, ceu quæ calificant hume-
fcentiq; omnibus nō affectibus, quibus moueri
pus expedit, admouemus. Hordii namq; farina,
ex aqua & oleo sitemq; panis, ex aqua & oleo: præ-
terea sementis mulæ calidæ aquæ & tetraphar-
maci us: omnia deniq; calicienna simul & hu-
meantia, pus quicellerrimē mouēt. Sciendum ta-
men est, admoueri cataplasma calidū atq; humi-
dum inflammationi, haud quidem tantū remediū
ipsius (phlegmones namq; remedia facultatē fici-
tiorē possident, ut uerbisq; cōstitū, & folia triso-
lij cruda, & epipatri folia cocta, & polium) sed ut
lenimen quoddā symptomatis. Ac proinde hoc
dei farina, lenit quidem dolorē, minime autē me-
detur inflammationē. Igitur uel prauus succus nō

amplius confluit ad partē exulceratā, aut etiam
non fluit. Si nō amplius fluat, ipsi tantū quod la-
borat, est succutendum: si quidem uel liuidum,
uel nigrū, uel rubrum conspiciatur, scarificandū,
ac sanguinē emittendū, mox spongiam ficiore
potius q̃ humidiorē superimponendo: post hæc
uerō etiam ficcantia remedia applicandā. Ab his,
si res postulat, rursus sanguinem auferendo, ac
mox iterū eadem peragendo, donec parsa sani-
tas sit. Quod si labra ulceris dura, callosaq; appa-
ceant, etiam ex cindendo. Si si aliquid humo-
rum ad partē fluat, fluxionis est occurrendū ori-
gini. Si uerō ualens aliquis morbus, unā cum ui-
riū robore affligat, uel si redundantis sangui-
nis concursus nō adsit, nemo est qui nō sangui-
nem detrahatur, qui utiq; in artis operibus fuit
exercitatus. Quippe sanguinis redundantia hæc
quāq; sanguinē esse mittendum indicat, sed ma-
gnitudo morbi unā cū uirtute uegeta: exceptis
tamē & sermone pueris. Etenim si quis etiam nū
sanus, nec adhuc quicquid læsus, sanguinis redun-
dantia grauetur, non statim huic mitti sanguinē
est necesse: imō alij satisfaciē inedia, alij cibi par-
ticipia, alij soluta alijs, uel purgatio, uel frequen-
tius balneum: alij sola exercitatio, uel multa tri-
stio, abundē fuit. Sed nec purgatio in sola uitio-
si succi abundantia cōuenienter administrat, ni-
si etiā magnitudo ipsius morbi sit ipsi cacoethi-
mæ cōiuncta. Sic enim ulceribus partis præstan-
tibus, omnibus quoties ualida sunt, purgationem esse
uilem est professus Hippocrates, quōd nimirū
& insigniter uacuet, & ad diuersum trahat. Vni-
uersa autē uita, intransiū grana ualidāq; reddun-
tur: nempe uel propter afflicte partis præstan-
tiam, uel propter affectus magnitudinē, uel pro-
pterea quōd sint cacoethē. Vultus igitur quod
intra thoracē, peritonijq; penetrat, nō parū
periculum adfert, præcipue si interiorū quæcūq;
sit simul conuulsiō. Quinetiam cacoethē ita
tim fieri, quæcumq; in articulis accepta uulnera
sunt, id quoq; omnes ferē sciunt. Vbi enim ten-
dones, & nerui, & carne uacua, osculentāq; sint
loca, hic doloris, uigilium, cōuulsiōis, & deli-
rii periculū inuit. Tum hæc igitur uulnera, tum
quæ adeo sunt magna, ut futuris aut ligaturis
in digeant, purgationem desiderant. Ad hęc, qui-
bus periculum corrumpeodi oisā impendit, ex
utiq; non sunt absq; magnitudine phlegmones.
Quæcumq; uerō excedunt, ea tum cacoethē sunt,
tum malorum succorū soboles. Herpes quoq;
a bilioso excremento ortū habent: cetera alq;
diuturna omnia, ex huiusmodi quāpiam causa
proueniunt. Quare in omnibus his meritis purgare
per alium iubet Hippocrates. Si igitur ualenter
etiam tum fluxio irruat, reuellere ad cōtraria itū
debimus: unque si in superioribus ulcus consi-
stiat, per inferna purgantes: sin autē in inferiori-
bus sit, superiorem uentrem uacuantēs. At si iam
fluxio resistit, atq; in membro inhiæt, detrahare
per uicina magis expedit: cū & in propinquiora
translatū, & purgantū medicamentum tum acce-
sus, tum attractus, & uicino, sit promptior. Ma-
gnitudo autem morbi, ceu scopus quidam san-
guinis detrahendi, aut purgationis adhibendæ,
& nobis cōstituenda est: Quæ sanē scopū inuenit
primus

*Sanguinem mi-
ttendum esse vbi
cuiusq; magnitu-
do morbi est co-
muni robore con-
spiciatur, uel si
sanguinem dicat
sua non adsit.*

*Sanguinem re-
ducendum nō po-
tuitate sed uirtute*

*Purgationem in
fili cacoethymæ
non administrat
si comendat, nisi
etiam magnitu-
do ipsius morbi
eam postulat.*

*Vitæ omnis ut
sanā quædam re-
ducatur.*

*Vulnera articu-
larū ualde ca-
cutiē.*

*Herpes a bilio-
so excremento or-
tuitur.*

*Reuulsione et
si ad contraria
loca multat.*

*Detrahens scilicet
est per uicina*

*Morbi magnitudo
dicitur esse scopus
sanguinis mitti
de purgatione
adhibenda.*

*Vitæ remanet
expulsiore rem
si autem finis seu
genu.*

primus omnium Hippocrates secundum cuius quidem sententiam, omni recens factu vulnere, nisi in ventre consistat, expedit ex ipso statim sanguine plus minime effluere. Quippe phlegmone sic minus tentabitur tum ulcus ipsum, tum quæ circumposita et loca sunt. Idem etiam confirmat, debere scilicet imitatore esse medicum, non tantum nature, sed eorum etiam, quæ cum sua sponte eueniant, conferunt: necnon conducere, si ab inueteratis ulceribus eorumque circumiacentibus partibus, crebro sanguis fluere cogatur. Porro quæ acuti sensus pars est, eam quæ maxime feruere citra dolorem tentandum. Quæ uero parum acuti sensu est prædita, hæc, si affectus ita suadet, ualentiore præsidia admittit. Rursus principes qui de eam membri robur seruari oportet. Quod tale non est, licet huic adhibere et relaxantem dendi rationem. Quod uero ad positum pertinet, si ventriculus fuerit exulceratus, medicamenta bibenda sunt. Si gula (quæ transiit comestorum bibitorum) est non semel, nec tota simul sumenda, sed paulatim, assidueque lingenda: & sanè tum crassiora, tum magis lenta esse debent. Nam ex transitu contractus, vulneribus quæ illic habent, emolumentum accedat. non ex continendo, & diutius adhibendo: sicut ipsæ quæ in uentriculo sunt. Quæ uero ulcera in crasis sunt intestinis, ipsæ quæ per sedem iniquitè remedijs magis egent: quippe cui magis sunt propinqua. Quæ in tenuibus habentur (quoniam & longinqua sunt, & medio situ posita) ambo requirunt, & quæ superne sumuntur, & quæ infunduntur per sedem. Communis autem eam omnium internarum partium est indicatio, ut ea elegantior, quæ animalis nature maxime sunt familiaria, siue cibi sint, siue medicamenta: fugiantur respuanturque his contraria. Quamquam in ipsæ quæ foris sunt ulceribus, innoxios etiam talium medicamentorum sit usus, æruginis, æris uisti, æris squame, cadmie, pompholygis, lithiargyri, argenti ceruise. Hæc igitur & similia, interioribus exhiberi non debent. Eligenda uero alimenta sunt, si quidem ad cicatricem perducere, aut ulcus glutinare studemus, tum austeria, tum glutinosa, & quæ minimè rodant. Quæ emundare, quæ modicè abstergeant: quod minus mel non coctum, præter cætera præstat. Ac uocò sanè austerius, id quod astringens dicitur: ut acerbum, quod impenitè est austerum. Ergo internis ulceribus opulantur, hypocistis, balauftium, puniceorum cytini, galia, malicoruli, terra Samia, Lemniæ sigillum, rhois, rosarum succus, acacia, aliaque id genus, quæ citra incommodum uiscerum, præditiu internis uisceribus afferunt. Danda uero hæc sunt, ex aliquo astringenti decocto, uel mali coronei, uel lenitici, uel clauiculi rubi, uitisque, uel myrtorum, uel denique ex uino aliquo austerio. Cauendum tamè à uino est, ubi phlegmone suspicio adest. Sunt autè & præparanda id genus medicamenta, cum eisque miscenda etiam, tum tragacantha, tum gummi: præferim si ob gule ulcera exhibeantur. Sed & gargarizare quoque iubendus est, qui ad fauces & paritissima his uteretur. Ad uiscus autem quod in aspera sit arteria, ut supinus quiduisime in ore teneat, ac omnes qui illic sunt musculos laxet, remittatque, præcipiendū in-

*Gula exulcerata
medicamentis
officiis paulatim
officiis paulatim
officiis paulatim.*

*Insignis randa
randa que modo
faccit uiscum.*

*Interi qua propi
nanda non sint*

*Mel erodum.
Austerum quod.
Acerbum quod.
Viscerum internarum
partium
qua præstis
medicamenta.*

*Vinum fugien
dū esse, ubi phle
gmone suspicio
adest.*

*Aspera arteria
ulceris: qua ra
tione medicam
fi.*

fluit nanque sic sensum & paulatim de medicamento aliquid sensibilibiter & manifestè in ipsam arteriam. Nam & cum naturaliter sese habet, scire licet potionis non nihil illuc percolari. Semper autè cauendum est, ne largius quicquid & per mediam spiritus uiam, infusetur alioqui excitabit tumorem. Iam uero medicamentis omnibus, quæ thoracis & pulmonis ulceribus sunt destinata, mel admiscendū est: quod quidem digestionis eorum in corpus, ac celeris transitus, uelut uehiculū erit, cum eo, quod neque noceret ulcere. Ad eundem modum, quoniam in uiscis & renibus consistit uiscum, non solum mel ipsum, sed etiam diureticorum aliquod ulcerum medicamentis miscere oportet. Cæterum partes exulceratas, tum ex earum substantia, tum functione, tum utilitate, tum positu, tum figura, faciliè discernuntur. Itaque non modò illa quæ diximus, sed etiam complura alia, ex figura partium, positiualiter indicantur. Etenim cathetere omnino probè uti nequeas, nisi & positum, & figuram totius uelice planè perspicèam habeas. Ergo in hisce omnibus non parum ad totam curam locum affectus indicat. Porro ualentiora medicamenta requirunt, affectus in alio delitescens corpore, quam qui in summa superficie consistunt. Ecchymosis omnis, uacuationem pro curationis remedio indicat. Quare callidè huius, & modicè siccanibus medicamentis est opus. Quod si ecchymosis altius descendat, non fuerit usus cucurbitulæ in utilis: quod quidem instrumentum tunc à medicis, ad uolentiam attractionem ex cogitatur. Ergo si enocata celeriter ecchymoma sit, faciliè coalescat rupta ipsa caro. Sin longiore spacio, sordes multa subnascens, medium inter uiscus labra spaciū occupat, ita ut iam coire ruptio non possit, sed tantum ipsa labra propè admoveantur.

GAL. DE METHODO MEDENDI LIB. V.

Monitum igitur est, omne ulcus siccatum medicamentum requirere. Cæterum quod finem habet, ut minus sanè quam reliqua, sic ea quæ præterquid quoddam modicè siccant, etiam abstergendi facultatem possideant, desiderare. Quod uero coniungi sibi labra postulat (cuiusmodi sunt cruenta) huic tum quæ magis etiam siccant, tum quæ citra absterfionem leuiter astringant, esse opus. Iam quæ ulcera per duci ad cicatricem postulant, hæc non solum magis adhuc siccanibus, sed etiam strenuè astringentibus remedijs egere. Quod si caro eorum præter nature modum intumuit, acris & demolentia desiderare. Si quod uero aliud symptoma ulcere adiunctum erat, ab eius natura curationis indicatio fumebat: atque ex hac rursus petebatur remedium facultas. Si namque sordes innasceretur, quæ hanc tollerent opus esse: eamque omnia abstergendi uim habere, multò sanè maiorem, quæ ea quæ carne impleant. Ac si agglutinatorum medicamentis esset, siccanis, astringentisque esse debere. Si carne impleturam, siccanis & abstergens: atque in singulis reliquorum, unum dictum est. Si uero in temperata subiecta caro esset, primum per contraria succurrendū esse illius intem-

*Potius non nihil
semper in as
peris delati as
serui.*

*Mel permiscen
dum esse meli
mentis quæ
alioque positi
no: uelut an
stomat.*

*Duratiorem
aliquod, melque
ipsum miscenda
esse medicamen
tu quæ ad uiscu
cam & ueni fa
ciliè emulsa
bit.*

*Affectus in alio
fieri, ualentiora
medicamenta re
querre, quam
qui in summa
superficie consi
stunt.*

*Ecchymosis cura
tis.
Cucurbitula
ut.*

*Vitæ casu uo
dici scilicet nec
non derogetia
possit.*

*Quintissia me
dicamenta qua
la nam esse de
bent.*

*Cicatrice in do
mentis medica
mentis qualis of
fi oportet.*

*Extrahere caro
quali requirit
medicamenta.*

perant. Nihil siquidem redire ad propriam naturam potest, sine quo ipsi facultatē habent contrariam. Considerandas præterea esse & ipsius in temperantia causas: ac primū quidem medendum esse causis quæ adhuc temperiem fouerēt: post hanc uerō, & ipsi quæ iam facta esset intemperantia. Ostendimus autē, tum ab ulcero differēt tjs diuersas indicationes præberi, tum eas quæ ab laborantis corporis temperamento sumuntur, diuersam ab his habere rationē. Si quidem illic, cum ex ijs, quæ sunt præter naturā, sumant, omnes contraria esse adhibenda dicunt: hæc, cum ab ipsa natura capiunt, similia. Nec illud omisit, ex præcellentia membri, aut contrario statu, itemque sensu acri, hebetere, diuersum medendi consiliū peti. Cum autē non modō in similibus, sed etiam in organicis partibus solutio cōtinui oriatur, remediōrū indicationes alijs quidem à similibus, alijs ab instrumentalibus desumunt. Cæterū quandoquidem satis superque de ijs ulceribus, quæ in carnosissimis accidunt partibus, differuimus, temperatiū uideretur nunc de illis agere, quæ in arteria, uena, & neruo contingunt. Ergo si cui arteria, uenāque magna sit uulnerata, copiosum sanguinis profluvium subito superuenit, & glutinari id uulnus difficile quidem in uena potest: in arteria autem (sic nonnulli medicorū est uisum) fortasse omnino nō potest. Sanē profluit ex uena aut arteria sanguis, aut reserato earum ore, aut tunica earum diuisa, aut transcolatus, siue sudoris instat transfusus. Porro diuiditur ipsa tunica, aut uulnerata, aut cōtusa, aut rupta, aut erosa. Anasomosis (hoc est, reseratio) accidit, propter tum uasus imbecillitatem, tum sanguinis qui ad os eius impetu ruat, copiam: ad hæc, acrem quampijs, quæ illi extrinsecus incidat, qualitatē. Diapedesis uerō est tunica rarefacta, & attenuato sanguine oritur. Accidere tamen potest, & ob graciliū uasorū os adaper tum. Quæ igitur uulnerant, ea sunt acuta, atque ad secundum habilia. Quæ cōtundendo soluit, dura grauius existunt. Quæ rumpūt, omnia tensio nis interuentu id faciūt. Idem & intensior actionis uehementia facit: tum plenitudo illa quæ respectu uasorū dicitur, tum casus ab alto, necnon graue quippiā durumque incidens. Ac si ex uulnere, uel dolore, uel casu, uel obusione, perruptū uas sit, unguē in ijs causa ipsa desinit. Si uerō ex abundantia, fieri potest ut uas etiam amplius rumpatur, effectrice saltem enīmmum causa manente.

Quare in tali affectu, si primū est ipsa plenitudo uacuanda: dein supprimendus sanguis: ac demū ulcus curandū. Vbi uerō effecrix causa iam desinit, primū quidem sanguis sistendus est, ac mox ulcus sanandum: idque obturatio perrupto uase, translatoque aliorum quod per id ferebatur. Porro ulcus ipsum claudet, uel labris eius, quæ dissi dent, in idem adductis, uel osculo ipsius obturato. Adducēt in idem labra, tum nostrarū manuum opera, ubi sic ad manus uasus se exhibent: tum per deligatur, tum per refrigerantia astringentia remedia. Neque enī suere fas est, arterie uenæque uulnus. Obstruere uasus osculū & sanguine ipso cōcreto, & ijs quæ foris illi admo uentur emplastris liuimentisque: necnon igne, & me-

dicamentis inducentibus crustam. Potest etiam superimponi ulceri circūcissus caro, atque ipsa in nonnullis uulneribus cura. Auertitur autē sanguis, tum ad proxima deriuatur, tum ad contraria reuulsus. Deriuatio ad uicina loca fit, cum id quod per palatum uacuatur, deriuatur per nares: reuulsio autem ad contraria, cum ad inferna reuellitur. Rursus, quod per sedem profluit, id deriuamus per uulnā, sursum uerō reuellimus. Ita nāque & natura ipsa facere solet. Mulieri enim (inquit Hippocrates) sanguinem uomentis, mensis superuenientes remedio sunt. Hac de causa, si nel mensis cōfertim eruperint, uel sanguis ab utero quoquo modo profluxerit, sursum reuelles, cu cubitā maximā suffigens ammis. Eandem ob causam, si ex dextra quidem nare profluat sanguis, eum tennet maxima cucurbitula hepatis admodum. Si ex sinistra aurem, ueni. Quæ admodum si per utrumque fluat, utriusque uulsi cucurbitulæ applicandæ sunt. Quod si resolutus adhuc æger non sit, etiam uena ex eodem cubito incidenda est, qui profusio nē directo respōdet. Cæterū ubi paulum detraxeris, mox unam horā inmittens, rursus detrahes: post iterū atque iterum, pro laborantis uiribus. Ad eundem modū, quæ per alium fluunt, ea uel per urinas, uel per uterū deriuabis: quæ per urinas, ea nel per uterum, uel per sedem transferes. Pari modo, quæ per uterum erumpunt, uel per urinas, uel per aluum. Quæ uerō in oculis, aure, uel palato, fluxiones accidunt, earū ad uicina deriuatio per nares est. At reuulsio in ijs quæ supra sunt omnibus, deorsum semper agitur: sursum in ijs quæ sunt in frā. Præterea à dextris ad sinistram: sicut ab his rursus ad illa. Similiter ex ijs quæ intus habent, ad ea quæ foris sunt: contraque ab his, ad illa. Ergo & fræctio contrapositæ partis, ponisum per ea medicamenta quæ calfaciant: præterea uincula arctiora, ijs quæ ad contrariū reuocant remedijs annumeranda sunt. Non secus profectō, & narum alium meatu qui positi ex aduerso sunt, reclusio. Porro uinculū ipsius profluentibus uasis iniectum, fluente sanguine sistit: nostrū similiter digiti appositū: arque adeo dissidentius uulnere labororū ligatio, quam epidesium uocant. Sicut autē particule uulneratæ sit talis, ut & spectet sursum, & ipsam indolentem conseruet. Si uas unde sanguis profluit, alius demissum sit, unco atollendū est, modicèque intorquendū. Quod si ne tunc quidē sistatur, ipsūque uas uena fuerit, supprimendus est cataplasmas quæ ex frica resina, & farinæ triticæ tenuissimū polline, & gypsio, alijsque id genus confecta sunt. Sin sit arteria, aut uinculo amplexet, aut totū uas præcedens, pro fluxui sit. Sed uinculum etiam inungere magnis uenis compellimur: interdumque transfusum totas præcedere, ubi ceterū ex profundissimo loco assurgunt, ac præsertim per angustias quasdam, uel per principes partes. Tutius tamen est utrumque moliri, & uinculū uasis radici inungere, & quod deinceps habetur, præcedere. Vasis radicē uero priorē eius partē, quæ uel iecinori est propior, uel cordi. His peractis implendū carne uulnus est, priusquā uinculū à uase decidat. Itaque sistendo sanguini longē sunt cōmodiora empla-

Sanguinem deriuari ad uicina, & reuelli ad contraria.

Mulieri muli seriem aduena cucurbitula mīma. Sanguis ex dextra nare fluxit, ut supponi, aduena cucurbitula hepatis: ex sinistra autē uena. Sed quæ per uterum fluunt, quæ per crura fluunt, quæ per crura fluunt.

Deriuatio modis diuersis.

Reuellendū ratio.

Fractio. Vinctula.

Epidesium. Uulneratæ particula sit. Sanguis profluit ex uasis demisso alium, quoniam de supprimendo.

Indicationes ab laborantis temperamento habere rationem illam, quæ ab uicemum differentijs sumuntur.

Sanguis quatuor modis à uas effluere potest.

Anasomosis uas ferunt unde accidit.

Diapedesis causa.

Secundum arteria aut uenam uas non effluat. Vasa aperta ob illius quatuor loca sunt posita.

*Sanguini sup-
pando ear com-
plexica sunt ap-
pura crustina.*

*Sanguini sup-
pando ear quom-
plexica sunt ap-
pura crustina.*

*Dolor omnis
maximi tunc ip-
sum profusum
excitat, si phle-
gmona aget.
Magna thorax.*

Tibum.

*Malitiae.
Cauterij causi
enq; in quib. co-
guntur rei.*

*Adherens si-
mul & affringit
na, qua fiat.*

*Crustis & can-
tibus affringentib.
excitatis, hae-
re duntur vices*

stica, & inducentia crustas: quâdoquidem in his
est uterq; dñ, ne ubi crusta decidit, rursum san-
guinis profusio ab ipso vase exciteretur, cum uas
magis nudatâ carne, q̃ pro ipsius naturali habi-
tu, derelinquat. Siquid generatio crustae, ex sub-
iectis fit, circumpositisq; corporibus semiuistis.
Optimû igitur omnîu quæ noui medicamento-
rum, quo etiam ad cerebrî membranarû, necnô
sphagindum uenarû hæmorrhagias tutissimè
utremur, est quo d subijciam. R. thuris partem 1.
Aloës partem 5. miscetur ita cum ovi candido,
ut perueniat ad frassitudinē mellis. Postea ue-
rò leporis mollissimis pilis excepta, tum uasi,
tum uniuerso ulceri, liberaliter admoveant. Ali-
gandum autē id forinsecus fascia est ex renui lin-
teo: cuius fasciæ primi quatuor quinqueq; am-
plexus, ipsi profluenti uasi inijciuntur, ducēturq;
mox uersus eius radicē: nisi in quibus partibus
id nō licet, ut in cerebri inuolucris. His factis, ubi
tertio die solueris, si tutò adhuc medicamen-
ulceri adhæret, aliud rursum superimpones, deli-
gabisq; ut antea, similiter. Quod si prius lina-
mentû decidit, impones alterum: ac sic, quoad
carne muniatur, curandū ipsum uas est: necnon
a principio ad finē usq; uulnera partícula, me-
dicocriter supina seruanda. Vitandum autē est ne
dolor incidat, ac rursum profusum excitet, cum
nihil sit quod profusum magis q̃ dolor pro-
teret, & phlegmonas augeat. Iam mâna thuris ma-
gis q̃ thuris asfringit: est autem minus emplastica.
Constat uerò in duris corporibus plus aloës im-
miscendum esse prædicto medicamento: in mol-
libus autē, plus thuris. Exterû ubi medicamen-
tum id facere magis emplastici optas, deligere
thurs resinosis oportet, quod quidē & mollius
est, & can didius, mansumq; noui cōminuitur, sed
partes suas sibi colentes tuetur, ut mastiche.
Maximâ autem necessitatem uel crustificis me-
dicamentis, uel ignitis ferramentis utendi animad-
uertî, ubi ex erosione putrescentis alicuius, pro-
fusum sanguinis excitat: ut in pudendis & sede:
quæ partes, & propter naturalem humiditatē, &
quod excrementorû canales sint, ex leui occasio-
ne putrescūt. Vbi igitur totû quod iam compu-
truit sublati fuerit, tunc in hisce opus est radicē
ipsam exurere, idq; aut ferro candenti, aut medi-
camentis excitantibus crustam, sed quæ etiâ facili-
tatem asfringendi possideant, qualis in chalcide
& mysi, & atramento sutorio uisit. Porro quæ
ex calce nō extinctâ conficiunt, ea unq; ualentio-
ra his sunt: ceterû calx uim asfringendi non habet.
Excident igitur citius quæ ab his sunt crustæ:
hærent autē diutius, quæ ab asfringentibus:
quod unq; longē est utilius. Quare nec festinare
quidē debemus ad amolienda crustas, ubi hæ-
morrhagias periculû adest, nisi in illis tantû asse-
ctibus depalcamentibus, in quibus propter putre-
dinē, candens ferrû admoveat corpori fuimus
coacti. Porro quæ uas profusum sanguis, aut
propterea quod amplius nō cōfluet, sistetur: aut
quia occlusa diuisio erit: aut etiâ ob utraq; cau-
sam, id quod tutissimû fuerit. Ad cōfluere prohibe-
tur, & propter deliquit animi, & cum ad con-
traria reuellitur, & cum deriuatur ad proxima: &
per refrigerationē, tum corporis totius, tum præ-

eipue partis affectu. Hac etiam ratione, frigidâ
tum pora, tum parti foris affusa, sipe hæmorrha-
gias superpresit. Idem etiam moluit, & posca, &
unû acupunct, aliâq; omnia quæ uel asfringendi,
uel simpliciter refrigerandi uim habent. Claudit-
ur ipsa diuisio, si uel contrahatur cōnuentatq;
id quod diuisum est, uel obstruatur. Sanè contrahi-
tur tum asfrictione, tum refrigeratione, tum de-
ligatura, tum uinculo exceptû. Obstruitur uel in
trinfecus, uel extrinfecus. Et intrinfecus quidē
cōcreto sanguine: extrinfecus uerò, tum ab hoc
ipso, tum a linamento, & spongâ, & crustis, &
medicamentis ijs, quæ lētita crassitieq; sua, me-
tus obferant ad hæc, corporibus ijs quæ circum-
iacent, propius admotis. Atq; hæc tenus de pro-
fusis sanguinibus, quæ a partibus expositis sensui
oriunt. Nam quæ de profundo sanguinis proflu-
uia erumpūt, ea nec uinculo nec deligatura sana-
ueris, uelut neq; candenti ferro: sed per reuulsio-
nem, ac ad uicina loca deriuationē: necnon per
cibum atq; potionem, quæ & emplastica uim
fortiantur refrigerentq; necnô per medicamen-
ta asfringentia. Pro differentia autem & proprie-
tate partium quæ profusum patiuntur, uariâ
utimur instrumentis. Siquidem per dytserem, in
intestina: per metrenchyras in uterum: in uesci-
cam deniq; per cathetras, idoneorum aliquid
medicamentorû immittimus. Equidem quater-
nis diebus uidi sanguinē & uulua profluere, nec
potuisse ullo remedio sisti, quoad quarto die
plantaginis succo utentibus nobis, profusum con-
sistit. Est quippe hoc medicamen, quæ & ea quæ
ex erosione excitantur profusua sanguinis uti-
lissimum. Cui etiam ualentius aliquid hoc casu
medicamentû, aliis aliud miscere soleo, ut uidelicet
hianc ipsam, uel ut primû, uel ut secundû indica-
tionem curationis habeamus, nec ramen negli-
gentes affectum. Nam si perruptus uas aliquid
magnû est, aut uehementer reclusum hiat, urig
asfringentibus medicamentis est opus, ueluti ba-
laustio, hypocistide, rhoē, omphacio, acacia, gal-
lis immaturis & malicorio. Sin uel exiguum uas
est, quod perruptum est, uel modicè resecratum,
sic ut nō multum sit ex eo sanguis profluens, etiâ
aloe & manna, & pini cortex, & lemmû sigillum,
& spinæ Aegyptiæ fructus, & crocû, & lapidis hæ-
mantes, aliâq; id genus, ex uino nigro aultero,
unlia medicamenta sunt. Quod si nec genus id
uim adde, nec plantago, nec solanû (quippe hæc
quog; funi doridie) rubi, & cynosban, & myrri,
& lenicis, & hederæ, & cotoneorum, & meliplo-
rum, breuiterq; asfringentium omnium deco-
ctum ex usu est. At si ex erosione profusum ali-
quod incutit, erit utiq; id exiguum, atque paulu-
tim effluens. Quare Passionis, uel Anadomis, uel
Polyidæ pastillis utendum est: ut enim nostrum
quæ ex charta constat. Sin profusior hæmorrha-
gia sit, q̃ quæ uehementissimè asfringant uten-
dum medicamentis, quoad uehementis eius franga-
tur impetus. Mox deinde admiscēdi illis pastilli
sunt: postea ad ipsos solos ueniedû, cû aliquo ex

*Refrigeratio totius
corporis est
particula aff-
cta, sicut & san-
guinem superpres-
sit.*

*Sanguini pro-
fusio ex profun-
do erumpunt,
qua ratione sic
curandum sit.*

*Plant. agni fac-
tus reuulsio a-
pium est con-
gruum effusio-
nem.*

*Asfringentia me-
dicamenta.*

*Pastilli diuersi
etia profusum
sanguinem ex ero-
sione obstruunt.*

*Altringenti si
mol et refrigerati
tam vniuersa
al fupprimendi
sanguinem ap-
plicati extrin-
secus, non vbiq;
probat Galenus*

*Refrigerantibus
quodam circa par-
tem vnde fluit
sanguis remedi.*

*Cucurbita sum-
ma ceruicis affi-
xam, reuoluit de
veneribus sangui-
nem.*

*Sanguis fluxus
in per naves, re-
uulsio duplex.
Diaplediti quom-
modo sit curan-
da.*

*Dura omnia a-
git cōsolatorie*

*Verno tempore
sanguinem mite-
re. Grati etia
erat cōsuetum.*

*Vesica pro chyli
re Galenus re-
tat.*

*Lemnia terra.
Romam esse ma-
ximè obnoxiā
fluxibus.
Pulmonis vici-
ra cor diffinire
sanata sunt.*

antè dictis succis aut decoctis. At uerò quæ ex-
trinsecus profuenti particula demouentur, tum
astringentia, tum citra astringentem frigidā, hæc
ipse nō ubiq; probō: sed mihi contrā omnino q̃
fieri res postulat, ipsam sanguinē intrō compel-
lere, ac uenas quæ in alio sunt implere uidentur.
Vidimus enim quosdam eorum, qui sanguinē à
pulmone reicerent, ex thorace refrigerato ma-
nifestè lases: æque ut qui sanguinē uomuerunt
nonnullos, quod uenter esset foris refrigeratus.
Eodem modo & eorum quibus ex naribus san-
guis profuxit, aliqui ex capitis refrigeratione
deterius habuerunt. Quare nec omnino, nec sine
discrimine, nec omni tempore loca quæ circa
particulam unde sanguis profuit, sunt sita, refri-
geranda fuaserit, sed postea q̃ in alia diuerteris:
ut exempli gratia, in naso, ubi sanguinis misio-
ne usus fuerit, ut artuum frictione, deuinctio-
ne, uel ad præcor dia cucurbitis delixis. Quin
ne sic quidem ad frontem caputq; refrigeranti-
bus uten dum est illico, sed reuellendū prius ad
contraria: unq; affixa in summa ceruicæ cucurbi-
ta. Quippe duplex est in sanguinis è naribus pro-
fusione auctio: & quæ est à totius corporis in-
ferna, & quæ ad capitis posteriora: propterea ui-
delicet quod ipse nares & in superiore & in an-
teriore parte sunt sitæ. Iam uerò sanguinis effu-
si diapedesis dicta, refrigerantibus & astringen-
tibus est curanda: necnō uictu crassiori, si ob te-
nuitatē sanguinis accidat. Porro quod uenæ in-
sedit ulcus, si ad manū est, eandem curationem
cum ijs deliderat, quæ in carne cōsistunt. Enim-
uero quæmadmodū dura omnia ægrè consolide-
sunt cartilago enim cum cartilagine per cois-
nem haud coalescit, sicuti nec os cum ossi, sed
per callum tantū coniungitur sic etiam solutæ
arteriæ cum difficultate ob substantiæ duritiem
coalescūt, et si eas aliquando cōglutinari uideri-
mus: idq; in mulierib; atq; pueris, tum circa fron-
tem, tum circa malleolū carumpit, ac mediū ex-
tremæ manus. Simile quiddam aliquando & a-
gressi contigit iuueni, dum sanguinē sibi mitten-
dum ueruo curaret tempore, quod nostrantibus
est maximè in usu. Illi siquidem pro uena fuit se-
cta arteria in cubito, quam postea non ipsi cōglu-
tinauimus. Est autē sanatu difficilior arteria inci-
sa q̃ uena, tantoq; siccioribus medicamentis eger,
quāto ipsa est suapte natura q̃ illa, siccioris tem-
peramenti. Cætera uerò, eiusdē speciei ambie me-
dicamenta desiderant. Porro ad ea quæ in recto
intestino sunt ulcera, per uesicā, cui res situla re-
cta ad sinē annexa, inijcere liquatū medicamen-
atq; tepidū licet. Cæteri sicca medicamenta ma-
gis sunt idonea, q̃ quæ liquidabilia uorantur: quo-
niam facili uel plantaginis, uel aliterius eius ge-
neris succo miscuntur. Eiusmodi medicamenta
sunt, & crocum, & pompholyx, & aloë, & quæ di-
cuntur cephalica. In ipso autē primo producen-
dæ carnis tempore, quod suppressio sanguinis
continenter excipit, etiam Lemnia terra salu-
tare est præsidium. At quæ pulmonis adhaferunt
ulcera (cuiusmodi sæpe in urbe Roma uidentur,
loco profecto maxime obnoxio fluxionibus)
difficiliora curantur: existunt, ad assiduam ipsius
ulceris agitationē. Quod quidem laxū & spon-

giolum cum sit, minimè etiam mirari conuenit,
si sanguis aut pus in thorace contentū, aliquan-
do per membranam illius transmittitur ad arte-
riam asperam: quandoquidem per aliam longè
duriorē in ossis fracturis effundit sanguis cras-
sus ad calli generationē. Vbi igitur uel ex causa,
uel præuialia acutis uoce uas aliquod in pul-
mone ruptū, citraq; dolorem cōstrem sanguis
feruens, floridus, multusq; cum tuis expu-
rit, scire licet in uiscere uulnus consistere. Itaq; labo-
ranti inungendū est, ut nec respicit uehemētē,
ac semper silentiū agar. Præterea uena cubiti in-
terna protinus incidenda, à qua bis terq; postea
sanguis est detrahendus, utiq; auertendi grana,
tum artus omnes fricandi uincientiū. His per-
actis, primū posca tum diluta, tum tepida, potui
offerenda est, quō si quis in uiscere cruor concre-
tus latet, solutus expuatur. Atq; hoc nihil uetat
bis rēre, ternis horis facere. Ab ipse uerò etiā ali-
quod eorū quæ tum emplasticū uim habet, tum
astringunt, medicamentū est exhibendum: idq;
aut ex posca diluta primū, aut ex maiorū myrto-
rum decocto. Rursusq; uel per medicamen-
hoc similiter dandum, circuncisio (si ualentior sit
æger) omni nutrimento. Sin aliter, sorbitionis q̃d
satus est exhibendum. Maximè uerò ad rem perti-
nabit, si etiam postero die (modò æger robustus
sit) partū sanguinis rursus ab incisi uena de-
trahat. Vicin autē, me diamentis eodem mo-
do in quartū usq; diem utatur: pectorē interim,
si æstus sit, undiq; melino & rosaceo, ma defacto:
sin lityeme, nar dino unguento. Iuuerit etiam uel
maximè nō modò ad uulnus pulmonis, sed ad
alia omnia, illud medicamen emplasticū, q̃d ex
butimine acetoq; & alijs quæ illi misceri solent,
constatur. Quod si mulieri puerōue, aut corpori
quod molles sit rarnis, medearis, quod ex chaly-
ride sit, satis habile medicamentū fuerit. Cæteri
si rupturæ uasis successerit inflammatio, exigua
spes est cōglutinandi ipsius: quādoquidē inflam-
mationis solutæ pus, purgari sine rursi nō po-
teat, quæ maximè rupturæ a duersal: in longius
ramē tempus produci ipse affectus potest. At se-
peti transuersi uulnera, quæ foras nō perueniūt,
in carnis quidē partibus subiu de uisā sunt coa-
lescere, eius motu minimè olstante. Quæ in ner-
uosis eius hærent, insanabilia sunt. Sanè difficilis
grauisq; curatio est etiam eorū quæ in carnis
sunt partibus, si has iam phlegmone obfede-
rit, idq; non in diaphragmate solū, uerumetia in
omnibus quæ intra peritonæū ambiunt: quod
in ea scilicet sanies defluat. Danda tamen opera
est, ut illa quacunque ratione siccomus, tum per
ea præsidia quæ extrinsecus imponuntur, tum
per ea quæ ex aqua, uinōue tenui bibuntur. Ho-
rum maximè idonea sunt, quæ diapharmaron uo-
cant, & quod ex casia componitur. Immutatur
autem plurimū ipsa curatio ulcerum, per singu-
las animalis partes. Indicat siquidem, ueluti ui-
tium ipsū, ut curetur, sibi applicandum esse
cōtrariū: sic particula quæq; quod sibi sit q̃ simi-
limum. Quamobrem aurū uelut, cum ex par-
tes longè ficcissimæ sint, glaucio ex aceto curan-
tur: necnon (si ualentior sit opus) mediramine
Andronio, scoriatq; ferri in pollinem tenuissimū
læuigata,

*Pulmonis uicis
ra uideret.*

*Flammam
maris curat.*

*Posca diffinire
gramen.*

*Sanguinem re-
prensū re-
prensū esse mē-
suri sanguis.*

*Pulmonis uicis
diffinire si uisā
malo iungit.
et, cur esse la-
negotat cōsue-
dare.*

*Vitæ curatio-
nem uenit
plurimū per sa-
pulas animalis
partes.
Aurum uicis
quibus medica-
mentis curant.*

*Diapermaton
medicamentum
v. s. u.*

*Pulmonis vici-
ria contra la ex-
terni fucci ex-
terni esse prae-
sunt in ambula-
tione.*

*Pulmonis vici-
ria curatio.*

*Cataplasma de-
serpae a Gale-
no.*

*Pulmonis vici-
ria in si qui de-
plorati non sunt,
curari per circa
fluentem sangui-
nem purgatione,
et ea quae caput
roborent.*

*Extremis mor-
bu extremis re-
media adhiben-
da esse.*

*Pudendoris vici-
ria qualia me-
dicamenta po-
ssint.*

*Alcum in infer-
nam, esse saluta-
re medicamen-
tum sibi et po-
derantem vici-
riam.*

*Medicamina vi-
ceris, sibi et po-
derantem apta.*

aliquo, qui facili concoctu esset, adiecto. Dedi
quoque medicamentum diapermaton & secundo
& tertio die similiter circa uesperam: quippe &
somnia cōciliat, & sensum doloris leuat, & sic-
cant uim habet. Vbi autem & spiritui delegare
partes in naturali essent temperie, & totum cor-
pus uacuatum, ac nulla phlegmones suspicio iu-
xta ruptum uas superesset, tunc expurgare incepi-
mus. Mox propinata theriace uigenis ætatis, il-
lum ad Tabas dimisi. Ex his uero qui ulcus in pul-
mone habent, hī demum infanabiles mihi esse ui-
dentur, qui ex succi uiriosi erosionē id possident.
Oportet autem in principio nullius rei aquē esse
solidiorum, quam ut neq̃ rursus, neq̃ ex capite ali-
quid in pulmone defluat. Cautetur id triplici præ-
sidio: purgatione primū secundū, medicamine
quod diapermaton dicitur tertid, ipsi capiti pro-
uidento. Quod purget, diuersas facultates ha-
beat oportet: cuius generis nostræ sunt pilulæ,
quæ ex Aloë, Scammonio, Colocynthis, Agari-
co, Bdellio, & Gummi Arabico conficiuntur, ad
plures uidelicet purgandas species excremento-
rum. Capiti prouidebitur cerati usu quod ex rha-
psia constat. Atq̃ hæc quidem sunt peragenda in
principio. Post uero reficiendus est æger salubri-
ter, cibis boni succi, frictione, inambulatione, &
balneo, ac præterea lacte fouendus. Quicunque
parum habere sanguinis uidebuntur, his ad quen-
dam succum probiorem reduci, detrahere sangui-
nem poteris: tum rursus reficere: eosdem enī
rursus purgare, ac rursus reficere: denuoq̃, si res
suadeat, sanguinem mittere, potissimum quibus
ueluti limus quidam uiriosus & crassus, totus est
sanguis. Ac qui sanguine abundat, statim his ad
principio minuendus est. Itaq̃ per hæc tria, qui
plane deplorati non sunt, omnes seruatur: nempe
per detractionem sanguinis, & purgationem,
& ea quæ caput roborent. Quare minimē id pa-
uis incipien dū auxilijs est, in quibus morbis ma-
ximum impendit periculum. At in leuioribus,
licet quidem leuiora experiri remedia. Sciendum
autem est interim, fieri non posse ut glutinetur ul-
cus, si phlegmone pulmonem inuaserit: omni-
noq̃, si inuaserit, febricitaturum hominem esse, ac
purulenta deinde, quam soluetur phlegmone, ex-
puratum tuisi. Porro ulcera quæ circa phlegmo-
nem in pene, sed cūc consistunt, nullum cataplas-
ma desiderant, sed medicamen quod cicatricem
inducat: non tamen eius naturæ, quæ ulcera, quæ
in carne sunt, in ducere cicatricis possit: imo quæ
tantū magis ualeat ficcare, quantū hæ partes car-
ne sicciore existunt. At talia sunt medicamenta
sunt, q̃d ex charta combusta cōstat: anethūq̃ uisū
atq̃ respersum, ac deniq̃ colocynthis combusta.
Verū ipsorum, quæ in pene sunt, ulcerum, magis
siccat postulant quæ in toto cole hæserunt, &
quæ solam glandulam occupant: minus uero quæ
in præputio sunt: atq̃ etiam his minus, quæcun-
que in reliqua sunt cute, quæ totum colem uestit.
Recentibus & sine maiore tum sedis, tum puden-
dorum ulceribus, sola aloë redacta in tenuissimū
pollinē, inspersaq̃, salutare medicamen existit. Si-
milis huius uim habet cadmia uino elota, & sic-
ca. Ab hac non longe abest lithargyros. Deinceps
uero molybdæna sequi. Cæterum omnibus tum
miosis inferens doloris, tum nullo minus efficac

pompholyx est. Sin humidiora sint ulcera, ipse per
se pinhi cortex, itemq̃ lapis hymanites, idoneus est.
Quod si profunditas quæpiam adsit, ubi exicca-
ta fuerit, dictorū alicui tantum manū admiscen-
dum est, quantum sit ad carnem gignendam satis.

GALENI PERGAMENI DE medendi methodo liber VI.

Solutio continui, in carne quidem, ulcus: in
osse, fracturam in neruo osis fibræ, spasmum mu-
sculis deniq̃, ulcus atq̃ ruptio uocatur. Sen-
guli uero horum affectionum, quatenus quidem af-
fectus sunt, sui per contraria sublationem indi-
cant: quatenus autem solutiones continui, unitionem.
Igitur si cutis tantum acu (exempli gratia)
alicui sit puncta, facile in eo sanescant ulcera, et
iamq̃ citra medicamentum, nudojq̃ membro, ip-
sum ad consueta dimittas opera, nihil sentiet ma-
li: sin uero æger in illo sanetur, primū quid-
dem dolebit, post enī tum pulsu particula infesta
bit, tum phlegmone. Quare minimē imponemus
medicamē quod glunnet, sed molle, & blandū,
& quod dolorē minget. Siquidē ubi magna diuisio
est, ibi studium impendi debet, ut magis siccantur
remedij labra ulceris & uniantur, & coale-
scant: ubi autē acu styloide facta diuisio fuerit, id dū
taxat curandū est, ne phlegmone tentetur particu-
la. Porro ubi aliquis neruus est punctus, cum ip-
sam apertū seruire oportet: aut (quod rarius est)
larius incidere, ut per eam ex neruo uulnere effluat
sanies: de in uero ad mouenda quæ simul do-
lorem mingent, & exitum saniei patefaciant. Si uir-
tus uegeta sit, sanguinis misio est expediri, purga-
tioq̃ uerū corporis, si uiriosis fucis reddat.
Quia uero calida, quanquam reliquis phlegmo-
nas ualde mingat, uulnere tamen neruis inimi-
cissima est, quam præsertim eo si substantia ex re
frigerata concretisq̃ humidiori materia sit cōdi-
ta. Omnis quippe eiusmodi cōstitutio, per ea quæ
simul calfaciunt humectantq̃, resoluitur, atq̃ pue-
rescit. Quare præstat oleo tenuium parium, &
ueteri, & calido, neruon punctos fouere. Hoc si
quidē, si frigidum applicetur, tenues meatus ob-
struit: sin calidum, digerit. Etenim medicamenta
quæ nerui puncturæ auxiliantur, debent esse fa-
cultate tenuia, modicē calfaciētia, & quæ ficca-
re circa dolorē possint: quandoquidē sola hæc tra-
here ex profundo sanem, nec demorsā, nec cōtra-
cta particula, ualent. Ego itaq̃ sum usus primū
refina terēbinthina, tū per se, in his qui molli erant
carnetum cum euphorbio, in his qui dura. Non
secus enī & propoli, non per se modū, uerum etiam
cum euphorbio ipsam molliens: quod si durior
esset, cum aliquo tenui oleo. Quin & sagapeno,
opopanax, sum in duris corporibus usus, atq̃
cū oleo & terēbinthina id miscens. Sed expulsi
ex la chryma Cyrenaica nō inuile ad id fore mihi
uidei. Nec secus sulphur uiuū, ac minimē lapido-
sum, tenui oleo permistū, donec fordū crassitu-
dem contrahat. Calx etiam lora, oleoq̃ cōmixta, si
militet auxilia, præcipue in istu canalicis
terre aqua marina abluit. Ego uero ad neruos
punctos hoc unī consueui emplastro. Certe par-
uū: refina terēbinthina, aut (loco eius) humida
pinæ, aut colophoniz, aut abietinis, unius par-
tis dimidiū: placia tantundē. Si itaq̃ humidā refina
musebia

*Solutio uulnere
fuerit.*

*Punctura con-
tra.*

*Punctio nerui
uulnere est dila-
tandum.*

*Punctio nerui co-
rui.*

*Aquā calidam
esse uulnere
nerui inuoluen-
tium.*

*Neruos punctos
oleo calido foudi
debe esse.*

*Punctio nerui qua
lia medicamēta
possint.*

*Terēbinthinam
a uulnere pon-
derosa.*

*Punctio nerui
emplastro opo-
pax.*

miscēbis, tu nūm cribratūm ip̄ euphorbiū reliquis immittes liquatis. Eō uerō pondus eius, pars ceræ duodecima. Si nū siccam, sicuti quæ colophonia dicitur, ungu oleum puillū desiderabit euphorbium. Itaq̄ vulnerati nerui curatio medicamenta postulat, quæ & tepidū calorem excitent, & uolenter siccent: tum quæ ex substantiis sup̄ natura & attrahendi uim habeant, & tenuia sint partū. At si neruus non pūctus, sed per directū sit cūctus, nudatq̄ diuisa cute ostendatur, uim euphorbi non feret, ita ut quum interposita cutis est, ferre potest. Quare tu uic optime calore elora, & in plurimo oleo soluta utere. Salutare erit et̄ medicamen, q̄d ex pompholyge medicamentū fit, si in largo sit rosaceo liquatū. Quod unq̄ melius fuerit, si tum rosacū ipsum, tum oleū, salis sit expers. Porro quæ ex metallis cōstant medicamenta, ea elora omnia esse debent, si cūra morsum sint siccatura. Salubre uerō medicamentū est, q̄d ex melle soluto in oleo insulso constat. Cera præterea, terebinthina, si

*Puillū nerui
qualis desiderat
tur medicamen
ta.*

*Nerui per directū
cūcti capiti
tio.*

*Metallica medi
camenta debet
elora esse, si cū
tra morsum sint
siccatura.*

*Morsu vulnera
tu nihil debere
admoneri frog
dum.*

*Morsu sunt in
instrumenta vo
luntaria motio
na.*

*Oleū reddet ut
cūa siccata.*

*Nerui vulnera
to neq̄ aquam,
nec relaxantia
ca taplasia admo
uere oportet.*

*Nerui transuer
sim vulnerati
curatio.*

*Nerui vulnera
to in brachio a
uiliis: in crure
ex ambuasi laco
gelo siccandi
q̄d.*

neri largo oleo imbuendū: tum per totū spinam ad collum & caput ascendendum. At contusi nerui, ubi cum eis est simul & ipsa cutis contrita, cataplasmate ex oxymelite & fabacea farina curatur. Qui uerō ab ip̄s cutis simili affectu, contusi sunt, is oleum calens, atq̄ tenuium partū, auxilio est. At si dolor unā cum contusione cutis & nerui infestet, etiam picem liquidam immiscere illi cataplasma, ac bene coquere, tum calens medicamentū imponere oportet. Vbi uerō magis siccata effice re uolet, erui farinā iunices. Quod si ut amplius quoq̄ siccet desideras, irim immittes lilyricū. At si totus præcūctus neruus sit, merus præterea nullus inest, debilis tamen remanebit particula. Curatio uerō eius communis est cum ea, quæ aliorum est ulcerum. Ligamenta autem, quum simillimam habeant speciem tendonibus, ualentissimorum & mediocrius uim tolerant: quod neq̄ ad cerebrū pertingant, & sensus sint expertia. Nam nerui omnes, alq̄ ex ipso statim cerebro habent ortum, alq̄ ipsiuali interueniente medulla. Tendonēs quoq̄, quouiam ex neruo & ligamento constāt, quatenus nerui particeps sunt, eatenus ex cerebro oriunt, minus tamen q̄ ipsi nerui conuulsione accersiuūt. Ligamenta uerō, quum ex ossē ortum habeant, quæcūq̄ rotunda sunt, ea neruus sunt consimilia: duritie tamen plurimum discedunt. Verū in eo quod alba sunt, & exangia, & cauate carentia, & in fibras diuidunt, similitudo illis cum neruis & tendonibus cōstat. Ligamentū igitur uulneratū, si id est quod ab ossē ad os pertineat, & maxime sine periculo est, & si id siccet quislibet medicamenta, nihil hominē offende ris. Sin id quod fit in musculū inferit, quātū est uero & teodone minus opportunū periculo, tantū utiq̄, nisi resicere tueretur, reliquis ligamentis magis terere debet. Sed iam operis præcūctum est, ut de abdomenis uulnere aliquid etiam dicamus. In abdomen extrinsecus cutis omnis antefrat: quæ in membranam finitur. Post cutem, medio circiter loco, nerua tenituras muscularum gemina tenditur, membranasum ritu. Post has deinceps habentur duo musculi recti, & carnosī, qui a pectore ad ipsa pubis ossa perueniunt. Atq̄ hæc quidem omnia sibi maruo coluerunt, abdomenū constituit. Quod uerō deinceps hoc excipit, peritonæum uocatur, estq̄ ex corporibus duobus exangibus & neruosis constitutum. Verū alterū eorum ueruo uoluitas eorum muscularū est, qui per transuersum seagunt: alterum, membranam præterueniunt, uelut aranea, quæ utiq̄ uerē est peritonæum. Ac tale quidem in medio sui est abdomen. Partes uerō eius, quæ utrinq̄ ad latus ad quatuor quasi digitos recedunt, hæc statim a curcubloque musculi habent: priores quidem, qui a pectore demittuntur: secundos, qui ab ilibus ascendunt: inter post hos, transuerfus utrinq̄ musculum, sub quo quod peritonæum. Ergo & minus periculi in hoc loco conuulnato est, quā in medio: quum tenuem aponeurosin nullam habeat, & sutura in medio difficulter admiuistratur: quum nimirum & hæc paræ maxime præcūctam inest, & ægrè inibi contineri queant. Si igitur maius sit abdomenis uulnus, tum plura necesse est intestina excidere, tum difficilissimum denuo immitti: quauquam & parua uulnera tractata etiam sunt difficilia. Nam

*Cūcti nerui in
tate.*

*Ligamenta sunt
sensu expertia,
neq̄ conuulsū
cerebro.
Nerui oriuntur
a cerebro.
Tendonē con
sist ex ligamē
tis & neruis.
Ligamenta ori
untur ab ossib.*

*Ligamenta ab
necesse periculo
q̄ uulnerantur
quasi.*

*Abdominis de
scriptio.*

Peritonæum.

*Abdominis par
tes antecuram
cū uulneratur,
ægrè curari
q̄ que consistit
ad latus.*

Abdomine vulnerato, cur me dicare foveamus fistulatarum an gyno.

Insuper ex- cludimus per ab domine vulnus quod agendum.

Abdomen vulnerato confusio de ratione.

Ab lani vulnerato confusio de secundis modis.

nisi quod prociat, illico in suum reponat locum, in statum, surgit in tumor emquo sit, ne per angustia foras immitti nequeat. Quare minus graue per huiusmodi vulnere, mediocriter foramen est. Principio itaque agendum est, ut intestina que ex cident, in suum recondantur locum. Secundo, ut ulcus sanetur. Tercio, ut medicamen imponas. Quarto, ut ne qua præstantior pars simul afficiatur, prospicias. Si ergo adeo parum sit vulnus, ut inflatum intestinum ex frigore ambientis aeris remitti nequeat, discutimus statum spongia molli, & ex calente aqua madenti, moxq; expressa, intestinum ipsum calfacientes. Præparetur nerod interea vinum austerum calidum: quippe id magis calfacit quam aqua, roburq; intestino addit. Quod si huic quoque præsidio, intestini inflatio non cesserit, incidendum peritonæo tantulum syringotomis est, quantum ei quod excidit, reponendo sit satis. Scalpelli vero quibus acies utrinque habetur, aut quibus cuspid acuta est, sunt omnino fugiendi. Sinus autem laboranti sit tepis, ut quæ vulnerata pars est, sublimiorem semper locum obtineat. Cauendum namq; magnopere est, ne id quod exciderit, degrauietur quicquam ab intestinis alijs. Qui igitur intestina per magnum vulnus prolapsa, reponere in proprium vult sedem, in obitorem vulnus manibus suis extrinsecus apprehenderit, debet intro reprimere, tum constringere, ac exiguum semper suenti prænnare: quoniam id ipsum quod assutum est, modicè comprime, quoad totum perficiatur. Quoniam igitur coire coalescere oportet cum peritonæo abdomen, incipendum quidem à cute est, atq; ab exteris introitus acus inijcienda. Vbi vero tum cutim, tum rectum musculum totum transierit, præterito quod ei subest peritonæo, per reliquum peritonæum eam ab interno extrorsus inijcies, atq; inde per reliquum abdomen ab interno extra transmittes. Vbi hoc penitus penetraverit, rursus ab externo introitus idem abdomen est perforandum. Mox ubi peritonæum quod illi quoque subiacet præteritis, atque ad contrarium ueneris, hoc quoque ab interno extrorsus est perungendum, unatq; cum eo totum ipsi coniunctum abdomen. Deinde ab hoc incipendum rursus, atq; id cum contrario peritonæo coniungendum: ac rursus uicina quoque cute transmissa, iterum ab ea parte acus introitus est traicienda, consensendumq; abdomen id cum peritonæo contrario, etiam inibi uicina cute transmissa. Atq; hæc iterumq; iterumq; facienda, quoad totum vulnus similiter confuerimus. Quod uero ad interuallum punctum, earundemq; altitudinem pertinet, mediocritas eligenda est. Si lum etiam, inter durum & molle medium quoddam obineat. At uero medicamenta, quibus in his utemur, eiusdem materij sunt, cum vulnera gigni nantibus. Sicut qui aliter vulneratū abdomen cōstantibus, ad hunc modum: Oportet à uicino nobis abdomine incipere, atq; ab externo introitus per id tantum acum transmittere. Post, præteritis utristiq; peritonæi labris, ex aduersa parte ab externo introitus per utrumq; eius labrum acum reuocare in rursus hanc reuo care, atq; ab interno extrorsum per aduersum abdomen traicere. Atq; ita totū peritonæū sibi mutuo coalescere, prorsus intra abdomen abscondi. Deligatio uero extrinsecus,

uel præcipue in his necessaria est. Ad hæc qd inter bubones & axillas est, id totū molli lana ex oleo mediocriter calido imbuta circūdare oportet. Satiū ite fuerit, & si per clyster intestinis aliud simile infundas. Quod si qd ipsorū intestinorū sit uulneratū, quæ extrinsecus fieri debet, omnia similiter ut diximus, sunt peragēda. Ceterum quod intus, unū nigrū austerū, & repens erit. Ac crassa quidē intestina, sanata facilia sunt contrario difficilia, quæ tenuia existunt. Ictui autē est omnino incurabile, tum propter magnitudinē malitudinēq; uasorū, tū quod tunica eius nervosa, præternatq; sit. Adde quod tum bile syncerā hoc intestini recipit uniuersam, tum quod omnium maximè est incitū iccinori. Ventriculi autē quæ carnosæ partes infernæ sunt, curare est si fiducia tenebatur: quæ uero in ore eius sunt, ex sensu acumen quo minus sanentur, obest: atq; hoc etiam quod modicè medicamentis illic diu herere non possint. At uero omentum si per vulnus exciderit (præstat enim hæc pars aut mali usum non usque adeo magnam: constatq; ex membrana tenui, arterijs atque uenis contexta) si quid ex eo nigricans sit, excipimus id uinculo, ac sic, qd post uinculum est, amputabimus: atq; ut in imo sine iam prædictæ futuræ abdominis, pen deant ipsius uinculi extrema, curabimus, quō nimirum ea, quum ex uulnere supprantur euomentur, facile recipiamus. Sed iam ad fracturæ curationem uenimus est: cuius quidem scopus unio existit. Ceterum coalescere nequeunt ossa iuuenum, adolescentum, consistentium ætate, nec non senum, ob eorum maximam siccitatem duritiamq; tamenq; interueniente alia quapiam subtilia crassiuscula (quæ ex proprio eodemq; crasso ipsorum ossium alimento reddunt) concrecentq; in labris fracturæ, possunt ceu quoddam glutino separare ossis partes conuenientem, atque cōglutinari. At uero quæ abunde sunt mollia, qualia in puerulis conspiciuntur, ea sola initionem recipiunt. Ergo si os aliquod per transuersum frangatur, sic disident à se eius partes, ut è ducto non iaceant: iquare primò curandum est, ut in directum & contrarium agantur, iuxta integre exemplum: à qua nimirum certissima transpositionis fractorum ossium indicatio sumenda est. Quæcumq; igitur retrorsum (exempli gratia) magis sunt acta, ea prorsus magis impelli cōueniet: nec minus alteram quoque fracti ossis partem modicè ad contraria retrudi. Contrā, quæ prorsum sunt emota, hæc rursus ipsa quidem retrorsum, reliquam nerō partem sensum diu prorsum: nec secus de cæteris differentijs. Cauendum tamen est interim, ne in adducendis contrario motu partibus, extantia fractorum ossium frangantur. Quibus sanæ contracta, non poterunt ad amissum inter se coaptari fracti ossis fines. Ob idq; disidentia ossa, è directo ad mora esse oportet quod commodè fieri nequit, nisi retracta sint, idq; aut manibus, aut uinculis, aut instrumentis. Postea uero quim abunde reuulsa fuerint, nec ullis superflue metus, ne se in adducendo tanguant, tum in directū opponere, uinculaq; remittere, ac musculis ipsis diductorum in idem commissuram permittere expedire: interim uero te ipsum quoque manibus subleuare: & sicubi aliquid paulū sub fultet, corrigere atque formare. Ab ipso secundo,

Intestinū aliquo vulnerato quod agendum.

Intestina crassa qd sanata facilia sunt contrario difficilia autem quæ tenuia existunt incurabile.

Omentum excidit te per vulnus, quod agendum.

Fractura supra uentris.

Ossa ut coalescant scopus quoque sine.

Callum glutinosum ipsorum ossium natis ex alimento intrudendum.

Ossa puerorum sola possunt initionem coalescere.

Fractura contraria.

quod diriges, fuerit, ut immortum prorsus membrum consistat, ne quid eorum quæ efflueris, mo-
ueatur. Ne uero per moriones ipsas disingantur
ossa commissa, rursus deligatur completè fractu-
ram oportet. Quam sanè deligaturam nec adeo
debemus arctare, ut eam comprimat: nec remitte-
re ita, ut sit laxa. Ac pectori quidem latissima
fascia congruit: artubus autem & iugulo, augu-
sta, sed quæ tantum ex uersuum numero securi-
tatis adiciat, quantum ex angustia deficit. Ad
hæc deligaturæ principium debet super ipsam fra-
cturam inhiç, ac circumduci bis tære: hinc uero
ad membrum reliquum dispensari. Siquidem qui
sic deligat, & ab integris ad laborantem partem
sanguinis confluum arceat, & quod iam colle-
ctum in ea est, exprimit: prohibetq; circa fractu-
ram excitari tum phlegmonem, tum sphacelum,
quæ osium carnes & corruptela existit. Cæte-
rum quomodo due partes sint, quæ & recipere ali-
quid a laborante paricula, & transmittere ad eam
possint: utiq; quæ superiacent, tum propter multi-
tudinem, tum magnitudinē, ad ambo magis sunt
habiles. Extremæ uero, propter causas cõtrarias,
exiguam quidem aliquid uel recipere, uel trans-
mittere possunt: ut multum nec ægris submini-
strare, nec ab ipsis recipere. Sed nec sola deliga-
tura fasciarum est satis ad commissuram osium
tutelam, nisi etiam & splenia una cum fasciis exte-
rioribus adhibeantur, quæ hæc quoq; ipsa stabili-
ant. Ne autem phlegmone oritur, cerato est hu-
mido utendum. Iam uero repõitionis figura di-
genda est, quæ a dolore maxime sit immunis, quò
nec phlegmoneum particula contrahat, & æger
persisteret in una ea diuissimè immortus possit.
Ac talis sanè est quæ maxime naturalis uero mem-
brum, ut brachio quidem, angulosiuscitur uero, quæ pau-
lo minus porrecta est. Verum ad dolorē uitandū,
non modò naturalis habitus cuius instrumento
est utilis, sed etiam consuetudo quoq; conducere
non nihil uidetur. In uniuersum autem tum ex-
tendere, tum effingere, tum deligare, tum reponere,
una ea figura, quæ doloris minimum habeat,
est studendum. Soluere autem deligaturam tertio
die debes, ne in membro præter solitum cooper-
to, dolor aut pruritus creetur: nec eius, quod iam
fracturæ est infixū, perspiratio prohibeat. Cuius
occasione nò modò noxiis pruritus quibusdā ac
eidet, sed etiā tantū aeris inopia m̃siet etiam
exulcerari. Infundendum igitur tantū temperatæ
aque est, quantum ad euocandum eiusmodi fa-
niet sit satis. Quod si rursum quoq; simili modo
facies, utiq; septimo id à primo die facere debebis.
Apparuerit uero iam omnia phlegmonelibera,
& quàm pro naturali habitu magis aliquiddo gra-
cilia. Tunc igitur licebit & ferulas circumponere,
& solpere ex maiore intervallo. Nam antea quam
phlegmones periculū esset, nō erat rurū ferulis pre-
mere. Quod si ex longiori intervallo eas soluas,
callus multò felicius conerescet. Ar ubi adeo exie-
cata sunt ossa, ut callus producti nequeat, tertio
uel quarto die modicè aquam calidam infundere,
donec carnes in tubum tumorem attollant
tur: desistensq; prius quam subsidere incipiant.
Vbi uero aliquid digerere uolumus, non prius est
desistendū, q̃ quod ex perfusione intrumuit, subsi-
dat. In quibus aut, quo minus callus in fractura

proueniat, humiditas abundanti orbitat, ibi hanc
ficcare cõuenienti deligatura, & perfusione aque,
quæ uel minima omnino sit, uel plurima, constabi-
mur. Minima quippe, humores qui in superficie
sunt per spiratū digerit: & qui in alto hæret, modi-
cè liquat. Plurima uero, digerit plus quàm attra-
hit. Constat autem, in ea quidem deligatura quæ
exprimit, minus esse arctandis fasciarum finem
in ea uero quæ ad renutiandum est comparata,
nec minus hos esse arctandos, & uniuersos circū-
ductus laxiores facit. Quo tempore callus qui
gignitur, nutriendū coepit: ex cibis optimi facci,
& qui multum nutriant: ex quibus prouenire luc-
cus consuevit, non solum bonus, sed etiam tenax,
qualis desideratur ad calli generationem. Magni-
tudo autem calli ea sit, quæ & ossibus tum uinculo
existat, nec musculos tamen comprimat. Qua-
re danda opera est, ut si minor iusto proueniat, au-
geatur: uel inhibeatur, si immodicè crescat. Sunt
uero quibus hæc efficit, ipsius perfusiones quan-
titas, qualitas: præterea ciborum quantitas, &
medicamini quæ illi imponuntur extrinsecus, fa-
cultrates. Etenim quæcunq; emplastica substantiis
habent, ac modicè calidæ sunt, ac callos tum pro-
mouent, tum uero augent. Quæ uero digerendi
uim obtinent, ea magis os quibus diminuit.
Conferunt in proprio statu, medicamenta quæ
eruentis adhibentur uulneribus. Atque hæc uen-
te de transuersis fracturis. Longæ autem, similiter
sunt curandæ, ceterum comprimendæ magis in
ipso fracturæ loco: tum quod recessit, retrahendū
introrsum est. Quæ uero multifariam contracta
sunt, hæ splenia circūdantur fasciæ ritu incurua,
ut monet Hippocrates. Medicamenta etiam omnia
ex siccanis sint numero, atq; ex his quæ enema
uocant. Capitis autem fracturæ simplices, quæ
ad secundam usq; laminam caluarie perueniunt,
scalpellis angustis iudigent. Expedit autem hos,
ut numero multos, sic esse magnitudine impræce.
Atq; ubi os uiratum nudatum fuerit, primò quid-
em utendum lanore est: secundo loco, eo qui sit
illo angustior: mox ita deinceps reliquis, usq; ad
angustissimum omnium: quo sanè est in ipsa se-
cunda lamina, quam diploen appellant, uten-
dum. Post hæc tum protrinns, tum ad finem usq;
siccis est medicamentis medendum, quæ ob id ce-
phalica uocantur. Ea componuntur ex tri-
llyrica, & erui farina, & manna, & aristolochia, &
pauca radices cortice, & in summa, omnibus
quæ exergere citra morsum possunt. Ipsa namq;
generatio carnis, naturæ opus est. Itaq; ægro ad
eam rem nihil est opus arte medica. Vt autem quæ
prouenit caro coalescat, circūcreant omni os-
sis parti, id inde maxime eueniet, si nec sordes su-
per eo sit, nec oleosa quæpiam pinguitudo. Id igitur
est, quod ægris medicis ad carnis productionem
præstant, ut totus locus siccus sit, tum quali-
bet ossis uiriati pars planè pura. Ex fracturis uero
quæ ad cerebri usq; membranas perueniunt,
si simplex tantum fractura sit, angustis scalpellis
utendum. Sin cum conrussio aliqua, quod con-
tustum est, excidi debet: idq; uel terebellis prius
in circuitu foratum, ac mox fasciam admotis, uel
protrinns ab initio cyclicis. At quæ per terebel-
lam quidem ratio fingitur, parum rursus est: pro-
pterea quod dum audacius eam tractant, duram

Fractura ossis deli-
ganda ratio.

Sphacelus est of-
sum carnes &
corruptela.

Splenia fractu-
rum confirmatū
da requirit.

Ceratum humi-
dum.

Figuram eam of-
fractura eligenda
est, quæ a mi-
nimo dolorifica
sit.

Fractura ossis, ut
ritu esse solanda
esset.

Tertio quando
remenda ad fra-
ctura summan-
da.

Perfusione aqua
calida quando
remendum circa
ossa fracta.

Callus pignendo
qualis uultus na-
tus conueniat.

Callus primo
uultus emplastica
medicamentis,
qua modicè cal-
faciunt.

Callus in statu
proprio seruatur.
Longæ fractu-
ræ curandæ ra-
tio.

Capitis fractu-
rum curatio.

Cephalica me-
dicamenta.

Carnis produ-
ctio, naturæ o-
pus est.

Fracti simul &
cerebri capitis of-
fractura.
Terebellis usum
in fractura capi-
tis, cum parum in-
ueniunt, Galen. dicit.

membranam, quæ ossi subternitur, non raro uiolant. Quod uerò per cycliscos opus administratur, ne id quidem omnino uitio caret, quum quæritur inmodicè caput, quod potius quietem possit. Ceterum si magnæ sunt fracturæ, & ossa quæ fracta sunt uehementer mota, mihi cyclis corum usus perperat. Quippe paucis excisionibus facies lenticulari excisionis locum. Sin firma plurimum ossa sint, foranda sunt terebella. Terebellis aut ipsa, ut mergi non possint, parâ supra cuspide, nonnulli superciliis extans efficiunt. Expedit itaq; id genus complures præparatas habere ad omnem caluariæ crassitiem. Commodissimè tamen cyclis utris: & primo quidem aggressi latioribus, postea magis angustis, donec ad crassam membranam perueneris. Verum quod excidi oportet, id totum cyclis nudandum non est, sed ex e maxime parte, quæ fractura est grauissima. Nam præter alia, etiam membrana ipsa ab ossibus quæ sunt uehementer afflicta, recedit celerrimè. Si uerò unam

GALENI PERGAMENI DE medendi methodo liber VII.

Medeudi methodum, Eugeniane charistelle, quam olim in Herouis gratiam scribendam susceperam, postquam illum functum uita intellexi, ipsi quoq; persequi destitimus. Tu namq; mihi cõscius es, neq; hoc me opus, neq; aliud ullum, popularis auz studio fuisse aggressum: sed quò uel amicis gratificarer, uel meipsum simul utilissima ratione ad tem proposiram exercitarem, simul ad obliuionem senij (ut Plato inquit) commentarios mihi reponerem. Quippe multitudinis laus, commodum ad usus nonnullos instrumentum uiuentibus aliquando est: moe tuis certè nihil prodest, sicuti neque uiuenti quibuscumque. Nam qui uiuere in tranquillo operatur, & fructum ex philosophia ceperunt, suntq; quæ corpori curando sufficiunt contenti, eis utique impedimento non paruo est apud uulgum fama, ut quæ ipsos à rebus pulcherrimis plus iusto transuersos auferat. Ego uerò (haud scio qua ratione) ab ipsa usq; adolecentia mirifice siue inspiratus, siue furore percitus, & uulgi famam contempti, & ueritatis scientiæ studio flagraui, nullam esse hominibus neque honestiorem, nec diuiniorem possessionem ratus: ob idij nulli meorū laborum meum nomen præscripsi. Quandoquidem igitur in præcedentibus cõmentarijs, quemadmodum familiarium instrumentaliumq; patium communem morbum, nempe solutionem cõtinui, curari conueniat, scripsi: deinceps quoque reliquum est, in tui & aliorum amicorum id flagrantij gratiam adiciam, reuertarq; ad eum morbum, qui omnium est primus, nempe qui in similibus nascitur, quibus scilicet primis animantis functiones referuntur acceptæ. Est enim hoc morbi genus cognitum maximè necessarium: nec ratione curari potest, primis elementis corporis ignoratis. Ergo quousq; in aquare animalis particula propriam actionem ædat, quæ tantum ab aliarum actionibus differt, quantum ipsa particula ab alijs, quæ illas ædunt, dispersa est, temperamenti ratione: sanè qui tueri partium actionem uult, hic temperiem earum custodiat oportet. Custodiat autem, si id quod ad calidius conuersum est refrigerabit: qd ad frigidius inclinat, exalciat: ac de ceteris intemperantijs, tam simplicibus quam compositis, eadè ratione. Quis enim octo earum sint differentes, octo nimirum erunt & medendi rationes, quibus particula, per contrarietatem eorum quæ exuperant, ad naturalem symmetriam reducit. Erit itaq; curationis una meta communis, quod diriguntur consilia medentis, ipsius similis corporis alteratio: quandoquidem etiam morbus, ex naturalis temperamenti alteratione est ortus. Medicatio autem particularis, ex materie copia, & huius congruente usui conficit. Sed horum iam proponamus exemplum, auspicati à uentriculo. Ac facillimè quidem curata eius alterationes sunt, quæ ex calido & frigido oriuntur, propterea quod maximè affectus qualitatibus corrumpuntur. Acrius uerò curantur, quæ in humido siccoq; habent, quod qualitatibus imbecillis, curatio earum perficitur. Ac tempus quidem caloris, frigorisq; reparandi, par quodammodo

Latentem populum mortuum uel prodesset, si nec uocaret quibuscumque.

Caleni iactantia.

Caleni uultu breuiter faciem propriam nemi præscripsit.

Similiter partibus primis animantis functiones referuntur acceptæ.

Intemperantia rem esse diffinitas octo iudicari medendi rationes.

Medicatio particularis ex materia copia & huius congruente usui conficitur. Venerabili alterationem quæ ex calido & frigido oritur, esse curata facillima.

est: se-

Cyclis formam uisum in magnis fracturæ capiti quando probat Galenus.

Ulcusculari fractura.

Caluaria forata raris.

Ostia raris.

Dimidium facti qui bene cepit habet. Igitur quod uehementer cõfractum est, id totum est aufferendum. Si uerò ab eo fragmenta quedam longius excurrant, hæc persequi ad finem non expedit: ut illud persuasum habentes, minime futurum ex eo noxa sequatur ulla, modò reliqua ritè sint nobis peracta. Atque indicatio agendorum hic quoque ex natura ipsarum partium affectarum subministratur. Necessum itaq; in capite uobis (quatenus dictum est) primò fracturæ aliquid denudare, quod uidelicet detergere & abluere à membrana saniem possumus. Pdnt uerò, quum phlegmones tempus præterij, omuati ad unguem sunt sicca, carnem producere, ac cicatrice locum includere. Porro quum unus atq; alter homo occurrisset mihi habens fincipitis atq; temporis os cõfractum, equidem superius, hoc est fincipitis, os exemi: à temporali autem abstinui, cui callum inducendum curauit. Nec infeliciter celsit nobis negotium. Quod uerò ad medicamentis post foratum os infundenda pertinet, quandoquidem auditorius metatur (qui non solum usq; ad cerebri duram membranam penetrat, sed etiam uerui contingit, qui in ipsam descendit à cerebro) uehementissima medicamenta tolerat: nihil mihi sit, si crassa membrana cerebri, antequam notabiliter occupetur phlegmone, ualentissimis post forationes etiam medicamentis gaudeat, ceu naturaliter siccam substantiam possidens.

Cranio forato, ualentissimum et ficiendum medicamentum quodam dura membrana cerebri.

est fecunditas tamē impar. Nisi enim cunctis quę ei quod curatur circundare sunt particulę, ualde planē sint, uerendum est, ne ab his quę refrigerent, noxam cōtrahant non leuem. In reliquis duabus qualitatibus est fecunditas similis. Tempus tamen curatiōis in sicca intemperie multo amplius est. Quippe quod senium in sanis, id in egris sicca intemperie existit. Itaque et infansibilis est, si prorsus sit consummata: nempe ubi solida partium similitudinem substantia ceciderit fuerit sicior. Nam est & altera siccitas, utiq; quom ea, quorum substantia est humore cōcreto coarctat, sicuti caro & adeps, sunt liquata. Etiam tertia, quom propria humiditas, unde partes nutriuntur, & quę in illis habetur, ueluti ros quidam sparsus, omnino est absumpta. Diuersa ab his siccitas est, quę in propriis cuiusq; particulę exhibitibus arteriis atq; uenis consistit. Prouenit autem & hæc ex penuria sanguinis. Omnibus igitur his siccitatibus maxime contrarius est austerorum usus: quippe quę si quid in his superest naturalis humoris, id absumunt, partim ebibentia, partim in sinu uentris per exigua meatus excrementia, partim ad continentes partes trūdētia. Carabis ergo ipsas, si meatus qui contracti sint, dilataueris, ac quod in uicinas particulas est impulsū, retellas: præterea singulas similitudinem partium propria humiditate, humectantibus nutrimenti ope, repleas. Cui negotio lac asinum ex ipso animali factum, uel maxime ex usu est. Quod si asinum fugere uerget ipse grauetur, expedit ut quamminimo tempore lac in ambiente æthere moriet, propterea q̄ celerissime mutari est aptum, genitalis seminis ritu, quod nec ipsum aliquandiu extra propela uasa morari patitur. Optimum aut, utpote cognatum, existit muliebre lac: quod quidem sugendū nō suadet Prodicus, qui tale absumuntur. Sed quoniam id exhiberi sibi cum pueris pleriq; reculant, utiq; cum asinis, asinum ipsis dari conueniet. Id siquidem reliquis omnibus ad propositum affectum uilius est, quum & tenuissimū sit, coaguleturq; minime, & quoquo uersus ocyssimē digeratur in corpus. Est itaq; lac ipsum nō tum per se dandum, tum pauxillū ei tepi di mellis miscendū. Ceterum quoad mel statuo est colore, odore suauis, tum purū aded, ut totum pel luceat, ac gustanti parum acat iucundissimūq; præterea tam sibi hærens, ut si attollatur digito, edētinuum sibi, nec intercisum, ad humū deducat, id omniū optimum iudicatur. Si uerō abruptum sit, nec demissum ad terram usq; continuatatem tueri, id aut crassius iusto est, aut tenuius, aut dissimilium partium. Debet autem nullam penitus aliterius cuiuspiam rei emulgentem in se continere qualitatē optimū mel. Quare quod thymum planē redolet, minime probō. Ad eundem modum & lac nullam externā qualitatē odore gustūe præ se ferat: sed esto quamdulcissimū, & sibi ipsi cōnisiū, & prout lacti cōuenit, splendens, super omnia, quoad eius fieri poterit, similes partes habeto. Quā uero optime lac fiat, & idoneis nutrimentis alendū animal est, & exercitationibus medicandis exercendum, & pullus, si quem lactat, auferendus. Quod autem ætatis quoq; florentis esse uel maxime debeat, id neminem latet. Curandum quoq; ut, quam optime concoquat: contempnis uidelicet his, qui si asinis quoq; præscribemus

uictus rationē, ridebit. Fugiamus igitur argum aliquem tum lotum esse, tum lac hauisse hunc: ad secundam usq; lauatiōē quiescere permittemus, tum modicē fricabimus, & pinguiet, utiq; si lac quod fumpsit, iam ad unguem cōfecit: id quod tum ex ructu, tum uentriculi mole, nobis licebit coniicere. Modicum uerō temporis iuter primā & secundam lauatiōē interuallū eris, si quatuor aut quinq; æquinoctialū horarū interuallum iuteris, scilicet si tertio adhuc lauare paras: siu aliter, plurius. Sanē tertio lauatiō, si multis lauatiōibus fuit assuetus. Quimetia post quāq; lauatiōē hominem unguem oleo pruisquam se uestiat: uelidelicet plus digeratur æquo, sed obstruat exiguā cutis spiramenta. Quippe conducit ad renu-tricationem id quoq; sicuti & frictio. Iam uerō siue cuiuslibet parti corporis temperatam infundas calidam aquam, siue frices, siue laues, siue alter quomodocunq; calicias, primum quidem attol-litur, mox efficitur gracilis: ideoq; ubi carne im-plere quodlibet corpus studemus, id ratenus cal-faciendum nobis est, dum intumescat: ubi uerō primum intumuerit, tunc superfedendum est. At si digerere & euacuare contendimus, eatenus con-tinuandū est, dum quod prius intumuit subsidat. Sturget igitur delectetur lacte, post secundā quoq; lauatiōē id exhibebis. Sin alter, pitans diligenter coctam, aut alicam prisanē ritu præparatam. Hinc ubi rursus quicuerit, ad tertiā reducendus est lauatiōem, aut illico ad cōnam. Sit autē præ-paratus illi panis purus, probē coctus in furno, quigrum fermenti, tum salis, quod satis est, ha-buerit. Opsionum quoq; sit ex laxatilibus pisci-bus, aut ex alio iure aselus: necnon alia testēq; gallinacei, qui lacte sit alius. Quorū si copia non est, alijs utendum. Ad eundem modum & perdi-cibus, & montanis aulicis, quę mollem caruem sortiuntur, uescendum. Viranda autē & quę palu-stra sunt, & quę carne sunt dura. In summa uerō, alimentum sit coctū faciliē & nutriens, minimeq; glutinosum aut excrementitū. Porro omnī ci-borū, quos nouimus, maxime nutritis suilla caro est, uetum non aquē ac prædicta, cōcoctu faciliā præterea glutinosum succum crassumq; generat. Quare licet uel ad propositū affectum non conue-nit. At uino ut utantur omnes, quibus refici cor-pus est opus, consulo, modō nō febricitet. Esto ta-men id & aquosum & astringēs leuiter. Aquosum uatura appello uinum, quod tenue est, & purum, minimūq; aquę mistiōē ferens. Cauendum autē ad uinosū est, q̄ feriat uires imbecilliores. Rursus nouellū uinū tum aquosius, tū imbecillius quo-dāmodo est, q̄ uino cōueniat. Adde etiā q̄ ægri us cōcoquunt, ac magis excrementosum est. An-tiquius uerō, ut uinosius est, ita uehementius exi-stit, q̄ ut propositis sit ex usu. Porro aquę uita pen-dent ex aquę frigidityte omnia: cuius culpa & mo-ral in præcordiis diuissimē, & fluctuationes exci-tat, & in statū restituit, & corrumpitur, adeoq; uen-etriculi robur refertur, ut deterius proinde conco-quatur. Sed nec digerendo per corpus alimento ma-gnopere uidet aqua cōducere. Quibus fauē aquę uitis, quę nuper diximus uinū contrarias uirtu-tes obnuit. Potiōis itaq; est crit modus, ut neq; in uetriculo innatet, nec fluctuatiōis uilius sensum in uentriculo uerō, ut uel uō grauior, uel graui-

Sicca intempe-
ries in ægri uis,
quod senium in
sanis.

Siccitas consum-
mata est in sa-
nibus.

Siccitatis spe-
cies tria.

An tertia siccitas
siccitatis ab-
soluta sit una.

Siccitatis co-
raria.

Lac asinum
siccitatis affec-
tu ueni digne-
tari esse.

Lac si in ære
aliquandiu mor-
etur, muta-
ri prout.

Semen genitale
extra propria
uasa corruptum.

Lac muliebre
esse optimū ta-
bule.

Lactis asini
prærogatiua.

Mel optimū
quale esse de-
beat.

Lac optimū
quale.

Animal cuius
lactis uis uolun-
taria, optima ef-
fe uictus ratio-
ne educandum.

Vultus ex a-
liis oblatore, po-
tius digeratur
tur ac resplendet
tur facies.

Carne argen-
da minimeq;
quale frictio
profundius deli-
detur.

Toller galli-
nacei.

Suilla caro est
maximū nutri-
mentum, ægri ta-
men cōcoquunt.

Vino uiantur
omnes quib; re-
ficio corpus espe-
dit, dummodo
nō febricitent.

Vinū ægros
Vinū uinosum
Vinum nouellū

Vinum anti-
quius.

Aqua uitis
præuenit ex-
cūs frigiditatem

Aqua distilla-
do alimentum
per corpus non
uoluit rēque-
dū cōducere.

re quamcūque definant. Ab hoc tensio inflatioque præcedit diu utrandæ ita sunt. Ergo si ob affectum uentriculi totum corpus macrescat, exquisitor uisitationis desideratur, propter concoctionis imbecillitatem. Vbi uero æger sanior est redactus, ad refectorem est transferendus. Id fieri, si pluribus & frictionibus, & gestationibus, quam antea, utmurac cibum, tum qualitatē, tum quantitatem mutabimus, ita ut plures & ualentiores quā prius exhibeantur. Quā uero ad sanitatem statum propemodum uentrem iam sit, cibandus uolatilibus est: illigiam offerre carnes suillas licet primū quidem, porcellæ pedes in prisa elixos, dein pernam: ab hac enī reliquas partes. Quæ porcellum, si hyema sit, pridie fuisse ingulatū oportet: nam hesternus, quā recens sit, facilius cōcoquitur. At uitate sit fuerit, si porcellum mane immolatua fuerit, ac iuxta occasum solis edatur. Quippe semper alimentum ualentius ad uesperam exhibendū est. Quā igitur qui macilentissimi sunt, plurimo nutrimento indigent, nequeant autem uel quod mediocre est cōcoquere: paulatim eoa, sed sæpius cibare erit melius. Atque hac sanē de causa ipse eoa ter cibare sunt solita. Verū quando iam manifestē meliores sunt facti, etiam biā nutriuisse sit satia. Quare tantam exhiberi primam cibationem est rationale, quanta prius quādam secunda sumatur, tota prorsus erit concocta: id quod ualentiori cōtingere alimento non potest. Idcirco primo loco leue sumendum eia est, secundū autem crassius: quidquid & quies, & somnus, & longiora tempora, huius naturalē administrationē excipit. Iam uero bibendum illi cō post cenam nō est, antequam cibis fuerit concoctus. Siquidem iunantur cibi si bibant, ita ut eoa uentriculi corpus, propter humorem interpositum, non cōiungat. Cæterum si magna sit torquetur, tantillum est propinandum, quod & molestiam soletur, & firmiter leuet. Vbi uero nutrimentum concoxerit, abundē bibere sunt sinendi. Manē autem post somnum, quum deiecerint, & paulum inambulare rint, modicē sunt fricandi, uidelicet donec corpus incalcat: mox gestationibus utendū. Deinde rum laudandi sunt, tum fricandi, idly intra uel circa meridiem: Quum igitur conualescentiū uictua ratio media quædam sit inter eam quæ saniorū propria est, & quæ ægrotorum: difficile minimē fuerit, ex his quæ de utraq; sunt prodita, ut per se ipsum quia mediū inueniat. Domum in qua cōualescens nutritur, sit temperata: laudandumq; ut ad eoa cibos reducat quosq; quibus insueuit: uanarum interim proprietate oblectata, necnon regionia & tempora. Sciendum autē est, uniuersum corpora habitum exicari a uigiliis: ac proinde eas infestissimas esse ita qui ex siccitate laborant. Quod uero ad nutriendi modum spectat, si corpus modicē siccum sit, uberius nutrire id licet: propterea quod uires eia, quæ utiq; alimentum conficiant, penitus non conciderunt. Si uero immodicē, parcius, contraria ratione. Porro intemperies sicca, ubi solida corpora contigerunt, si quidem in una quapiam parte consistant, ueluti nuac in uentriculo propositum est, nunquam integre sanabuntur: neque in eum statum qui ante morbum fuit, reuertentur: sed in reliquam uitam particula affecta laborabit imbecillitate. Quod si intemperies

sicca etia solida cordis partes occupet, celeriter sic affecti inarescunt: quem marasmū, Philippus uocat ex morbo senū. Itaque breui mortem conciliat. Proximē huic, qui à iecinore incipit, est. Mox qui à uentriculo. Quia ab alijs partibus ortū habet, tantū tardius, quanto quolibet harum ignobilior quā ille existit. Cæterū uictus ratio eadem genere est, cum in hac siccitate, tum in illa, quæ solam eam humiditatem absumit, quæ nutrit solida partes. Præterea etiam in tertia, quam supra memorauimus, siccitate. Facillima uero omnino sanatio quarta est, in qua uetere succo suo sunt inanita. Imo hic affectus ad digestionē potius corporis, quā ut siccitas, est curanda: ac proinde eius sanatio est celerissima. Scire autem licet, solidorum corporum siccitatem, si perdurent, succedere necessariō frigiditatem. Celerimē namque ex nutrimenti defectu refrigerantur partes, propterea quod ex calido sanguinis succo nutriuntur. Si igitur siccitas partū iuncta frigiditas sit, duplex erit medendi ratio, humectans scilicet, & modicē calfaciens. Nam quæ calfaciunt impense, hīs uelut menter siccandi uis inest. Quare calfacientes materię humectantibus medicamentis tantū miscendum est, quantum particula ad frigus ratione siccitatis inclinat. Proponamus ergo (exempli gratia) uentriculum tum siccum, tum modicē refrigeratum alicui esse: huic certe simul cum lacte uberius mel exhibebimus. Vinum uero, quod minua aquosum quam prius sit, & plurium annorū, dabimus. Quiniam effulscuta omnia calidiora offeremus: idly tum naturalis temperie, tum ignia opera, sic comparata. Nardino præterea uingento ungendum assidue est uenter, sic ut utrumque siccus remaneat. Eius si copia non addit, utere mastichino, aut opobalsamo, & perse, & misto dictis unguentis. Quod si cupia ut magia ea corpori adhæreant, cerę non nihil est admittendum. Si aer ambiens sit frigidus, lanam opobalsamo aut unguento nardino imbuti, in quibus liquata prius Chia mastiche fuerit, admouebas uentriculo. Præstiterit autem imbueri optimam purpuram, qualia est Tyria: quando & astringi ipsum modicē, & enia eiaz meatus obstrui expedit. Siquidem quarum habitum faciunt, & relaxant, ea tum digerunt succum, tum particulas frigidis extrinsecus ad uentrem obnoxia reddunt. Quæ uero ualenter astringunt, ea siccant. Quo fit, ut medicamentum quod eiusmodi corpora calfacit, id neque euocantem uim habere expedit, neq; asstringentem multam sibi immitti. Memineritis etia, qualiter acerbam, sua quidem ipsius uirtute, & refrigerare & siccare: quare etiam prohibenda est in huiusmodi affectibus. At si cum sicca intemperie multa frigiditas adsit, in nardino unguento similiter Chiam mastichē quam pinguis simam solues, ac purpura excipiens, uteris. Commodissimē etiam adieceris opobalsamum. Dandum præterea uberius cum lacte meli est, sed super prunas ex queru uictuē, desumpatum curiose, quo & minua sit excrementosum, & magis nutriat. Quiniam mel ipsum desumpatum per se optimum nutrimentum frigidis uentriculo est, ut aduersissimum calido. Vinum autem eligendum semper antiquū est, eoip; antiquius, quod maior fuerit frigiditas. Sed nec adeo esse debet ue-

Senex ex morbo
ba.

Siccitas hys
diebus quatuor.

Siccitas corporum
solidorum
si perdurent, succo
uictus refrigerantur
frigiditas.

Ventriculo sicco
modicē refrigerato,
qua medendi ratio
debetur.

Ventriculo sicco
& frigidissimo
remediis, qua
synthesis conueniunt.

Purpura Tyria

Acerbam qualiter
refrigerare & siccare

Mel cum lacte
confusum uentri
culo facit in
pinguis refrigerata.

Vinum antiquum
quod uentriculo
frigiditati est
optimum.

Refectoria
victus ratio,
quo modo admi
nistretur.

Hesternum
quum recens sit
tatum porcellū,
facilius conco
quitur.

Vesperis exhibendum
est ali
mentum ualen
tius.

Macilentissimi
sunt cibandi
par
ci sed crebro.

Cibi cur cras
fieri in cena
debeant.

Bibendum illi
cō post cenam
nō est.

Conualescentiū
uictus ratio,
media sit
inter eam quæ
sanior, & eam
quæ ægra debet
uideri.

Vigilia quibus
sunt aduersissimæ.

Vina amara
medicari so-
lent.

Picatore in
quibus reuol-
uitur.

Puellus admo-
tus reuoluit
calorem il-
lum.

Formica ca-
pilla quibus
medicari so-
lent.

Ventriculus ad-
modum frigidus
et incale-
scit prae na-
tura, quia ve-
rus ratio est
vera.

Ventriculus in
tempore labo-
rum calidus, et
humiditas me-
diocriter in-
creuit.

Frigiditas per
quibus pericu-
latus est.

Humida inter-
peries facili-
ter curatur.

Ventriculus in
periculis effe-
ctus curatur
per.

Ventriculus in-
temperans
da et sicca et
omnis possum.

tus, ut iam amaricet. Siquidem uina amara, immo-
diocē ficiant. Sanē optimū medicamentum talibus
omnibus sit, quo picatores quou die utuntur. Er-
go illūne eo totum uentrem, ficuti & alias om-
nes particulas, quae alimentorū usui non promo-
uentur, conuenit, ac postea illi, priuāquam refri-
geretur. Quod quidē si bīa uno die fecerit, abunde
fuerit. Naturalem uentriculi calorem tueretur &
fouet admotus puellus qui boni habitus sit, & mi-
nimē cute humectat. Suat qui catello pinguis in
hunc habeat usum; qui etiā ex usu sunt nēs, qui
propter siccitatem solam habent imbecillum uen-
triculum. Nocent autem intemperantis et iulmodi,
fomētā calida: quae quidem siccā sunt, eō quod
rorem similium depaſcunt corporum: quae uē-
rō humida, quod hunc digerunt, potissimum ubi
largius his uimur: praeterea quod nimis rarum,
frigoriū oportuū corpus efficiant. At si multae
siccitati sit calor non admodum multus adiun-
ctus, abstinendum a melle est, uinum minimē
antiquum bibendum. Iam cibos offeremus te-
pentes: sed si xestas sit, qualitate referentes aquam
ionianam. Ventriculum autem ungemus oleo
tum crudo, tum melino. Ac multo sanē magis, si
placenta caliditas sit, ipsum uinum tum aquosius
exhibebimus, tum sub eo frigore, quod fontis a-
qua per medium uer exhibet. Illud nobis persua-
dentes, eiusmodi affectum febri proportionē cor-
respondere. Nam quod illa in toto animali, uel in
corde est, id propositum nunc affectus est in uen-
triculo. Ceterum ubi ualide in ambabus qualita-
tibus immutata quaevis particula est, omnis eius
affectio perit, atque labefaciatur: nec facile quod sic
est affectum, ad suam naturam reueri potest. Vbi
uērō altera tantum qualitas pluculum immutata
est (ueluti uincit siccitatem fiximus) et reliqua
autem aliqua eae habet mediocriter: utriusque
ita est affectus, sanari potest. Si uentriculus inter-
perie affligatur calida, cui mediocriter humiditas
iuncta sit, facile affectus is frigidae potione cura-
tur: quum minimē ex ea ledantur partes uicinae,
utpote he habētes mediocriter. Nam in siccis uen-
triculi affectibus, necesse est nō ea modō quae pro-
xima sunt, sed etiā totum corpus gracilius reddi:
ac proinde tunc potus frigidae maiori cum peri-
culo administratur. Si ubi uērō adeo uehemens
caloris intemperies uentriculum occupet, ut usque
ad cor ipsum perueniat, febricitare hominē est ne-
cesse. At intemperies humida uentrem accidat, fa-
cillimē omnium curatur. Cuius quidem, si sola
consistat, remedia sunt cibi citra ualentem cale-
factionem, refrigerationēque siccantes: praeterea
conserue potius in parca. Eius autem quae cum
caliditate coniuncta est astringentium tum cibo-
rum, tum potuum minimē caliscentium usus,
necnon potus frigidus, quem admodum illius quae
frigori est iuncta, optima praefida sunt aeris om-
nia: quibus admisceri debent quae acerbā sine, mi-
nimē tamen euidenter refrigerantia: praeterea po-
tio exigua, eaque uini insigniter calidi, ueterisq;
in uentriculum autem, calida intemperies uentriculi
refrigeranda est, frigida caliscentia, humida fic-
canda, siccā madescentia. Ad eundem modum
quae ex duabus qualitatibus intemperantis con-
sistat, reliquis contrariis sunt retundenda. Peli-
ma autem omnium est intemperies, inter simpli-

ces quidem, siccā: inter compositas uērō, siccā si-
mul & frigida. Atque haec uentriculi intem-
perantis, extra humores affluxum. Vbi uērō ali-
qua humor aut in ipso sinu uentriculi deiecit,
aut imbutus in illius tunica, aut ori intemperan-
tiae exierit, expurgandus ille est. Quod si ab ali-
partibus transmittatur (id quod ex toto corpore
habitu, ac tum singularū partium exploratione,
tum ex uacuationibus solitis retentis, necnon
cōsuetā mētua ratione cognoscere) primū illis est
succurrendū: dein uērō roborandus uentriculus,
quod eorū quae ad se se confluunt, minus promptē
quicquid admittit. Verū si quidē ex minus mome-
taneis facta translatio sit, quod superfluum est, rur-
sus ad ea reuelles. Sin ex his quae maioris momenti
sunt, ambobus simul cōfusa, tum semper affectū
submouens, qui fluxione exierit. Rex id, si omnes
corporeis partes ad bonam redieris habitudi-
nem: omnesque expulsiōnes naturae, fluxiles semper
reddideris. Quod si ob aequali in toto corpore
redundantiam humorū, uentriculus fluxione tēte-
tur, totum corpus est euacuandū. Si propter mali
fucci abundantiam, eo purganda est: atque hinc ad uen-
triculum cōuertenda curatio. Quae igitur in sinu
eius cōstinetur, eō modō expurgatur per uomitu-
rum. Verū si quod plures dies prauus humor
decubuerit in ipsum, ueter aliquid sibi uitae cōtra-
xerit, haud intempetū, qui sic laborat, abstinent
potione utetur. Per contraria autē corrigi inducta
intemperies debet. Si uisiofus succus in uentricu-
li tunica sit receptus, curari i affectus debet phar-
macia quae modicē purget. Ceterum quae ex aloē
componuntur, omnū sunt longē aptissima: nec
secus ipsa sola aloē. Quae quidem si illota sit, ualen-
tius uacuat: elora autē, purgat quidem minus, sed
roborat uentriculum magis. Exuperat ergo para-
tam habere heri, tum ex aloē illota, tum ex elora
coacta. Admiciuntur autē huius drachmis cen-
tenis, cinnamonum, xylobalami, asari, spicae nardi,
croci, & Chiae mastiche, singulorū sex drachmę.
Præstantissimū hoc medicamen est contra uino-
sos succos, qui in tunica uentriculi habentur: utri-
usque fuerit ut siccus ex aqua uti uim paruorum
cochleariū mensura, ubi mediocriter illo uti stu-
demus. Siquidem maximus eius modus, est ma-
gnorum duō cochlearium portio, in aquae tem-
perate cyathis tribus: ut minimus, unus parui.
Utendum uērō hoc tempore & pituitae eremore
est, qui primū a balneo fumē. Nam medicamen
ipsum solito purgantium medicamentorū tempo-
re dabitur. Post id uērō, ubi modicē inambulaue-
rit, de reliqua uictus ratione nihil est immutan-
dum. Sicut qui reponunt medicamentū, excipien-
tes id depurato melle: & sit quidē sic durabilis,
ceterum nō perinde ad propositos hoc loco af-
fectus uelut, quō & minus uentriculum roborat, &
magis aluū subducit. Verū quibus lenta pituita
est infixa uentriculo, is prius sunt exhibenda, quae
candam cōm discē: post deinde purgandū. Quod
si ad uomendū sint apti, nō in uile fuerit per radi-
cālem ex oxyphyllo uomere. Sin uērō nec lentus
humor sit, nec crassius, utique abunde fuerit a pitui-
fanae solia eremore uomiscentem i mulla. Quo
casu sumendū utriusque plus est, si uel nutrimen-
ti, uel etiā deiectionis causa sumetur. Idoneū
uērō est, et mulla in qua coctum abſynthium sit,

Ventriculi intem-
perantis quibus
regulans
est humor, quae
ratione curari
possunt.

Abſynthii potio
quibus sit con-
gruus praefida
um.

Aloem purgat
humores in tu-
nica uentriculi
imbutos.
Aloem elata fa-
cilitas.
Hiera picra de
pieta.
Hiera picra ci-
pota.

Flora siccā
ex aqua
uini Galeni
cōmēdat, con-
tra uisum hoc
est uentriculi.

Flora cum mel-
le coacta mi-
nus uentriculi
roborat, sed ma-
gis aluū sub-
ducit.

Attenuandus
est prius cras-
sus succus, quā
necnon.
Vomitus qui
bus & per quā
pronandus.

Affectus omniū maximè regitur, dirigitur semper curatio consilii unde debet.

Affectus magni tunc est triplex.

Ventriculi grauiusculi laborant ob defluxum humoris à capite descendente, curatio.

Affectum nullū perfecti sanari possit, manente adhuc ipsa, va de viuis est, ita fa.

I indicatio remediū à natura partu laborantis designat, est in multis.

Recessibus à naturali temperie exiguū mutatione est, quæ ut remanent, magni vero maxime. Cognato naturalis morbi laboris minus periclitatur.

bibatur. At uero si plures affectus in unū coeant, ad eum qui magis urget, dirigī primū curantis consilium debet. Vbi aliud efficiens est, aliud quod ab eo efficiatur, ipsa causa spectanda. Sin autem curari hoc ante illud non licet, ad id quod ordo dicitur, est respiciendum. Atque in eo quidem curatio consilio, quod ab urgente nititur, affectus magnitudo perpendenda est: quæ sanè triplex existit. Alia namque ex læsæ actionis præstantia spectatur, alia ex propria affectus essentia. Tertia præter has, ex facultate quæ læsum corpus gubernat. In eo uero consilio quod ex causæ ratione nititur, animaduertendum est, quidnam eorum quæ inter se sunt coniuncta, augere aut gignere reliqua possit: quæ rursus uel gignant, uel in eumentur ab alio accipiant: at in eo quod ordo præscribit, quid ante quod, uel quid cum quo, uel quid post quod, sanari possit. Pingamus igitur in uentriculum defluere ex cerebro superfluum quendam humorē frigidum: atque eius occasione intemperie quandam in uentriculo contrahi iam efficit uel potius malū iam succū per totum eius corpus media omnia simulariū particularum spacia occupasse: ab eoque, si placet, etiam mordicationis sensum, ac proinde tum deliquit animi, tum sudores, eum syncope quadā dissolutione excitari. Manifestū uero est, in primis esse occurrēdū ei, quod uires resoluat. Vbi aut uires firmatæ erunt, nec plurimū uitæ osi succi in uentriculo aderit, tunc nimirū ad fluxionis causam nos cōuertemus: illud pro cōperto habentes, non posse ad perfectiōnē ullum affectū sanari, manente adhuc ipsa, unde natus est, causa. Ergo si sic persanari mus cerebrū, ut sensibile amplius reducantur non creet, ueluti fonte fluxionis in uentriculum euerteremus. Ceterū si neque copia uorabilia excrementorū in uentriculo sit, nec eorum quæ in capacitate ipsius cōtinentur, nec eorū quæ in tunica, sed nec mordicatione quæ officiat uiribus, tum omniū primum sanandum ipsum cerebrū est. Ab hoc, sinus ipsæ uentriculi uacuandus, extergendusque est: postea expurgandæ tunice. Postremo intemperie medendum. Acreliquarū etiam partū intemperantiæ, similiter ijs quas in uentriculo propolumus, sanabuntur, adhibentibus semper nobis temedū affectui contrarium, illius remediōū indicatiōē, quæ à laborantis membri natura sumitur, adijcietur. Ea autē indicatio est multiplex. Vna quidem ac prima indicatio à laborantis loci temperie sumitur, quæ mensuram iudicandæ qualitatis præscribit. Secunda ex eo sumitur, quod actio eius omnibus animalis partibus sit communis, aut quod cōmune uirtutem subministrat. Tertia, ab ipsa parte figura. Quarra, ab ipsius positura: cuius portio est ad uicinas partes societas. Tum præter hæc omnia, ipsa sentendi uel acrimonie, uel hebetudo. Porro quæcūque calidiores natura partes ex frigore laborant, hæc liberalius, & diutius cal fieri possunt. Si uero calido morbo ægrotent, exigua breuiusque temporis refrigerationem desiderant. Siquidem paruus hic est in id quod præter naturā, lapsus: quare & in id quod secundū naturā, reditus. Eatenus siq̃ redeat ad naturā suā unūquodque est necesse, quatenus à natura recessit: ac ueluti quāsi uia retrō feras, quæ in diuersum agat ei, quæ facta in ipso est, transmutationi. Minus itaque periclitantur, quicūque cognato

naturæ suo morbo laborant. Quemadmodū autem reducantur esse ad mediocritatē diximus calidam & frigidam intemperiem, si cōducuntur & ceteræ, siue ex simplices sint, siue cōiungant. Porro in ijs temperaturis quæ sunt ex humoribus ortæ, si particula sibi soli iusserit, aut dāctæ uires licet, prout affectus suadebit, sed tamen etiā uirtutū attentus. Sin necessariū opus eius sit omnibus animalis partibus, ueluti uentriculi & iccinorū, uel leuis habēda sollicitudo de robore uirtutis est, ne hanc, magna semel uacuatione usas, dissoluas. Est autem cōmune opus & uenarū, & arteriarum, & cordis, & thoracis, & renū, & uentriusq̃ uescit. Cerebri uero opus, quū sanū sumus, ad uoluntarias actiones est necessarium, ijs scilicet instrumentis, quibus eiusmodi actiones obimus. Quam ægrimus, necessarium non est, nisi ijs tantum, quæ ad respiratū sunt deputata. Reliquorū uero organorum actio certē non est: ministerium tamen est ad uitam necessarium, ueluti palmonis, & asperæ arteriæ, & gutturis. Ergo ex eiusmodi particulis quamprimū uacuare reducantur licet, prout uolueris. Ex uentriculo uero & iccinorū utcūque uacuare nō licet, sed cum cauatione, ut ne quid uitæ officias. Habenda præterea est & dignitatis actionum ratio. Maxima autem est cordis officii dignitas, ægrotantibusq̃ omnium maximè necessaria. Cerebri uero ad uitam par est momentum: nō tamen par robur eius in ægrotis requirimus, quum necesse omnibus non sit neruorum ac musculorum opera uti. At iccinorū opus omnibus particulis perueniens est: non tamen adeo saltem perpetuum necessarium habet, sicuti ipsius cordis. Ad portionem autem iccinorū, etiam uentriculi opus se habet. Itaque ex partium functionibus facit intelliges, quatenus cuiusq̃ robur custodiri expediat. Ad eundem modū, & quæcūque partes alijs sunt facultatū auctores, harum quoque robur seruare decet, per facultatis earum uisus portione. Etenim cerebrum neruis ac muscularis, cor arterijs, iecur uenis facultatem suppeditat. A figura uero, indicatio ipsius modi uacuandi excrementi, ad hunc modum suggeritur. Ventriculus uominis, deiectionē inanit. Intestina deiectione tantū: sicuti & iccinoria caua. Renes uero, & uesica, & iccinoria gibba, si multo uisoso succo redundant, per deiectiones & pharmacā deiectionis expurgant: sin mediocri, per urinarios meatus. Cerebrum, per palatum, & aures, & nares. Pectus & pulmones, per asperam arteriam, & fauces. A situ indicatio dabitur, tum ad solidam intemperiem, tum ad succorum uisū, non leuis. Nam qui per summa corpora intemperie laborant, ijs medicamenta quæ intemperies requirit, applicabimus. Quibus autem in summo corpore intemperies est, in ijs rationē laterali inibimus. Sin enim medicamentis ijs utre, quæ intemperies postulat, utique multo imbecilliora, quā pro usu tuo, ad affectum locū peruenient. Iam ad uacuationes quoque fitus nō nihil indicat, dum societas laborantis particulæ cum alijs docet. Non spernenda uero indicatio est, & ea quam sensus partium acuit, hebetudoq̃ suppeditant. Quasquodquidem omne medicamentum cōemunt, quæ tardi sunt sensus, etiam si non euit mordeat. At quæ acuti sunt sensus, earum uires dolore soluantur.

Partem afflicta quando audierit, quando impule uacare debeat.

Partium officia quando uires resoluas, quæ dāctæ uires.

Cerebrum. Cor. Hepar. Vacuationis modus quando à figura partis afflicta fuerit.

Situs partis afflicta quæ modo canones colobent.

Sensus partis afflicta quæ pro bono indicatio.

soluuntur. Expedit igitur his, nec cōferim, nec semel, valentibus auxilijs mederi tentes, sed rursus potius in tempore. At ubi tardus est sensus, in his etiam celeriter obire quod iustum est, licet, semel usus remedio quod sit idoneum.

GALENI PERGAMENI DE methodo medendi lib. VIII.

Quod igitur ex calido, frigido, humido, & sicco, simularium particularum natura constet: quod ipse simplices atque prime particule secundum tales temperaturas inter se dissident, alibi à nobis est traditum: quemadmodum etiam duo esse morborum genera, quae simplicibus ipsis particulis accidunt: alterum, quod compositis est etiam commune, & dicitur unitatis solutio; alterum peculiare ipsarum, quod in calidi, frigidi, humidi, & sicci temperie consistit. Quarum sane intemperiarum, quatuor diximus esse simplices, quatuor uero compositas. Simples quidem, quae secundum unam qualitatem à naturae ordine aberrant: compositae uero, in quibus secundum oppositionem utraque ipsa natura uariatur. Febris autem, unus morborum est, quos intemperies gignit: utique quod adeo immodecus est auctus calor, ut & offendat hominem, & eius functiones laedat. Porro primarum differentiarum febrium, una illa est, in qua causa adhuc adest febrium creatrix: aut febris excitata, iam desit. Altera uero, quae esse solubiles, à solutione facilibus febribus, dissingunt: illas hecticas, has Graeci schiticas uocant. At uero prima indicio omnia febra, ueluti à morbo est, ablationem eius praescribunt. Secunda autem, ueluti à tali est morbo, quae certam quandam sublationem indicat: nempe intemperiem febilem, quomodo fit caloris excessus, per occursum refrigerantiū tollendam esse. Omnis quippe excessus per contrarium excessum sanat. Ergo si febris ipsa sit genita, causa autem quae eam excitauit, iam desit, huc tantum sanandae eius dirigetur consilium, ut refrigeretur. Si uero in generatione adhuc febris est, causa quae accendit illam, est submoenda. Sin pars eius iam genita est, pars etiamnum gignitur, cōsulendum utrique fuerit: primum quidem, submoendum quae eam accendit causam; dein extinguendum, quae ab hac accensa est, febrem. Excitare autem uel maxime febrem solet consipatio meatuum, in his corporibus, quibus quod transpirat, halituosum non est, sed mordax, acre, & fuligini simile. His igitur corporibus saluberrima est ex aqua dulci temperata uauio, tum frictio quae rarefaciat, & excitationes medioeris, & uictus qui dulces efficiat succos. Aduersissima uero sunt lauatio frigida, & aluminosa, & lauatio abstinētia, & exercitatio acuta, & frictio uel planē nulla, uel dura, & uictus mali succi, & uigiliis, & ira, & tristitia, & cura, ostioque in sole, & sanguine. Grauisime autem peccare mihi uidentur, à carnificibus nihil differre, qui medici hominibus natura biliosa, tenuissimam per morbos rationē uictus iniungunt, eosque tridui inedia conficiunt: quum nimia talis natura, ex longiori abstinentia cibi, acerrimis acutissimis febribus corripiantur, à quibus promptus est in hecticis transitus, atque ab his rursus in marasmodum torridum, aut (si ea uentriculi est iniuria obnoxium) in eum qui syncopen infert. Etenim

in quorū temperie siccum praualet humido, & calidū frigido: his corporis habitus gracilis, hirsutus, & nigrior est: ac reliquis tribus intemperantia, quae hac minus calide sunt, tunc calidior aduertitur. Plurima quoque his flaua est bilis, utrinque ac deiectione bili saturata, & pulsus magni, & somni leues & pauci, & animi impetus uelocius. Quae etiam tum refrigeratione, tum aq. potione, atque adeo requiritur & cibum largior congruere proficitur Hippocrate. Quum autem refrigeratio ipsa conciliat corporibus tum et alij quibusdam, tum non minime ex ciborum exhibitione: cōueniet utique, ubi corpus calidius siccissimum solito est redditum, frigidum humidiusque intrinsecus exhiberi: sed quod nec medicamentosa nullam sensu perceptibilem facultatem obtineat: nec ipsam quod nutrit, plurimum: quemadmodum neque minus quam sit ex usu. Cōmodissimum itaque tali corpori est praeparare morum ad unguem coctum, in quo nullum sit condimentum superfluum: utpote qui & refrigerare, & humectare, ac sine sit feruare homini potest, cum eo quod nec halituosum, nec humidum, nec siccum detinet excrementum: quum nec astringendi, nec obstruendi, aliquid uim fortiaur. Ac quod non astringat quidem, uel gustus ipse docet, cuius uicinis id iudicare est propriū. Quod uero nec obstruat meatus, hinc licet etiam coniectere, quod non secus quam ap. hronitrum, fordes cutis ex tergeat uicinisque à uentriculo medioerem pituitā eluciat, nihil infelicius quam multa: quae sane nec sitim restinguit, ut praesens & in natura biliosa bilest facit. At uero si multa, & uoluntate glutinosa & crassa pituita uentriculo adhaeret, hanc radica ex oxymelie, non multa, aut praesens detergere est habilis. Optimā itaque biliosam temperantiam nutrimentū est praesens. Proximum huic, alica, cui paululum aceti ad faciliorem distributionem adiectum fuerit. Tertium, quae sine alicera liquidatur. In sicce uero huic, dum coquatur, aliquid porri, faris est. Nam quod rursus anellit, tum salis aliquid necessarium habebit, neminem laet. Quum etiam panis in furno coctus, est utilis cibis: sicuti etiam omnes pisces fixatiles: nec ipsis minus asellus. Proxime asellus sunt, soles, torpedos, lupus, muli: post, mugil, & pelago. Omnis autē piscis deterior est, qui prope lacum qui mari iungitur, aut magni fluminis ostium, patit. Ex uolatilibus optimi sunt perdices, ac montanae omnes auculae. Ab his, gallinae, & phasiani, & columbae iuuenes. Sed nec haec tamen intus claudenda, quum excrementosa sint omnia, quae excitatione caret. Excrementosa uero non minus sunt, tum laeustria, tum palustria omnia. Quo fit, ut ex ipsis etiam fulis carnibus, optima sit montana. Ab his denique sunt hodi. In omnibus autem fugienda tum uerula, tum recens uerula sunt: illa namque duriora, concoctius difficiliora sunt: haec immodice humida, & excrementosa. Igitur, quibus acre aliquid quondam transpirat (ferentur enim rursum ad infuturum) hi, si curis eis constipetur, facile corripiuntur febri. Si uero ipsam, tum quae astringunt omnia: tum quae lenit, crassitudinem sua, in exiguis haerent meatibus. Aliquod etiam ipsius cutis immoderatio siccatas, exiguos meatus densat. Qui ergo ex stipra cute febris laborant, in cunctante prima accessione, ducendi om-

*Calide et sicca
temperatura in
dicitur.*

*Calide et sicca
naturae quae
in uicinis ratio
conueniat.*

*Prasens cremo-
sa facilius.*

*Consilium quid
proprium.*

*Prasens inoffe-
nsus deterior.*

*Multa uero natu-
ra biliosa bile-
st facit.*

*Alica biliosis
naturae conue-
nit.*

*Pisces biliosis
naturae congrui
sunt.*

*Pisces dampnan-
di qui sunt.*

*Volucra bilio-
sa congruentia.*

*Excitatione
caritas esse ma-
ximam excremen-
tosa.*

*Hodi biliosis
ap. autem.*

*Animalia uero
lae, uicinisque
ad, ubi esse in-
propria.*

*Stipra cutis
cum qua sunt.*

*Febricitans à
constipata cute,
quod sit pro
causa ex abla-
tione.*

*Simularium parti-
cularum natura ex
quibus consistit.*

*Simularium parti-
cularum effectus
horum genera.*

*Intemperantia
ratiōem quae
duplex.*

*Febris quando
ignatur.*

*Febris prima
differentia.*

*Hectica febris.
Schitica febris.
Febris indica-
tione.*

*Excessus omnes
per contrarium
excessum sanantur
esse.*

*Consipatio
meatus quon-
dam febrem
re patit.*

*Febris à consi-
patione produ-
cta, perit.*

*Biliosis natu-
rae, ex longiori
inedia febribus
accensum cor-
ripit.*

nes ad balneum sunt: tum pinguius, molliorib; fricandi, si quidem ex aliquo, quod astrinxit cutim, laborent. Nam si ex siccitate, fricandi quidem & ipsi, sed parcius lauandi autē uberius. Respicendum uero ad uirtutis modum semper est, in huiusmodi auxilijs. Atque ita quidem, tristitiae, uigilijs & curae, nec frictione, nec lauatione multa indigent. Sed omnibus qui ex eiusmodi occasione febricitant, oleum infundendum est tepidum largely, cui minimē aliterius uis infit: rum paululum fricandi, ex confecturadiu lauandi. Vitro uero protinus ab initio refrigerandi desiderat: rum crebriorem lauationem: minimē tamen aut oleum largum, aut frictionem crebram. Sint autem quae refrigerent, & rosaceum, & omphacium, salis omnino experta. Efficies hęc magis frigida, si ita uas, in quo continentur, in puteo suspensas, ut aquam rangat. Præterea si deluxus frigidae aquae uasi se illudat, magis humorem refrigerat: magisq; adliue nix circumposita. Infundere autē oleum ipsum synypiti, sublati in altum manu, per mediocrē lanam modum oportet. Hęc usque ad inclinationem faciens, in balneum duces.

Si uero qui memorato est temperamento, ex frigore febricit, etiam duendum ad balneum in remissione est. Si autem cum grauedine & destillatione febricitet, prius quam hęc sint concocta, lauandus non est. At qui ex uestione febricitat, ijs uel quum hęc adfint, lauari debebunt. Post lauandū uero ipsū quibus ante madefaciēda amborum capita sunt: eorum quidem qui ex uestione febricitant, refrigerantibus: qui ex frigore, calfacientibus: cuiusmodi sunt irinum & nardinum unguentū. Porro qui ex uestione febricitat, ijs intendenda, quae ex refrigerantibus cōstat, curatio est: ijs uero qui ex frigore, quae consistit in calfacientibus, remittenda fuerit. Omni autem condimento comprehendat in proposito temperamento, ubi febris diaria laborat, uictus communis est, ijs, qui & sit boni succi, & edocetū facilijs, & qui nusi-quam exiguis cutia meatibus hercat. Sed ijs qui exusti sunt, cum eo quod refrigeret, & humectet. Pari modo ijs, quos ira mala habuit. Iis uero qui refrigerati fuerunt, cum eo quod calfaciat modicē. Iis qui per nigrilium, & tristitia, & nimia cura confecti sunt, uictus esse debet humectans, atq; somnum concilians. Ad eundem modum ijs qui defatigati sunt, magis nutriendus: minus autē, ijs qui refrigerati. Reliquijs, qui medius sit amborū. Vinū uero ipse hīs omnibus exhibere solet, sed quod

tum aspectu, tum uiribus sit aquosum. Id enim ad omnia utilius quam aqua est: utpote quod & concoctionem iuuat, & nriuas ex sudores prouocat. Etenim constat Hippocratem, non in diarijs modo febribus, uerum etiam in acutis, uinū porrigere. Cæterum naturae calidae, magis potere frigidae portione iuuatur: neq; in diaria febris, nisi quibus in usu fuit, ipse cum circuncido. Si quis uero non affueuit, huius per febrem dare nō inceperim, nisi pristina sanitate prius reddita. Porro si propter obstructionem morata sit transpiratio, si parua quidem ea sit, qui rectē deterferit, secundam foras accensionem uerabit: sin momentanea, nō possit ita promittere. Quod si & multū, & crassū, & glutinosū impactū sint succi, quae hos excipit febris, siert non potest ut intra fines diarium con-

sistat: quando ex necessitate huius in mali succi natura, ea quae ex putredine humorum accenditur, succeder. Nam in alijs saltem temperamentis, quae in sequentibus exponam, excitari ex tali causa potest, citra humorum putredinem, aliqua cōtinentis febris species. Itaq; nisi uitiosus succus transpirer penitus, necesse est ut putrefcat: ut transpiraret autem, ualido auxilio est opus. Ac si quidem uel puer, uel senex sit, sanguinem detrachere non licet. Inter has ætates, ubi robur ægro non deest, secati da uena est, uel si plenitudo signa non adfint. Præter enim uictus maiore parte emissa, ad detergendas obstructions accedet: quum alio-

qui uerendum sit, ne si obstructionibus liberandis, prius ijs uacuaueris, itudeas, ipsas multo magis impingas. At soluunt quidem obstructions, quae deteriorum obtinent facultatem, sen foras admora cuti, seu intro in corpus accepta. Periculum uero etiam est, ne quae foras trahunt, uel cum ijs quae obstruunt, etiam aliud quippiam attrahant: & quae ab interno sursum feruntur, aliquid secū ex ijs quae in uasa continentur, rapiant. Quod ipsum si tenax & crassum sit, obstructio-

nem planē geminabit: si aliter, multitudine certē sua, non parum omnino nocebit. Neq; ita hęc contingant, utilissimum est inanisse corpus. Detergetur autem magnitudo obstructionis ex ipsa magnitudine febris, ut quae ex maiore obstructio-

ne, maior: ex minori, minor inciderit. Vbi uero modicē uacuaueris, laud multo post aut nō trimentum aliquod, aut pharmacum ex ijs quae detergeant, exhibebis. Atq; in alimentorum quædam ratione fuit pnsa & multa: In pharmaco-

rum, oxymeli, & quaecumq; in coquere in multa licet, ceu calamintha, hyllosum, origanum, serpyllum, irim, & apium. Verum hęc omnia iusto fuit calidiora, idcirco febres accendunt, æque ut uinum. Oxymeli uero solum nec febres accendit, & strenuē deterget, sic ut ea quae glutinosa crassa sunt, dissoluat, & meatus obstruētos liberet. Inter multa & oxymeli medium locum habet quod apomeli dicitur. Nec immerito arbitror & saccharum inter hęc numerandū. Ex hoc uictu obstruētis, quantum de febris calore minuitur. Etenim si tertio die manē uideris minimum esse quod de febre relinquatur, ac nec putredinis hu-

morum in pulsi nota subit, neq; in urina cruditas, suspecta uero hora, qua primo die febris occupauit, extra meridiem sit: audacter hominem quamocumq; lauiabis, longē ante sextā horam. Abundē tamen sit, si intra tertiam horam lauationem compleueris. Ad eundem modum & si decimam horam suspectam habueris, usq; ad septimā laues licet: quum tres quinquēstiales horas quatuorā, inter balneum accensionisq; tempus interponi abundē sit satis. Debet autem in balneo corpus prius unctum ad moderatissimē frictū, mox detergeri extrinsecus, abluq; Moderatissimē detergent tum erui, tum hordei, tum fabarum farina.

Præterea multa quae sit aquosa. Magis uero quim hęc, iris, & panacia radix, & aristolochia, & multa quae mediocri est mistura: ueluti etiā hac magis quae meracissima est. Possunt autē uel hac magis detergere, tum spuma nitri, tum nitrum ipsum, tum aphronitrum. Sapo etiam ex ijs est, quae maxime detergere ualent, Egregijs balneum, præ-

ter

Febri ab aui-
m afflicto.

Febri ab afflu-
m mdo la, cu-
ratio.

Re-acum refri-
gerandi mdo.

Capiti refre-
gerandi ratio.

Febri a frigore
arte curatio.

Diaria febre
horem in foli-
s temperamē-
to, tum cōmuni
muniā, tum
cuiusq; propri-
m mdo ratio.

Diaria febre
decenta uinum
esse propriam
dum aquosum.

Vinum acutis
febris suppo-
nere potest.
Celsa natu-
ra frigida potu-
re uolunt.

Aquam in fe-
bribus non esse
proprietatē, q-
ui uel illa mē-
conferuerit.

Continens fe-
bra spem ali-
quam excitar-
pote abq; hu-
morum putred-
ine.

Sanguinem nec
puero, nec seni
detrachendum esse.

Sanguinem det-
rachendum in-
terdū esse, ali-
qua plenitudo-
nis mōte.

Obstructiones
foliunt, quae de
terferat facultas
sestus produca

Vacuandū cor-
pus si corpus
quum obstru-
tionibus libe-
randum.

Oxymeli esse a-
poritū ab iro
tribus quim
apomeli quim.

Apomeli
saccharum.

Balnearum intro-
na corpus a febre
et acutis, prius
uictu debet, mo-
deratissimē fric-
tione, ac dem de-
tergere.
Detergentia
quae sunt.

Diarrhi ex cruditate fieri sicut in bilioso temperamento.

Cruditatis diffinitio.

Febris ex defurgendo frequenter.

Febris ex diarrhoea orta interitua.

Fomenta ex alio et absinthio quod da verendum.

Purpura merina.

Purpura Tyria. Ventriculi imbecillitas quare horret.

Tempus ad quo morantur, diffinitio ventriculi firmitudinem.

Vingens a esse caliditate in duplo et alio. Aluo statim que constant. Romanorum luxu qui quare vixit et inuenerit. Ceratum roborendo ventriculo la commodum.

Aluo fluenti vultu ratio comitatus morbi.

Appetentiam reuertere vultu modo comitatus ex facie cydoniorum et sic.

ter aquam quæ parum apij in coctum in se habuerit, nihil est offendentia. Iam uero diarriz febres (de quibus tandem in prædicti commentario agere est animus) in propolis corporum temperamenti septennumero etiam cruditatibus solent superuenire. Est autem pessima in eiusmodi temperamenti cruditas illa, cuiusmodi febres accendit, in qua cibus in nidorulentum & fumolam qualitatē corumpitur: quando ea que in acidam vertit, utraque talibus naturis coningit, ita minus nocet. Nidiorosa tamen cruditas, si alius lubrica sit, minus est noxia: sin asstringitur, grauius existit. Febricitant etiam nonnulli & ex his, quos diarrhoea ex cruditate male habet. Quibus urigi non minime proritale febris ex defurgendo frequentia. Est autem eorum quibus clausa aluus est, & quibus fluens, non eadem sanatio. Si igitur ex tantum que corrupta fuere, per diarrhoeam vacuata esse uideantur, tum lauandum, tum nutriendum in remissione febris est: sed ipsæ circa uentriculum sunt, prius consulo. Sin ita multa inanitio aut prius facta sit, ut nunc etiam iu homine duet, ut uirtus iam sit defessa, satius est omnia lauatione cibare, fed cōsulto prius his que circa uentrem sunt. Confulerit ita laborantibus, si modò uacuatio amplius non persequeretur, fomento ex oleo & absinthio. Quod si quis morbus, aut doloris sensus in uentriculo adhuc supersit, amicitri periculo post fomentum debet, qui uel calidus sit, & siccus: uel ex oleo in quo absinthium in coctum fuit, uel ex unguento nardino madens, ac plurimum expressus. Iam multo etiam satius sit, si purpura marina sit: atque etiam longe optimum, si optima sit Tyria. Quod si os uentriculi imbecillus sit, tanta portione Chiz maritimes in nardino tunia, uide foridum et asperitudo existat, madefactis ex eo purpuris imponemus. Edo autem abunde calens talem quiddam quam primum ad mouet. Nam que tepida sunt, dissoluunt uentriculi firmitudinem. Vnguentum autem ipsa calfacere in duplici uase folleo: quandoquidem aliter calfacitis, uitariur eorū facultas. Cæterum fluente adhuc aluo, unius est optimo recentij melino, simili modo quo nardino, uti. Vitale autem ad omnia talia est & mastichi nam: nec in postremis conserunt spicata & solitaria uingenta, que Romanorum luxuriam inuenit. Mi re etiam uentriculū roborat hoc ceratum quod subdam. Ceræ Tyrrhenicæ, unguenti nardini, singulorum unciam i. Aloës, Mastiches, singulorum drachmas ij. Fiat ceratum. Si uero intus uratur uentriculus, ita ut affectus quidam phlegmonæ similis consistere in ipso uideatur, unius est ceratum quod ex melino conficitur. Porro cibandi sunt, fluente quidem etiamnum aluo, polenta & pæno, qui pauxillum aceti receperit. Quod si plus aque aluus excernat, inspergere oportet polentam succo cotoneorum malorum, uel si xgro magis arideat) pistorum, aut malorum, aut myrtorum decocto. Sin uenter non amplius excernat, succerit tum alica, similiter præparata: hoc est, aceti habens pauxillum: tum ex ea fine acco sorbitio: tum gallinaceorum testiculi: & laxatiles ex albo iure pisces: præterea fructuum aliquos ex his qui asstringant, uel solius, uel cum pane. Quod si appetentia directa sit, ex medicamento quod ex succo, uel ex carne cotoneorum con-

ficatur, unum aut duo cocleiarum exhibebat. Atque ita sanè in prima remissione ne qui ex cruditate febricitant, uenter excernente, mederi conuenit. At si omnino uenter asstringitur, si quid in superioribus intestinis, uel etiam in ipso uentriculo cibus crudus consistat, aliquid diatrion peperone propina, eius uidelicet quod in opere de tuenda sanitate laudauimus, ceu & simplicissimum, & aptissimum his qui cruditate laborat. Post drinde præcordia, omnemque uentrē perfundes. Hoc uero, etiam si inferius decidit erunt que uinosa sunt, facies, plurius minoris ratione id uariare. Si quid plus & temporis & perfusionis exigunt ad præparationem eorū que deinceps sunt agenda, quib. in superioribus uetris corruptū nutrimentū adhuc manet. Sin mortū id notabiliter ad inferiora sit, adiuuandum aut glande subdita, aut leui per inferna fistula sione est. Vng si morbus simul addit, hūc mingantibus nobis. Sin flatus, hunc cōprimentes. Sin neutrum fuerit, ex melle, aqua, & paululo olei ipsum clysmum facientibus. Vbi uero morbus uehementior urget, Sabinum oleum, in quo aliquid est ut anserini, uel gallinacei, uel caprilli liquatum sit, est utilius. Quorum copia si desit, iniiciendum oleo parum ceræ est eloty. Flatus uero d sanandis sunt oleo in quo ruta, & semina que flatus discutiant, incocta fuerit: cuiusmodi sunt, apij, cumini, marathri, finonis, aliaq. id genus. Vacuata aluo, nutriendum protinus in ceteris quidem his quos memorauimus similiter est, asstringentibus tamen amoris. His igitur prima & secunda die obstita, si secunda die febris desit, hominem lauare permittes: ac ubi sequenti nocte citra offensam dormierit, sanum iam hominem profus existimabis. Si uero qui cruditatis successit dies cum sequente non est febris attulerit, ueluti in secundo die, ita tunc & accurandus, & nutriendus homo est. Quod si nox tertiz die febrile quiddam paululū attulerit, ne sic quidem est formidandum, sed hos quoque postredie laubias, natriæque, ac reliqua omnia in illis, ut ante definitum est, ad portionem exequere. Acida autem cruditas non contingit in biliosis temperantibus, nisi admodum raro, id est ex cibis qui promptè accescunt: nec accendere febrem diariam solet, æque ut nec concoctionis tarditas: quandoquidem sicubi ob talem cruditatem febricitant, quibus amara bilis abundat in temperamento, obstruccionis & humorum putredinis est suspicio. Ad hæc, fumidus uapor ex tarditate concoctionis, aut cruditate, in quatuordecim sentiuntur acidi, nunquam excitatur. Quippe frigidi halitus abs talibus succis ascendunt, hique omnino paucissimi: minimè autem uapores multi, hūmidis, ac fuliginosis, quum neq. in his que sunt extra, aliter aut fumum edat, aut fuliginem uideat, quàm fumum ex materijs tenuissimis, fuliginem ex immediatè assue, uisibily. Est nam fuligo uapor terrestris. Fumus mistio quedam ex terrestris, aqueisq. substantiis. Absoluta iam in his naturis, quibus amara bilis redundat, diariam febrem disputatione, ad aliud corporum temperamentum transuamem, in quo ut calidum frigidum, sic siccum humidum præualer. Est enim hæc iutemperies omnium maximè obnoxia putredinis morbis, propterea quod per ipsam fauorat ad putredinem proximè accedit: id quod tum ex sudori-

Diatrion pæpe non esse melius, nisi cruditatis, uentriculo aptissimum.

Intestinarum morbum leniunt.

Flatus discutunt ita que sint.

Acida cruditas non contingere in temperatis biliosis, nisi admodum raro, ne que accendere febrem diariam.

Fumidum halitum non exciteri ab acida cruditate.

Fumus ex materijs tenuissimis nascitur. Fuligo ex immixto esse uisibilem materij grauissimæ. Intemperies calidam atq. humidam, esse maxime obnoxiam morbis putredinis.

bus conficere est, qui grauius his olent: tum uerò ex urinis, deiectionibus, atque de ipsa etiam expiratione. Etenim qualis est humorum, talis est humorum uaturarum temperies. Ideo prompta est ex qualibet occasione, tum alijs morbis, tum uerò febris corripit. Si quidem quum eorum cutis est stipata, effugere febrem non possunt. Sed nec quum ualentem cruditate contraxerunt, aut perusti fuerunt, aut tale quippiam aliud perpeffi. Iam uerò à crudatibus nidorosis obstructionibus naturae calidae & humidae, si fecer, promptius leduntur. Itaque omnes diarias febres accenduntur promptissime in istiusmodi temperamenti, id est ex qua liber earum causam, quas in biliosis naturis retuli: curationemque permittit illis habent, ac in paucis omnino disidentem. Nam quum lux naturae humidiores sint, magis quam illae famem & sitim perferunt. Est igitur illis ex usu balnei, quod cum laxet, non aut quod corpus humectet. Quaecumque uerò de eiusmodi natura sunt dicta, eadem & de acquisitis haberi dicta esse censendum. Quum autem octo interperies exsistant in uniuersum, opportunissima ad febres est calida & sicca: ac nisi quis illam (ut dictum est) cibet, ocyfime in ea diaria febris in acutam mutatur. Propinqua huic est quatenus ad febrem spectat, quamuis sit ad alia deterior, interperies calida & humida. Tertia ab illis interperies est, ea simplex interperies, in qua tantum exuperat calidum. Huic proxima est simplex altera, in qua siccum humido prauallet.

Ab hac deinceps media omnium est, scilicet quae mediocritate in utraque opposiitione tuerit. Quatuor quae reliquae sunt interperies, neque facile febribus, occasione iam dictarum causarum, patientibus diariae tenent, si inedia moliuntur, in plurimum dierum febres transeunt: imò aliquae saltem earum, ubi citra corruptelam contraxerunt reduntur ad humorem, utilitatem ex inedia sentiunt, ac potissimum quae frigida est & humida. Ab hac quae humida est. Tercio loco quae frigida. Quarto, quae simul frigida & sicca. In eiusmodi ergo omnibus temperaturis, temperamenti quidem ratione, uictus ratio uarianda est. Nam ex eo quod ad febrem febri fecerunt, non diuersam, sed omnino eandem fortiter indicantem. Si quidem quod secundum naturam est, semper similia postulat. Quod autem praeter naturam, contraria: quum nimirum quod fe naturaliter habet, custodire: quod praeter naturam est, tollere expedit. Porro febri omnibus praeter naturam est: ideoque uictus rationem frigidam & humidam exigit. Temperamenta uerò ipsa, alijs similia, alijs contraria postulant. Quae enim uicio carent, similia perpetuo: quippe quae seruare expedit. Quae uero habent, alijs similia, alijs contraria. Similia quidem, tum in alijs de quibus mox dicemus, tum in ulceribus omnibus. Contraria autem in eo uictu qui per sanitatem adhibetur, dum corrigere eorum interperientiam est animus: necnon ubi eiusmodi uicio naturae à longo tempore contrarie uictus rationi assueuerunt: gaudent eum naturae consuetis semper. Duplex itaque nobis in his qui sani sunt, finis proponitur. Nempe ut corpus sanum in pristina eius temperie tueri: uel hanc meliorē efficere. In ea tamen natura quae haud dubie in medio temperamento consistit, ab ipsa febri

contrariorum indicatione accepta, eatenus humidum frigidumque adhibebimus uictum, quatenus siccus calidusque quodam antea iam redditum corpus appareat. Humidus igitur uictus (ut testatur etiam Hippocrates) febriennibus omnibus conuenit: maxime uerò pueris, & alijs qui sic cibari assueuerunt. Etenim febriennibus, quatenus febriunt, ex ipsa contrariorum indicatione humidus uictus conducit: pueris ex similitudine. Nam quum aetas ex his sit quae natura nobis inest, similem sibi uictum postulat. Quae uerò à consuetudine indicationis sumitur, sic sumit, sic sicut & quae aetate. Quippe seruare quoque hanc iubet Hippocrates, perinde ac proprium status temperamentum. Sed aetate etiam & anni tempore inter dum indicationes sumuntur. Ceterum à consuetudine quidem semper est indicatio similitudo, quoad scilicet aegrotant homines. At ab aetate, uariatione, anni tempore, & statu corporis, ubi temperata haec sunt, similitudo semper praefidiorum est indicatio, siue ualeant homines, siue etiam aegrotent. Contraria ab interperies, anni tempore, statu corporis, & regione, contrariorum est indicatio. Verum ab aetate & natura non absolute, sed cum consuetudine. Porro nihil in contrarijs indicationibus tam conuenit expendi, quam magnitudinem eorum quae ad indicationem conferunt: quae quidem duplex exsistit: altera, quae ex eorum dignitatibus spectatur, altera quae ex ipsorum proprijs substantijs. Quas sanè ex collatione cum mediocritate, & quod secundum naturam est, esse accipiendas liquet. Omnibus igitur conspiciendis in unum indicationibus, unam praefixam uictus rationem constituimus. Diuisiōnibus uerò inter fe, quae ualentiores & plures fuerint, eas praefereamus, ita ut uictus species, quam lux praescribit, antepoñamus: minimè tamen negligamus contrariam. Porro quae à febri sumitur indicatio, ea reliquas, quando omnes contrarii esse faciendum dicant, numero quidem inferior est: magnitudine tamen quae ex dignitate spectatur, utique superior exsistit, potissimum si longè à natura recessit. Quippe duplex tunc ei magnitudo accedit: & quae ex febri genere prouenit, quae omnibus est communis: & quae propria, suae ipsius exsistit. Si uerò parua sit febris, fas est reliquas omnes coniunctas indicationes una cum ipsa conferri. Ac si quidem parae uideantur, media uictus ratio eligenda est. Sin altera indicatio exuperet, tantum recessisse à temperato & medio uictu par est, quantum ea quae pollet, sua contraria superant. Ac diariam quidem febri indicationes ex his capiuntur generibus, raroque à laborantis uirtum modum. At febrium, quae pluribus diebus affligunt, indicationes, tum uirtuum respectum necessario adhibent, tum causarum quae ipsas exsistit: ex his praefixam haec uictus, utpote quae nulla accedit causa: quemadmodum neque corpus id quod iam habuit calorem ignis in se recepit, siue id lapidis sit, siue lignum. Illud namque commune cum diarijs habent, quod uidelicet noua plus sanandi duntaxat autem in eo, quod diarsis in leui affectu calore habent, haec in habitu qui regre soluantur.

Humidus uictus febriennibus conuenit, maxime uerò pueris.

Consuetudinem esse seruandam, ut siue aetate, siue proprium temperamentum.

Indicatio ab aetate, natura, regione, anni tempore, & statu corporis, ubi temperata haec sunt, similitudo semper praefidiorum est indicatio, siue ualeant homines, siue etiam aegrotent.

Indicationibus oppositis occurrentibus, expensum deinde esse in quatuordecim eorum quae ad indicationem conferunt.

Indicationes à febri sumuntur, ut siue aetate, siue proprium temperamentum.

Indicationes à diarijs febribus, tum autem quae pluribus diebus affligunt, ex his capiuntur generibus, raroque à laborantis uirtum modum. At febrium, quae pluribus diebus affligunt, indicationes, tum uirtuum respectum necessario adhibent, tum causarum quae ipsas exsistit: ex his praefixam haec uictus, utpote quae nulla accedit causa: quemadmodum neque corpus id quod iam habuit calorem ignis in se recepit, siue id lapidis sit, siue lignum. Illud namque commune cum diarijs habent, quod uidelicet noua plus sanandi duntaxat autem in eo, quod diarsis in leui affectu calore habent, haec in habitu qui regre soluantur.

Naturalis calida & humida, magis quam calida & sicca, femora & sitim perferunt.

Interperies calida & sicca est ad eripiculis fieri opportunitissima. Interperies calida & humida, quatenus ad febrem spectat, quamuis sit magis deteriora febris.

Interperies frigida et humida, quando ab inedia mouetur.

Naturalis uictus rationem, semper similia postulat, quod autem praeter naturam, contraria: quum nimirum quod fe naturaliter habet, custodire: quod praeter naturam est, tollere expedit.

Febris requirit uictum rationem frigidam atque humidam. Temperamenta inuicem similia postulant. Temperamenta uicem, quando requiritur similia, & quando contraria.

Natura quidem semper consistit.

GALENI PERGAMENI DE
medendi methodo liber IX.

*Diarrharum ac-
cessus ut vicia,
vices circumscri-
pta dicitur.
Diarrhas transire
in putredinem,
hecticasque, vici-
recte tractantur.
Putredinis febres
qua.
Hectica febres.*

Diarrharum igitur curationem præcedenti li-
bro exposuimus. Quarum sanè febrim
unica accessio est, unico plurimū de, ex ip-
sorum saltē natura, cur cumscripta. Cæterum ni-
si quis eas commodè tractet, in reliqua duo gene-
ra febrū, uempe in putridas & hecticas, transiūt.
Putridas enim appello, quæ ex humorū putredine
hecticas uero, quæ ex immodica solidarū par-
tium nascuntur calfactione. At uerò in illo transi-
tu diuersi in reliqua illa duo febrū genera, alterum
quoddam febrim genus mediū licet imaginari,
quod neutri extremarū sit idem. Cæterū mediū
id, quū incidit, nec nosse hī possunt, nec reprimere,
qui extremarū, quarum exiit mediū, speciem
ignorant. Ergo ex aduersione, cruditate, laetitudine,
uigilia, perturbacione animi, uel bubone ab e-
uidenti causa aliqua oborto, nunquam ad tertium
usque diem progressus febris accessio, nisi quid de-
licitū circa laborantē fuerit. At quibus stipatio fe-
bris accessio est, ipsi etiā ultra hos porrigi accessio
potest. Etenim stipatio fit, uel obstructus exilibus
meatibus, propter glutinosos, uel crassos, uel co-
pulos succos: uel cōiuentibus, uel ea quæ corpus
ficcarunt: uel denique improbe condensatis, ob oc-
cursum causarū refrigerantiū. Quas igitur febres
uel conuientia meatuū, uel recens corporū den-
satio excitat, hæc & post primū accessionē desinit, u-
si quæ rectē ipsas tractet: & uerè diarræ tum sunt,
tum dicunt. At quæ ex obstructiōne creantur, si hæc
quidē pusilla sit, solui quoque ipsæ similiter ut aliæ
diarrhe possunt, si quis eas legitime sanet. Sin autē a-
deo uehementer sint humores impacti, ut ualen-
tius aliquid quod eos eximat, postulant, id genus
febris porrigi ultra unum diem necesse est, ac pro-
inde diarrarum genus uideri egressas. Verūm si
neq̃ humor putrescens subsit, neq̃ ipsum corpus
febrilē calorē susceperit tanquam habitū, unq̃ ge-
nus id febris, ab alijs duob. diuersum erit. Quare
huiusmodi febris natura quidē eadē est cū diarr-
rhæ, nomen uerò non idem. Si quidē quæ febres ab
initio ad finem usque unicā accessionē soluant, in
multis diebus potest, ex synochi, hoc est, cōtinen-
tes uocant. Quarū natura est duplex. Quædā nūq̃
earū manifestā habent putredinis notam: quædā
prorsus non habent: quas nimirū ex diarrarū esse
genere cōstat. Quæ enim accessionis remissio ex
fretuentiū humorū transpiratione contingere solet,
nō transpirent aut prorsus in stipatione uehemen-
ti: necesse haud dubiū est, multorum dierum fieri
accessionē. Igitur ubi in tali febre nulla subest oc-
casio, quæ alterius accessionis principii excitet,
non modò multorum dierum euadit febris, sed
absq̃ inuasiōne uilius accessionis, ab initio ad fi-
nem una febris persistit, nec quorūdiā, nec ter-
tiana, nec quartana referent. Quoniam igitur
ex duobus his foveri febris potest, & quod to-
tus uapor nō transpiret, & quod idē uapor ca-
quæ contingit exalfaciatur: necessum est res esse syno-
chorum differentias in uniuersum: nempe uel pa-
ri permanente magnitudine, & quam in primæ
accessionis uigore habuit: uel adiacente semper
exiguū aliquid, minuentē: atq̃ hæc uel æqua-
liter faciente, uel inæqualiter. Ac si quidem quod

*Synocha febris
quæ uocatur.*

*Synocharum fe-
brim genus du-
plex.*

*Synocharum fe-
brim tres diffe-
rentias.*

accenditur, ei quod transpirat par fuerit, nec au-
geri nec minui febris calor cernetur. Verūm si
eorum alterum uicerit: utiq̃ si quod uacuatur, ne
cessariū est febrim minui: sin quod adficiatur, om-
nino inerecere. Hæc itaque est continuentium fe-
brim species una, quæ eandem naturā cum diarr-
rhæ fortia, absq̃ue humorum putredine in plures
dies extenditur. Altera uerò contingit, ubi in om-
nibus uasis, ac potissimum maximis, æquabiliter
succī putrescunt. Quarum sanè febrim in graci-
li & frigido corpore neutra solet cōsistere, sed plu-
rimum in ijs qui sanguine abundant, & corpulent
tū: quando nec obstructio citra putredinem exci-
tare febrim ualet, nisi id quod transpirat, & copio-
sum, & calidum sit: nec humorum putredo in om-
nes quæ inter inguina & alas intersunt uenas, æ-
quabiliter ac citō porrigi in frigido habitu po-
test. Dehent enim quæ putrescunt, tum calida &
humida esse, tum difficile habere transpirationem.
Eoq̃ fit, ut neq̃ in frigida ætate, neq̃ in frigido
corporis temperamento, continens exciterur
febris: quemadmodum neq̃ in gracilibus, uel qui
raro sūt corporis habitus: sed prorsus in tempera-
menti, corporibus atq̃ naturis contrarijs. Pro-
inde fit, ut qui lia febricitant, ipsi & pulsus maxi-
mus sit, & æqualis, & uehemens, arteriarūq̃ cō-
sistentia inter molle & durum mediocris. At ceteris
taq̃ue frequentia pulsus, pro ipsius magnitudi-
ne febris. Hæc itaque sunt amarum febrim
communis. Alteri tamen priuam infans notæ
putredinis, non modò in lorio, sed in pulsa etiam,
calorisq̃ qualitate inuicunda. Quarum sanè fe-
brim dignonem & curationem ipsi tum rati-
one, tum experientia didicimus, qui statim ab
adolescencia philosophis studio capiti, primū nos
ad eam conuulimus: mox patris euidenti infor-
mio moniti, ad medicinæ studium excolendū ac-
cessimus. Est porrò conuulsiū febrim prædi-
cium maximū, si modò uires ualentes sint, sangui-
nis diminutio, uel usq̃ ad deliquium animi. Pri-
mū namque in contrarium statim agitur cor-
pus, celeritē ex animi defectu refrigeratū. Hoc
uerò nihil inueniri possit neq̃ ipsis ægris, nec natu-
ræ quæ animantes gubernat, iucundius utilisq̃
ue. Postmodum in corporibus ipsius necessariū su-
peruenit alui deiectio, nonnuquam & uomitus
bilis. Quas res statim a toto corpore maiores su-
dorisq̃ue excipiūt. Etenim uel sola sanguinis detra-
ctiō sic obita, restitui olim ipse quemdam adole-
scentem ardensissimā laborantem synocha. Cui
sanè post duas à sanguinis missione horas pau-
lum nutrimenti exhibui, permisiq̃ ut quiesceret.
Iam uerò eorū quos ex sola obstructione febricitan-
tes mihi uidere congit, nemo in putredinis
febrim incidit, qui sanguinem prius detraxisset.
Quem quidem, ubi ualida uires subest, & xas
permittit, usq̃ ad animi defectū (ut diximus) mis-
tere expedit. Vbi horum alterū haud satis respon-
det, tutius est, quantum satis uisum fuerit, tantum
principiō detrahere: quod desuit, iteratione sup-
plere. Quo quidē præsidio omissio, in summā ægri
diserimen ueniunt: nisi eos uel uirū robur, uel lac-
tum profusum sanguinis, uel sudor copiosus,
ex manifesta perniciē eripiat. Agimus itaq̃ impre-
sentiarū de ijs febribus, quæ ex stipatione pro obstru-
ctiōne meatibus oriūtur. Quas, si siue putredine

*Putredinis quæ
requiritur.*

*Cicuta febris
in quibus non
possiat ægri uires
paritas.*

*Calentis patris
infirmos a dno
uero Medice
manantē aperit.
Conuulsiū fe-
brim præsidio
maximū est,
molis sanguinis
uel ad animi de-
liquium usq̃.*

*Sanguine detra-
cto in ardensis-
simā febrim,
interpositiū sy-
cho in duas, esse
modicū alendū
ægris, permitti-
tūq̃, ut quæ
sint.*

*Aliguo mōdo
quædā sic cri-
branda usq̃ ad
animi defectum
neq̃.*

cultates seruare, nihil planè est aliud, quàm uitam seruare. Siquidem qualibet earum amissa, necessum est reliquis simul perire. Ac proinde in opere de sanitate ruenda, huc omne cõsilium direximus. In hoc uerò, primum propositum est, morbi sublatio. Nam cuiusmodi in illo est sanitas ruinio, eiusmodi in hoc est morbi sublatio. Quorù utriusq; cõmunis est ipsa uis custodia. Hoc tamen uo tereft, quòd quæ secundæ ualitudinis ruendæ gratia geruntur, eadem statim uitam ruunt: quæ uerò affectiones præter naturam in morbis discutiunt, ea non omnino uitæ custodiant. Quippe ali qua eiusmodi prædicta sunt facultate, ut si immode ratè aut intempestiue utare, uitæ adimant: quod solent uacuationes immo dicæ. Ergo quum uirtus tantopere necessaria sit, cum autem lãdant omnia uacuantia remedia, si quis ipsis parum moderatè oratur: utiq; aduerse inter se facientiorum indicationes in talibus corporibus sunt, in quibus affectus, quò expugnetur, notabilis uacuatione considerat: uirtus autem hanc ferre non ualet. Cæterum quemadmodum nihil quod sanitatem ruetur in ualentibus uires corrumpit: sic in ægrotis aliquando uirtus succedit ipsæ, quæ ueluti in perniciem eius administrantur: ut euacuando in plenitudine quæ est supra uires, aliquando ab ipsis dissoluitur. Etenim in pyrochis febribus, ex meatuum stupore ortis, quoniam ualida plerumq; oirtus est, citra periculum uacuatio adhibetur. In alijs uerò quæ ex corruptela humorum gignuntur, existit maximè periculosa. Siquid quod corruptum est, alienum à natura quum sit, id se auferendum dicitur, uel uena incisa, uel purgatione. Horum autem præsidiorum neutrum feret imbecilla facultas, si quando cum corruptela coioris. Oportet igitur, ubi indicationes ita sibi aduer santur, paulatim quod uitiosum est, uacuare: paulatimq; quod salubre est, in eius locum reponere: quam curationem uitiosus succi, Medici epierafin nominant. Quum igitur sectio uenæ, sanguinis

*Curationis parti
artis, quæ qua
sanitatem tur
tur, quæ in re cõ
ueniant, et dis
ferant.*

*Vacuatio reme
dia omnia uer
tutem euacuam.*

Epierafin quid.

*Sanguis probus
est possessio na
tura.*

*Sanguis dupli
citer inuadit red
ditur.*

*Sanguinis mis
sa interdum est
uena ut præsi
dium uacuam
interdum ut re
uocem, aut dete
uam.*

*Vires quando
præbetur indi
cationes uirtu
et quando nu
munt.*

*Virtus semper
custodia sua in
ducit.*

stodietur autem, primò quidem, si quod ex sub stantia ipsis uel inaniurum, uel alteratum est, cor rexerimus. Secundò uerò, si quæ ipsis substantiam uacuare, alterareq; possunt, prohibuerimus. Acstimari autem debet interim, quod magnitudi ne, dignitate uel antecellit. Maxima igitur digni tas uirtum ipsarum est, quando uiuere ipsum nobis ex hac uis custodia constat: utpote quum uitam, aut ipsas esse uires, aut earum actiones, ne cesse sit. Virtus ergo omnium prima custodienda hominibus est. A uirtus indicatione proxima exi sit, quæ ab affectibus, quos curare conamur, sub ministratur: postea deinceps reliquæ. Quicquid igitur in indicationi, quam uires præbent, aduersa tur, id secundum est loci. Quæ uerò com quæ con ducunt uirtutibus, in idem competunt, hæc utriusq; calculum referunt, & eorum quæ primæ sunt no tæ, & eorum quæ secundæ. Quare citra contro uersiam faciendum. Quæ uerò aduersantur, aliquan do administranda prorsus non sunt, aliquando paulatim. Prima igitur indicatio omnium est, quæ a uirtute sumitur: non tamen sic prima, ut cura tionem nos doceat, quum ex numero curaticulæ indicationem non sit, sed uirtutum. Nam neque ut ualeamus, neque ut à morbis liberemur, ab ea quicquam primum desumimus, sed ut uiuamus: quamuis ex accidenti interdum uirtutis robora tio ad affectus curationem conducatur. At uerò me dicatrices indicationes à morbo ipso sumuntur, & à temperie corporis, & ab ambiente nos aère, qui causæ sine qua non, rationem obtinet: quum sine ipso nec tolli morbus, nec reuerti sanitas pos sit. In omni itaque curatione agendorum, indica tiones in his tribus ad summum consistunt. Reliquæ autem omnes ab his in partes diductis, ori untur. Cæterum affectus ipse haudquam in causas diducti est aptus, quemadmodum temperiæ arque ambiens aër, sed tantummodo in differe ntias. Nam aut in similibus consistit parti bus, aut in instrumentarijs. Ac in similibus qui dem, uel simplex est intertemperies, uel composita. In instrumentarijs, circa simplicium partium uel posituram, uel formam, uel numerum, uel magni tudinem, tum quæ horum sigillatim traditæ sunt differentiarum, consistit. Porro affectum qui simpli ces partes occupant unus, est intertemperies calida. Quæ si in totum corpus diffusa sit, ap pellatur febris. Ideoq; omnis febris, quæ febris est, humecta tio refrigeratiois remedia sunt. Ac si sola quidem sit febris, ad refrigerandum humectandumq; ue luti ad finem, dirigitur omne medicis cõsiliu.

Quæ materia inuenta, opportuno tempore ex quatuor febribus temporebus fumes: quantitate uerò, ex conferendo cum naturali habitu morbum. Quippe quantum recessit à naturali ha bitu, tantum opus est ægri refrigeres & hume ctes. Ambiens autem aër (cuius fugere commercium non licet) si contrariam morbo temperiem habeat, præsidiorum numero est unus: si simili lem, una est morbosificarum causarum. Idcirco tunc inhiibenda eius noxa est, scilicet reliquorum auxiliorum humiditate ac frigore intensis, adau ctijs. Ipse autem aër reddendus est talis, qualis ad proliugandum febrem, aut aliam quampiam di spositionem, desideratur. Si igitur morbus fectus & calidus sit, humidiores frigidioresq; domos

*Vires quas mo
do seruanda sit*

*Indicatio di
gnitate esse af
fectus.*

*Vires esse aut
uires ipsas, aut
ipsarum actiones.*

*Indicatio om
nium prima est
qua a uirtute
sumitur, non sit
tamen ut cura
tionem nos doce
at.*

*Indicationes me
dicatrices uide
sumantur.*

*Morbi differen
tia.*

*Febris quid.
Febris remedia
humectatio, re
frigeratio, ex
siccatio.*

*Aëris commo
tionem nos frigere
haudquam possit.*

10

10

40

50

60

*Febriensibus
quales esle
gere, prepara-
reque debeamus.*

& eligemus, & preparabimus. Sicuti est diuerso, si frigidus, humidusque, easque calfaciant & siccant. Sunt itaque diligenterque ex se ipsis eiusmodi finit alioqui industria nostra preparabimus ipsas, per statum quidem eas subterranea molientes, & ad Septentrionem conuersas: ac paucimenta ipsarum asidue humore aspergesque: tum ut ex euripo aliquo aura expieret, machinantes flores præterea & germina, quæ frigide humidique sint facultatis, per aream diffeminantes: per hyemem uero, contra-
10 riarum horum facientes, præsertim ubi morbus suadet: ubi non suadet, excessus tantum utriusque temporis remittentes. Poterunt rursus tres illæ indicationes prædictæ ad duas tantum reduci: nempe ad morbum & sanitatem. Neg enim aliud ipsa sanatio est, quam morbi in sanitatem translatio. Qui affectus contrarij quum sint, necesse est per contra-
15 riam fiat eorum alterius in alterum transmutatio. Arguita rursus una erit sola curationum indicatio generalissima, uidelicet contrarietas. Ceterum ad accuratam contrariorum administrationem, necessum est curandorum corporum prius & naturas & temperamenta cognoscere: quæ qui-
dem tum ex his que in libris temperamentorum tradita sunt, noscuntur: tum ex grate, & tota antea uita, quæ nimirum in uictus & exercitj ratio-
ne consistit: præterea, in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc cæli statu, conuersatione. Ex ipso autem temperamento inuenio, admissurum
20 tum indicatio suppeditabit. Sed neque parum quid negligendumus, ad remedijs inueniendæ conuersatione adfert: uelut nec ad sanitatem tuendam, quam singulorum corporum etiam naturam ostendat. Nos siquidem ipsarum rationeque ab ea procedentes, inuenimus ipsarum partium affectum: de in ex illo rursus peruenimus ad faciendum indicationem. Consuetudo itaque curationis rationem indicat, per corporis naturam intercedentem, quemadmodum etiam: quæ & ipsa temperamentum interuenit, præstat indicationem. Aduertere autem oportet, corpora frigida & sicca, quæque exter-
25 restri natura cõstant (cuiusmodi sunt mineralia) quam ægerime solui. At quæ calida & humida sunt, eorum substantiæ celerrime dissipari in ambientem. Quæ uero in medio horum, ex diametro pugnantia, consistunt, ea corpora quo magis ad hæc uel ad illa accesserint, eo uel apriora ut dissiperentur erunt, uel contumacia magis. In summa, citra calorem non potest in halitum digerit corpus ullum, quandoque substantia eius coacta den-
30 sarique manserit. Peritorum autem substantia, facillime omnium digeritur, dissipaturque, propterea quod est ut humidissima omnium, sic nulla frigidior. Quo minus uacuantis prædicti eget, quum ex se ipsa naturaliter abunde uacuetur. Fit autem profecto & propter calidam siccamque regionem, & tempus æstiuum, & statum cæli impen-
35 sicum & calidum, notabilis per cutem uacuatio. Ita quæ hac causa, qui sanguinis detractionem desiderant, ipsæ aut profors non secabimus uenam, aut parum detraximus. Eruntque in hac detractione quoque spectanda, natura ab initio, consuetudo, ætas, locus habitationis, anni tempus, cæli status, necnon hic, quem curamus, affectus: aliaque ratione ante hunc, laboris facultas. Quæ uero affectus sint numerosi, cuius ipsorum uia est curationis per
40

contraria indicatio. Quocirca, octo intemperamenta quum sint, octo erunt etiam morborum, quibus simplicia corpora sunt obnoxia, particulari indicationes. Ultraque has, una eius affectus, qui instrumentum communis est, diciturque contrarij diuortium: cuius sanè est indicatio curatio-
45 nis, unitio. Est igitur unum morbi genus, quod similes & simplices animalis ætate particulas, quam intemperiem uocant. Huius alique differentie oriuntur, ubi corpora nudis qualitatibus alterantur: alique ubi accedente etiam humo-
50 rum affluxu. Quæ sanè dispositione utraq, uel afficitur una pars corporis, uel plures, uel uniuersum corpus.

GALENI PERGAMENI DE medendi methodo liber X.

ERgo in diarijs febribus simplex quidam est in corpore præter naturam affectus: utpote causa quæ primum cas exsuscitat, iam ad-
55 demptis. In quibus uero causa quæ eas accendit adhuc manet, in ipsis neque affectus simplex, neque sanatio est. Siquidem quod febris iam receptum in corpore est, id ex propria ipsius curandi indicatione discutere oportet: quod adhuc est futurum, id propul-
60 sare, ac ne fiat, uitare. Verabitur, si quæ id excitat causa prorsus summotæ sit. Itaque in diarijs faciendo indicationem maxime ex ipsa febre ætatemus. In reliquis uero, quæ accensionis uix causam intus habent, prima indicatio ab ipsa sumet causa. Quæ
65 re si febribus quæ multos dies cõtinuant, rectè ostendimus putredinè esse causam, hæc nimirum sananda est prima. Sed nec interim extinguendæ febris, quæ per eam iam accensa est, ratio non habenda. Ac si quidem in idem consentiant, & quæ febrem exnngunt, & quæ oppugnant causam: in quo
70 utraq cõspirant, quum unum sit, sine cunctatione est agendum. Sin febris, quæ iam accensa sit, sanatio, causam quæ hanc exciuit, est auertenda, aut quæ causam submovent, febrem exasperabit, diligens habenda consideratio est de remedio-
75 rum specie. Etenim si intolerabilis ægro sit magnitudo febris, committendum non est, ut per ea quibus causam adimimus, febrem augeamus. Sin ita mediocriter sit febris, ut quo tempore contra causam tantum pugnas, obruendæ interim uires æ-
80 grotantis non sint, utique contentuendos hic curatio-
nis modus non est. Non contentuendos autem nec ille est, qui contra id, cuius maius momentum est, in stare lubet: nec tamen alterius omnino ne-
85 gligentem esse. Quum autem in examinandis hæc, ad hominis salutem non parum momenti facultas habere uideatur, tria nimirum erunt, quæ in propofitione iam ob putredinem febribus, agendo-
90 rum indicationem nobis prima largiant: febris uidelicet: eius effectrix causa: præterea naturalis facultas. Cæterum priora duo submouenda sunt, tertium est custodiendum. Erit itaque rursus & hic
95 necesse, ut tum febrem, tum eius causam, cum facultate ipsa conseras. Mox si ea dem ambo remedia requireris, ea promptè exequaris. Sin indicatio-
100 nes pugnantur, unam præferas, uel quæ ad uires sumitur, uel quæ ad causam, uel quæ ad febrem: sic ut quæ cæteris sit ualentior, hanc magis sequaris, nec tamen cæteras negligas. Nunc uero ad particularium præfidiarum differentias nos con-
105 uertamus,

*Intemperies simplici-
um partium
esse etiam, uide-
tur: quæ illarum per
ticularum indica-
tiones.*

*Solutio causæ
non indicatio est
unitio.
Intemperies dif-
ferentia.*

*Diariarum esse
itaque simplices.*

*Indicatio ipsa
quædam est febris,
et quædam a feb-
re causa sumit
da sit.*

*Putredinem esse
causam feb-
ris: quæ plures
causas præter
inducit prius
dam esse.*

*Indicationes a-
gendum in
putredine febribus
non a febre sum-
untur: quæ ad
effectrix
aliam causam, et
a facultate.*

Sanatio quæ id.

*Indicatio cura-
tionis generalis-
sima, est uita
indolens citra-
rietas.*

*Contrarij ex
habitu, qua-
rum rerum dis-
cretur cognitio.*

*Cõsuetudinem
ad inuentionem
remediorum, et
ad sanitatem
dam plurimum
posse.*

*Cõsuetudo quo-
modo curatio-
nis rationem in-
ducit.*

*Corpora dissipa-
ta facillime et dis-
solvuntur quæ sunt.*

*Peritorum substi-
tia curantibus
facillime digere-
tur.*

*Pueri substatia
cor minus
conuocant, pro-
p-
t-
ideo uacuant.*

*Sanguis de-
tractionem pro-
hibentia.*

*Sanguis detrax-
tione qua sunt
consideranda.*

diarias febres, dum imperi tractantur, du sumunt fieri. Diarum causa quando recidant, quando perstant in corpore.

Seipatione quae faciant.

Diaria febres, ut sic dicuntur. Diarum afflicti sunt multiplex.

Ephemeris febres in quibus excrementa deficiunt.

Diarias prodromos vultu accedat.

Diarum.

Diarum multiplex differentia.

Stripatio duplex. Densitas morbum vultu accedat. Obstructione differentia.

Indicatio in viribus sumpta, in diurno tempore exire, in plurimum autem diurnis febribus, maximum solus est momenta.

Vires prima aut secunda die ab initio morbi, vultu refecti accedat.

ubi tristitia, uigilantia praecesserit, & inedia per totum secuta est die, dein febri prius quam homo cibaretur, circa uentrem occupauit, & nos infirmus est acta, uires impense resoluunt. Porro quibus temperies corporis ad sicum calidumque conuersa, febrem accendit, si interdum uires in prima inuisione accessione nutriendi sunt, medium ante illa.

Eis autem soleo ipse forbitum esse alia exhibere, inieci in eam mali punici granis: qui cibis biliofo stomacho esse optimus. Nam & roborat hunc malum punici: & alia, quod diutissime in eo citra corruptione maneat, sensum coquatur, idque nec accensum, nec erit inatans. Igil mordens halitus, succosus, ubi per sensibilia corpora fertur, horrores & inaequales tonus corporis coactiones facit, in his, quibus coque stipata, quae prius transpirabat, iam sunt detenta. Quae quidem, si fuliginosa sint, febres accendit. Eiusmodi autem halitus, succosus, tum multa & uetustas dimotio, tum uigiliae, & ira, & dolor, & cura, augent: tum proximae ab istis, unum illud per se interdum augere eos sufficit, utique si cibis quibus non sumperit. Efficitur namque corporis halitus in his naturis, quae facile amarum bilem gignant, ex longa inedia biliosus. Coactione itaque siue rigor succedit, propter eorum quae feruntur excrementorum, tum multitudinem, tum acrimoniam, tum imperis celeritatem, tum laborantis uirum imbecillitatem. Horror uero fiet, ubi & qualitas eorum, & impetus uelocitas est remissa: tum copia minor, ac potissimum quae uires tristant obstant. Quod si largius remittant iam dicta, ne horror quidem coegetur: sed uel quidam cetero ulcersus sensus, uel tantum inaequalitas. Porro quibusque uirtute existere imbecilla, squalidolique corporis habitus, incipientis adhuc accessione uidetesse symptomata, quae omnibus panem ex uino diluto & calente, maturae exhibent, horrorem statim inhibet. Quanto uero hos citius cibaueis, tanto scilicet magis febrem prohibueris. Sin

duae horae ab initio inaequalitatis interpositae sint, nutries tunc quomodo, modo adhuc dures horrores praedicant tamque, quod hi febricitabant, ceterum innoxia febre, & cui curis maior succedat quae facta, tum lauari, tum nutrire debebit. Quod si horrores praeterierit, ac iam plane febricitent, id teporis non sunt cibandis sed decrescente iam accessione, atque interdum in summo uigore, nutriendi sunt, solatio inedia integritate non expectata. In nullo namque squalido affectu comode finitur accessio, priusquam illi uel ex laeuacro, uel humido uisui, humectatio accesserit. Calidus itaque & siccis naturis, siue si primo ortu sint tales, siue sint erit acquiris, maximum inedia aduersus febri paratissima causa. Inter alia autem, calidus in summo, siccusque celsitatus, iam dictae temperaturae efficit. Hic autem status alio anni tempore, si aetate, plane incidere neque scit nec humidissimus pariter frigidissimulque, in alio quae hyeme. Corpora igitur calida & sicca, ex inedia facile in febres ardentes incidunt: quibus, nisi prius mors occupet, in hecticis transuenitque ab his, in marasmo uel protinus ab initio, ardentibus praetertitis abire in hecticis. Maximae autem sicca, calidatque dispositiones corporum, si principio febris hectica corripit id quod olim eundem iuueni commisit, quae ira febricitauit. Cui quidem, quoniam nutrinus est, fontane plane gelidus dedimus

Nutricandi est in prima inuisione accessione qui facit.

Fractum melleum, ventriculum roborat.

Succosus aeris quae gignant.

Rigor vultu accedat.

Horror vultu praeterea.

Vires in summo quae quide facit.

Horror in prima accessione, subicit panem ex uino diluto & calente exhibent.

Nutrinus interiorum dom horrores, quae possunt.

Hectica aduersus febri calidus & sicca naturae.

Hectica febri in principio corporis calidus & sicca dispositione.

interim binos cyathos, interim ternos: quando frigidam simul multam sibi dari, qui ira sunt affecti, citra noxam non ferunt. Quocirca uniusmodi fuerit, ubi febris ideam perperet, in prima statim occasione, minori cum periculo, copiosiori frigida uti, corporibus ad validam siccitatem nondum deductis. Iam vero quemadmodum in quibus febris accenditur propter mordentem acrimoniam exalciata attenuatur a Sole, inedia & laboribus, succi, maximum eius remedium est humor nutritivus: sic & diuersi, ubi ob copiam, vel obstructionem, vel phlegmonem, vel humoris alicuius putredinem, febris est orta, maximo malo est cibus. Quare hos quidem, nec in febris inclinatione, citra noxam nutras, necum ipsa accessione inuadente illis uero, omni certe tempore, sed potissimum per inclinationem. In summa uero, illa duo a primo statim die, sunt tibi in omni agro spectanda: morbi summus vigor, & agrotantis uires, a quibus cibandi consilia petas. Postea si transierit humor incrementum suum omnino potest, in cibi abstinentia hominem ipsum seruabis. Sin exiguum admodum requirat, abum de erit sola multa. Quod si maius desiderat quam sit ex multa, praesentem eror fas erit. At si fas non est summum morbi incrementum autem uictu, aut inedia transierit, id agendum, ut homo statim in prima accessione inclinatione nutriatur. Aliquos uero ipsorum, & quum inuafura adhuc est, & quum incipit, cibabis. Sicut potero hi siccio temperamento & calido, oportet, tum uiribus necessariis imbecillis: quum fieri nequeat, ut abunde siccum calidumque corpus, si febricitat, uiribus sit ualentibus. Si autem cum eiusmodi febre & corpore, momentanei membri phlegmone sit coniuncta, omnino ager morietur: magis id certum est, si uel peripneumonia, uel pleuritis, uel angina, uel utriculi, uel icterici phlegmone infestet. In quibus sane affectibus una salus est, uirum robur. Nam quod ad phlegmonem quae in ipsis est partibus atinet, minime plane est cibandum. Quod ad uirum infirmitatem, unig saepe. Ac proinde necessum est, aut resoluantur uires, aut phlegmone augeatur. Quoties igitur uel ex lassitudine, uel ira, uel pluribus curis, uel uigilijs, uel tristitia, uel longa inedia, uel uniuersis una coeunibus, siccatis corpus est, ac febris inuasit, quae & aridam reddit cutem, & igneam calorem refert: uigui hunc talem timor est hectica febris correptum iri, potissimum inestate, ac coeli statu siccio calidioris. Oportet autem quamprimum praesentem erore, & fortitione ex alicui nutrum, panemque post oblatum, aquae frigidae potione hominem cures. Quippe protinus extinguitur, ac cessat omnino febris, modo nec phlegmone aliqua ei sit adiuncta, nec putridus humor. Quanquam ego etiam uel si haec aderant, agrotatum non paucis aquam frigidam dedi, rursus esse rarus phlegmonas in praesentia augeat, quam sine re hominem in hecticam febrem prolabi. Ceterum si magnus fore incosmodum, uel humoris putri, uel phlegmonae sit suspicio, a frigida quidem danda abstinentia: refrigerantibus autem remedijs, quae foris applicantur, utris: modo ea super os utriculi, aut tota praecordia, modo super pectus imponens, ubi scilicet plurimum flabellae caloris

loris, maxime iudicabis. Balnea etiam ipsi qui siccato plurimum corpore sunt, & citra humorum putredinem febrium, non incommoda existunt. At phlegmonas subsequuntur febres propter putredinem humorum, qui in ipsis impacti habentur. Possunt tamen uel citra phlegmonem, in ipsis uasis aliqui humores putref: errorum aut in una animalis particula, in sinibus ipsorum impactum etiam in totis eorum capacitibus, quae inter ubi bones & alas sunt, comprehensi. Vbi igitur citra putredinem squalenti corpori febricitare contigerit, caput totius curationis in ipsa remedijs quae refrigerent humectant, statuere oportet. Porro duplex genere est harum rerum prima materia. Una, eorum quae foris incidunt: altera, quae intus in corpus sumuntur. Extrinsecus corpori incidunt, tum aer ipse qui nos ambit: tum pharmaca, quaecumque humectandi refrigerandi uim obtinent: & tertium praeter haec, dulcis aquae balneum. Intus in corpus sumuntur, quae eduntur, ac bibuntur, & inspirantur aer. Ab his generibus tentandum est propositis hoc loco febribus, tum humiditatem, tum refrigerationem comparare. Verum refrigeratio, quoniam per efficacissimam qualitate inducit, & parui temporis est, & periculosa. Contra siccitatis, per ea quae humectent, curatio, ut longi temporis est opus, ideo minus est, quam refrigeratio, periculo exposita. Si igitur temperatus sit aer, qualem se exhibet, tali eo est utendum, nihil amplius de eo nobis sollicitis. Sin uero admodum calidus, uel admodum frigidus sit, pro calido inducendus arte contrarius est, subter raneis inuentis domibus, quae & frigidissime sint, maximeque perfatae, & ad septentrionem conuersae: tum auris quibusdam suauibus opera nostra paratis, alijs ex euripis, in quos multi se aquarum fontes praecipitent: alijs aqua frigida ex uasis in uasa transfusa, id quod etiam conciliat somnum: praeter ea domo assidue aqua, quae proflus frigida sit, aspersa: ac rosae purissima humi fusa, aut uitium caepreolis, aut ruborum clauiculis, aut lenificis ramis, aut denique reliquarum, quae refrigerent, stirpium aliquibus: turba quoque hominum ingredi prohibita, ut quae domum similiter calfaciat. Ac sic quidem calidissimum aerem, qui scilicet in aestate calida & siccata accidit, refrigerare est tentandum. Qui sane si modice frigidus sit, hoc esse contentos oportet, nihil de eius temperie alterantes. Qui uero frigidissimus est, utique quatenus respirando attrahitur, admittendus est, ut qui admodum calorem cordis refrigerent: non tamen quatenus extrinsecus agrum contingit. Quippe densitas coegit cutim, putrilaginosorumque humorum effluxum, atque transpirationem cohibet. Si quidem per pulmonem, quod rarum est uiscus, difficile non est, ut tum qualitas ipsius, tum etiam substantia, facile ad eorum perueniat: per cutim uero, utpote densatam, fieri id non potest. Ceterum ex frigida inspiratione maius sequitur cosmodum, quam incommodum ex cure densanda, praeter nulum cum operimentis haec nobis calfacere liceat. Porro utendum maxime eiusmodi aere est in his hecticis, in quibus primum quod afficitur, ipsum est per: quod ut si utriculi primum affrigeretur, ipsi per comesta & bibita succurrendum esset. At icterici ex inspirato aere nulla certe accedit utilitas: comestis uero

Balnea quibus conueniant.

Phlegmonas quae siccio sequantur.

Potero humorum quatuor propter accidentem possit.

Remedium refrigerantium humoris in qua, dapes ad materiam.

Refrigeratio in febribus ad breuius sit tempus, atque periculis.

Aedes fibrinosis quales esse conueniant.

Somnum conciliari ab operum strepitu.

Torba hominum incalcescit an hominem.

Aer calidissimus quomodo refrigerandus.

Aer frigidus si sit.

Incineri exasperatio aeris uel la accidet uolunt.

Nutriendi qui non sunt, ne ipsa quidem et resistent delectatione.

Nutriendi consilium sumendum esse a summa uigore morbi, & uiribus agrotantis.

Hectica febris quando sit extinguitur.

uerō & bibitis, minor planē quā nētriculo, ali qua ramen hand obſcurē adueit. Cōmunis autem omniū ſanatio eſt, per ea quæ extrinſecus applicata refrigerant, & humectant. Arg. ob hæc quidem uicerā, magna ex parte heſtica maraſmodieſe febris accidere contemplati ſumus. Superueniunt tamen aliquando & pulmonem intemperantiæ calidæ & ſiccæ. Incidunt præterea & peſtori, & meſenterio, & reſuſo, & colo: inter ſum uerō, & uero, & renibus. In ſep̄to autē tranſiunt maraſmū non uidi, febrem heſticam uidi.

Marasmodieſe febris ob quæ uicerā maxime ex parte ſolent accidere.

Hæſticam ex ſe poſt tranſiū or ſi diſſimilis eſt delirio exopt.

Hæſticæ ſep̄s tranſiūſo, quo modo diſtinguitur.

Ac. frigida quanta maxime conſeruat.

Refrigerantia extrinſeca, in febribus qualia eſſe debent.

Aceti ſarale

Aceti quomodo utendum.

Refrigerantia humida, ſarale: ex ratio deſcripta.

Frigida Galeni exarata, quomodo utenda ſit.

Refrigerantia frigida uera

integris herbis tuſis. Iam uerō quod epithema ex pinguibus conſtitit palmulis, ſalutare medicamenū eſt. Porro coquere oportet harū carnem, omni membranoso exempto, aliā ex ſolo claro aceto, aliā aqua ipſe per miſta: atq; hac, ubi tenera ſaris redditā eſt, tuſa nri. Eſt uerō ſalutare medicamenū ad italia, etiam ſuccus roſarū frigidus, uñ cum polentra. Salutareſ ſimiliter ſunt & ipſe roſe conſuſe. Præterea ſtipſi quæ moderate aſtrin gunt, ermina trita. Ad quem modū aut aliquando licet herbis medio critæ aſtringentibus, uſo ſolano. Huuiſmodi tamen refrigerantia omnia, il li tantum ad mouenda ſunt parti, quæ primariō eſt affecta: non alijs quæ refrigerat: non poſſunt.

Ego nongno hominem ſcio, qui impoſſo præ cordijs refrigerante medicamento, laborarēt ita tim diſp̄næ: ſicuti alterū, qui tuſiſſet protinus. Verum ex remedijs ipſis, nonnulla quidem per ſe, neque intercedente alio, refrigerare ſunt natura: ut, graſia exempli, frigidi potio, necnon ſuccus uis immaturæ. Alia autem ex accidenti: ut ſanguinis miſio, quæ calidam aliquando intemperiem ſanans. Ad eundem modum & clyſter, & purgatio, & fomentum, & cataplaſma: quod uidelicet digerant, concoquantur. Vtrāque uerō facultatem in ſe comprehenſam habet dulcis aque balneū tem peratum: uipote ex partibus uarijs facultate præ ditiſ conſtituit. Si quidem quum primum in id æ gri ingreditur, in ære uerſatur calido: poſtea in calidam aquam deſcendit. Mox ab hac egreſſi, in frigidam. Poſtremo ſudorem deterget. Po teſt autem prima cijs pars materias per torum corpus tum calſcitare, tum liquare: præterea quæ inæqualia ſunt, æquare: & cutim laxare: & mul ta, quæ ſub hac anie deſinccant, uacuare. Secun da eius pars, ubi quæ in ſiccū corporis affectu ac uiritur, poteſt maiorē uilem ſolidis partibus im mittere. Tertia balnei pars poteſt, ubi quæ frigida uiritur, & torum corpus refrigerare, & cutim den ſare, & alres firmare. Quarta uerō, corpus per ſu dorem, citæ refrigerationis noxam, uacuare. At ubi quæ intemp̄tiē lauat, in horrores, cu tiſque denſitudinem incidit. Eſt autem continens ipſius horrores cauſa, mordentium excremento rum, aut etiam crudorum limorū, conſenſum æctorum, citatioſ motus. Proinde quibus horum eſt abundantia, caro uerō ac cutis denſæ, ſiue bal neum ſint ingreſſi, ſiue ſteterint in ſole, ſiue quo quomodo uel geſtati, uel perſecti, uel exacerati, uehementius dimoni fuerint, utiq; ipſi horror inci dit. Contra, quibus hæc pauca ſunt, & corporis habitus ut remittitur laxeturq; à balnei calore, promptus, ſi non modò non horrent, eſt etiā meli ores redduntur, uipote excrementis per id uacua tiſ. Quo rationabilius, neq; in primo in quaſionis initio, nec in incremento, quiſquam ægotanē la uit. Quippe denſata eſt hoc tēpore, coarctataq; & cutis ipſa, & quæ ſub hac habetur carnea ſubſtan tia. At in febris inclinatione uel incipiente, uel pro cedente, uel amplius progrefſa, ſep̄ numero nos ægrotos lauantes, non parū eſt cōſulimus. Si quiſ ægroti balneum ingreſſus, minimē in horruit, ſed laxata illi, necnon rarefacta eſt cutis, huic ſucce dente planē excrementorū uacuatio, æqualis per uniuerſum corpus calor, exiguoſum meatu ſu ra ſeſaſio, tenſorum laxatio, denſatorū ſuſio. Ac uā

Refrigerantia ex palmulis.

Roſarum ſarale.

Refrigerantia remedijs a liis quidem per ſe, alia ex acci denti refrigerantia.

Balneū dulcis aque, tempera tæ, ſarale: balnei pars diuerſa.

Balneū intem perſum horro res, citatioſ den ſitudinis ſignat. Horrores cauſa.

Lauandū nec in accipiū meo, nec in ipſius incrementa, ſub ſentient eſſe.

Balneum cōſu liſſe perſeip̄ in accipiūſum de clinantibus.

Balneū uirgū ſiue uirgū.

coatio quidem excrementorū, omni febris est uti-
lissima. Pari modo, & rarefactio, & relaxatio. Fu-
lio tamen, & calor, non item: sed calor omni febris
inimicus est. At fundi æqualiter, id solidus quidem
animalis partibus non est alienū: succi certe non
perpetuo est unlesed quoties in animali uel phleg-
mone, uel affectus phlegmonæ similis consistit,
uel utraque plenitudo, omnium inimicissimū. Nam
phlegmonæ quidem, quā calfacti & liquati succi

Phlegmonæ quæ
de augentur.

Balnei singula
partes quæ vi-
su præsent.

ad ipsas confluunt, augentur. Tunicæ uero uaso-
rum, impares plenitudinē, quæ iam ex liquatione
est repleta spiritu, distenduntur, ac uires hoc no-
mine malè habent. Ergo calidus illis ficiis affe-
ctibus, effusio mor dentium est salubris, liquatioq;
eorum contingit citra periculi. Calfactio tamen
noxa non caret. Atq; hæc quidem ex prima bal-
nei parte optimè administrata sumunt. In secun-
da autem (quæ lauacrum erat) uel febriili corpora
ex humectatione iuuantur, sic ex calore nihil il-
lis cōmodè accedit. At in tertia refrigerant inno-
xiæ quæ fuerant ex calfactio, & uires firmantur. Si
qua uerò & laxata, & luto plus sunt remissa, ea in
naturalem redeunt mediocritatē: id quod quarta
balnei pars, quæ derisio est, iudicat. Quippe qui-
bus ritè sunt omnia adhibita, si post frigidæ uisum
adhuc sudant, & omnia ipsius excrementa uacuuntur.
A balneis igitur (ut unam omnium uelun som-
nam colligit) uacuatur quicquid in corpore uel
fuidum, uel fuliginosum præfuit. Reducuntur
ad naturæ symmetriā, tum caro ipsa, tum cutis:

quom scilicet se ab exercitatione in eam saltu de-
mittunt. Siquidem quod nobis balneum, id præ-
stat illis exercitatio: ut quæ non calfaciat tan-
tum, sed etiam insiti caloris motum à profundo
corpore exte: orsum concitet, sic ut & frigidæ im-
perui occurrat, & quo minus uiscerum aliquid
feriat, aduersetur atq; prohibeat. Neg enim ip-
sam frigidæ substantiam, neq; eius qualitatem om-
nino integram, usq; ad uiscera perningere est fa-
lubre. Imò sarius & tutius fuerit, solam qualita-
tem, eamq; retulim calidiorum occurru, descen-
dere. Iam uerò qui hæctica febricitantes ad bal-
neum accedūt, nisi in frigidam sine demissis, nihil
iuuantur, contrā quā alij correpti febribus.
Nam quum ita solidatū partium affectus can-
denti ferro sit similis, calcescit duntaxat eos hu-
mectasseq; haudquaquā uidetur sans (sic enim a-
limentū incrementumq; præberimus febri) sed
opus est, utmersa in frigidā, exinguamus calo-
rem. Quod si ex uiolento ipso subitoq; frigidæ u-
sū malè fuerint affectu, uisore in contrariam qua-
litate mutari, hoc licet in toto quod sequitur tem-
pore, calfaciendo sanare: quæ neq; par periculum
sit in frigidā affectu, necin remedijs quæ illi ad-
hibentur. Quum autem insaniabilis solidatū par-
tium summa siccitas sit, ad quam per hæcticas fe-
bres oia expeditissima patet, melius est hominem
in frigidam intemperiem transferre, ac cui cora-
tionem adhibeamus habere, quā tendentem re-
stitā ad interitum sinere, desperatamq; illi salutem
facere. Ergo eos qui hæctica febriunt, illicō om-
ni ratione refrigeremus, antequam progressi in
marasimum perueniant. Nam quem iam occupa-
rit marasmus, hunc nequitiam sanare tentaue-
ris. Ipsum tamen in alterum transferre maras-
mum, quem appellant ex morbo senium, libebit:
ac sic superstitem, non tantū plures dies, sed et-
iam menses, seruare. In cæteris autem febribus,
quas uel phlegmone, uel putrescentes succi accen-
derunt, nihil offendens, etiam si in frigidam æ-
grum ipsum non merserit. At io hæctici, id quod
remedium affert, calidæ solium non est, sed frigi-
dæ. Quicunq; igitur hæctica febre laborant, at-
que ex his præcipue, qui iam marasimum tenen-
tur, modò his nulla alia febris, uel ex solo putre-
scente humore, uel cum phlegmone sit adiuncta,
eos omnes audacter lauabis: sed prorsus citra o-
mnem laborem, ne resoluantur uires. Sint ergo
tres domus balnei: in quarum primam, quæ sans
esse calida debet, in lesulo cubans ducatur, inibi-
que nuderetur. Illi ne autem ualida sindone in se-
cundam portari debet: quæ non tantūm sicut sit
media, sed etiam temperie: rantiō scilicet prima ca-
lidior, quantorū est rantiō frigidior. In ea itaq; oleo
tepido super sindone perfundatur. Hoc factō, ad
tertiam ducatur domus, ubi nimirum est solium.
In cuius quidem moretur aqua mediocriter: idq;
sustentans sindone, nullatq; in fusione aquæ, cuius-
modi in alijs unī solemus, adhibita: imò nec ca-
piti eius quicquam infundi uelim, quom sit satis
id quoque, bis rēue nisi cum toto corpore in a-
quā mergi, demissa mediocriter deorsum sindo-
ne, ac rursum per quatuor iuuenes, qui cum por-
tant, leuata. Mox hinc eductus, io frigidam fernet
torus ringatur, ne uel breuissimo quidem spa-
cio illic moratus, Proutinus uerò alter paratam ha-
bens

Exercitatio
preparat ut
pau ad balneū
frigidum.
Exercitatio
visum.

Hæctica, dum
ad balneū acc-
dunt, nihil in-
uuant, nisi in fr-
gidam sibi de-
missis.

Siccitatem sum-
mam solidari
particulari of-
fio insaniabilem

Hæctica senium
esse omni ratio-
ne refrigerandi.
Marasimum q-
se uocant balneum.
Senium ex mor-
bo.

Balnei partēs
descripsi.
Hæctici quom-
de sint per qua-
tuor partes bal-
nei tractandi.

Balneum frigi-
dum quibus in-
trepidi, & quæ-
bus causi debet
administrari.

Balnei calidæ
ad idq; frigidæ
visum corpora
preparandi.

Reducuntur ad naturæ symmetriā, tum caro ipsa, tum cutis:
corrigitur solidatū partium ariditas: & calor nō
modò is qui ex lauacro accessit, sed qui etiā præ-
fuit, ex frigidæ usu extinguitur. Maximo huius rei
documentum est præsidium, quod senum homines
ex huiuscemodi balneo, ubi à ferocenti sole exicca-
ti, lauantur. Quippe quom accedant ad id, ritu sit
pulz aridi, egressi i frigidā, illicō in naturalem ha-
bitum redeunt. Si itaq; certam febricitantium na-
turæ haberemus notitiam, non dubitarem eorū
aliquos assidue in aquis frigidis citra balneū
lauare. Quia uerò ex acta nobis dispositionē non
est notitia, ac maxima ex errore impendit noxa,
utiq; eiusmodi teculamus præsidia, potissimū
in febribus hæcticis: quādo per has & pauci sangui-
nis, & nudū carne, & experts adipis, corpus est red-
ditū. Etenim iuuenis corpulentus, ætatis tempo-
re, ac in febris summo uigore, modò nulla uiscerum
phlegmone subfit, sudabit, si in frigidam se
coniecerit. Quod si sit frigidæ lauatio i assuerus,
securè remediū utetur. Qui autē ex calida & sic-
ca intemperie febricitant hæctica, ac sanissimum
qui iam marasimodes fiunt, is ubi tale præsidium
perunt, tutum non est in totam confici: æque ut
nec gracilibus & imbecillis, qui æstate calida &
sicca, longa uia peracta, refrigeratione indigent.
Nam neq; his tutus est frigidæ solij usus, nisi prius
fuerint in balneo æqualiter ex calfacti. Siquidem
simile quiddam nobis uidetur accidere, quum in
frigidum solium post balneū ingredimur, ei quod
ferro accidit, quom tingitur. Etenim tum refri-
geramur, tum roboramur: quemadmodum & il-
lud, ubi candens iam redditum frigidæ mergitur.
Atq; huius rei causa ad imbecillia corpora inueni-
entur balneæ, quæ ea præcalfaciant, atq; ad fri-
gidum solium præparent. Non dissimile quid-
dam faciunt, & qui sine balneo frigida uruntur,

bena calentes sindonem, ipsi injiciat. Deinde per
suo in lectulo collocatus, primū spongias de-
tergeat: dein mollibus linteis, quoad heri po-
test, blandissimē. Postea uerō unctus, amictus
vestibus, rursus super lectulo reducat in aliquā
aliā domū uicinā, ubi cibari consuevit, inibi
uriatur. Porro humidum esse ac frigidū, quod
hecticis febribus sit conductum, nemo nescit.
Eiusmodi uerō sunt tam cremor pitane, qui fit
gruis sumitur: tam alica, similiter pitane cre-
rit condita: id uerō est ex aqua, & exiguo porri,
& anetho, tam sale, oleo, & aceto. Cōmodus praete-
rea nē qui se laborant, et & exiguis uia aqua fri-
gida panis. Ceterum nullius horū pura frigida
esse debet, scilicet potius. Quippe haec manere
non incalēcit, tam per corpus digeritur. Illa, qui
plurimum temporis in uentriculo morantur, ip-
sum fortassis refrigerant, si fuerint immodice fri-
gida. Vbi autē febris iam traxerit, dandum quocu-

re que colligant: sed in eo differunt, quod in his, que portio carnis colligatur, ea semper vapores uice digerit: in illis dehiit in uentre Nam quia modum quo magis animal uel adipem, uel carne abundat, eo, quod ab ipsis carnisbus, dum in craticulis torrentur, dehiit, copiosius carnitrad gaudet modis in calidissimis febribus, si carnes humide ac molles cum adipis copia fuerint, eas sensu liquari deprehendas. Sin abique adipem & siccescenti, insensibiliter absumuntur, & uel febres marasmodos transeunt. Hæc præmonitis, colligantium febrium quidem methodis curam ages, tum ad frigida exhibendam, quamprimum propterea, tum his que refrigerant & humectant, nutriendi. Multum uero inimicis in illis esse censimus.

Collegiantia in
filiis curata.

GALENI PERGAMENI DE
methode medendi lib. XI.

MOdum igitur curandarū ephemerarum, in octavo huius operis cōmentariō: cōtinentium, in nono. hēctiarum deniq; in decimo, fias accuratē expōsumus. Nunc uero quēmodō quę ex putrefactibus humoribus excitantur, methodo fini sanandę, aggredi cōt animus. Duo autē firi scopi cōtariētis in uniuersum: affectus nempe ipsę, atq; egrotantis tēperies. Affectus quippe, ex nō quę sub cōtraria firi, adhibenda esse methodo indicat. Laborantis uerō tēperies, simul cum ipso morbo, mensuram contrarię firi definit. Porēti cōtra ambiens nō aēr (quę ex celi statu, aut tēpore, ac regionis natura, suas mutationes fortitur) unam cōticerē indicationē, ac uel aggrudinis causā, uel sanatię, annumerari. Porō auxiliū, quod ad morbos tollendos utimur, prima &ultima dicitur sanatię causā, fuis tamē ranonibus. Dicitur quippe ultima tēpore: quandoquidē & natura, & ars, & fortuna, priores, secūdū tēpū, cōt sanatię cōtillant causę. Prima uerō cōt, quę uisū ad cōmē laborantis

Curatiois se-
pe sunt due: af-
fectus & agri-
tutem.
Temperies labo-
rans quid in-
dicat.
At vnde fuit
ventilationis for-
titer.

Auxiliū car pri
ma & vltima
sanctio canja
dicatur.

*Fertuna per
auxilia morbus
prostat.*

*Solida partes
ex femine gene-
rantur.*

Violentiam offe-
ditur ex car-
itate scilicet.
Temperat est
duplex.

Indicationes re
meliorū vnde
formantur.

Hebent requi-
re bonum et
fructum natu-
ritatis.
Hebent et
Amicitia.

Lat. *afirmum*
cum *nece* *fum*
pium non *cog*
tur.
Med. *effe* *inimi*
cum *h* *est* *h* *oc*.

Lactis in ven-
tre corrupti no-
ta.

Hæclicæ febres
ne leuissimum
quidem tolera-
re errant.
Hæclicæ febres
Bænes.

Care qua dicitur.
Parenchymata

*Mars, Suedi à
colligantibus
febris, quomodo
de differe.*

*Intemperiem
per contrariam
aliam sanan-
dam esse.*

nobis intemperies quædam curanda: ea utiq; per contrariam intemperiem sanabitur. At quoniam uniuersis febrium generis intemperies est calor, utiq; per frigiditatem curabitur. Quemadmodum autem ab affectu ad materiam præfidiatur per ueni-
mus, eodem etiam modo à singulis reliquorū ge-
nerum primorum, ad eas est descendendum: uelut à uirtute, quæ morbo ceu aduersatrix opponi-
tur, & cui omni ratione opitulari & subuenire est
consilium. Quare uirtus quidem ipsa erit unus ac
primus scopus: alter aut arg secundus, quod ab
ea significatur, nempe custodia ipsius. Pari etiā ra-
tione, morbus quidē dicitur esse primus scopus:

*Custodiendam fer-
ri per similia.
Sublato morbo
fieri per contraria.*

*Partium singu-
la per que con-
sistenda sunt.*

secundus autē, sublarior ipsius. At uerō custodia,
similium indicabit exhibitionē: sublarior, contra-
riorum. Quoniam uerō uirtū substantiam tum ex
spiritu, tum ex carnosa specie, tū solidis ipsius com-
pletur: ex ijs quæ similia sunt, moliri cuius suam
custodiā oportet. Spiritui, ex respiratione, trans-
piratione, & uapore qui ex sanguine atrolit. Soli-
dorum uerō generi, ex solido nutrimento. Car-
noso generi, per eam naturam, quæ in medio liu-
midorū ac solidorum corporū est. Porro cuius-
que horum modum ex conservandæ substantiæ
modo inuenies: qualitatē uerō, ex ipsius tempe-
rie. Quā autem horum cuiusq; temperies, uel opti-
ma sit, uel aliquatenus uitiosa: quæ quidem opti-
ma est, semper seruari debet. Quæ uerō omnino
uitio nō caret, licet in sanis quidē uel seruanda est,
uel alterāda: in ægris uerō seruanda. Quā autem
diuersitas nō parua sit in partū animalis tempe-
ramento, propriā cuius mensurā, eorū quæ ipsi si-
milia sunt, oportet accōmodare. Nempe ei quæ ter-
rea est magis, eorū quæ magis sunt terrea: & ei quæ
humidior est, eorū quæ sunt humidiora: ac sic de
ceteris constitutionibus. Hinc uerō iam materiæ
particulares omnes in cibis, potionē, aëre, & om-
nibus peragi solitis, innemidē sunt. Quod si mu-
tuō inter se pugnant aliquæ indicationes, perpen-
denda nō indicantiū scoporū tum magnitudo, tum
dignitas est, efficiendūq; id, qd tum maiore, tum
digniori scopi admonet. Quoniam dignitas quidē
iudicanda est, uel uirtus, uel sanitatis respectu. Ma-
gnitudo autē est duplex: uel propriæ substantiæ ra-
tione, uel declinationis à naturali habitu. His igit
præmissis methodia, iam in febriū genere exercite-
mur, quod ex putredine nascit. Ac primū ab illa fe-
bri exordiamur, quæ ex putredine humorū in ma-
ximis uasis, uel in omnibus simul, cōputrescentiā
oritur: quāq; necesse est synochon, hoc est, con-
tinentē existere. Fieri aut nequit, ut talis febris sa-
netur, nisi inhibita prius ipsa putredo sit: quæ sanē
inhiberi, causā manente nō potest. Quare submo-
uēda ipsius causa est, si modū putredo ipsa prior,
mox post ipsā, febris sanari debeat. Ostensum
autē est, illa tantū putrescere corpora, quæ quā cali-
da humiditq; natura sunt, neq; perflata, neq; uenti-
lata, in calido humidiorū loco includunt. Quod si
in motu sint, uel uentilantur, ac perflentur, possē ea
nō putri, integritate seruari: porrius uero quæ cum
corporā sua ipsorū natura reguntur, ut animalia,
stirpiumq;. Ea namq; ab iniū cōgenitis secū mo-
tus habēt, quibus superflua excernit. Nec minus
etiā est demonstratū, quæ situm respirationis,
tum pulsū utilitas, ad perflandū, uentilationemq;
corporis, arg eius natiū calorem tuendū. Itaq; si

*Temperies opti-
ma, semper ser-
uanda.
Intemperiem ui-
tiosa quidē ser-
uanda, ex quo
de se alterāda.*

*Indicantiū scop-
orum dignitas
fieri esse expe-
denda.*

*Synochus febris
quæ dicitur.
Synochon con-
tinent.*

*Putrescent cal-
da & humida,
qua in simili lo-
co conclusa, per-
flari nō possunt.*

quid in eo manifestē putrescere debeat, dictas tran-
spirationes esse impeditas oportet. Fieri aut nō
potest, ut illę per totū stantur animal, nisi uel fini-
bus uasorū stipatis, uel tota cure. Porro accidere
iū finibus uasorū stipatio potest, uel ex uelocitē
extrinsecus refrigeratione, uel ex succorū, qui ex-
trorsum in ipsos confertim ruerint, crassitudine,
molestudine, uel lennitiā. Accidit hoc illis & ex q̃
exercitationibus quę in palstra, uel aliis obcunt,
& innere laborioso: uel à ambientia stira, quā ex ri-
gore in æstum mutatur est subitū. Nōnulli uerō
seruēt ex ira succi, ac foras simul impetu ruen-
tes, effecerūt dictas respirationes. Quisquis igit
propositam sanaturus est febrē, hic simul causam eius
oportet adimere: simul calorē qui in animalī exci-
tatur ab ea est, refrigeret. Ac quemadmodū qui-
dem ille refrigerandus sit, prius est dictū. Causam
uerō adimi oportebit, propria cuiusq; naturę in-
uenta contrarietate. Vigili ex frigida causā stipa-
tum, densūq; redditū corpus est, relaxato eo, om-
nīq; ratione rarefactū. Sin ex obstructione ita
est affectum, hanc reclusa. Quod uerō reclusū,
hic quoq; ad cōtrarietatem indicationē arrentus inue-
nies. Vbi namq; abundantia humorū est, hōsua-
cuabis. Vbi crassi, glutinosi sunt, eos tenues &
fluxiles reddes. Si plures causę aliquando co-
iunctę, omnibus per contraria occurret. In euismo
di aut dictarum causarū complexu, ceptisse à san-
guinis missione conueniet: ac abuo dantiā uacua-
ta, tum ad extenuandos humores uenire. Ab hoc
ad remittenda quæ sunt cōstricta, & rarefacien-
da quæ sunt densata. Atq; hæc quidem à morbi af-
fectu indicatiuē sumenda sunt. Quā autem cibo-
rum arg portionē, necnon spiritū decens quan-
titas qualitasq; uirtutē ipsam custodiendā: ac mo-
dus quidē quantitatis ipsorū à uirtutis substantia
inueniatur, qualitatē uerō à temperie: nimirū z-
stimari debet, quemadmodum uires quæ cor-
pus regunt, se habeant. Quæ quidem si sint ualen-
tes, uel adfectu uacuauimus præfidiū uirtutis. Sin in-
firmiores sint reddidit, uacuauit remedia cautius
administrabis. Sed & nutrimenti modus hinc ti-
bi desumendus est. Quippe quum uires legitimū
robur sum habent, & morbi summus uigor bre-
ui expectatur futurus, tenuissimū cibo uti licet.
Vbi uerō infirmiores fuerint, non licet sine grauī
noxa: sed adicere ad nutrimenta tantū oportet,
quantū est de robore uirtutis detractū. At nu-
trimenti qualitas, ex morbi affectu, uicū cum soli-
dorum corporū temperamento præfenti, sumen-
da est. Tempus autem nutrimenti, quod quidem
ad reliquas febres pertinet quæ ex putredine o-
riuntur, in progressū sermonis dicitur. Quæ uerō
unicam tantū à principio ad finē usq; accep-
tionem habēt, synochis dicuntur (de quibus im-
præfenditū est sermo) in ijs tunc offerendus est
cibus, dum ægri medius se habent: eoq; potissimū
diei tempore, quo in sanitatē prius cibari erant
fueri. Est autem frigida quoque ijs propinanda,
quum succi & iam cōsequuntur, & crassitudo
eorum est extenuata. Ceterum iam oportet præciū
est explicare, quorū sit febrim, quas putredo ac-
cendit, in uniuersum differentiā. Dein, quænam
sit ipsius generis earum cōmunis utilium auxi-
liorum indicatio. Mox, quæ sit singularium cuius-
que propria. Quod igitur ad differentias perti-
net,

*Transpiratio-
nem uide proba-
tem contrariet.
Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Transpiratio-
nem uide proba-
tem contrariet.
Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Stipatio uel fini-
bus uasorū uel
de cōtractat.*

*Nutrimen-
ti quantitatem &
uirtutem, qualita-
tem à temperie
sumendam esse.*

*Tenuissimū ci-
bo quando sit
utendum.*

*Nutrimen-
ti qua-
litatem ab affectu
ex corpore
sumendam esse.*

*Nutrimen-
ti tum
quæ sit
sanitas opti-
ma.*

*Principia quæ-
dam sit
proponenda
da q̃ qui labor-
ant febribus.*

Psittacus *fr-*
differs *differs*

ner, prima fanē ex eo est, quōd causā ipsius putre-
dinis ad adducit, non ad auferat. Secunda ex eo,
quod per totā animal, aut eius partē aliquā, di-
fusa putredine fit. Tertia, quarens cum phlegmo-
ne, aut circa hanc. Ergo ordiamur ab humorum
putredine, quē primū indicans in diuisione fuit.
Cuius quidem natura, ad curationē est inuen-
tionis principii. Porro natura putredinis est mu-
tatio totius putrescentis corporis ad corrupteliā,
ā calido elemento. Non enim perfectō ā proprio
calore corruptū quicquid: imo prorsus contra,
quicquid in rebus subfistit, id augetur, roborat-
ur, firmitur, ac uiuit, dum proprio calore regitur: ue-
luti nūquā ipsa animalis corpora, quandiu fer-
uuntur propius eorū calor, in cordis quidē cor-
pore, per respiratiōē. In reliquis omnibus par-
tibus, tum per cōmunitatem quam habent cum

uacuandi. In uniuersum autē, dum plura simul
coeunt symptomata, id qđ maximū omnium est,
aggrēdi oportet, atq; ei uel folli, uel magis q̄ cete-
ris, subuenire. Porro ad corrigendos putrescentes
humores, non tantū requirimus uires ipsius
pulsus firmas: sicut nec eius facultates quę uo-
luntariū mori largitur, sed multo magis ipsius
co-coctio. Ergo si & uires cōfēx ualentes sint,
& ardentissima febris, & co-coctionis notę pla-
ne euidētes, frigidam intripide propinabis.
Quod si atq; exē bona corporis habitudine sit
tum itatus corū calidus ac ficcus, etiam si in frigi-
dam nationē hunc dimittas, haudquāq; ledet.
At si mediocrius est febris, & uires nō ualide, sed
cum notis co-coctionis, q̄s qui ita febre, balne-
um prodest, & uini portio: tum uerō ex unctio-
nibus est quę rarefaciūt: idq; multo magis, cum
ambiens est frigidus. Neq; enim aut frigidam in
balneo lotionē, aut frigidam potione in euismo
di cōti itatu ferē expersunt, utpote inspirationib.
asidue refrigerati: cum si quando in frigidum ab-
biente uehementer uri agrotū cōtingat, exigua
salus eius habenda spes est. Si uerō nec co-coctio-
nis habeat signa, nec uires ualidas, seruati in pla-
ne nō potest. Quo minus aut idem lauandus in
balneo est, aut medicamentis q̄s quę rarefaciūt,
ungendus, aut uinū illi dandum, frigidaue offe-
renda. In quo enim desperata omnino est salus,
imprudētis consilij ferat apud uulgi infama-
re perfidia, quę multis facit saluti. Febris igitur,
prout febris est, aqua frigida est perpetuū reme-
dium. Quod uerō ad alia pertinet, nō perpetuū.
Veluti cum ex obstruptione glutinosi & crassi
humoris putredo nascitur. Ponatur autem cum
hoc, & redundantiam in toto esse corpore, tum
uirtutē nō imbecillam. In euismodi etenim cum
plexionibus, cum multa peritē naturā in corpo-
re sint, quędam corū precedentes causę erunt:
ueluti redundantia cum glutinosi & crassi hu-
moribus. Horū namq; uino obstruō est orta:
quę morbus iustum talis est, corū quę obstru-
cti sunt corporū. Hanc symptomata sequūtur est,
ipsa transpirationis cohibitiō: quę rursus putre-
do humorū excepit, antequam quādiu ipsius fe-
bris causa. Ergo qui febrē curare uult, nec esse est
inhibere putredinem. Ac sic dux indicationes se
exhibent, altera dē febrē, altera dē putredine. Atq;
si febris rursus dux: scilicet ut portio febris, quę
iam accensa est, percure: quę uerō etiā nū gi-
gnitur, inhibeatur. Alię autem dux rursus dē pu-
treddine erunt indicationes: ut & quod putredini-
nis iam factum est, fuit: & quod in generatione
adhuc est, sitas. Porro qđ in generatione est,
id peripiratio impedita facit. Ita ab hac rursus al-
iæ dux indicationes nascuntur: tum ut quod re-
tentum est, uacuetur: tum quod retinendum est,
prohibeatur. Prohibebitur sanē, si obstruōnis
medamur. Cuius quōq; ipsius, quod iam occu-
pauit, simandū est, per ea quę obstruō liberant:
quod futurū est, propulandum, per ea nimirū,
quę affluxum obstruētiū succorum compes-
cunt. Ergo quod uisum in ipsa methodo resolu-
tione est muentum, id primū omnium in cura-
tione tibi est peragendum. Etenim si q̄s actualis,
quę obstruōnes eximant, uti, non uacuat

*Frigida quando
fit propinqua
intergrale febris
hanc affertur*

*Frigida notatio
ne quando post
mau rei in cōs
uentibus febris*

*Vana quando
exhiberi posuit
per continenti
febris.*

Letalia fuscipes
in Koebe.

Infamanda saluberrima medicamenta non esse ubi salus est deplorata.
Febru, ve febrü, aqua frigida est perpetuo remedium.

Objectiones
quid

Parado est an-
tecedens affinis fi-
deri causa.

Patres et mater
corpora ad
corruptela à ca-
lida exteriora fa-
ciat.

Calor naturalis
auget arq; cōfer
naturam, illūj
vitam Lingula
Calor naturalis
quomodo conser
uatur in corpore

Puerto Nuevo
de la Cruz.

Partie humaine
quomodo sit re
candem.

Vaccinatio
determinata
per parasitum
et adangra.

*Varmantia me
dici qua sunt.*

Rarescendum
non esse corpus
prout, quam si
vacuatum.

Virum a quo sunt
procreantur a mu-
liere a coitione.

Obstrucla non
esse aprimenda,
prius quam ple-
nita de r' accen-
tur.
Obstruclionum
curatio.

prius abundantia, uelimus, nō modō nihil proficiemus, sed maiorem etiam reddemus affectū. At si uacuat prius multitudine ad curandā obstruclionem accedamus, medicamentis ipsi ntemur, quæ citra calorem obstrucliones expedire sicut apta. Vbi autem quæ obstruunt deteria, dis- se clatq sunt, per alium, urinam, atq sudorem, ea uacuare tentandū, idiq medicamentis, quoad li- cet, minimè calfacientib. Hoc uerō tempore etiā uires roborare, quō & putredinē superent, & suc- cos concoquant, studebimus. Quod autē febris ipsius iam accensum est, refrigerabimus. Itaq in auxiliorū inueniendorū ordine, ultima est quæ ab hac sumitur indicatio: quā alia ratione sit pri- ma, cū si febre uidelicet corperit inueniendorū præsidiorū methodus. Ac si nullum quidem in- terim uehementē symptoma incidat, prohibeatq quo minus auxilia ab initio morbi ad finem ita procedant, celerrimè febris sintet. Sen tale quip- iam incident, quod totam ad se curationem re- uocet, producetq & curanonis finis. Expende- re autē oportet medicamentorū tum usum, tum noxam. Quippe aqua multa, quatenus crassos succos extenuat, glutinosos deterget, atq excre- tionem promouet, optimū in ipsa synodus medi- camen fuerit, quos habitus coarctatior, & putre do excitant. Quatenus uerō calorē febris ad- auget, etiā noxia. Quare si hic immodicus sit, par- cendum melle est, uten dumq cremore ptisanq. Quod si difficile & cōtūaces iudicaueris esse obstrucliones, etiā oxymelē. At hoc ipsum rur- sus, si immodicè utare, & intestina radit, & ruf- sim excitat, & neuosa lædit. Perpetuū autem do- gma illud exiit utiq, Contrariorū cōtraria esse remedia. Quisdoquidem fieri nō potest, ut eorū quæ præter naturā sunt, quicq per aliam ullam re- mediorū speciem curetur. Non tamen ex usu est, semper omnibus quæ præter naturā sunt, mede- ri: sed cum sola per se subsistūt. Nam si cum alijs unā incident, alijs sepe est ante illa medendū: si- cuti in causis ulceribus, ubi ea simul cū phlegmo- ne sunt cōiuncta. Si quid uerū in his quoq ma- net, quod per ea quæ carne implent, curant. Cæ- terū his uti nō licet prius q̄ curaueris phlegmo- nem. Quæ itaq præter naturā sunt, omnia ab ip- s quæ ipsis sunt cōtraria, curantur. Cum autē eo- rum quæ præter naturam sunt, duplex prima sit differentia, alijs per se subsistentibus, utputa affe- ctibus: alijs in generatione suam essentia habentibus, ac umbræ ritu affectus concomitantibus, nempe symptomaticis: utiq sanāto quidem, affe- ctū sublatio est. Hanc uerō symptomatū amo- tio sequitur. Quare affectū ipsorū, qui uerè & primariō curantur, potissimū dicuntur esse con- traria remedia: symptomatū autē, ex accidenti. At uerō contraria dicunt, quæ sub uno eodemq genere, plurimū inter se dissident. Si autē in illo genere qd medio cre est, hoc est, mediū inter duo extrema, intellexeris, infinitā quandam cōtraria- rum rerū multitudine, quæ in aioris minorisq ra- tione inter se dissident, eo inuenies. Nō enim in corporū modō qualitate, uerumetia in quan- titate, eiufmodi contrarietatem inuenias: quam utiq Aristoteles nō contrarietatem, sed opposi- tionem nominat. Verū Hippocrati, omnia id

genus contrariorū habent appellationem: sicuti etiam Platoni, qui ex contrarijs esse dicit genera- tiones. Contemnere tamen nomina oportet, mi- nimè autem scientiam rerum. Cuius nō ignarus Hippocrates, ait: Medicina appositio est, & detrac- tio: deficiendum quidem appositio, redundan- tium autem detractio. Porro deficiunt, redun- dantēq nōnulla quidem in quantitate, quædam autē in qualitate. In quantitate, cū sanguis im- modicè est autus, aut rursus minor redditus. In qualitate, cū uel calidus, uel frigidus, uel cras- sus, uel tenuis, plus iusto, minusue, est effectus. Verū ad medendi indicationes propofiti nobis febrilī generis reuertamur. Genera causarū quæ in nobis præter naturam oriuntur, sunt, multitu- do, crassitudo, & lenor humoris. Causa simul atq symptoma est, transpirabilis excrementi re- tentio. Simili modo causa pariter & affectus est ipsa putredo. Morbus uerō tum obstruclio, tum febris ipsa. Symptoma est, transpirabilis excre- menti retentio. Ergo indicabit præcedentiū cau- satum quælibet propriū aliquid, poscens nimis ablationem sui per opposita. Nempe multitu- do ipsa, quæ ex eorum est numero, quæ sunt ad ali- quid, in prædicamento quantitate, uacuationē. Lentitia uerō & crassitudo, quæ sunt in qualita- tis affectu, in cōsionē & absterfionē. Obstruclio autē, qui morbus instrumentalis est, redutionē. At transpirabilis retentio, excretionē eorūdem. Sicuti & humorū putredo, excretionē, refrigera- tionem, uentilationē, & concoctionē semiputri- dorū: quæ omnia illi ex aduerso respondent. Ipsius uerō febris, refrigeratio oppositio est. Sin- gule itaq res semper unā indicationē exhibent. Ac si præter naturā ipsum indicans sit, semper in- dicabit contrariū: sicuti nō contrariū, sed simile, si secundum naturā se habeat. Igitur si uires eius qui ex putredine humorū febricitat, ualētis sint, mitidus statim morbo incipiente est sanguis, si cruditas uentris nō addit. Sin uires infirmæ sint, aut ætas dehortet, incidenda uena nō est. Eius- modi tamen febris in uirtutē imbecillam nō in- cidit. Quippe synochos bene habiti corpora, & calentis gratis est propria. At si in pueri incidat, qui quartūdecimū annū hæctenus nō attigerit, miti illi sanguis nō debet: propterea quod tan- tillis, cū præsertim calidi & humidī sint, pluri- mum corporis substantiæ quotidie defluat, ac di- geratur. Itā qd ex incidenda uena molendū no- bis fuerat, id ultro nobis ex curandi corpora na- tura præstat. Quod si corpus quartūdecimū ex- cesserit annū, æstimandū est, quales eius natura sit, num gracilis, & spissa, & dura, & copiosi san- guinis, an contrā. Atq ita in priori missionē san- guinis adhibebis: in secunda, nequa. Quinetiā modus uacuandi sanguinis ex ipsēd sumet in- ducanonibus. Si enim cui sanguis mitti, triginta annos sit natus: sed laxus, & mollis, & pinguis, & albus, & gracilibus uenis: huic aut planē san- guinē nō mires, aut parā dextrales. Et omnio quidē nō mires aliūo tempore, regione æstiu- sa, & cæli statu calido & sicco. Parū dextrahes in reliquis tum a nni tēporibus, tum regione, tum cæli statu. Iam uerō si neq obstruclio, nec putre- do subesset, sed sola redundans succorū, protu-

Medicina est ap-
positio & detrac-
tio.

Conferuntur gen-
era præter natu-
ram.

Conferuntur præ-
cedentia sicut
putredinem, quod
sanguis indicat.

Sanguis in pro-
pria ratione nat-
tendus est si po-
tente febre leu-
tate ualida re-
tinetur sit, nec
dicitur subsist.

Synochi non
incidere in im-
becillos uiri.
Pueri ante qua-
rtum quatuor-
decimū annū
sit sanguis mitti
dicitur, nisi labo-
rent synochi.

Pueri post qua-
rtūdecimū annū
quidē mitti
dicitur, si sanguis
est quando m-
mure.

Malā facultas
m.

Oxympelitis no-
xa.

Contrariorū of-
ferremedia cō-
traria.

Remedium præter
naturam diffi-
rentia duplice.

Contraria quorū
dicitur qd
p.

Contraria quo.

Oppositio quo.

illis periculosum. In his uero est quidem periculosum, non tamen perinde ac in illis: nisi pus educere ex pectore aut pulmone, aliquid sit opus. At in liene curando, si uel exger ex his sit, qui atræ bilis excrementum naturaliter congerant, uel etiâ eo tempore succus in eo redundet, necesse est reliquias attringentia permiscere, quod uisceris robur custodias: ita enim & excrementa ad se trahet, & cû corpus expurgant, ipsæ rursus per uentriculû excernunt. Sin atræ bilis sit omnino excrementum tuum, aut prolixius attringendum non est, aut parçissimû. Ad lix, si in quauis phlegmone obfessa particula, calor tumorê superet, agendum ut sensim per ea quæ tepentê calorem obediunt, digeratur: quod genus est tum lini semen, tum chamæmêdû. Quibus adqûi uel hordei, uel fabarû farina debet: quippe quorû neutrû exal facit. Sæpe uerò & artometite ad euismodû phlegmonas utitur: cui aquæ aliquid admiscemus. Ad lientê uerò etiâ aceti aliquando aliquid. Si uerò laborantis phlegmone partis calor non multû à natura recesserit, tumor autê ipse fuerit notabilis, digerere hand timide sine aqua debebis, etiâ scenigræci aliquid supra dictis immiscens. Si ueluti scirrhusa duritie phlegmona sit, propter humoris quæ cõtinet uel crassitudinê, uel lentorê, tum aceti aliquid, tum amara medicamenta, simul immiscenda curabis, potissimû in liene. Etenim uiscus hoc, propterea quod ab icenore crassum humorê trahit, euismodû humoris occasione plerumq; laborat. Quo magis cataplasmata quæ ex oxymelte, & absinthio, & scappari sunt, illi sunt idonea. Cæterû nec eorum qui ex putrescente humore febricitant, quenq; ipse lassabo: nec relaxantibus cataplasmatibus, prius q; superuacua purgarim, utar. His uacuant, non solû audaçter lauem, sed etiâ cataplasmatibus utar: in alijs quidê membris, his quæ relaxant: in icenore uerò ac uentriculo, additis etiam quæ attringant medio critur. Parcius autê ad pectus, q; ad ea, utendum attringentibus est: quando ita humores qui phlegmonê excitât, in pulmones & cor non nunq; reprimunt. Ac cibis potius horum firmitudini est consulendû. Neque enim sicuti in icenore & uentriculo phlegmone laborantibus, ita hic tenuissimo uictu est utendû. Ac longè quidem magis in pulmonis phlegmone abstinendû ab attringentibus est: quodd in eo ipsa quoq; relaxantibus admiscendum aliquid acriû quodammodo, & euidenter calfacientiu est. Quippe foras trahere, potius quàm reprimere, in eo debemus. Itaq; etiâ cûcubitula, in his qui sic laborât, si prius sint uacuant, applicabit. Si uerò abundantia succorû adsit, non magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi transferet, q; ex toto corpore attrahet in uentrû. Eadem ratione, neq; in cerebri & eius membranarum phlegmonis, cucubitulis in morbi initio utemur: uerû ubi nec insuit adhuc quicq; & totû corpus prius est uacuât. Ad reprimendû in his quoq; inter initia utendû. Sed cû per cranij ossa mediâ occupâtia regionê, in aliu descendere reprimendû uim cupimus, eorû quæ priore, ac deducere ea possunt, aliquid reprimendû admiscebimus. Ea sunt, quorû substantia ex tenuibus partibus cõstat. Sane aceti non modò te-

nium partiu est, sed etiâ non mediocriter reprimendum obit. Quo profectò rationalibus in principijs affectuum ipso utimur, rosaceo admiscens. Procedente uerò tempore, etiâ spodylû & serpylli aliquid miscet: quo scilicet tempore transire ad ea quæ cõcoquant, ac digerant, cõuenit. Sane ad rem modû & castoreo utimur: cûm tamen ipso in alijs phlegmonis minimè utamur, quis etiâ in summa inclinatione consistant. Est namq; calidius id, q; ut phlegmonis sit idoneum. Soleo autê ipse singulari particulam mentas, qui ipsa excrementorû emissio est (sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, uentriculo, melenferio, & icenoris cõcaus, intestinû rectû. Renibus, uescicæ, icenoris gibbis, uenæ caue, arteriæ magnæ, & omnibus quæ in lumbis habent, eum qui uescicæ inseruit. Pulmonibus & pectori, arteriâ asperâ, atq; fauces. Cerebro & eius inuolutis, eum qui per palatû & nares descendit. Paratur fluxibilis his quidem quæ per sedem excerni debent, mulla, & cibus his qui uentrû liquant, & pharmaciis quæ modicè proritare possunt. Ad uentriculû uerû, iecur & lientê, si quiddo phlegmone sit uexata, nec mulla ipsa est utilis: quoniâ licet in bilem transit, ac uiscerû phlegmonas auget. Excrementa autê, ut cum urina excernant, diureticis promouebis: quemadmodû quæ in pectore & pulmone hærent, his quæ tuisim excirant, euacuant. Porro balneum in remissione febris administratû, corpore iam mediocriter transpirante, non exiguû cõmodum aliert, omnia ex eo tum saligi nosa excrementa, tum luumia educens. Curandum tamen est primò, ut citra horrore administretur. Secundû, ut nullû primæ notæ uiscus sit inbecillû. Tertiò deniq; ne multitudo crudi humoris in primis uenis cõnueat. Horror siquidem & auget, & gignit febrê. Partes uerû inbecillæ, per balneum liquatos humores multò facilius alliciunt: & quod facit liquati sint, & quod uigilantur dilatare. At crudorû humorû copia in totû corpore digerit. Horû si nihil obstat, ex balnei duo hæc ægro cõpendia accedunt: & quod redundantiæ humorû uacuabatur aliquid, & quod multû transpiratû caloris febrilis. At uerû cûm particula, quâ obstructio, aut putredo, aut phlegmone obediât, febris ipsius ueluti focus sit: si ei propter calorê suâ sponte trahenti, alia quæpê occasio extrinsecus, ex his quæ potestate exalciant, accesserit, necesse est affectû intendi. Si quis autê prius toto uacuato corpore, relaxantibus curet, ubi scilicet maxima febris non adest, utiq; prodesset aliquid potest. Quo tempore etiâ laiare citra noxâ licet. Cauendû tamê si frigido solio his est quodd & crudi & putrescentes succi, minus apti sic exhalandû redduntur. Itaq; in progressu morbi, ubi & absumpta iam superuacua sunt, & tum cruda, tum putrescentia cõcocta, & cataplasmatibus relaxantibus, & balnei sine periculo utar. Porro apertissimû in febribus quæ intermittunt & repetunt, tempus est, cum exhalare febrilis calor iam corperit. Statim siquidem corpus ad nutrimentum præparant: huius quoq; opportuno tempore ex duplici consensu respectu, uicè summo præcedentis accessionis uigore, & future principio. Ad hoc namq; spectantes, operâ dabimus,

Calidius igitur
bilis, quam vi
excrementis phlegmonis.
Tertium singulare
lenti mucus est:
se reddenda, si
cilio.

Fluxibilis
mentas quibus
medicamentis pe
retur.
Bile si quibus
non sit cõueniens

Balneum quod
de cruditatibus.

Balneum quomodo
admitte
strandum.

Balnei igitur de
plece.

Balneo apertissimum
tempus in
febris, intermit
tentibus, quod
nam sit.
Nutrimentum
tempus uero sit
ut illa modum.

Phlegmonas
quarum calor tu
morem superat,
quibuscumq;
medicamentis do
beamus.

Artometite.

Phlegmona que
rum tumor calori
superat, qua
ratione curanda
sint.

Acetum quiddo
miscendû phleg
monarum medicamentis.

Lieni affecto
que medicamen
ta conueniant.

Tumida febre
detentis, nec la
ssandis, nec rela
xandis effe, an
tequam corpus
nutrimentum sibi
re.

Hypocati cata
plasmatum sensu
ficunda attringentia.

Pectore affecto
parcius mouenda
esse cataplas
mata attringentia.

Pulmone inflama
to, abstinendû
ab attringentibus.

Pulmoni inflama
to, applicandû
cataplasma
tum esse, si prius
siccû corpus uacuatum.

Cerebri & mē
branarum oris
inflammationibus,
quodammodo
cucubitula conueniant.

Tenuia quiddo
miscenda sunt attringentibus.

Aceti facultas.

*Contingit febrem
dicentem, quoniam
dicitur ab ipso
feruari debet.*

*Phlegmone affligit
genae, utriusque
in hoc loco, per
necessitatem esse
ante accessum
cibarii.*

mus, ut longissimè ab utroque nutrimentis. Verù si febris ipsa sit còtinens, còbit eam breui finem dam. Si igitur ultra septimū neutiq̃ progressura uidel. prorsus còtinens, a cibo æget, et si uirtutem nō defuturā coniungimus. Sin ad nonū, aut unde cimiū, aut quatuordecimū usq̃ progressura uideatur, aut etiam finem de septimo, cæterū æger uires infirmiores habere, quàm ut in tantum tempus fossicet, necessum erit nutrire, ac deligere id, quod minus sit noxium. Etenim ubi uel itecur, uel uentriculum phlegmone prehendat, perniciosissimū est ante accessionem cibare. Vbi hæc habet, quibus infirma est uirtus, utilissimum. Porro summū uigorem febris accessio nis expendens, an circa magnitudinē febris caloris sit siccus, squalensq̃, an citra siccitatem urēs. Priorem nanq̃ humectante uictu ægrum ma defacere oportet. In secundo, dum plurimum se fe calor remittat, manere. In principij uerò accessio nis more æstimabis, an corporis extrema refrigeret, & magnam sanguinis reuocationem ad interna corporis faciat: aut omnino corpus non premat. Quippe secundum hoc, seu facile mansuetum, continens. In priore distinguas oportet. Nam si abiq̃ uisceris phlegmone, aut succorum redundancia motus ad interiora in accessio nibus pollet, uel offendens paulo ante cibaria. Sin uel phlegmone, uel redundancia sub sit, cauenda est ante accessionem cibatio, seu res maximè noxia.

GALENI PERGAMENI de medendi methodo lib. XII.

QUæ cum symptomata constitunt febres, non sunt ad febrium genus ullum, aut species, aut differentias distincta. Porro grauiorū symptomatū, & quæ rareret febribus incident, primæ differentie sunt tres. Aut enim in læsione actionis còstitunt, aut in retentorum uacuatorumq̃ immo dico excessu, aut in corporum ipsorū affectu. Ex quibus dus quidem differentie priores, si còtristrent, ad ferotā curationē còuertunt, affectumq̃ delerere cogūt. Tertia uerò, alterius quidem quæ curare oportet, affectus est si gnus: nullam tamen seorsum curationē exigat, utpote cum affectu, unde nascitur, una celsa. Nulli autē symptoma, quod symptoma est, nec curationis rationē indicat, nec primū immutat: licet ex accidenti interdū id faciat, ubi scilicet causæ locū sortitur. Porro eorū omnium, ubi ueluti causæ curationē immutant, unū caput est, ipsa læsio, siue uirtutis sit, siue dispositio nis. Lædunt autē uires, uigilia, dolor, atq̃ uacuatio immodica. Affectui uerò eadem, nō utiq̃ semper, cæterū magna ex parte, nocēt: ac potissimū cum fuerint immodici. Quæ de causa, quandoque cogimur prius submouere symptoma, q̃ morbū, mutato uidelicet instituto. Ergo si labant uires, nō tamē uehementer sint resoluti, sed adhuc resistent, ad symptoma tantū sumus attenti, atq̃ id q̃ primū tollere maturamus. Sin iam resoluti: uehementer sint uires, non modò symptoma sedare, sed illas etiam firmare còten dimus. Vbi uerò uirium roboris fiducia est, adeo nūq̃ còtra symptoma pugnamus, ut (quod prorsus contrariū est) per ea

nonnūq̃ præsidia, quæ dolor afflicto, morbos ipsos curesmus: ueluti profectò dyfenterie ipsi, mordentibus maxime medicamentis tum potissimū medemur, cum onq̃ est grauissima. Est autē duplex medicus contra dolorē intandendi ratio. Altera, quæ delictis cubantium subscribunt: altera, ex artis ratione. Quippe si licet ægrum doloribus obuitentē ualentibus remedijs uno die persanari, qui tota curatione oglectia dolori tantū intensus est, nō ex artis ratione, sed in gratiam ægrorantis id facit. At si ex dolore uires sol uuntur, atq̃ ex eo impendit periculum, mitigari dolor, & roborari uires debent, quò & morbo resisteret, & curationis spacio sufficere ualeat. Esto igitur terminus in ægrorantibus, quem nō transibit is, qui ex arte generosè còtra morbum pugnat, ut tutò medicetur. Ei uerò qui dolore mitiga tur, ut uires custodiat. Porro dolorem mitiga tur, quæ ex papaueris succo, uel alterci semine, uel radice mandragoræ, uel deniq̃ styrace constant. Cæterū si fas sit, ipsa remedijs quæ morbum sanant, utendo, quod optamus efficere, cauendum ab id genus sopsiferis medicamentis est. Sin uerò ex uigilijs & uiribus resoluendis, æget ad mortis discrimen tendat, tum profectò ipsis tempestiue utare: nō ignarus scilicet corporis habitu nō nihil ex eis lædendū, eligendū tamen potius læsionē ipsam, q̃ mortem. Hæc nimirū persuasione ipse quoq̃, tamen omniū maxime ab usu grauior sopientū abhorrens (quod rebellē ualentem in corpore frigiditate relinquit) ali quando tamē ea & colicis exhibeo, & ipsi qui uel oculorū, uel aurium, uel aliarū partium uehementissimò dolore cruciant. Interim uerò, & cum æger ex tenui destillatione, uigilijs, & uehementi tussis urget, pauxillū eiusmodi medicamētū offero: facile noxā etiā, si quis semel sit uisus, spacio emendatū iri ratus. Omnia tamen id genus magis salubria sunt, si post annū à còpositione sumant: ueluti quod ad Philonē refertur, quod ad dolores stupefaciendo sedandos, nullo minus est ce lebre. Id uerò etiā si duorū, triumq̃, aut quatuor annorū sit, multo sanè fuerit præstitū: sed neq̃ inutile tamen sequētibz annis, ad decimū usq̃. Ergo sicut cauēdus est, quoad fieri potest, eiusmodi medicamentorū usus: ita si necessitas urgeat, nec ad modū recentia sunt offerenda: quod frigida quæ in his sunt, proalescentes uires adhuc habeant: nec ita antiqua, ut spem nostrā frustentur: sed tandem dimittēda sunt, quoad uiolentia refrigerantur, ab eorū quæ calfaciūt ui mitiget. Et talū quidem medicamentorū usum, eorū qui aduersus symptoma pugnat, est proprius, potissimū ubi ex frigida causa dolor est excitatus. Ob sunt enim talia plurimū non affectū, curationisq̃ contumacē eum reddunt. Ad sanguinis missio, quæ scilicet uires nō deicit, symptoma spectat: ita medici opus nō est, sed eius qui totū affectū adimere studet. Ad eundē modū & balneū, & purgatio, & fomēta calida, & uini potio. Quæ omnia, dum affectus sanant, unā cum ipsis etiā dolores sedant. Eodem modo & nutrimentū exhibitum, ubi sicco & squalente morbo os uentriculi afflicti tum, dum affectum ipsum sanat, hominem prehensū syncope proliet. Porro qui ex copia crui

*Dyenteriam
grauissimā cura
ri maxime nec
dicitur nec
medicamentis.
Dolorem ex
pugnādo ratio do
pior.*

*Melendūm ta
li esse.*

*Vires esse fra
das.
Dolorem quæ
mitigat.*

*Sopsifera, si se
ri possit, tu an
da.
Sopsifera quæ
resolunt.*

*Stupefacienti
bus medicamen
tis Galenus res
baturum res
doloribus ac
cerbis sumat: ut
tenuibus destil
lationibus.*

*Stupefacientia
medicamenta in
tota esse, si post
annum a compo
sitione suman
tur.
Philonium stu
pefaciens.*

*Stupefacientia
medicamenta,
aut nec recentia
nimo, nec vetera
imponi ubi
lunda sunt.*

*Symptomata cum
gaucorem uis
differentia.*

*Symptomata ad
ex si nec curatio
uirtutem in
dicant, nec pri
mū immutant.*

*Vires à quibus
læduntur.*

*Symptomata
soluere, quæ
de uigilijs mor
bu cogimur.*

10

10

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Vacuatio per
frictionem soli,
quod debet ad
ministrari, et
quomodo.

dorum humorum, unde cum oris ventriculi offensione febricitant, et ne inflammatione sanguinis, neque purgatione toleret, cum enim vacuatione desiderant. Quare eis vacuatio per frictionem soli ad ministratur. Ergo linteis medio criter asperis ita etiam in ipsis auspiciis morbi fricandi sunt, à cruribus superne deorsum. Debet enim radi ab his cutis, cum simul & calferi per eam, & digeri corpus postulet. Dein tota brachia, simili modo ab humeris superne deorsum. Vbi uero artus omnes abunde calore iam uidebunt, & metus fuerit ne quis ex multitudine frictionis, cōtusa iam carne, superueniat lasitudinis sensus, oleo relaxare uteris: quod genus est Sabinū. Ab astringente uero abstinere, cuiusmodi Hispani existit. Hyems uero si fuerit, nihil deterius sit, si ad digerendum aliquod transieris, quale Sicyoniū est, aut enī chamæmelinū. Vbi igitur oleo membra ipsa abunde fricueris, oleum est detergendum, atque ad spinam dorsī transeundū: quam totā pariter fricare, primū quidem sicca frictione, post oleo, expediat. Ab hac rursus ad crura te conferes, & ab his ad brachia, denuoque dein ad spinā: sic totū diem agens, in domo & lucida, & temperata. Sanē multa, in qua coctū hyssopum fuerit, linteis apertissima: qua sola primis tribus diebus utaris. Ipse uero eo tantū tempore dictū intermettes frictionē, quo somnus hominē occupauerit. Ad quē etiā alliciendū, & frictio uerior facit. Ceterū somnus uerior his minimē est salutaris: cum nec

Oleum Sabinū.

Oleū Hispanū.

Oleum Sicyoniū.

Oleum chamæmelinum.

Frictio uerior
alioquin somnus.

Somnus dicitur
non crudes fieri
digeri probi
bit, et rursus
reddat graui-
ta.

Somnus conco-
quit,
Vigilia digerit.

Mulsa rebusibus

Cataplasma uti
potendum nō est
si priusquam su-
peruacua par-
tem sint vacua-
ta, partem conco-
cta.
Iandem vigilia
miseris, quibus
corpus cre-
dita succi redun-
dat.

præparabit. Neque enim eis qui sic sunt affecti, acetū incommode est. Imò sicuti crudos affatim succos esse animaduertis, oxymel assidue pro multa dabis: si quidem æstas sit, & æger frigida affuerit, frigidum: si hyems autē, omnibus calidum. Maxime uero pulsus paruus, tardus & rarus, frigidos subesse succos ostendit. Sanē propolis aduersissima sunt tum balneum, tum aer ambiens, quoties uel nimis calidus est uel frigidus. Itaque ut laudandi linteis non sunt, sic & reclinandi in domo sunt: æstas quidem, que frigat: hyeme, que caleat. Lædunt namque non parū ab utroque excessus.

Oxy-mel. i. e.
succe illi qui
creta succo re-
dunt.

Frigida subesse
succos que pul-
sus indicat.

Syncope à cre-
ditate curata.

Syncope lebe-
rantibus muni-
bus quare uis
sic exhibenda

Vinorum gene-
ra varia.

Vinum a uino
quod calidū sit
reperit nullū.

Vinum impurū
calidū, et effu-
da non est, quia
huius capis qui
hæret.

Atque hæc quidem agenda sunt tibi, ubi à primo die curationē susceperis. Si autē ad eos quos iam premit syncope accitus fueris, si ea que retuli ta phlegmone naet, panē exhibebis nō multū, eumque ex uino aliquo, quod celerē in corpus digestionē adiuet: statimque ad frictiones uenies, quas ut diximus administrabis. Ac si quidē celi status sit uehementer calidus, cum frigida uinum dabis: cum calida autē mediocriter, si tēperatus. Quæ tamen secundo & tertio dabitur potio, omnino calidam exhibendam carabis, ut que succo rum crudorū concoctionē adiuet. At quib. & flauo bili, que os utriculi infestet, syncope incidit, si frigida exhibenda pono est. Vinū tamen quod & calidum natura sit, & deductionē in corpus promoueat, omnibus quos syncope male habet, offerre cōuenit. Constat autē ex uinis ea deligenda esse, que & flauo colore sint, & substantia tenui, & ætate uetere. Italia nimirum & boni odoris cōtinuō fuerint. Quinetiam si paululū ubi mista sunt, gustes, senties calorē per totū corpus transmitti. Ceterū amara præ uetustate uina ne sunt, præsertim que non exhibebis, quibus stomachus flaua bile urgetur. Cōmodissima igitur his uina sunt, que cum naturaliter sint auctera, sensibilem tam astringendi uim, propter uetustatē nō amplius exhibent: calorē tamen admodū uel dentem habēt. Huius igitur generis uinorū optima sunt, Surrentinū, Signinū, Sabinum, Tiburtinum, & Marium, omnia quidē Italica, astringentiaque. Quibus tamen ex crudis humorib. syncope periculum imminet, sanē Falernū tantū iam memoratis præstat, quātō tum melioris est succi, tum etiā calidius: utpote quod & uelocius illis digeretur per corpus, & crudis succis concoquendis auxilio erit. In summa uero, quibus ex abundantia crudorū humorū syncope incidit, ipsa crassa uina, ceu noxia: aquosa, ceu parū efficacia, fugienda sunt. Deligenda autē eorū sunt media, quæque flaua existāt: & calida. Neque enim minus ex albo uinorū genere calidū ullum: quoddā etiā auctera, & mediocriter calidū, cum inueterauerint, quodāmodo saluaria reddunt. Quorū quorū autē in ipsis calidissima sunt, omnia profecto sunt flaua. Reliquorū uini generū, auctera que mediocriter alba, crassaque sunt, certe nullā ad digestionē in corpus est idoneum. Si tamen abunde inueterari, nec aliorū copia sit, ut illis licebit, quod stomachum roborent. Ceterū uina que calcascent immodicē, si offrenda nō sunt, quibus caput est imbecillū, facile ab id genus uinis replet. Porro uina que odora fuluigia sunt, quantū ex ipsorum est natura, omnia caput grauāt. Eoigitur Falernum,

50

60

*Vina anthra
ventriculum ro
borant, capiti
momenti tenui
sunt, tamen
prehenso ad ef
ferunt.*

*Syncope est pra
eceptum uero
essentia uero
in quibus con
sistat.*

*Spiritus anima
lis à cerebro na
scitur.*

*Spiritus vitalis
in corde ex aere
fit confusus.*

*Spiritus natu
ralis si qui sit,
in uiscere citius
habet.*

*Lapsus uirum
quibus succedet
resoluit.*

*Spiritus 2 quib.
alterari solet.*

*Spiritus qua
corruptant.*

*Anima per se
ipsam moueri in
portantibus
habet.*

lernum, tum Tmolites, tum Lesbii, infirmo ca
piti noxia sunt. At uina austeria uentriculum ro
borant, caputq; inter omnia uina minimè ten
tant: digestionē tamen in corpus nō promouēt:
quō magis fugienda tibi in syncope preheus
sunt, nō secus quā aqua. In penuria uerō uini
quod accommodū utriusq; syncope sit, et inquit quē
ex multitudine crudi succi oritur, & ei quē ex bi
le incidit, coactū uti uino, uetris aquosis, ma
gis si antiqua fuerint. Talia namq; tamen nō
ualent exsiccant, facili tamen deducunt in
corpus: quo uomine urinas præter cætera om
nia promouent. A quibus secundum locū obti
nent, quæcūq; fuluorū maximè sunt tenuia: quæ
etiam ad syncopas præcipue sunt deligenda. Est
autē syncope, præceptum uirum lapsus. Cū autē
essentia uirū, quibus regitur corpus, tum in spi
ritu, tum in solidorū corporū temperamēto con
sistat, hæc nobis, & ubi integra sunt, seruari: & ubi
corrupta sunt, ad integrum reuocari omnino
debet. At uerō substantia spiritus, ipsaq; solida
corpora, sic nobis sunt custodienda in morbis,
ut tum qualitate, tum quantitate, quoad fieri li
cet, se naturaliter habeat. Curandum itaq; est, ut
quæ substantiæ portio ab eis deflueret, hanc per ap
positionem sarcinam: quod in ipsis uerō alte
ra sit, in debitam temperiem per cōtrariam alte
rationē restituamus. Si igitur tum uacuatio, tum
alteratio sensim paulatimq; fiant, etiā correctio
utriusq; sensim administrabitur: quod munus
ad artem sanitatis tuendæ pertinet. Sin cōterit
& semel, ac magna aliquando uacuatio, uel etiā
adfectio incidat, sic sanè & efficeret morbus, &
medendi methodum ad eorū sanationē deside
rabimus. Porro animalis spiritus, à cerebro, ue
luti à fonte, nascitur. Qui partim ex inspirando,
partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat,
irrigatur alturip. At uitalis spiritus continet
in corde, & arteriis: nutriturq; tum ex aere inspi
rato, tum ex sanguine humido. Quod si natu
ralis quocūq; aliquis spiritus sit, utiq; continebit
in iecore & uenis. Virū igitur lapsus, qui qui
dem solidorū corporū substantiæ resoluæ succe
dit, in longissimis morbis subinde incidit, ani
mante ex frequenti atrophia extenuato: præ
terea in colliquantibus febribus. Qui uerō ex sub
stantiæ temperie mutata prouenit, is, uel ubi im
modicè ipsa fuerint calfacta, frigefacta, madefa
cta, uel exiecata, uel horū aliquib; copularis affe
ctus, prouenit. At alteratio spiritus, tum ex uitio
sis oritur succis, tum ex ambientis aëris malitia:
præterea uenenatis facularibus, aut animalium
quæ uirum cõticiant, uenenis. Ipsius uerō essentia
spiritus corruptio (quæ tum ob animi affectus,
cuiusmodi sunt, timor subitus uehementissim; nec
nō mæror, ira, curæ, atq; summa uoluptas, tum
ob ingentem dolorē: præterea ob plures motio
nes uigilantiss; ob id immodicam ipsius tenuita
tem, & continētū eum uisorum raritudinem,
arque adeo ante hæc omnia, ob respiratū prohi
bitum, & nutritiū defectū incidit) diligenter
corrigi postulat. Sciendum autē est, in omnibus
perturbationibus, ipsam per se ipsam moueri a
nimam: quæ nimirū in alijs actiuis functionibus
mouet etiā & ipsa corpus. Ob idq; resoluti eius

robore, utroq; motū suorū genere, si modum ex
cedant. Ergo nec rarefaciendū immodicè & ag
grauandū corpus, si spiritū retineri in ipso studeas:
sed nec quæ in eo sunt, per comesta & bibita ua
lenter extenuanda. Est etiā ad uirū robur tuen
dum, ciborū atq; potionū habenda ratio, ut sint
tum quantitate modici, tum qualitate exquisiti.
At præterea quæ inspiramus, debet esse ut opti
mè temperatus, sic ab omni corruptela & inqu
namento alienissimus. Curandū similiter est, ut
ipsa corpora solida, in quibus uel maximè consi
stere uirum substantia uidetur, sint sano tempe
ramento. Quippe ad conseruandū uirtutis ro
bur, & syncopalem accessionem prohibendam,
singulare præsidium est temperamenti custodia:
ante omnia quidem, tum principiorū: mox uerō
reliq; partium, quæcumq; in consortium
affectus, principia secum ex facili trahit. Cuius
modi est os uentriculi, quod propter exquisitum
sensum, accersit syncopas. At uerō si humores
crudi uires sua copia premant, ac propter multi
tudinē simul & crassitudinē exiguis animalis
meatus obtuant, is affectus multis nominibus
exitialis est, ac syncopeæ opportunos reddit.
Quippe succi crudi nutrire prius quā sint con
cocti, nequeunt. Quod si nec obtuant, nec one
rent, syncopen ip̄ cerē nō inferunt, sed deliquia
animi. Siquidem resoluunt egrotantes huius
modi, nisi frequenter nutrant. Sunt autē nutri
endi hi extenuantibus calfacientibus: idq; nō co
piose, nec semel. Medicamenta similiter sint ex
tenuantia calfacientia, sed moderate. His & a quo
sum uinum idoneū ab initio est, nisi tamen uehe
menter febricitant. Etenim qui laborant ex hu
iuscemodi succis, hos quonidie accessiones exer
cent, præcipueq; ad uesper, noctūq;. Qui uerō
ex tenuissimis succis urgent syncope, diuersa à
iam dictis ratione curādi sunt. Illos namq; paula
tim & assidue uacuamus. At qui sic se habēt, hos
paulatim & assidue nutrimus. Quod si uiribus
imbecillis, aliquid his uiscus plilegmonie obse
sum sit, eorū salus est deplorata: quando nec ip
sos licet assidue nutrire, sed tantū in remissioni
bus: & seruati nō possunt, si nō nutrant. Non so
lum autē extenuatis ad eum modū spiritu & san
guine solet sepe uires resolu, sed etiā facultate
expultrice per uniuersam corporis molē immo
deratius concitare: id quod accidere maximè so
let, ob retentricis imbecillitatem. Ergo nutrire,
quicquid horum inderit, est necesse: sicuti etiā
corporis summa densare, non secus q̄ priorū ra
refacere. Frigidū itaq; aërem attrahentemq;
comparabimus. Vnguenti præterea sunt affric
turi uenguent. Tum cibi nō dandi, qui nō admo
dum promptè dissoluant: cuiusmodi sunt, panis,
forbino ex alica, fructus austeri, & qui non facili
ter corruptant, uorum uirile, quandoquidem
album agrè concoquitur: gallinæ eorum, qui la
te alti sint, testiculæ, ac denique suillum cerebrū
diligenter assūm, uel in albo iure legitime elixū,
porro & anetho inieciis. In summa, omni ratio
ne agendum, ut & succorum materiam crassio
rem reddas, & cutim denses, & exhalationē inhi
beas. Vinum uerō ipsū aquosum, necessarium
inter inrita est, sumptum post cibos. Quod si ex

*Virum robore
custodienda qua
reguntur.*

*Syncope ab ore
resoluitur etia,
curatio.*

*Vires resolu
etiam ob excre
tionem rem im
modicè comesta
tam.*

*Vires imbecil
liores resolu ab
excretionem ma
teriam crassio
rem, quando res
soluitur.*

*Albucum uerū
agere concoquit.*

sententia nobis omnia responderint, etiam car-
nei ipsa aliquid nutrimenti post alia dabimus, po-
tissimum post quartum diem, si febrem exci-
tauerunt, iam ad concoctionem venientibus. In
omnibus autem eiusmodi curantionibus, si iam ad-
sit syncope, omnis sollicitudo medentis ad sym-
ptomata vertetur. Sin expectetur, utriusque curam
habebit, & ut symptoma non incidat, & ut pau-
latim discutiatur morbus: quem celerius discute
remus, si nullus symptomatum subesse metus.
Quippe qui multitudo crudi succi grauius, hūc
si modum iustam semel uacuationem ferre possit,
nec metus aliquis syncopes impenderet, semel
arbitror, uacuatū explicaremus i. a morbo. Eum
verò cuius spiritus & succi facile exhalant, si an-
te accessionē cibare nō cogitemur, longiorem
illi morbum certē non redderemus. Sunt & aliæ
quing. occasiones quibus succedunt syncopæ:
nempe dolor uehemens, uigilia, immodica uen-
tris inanitio, motus in delirantibus, ac denique
principiorum intemperantia, uel nuda, uel cum
humorum affluxu. Si igitur causam ipsam unde
excitatur dolor, adimere possis, ita ungo contra
symptoma non pugnaues, sed curaueris agri-
tudinem. At si quā occasione prohiberis, affe-
ctus submouendo intentum esse non licet, uehe-
mentiam mitigabis doloris. Dolent porro tan-
tūm particularē sensibiles, idē uel ob continuata-
tis diuorū, uel ob aliquam alterationē, nō sen-
sim, sed confertim & uolenter factam. Quippe
uidentur corpora, nō solum cum in non natura-
lem habitum confertim aguntur, tristem muta-
tionē sentire, sed etiam in ipso ad naturalem sta-
tum suum redire, nisi in sensum fiat, torqueri. Ac
ex alterantibus quidem dolore afficiunt, omnia
uehementer calfaciētia, atq; refrigeratiā. Ipsam
autem solutionem cōtinui, ne cēse uel in ruptio-
nem, uel cōtusionem, uel erosionem existeret. At
ruptio ex diffinitione quadam, confusio ex gra-
uante aliquo, erosio ex mordente prouenit qua-
litate. Ergo cum nihil extrinsecus sit, quod uel
distendat, uel grauet, uel erodat, sed ex seipso ho-
rum aliquod corpus sentiat, neminem latere po-
test, distentionem ab aliqua intrinsecus subitan-
tia, quæ multitudine sua corpus se continens di-
stendat, aut immodica ficietate, prouenire: con-
tusionem, ex eo quoddam corpus occurra-
rit extrinsecus, quod uel durum, uel magnū, uel
grauē, uel simul ambo extitit: erosionē uerō, ex
succo aliquo, cui mordens natura inest. Qui qui-
dem si sit in tunicis intestinorū imbibitus, com-
modissime hiera pica expurgatur. Quod si ali-
quam exulcerationē pepererit, nutriendus cer-
tē arget esse calente alia, fed insectis mali punci
graminis. Porro autē illi offendentis est, mali punci
cremor. Porro si sanguinis abundantia sit qd di-
stendit, protinus sanguis mittendus est, modū ui-
res agri non sint infirmæ. Sed si uel in sanguinis
missionē timeat, uel uiribus sit imbecillus, tum
reuellendus in diuersum est sanguis, tum per pro-
pinquā deriuandus. Quod si per se peractis dolor
etiā persistat, patet proleto in agrotante particu-
la impactū esse quod cōstiprat. Patet uerū nō mi-
nus, & quod cura non ipsa per digerentia medica-
mēta mouenda sit. Similiter etiā curant dolores

à flatulento spiritu orti: magis tamē ij extenuan-
tia remedia desiderant. Si moles aliqua grauan-
do, contundendoue dolorē excitet, moli ipsi est
medendum. Sin mordens humor, aduersissima
huic sunt, quæ extenuant & calfaciunt. Postulat
namq; huius generis affectus, ut ea quæ cōstipant
uacuent, aut alterent, aut medicamentis torporē
inferentibus retundant. Et quippe minus hos
affectus lædūt, q̄ alius, qui à crassis glutinosiss
humoribus proficiunt. Huiusmodi tamen suc-
cos, dolor uehemens nō comitatur, nisi aliquis
eis halituosus spiritus copuletur, qui ex ipis cor-
poribus quibus cōtineretur, eripere prorsus non
possit. Nam sic, grauissimi solent excitari dolo-
res. Etenim cum tunice intestinorum sint dupli-
ces, si in medio ipsarum spacio frigidus ac uisci-
dus humor collectus sit, à calore liquatus in fla-
tulentū mutatur spiritum: qui crassius frigidusq;
cum sit, acerbissimos dolores inducit. Ac ad tē-
pusquidē, post bibiti medicamen stupefaciens,
prorsus indolentes reddunt agri, exterius affe-
ctus ips uariis modis fit maior. Nam & intesti-
norum tunice medicamentorū frigiditate densio-
res, minusq; statim transmittūt habiles reddun-
tur: & humor ipse tum crassior, tum ad motum
ineptior euadit. Quare id genus dolores omnes,
per ea quæ incidunt & concoquant, præterea
status discutiunt, desiccantq; citra ualentem
calfactionem, curandi sunt. A nullo autem in e-
iusmodi succis tam est merendum, quam à calo-
re qui & eos liquet, & in statum uertat, sed nō
ualeat discutere. Porro agrestis quidam, alio co-
mesto, uinoq; ad uesp̄ā meraciori bibito, à dolo-
re colico fuit liberatus: negi id iniuria: allium
siquidem statum discit, ac minime sitim infert.
Quamobrem ipse allium theriacem agrestium
appello: estq; cōmodissimum ipis omnibus, qui
regionem frigidam incolunt. Quos igitur ex su-
pradicta causa uehemens intestinorum dolor ci-
tra febrem exercet, ips & allium esse licet, & the-
riacem bibere. At si cum febris uel talis dolor ali-
quando incidat, principio quidem, id sit ferunt,
fomentum siccum ex milio adhibendum est. Si
ab hoc non quiescant, semen aliquod, quod fla-
rum dissipet, in oleo quod tenuium sit partium,
coquere, mox per lintē, quod purum sit, oleum
colare, dein anseris, aut gallinaceum serum, nec
salum, nec admodum uetus, in ipso oleo liqua-
re, & per sedem infundere oportet. At si neq; ex
hoc remittant dolores, secundū rursus inhiēndū
est idem, adiecta etiamnum castoreo & pa-
paueris succi, utriusq; fabæ non amplius magni-
tudine. Olei uerō hēmina modus esto. Excipitur
& lanula ex hoc medicamento aliquod: quæ ap-
pensā forti filo, quam penitissimē in rectum in-
testinū inferi debet, quod utiq; & cum liber, in fa-
cile recipiatur, & euidentē utilitatē cōferat. Simi-
liter & oculorū, & aurium dolores, qui ab infēdo
causis in febris excitant, sedare conueniet fomen-
to ex milio. Sed infundimus etiam auribus me-
dicamentū id qd ex castoreo & papaueris succo
conficit, sapa liquatū. Quod sanē auri instillatū,
oculorū etiam ac dentū dolores lenit. Jam uerū
si cataplasma imponi aliquod res ipsa suadet,
papaueum capibus in aqua coctus, ac farnigretū,
uel

Doloris à flatu-
lento spiritu or-
tis curatio.

Doloris à mor-
de humoris oris,
curatio.

Intestinorum
tunicas esse do-
lentes.

Strophacenta
medicamentū
obstruens quā-
dam dolorē, esse
tamen tamē ma-
iorem reddens.

Dolores intesti-
norum à crasis
succi proleto, esse
tamen tamē ma-
iorem reddens.

Allium agrestis
tunc dolor colici
allium statim di-
stendit.

Theriacis quā-
dam dolorē
cui sit suauissi-
mus, curatio.

Colici doloris
cui sit suauissi-
mus, curatio.

Postquam confectū
de modis ad in-
hiēndū dolores
colicos.

Dolores oculorū
& aurium quæ
ratione leniun-
tur.

Auribus instil-
latum medica-
mentum ex castoreo
& papaueris
succo conficitur.

Dolores mor-
de cataplasma
optimum.

Syncope quibus
succedat causæ.

Doloris causa.

Solutio cōtinui
quæ complex sit.
Ruptio.
Contusio.
Erosio.

Distensio sponta-
nea unde ac-
cidat.
Contusio
causa.

Erosio unde fiat

Hiera pica ex
purgat humores
acris tunica in-
testinorum im-
bibitus.
Distensio quæ
in milio conue-
nit.

Distensio in
sanguine cap-
ta.

Ruptio fieri
posse in cōtusionē
modum.

Distensio sit
per propinquā.

*Opium recipiunt
ita collyria, re-
benedictissimi ocu-
lorum dolores la-
uant, tamen
imbecilliores ex
frigida ipsi
recompungunt per
tactum.*

*Cucurbitula
admodum, ab ipso
a flatu excita-
tum folet.*

*Rumorem o-
culi an exhiberi
qui dolor colli-
cum a frigida sit
ex ortu, deterio-
ret.*
*Doleris a tenui
humore excita-
ti curant.*

*Consuisiones a
plenitudine qui-
dem a frigida, cura-
ri possunt: a ner-
uorum autem
partium aridi-
tate, minimis co-
rationis admi-
tunt.*

*Phlegmonem ge-
nerant.*

*Phlegmonem ge-
nerant curant.*

uel hordei, uel lini seminis farina aequè immixta, cataplasma conficiunt. Porro collyria ex opio cōfecta, uehementissimos oculorum dolores laxant: utendumq; his est, cum maxima necessitas urget. Nam tamenq; imbecilliores ex frigida in reliquam uitam ipsas reddant particulas, occurrunt tamen praesenti discrimini: ac postea frigida tatem ab opio relictā, licet nobis corrigere, tum oleis calidū, tum etia collyrijs. Nempe auribus oleum id quod solum calorem recipit, inflatū 10 m oculis uero, ex cinnamomo collyriū. Qui a solo spiritu flauofo cruciantur, illico cucurbitula admodum, tum a dolore liberi, tum omnino sani redduntur, in quacumq; corporis parte dolor sit excitatus. Quibus uero non spiritus modò flauosus, sed etiam humor quispian, unde is oritur, uentris dolor excitat, ipsi illico ad tempus dolor sedatur: redit ramen uel in sequenti nocte, uel postidē, uel etiam tertio die similis dolor. Quare in his primū doloris accessio est curanda, admodum folet cucurbitula. Postea nauandus humor, infuso per sedem aliquo medicamento calfaciente simul & attenuante. Ego uero oleo quopial tenuis substantiae uti a siueus, ruram in eo praecoco. Quo iniecto, nonnulli xgri paulo post excernunt humorem uitreū: atq; hoc prorsus simul & a dolore, & ab affectu liberantur. Si dolor ex tenui acris excitet humorem, qui cōsuisiones uehementes etiam inducere solet: is quidem in uentriculo talis humor consistat, uomitu expellendus est, aqua tepida propinata: sin autē in intestinis, iniret per sedē oportet aliqd medicamen, quod blandē eluere, de tergereq; eiusmodi humorē possit. Cōmodissimum itaq; ad id fuerit cremor pīnise. Cibi uero excludendi hi sunt, qui & boni sint succi, nec facile corruptant. Qui ob siccitatem uehementem distenduntur, & disrumpantur, si curari q; de beant, humectationē desiderant. Ceterum si affectus is, sit febris occasione cōtractus, percuratus est difficilis, uel ponus curatione non recipit. Quippe cōsuisiones quae ex plenitudine neruorum partium, uel ex humore mordente, uel denique ex ingenti frigore oriuntur, curari possunt. Quae uero ex neruorum particularū ariditate proueniunt, uallus certē q; ad sanitatem est locus.

GALENI PERGAMENI de methodo medendi lib. XIII.

In hoc rettiodecimo cōmentario acturi de tu moribus praeter naturam, primò quidem tractemus de phlegmone, quod haec & frequenter in iudat, & febres inferat, grauissimā inducat symptomata. Gignitur autem omnis phlegmone ob cōfluxum sanguinis, copiosioris scilicet, quim pars postulet: quo tumor & obfessa particula, auctior, quim pro naturali habitu, calidior & rubicundior, redditur: tenditurq; ac tangenti renititur, cum dolore ac pulsatione sensibili. De phlegmones ramen generatione, uariū uario modo opinantur, licet ipsa curandi ratio omnibus cōmunis existat: nempe uacuatio sanguinis, in particula inflammata contenti. Ceterum phlegmones quae etiamnū gignitur, est du-

plex curationis scopus: quippe quod ex ea generatum iam est, id profigare oportet, praefidius illius medicinae pars, quae morbos curat: quod uero superest generandū, inhibendum est profusum, beneficium alterius, quam praecautrice uocamus. Porro sanguis copiosior influit, alia quapiam, aliq; particula aliquando eum mittentibus, ac ea quae phlegmone laborat & incipit, recipiente: aliq; particula quae affligitur, ipsum ad se trahente. Sanē quae mittunt partes, alia ut copia superuacua, uel qualitate molestum: aliis utroq; nomine succum propellant. Quae attrahunt, ea morbofo calore trahunt. In doloribus, incipit quidem causa ab eo quod affligitur: sed quicquid est phlegmones, id superpositae partes efficiunt. At uero tumorū omnium, qui praeter naturam sunt, uarietates, ex eius quod influit, natura nascitur. Vbi enim flauulenta materia uelior accessit, flauosius magis humor est. Phlegmones magis similes, ubi sanguis: sicuti erysipelas, ubi flaua bilis: & ordemari, ubi pituita. Similiter scierthosi, ubi uel crassius, uel uehementer lentus humor parti fuerit infusus. Ceterum crassius humor quodammodo iam melancholicus est. Lentus autem, ex glutinosus prouenit cibus. Vbi igitur particula aliqua, phlegmone uergeti cepit, uidendum est, an propter calorem aliquem, qui in illa praeter naturam sit ortus, an propter dolorem uel ipsius, uel propinque alius partis, hanc ipsam cōtraxerit, quod scilicet adempta causa, phlegmone non amplius increseat. Dein proximè expendendum est, nunquid nicina aliqua pars sanguinis largius ad particulam phlegmone obfessam transmittat. Postea uero, num totū corpus plenitudine succorū labore. Siquidem supracanea, quae expellantur a ualentioribus, ea semper in imbecilliores procumbunt. Vnde accidit, ut glandulosa corpora, imbecillima omnium cum sint, facili fluxiones ipsas recipiūt, tum moribusq; praeter naturam (quos bubones appellant) celeritē corrumpant, cum aliis, tum uel maxime, ubi propter magnā artem alia uenam, fuerit ulcus aliqd ortum. Quod si scierthosior earum partium phlegmone aliquando fuerit, haec & curationi renititur, & struma uocatur. Ergo si uel totum corpus plethoricū sit, uel prauo succo redundet, difficilis bubonum curatione redditur. Sin sanum planè sit, facilis. Quippe ex calfacere & humectare modicè totum membrum, quod dolor mingetur, oportet: lana quidem imbuta calente oleo, id circundantes: ipsi autem ulceri tetrapihramac liquorum oleo rosaceo, calidum, aut etiam Macedonicum pharvacum (quod solo flure tetrapihramaco praefat) ex luicinio imponentes: atq; insuper calidum cataplasma ex farina uel hordeacea, uel triticea, uel ambabus, aqua & pauulo olei cōfusa constans, extrinsecus applicantes. Non secus uero ipsi adeni, qui phlegmone urgeri cepit, prima quidem die imponi debet lana oleo calente madefa, sed atra sale. Cuius postea nonnulli indemus, ubi & tumor per totū membrū remissus fuerit, & uiscus dolor sedatur. At si uel plethoricum corpus sit, uel uitioso succo redundet, curatione per ea quae sic calēt, fluxionē ad mēbra citat:

Tumorem praeter naturā uarietas pro differentia flauoris humorem nascitur.

Phlegmonem ex calore quae sunt consideranda.

Supracanea capilli semper a fortiori ad imbecilliores partes colant.
Glandulae corporis maxime ob noua fluxionibus.

Struma quid.

Robore curatione.

cogimurque aliis sanguine mittere, idem aut uena incisa, aut membris ips, quæ læsa nō sunt, scarificatis. Manu etenim laborante, scarificabis crura. Altero crure malè habère, reliquū. Has namque uacuationes indicat ipsa copia: sicuti etiam succorum uitium, redundantis succi purgationē. Sed quæ etiam græcè dicuntur phymata, glandulæ, sicuti fluxio in eas procubuit, citra ulceris occasionem accidunt. Vbi ergo distent uelementer glandulæ sunt, aut alia quæuis particula, quæ premit phlegmone, cogimur, toto corpore prius uacuato, ipsam scarificare. Sane uacuamus totū corpus, etiam cū mediocritatem succorū continet, si morbi magnitudo id suadeat. Siquidem dolor, & membri inflammatio calor, etiam si purum ab excrementis sit totum corpus, fluxionis causæ sunt. Tunc tamen parcius uacuare expedit: idem habita ratione ætatis, nature, anni temporis, regionis, ac denique consuetudinis ipsius ægrotantis. At ubi iam phlegmones ipse ueluti feruor subleuit, mitigatoris emplastris dimissis, ad ea quæ digerunt, paulatim est transeundum. Ac primū cum mingatoris ipsis paulū mellis miscendum. Mox triticea farina in totum est auferenda, contentus hordæcea cum melle uberiore. Deinde ad aliquod eiusmodi digentium medicamentorū ueniendum, quæ uel humida consistētia sint, uel cerati specie. A duris autem est abstinendum: nam & phlegmonarū reliquias contrahunt, & rursus phlegmonem in ægra particula exciunt. Quod si pus aliquod notabile in suppurante particula sit contentū, non expedit incidere protinus, sed digestionem moliri medicamentis ad id ualentibus. Cū autem quod ex phlegmone ipsa relinquitur, scirrhiosum effectum uideatur, fidenter iam ualentibus medicamentis uideris. Si quid ergo ægram partem medicamentis acrimonia irritatam uideris, mitigabis eam interea fomento, quod per spongiā administrabis. Id autem aliquod ex aqua dulci esto: aliquando etiam sal habente, ubi scilicet scirrhiosiores sunt phlegmones. Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea uideantur tibi totum digerere posse, quod sic abscessus secare, eo potissimū loco oportet, quo est editissimum: obseruata interim effluxus indicatione: quippe tenuissimam illic etiam cutem inuenies. Post sectionem uerō, medicamentū aliquod, eorum quæ sine morfu siccant, impone. Quod si cōpugnasse portio aliqua suppurantis partis uidebit, excidi eam est necesse. Sectio igitur quoque itemur in suppurante particula, myrti imitetur folium, sitque planè nō magna: quali nos semper cōtenti sumus. Ceterū cum in tali incisione longitudo maior quæ latitudo sit, esto in inguine longitudo per transversum ducta, nō autem per rectitudinem membri. Quippe ita dum membrū inflectimus, naturaliter cū sibi applicatur. Post excisam cutem, medicamentum, quod mannā uocant, affectum parti implebimus. Est enim ea purgantior thuris, leui astrictione predata: quo nomine etiam thure ipso ad nonnulla utilior. Thus siquidem puris tantū mouendi facultatem obtinet, utpote nullam astrigendi uia habens. Magnis id facit, quod pinguis ex eo

est, & magis albicans. Sicuti quod magis est flauum, potentius siccant. Mannæ uerō, etiam corticis thuris paululum est admixtum, unde astrictionem um habet. Ipse autē cortex thuris, tum astringit, tum siccant insignitior. Itaque eo solo utimur ad sanguinis perfusiones. Quinetiā mitigare prius incisionem parit oportet, fomentis primū, dein cataplasmate, mox humectante aliquo medicamine, aut sic siccant, singulis scilicet extrinsecus imponis. Nam in ipso ulcere tum mannam, tum pus mouentia, dein quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ si cauitas enata nō sit, quæ impleant adhibenda sunt. Sin minus, ea quæ cicatricē inducant: ueluti quod ex cadmia efficitur. Vendū uerō medicamentis id genus est prius, quod ulcus ad æqualitatē prorsus impletū fuerit, ne ipsa forte cicatrix circūposita sit cute eminentior. Porro ubi æqualiter inter se succi omnes sunt aucti, plethora, siue plenitudo in affectus uocatur. Vbi uerō uel flaua bile, uel nigra, uel pituita, uel ferolis humoribus repletum corpus iam fuerit, cum habuit cacochymia uocamus. Ergo plethora tum sanguinis missione curatur, tum balneo frequenti, tum exercitatione, tum frictione: præterea digerentibus medicamentis, atque etiam inedia. At succorū uitium, purgatione, quæ redundantis succo sit accedens, corrigitur. Ceterum si iam æger febricitet, nec exercitatione uacuare licet exuperantiam, nec unctione quæ calefaciat, sed nec multa frictione, nec balneo: imò sanguinis missione, nā cum inedia, uel purgatione aliqua. At si non febricitat, omnibus iam dictis utare, optimum quodque ad id quod infat, deligens. Verum cui crura laborant phlegmone, ambulatione uel cursu exercitandus non est: sed nec stare iubendus. Satus quippe est, ut sedens fricetur plurimum, moxque manuum motu exerceatur. At si quæ ex supernis partibus urgeri uideatur phlegmone, huic motus ex inambulatione aut cursu est admodum salutaris. Similiter & frictio ea tunc potior est quæ cruribus adhibetur, illis quæ in supernis partibus administrantur. Siquidem in omnibus talibus reuulsio debet fieri in contrarium. Neque igitur cū uel circa sedem, uel aliquā huius partem uicinā, initium phlegmones incidunt, alium deiciis. Neque cū in uenis, uel coele, uel renibus cepta est, plasmata quæ urinas pro uocent, bibenda dabis. Nec si mulieri in utero, uel pudendo infedit, menses huius pro uocabis, sed ad paries quæ maximè longinquæ sint, semper reuulsione molieris, estimata tum phlegmones magnitudine, tum corporis totius statu. Nam si plurima succorū abundantia sit, nec exercitatio, nec balneo sine periculo utare. Sin exigua sit, licet & per hæc uacues. Iam uerō, si phlegmone oborta sit ab affectu partis quam uexat, primò quidem affectus ille sanandus est: mox quicquid ex phlegmone est genitum. Quæ ambo interim si idem prædixi rollant. Ceterū ad incipientes phlegmonas, frigidis astrigentibus magis utendum est, quā in iis quæ digerunt: atque etiamnum magis, ubi crassum quod confusit non est. Sed si sanguis in inflammata particula uehementer impactus fuerit, nō est amplius utendū repercutientibus.

Manu laborante
scarificanda esse
crura.

Crure altero
affligito, reliquum
scarificandum esse.

Phymata.

Phlegmone effluas
particulas
quando scarificare
cogamur.

Vacuare quando
solum corpus
purum, etiam si
mediocritas sit
corum continet.

Variis causis
sunt dolor et
membra calida.
Phlegmones
quod si digerunt.

Phlegmones
curantur adu-
sari data medi-
camentis.

Si legem non
suppurant non
esse incidendum
propterea, sed di-
gestionem medi-
camentis ad id
ualentibus.

Abscessus quan-
do serandus sit,
et quia in par-
te.

Sectionis forma
qualis esse de-
beat in suppurante
particula.

Inguine suppu-
rans sectionem
per transversum
esse faciendam.

Manu thuris
habundans esse in-
flammatam esse
Thuri puris mor-
uenda idcirco
nullam astrigendi
uiam habent.

Thuris cortex
astringit et sic-
cant.

Deiciis partes
esse aliquas sunt
in circa iniectione,
non laetandis.

Vleeris in parte
felle relicto con-
tariis.

Cicatricis indur-
centibus medi-
camentis reman-
entem esse prius,
quam totum ul-
cus propriis im-
pletum fuerit.

Cacochymia
quod.

Plethora con-
tentis.

Cacochymia
corrigitur.

Crura phlegmo-
ne affligit quomodo
sunt curanda.

Phlegmones su-
perioris partem
quomodo sit curanda.

Reuulsio debet
fieri in contrarium
uersu partem
pariem, quæ phleg-
monem uocat.

Phlegmones in
parietibus prius
destruendi sunt
et aliter
magis quam
digerentibus
medicamentis.

Phlegmones
quod si digerunt
de his dicitur
de.

Phlegmones à
punctis mori-
bus animalis cute
suscitantur.

Virus à bestia re-
lictum, quod re-
suscitantur.

Medicamentis
variis pro la-
borantium par-
ticularum diuer-
sitate.

Erysipelas co-
rati.

Refrigeratio-
nis in phlegmo-
ne.

Cassationis
modi dolorum
solandi, et circa
ta in parte infla-
mata digerendi.

Hepatis inflama-
tio curatio.

Pueri fistulam
vena non ferit.

Sanguinem va-
riam et reuelli
ab hepate, sic
interna dextri
cubiti vena.

Vena interna
non apparet,
modum aut in
meralem fissu-
lam efficit.

Resoluitio effi-
caciolam quon-
longissime à tra-
cata fluxus par-
ticula.

cutientibus: sed tunc digerere est tempestiuum. Quod si ex animalis punctu moriatur dolor incidit, à quo exorta sit phlegmo, duplex finan di doloris ratio est, uel virus ipsum uacuandum, uel quod dolere excitat, alterando. Ac uacuabis san- ne id, eorum medicaminū ope, quae uelementer attrahunt: alterabis ita quae sunt contraria. Vacuant itaque tum calidissima omnia, tum quae à de circa calidiorē alliciunt: ut cucurbitulae, & cor- nua quaedā. Sunt qui & ore suo virus extrahant. Huc pertinet & cauterii, & medicamenta quae cauteris similiter elicham efficiunt. Alterū auxiliorū genus est, eorum, quae qualitate per con- traria alterant. Variant autem medicamenta, pro laborantium particularum diuersitate. Vna quippe indicatio ex similibus sumitur parti- bus, altera ex instrumentariis. At ea quae ex simi- laribus sumitur, modum calidissimi, refrigeran- di, siccandi & lumentandi determinat. Quae uer- o ex instrumentariis, tum locū ipsum, per quem uacuare oportet, tum uacuacionis rationē, tum uerō in similibus specie medicamentorum usū ip- sum pluris minorisq; modum. Porro uacuacionis indicatio in phlegmone, refrigerationis indi- cationem uincit, contra igitur in erysipate. In hoc namq; refrigerationis indicatio magis urget, q̃ uacuacionis: etsi ubi refrigeratū erysipelas est, ad ea quae digerūt medicamenta cōuertimur. At in phlegmone tantisper refrigerandum est, quate- nus & ad incrementū eius sūuendum, inhiben- dumq; est cōmodum. Quippe refrigeratio reper- cutit id quod affluit, & ex eo quod in laborante conuenit particula, aliquid in proximas partes repellit. Simili modo & quae modice exalciaciūt, utraq; interdum ratione profunt: quod & dolo- rem sedant, & cōtenta in parte agra digerūt. Si- quidem mitigando dolore, augeri phlegmonas uentat: digerendo, quod eā iam conceptū est, sanant. Si iecur inflammationē contrahere cepe- rit, ac totū corpus egeat inanitione, uirtusq; ual- ida sit, atq; uerget pueritatem attrigerit (puer enim, quae per dissecatam uenam fit uacuacionem non feret) pariter tum reuellendus, tum educendus, qui ad ipsum fluit, sanguis est, interna in dextro cubito insecta uena: propterea quod & directio, & ampla uia, cum uena quae caua dicitur, so- cietatem habet. Hac nō apparente, media secan- da est. Quod si nec illa se ostēderit, reliqua & ter- tia incidenda uenit. Ac modum quidem uacuacionis, ex redundantiā modo, & tate, natura, ani- mi tempore, regione, consuetudineq; atq; ante haec, ipsa laborantis uirtute, inuenies. Venae au- tem secandae electio à parte laborantis indicatur. In uniuersum autem, q̃longissime à tenrara flu- xione parte quod redundat reuellere, nequaquā ad eam trahere, conuenit. Hac ratione, nec si he- par, aut uentriculum, aut intestina phlegmone occupare iam ceperit, medicamine quod aliū deiciat, iam conuenit. Eandem cum his indica- tionem & uteris forsitur, sicuti cum urinae uasid- uenda. Ad uomitu ipsi pudibundis laboranti- bus, in diuersa reuellens auxilium est. Eadem ra- tionem in omnibus quae circa caput accidunt, alii subductio iis contrariis avertit. Si qua uerō cir- ca fauces, & palatum, aut linguam, aut denique

in ore phlegmone laborare ceperint, in his om- nibus cauenda sunt, quae pituitam per os euo- ciant, Graeci apophlegmatismos appellant. Sati- us namq; tūc fuerit deriuare ad nares, incidereq; hu- meralē in manu uenā: uel, si ea nō cernitur, me- diam. Vbi iecur, pectus, pulmo, aut cor sic affici- untur, internū. In angina primas in manibus: secundas eas quae sub lingua habent. At ijs quae in occipite sunt afflicti, enā eam quae in cubito est, necnon eam quae habet in fronte. Renibus uerō, & uelica, & pundo, & utero sic habenti- bus, eas quae in cruribus sunt, ac potissimū quae sunt circa poplitē. Sin minus, eas quae sunt iuxta malleolum. Ac perpetuū quidem in omni- bus, eam quae ē directio est. Vbi iecur phlegmo- ne inuadit, quae in dextra sunt manu ubi lienem, cōtra. Itaq; itam prima uacuacionis diuersitas pro particularum diuersitate uariatur: constans cōmunem, quod sit uacuandum, indicationem, nō magis esse utilitatis quā noxae causam. Por- rō ubi pectus, aut uentriculus, aut partes circa col- lum caputq; laborant phlegmone, etiam exco- gitatū est artus uincire. Quippe ipsum quod in- festatur phlegmone, haudquaquā uincendum est. Sed si in manibus sit phlegmone oborta, crura. Sin in cruribus, manus. Iam uerō nec refrigerare inter initia, aut astringere, circa laborantis parti- culae indicatio nem, utilitatis magis quā noxae sunt causae. Nam particulis quidem quae iuxta ar- tus sunt sitae, tūto ministrare possum frigidam ali- quam fomentationē. Iecinori uerō, si phlegmo- ne infestari ceperit, non licet imponere actū frigi- dum, aut fomentum, aut cataplasma. Rursus astringens oleum, nec oculus, nec oris partibus admouebis, sicuti huc tentari phlegmone cepe- rint. Auri uerō, etiam si acetum cum rosacco in- fundas, nihil offends. Victus etiam pro parti- ratione uariatur. Quippe ijs quibus glandulae, aut aliquid circa artus tenet phlegmone, tor & talia exhubenda sunt, quot & qualia si ciliē com- coquent. At si iecur nentriculusue infestet phleg- mone (cū manus eorum sit toti animali cō- mune) uisū exquissimū est opus, qui uidelicet meatus aperiat detergearq; circa ratiōnē, ac breuiter omnis tenacitans sit expertus: qualis utiq; in cibis est pīnsa, & in pharmacis oxyme- li, aqua distemperatū. Ceterum dulcibus omni- bus tum iecur, tum lien intumesceat. Iam uerō a- stringenda omnia, mala icinoris phlegmonis sunt incōmoda, praesertim ijs quae in cauo eius consistunt. Similiter ea quae mordent, phlegmo- nas quae in cauo sunt uisceris, ijs quae in gibbo cō- sistunt, magis irritant. Iis quippe quae in gibbis sunt, murata iam ueniūt quae à sumpta fuerūt: & quod prius concocta sint, & quod sanguini, qui in icinore prius erat, admixta. Cauo autē icino- ris phlegmone obfeso, protinus etiā uenas quae in mesenterio sunt, unā phlegmone laborare est necesse, cū ex uena portae exoriant: proinusq; etiam, quae cunctae osculus earum incidunt, uim suam ostendere. Porro ubi iecur phlegmone ob- fessum est, medio critere astringi per cataplasma- ta mixtae materiae debet, quod altissima facultatis principii animalibus sit, & uenofum ab hoc exo- riatu genus. Vt autē icinoris cauum per aliū

Apophlegmati-
smos singulis et
fissis partibus ar-
tus uelocitate.

Phlegmone cor-
pore uel parti-
culis diuersis
modis ad uenarū
q̃ secundaūque
humeralē in ma-
nu uenam, aut
mediam.

Vena secunda
ratio in uenarū
pulmonarū, pec-
toris, uel uenarū
occipitis, renium
regulae quod uel
q̃ uenae afflicti-
bus.

Vincula non ef-
ficacissima in-
flammasa parti-
culae, sed illa quae
opposita est.

Iecinori si phleg-
mone infestari
ceperit, nihil a-
ctū frigidum ef-
ficacissimum

Auri inflama-
tio ubi nō uenit,
vel aucti et ro-
sacco infundens.

Victus pro par-
ticularum ratione uo-
ratur.

Uiculus iecori uē-
triculusq; inflama-
tione conuenit.

Ductus in cau-
em iecoris tum iecur
tum lien.

Cauo hepatis
phlegmone obfeso,
venae mesen-
tericae similiter
inflamantur.

Iecur phlegmone
obfessum, tor me-
dicamentis astrin-
gendum sit, per
cataplasma mixta
materia.

Hepatis partes
per quas transit
quibus purgan-
da remedijs.

purgatur, sic gibba eius, per ea quæ modicè urina-
re movent. Cuius generis apilum exurit. Proce-
dente autem tempore, ubi phlegmone iam con-
coquitur, etiâ ualentioribus un licet: ut asaro,
Celtica nardo, phu, petroselino, smyrno, & meo:
sicuti etiam per uentrem uacuare, si cauum affici-
tur, cnico cibus admitto, & urtica, & mercuriali,
& epithymo, & filicula: omnibus præterea quæ
modicè alium deiciunt. Magisq; in remissione
nibus, tum his ipsiſ auctius quam antè utendū:
tum uerò quæ iſ sunt ualentiora, partim in ptiſa-
na incoctis, partim tunſis, ac in molliſſimum
puluerem redactis. Exhibenda uerò & hæc ſunt
uel ex ptiſana, uel ex aqua. Ego namq; etiam fili-
culæ aliquid in ptiſana aliquando incoxi, & nigri
ueratri cornem. Sed clyſtere etiam ipſos uacu-
are expediet: inter initia quidem, uel ſale, uel
nitro, uel aphronitro cum muſſa diſtemperatis
contentis: in remiſſione uerò, potiſſimumq; ſi
quid ſcirrhoſum relictum eſt phlegmone eſt,

Hepati obſiſſe
phlegmone qua
in clyſtro conue-
niat.

Quippe hyſſopum eo caſu aque incoquimus, &
origanū, & colocynthida, & minus centaury.
Opportunifſima namq; ad ſcirrhū ſunt iecur,
lienq; ſi quis, parum habita de his ratione, glu-
tinofis cibus urat. Etenim ſubſtantia lienis, ram-
eſt rarior quam iecinoris ſit (eſt enim illis ſub-
ſtantia luſa) crebris ramè ſcirrhoſis uiriſq; af-
fligitur, propter nutritiōē, quo altius, ſpeciem.
Siquidem craſſo nutritur ſanguine, qui ueluti lu-
mus purioris eſt, faciliſſimèq; nigra bilis eſſicitur.
Renes etiam facile ſcirrhū deprehendi, atq; id-
circo nephritidas alias omnino ſolui non poſſe,
alias ægrè ſolubiles eſſe, ratio docet: cūm & craſ-
ſa ſubſtantia ſint, & nō careant excrementorū ul-
tio. Quo ſit, ut qui craſſi fucci cibus uſeunt, cal-
culi uitio uexentur. Medicamina igitur horū af-
fectuum ea eſſe conſtat, quæ diſſecent, diſſoluūt
& frangūt: quæ utiq; ex eorum ſum genere, quæ
obſtructiones eruant atq; detergent: ceterū ui-
ribus ualentiora. Curationē autem unā coincidant,
uirtus, natura, ætas, anni tempus, regio deni-
q; coſuetudoq; iecinore itaq; laborante phleg-
mone, quæ extrinſecus applicant, ea miſtæ eſſe
facultatis eſſe debent: idq; non in generatione
phlegmones modò, ſed etiâ cūm nec aſſuit am-
plius quicq; nec repelli quod in laborante parti-
cula cōtinetur, poteſt. Quo quidem tempore du-
plex nobis indicatio ſuggeritur: altera quidem à
phlegmone, ſui euaporationē poſcente, nimirū
digerentia: altera uerò ab affecta parte, quæ per
aſtringentia robur eius ſeruari iubet. Quare coē
uinitus unā contrarijs in dicationibus, compo-
ſitum quoq; eſſe medicamentū oportet: nempe
aſtringens ſimul atq; relaxans. Verū tuendi ro-
boris indicatio, in iſ tantum partibus eſt cōmu-
nis, quarum munus ex uſu eſt uniuerſo corpori.

Calculus que ſe-
leant gignere,
Calculusque me-
dicamenta con-
gruant.

Hepatis inflam-
mati curatio.

Igitur nec lienem tantū relaxantibus curare o-
porteret, cūm hic quoq; ex iecinore quicquid limo-
ſum & melancholicū eſt expurget, propterea ſci-
licet, quod ex eo humore nutritur. Idcirco quo-
ties obſtructio aut phlegmone, ſed præcipuè ſcir-
rhoſis, in eum incidit, tum ea quæ obſtructiones
eximant, tum quæ diſſecent, uehementiora exi-
git. Nam quale medicamentum iecinori adſyn-
thium eſt, tale eſt lienī capparis cortex. Quale
rurius iecinori eſt eupatoriū, tale ſcolopendriū
lienī. Siquidem ſimilia genere medicamēta, quæ-
admodum & nutrimenta, ambo uifcera poſſunt:
ceterū tantò ualentiora & acriora lienī,
quantò craſſiore uinitur alimento. Iam uerò cūm
gibba iecinoris expurgari per renes oporteat, ſi-
cuti cauſa per in ſuperiorem uentrem: lienī ſanè per
renes nulla adminiſtrari poteſt uacuatio, ſed tan-
tummodo per inteſtina. Proinde ubi phlegmo-
ne premiſ, deſectorijs ipſum medicamentis tum
detergemus, tum laſcuiſſimus, quò demittat de-
ponatq; ſuperbius. Eſt autē duplex ratio euſmo-
di medicamentorū uſus. Nempe, ubi partes ſupe-
rius ſitæ laborant, per ea quæ edunt bibunturq;
cūm inferioris, per id quod ſit per clyſter in-
fuſum. Quando quidem quæ eduntur ac bibun-
tur, eorum uia, anteq; ad inferiores partes perue-
niat, reſoluitur. Quæ inſuſa ſunt, ea omnino ad
ieciunū uſq; aſcendere nequeūt. Porro gula (quæ
ſtomachus propriè uocatur) affecta, cataplama
ta ſuper dorſi ſpinam imponimus: nō autē in an-
teriori parte: quod facimus, ubi phlegmone os
uentriculi urgetur. Siquidem ſpinæ gula ſupe-
riat, per collum & pectus deorſum uſq; ad uen-
triculum exporrecta. Iam quemadmodū lien &
iecinoris cauſa, per inteſtina: gibba illius & renes
per urinas purgati: ſic pectus, ubi interna uia
tentatur phlegmone, per ſuccingentem mem-
branam, aliquid in mediū ſui pulmonumq; ſpa-
cium tranſmittit. Id autē expurgari per eandem
quæ pulmo uiam debet. Propinqua igitur iſe qui
ſic aſſiguntur, ſunt, quantum quidē ipſa inualeſcit
phlegmone, medicamēta quæ mediocriter uias
aperiant, & craſſos humores diſſecent: ut ptiſa-
na & muſſa: in exquisita autē declinatione phleg-
mones, dum educi iam excrementa poſſunt,
quæ id ualentius moliantur: ut urticæ ſemen, &
muſſa, in quam huiſ coſiectum paululum acrium
herbarum: quales ſunt, organum, hyſſopum, ca-
laminthe, pulegium, & ſilyrice ieros radia. Oxy-
meli etiam quod ex maribus coſſicetur, craſſo-
ra pectoris pulmonib; excrementa incidere po-
teſt. In uniuerſum autē quæ in alio corpore aſſi-
guntur phlegmone, ex partes paulò acriora, q̄
pro phlegmones natura, medicamenta deſide-
derant. Reſoluntur ſiquidem eorū uires, dum
altè deſcendunt. Hac ratione & cucurbitula (ſtre-
nuum planè auxilium) eſt inuenta, tum ut foras
euocentur quæ ſunt in alto, tum ut eximantur &
eruantur, quæ iam in ſcirrhū abeunt. Verū
uten dum cucurbita in ipſa parte quæ phlegmo-
ne urgetur, inter initia non eſt, ſed poſteq; uni-
uerſum corpus uacuaueris, *atq; ex uſu iam eſſe
uideatur, eorum quæ in inſiſſimata particula con-
tinentur, aliquid aut uacuare, aut uerſus exteri-
ora reuellere. Proinde ubi affectus *etiā in uia
in generatione conſiſtit, minimè ipſis membris
quæ laborare incipiunt, ſed iſe quæ continua hiſ
ſunt, cucurbita imponi debet, auellendi in cō-
trarium cauſa. Sic namq; ad mamillas cucurbitas
imponimus, cūm ſanguis ex utero profluat, de ſi-
uo maximè in ipſis cōmuniſ pectoris & uteri
uſis, iſis ore. Sic ſi eſt narius ſanguis profuſus
dicitur, præ cordijs maximas cucurbitas aſſigimus.

Sic &

Lien hepatis ſi-
milis naturam
ta q̄ medicamē-
ta requirit.
Lien et alij
uicem alacritas
quæm hepar.
Hepar per quod
renes uacuatur.
Lien per inteſti-
na uacuatur.

Chylus non poſ-
ſe ſiſ ad iecunū
aſcendere.
Gula affecta,
cataplama iſe
applicandū ſuper
ſpinam dorſi.

Pectus per quod
renes purgan-
tur.

Pectus phlegmo-
ne obſiſſe quæ
medicamenta co-
muniſ.

Inſtammatio
altius ſitæ, ut
paulo medica-
menta acriora
poſſint, quæ
pro ipſorum ra-
tione.

Cucurbitula
quæſum uia.

Cucurbitula
quando uia.

Cucurbitula
quæſum ad uel
maſ aſſigenda.

Lien nutritur
ex melancholicis
ſanguine, quem
expurgat ab ipſa
parte.
Lien obſtruitur,
aut inflammat,
qualia medica-
menta poſſunt.

Cucurbitulae sanguinis à parte reuoluitur, atq; ad ipsam si fuerit opus, attrahunt.
Cucurbitulae pabris afficit: membris emicat: oculi tum autem fluctuant reuoluit atq; capiti adhaeret.
Cucurbitulae nō esse vitanda prius, quam trinitatem corporis vacuetur.

Alia miscenda non esse medicamenta quae graui phlegmonem propinquant, si alio volumus decere.
Alia tūto emollescit.

Leithargus est affectus contrarius pleuritidis.
Animum rationalem consistere in capite.

Principia autem facultatis singulae symptomata ueniendi praeficiantur, et quae ratione sunt curanda.

Oxyrhodinum quod conueniat affectibus.

Affectum qui cum prurigo delirio infuso, curatio.
Affectum qui cum sopore inuadunt, curatio.

Sic & omne aliud sanguinis profusum, ad contrarium per communes uicinas auertimus: quem admodum rursum & sanguinem (si ita est opus) attrahimus. Siquidem quum menses euocare in animo est, ubi & in linguam curbitam affigimus. Ad haec, in occipite cucurbita defixa, efficax est remedium ad colorum fluxiones. Vacuari tamen prius totum corpus expedit. Nam si referrum sanguinem corpus sit, in quacunque parte capitis curbitam defixeris, totum ipsum implebis. Aduertat autem, ubi dicimus, astringere incipientem phlegmonem esse opus, non quodlibet astringens in his quae deuoranda sunt, exhibendum esse: sed ea tantum, quibus nulla corruptrix admixta uis infir. Nam chalcantides inter precipua astringentia: cuti etiam misy, & fori, & chalcitis, & diphryges, & res ustum, & squama eius, & flos. Verum haec medicamenta, noxia deuorata sunt: quocirca sto matitis ea miscere tutum non est. Desinit naueque interdum ex his aliquid ad uentriculum. Sed nec aloem probe miscueris, si medicamentis, quae phlegmones alicuius causis, quae intrus confluxerit, deuoranda sunt: quando huic quoque purgandi uis quaedam inest. Exterum ubi phlegmones et prorsus incinauerit, si quis paululum aloem admiscat, deiciendi uentris gratia, qui prorsus non deiecit, nihil laedit. Quamquam satis fuerit met curialis, ut urtica, aut cnico, alium sic laborantium subducere. Admodum itaque necessaria est indicatio quae à particulis sumitur. Quae nec ipsa facta ad curandos morbos, nisi etiam methodos de medicamentis didiceris. Vt autem ad affectus capitis iam nostra reuocetur oratio, oxyrhodinum quo caput plenitudo corpum perfundimus, sanè ueneros redargit, quicunque principem animae partem in corde statuunt. Siquidem per id genus affectus, uō capiti, sed pectori praedia admodum da essent. Atqui non in phrenitide modò, sed in leithargo etiam (quod nitium illi contrarium quodammodo secundum speciem exiit) uiniueris applicant ipsa remedia capiti, in quo scilicet principis animi pars residet. Ergo quum humor qui in capite redundat frigidus est, insensibilitas immobilitasque hominem opprimunt: quum uerò calidus est, perperius potius morus, unā cum rationis noxa. Accidit enim frigida ex frigore: ex calore, immo dicus motus: ex humoris uerò uitio, demencia. Igitur in eiusmodi affectibus, si uirtus ualida sit, ac nihil aliud prohibeat, ut crudi humoris copia, uel aetas puerilis, uel anni tempus, uel regio in qua sit extremus calor, uel frigus, statim ab initio uena tundenda est. Atq; hoc quidem commune utriusque uitio, & ei quod cum sopore, & ei quod cum uigiliis in cidit. Commune praeterea utriusque est, ut oxyrhodini in principio admovent. Nam repellendus à capite humor est, quisquis is fuerit. Quae sequuntur, contraria sunt. Nam quae cum uigiliis coniuncta sunt, ea lenire expedit: quae cum immobilitate, excitare: Iure ergo quum in summo incremento sunt, iis uitio quae peruigilio & delirio infestant, perfusiones ex papaueris capitibus applicabimus. Odorem quoque naribus obiciemus: ac narium alas intus, uel frontem ex similibus medicamentis illinimus. Quippe sopire, ac stupefacere principis facultatem oportet, cerebrū scilicet, quod supra modū incaluit, refrigerando:

in contrariis aut uicinis excitare: ac noxiū humoris, qui citra putredinem, & citra febriū, altos fopores inuehit, crassitudinem incidere, exalface-re. Tales nimirum altos fopores, Graeci apoplexias, caros, & carochas appellant. Quod si quando humor putrescat, utiq; cum febris incidunt ea genera, uocatur morbus graecē leithargus. Inco-
 Lethargus quid
 quentes igitur in aceto rhythmum, & pulegium, & origanū, aliūq; id genus, naribus si affectorū admodum, quō uapor subleuatus ad cerebrū, humoris crassitudinē dissecet. Mox enī palatū ualentiū & acris medicamentis ungemus. Ab his uerò etiā sternutamentis utemur: tum capiti si miles praediorū facultates imponemus, adaucta semper corū, enī ad ipsum usq; sinapi, uehementia, si utriusq; diu perseueret. Quin etiam cum curbitis ad utriusque uini, si diutius sit, utemur: itemque castoreo, quippe quod ipsum probe cōcoquit, debite admixturatū. Quoties aut medicamentis alicuius uim exactā ad cerebrū descendere uoles, ad coronale uocatū futurū (cuius plurima diffusitas in hominibus est) applicabis. Nam praeter reliqua, tenuissimū, & rarissimū eo in loco est craniū. Commotus enī fuerit, si & cum infusione id facias, aut tonsis capillis, aut enī planē abrasis. Quod si humidū sit quod applicandū est, si id ex alto effusus, ac ueluti fontis ritu illidat: quippe genitus intrō ab icū magis impellit. Si cum autē hic uehementior humoris casus cōducit, tra in oculo uersat. In capite namq; insensile os est quod fertur in oculo mēbrana quaedam & imbecilla, maxime sensibilia corpora. Et in capite quidem, aliud est quod icū excipit, aliud quod curat: quodq; ut icū non sentit, ita facultate, quae ex incussu ad ipsum peruenit, fruatur. At in oculo, quod est curandū, idem ualenter feritur. Quare insundere huic sensibile medicamentū, liquata humoribus mitissimē facultatis, oportet, atrollescentes palpebrā superiorem blandissimē. Merito autē commendatur ad phlegmonem o colorum, ex oui humore, id quod tum glutinosum est, tum minime mordens. Ceterum quae terra corpora oculariis medicamentis miscenda sunt, ex leuigari exactissimē debent. Dolent porro uehementē oculi, aut ex uehementi acris confluentis humoris morfu, aut quod eorū tunicae plenitudine distendantur, aut propter crassum humorum, flatu osūū spiritus extensionem. At morsum quidem, tum purgantibus medicamentis, deorū nempere reuolendo, & uacuando, curare conuenit: tum ipsi particulae oui humore insuso, quod per eum acris fluxio sine offensa cluatur. Vbi autem concocta iam ipsa phlegmonem fuerit, & simul corpus uacuatum, tum uti quae lauaciones in balneo his sunt aptissimae. Nam & dolorem statim sedant, & fluxionem quae ad oculos fertur, sistunt, maxima quidem eius parte inter lauandum per totum corpus excreta, reliquo uerò contemperato. At distensionem quae ex repletionē prouenit partium, missione sanguinis, & alui deiectione, & infernariū partium frictione, curare conuenit. Quod si ne cessitas aliquando urgeat, etiam ligandis artibus: mox fomentis ex aqua dulci modicē calida, laboranti particulae adhibitis. At humorum, uel statuosū spiritus extensiones curabimus, uacuato prius in his quoque toto corpore: sed & humorum momen-

Coronale futurum esse applicanda medicamenta, quorum uim exaluit ad cerebrum descendere uolamus.

Capiti insinuat fomentum humidum, est illud da ab alio.

Oculorum phlegmonas uicinas albugines con.

Oculorum dolor uide curatur.

Oculorum morbus curatio.

Oculorum infusio matris quanda, et curatio balneum cūdat.

Oculorum distensionem à plerisque diuis curatio.

Oculorum à stas uolens subleuata extensum curatio.

care crura, aliis oxyrhodino, aliis oleo cum sale, aut etiam oxyryo dino sal habente. At si ex pituitoso humore in particulam influente oedema confluxit, abunde aliquando satisfaciit spongia recens, potabili oxyrato madidata. Deligare uero ipsam debes, ab inferiore parte incipiens, ac supra deficiens. Si recentis copia non sit, antiquam detergebis, expurgabis nitro, aphronitro, & aqua lixiva. Quod si sic oedema non subsidat, ubi rursus deligabis, pusillum aliquid aluminis conicies,

*Alumen medem-
ta dignetur.*

*Glaucio & dia-
glaucio adema-
ta, erysipelata,
& phlegmonas
sanat.*

*Scirrhus non con-
ueniens medica-
menta rebus
et callositas
& siccitas.*

*Calculi quomo-
do generentur.*

*Scirrhus sunt ad-
monenda, quae
molliendo dige-
rere possunt.*

*Indurati ten-
dones, quae ratio-
ne oportet tra-
rare.*

*Aceti visus quod
ad induratum ef-
ferat.*

*Ammoniacum
aceto ligamentum
luto induratum
conducit, nec ali-
ter induratum
mucula.*

*Aithra radice
visu anserino li-
quata, salutare
ad emolliendos
scirrhos medica-
men erigit.*

ficient. Meliora tamen crudi sunt, quod modice an-
te sunt cocta. Varias itaque curationis modis pro
differentiis particularum. Quippe laborantibus per
cordis oedema, nemo ex polca frigida applicue-
rit spongiam: nec absynthis oleo incoquens, ge-
nu quisquam perfudit. At seciori angustia &
leni, cum maxima utilitate adhibetur. Vocal igitur
scirrhus impraesentiarum tumor durus & indolens,

*Carotianus mo-
dos variari,
pro differentiis
particularum.*

Scirrhus quod.

*Ligamenta esse
inflabilia.*

*Inflatio ab oleo
mare quomodo
diffuset.*

*Inflationis scop-
us.*

*Inflationes vi-
ferri quomodo
distinguantur.*

*Cacurbitula
satis dysterum
de est idonea.*

*Umbonem re-
spongia applica-
tio, extremam
partem sicut
dipicet.*

*Macilorem co-
tionem qua con-
ferat.*

*Ocypus.
Cassius, magis
la medicamen-
ta qualia nam
esse debeant.*

*Acetum multas
facilitat fortis-
sim.*

*Inflationes mu-
tatae quae ratio-
ne curanda
sunt.*

*Priapismus
quod.*

non tamen omnino absque sensu. Talis enim non est sa-
nabilis. Reliqui omnes, sicut egrossi sensibili ipsam
partem affecta reddunt, ita omnino insensibilis non est
scirrhus: ut si sensibili sit natura. Ligamenta uero scir-
mus insensibilis esse. Sed iam ad inflationes nos co-
uertamus, quae quidem ex flatu olei spiritui in aliqua
cauitate collecto oriuntur. Differt autem inflatio ab oedema,
quod ille tumor sit laxus & dignis cedat,
utpote si pituita exortas: inflatio autem maxime re-
natatur tangenti, sonitumque uelut tympanum red-
dat. Scopus autem omnium inflationis communis est,

ut quod praeter naturam est, uacuetur, in
quocumque contineat: proprius uero, ut tenacis-
mis & calidis potestate medicamentis. Atque in
uentriculo quidem, inflantibus uisceribus, oleum
quod tenuius sit partium, quodque rursus habeat
incoctum, aut semen cumini, aut apii, aut petroseli-
ni, id praestabit. Aliquid uero & cucurbita ma-
gna bis tereus sine incisione medio uentri affixa.

At in artubus & musculis, qui sub cute, aut etiam
membranis quae ossa uelutur, sunt, inflatione
orta, si citra dolorem sit, lixiuium noua spongia
exceptum, abunde fuerit. Sin dolor quoque ur-
geat, ungenda pars est oleo, quod relaxandi, re-
mittendique uim habeat. Musculi uero simul & in-
flati & dolentes ob contusionem, sanus est, ut in
principio sapa cum uino & aceti paulullo, medio-
criter olei portione, omnibus una modice cal-
assis, atque lana succida exceptis, foueant. Quod si
succida facultas non sit, ipsius oxyssus infundendus
supradictis miscellae est. Ceratū autem quod ex cy-
cipo componitur, ad idem non indoneum fuerit. De-
bent enim in contusi musculi leniri medicamento,

cui mista facultas sit, quae simul concoquat, dige-
rat, & modice astringar. Quandoquidem si nihil
astringentis fortiter, augeat aliquando phlegmonas,
praecipue in his corporibus, quae sunt plethorica.
Igitur si dolor uehementer urgeat, mitigatua magis
medendi ratione uteris. Sin uero ille absit, maiori
ui contra inflationem instabis, pro ualentiora me-
dicamenta: cuiusmodi sunt lixiuium, acetum, & post
haec, alui. Quoties ergo de mitigando non labo-
ras, illorum plus in mittere conicies. Rursus ubi
repellere studes, uini nigri, austeritatis, plus quam ip-
sorum, immittes. At si digere & malis, lixiuium plus
indes. Acetum uero si his misceris, ad ambo erit
utile, propterea quod mistas habet facultates.

Quod si musculis prolixus sine dolore sit, licet in
lixiuium penuria, pro illo apii sonitum immittere,
idque minime lapidulosum, sed pusillum magis. In
flationes autem inueteratas, primo quidem aliquo
ex his quae ex lixiuium constant, soubis. Secundo uero
astringentis gymnastionem uersu facies, & mox
colans, pollinem calcis uixae inspergito, usque ad
crassitudinem luti, ac rursus cataplasma id affice-
re sed ad mouero. Salutare etiam his medicamentum
est, quod ex sycomoro conficit. Est & alius infla-
tionis affectus, priapismus dictus: quo detentis,

Re 2

uel inuitis, pudendum arrigitur. Etenim quum
neruus propriis colis subitantiis constitutus, ua-
tura cauernosus existat, ubi halituoso spiritu im-
plet, eiusmodi affectum excitat. At halituosus spi-
ritus in animalis corpore gignit, ex succis sensim
excalfactis. In primis ergo ea uacuatione uniuersum
uacuandum est corpus, quæ maxime uidetur
ex usu fore ægrotanti. Dein uerò imponendū ipsi
laborati particule medicamentū est, si ea calidior
sit effecta, quod ad portionē caloris abundantis
refrigeret. Sin aliter, inter initia quidem, omnino
quod modicè refrigeret: postea uerò id necessum
non est. Pari modo & quæ circa lumbos sunt par-
ticule omnes, eiusdem facultatis medicamento
cōprehendendæ sunt. Etiam reliquis uicibus ex-
hibendus, qui & statim aduerferat, & siccet. Equi-
dem quandam adolecentem sic affectum curauī,
primū quidem sanguinem misit: dein cerato, fac-
to ex officio simplici, imbutis aqua frigida, pu-
dendo ac lumbis imposito. Simili modo & alium,
qui post missum sanguinem, humido medicamento
tuo, quod ex chammelo conficitur, est usus. Por-
tō istis etiam nymphæ aliquod potandum exhi-
beo, saltem in principio. Mox ut uicis semet: ac si
traxerit aduicū urinum, iuxta semen copiosè com-
edendum. Est enim illud commune præceptū om-
nium semē, quos utrosque succus creat, morbo-
rum, quod in sine calfacientibus & siccantibus sit
utendum: quippe hæc, quod reliquum humoris
est, prius absumunt. At uerò maxime tumefa-
ctam cuiusdam linguā curauimus, caraporis ex
aloë, scammonia, & colocynthide, uesperti datis, il-
lum purgantes: lactuce autem succo ipsam lin-
guam colluentes. Quod autem in priapismo uo-
mitoris medicamentis potius quam subducen-
tibus sit utendum, in linguz uisio contrā, id ex
partium situ indicari peripicuum est. Nam aue-
rionis in contrarium, non à substantia, sed à cu-
randi membri positu, inuenio præstari. Porro
ex tumoribus rubens quidē, subesse humore san-
guineum indicat: sicuti flauus & pallidus, per-
sibilem ipsi bilem. Subalbidus uerò & laxus, pitui-
ram. Sunt & alij tumores fusci, liuidiue, tactū ad-
modum renitentes. Quod si membrum fortius
euidetiores uenas, exalaras eas iuxta huius tu-
mores à crasso & nigriore quodammodo sangui-
ne, uidere licet. Qui humor, ubi incaluerit impen-
sius, aut propter putredinem, aut febrem phleg-
mono dem, nigram efficit bilem, quam ne mures
quidem ipsi gustauerint. Terra quoque ab ea radi-
tur: ac partes quæ raduntur, omnes attolluntur
in altum: uocaturq; is affectus tum seruos, tum
fermentatio. Est namque is humor talis, quale esse
acetum docuimus: in uomicionibusq; non raro
percipitur acidus: ut amarus, qui pallida dicitur
billa. Quæ igitur uerè dicitur atra billa, acida
centrè est, atque terram fermentans, omnib; ani-
mali inuicunda. Quæ uerò ut talis fiat est apta,
ea dicitur melancholicus humor, uel nigra etiam
billa: ita tamen ut distinguatur ab altera quæ ex
assatione oritur. De nominibus tamen anxia dis-
ceptione neglecta, nonnulli præter naturam tu-
mores ex eiusmodi naturæ succo proueniunt, cuius-
modi est fax in uino, & amurca in oleo. Qui
quidem spatii temporis putrescente humore, pro
pretea quod sit impactus in uasis, exulcerantur,

Atq; huiusmodi sanè affectum communiter om-
nes cancerum appellant. Quod uitium, perinde ut
reliqua omnia, plurimam habet in maioris mino-
risq; ratione differentiā. Igitur communis can-
cri curatio, est melancholicis succi uacuatio. Mox
prohibitio, ne de cætero talis humor colligatur
in uenis: particulæq;, ne amplius redundantem
succum recipiat, corroboratio. Soluimus autem
melancholicum succum, drachmis quaternis epi-
thymi, in sero lactis, aut malsa exhibitæ: aut pro-
pinato medicamine nostro, quod ex duobus &
triginta simplicibus constat. Post purgationem,
dictum iam de omnibus eiusmodi affectibus est,
quod uel repellere humorem qui in membrū pro-
cubuit oportet, uel ipsam digerere: præterea quod
in principio quidem tam in ipso purgationis tem-
pore, quam ante id, repellere: ubi iam totum cor-
pus exquisitè purgauerit, digerere. Vbi tamē me-
diocri tantum purgatio præcesserit, mistum esse
quod applicabitur pharmacū, ex repellente dige-
renteq; facultate conuenit. Cæterū ad discutiē-
dos cancros, medicorum uirium medicamentis
est opus, quæ nec propter imbecillitatem uincan-
tur, nec propter effectus uehementiam, ipsū san-
guinem crassent. Quia uerò ipsius uirū maligni-
tas, ab his quæ mordent irritatur, & effertur: ob
id utiq; non modò mediocria uiribus, sed etiam
minimè qualitate mordentia, eiusmodi affectibus
sunt idoneæ: materia quorum, ex uitis elorisq; me-
tallicis desumuntur. Quippe quæ medicamenta ex
his componuntur, ad sanandos incipientes can-
cros, magnam uim obtrine. Maiores uerò sat fue-
rit, si his prohibeantur augeri. Cæterū si quan-
do cancerum per chirurgiam curare audebis, ce-
pisse quidē ab euacuando per purgationē melan-
cholicum humore oportebit. Vbi uerò quod uitia-
rum est, totum prius excideris, sic ut nulla su-
per sit radix, fines effluere sanguinem: nec propere
cum inhiabilissimò premendo potius quæ cir-
cum sunt, uenas, exprimes ex his crassiores san-
guinem: mox alijs ulceribus similiter curabis. Est
aliud uitium, carbūculus appellatus, quod ex hu-
more crasso, feruenteq; nascitur. Incipit hoc ple-
rump; à pustula: aliquando uerò & sine hac. Cæte-
rū inter initia, quibus hoc instat, scabunt omni-
no particulam. Mox oritur pustula quædam, mo-
do cineris colore referens, modò etiam nigrior:
quæ rupta, ulcus cum crusta gignitur. Omnibus
præterea his, circumposita caro, in summam per-
uenit inflammationem: colore, magis quam phle-
gmone, nigricans. Necessariò autem sic affecti fe-
bricitant: quare ab incisa uena incipienda cura-
tio est, detrahendusq; sanguis ad animi usq; deli-
quitiū aliud aliquid obest. Imponi uerò sibi æ-
gra particula, quod ad humorū inflammationem
spectat, refrigerantia desiderat: propter crassitu-
dinem tamen humoris, atq; etiam malitiam, nec sua
xionem auertere unquam poteris: & si quando id
feceris, aliud quippiam, quod in alio sit corpore,
offendes. At qui nec assuere est permittendus est,
Quin potius inquirenda remedia sunt, quæ cum
modicè reprimendo, etiā digerere possint. Tale
profectò est tum caraplasma quod ex plantagine
conficitur, tum quod ex cocta lentem: scilicet mi-
scellaneis nobis his teueram micam panis, & mi-
scellanei, & in clibano cocti. Etenim panis omni

Cancer generat.
Cancer cæcio.
Melancholicum succum purgati-
ua.
Metallica medi-
camenta san-
do incipientes
cancro idonea.
Cancer per di-
rurgiam curari.
Carbūculus de-
scriptus.
Carbūculus
alioq; fibre uim
reperit.
Carbūculus co-
ratus.
Carbūculus co-
ratus in oleo.

Halituosus spi-
ritus generatur
ex succis sensim
excalfactis.
Priapismus cura-
tio.

Nymphæ ad
Vitis semen.
Rosa femina.

Lingua mar-
mi tumefactam
quæ uisio curat
Galenus.

Auerio est mo-
lenda in cicera-
rum.

Color tumoris
humorem à quo
est ortus, decla-
rat.

Atra billa gene-
ratio, & facul-
tas.

Fermentatio
quid.

Melancholicum
succum.

Panis puri sub-
stantia in cutis
meatibus haeret

no puri substantia in cutis meatibus haeret est a-
pia. Furfuracea autem, crassiorum est partium.
Super ipsum uero ulcus ualens aliquid imponen-
dum est medicamentum cuiusmodi est Andronis, Pa-
sionis, uel Polydæ: liquoris id cum uino aliquo
dulci ad foridum crassitudinem debet. Quæ au-
tem pharmaca reliquis adhiberi ulceribus solent,
nempe quæ cōcoquant & pus moueant, ea nunc

Carbunculus
post sanguinis
missum, in of-
ficis scarifica-
da.

Cherædas.

Strumatum ar-
tus.

Glandularum
natura est du-
plex.

adhibenda non sunt, quando ita particule putre-
dinem auxerit. Scarificæ etiam euicemodi tu-
mores post sanguinis missionem alienum nō est.
Sunt autē incisiones altiores medicoribus, propter
inestantiam humoris crassitudinem. Inflammatione cessante, ulcus ad cicatricem similiter re-
liquis, est perducendum. Atque lætens de carbun-
culis. Nunc uero de strumis differam, quas
cherædas Græci uocant: quæque sunt, glandulis
in scirrhiolum affectum mutatis. Est autem du-
plex ipsarū glandularum natura. Quippe nonnullæ
rursum in quorundam uasorum medio, diduc-
torum in uarios ramos, ad tuendum eorum or-
bitum, sunt constructæ: quarum haud magnus usus
animantibus est. Aliæ uero ad excipiendam salu-
tatem, uel lac, uel semen, uel aliquem humorem alium
gignendum, sunt fabricatæ. Atque harum
sanæ maior est usus: nec aliter sanandæ sunt, si con-
traxerint scirrhum, quam ceteræ omnes corpo-
ris partes. At quæ medium uasorum spacium im-
plent, in his alia curationis indicatio præstat, qua
simul cum uasorum etiam pars ipsa tollitur: id quod
duplex, uel excisionem, uel medicamentum quod
putrefaciat. Sed tempus etiam misli iam est, ut nonni-
hil de abcessibus etiam dicam: cuius duplex est ge-
nus. Vnum, quum phlegmone in pus uersa, pus
ipsum tanquam in aliquo est sinu collectum. Alie-
rum, quum nulla præcedente phlegmone, humor
aliquis acris, isip alia specie alius, statim ab in-
itio in aliqua parte colligitur, eum cum posita corpo-
ra excorians. Frequentissima uero huius morbi

10

20

30

40

50

60

mouere in totum contendimus. Quorum uero
etiam locus ipse affectus una quæpiam natura-
lium est partium, prima indicatio est, ut affectus
sanetur. Secunda ab hac, si is instabilis sit, ut una
eum uisio pars quoque ipsa excidatur: sicuti in
cancro, & ulceribus omnibus, quæ curationem
reipiunt. E contrario uero in suffusione, quod
lypochyma uocant, uisum in prima indicatione,
ad alium eam locum, qui minoris sit momenti,
transferimus. Non desunt tamen, qui hanc quo-
que euacuare conentur. Jam uero humor qui in
hydrocele uisitur, alienus a corporis substantia,
tota natura est: sicuti etiam quæ in alciis hydro-
pibus continetur aqua. Quarum certè uacuatio-
nem uel medicamentis quæ digerant, molimus,
uel chirurgiæ: in hydrocele quidem, immo si si-
phonem in alciis uero, punctiōne adhibita. Quæ
admodum autem in his quæ ante comprehen-
sa sunt, eum affectu ipso exciditur etiam affecta
pars, sic & in herniosis aliquid peritonæi. Pari-
modo & columella aliquando una cum uisio am-
putatur: in idemque in cruribus & in testiculis
cum uariisque ipsis uenæ. Ad hæc tunica in naso
cum polypo, & foratus dens cum loramine. Ve-
rum ex his nullum est, quod ad naturalem habi-
tum reduci possit. In columella uero id omnino
est conandum: nec propinquum ad eam exciden-
dam, sed quando ad lori uideretur tenuitatem re-
ducta, tunc auferenda est. Similiter & excrescen-
tias carnis reducere ad mediocritatem oportet.
Danda autē in hisce semper opera est, ut tum bre-
ui tempore, tum citra dolorem, tum quamuis si-
miles cures. Verum ut utroque, tribus sis inten-
tus oportet. Vnum primumque est, ut omnino ab-
solutionem operis consequaris. Alterum, ut si-
cuti hanc non consequaris, saltem cubantem nō
lædas. Tertium, ut uirum non facili reuertatur.
Ex horum autem consideratione facili cognitur
est, quando ipsius chirurgiæ, & quando medica-
menti uisio oportet pugnandum sit. At chirurgiæ
quidem studium, in his præsertim quæ nunc sunt pro-
posita, ad inrempcionem eorum sefinat. Quod
uero ex medicamentis petitur, primum hæc ten-
dit, ut quod præter naturam est, tum uacuet, tum
digerat: aut si per membri naturam, aut rebello-
nem uisum non licet, ut id tum in pus uertat, tum
punefaciat. Similem curationem desiderant ipsis
quæ comprehensæ sunt, etiam ea quæ in numero
& magnitudine conuenientem naturæ modum
excedunt, quæque in his ambobus deficient. In qui-
bus amputare quidem conuenit quod magnitudi-
dine redundat uel numero: ceteræ autem & sin-
gere, quod deest, ubi uidelicet fieri id licet. Quin-
tum namque digitur non licet medico gignere, sed
utius naturæ opus sunt omnia talia. Ut autem
ad prodigiōse cor pulemque curatione auficemur,
si quæ adeo obfusca existat, ut nec eedere, nec re-
spirare possit, et calidior ficiōrius temperies (quan-
doquidem hæc corpus exile reddit) est procuran-
da: adhibitis nimium acutis exercitationibus, te-
nuante uictu, & id genus medicamentis, ac de-
niq. cogitantibus animi. Porro quæ ad articula-
ria uisio medicamenta adhibentur, quæ scilicet ua-
lenem incidenti faciliorem habent, ipsa quo-
que, quum nimiam obestatem curabim, utrer.
Sunt autem talia, rutæ, syluestris semen, aristolo-

Hypochyma
transfusio.

Hydrocelis cu-
ratio.

Alciis curatio.

Partes, quæ ual-
id cum affectu am-
putantur.

Columella quæ
de sit excidenda.

Uicini dandi
operam esse ut
non citra dolo-
re, quamuis si-
mi uideant.

Chirurgiæ stud-
ium.

Natura opera
qua.

Obestatis cura
ita.

Extenuatio cor-
poribus, uisum
articulorū, co-
moda medica-
menta quæ sunt.

Abcessum du-
plex genus.

Atheroma.
Sicciorum.
Meliceris.

Abcessus qui
in uicibus de-
hiscunt, med-
icamentis a quæ ex
aromatia cipi-
untur maxime
sunt ex res.

Tumores emaci-
præter naturæ,
sei ablationem
inducant.

chia rotunda, minus centaurium, gentiana, & polium. Præterea ex urina clientibus, ea quæ pollentes habent vires, ut petroselinum. Sed & sal quod ex combultis fit iuperis, potenter etiam extenuat. Ego uero iuuenem quandam quadragenarium, oppidoquæ obitum percurauit, uisum anti doto, quæ aduersus arthralgia uinâ est composita: tum sale theriaco, ipsâ theriacle, ac reliquo extenuante uictu, & pro exercitatione, cursu ueloci. Præparauit tamen hominem ad cursum,

perfricando primum linteo asperis, quoad cutis ruberet: dein statim cum oleo, quod in se digerens aliquod medicamentum habebat: qualia sunt syluestris cucurbitæ radix, althea, geniana, aristolochia, panacis radix, polium, atq; centaurium. Per hyemem autem etiam a balneo reuinxisse hominem iam dicto oleo profuerit. Verum cibum exhibere non statim a balneo, sed interposito somno, expedit. Quod si uelit rursus etiam ante cibum lauari, per mites. Magis etiam ad rem pernebit, si aquæ ipsi digerendi faculas, aut insira, aut etiam acquifina inlit. Verissime autem est, aliquid ex multo simul obito motu, febri hominem corripis quæ tamen ad rem propofita neutiq; erit aliena, utiq; si medicus recte omnia peregerit. Sanè fugere in obesis curandis conueniet uina quæ multum trilit, cuius generis crassa sunt: ut uero, uel aquo sis, id est, colore albus, & substantia tenuibus, uel quibus aqua marina sit mista. At ubi eos qui extenuati sunt, rescire in animo est, ipsi uinum exhibebunt crassum, cibum uero quæ succu efficiat crassum, exercitationes paucas, frictione mediocriter, ac breuiter omnia iam comprehensis contraria moliemur. His uero etiam picari est commodum, * idq; tribus aut quatuor diebus. Hoc quippe ad carnis generationem optimum est prædicium, quum huic mellest & calfaciat, sanguinis multitudine accita. Ego nec assidue picari corpus agrotans oportet, nec quum oportet, sæpe illinere: uerum in hyeme bis, in æstate semel id fecisse est satis. Itaque quibuscunq; particulis bonam habitudinem reddere cupimus, has & fricare, & perfundere, & percutere, & picare oportebit, tanquam dum iurumescant. Hoc ubi factum est, protinus desistere conueniet, prius quam digerere coperint. Etenim quæ calfaciunt omnia, si cum attrahere, sic sunt etiam digerere apta. Iam uero quibus torum corpus est extenuatum, his lauari quoque post cibum est congruum: quanquam timendum si est, ne iecur eis obstruatur, potissimum propter ciborum speciem quum nimirum aliter quoque obstruere soleant, quæ succum crassum gignunt, si quis his liberalius utatur. Incidit etiam ex tali uictu diutius exhibitio, caleuit in renibus generatio. Quod si is qui dicto modo cibatur, grauitatis sensum in dextera præcordiæ aut circa latus percipiat, protinus cappari ex oxymelite in principio cibationis donec cõstiterit grauitas, dabit. Ad membra uero quæ ægrè resiciebant, ac plusculum iam refrigerata erant, usus aliquando & thapsia sum, aliâ ex emelle membrum illinere, aliâ etiam ex cerato. Si quidem attrahit ea quoque paribus quibus superposita fuerit, sanguinis copiam. Quibus autem exiguum aliquid pudendi præputio de naturali dedit quantitate, ipsi non raro sola tensione debilitum modum restitui, membranam ualè mollem, fir-

mamq; ex charta, cui gummi illit extrinsecus circumuoluens. Ex interna tamen parte præputio ipsi rotundi aliquid ad mediocriter, aut ex plumbo, aut ex charta, uel uel fulcrâ, supponi prius oportebit: quod uidelicet, posteaquam agglutnata membranula fuerit, facili eximas. Porro immixtio ipsi præputii duplici chirurgie rationi subiicitur: interim in superna pudendi parte circulo incisa cute, quod uidelicet eius uinitate soluta, externas deorsum trahatur, quoad glandem cooperiat: interim uero scalpro ex interna parte, quæ glandis inuâ est, excoriata, mox deorsum tracta, ac deinde molli uinculo deligata. Similiter quæ in labiis, aut narum alis, aut aure deficiunt (Græci colobomata uocant) curant: primum quidem excoriata utrinq; curetende adductis, cõiunguntq; inter se cutis oris, atq; utrinq; quod callosum est, detracto: mox quæ reliqua sunt, assusis agglutinansq; eiusdem generis sunt, & quas in maiori oculi angulo rhedas Græci uocant: unq; uel impensius minuto, uel prius perditio ipso angulo. At prius quidem perditio eo, omnino insanabile reliquit uirtum. Minuto uero, ipsæ quæ modice atfringuntur curant, si tamè totum corpus primum aut est purgaueris, dein caput. Sunt medicocriter atfringentia medicamenta, quæ ex glaucio componuntur, & croco, & quæ nardina uocant: ite in primis & quæ ex uino sunt confecta. In summa uero, quib; aliquid perit substantiæ, maxime quidem curandum est, ut ei quamissimilima substituantur. Si id fieri nequeat, salte aliquid quod eundem præter usum machinamur: ut, exempli gratia, producentes callum pro offe. Porro ut uenas sensibiles regeneratas aliquando uidimus: uerum has, non tam similes ipsæ quæ antea perierant, quam easdem renasci dixeris, ueluti in causi ulceribus carnè. Cicatrix uero quæ in hac, calli modo durata, gignitur, ea cui quidè est quamissimilima, cutis tamen non est. Nunc autem ad alia trāsemus morborum genera.

Serpens ulceris, qui herpes dicitur, eiusdem est generis cū exulcerato erysipellate. Ramex uero (quæ scrotolem uocant) cum scirrhis. Etenim herpetas biliosus procreat succus, sub cute latet. Quo fit, ut eatenus affectus is, eiusdem sit cum erysipellate generis: atq; huius quoque magis etiam cum eo quod exulceraturum est. Differt autem ab erysipellate, humoris tenuitate. Est enim admodum tenuis qui herpetem excitat. Ex eo autem quod alter humor alter sit tenuior, crassiorq; ulcerum differentiæ, quæ ex profunditate spectantur, proueniunt. Huius certè generis est, & quæ phagedæna Græci dicitur, & exulcerati canceri. Quorum omnium communis curatio est, ut inhibeat primū humoris confluxus, post sinetur ulcerus. Propria uero cuiusque rum ex membri inuenitur natura, tum ex humoris non solidi specie, sed etiam quantitate. At tenuissimus quidem in eiusmodi humoris est is, qui exulceratum herpetem excitat: erasilissimus, qui cancrum. Proximè ab his loci occupat, quod ad crassitudinem attinet, qui phagedænas producit. Harum speciem quædam sunt, quæ Chirouia, & Telphidia dicuntur. Si quis igitur, toto prius purgato corpore, mox quæ influentem humorem reprimant, regerantq; medicamentis utatur, iam curauerit herpetem. Sin acutum horum fecerit, sed tantum

Præputii instillatio
randa duplex: ta
lis chirurgica.

Colobomata.

Angulorum im
mersiones in
oculo quo modo
sint curanda.

Venas sensibiles
regeneratas ui
das Galenus.

Cicatrix adu
ta ueluti non al
tenu.

Herpes eiusdem
est generis cum
exulcerato ery
sipellate.
Ramex.

Herpes ab ery
sipellate quomodo
differt.

Phagedæna.
Cancer exulce
rati.

Chirouia u
el
Telphidia
Herpes can
crosus.

Sal Theriacum
retinetur corpo
ra.

Obesum inuicem
qua uictus &
medicina ratio
ne extenuatur
Galenus.

Vina extenuant
de corpori apta
qua sunt.

Extenuata cor
pora resicili ra
tio.

Picari modum
tu conducat.

Præputia termi
nos, tum resice
re eis amicus,
sic tamen parua

Cappari ex oxy
melite cistit ob
structionem ueni
entem.

Thapsia sangui
ni attrahit ad
partem quib; fue
rit applicata.
Præputii resicili
do ratio.

60

50

40

tim ea quæ cicatricem inducunt, adhibuerit, unguis exulceram cuiusculam si sanauerit, proxime tamen illi, quo minus exulceretur, non consuluerit. Postmodum uero illa quod cicatrice inclusa, quæ ipsi continuata est, exulceratur: idque longo spacio, seu malo ipso serpente, sit, donec humor, unde oritur, sit inanius. Vacuandus itaque est per eiusmodi affectus semper si qui reducat humor, aliquando medicamento quod stauam purget bilem: sepe eo quod nigrum: modò eo quod mixtæ sit facultatis, quod si simul bilem & pituitam educat: ueluti in miliari herpete, qui nò proxius ulcus facit, quemadmodum alter: sed admodum exiguas pustulas ad speciem miliæ, quæ ipsa interposito spacio in ulcus etiam degenerant. Adeo non absque ratione quibusdam est usum, in eiusmodi ulcio bili esse aliquid pituitæ cõsummum. Ceterum ad generatione ulcers, in his quæ extrinsecus admoventur, exasperare debet, quæ repellendæ facultatem habent, Vbi uero nò amplius confluunt 20 in ægrotantem particulam uitiosus humor, quæ digerunt. Si quidem exiguum uitiosus humoris etiam si quis ad ulcera reprimat, leue damnum committet. At si eius quantitas sit momentanea, in principio aliquid membrum aliquando procumbit. Ac repellunt quidem, non solum ea quæ astringunt, sed etiam quæ sine astrictione refrigerant: digerunt uero quæ calfaciunt. Porro stauæ quidem bile uacuatio est facilis: pituitæ uero & nigre bilis, difficilior, quo magis purgantibus medicamentis ope indigent. In herpete autem, quoniam tenuis est humor qui ipsum creat, abunde est etiã aluum soluisse: uel urinas, per ea quæ id modicè efficiunt, citasse. Quod uero ad æchordonas & myrmecias curandas pertinet, non destit. Romæ qui eas apprehensas primoribus dentibus exerat. Sed & scalpro ad myrtæcei solis speciem formato, & seramento quod scolopomachæriton dicitur, eas facile quispiã excidere possit. Aque uero & ualentæ aliqua pinna circulo myrmecis imposita, ipsam 40 educimus. Debet tamen pinna fistula esse myrmecis crassitudinis par, ut eam undique profusus constingat. Quæ postea circuli, ac simul deorum impulsa, celeritè in ea myrmecia totam eniã cum ipsa radice educet. Iam uero, quod uehemèter attrahentibus sursum myrmecia uelletur, & putrefacientibus enecabitur, ratione ab aliquo inuentum est. Quum igitur inter dum quædam partes deficiant, quæ adesse debuerant quædam uero redundant, quorum uò erat opus: adimere quidem quod superuacuum est, sanè haud difficilè fuerit: aliud uero producere, quod simile ei sit, quod deficit, id in quibusdã quidè est facile, in quibusdã difficile, in alijs plane fieri nò potest. Si nanq. carnosum sit quod deest, haud magno negotio id reficit. Si nò sit, ipsam quidè instaurare nò licet, ceterum aliud pro eo durum efficere. Diximus autem uidisse nos uenas alias sensibiliter generatas. At si digitus deficit, is restitui non potest. Ceterum quæ in naso, uel aure, uel labio sunt curta, ea quod 60 uel refecisse nò licet, sic decorem aliquem his adicere licet, si quis diuina quæ uriningutim, mox in unum conductam quæ agglutinetur. Porro quemadmodum in sinuosis ulceribus generatio carnis, sic in capite & palpebris productio pilorum, opus naturæ existit. Etiam ex succis qui

per cutim transpirant, quod limosum est, id pilosum à principio gigitur, tum de cætero uelut succrescendo auget. Hoc igitur, quoniam uel profusus perit, uel redditus est uitiosus, toties pilos corrumpi est necesse. Corrupti namq. & sterpes ipsæ duplici de causa aliàs nutriende succo destituta, aliàs non idoneo usæ. Ac profusus quidem perdit eo qui pilos alar succo, caluities oritur. Eodem uel uato, ophias & alopecie proueniunt. In quibus & inhibere quod influit, & absorbere & digere re quod iam occupauit languentem locum, conuenit. Ergo cum in ulceribus illis purgationem nocentis succi primùm adhibuisti, eodem modo in pilis ipsis ab hac primùm exordienda curatio est: scilicet æstimato prius cutis colore, cuius cernis corruptos pilos. Nam si is albidior quàm pro naturæ habitu sit, pituitosi humoris purgationem molieris: si pallidior, eiusmodi bilis purgationem: uon secus quàm si nigrior conspiciatur, quæ nigram detrahunt bilem offeras. Quæ autem iam planè purum est purgatione corpus æstimas, eum qui in cute continetur humor digerentibus medicamentis discantes: hic tamen ut in his caueas, ne adeo calida, ac rursus à dimoueas, ut cutis exulceretur. Quin etiam ea quæ ualenter siccant, cauere conuenit: ne uidelicet cū uinato humore, unlem etiam absorbamus. Ego uero his medicamentis quæ alopeciam sanant, exiguum thapsiæ admiscui. Ceterum ubi uel numefactum pluculum, uel ex coriatum ex ipsis usu, pericranium confixi, illo quidem de à medicamento abstini ui: illius autem partem, uel galli, uel anseris liquato seuo: deinde postea die, si nihil tale apparuerit, rursus eodem medicamento sum usus. Iam eos quibus perire ciliorum pilli, similibus genere medicamentis sanabis: neququam tamen cõmites, ut medicamentum intra oculorum rubicines confluat. Quare facila longè tutiora existant. Porro pterygia, ramet si à sanationis habitu sit alienum, non tamen substantiæ ratione, quemadmodum artheroma & meliceris, à natura alienum existit. Eius uero sanatio, si quidem paruum & molle sit, per ea medicamenta quæ detergent, perficitur. Vbi magnū durumq. euasit, chirurgiam postulat. Simili ratione & aqualarum quæ magnæ sunt, chirurgia curabis. Quæ parux existunt, siccantes medicamentis curantur. At chalazion, quò toto genere sit à natura alienum, aufferi postulat. Ad eundem modum & oculorum pus. Verùm id pleurung medicamentis digeritur. Hypochyma uerò iam incipiens digeritur: ubi diu coexistit, non potest. Iustus medicus ætate nostra concussione capitis multos hypopios sanat. Mansit enim horum pus deorum, propter grauitatem substantiæ. Hypochyma autem leuius quum sit, nebulæ similis quum pus, haud ita dehiscere potest. Ceterum quod ferofioris naturæ est, id punctiõne ad præsens discutitur: interposito tamen haud longo spacio, seu uini flex quodam reuertitur. At quando pus oculorum digerere est animus, collyrijs quæ myrham habent, maxime uteretur. Quæ uero uehementer siccant, ad præsens certè ualenter uacuant, sed quod reliquum est, ita cogunt, ut ægrè resolu possint. Multum autem puris uacuabimus, diuisa runica ceratido, paulò supra coronam. Sunt præterea ex genere eorum

Herpete milia
re desinens.

Humores qui
facilius & qui
æstimas uacuantur.

Æchordonas.
Myrmecias.

Verrocæci es-
talis.

Carnosa res
facili.
On instaurari
non potest.

Natura opera
gna.

Pilorum gene-
ratio uide.

Pilorum cor-
ruptio uide ac-
dat.

Sterpes dupli-
ci de causa cor-
rumpi.
Caluities.
Ophiasis.
Alopecia.

Pilorum uis-
us quemodo iu-
corruunt iam.

Thapsia uide-
tur Galenus ad
alopeciam cu-
randam.

Pterygia cura-
ta.

Aqualarum
curatio.

Chalazij
curatio.

Oculari pus:

Hypopios sana-
bat uini capi-
tuli concussione.

Hypochyma si-
milè dysichum
pus est. re-
uert.

Oculorum pus
collyria ex myr-
thæ dicitur.

Non oculorum
uacuari diuisa
runica ceratido,
paulò supra
coronam.

quæ tota substantia præter naturam dicuntur, & ascarides, & helminthes, siue ex rotunda sint, siue laræ. Quocirca expelli prorsus eas & corpore expedit. Expelli autem, si prius enecaueris. Enecabis amaris medicamentis. Ac teretes quidem abstinendum perire poterit. Laræ uelutemiora medicamenta desiderant, sicuti & quæ ascaris græcè uocatur.

GALENI PERGAMENI DE arte curatiua ad Glauconem lib. I.

CAP. I.



Materia cuius propriam modum agnoscere oportet.

Omni cõmunem tantum omnium hominum naturam medicom cognoscere oportet, sed etiã uniuscuiusque propriam. Nam tamen propriam singulorum naturam, quæ atque cõmunem, possibile est scribere. Quum igitur ad rectè medendum plurimũ cõferre temporis occasio, & quantitas altiorum uideatur, licet autem propria in unoquoque ægri se cõtemplanda obiciãt, nec quicquam proprium possit sermone explicari: ob id nimirum quod cõmune est, scribere cogimur, quomodo id sit usu secundum. Etenim quantum quisque à naturali recessu habuit, ad tantum morbus magnitudinem peruenit. Distantiam uero recessus, facile deprehenditis, qui naturalè uniuscuiusque ægri statim exquisitè cognorit. Quod quidem quum nobis non liceat, confugimus ad cõmunes notiones, in quibus artifex plus aliquid, quàm inerte, assequitur. Porro qui omnia quæ secundum naturam & præter naturam sunt, diuisione artificis complexus fuerit, atque ab his omnibus, quæ sufficienter diuisa erant, indicationes sumpsit, solus is, quantum humanis permittitur uiribus, minime errabit medendo. Atque illos quidem quorum habebit notitiam, melius curabit, quam ceteros. Ignorare uero, proximè illis, quoad fieri poterit, ad sanitatem perducet. Si quis enim primum distinxerit differentiam æraturæ: postea eam quæ secundum temperaturas, potentias, colores, calores, habitudines, pulsuum morus, assuetudines, indolentias, animique mores haberet: atque his quoque adiunxerit maris feminique discrimen, expendere quoque regionum, temporum, atque adeo ambientis aeris temperies, hic ad propriam laborantis naturam agnoscendã proximè accedet. Nunc uero de his solum ægrotie dicere propoluius, quorum natura, antequam morbum contraherent, nobis erat exquisitè perspecta. Cum quibus tamen reliqui omnes intelliguntur, qui nobis erant ignoti.

De febribus ephemeris. Cap. I.

Primo igitur de ephemeris febribus, utpote simplicissimis differamus: quæ nimirum ob lassitudinem, ebrietatem, iram, excandescentiã, mororem, atque alias uelutemines animi sollicitudines excitantur. Ex quarum genere sunt, quæ ab inguinum inflammationibus trahuntur ortum, præterquam si absque ulcere & fiant manifesti: tunc siquidem & suspecte sunt, minimeque mihi apparent. Vigiliæ puerumque induxerunt simplicem febrem: sicuti frigus, & exanthema quandoque. Atque hæc omnes febres soluantur facillimè, in hunc modum. Oportet enim ipsos confestim ducere ad balnea, deinque ad consuetum uictus rationem. Nam qui triuani terminum absque cibo expectant, sepius acriter fe-

bres efficiunt. Quis igitur ad ægrum accedens, primum à maximis quæ circa ipsum sunt, est cõsideratio inclianda: deinde & ab alijs, adeo ut nec minime quicquid omittas. Nam ut magis aut minus ei quæ sit ex maximis indicationi credamus, ex aliorum fit adiunctione. Maxima quidem in omnibus febribus signa in pulsibus atque urinis cõsistunt. His uero addere oportet, quæ circa faciem febribus Hippocrates acubitus quoque & respiratione. Item ea quæ ab ore excernuntur, atque alui sediminetur: si quid aliud accidere circa aliquam corporis partem, aut operatione uideris. Quæ omnia cõmunia sunt omnibus febribus. Postquam itaque ex pulsibus atque urinis febris naturam perciperis, quum pulsus nullum inflammationis signum habuerit, neque omnino inæqualitas in aliqua arterie cõpulsione se ostenderit, si si hoc adfuerit, omnino sit imbecille: urina autem, aut prorsus similis illi quæ secundum naturam se habent, aut non multum à naturali statu recesserint: tunc sanè & ad omnia illa quæ nuper à nobis exposita sunt, accedere oportet: & quum ueluti chorus quidam omnia concinnè loquantur, tunc certe fidere oportet, ac, si libeat, interrogare, nunquid aliqua manifesta intecesserit causa. Si quid enim humidius modum æger fateat, expectata prima febribus solutione, statim oportet lauare: quum tunc certior sit nobis facta cognitio, ex ipso solutionis modo. Nam arteriarum motus in hoc in totum assiluitur ei, qui in sanis deprehenditur, quum in nulla alia febre ad naturalem habitum reuertatur. Iam uero plurimis ephemerarum humidi quidam uapores, & quibusdam etiam sudores utiles cõspiciuntur, accessione cessante. Quo tempore etiam urina multo meliores, quæ circa febrem initia, uidebunt: & si capitis aut alterius partis dolor simul inuaserit, neque hic amplius persistet. Aegrotantis quoque in lerando facillima, magni & ipsa signum, febribus suauitate nobis indicabit. Et si dum lauantur, nec horror aliquis insolitus molestauerit, nec alia tristitia adfuerit, post balneumque & deinceps bene se habere perseueret, tunc ne ueraciter offere cibum, & uinum, adlubito tamen pro tempore modo. Cõmuniter autem omnibus de ceteris ephemeris, urinae iuste excernuntur. Adiungitur uero his qui propter tristitiam febribus, aeris uero potius quàm abundantia caloris: quemadmodum & diuerso illi, qui propter furor. Sed & extenuatio corporis in his quoque tristitia aut cura uexatur, cõspiciuntur existit: oculorum præterea cavitates, & quædam in cõsuetudine decoloratio. Hæc quid sunt & illi qui quouismodo aliter cõgitarunt, cõmunia. Maxime itaque ex oculis distinguere oportet. Nam ex his etiam in sanis animæ mores cõscire possumus. At eos qui diu uigilauerunt, arguit quidam pallores facies, subutemina, nec non ipse oculorum morus, quo uix palpebras, humore quodam imbutas, attollere possunt. At qui tristantur, aut cogitationibus detinentur, illi excitantur palpebræ. Cavitates est cõmune accedens omnibus, meritis, uigilijs, cogitationibus, non tamen furori. In hoc enim, nec oculorum cavitates, nec manifestus pallor, & plus caloris atque celerius exumo prorumpit: nec pulsuum magnitudinem destruitur, quemadmodum in uigilijs, tristitia, & cogitationibus. Eorum etiam qui ex lassitudine in febrem incederent, curis est siccior, quam in aliqua alia ephemeris. Quæ autem

Signa maxime in febribus à pulsibus et urinis percipiuntur. Ephemerarum figura.

Pulsus in molli febri inter menses ad naturalem statum reuerti potest. Quæ in ephemeris.

Diarrham febrem quæ accedant.

Ephemeris ex tristitia ex oculis cõtineat moros extenuatio corporis.

Mores animæ ex oculis etiam in sanis cognoscuntur. Vigiliæ notæ.

Cavitates oculorum quid indicent.

Ephemerarum causa.

Febres cum balneo, si absque ulcere oriuntur sunt simpliciter.

Ephemerarum curatio. Tarda imbecillitas ex ephemeris redditur acuta febribus.

Ephemeris ex densata cute de fibrillis raro.

ex densata cute accidunt febres (densatur enim aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate astringente) hæc quidem solæ inter omnes febres passio astricta existunt: ac uel solo tactu noscuntur, tom ob densitatem cutis, tom ob differentiam caloris, qui mitis quidem in primo tactu sentitur, acris autem, si plussculum taderemus. Non tamen & his urinx sunt ruffæ: neq; moles corporis cõcidit: neq; oculi redduntur aut caui, aut aridificati nec pulsus minores, quemadmodum in macroribus, curis, uigiliis, aut exercitiis immoderatis.

De febribus ex inflammatione inguinum. Cap. i. 11.

Febres quæ ex inguinâ inflammatione sunt, pulsus habet maximus, uelociter, atq; frequenter: plurimisque illis calor inest: ac postquæ febris constitit, statim ex profundo quædam emergit lumiditas, calida quidem, sed mitis. Atq; in rotum facies rubicunda illis, & magis rufæ, utrinque subalbidæ. Cõmunis autem omnibus huiusmodi febribus est pulsus æqualitas. Curare igitur omnes quidem oportet. balneis. Cæteri qui ex cutis densitate, aut inguinis inflammatione febricitant, si in aëre balnei immorari iusseris, haudquaquæ nocebis. Reliquos omnes quam citissimè oportet ab aëre remouere. Si uerò diutius in aqua immorari uoluerint, permittite. Oleo autem multo, & tepido, & manibus mollibus perficere uamplurimum, sed eos præsertim, qui ex labore febricitant. Secundo autem loco, qui meatus habet astrictos: ac tertio, qui inguinum panantur inflammationem: quos nimirum spissius lauare expedit. Cibum autem cõcocto faciliè assumere qui ex labore febricitant, possunt multiores: non aquæ tamen, qui ex densitate conis, aut inguinis inflammatione laborant, quorum etiam uigilijs tenuis orisus est utilis. Sed & uinum potare quantum possunt conuincere sunt permittendi, quibus labor febris occidit. Mensuræ autem ratio, ex uiribus & ætate sumitur ægrorantis: nec non ex naturali temperie, consuetudine, anni tempore, & regione, alijsq; id genus. Qui uerò ex inguinum inflammatione febricitant, arcenti sunt à uini potu, donec inflammationes soluantur. At qui cutis foramina habent astricta, aut refrigerati sunt, si quidem non multum hoc affectu laborant, nec plenum corpus habeant, non sunt à omni potu prohibendi. Qui autem supra modum refrigerati sunt, aut plenior corpore, prohibere utile est. Rursum, qui ex uigilijs, aut aliquo animi affectu februnt, postquæ balneaueris, cibo humido ac boni succi reficere oportet: uinum uerò omnibus ita qui uigilijs passi sunt, interpede offerre, nisi capitis dolore premantur, aut pulsum uenarum in temporibus sentiant. Sed & ita qui ex ira aut mæore aliquo, aut cogitatione febricitant, uinum est exhibendum: si citi & illa, qui forore perciti fuerunt, quando omnino perturbatio fuerit refrigerata: nam prius sanè usus uini erit periculosus. Tentare autem oportet semper adderere contrarium ei quod infestat: laori quidem, quietem: uigilijs, somnum: iræ, furori & tristitiæ, sermonibus, actionibus, spectaculis, enarrationibus, animi iucunditatē. Sic qui ex cogitatione laborat, omnino ratiocinationes omittat. Et qui ex inguinum inflammatione febricitat, eius curationi inrendat: ac multo prius

Ephemeris ex inflammatione inguinum, que accidunt.

Ephemerarum curatio.

Ephemeris uicinis ratio curationis.

Mittit ratio in exhibitione alimæ per ephemerarum febres, ex quib; sumatur.

Vini potus quibus conueniat ephemeris.

Ephemerarum causis cõtrariis ratiocinationibus adhibendis.

Ephemeris cum habone ratiocinationibus adhibendis.

ulceris, unde originē habuit. Atq; hæc lenos de ephemerarū indicia, remedijsq;. Reliquæ uerò febreæ, nōnullæ ex inflammationibus, nōnullæ ex humoribus accenduntur. Et quæ ex inflammationibus sunt, sunt uelut symptomata quædam partium inflammationum.

De febribus putridis. Cap. 11. 12.

At quæ ex humorum putredine accenduntur febres, ex & dicuntur putridæ, & sunt non morbo rum symptomata, sed ipsi morbi. Ex his uerò nōnullæ quidem absq; accidenibus accidunt, & missimæ sunt nonnullæ item cum accidenibus uerunt. Earum igitur quæ accidenibus carent, pauca quidem ad exactam sui cognitiōem, diem quartum desiderant.

De signis febrium intermittentium.

Cap. v.

Quæ igitur cum rigore inuadunt, non circiter ex earum esse numero iudicabis, quæ per circuitus insistant. Tertianæ enim atq; quartanæ in totum cum rigore accessiones faciunt. Sed tertianæ quidem in primo insultu cum nimio sæpe rigore incipiunt: quartanæ autem non uidimus cum uehementi rigore incipientē, sed procedente tempore magnitudo ei superuenit, præter id, quod nec statim ab initio hæc febris ut plurimum solet inuadere, sed alijs quæ antecesserint, subsequi. Quartanæ itaque solet errabundus febribus superuenire. Quondiana uerò, raro accidit absq; læsione oris uentriculi. Rursum quartana ex male affecto splene gignitur: ut tertiana ex affectu iecinoris. Quæ uerò cum ualido rigore incipit, magis febris tertiana, quàm aliqua aliarū febrium fore speratur. Quod & reliqua etiam signa attestentur, hanc dubio procul in prima statim die tertianam esse cognosces. Etenim calor multus & acris adesse debet: pulsus autem magni, calidi, uehementis, uelocis, atq; frequētes, omnijs inæqualitatis, præterquam febribus, expertes. Rigor porro, ueluti si de aliqua acuta, plus quàm frigida, corporis perpergeretur: quum ita quæ quartanæ aut quondianæ intermittentem patiuntur, potius frigidum rigorem percipiant. Tempus autem anni æstiuum: sicuti & locus, & præsens status calidus. Sit autem & ægrorantis natura calidior, & biliosior, & ætas adolefcentis: & exercitationes potius quàm ociositas antecesserint: magisq; deuersio, quàm frige factio, & paritas cibi, potus quàm crapulæ. Vigilijs quoq; mæores, atq; labores, & intensæ cogitationes, ad eundem affectum perducit. Quod si multos alios eodem tempore laborantes contigerit tertianis corripi febribus, hoc quoq; maximum aliquod, præter ea quæ nuper diximus, signum erit. Si igitur hæc omnia aduerint indicia, aut saltem quæ maxima sunt, & sine quoq; uehementis adiungatur, oomitally bilis, aut sudor, uel utraq; superuenierint, tunc nulla dubitatio relinquitur. Quod si inter hæc à febris quieuerit homo, hac inquam quæ ex suo motu est omnibus nota, propria uerò febrium inæqualitas in artetiarum motu relinquitur, tunc firmiter poteris esse tertianæ febrem ostendere, ac si tertio iam die accessionem fecisse uidideris.

De signis quartanæ. Cap. vi.

Sum rident quæ quartana tenent, pulsus habet

dum tardos & raros. Quæ autem consistit febris,

Febres ex inflammatione sunt symptomata partium inflammationum.

Febrium partium differentia.

Quartana non solet ut plurimum statim à principio inuadere, sed alijs febribus superuenire. Intermittentiū singula, quarū partium conueniunt lesionem. Febrem tertianam qua arguamur.

Quartanarum indicia.

atq; etiam augeret, necesse quidem est ut ueloces
siant, atq; frequentes. Seruari tamē & tunc pro-
pria ipsius tarditas raritasq; si additur uelocita-
tem atq; frequentiam in accessibus mediteris.
Iam quæ omnibus cōmunis est febris, in uno
pulsu inæqualitatē, in hac manifestissime licet cō-
prehendere. Multo namq; uelocius principium,
finemq; motus inuenies, quā medium. Præterea
æstus, & deustionem, & quendam ueluti seruo-
rem, qualis in tertianis uidet, in quartanis laud-
quaquam inuenies. Sed & ægrotantis natura in-
spiciunda est, an atra in ea bilis abundet: & tem-
pus quoq; anni, an sit autumnus: & præsens sta-
tus, an inæqualis. Sic uerō & loci natura, & mor-
borum peragantium uulgariter, & an lien intum-
uerit, febribusq; antecesserit inordinata, & ætas
senior quā consentiunt, & an cum sudore fe-
bres desinant. In his uerō bilis fluxus uomitibus mi-
nimè expectandus est: quemadmodū nec in quoti-
dianis intermitteat. Hoc etenim tertiana-
rum est proprium signum. At quum febris cessa-
uerit, si adhuc uelut signum febris remanserit, pul-
susq; ipsi, qui secundum naturam rariore atq; tar-
diores fuerint, quartana proculdubio erit huius-
modi febris.

De signis quotidianæ intermitteat.

Cap. VII.

Quotidianæ
rem in ducit.

Quotidianæ intermitteat calorem humidio-
rem cum quadam acrimonia esse oportet, non
quæ primum manus admoctur, occurrentem, sed
per moram. Nam quædam fumosa caliditas cum
multo uapore cōmissa, perspirare uidebitur.
Sed & his lōgē minor es sunt pulsus pulsibus quar-
tanarum, quā istarum pulsus pulsibus tertiana-
rum. Rursus uerō, tantō rariore sunt in quoti-
dianis intermitteatibus pulsus, his qui in tertia-
nis, quantō illis pulsus quærtanarum. At tarditas
in utriusq; eodem modo se habet. Minus uerō siti-
culosa hæc febris est, tantūq; eam quartana ex-
cedit, quantum istam tertiana. Humidissimum e-
tiam totum corpus in his febris est, & uomit-
us pituitosi. Quæcūq; autem excernuntur per
uentrē, frigidiora, humidiora, crudiora, & pitui-
tiora existunt. Et quidem ætatis fluxus, naturis, an-
tiq; statibus, & temperaturis humidioribus, he-
bres accidunt. Nam adolescentem biliosa & sicca
reperatura, nunq; uidi quotidianæ corripit febre.
Pucri autē, præsertim minores natu, & ex adultis
pituitosi, & habitudinis crassæ, atq; eoio plurimo
dediti, necnon crapulis, ebrietatibus, balneis asai-
duis, post cibum præsertim, utentes, faciliē à quoti-
dianis capiuntur. Loca etiam humidiora, atq; ex
anni temporibus lybrenum, ex statibusq; humi-
diores, hanc præcipuè conciliant febrem. Quod
si populariter etiam grassetur, hoc quoque non
parum ad eam dignoscendam conducet. Non ra-
men liarem febrium declinationes, quemadmo-
dum tertianarum & quartanarum, sudoribus ter-
minantur: quare neq; ad integrum quietem, excep-
tis paucis, perueniunt. Quotidianarum urines
sunt albæ, & tenues, uel crassæ & turbulente, uel
rubicundæ. Tertianarum rufæ, uel subrufæ. Quar-
tanarum uariæ quidem, sed crasse omnes.

De signis febrium continuarum.

Cap. VIII.

Febres autem continuas hinc cognosces, quod

nullum eis adeat signum, ex ipsa quæ adeffe intermit-
tentibus diximus: & quod intra quatuor & uigin-
ti horas non cessent. Si uerō inæquale incremen-
tum habuerint, hoc quidem præter alia signa, lon-
gus etiam tempus ostendit: necnon si proprium
febris signum in pulsibus manifestū addit. Quod si
inordinatio etiam ac inæqualitas ipsius uel in-
concinnitas insit, & hoc etiam indicium simul
magnitudinis atque continuitatis. Si uerō in hoc
statu permanentes, tertio die maiorem accessio-
nem ostenderint, aut excrementa & urinx omni-
nino crude apparuerint, non possunt huiusce-
modi febres ante septimum diem terminari. Ad
hæc, si quarta dies tertiz diei similis fuerit, & fe-
bris ueluti deurens, nec facies, aut reliquum cor-
pus collabitur quicquam, huiusmodi febris ad
longius extendi tempus consuevit. Ac tales qui-
dem sunt differentie earum febrium, quæ acci-
dentibus carent. Curatio autem cuiusque earum
deinceps scribetur: primum tamen intermitte-
ntium, dein continuarum. Ex intermitteatibus igitur
breuissima minimisq; est tertiana. Longissi-
ma autem, & quantum in ipsa est, haudquaquam
periculosa, quartana. Quotidiana uerō, & lon-
ga, & non sine periculo. Porro * ubi morbi exi-
sunt acuti, celeriterq; ad statum perueniunt, et si
ualde tenacem uictum exhibeas, non multum læ-
des. Vbi uerō sunt diuturniores, nisi ab initio cibo
uberiore reficias, hominem simul cum morbo pe-
rimes, aut intertempuè uictus modum commu-
tabis. Neg enim oportet statu accedente offerre
largiorem cibum quā prius: fed contrā, potius
tenuissimū uictum, qui in toto morbo exhibea-
tur, in statum referuare. Distinguendum autem
est, num exquisita, an minimè exquisita sit febris.
Etenim exquisita tertiana, ad maximum septem
circuitibus indicatur, estq; minimè periculosa. Al-
teram uerō nō exquisitam, quandoq; uidet, quum
in autumnō incepisset, in uere desisse. Quantum
autem hæc natura inter se differunt, tantum ratio-
nabile est & rationem uictus mutare. Ergo si quæ
in principio sermonis tertianarum febrium indi-
cia scripsimus, omnia adfuerint, exquisitam red-
dunt tertianam. Cuius accessiois tempus bre-
ue, quatuor, aut quingis, aut sex: at longissimum,
undecim aut duodecim horas complectitur. At-
que huiusmodi febrium urinx, tertio die, aut ad
summum quarto, coctiois signum ostendunt.
Quibus sanè indicij exquisitam, à non exquisi-
ta tertiana distingues. Eadem quoq; ratione ex-
quisitam quartanam & quotidianam. Cui enim
omnia insunt indicia, quæ in quartanis febribus
antea descriptimus, hæc uera & exquisita est quar-
tana. Cui uerō minimè, spuria & non exquisita
existit. Quotidiana etiam cui omnia quæ diximus
insunt, exquisita est: quæ autem eam naturam non
habet, spuria. * Non igitur quemadmodum ex-
quisitæ quotidianæ & quartanæ, sic etiam non ex-
quisitæ, sunt longæ. Nam quemadmodum exqui-
sita tertiana est breuis, sic & quotidiana & quar-
tana diuturnæ. Ceterum non licet uobis bene
peranoscere, nisi quantitatem morbi atq; uirium
accuratè expendamus. Etenim si uires adeo ualide
fuerint, ut morbum uincere possint, necesse
est ægrotum euadere. Sin uerō contrā, omnino
moriatur.

Tertiana est
breuissima mi-
nimsq;

Quartana est
longissima, mi-
nimsq; pericu-
losa.

Quotidiana est
preloxa, neq;
vacans pericu-
lo.

Acuti & uide-
ntisq; morbi,
tenuissimū uic-
tum tantū po-
tulant: uero
rem, longiusq;

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

Tertiana ex-
quisita ad ma-
ximum septem
circuitibus in-
dicatur.

De

Quotidianæ
quæ præcipuè
solum corrip-
re.

Quotidianæ
rem in ducit
ari non termi-
nantur sudoribus.

Urina intermi-
tentium singu-
la propria.

Febrium conti-
nuarum indicia.

De cura exquisitæ tertianæ. Cap. ix.

Exquisitam ergo tertianam, ut quæ ex fluxu bile comota inualeat, quàm maxime fieri potest refrigere, atq; humectare oportet. Nam contrariarum cōtraria remedia sunt: quæ quidem quod superfluum est, reprimunt: quod aerō deficit, suppleat.

Ad fluxum bilis humor, omnium qui in corpore sunt, aridissimus, calidissimisque existit. Hunc igitur, quum ad ventriculum repit, per uomitum educere oportet. Quū aerō uergit ad inferiora, eodem modo per aluum: id quod fieri solit sponte in exquisitis tertianis. Per urinam quoq; & sudores oportet ipsum uacuare. Ac uenter quidē, mollibus clysteribus inanidus est: urina uerō, porcionibus, in quibus apii, aut anethi maduerit, prouocanda.

Quod si ribi cōctionis signa monstrantur, iam cum fiducia aliquid abstinēti exhibebis: quod a lloqui summū est remedium, ubi inestauerit bilis, si præsertim ex ipsius coma, quantum sit satis, accipiens, meliorato innoxeris. Balnea uerō calida ex aqua potabili, profunt: tum quia aliquid bilis educunt: tum quia sua qualitate & humectat, & potentia refrigerant. At marinx aquæ salse, nitrosæ & sulphureæ, plus quidem bilis educūt, sed magis sua qualitate nocent, quā euacuationibus iuuent. Semper aut oportet contrarias qualitates, illis qui inualuerint præter naturam, opponere: quū hoc multo plus iooer, quā quomodo liber euacuare. Hic itaq; in balneis scopus fit, ut corpus maderet, atq; humectetur. Vbi igitur plurius olei calidi infuderis, ad aquā perducere, ac maderescere oportet. Quod si in ea natare uoluerint, quantum id facere possunt, permittendum.

At qui balneis admodum desectantur, si etiam bis in die lauari permiseris, non aberrabis. Sed illud semper habeto in memoria, oportet ut id faciant. Si uerō etiam cōctionis signa ostendantur, si sæpius laueris, nihil deliqueris. A uino autem, antequam morbus coquatur, prorsus est abstinendum. Verum ubi concoquiti cœperis, dandum est ab iotio tenue, aquaticum, atq; paucum. Vbi uerō iam propē est morbus solutur, amplius est offerendum. Cibi autem quicunq; humectant, atq; refrigerant, omnes utiles sunt exquisitis tertianis. Cæterum quantitas in ipsa sit tanta, ut bene concoqui possint. Ex oleis quidem, atriplex, bistrum, lapathum, malua, lactuca, & cucurbita. Ex alijs uerō, prisanæ succus, forbino ex alica, expiscibusq; laxatiles. Ex uolaribus denique, quæ mollibus constant carminibus. Quæ autem talia non sunt, eorum alæ: testiculū quoq; gallorum, & suum pedes, & cerebra. Paruorum uerō si etiam dederis carnea assas, nihil nocetis. Sed & oua ad forbendum uolens offerenda, & præsertim latelli corum inanis his facilius quā pars alba coquantur. Ex fructibus autem illos tantum degunt, qui non sunt omnino difficiles cocti. Oportet abstinere à melle, sinapi, salitris & acrisus omnibus: sicuti & à uinis satis uersutis & calidis.

De cura tertianæ nothæ. Cap. x.

In ijs uerō quæ nō adeo exquisitæ sunt, prouidendum est, ne morbus augeat, ne uis agrotantis uires corrumpat; quæ laborare longiori tempore debent. Quare operæ precium est scire, ad quantam magnitudinem morbus ipse sit peruenturus, & quantum sint ipsius ægri uires: ut ad ea inspicias

quæ maius auxilium possolant, inedia quidem in ualentioribus uiris uiribus, & morbo cōcoctū difficulti: largiori autem cibo, ubi uires sunt infirmiores, nec morbus admodum ad cōcoctionem estumax. Iam uerō in tertiana nō exquisitis, nec statim circa iotina balneare expedit, sed quum primum cōctionis signa apparuerint. Nec ubi quotidie offerre expedit, sed alternis diebus. Quia uerō & caliditas circa præcordia iuuat, & forbitio: neq; concoquantur facili, & clysteria nō admodum mollia. Quod si sanguinē mittere oporteat, neq; hoc quoq; omittendum est: sed ab initio statim tantum sanguinis detrahendum est, quantum præsens status exigit. Sit autem totius uictus ratio, non quæ humectet, atq; refrigeret uniuersum corpus: sed quæ aliquid modum etiam amigat, ad calfaciendum, incitandumq; plurimum. Primum igitur eos iuuat prisanæ succus pipere adiecto. Ad hæc, hyssopum, uel origanum, uel spicam nardi multis infundens, & decoquens, ad bibendū propina, & quæcunq; alia prouocantia urinam, ex parte illis, quæ præter modum calefaciunt, excitantq;. Maxime uerō post diem septimum dandae eis iugiter est abstinēti coma. Et quidem oxymel ponere plurimos iuuat: & aliquid ex ijs quæ moliter centrem subducunt. Vomitus etiam post cibum, adeo his quibus hæc febris perdurauerit, utilis est, ut multos sciam solis uomitibus statim fuisse curatos.

De cura quartanarum. Cap. xi.

Quartanas ab initio mediocriter, ac leniter tractare oportet, nullū forte medicamen, aut euacuationem exhibentes: nisi forte sanguis uehementer superabundans appareat. Cæterum si oena incisa, is qui fuit, niger & crassus uideatur (qualis in ijs præcipue uisitur, qui liene laborant) audacius mittendus est. At si flauus, ac tenuis cernatur, subito suppressendum. Venam uerō secare oportet, ut interiore, uel mediam, quæ est in sinistro cubito. Viscum deinceps instituire sine flatibus, ac oporimum: uentremq; emollire, ijs quæ usitata sunt, expedit. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus utendum est, à principio quidem mollibus, postmodum uerō acrioribus. Arcendi sunt autē à suillis carminibus, ab omnibusq; edulsi quæ tenacia sunt, & tardum habet exitum, quæq; tum refrigerant, tum siccant corpus. Vino uerō utendum est albo, tenui, & mediocriter calido, & uolaribus quæ boni sunt succi, nec in paludibus degunt. Præces sunt adhibendi, qui facili cōcoquantur, ac molles carminibus, nihilq; tenax habentes. Utendum est autem balsamentis, & sinapi: ac certis diebus medicamē diatrion pepercon, uel diosporicum est assumendum. Quod si quotidie per tantum cum aqua biberent, rectē etiam facerent. A frictionibus autem, ambulationibus, atq; balneis, nō sunt penitus prohibendi. Quamquā si omnino possent à balneo abstinere, solis contenti frictionibus, inde plurimum iouarentur. Jam si quartana ipsa sit breuis, nec admodum uiolenta, nihil nocuerit si diebus interiectis ad cōsuetā exercitia se transferant. Hæc igitur ab initio, & usq; ad statum sunt adhibenda. In statu autem subleuol uictus ratio adhibenda est, quā ante, uel post. Statim uerō æger continendus in quiete est: ac uisceribus prouidendum unguentis & cataplasmatibus.

Tertianis in
dus uictus ra-
tio conueniens

Tertianis no-
thæ confert pla-
rimum uomitus
prouocatus post
cibum.

Quartanas
in principio est
tractandas le-
uiter, nullamq;
tem uolens
est fortis euacua-
tionem.

Sanguis mis-
sus in quartana
num quater em-
lenda.

Quartanis vi-
ctus ratio con-
ueniens.

Diatrion pepe-
ron quartana
uile.

Peper con aqua
singulis diebus
bibit, ad quar-
tanam facere.

Quartana de-
tenta rugenda
est: rejecta ru-
gescit, cata-
plasmatis, &
mollimentis.

Tertianæ ex-
quisitæ curatio.

Contrariarum
cōtraria reme-
dia sunt.

Flaua bilis qua
lis sit humor.

Vinum qua
prouocet.

Abstinēti est
remedium san-
guinem contra bi-
lis molitiam.
Balnea dulcia
cor tertianæ sub-
leuolant.

Alterare inua-
lescentes quali-
tates febiles,
quā natiuitas,
magis cōducit.

Vinū corruptū
tertianæ propi-
nandum nō est:
si, antequā op-
erantur signa cō-
ctionis.

Tertianæ ex-
quisitæ quæ vi-
ctus ratio con-
ueniat.

Suum pedes ex-
cortica confre-
re tertianæ, nec
non assis por-
celli carnes.
Vicia eorum
facilis quā
alba cōcoquantur.

Tertianæ no-
thæ curatio.

*Quartana de-
tinent, effi piam
purgandis,
fol. apparcu-
bus iam signu
colicis.*

*Theriacin
quartana prin-
cipio exhibetur,
quod molatur.*

*Quotidiana
curatio.*

*Febrim conti-
nuam quod o-
la citra acci-
dens infolant cu-
ratio.*

*Vitius humi-
dus in febrim
annuus acci-
dens.*

*Aquam frigidam
propinquant, o-
fa in ardore
febris quom
primis appa-
ruerint signa co-
licis.*

*Febrim cum ac-
cidentibus infi-
lantium cura-
tio.*

que mollire & laxare possint. Deinde medicamē-
tis utendum, quæ citius urinæ viam habeant. Vbi
verò coctio nis signa apparuerint, tunc sanè pur-
gare oportet his quæ humores atros inaniant, non
semel tantum, sed sæpius, si videatur necesse. Ven-
dum autem & uominibus statim à cibo: & si ni-
hil prohibuerit, elleborū album est exhibendum:
primò quidem, permistum radicali: quòd si nihil
profecerit, ipsum per se. Cæterum qui nequeunt
euomere, si uehementius per inferiora purgent: ac
postmodū offerant eis in portu, medicamentum con-
fectum ex uiperis: necnon quod succum cyrenai-
cum recipit. Quicumq; uerò ab initio aliquid ex
hisce medicamentis exhibuerūt, aut omnino ante
statum, quartanam quæ erat simplex, duplicem
reddiderūt: aut omnino maiorem, atq; difficilio-
rem: ex duplici autem triplicem, aut omnino am-
bas difficilesiores.

De cura quotidianæ. Cap. xii.

Quotidianā autem quam uolueris curare, oxy-
melite utitor post primos dies, & illius quæ probè
possunt urinam citare: uniuersumq; totius uictus
caput sit ad incedendum efficacies. Circa statum
uero, de uentriculo est habenda sollicitudo, ac de
ipsius ore præsertim. Deinceps iubendum est, ut
post radicales & cibos assumptos uomant. His e-
riam quæ pituitam subducunt, utendum.

De cura febrim continuam, quæ earet accidentibus. Cap. xiii.

In continuis autem febribus, quibus nō ultra
septimum futurus status est, si uires ualide sint, &
zetas edentur, admodum exquisitus & tenuis ui-
ctus est institutus. In quibus uerò uel status to-
tus morbi longius abest à septimo, uel uires ro-
bustæ nō fuerint, uberiori cibo ægri sunt reficien-
dis: quemadmodum prope statum tenuiori. Quā
autem iam adest status, tenuissimū uictum serua-
re oportet: deinde rursus semper uberiorem. Sanguinem
uero mittere oportet, & ob morbi ma-
gnitudinem. Quibus autem rubor multo inten-
sior, quàm pro naturæ ordine, & maior, quàm
pro consuetudine, totius corporis moles, uenæq;
eminentes, extensæq; fuerint, his etiam est auferen-
dus, nisi uires, aut ætas, aut aliquid cōmemorato-
rum, prohibuerit. Quòd uerò humidus uictus in
febribus acutis omnibus iuuat, rectè iam dictum
est. Cremorem igitur pituitæ, his quibus non a-
ccescit, exhibere oportet: & melicratum quibus
non bilescit, & sorbitiones ex alica, & panem ex a-
qua. Porro in quibus præter modum calidis, u-
rentibusq;, quom primū coctionis signa appa-
ruerint, tunc auster aquam frigidam propina-
bis. Modus uerò in quantitate seruetur, quemad-
modum tempus anni, regio, ætas, natura, consuetu-
dine exigunt.

De curatione febrim cum accidentibus.

Cap. xiiii.

Quæ febris cum accidentibus urget, non æ-
què simplicem exigunt curationem: sed pro uiri-
bus merendum est, quanta sit ipsa febris, quan-
tumq; accidentibus imminet periculum: atq; ad id
quod uehementius fuerit & difficilius, in-
tendendum, non posthabita omnino etiam alte-
rius cura. Etenim ubi simul cum ipsa febre senti-
tur circa os uentriculī anxietas, morbus, & imbeci-
litas, prius sanè uacuandū humores non sunt,

quàm os ipsum uentris corroboretur, etiam si cru-
ditate aut cacochymia æger ipse laboret. Sed nec
si fuerit febris cū uentris profluvio, alia est opus
euacuatione. Verū hæc sola sufficit, quāuis non sit
pro ratione ipsius plenitudinis. Iam uerò si quis
simul & distentione neruorū laborauerit, & san-
guinis egerit missione, neq; huic tantum semel
mittere oportet, quantum exigit morbus, sed ali-
quid etiam accidenti est luquendum, cuius causā
sæpe sudores eueniunt, & uigilie molestant, & ui-
res ægroti debilitantur. Ita etiā si uehementes uig-
ilæ, aut dolor intensus ægrotum cruciat, cau-
de sunt subite euacuationes, ac multæ. Ipsa præ-
terea ambiens aëris tēperies, loco accidenti euacu-
dam habeda est, dum exquirat calida & sicca fue-
rit qualis est tēpore medio inter Canis & Arcturi
ortum. Si etiā ualde frigida fuerit, tunc quoq; san-
guinem mittere formidandum. Ob hæc etiā neq;
in locis admodum calidis, aut frigidis, sanguinē
mittere audeamus. Quòd si regionis tēporis status
conferant, etiā omnino abstinemus: si uerò non
cōsentiant, euacuamus quidē, sed multo minus, q̃
neutrū prohiberet. Tolerantia etiā ægri, ceu quod dā-
dam accidens, expendenda uenit: nec secus ipsa
temperatura. Nam quicumq; calidi & sicci natura
sunt, hi omnes faciliè ab integris euacuationibus
offenduntur. Cōsuetudo quoq; nō parui momen-
ti est, quā ad omnia alia, tum præcipuè ad euacu-
ationis indicationē. Quidam enim nunq; prius fue-
re uacuati, & multis cibis sunt usi. Nōnulli cōtra
nec multis cibis sunt usi, & euacuationibus affue-
uerunt. Hos igitur intrepidè euacuare oportet, si
reliqua etiā cōsentiant: alios uerò, ne si reliqua om-
nia id faserint. Eodem pariter modo & corporis
habitus considerandus. Nam qui densa & solida
carne constant, nō offenduntur faciliè. Quare nō
oportet uereri ipsos uacuare ex toto, si quidem &
alia id iubet. At qui mollem, & tenellā, & dissu-
tem carnē sortiant, si mirū in modum sunt ad pa-
tiendum habiles. Quare uel si reliqua omnia san-
guinem esse mitemdū fudeant, nō tamen id face-
re audendum est, sed utendū alijs euacuationibus
moderate. Eodem modo & in his qui supra modū
crassi aut macilenti sunt, ab incidenda uena super le-
gendum, cæterasq; integras euacuationes uereri
oportet. His etiā & ætas annueranda est, ueluti
quoddā symptoma, quod prohibendi integræ ua-
cuationē uim habet. Nec enim pueri, neq; senes
hanc sine noxa tolerant. Hæc igitur omnes, si
dispositiones horrentur, nō semel, ex eo toto, sed
paulatim oportet uacuare, inedq; moderate, fri-
ctionibus, clysteribus mollibus, perfusionibus,
atq; balneis. Quòd si duo contraria symptomata
aut morbi cōcit, aduersus id quod magis urgeat
istandū, nec interim alterū negligendum. Eas u-
erò quæ habentur ex accidentibus & morbis indi-
cationes, non simpliciter, sed secundum causam à
qua singulari sunt, cōsiderare oportet: qualia sunt
defectus animi, & exolutio: quæ duo nomina de
unica re dicunt, cuius plures existunt causæ. Siqui-
dem nō solum per uarios a fectus corporis, sed e-
tiam in uehementissimis perturbationibus animi,
nōnulli exoluti fuerunt: præcipuè senes, & natu-
ra imbecilli. Etenim plures eorum tristi, aut læ-
tati, aut irati, animo defecerūt. Qui aut magis ro-
busto sunt corpore, ex immodicis euacuationibus

*Febris quæ
cum alio fuit
infirmitate, non
est alia opus
euacuatione.*

*Euacuationem
febri ac mola-
ta, quando co-
menda sit.*

*Sanguinis mis-
sionem probi-
bet ætas multo
tatio usq; ca-
lida aut frigi-
da.*

*Caldi & sicc
offenduntur ab
immodicis uac-
uationibus.*

*Cōsuetudinem
plurimum possi-
at uacuationis
indicationem.*

*Habitudinem
corporis quæ
nam facili
fines sangui-
nis ferat, &
quæ difficilis.*

*Pueri senesq;
integras uacu-
ationes nō ferunt.*

*Animi uoluntatis effe-
ctus, sine præ-
cipuo atq; mola-
tibus existunt.*

bus idem patiunt. Iam uero si abcessus quipsum rumpat, uires uehementer laedit, ac tum precipue, cum materia simul tota ad uentriculū, uel ipsius os, aut thoracē defluxerit. Quod si quādo etiam nos abcessus secantes, totū simul emittere pus uoluimus, animi defectū subsequi est necessarium. Nec uero laborantibus aqua inter cutē, tota simul humiditas, quā ea prater naturā sit, potest sine noxa uacuari: sed tunc quoque necessum est, hominē defecere animo. Ex dolorū etiā uehementia, similiter dissolutiones accidunt. Quinetiam neruus percussus, & musculi caput, & maligna in artibus ulcera, & immoderata quēdā frigiditas aut caliditas, utralisq; roboris exolutio, praterea insignis cruditas, obstructioq; aut inflammatio alicuius precipue partis, aut os uentriculi malē affectū, aut improbe euacuaciones, aut denigalia multa, de quib. postea dicemus, in septe possunt defectū animi. Quārū sanē causam singulae propriā curationē desiderāt. Porro eos qui ex cholera, & alui profusio, & alijs rumlar ge, tum uno impetu facis euacuacionib. dissoluantur, frigida spargere oportet, & nares cōprehendere, & os uentriculi perficcare, iubereq; ut uomāt, stomachū irritando digito uel penicini missione, ac deniq; alligare pedes & manus. Oportet autē nexus fieri, plures quidem ac fortiores circa manus, quando per inferiorem partē sūt euacuandēs. Nam si uacuatio per superiora fiat, plures ac uehementes ligaturae curibus admolindē sunt. Si ita quoq; aliquē parti fluxionē patiēti expedit innescere, in aduersum tendentē, sed moderate. Nam si nimis tendat, atq; ex hoc fatigē, nihil minus irritatur, q̄ si inclinaret ad eundē. In uniuersum autē, aut ad cōmunia membris patientib. in aduersum trahere oportet, aut ad ea in quib. est fluxionis origo. Atq; ideo uehementes euacuaciones quae ex matricib. sunt, ac curbiculā iuxta mamas appositae, statim sedāt. Quae uero ex naribus, hepāt ac spleni, secundū naturā patientē. Quod si ex ambabus narib. simul plurimus sanguis effluat, utriq; uisceri applicandae sunt. Vinū etiam aqua frigida temperatū, curat eas, quae ex magnis sūt euacuacionib. dissolutiones: ac tūc praeferim, quādo humores sūt ad uentriculū. Ceterū si aliquid uiscus sit in inflammationē, aut caput doleat uehementius, aut aliqua alienatio animi affuerit, aut febris ardēs in morbo crudo, magna & penē insaniabilis ex potu uini, huiuscemodi affectū, nouemētra proueniūt. Iam uero qui frigidū potare nō sunt assueti, aut manifeste ex ipso laedunt, quib. natura sunt frigidiore, & qui in extrema sunt senectute, & loco degūt natura frigidiore, & repore hyberno, caute re ad potione frigida debent. At qui cōtrario modo se habēt, nō intrepidē illū offerre licet. Sed autē uinū, in fluxionib. quae ad uentriculū sūt, calidū simul & tenue, quale Lesbū. In sanguinis uero fluxibus, crassum & nigrū, & acerbū. Ipsis autē locis imponere oportet, uelut uentriculo, matri, stomacho, & thoraci, quae corroborandi uim habent: capiti autē & fronti, prater haec, illa etiā quae refrigerēt. Ex quibus uel in superficie, uel in naribus, uena aliqua disrupta est, medicamen aliqd ex his quae sanguinē suppressere possunt, est im-

ponendū. Porro balneae in fluxionibus ad uentriculū quidem aptissime sunt: at sanguinis fluxum acriter irritat. Et quicūq; ob sudoris copiam animi defectū patiunt, his etiā plurimū nocent: ut quas potius astringere oporteat, atq; refrigerare. His etiam uinū frigidū exhibendū est, ac nihil omnino calidū. Sed nec etiam artus ipsos ligare oportet, neq; cogere ad uomitū, neq; ullomodo mouere. At uentus refrigerantibus aditū preparare: aerem quoq; domus alterare frigida & acida qualitate, myrtorū frondibus, & uinum capreolis, ac rosae pauimentū consistentes. Nihil uero horū confert, ubi fluxiones ad uentriculū sunt. At qui exoluiunt ob plenitudinē, eorū artus plurimum perficcare oportet, calcifcare, ac deligare. A uino uero & cibis sunt abstinendi, & a balneis, si febriant. Sufficit autē, si eis dederimus melicratū potū, in quo ebullierit thymus, uel origanū, uel pulegium, uel hyssopus. Conuenit quoq; oxy meli. Quae ex matrice laborāt, atq; exoluiunt, non aliter sunt curandae, excepto oxy melite. Fricare autē ac deligare magis earum crura oportet, quā manus. At quibus uires aut sursum, aut ad latus reuoluitur, inguinibus & coxis cucurbitulis applicandis & naribus quidē, ea quae fetidissimū habent odorem: matricibus autem odorata, & ea quae laxare calcifcere possunt, medicamēta offeremus. Si uero ob imbecillitatē uentriculi, animi sequeat deliquiū, ea quae roborandi uim habent, oportet emphasiā adhibere: quale est quod sit ex palmulis, uino, farina hordei, croco, aloē, & mastiche. Mastiche autē ipsae quae constant ex abstinētia, oleo melino & masticheino, necnō nardo, uino, & cenanthe. Quod si exuriantur, miscere ex refrigerantibus aliquid cōuenit, uelut cucurbitae, lactucae, portulae, folii intybi, atq; uuae acerbae succū. Aqua etiā frigida plerumq; uisat malē affectos stomacho, si tempestiue, hoc est, in declinatione, exhibeatur: ubi quoq; plurimū obest. Atq; his qui os uentriculi imbecillū habent, uinū calidū exhibere oportet, si nihil prohibeat. Plurimum uero uisat eos qui sic laborant, etiam frictio extremorū. Quod si ex ijs remedijs nihil melius se habuerint, eos quidem qui aduisti sunt, quamprimum ad balneae ducere oportet. Qui uero aliquid frigoris sentiunt, medicamen diatrion pepereon, ipsūm piper solum, atq; etiam abstinētiū bibant. At qui ex iniurijs humoribus os uentriculi mordacitibus exoluiunt, hos post aquae calidae, aut hydre-lae potū, fac uomere. Vacuatis humoribus, partem lesam oportet modis omnibus roborare, partim his quae ad mouent extrinsecus, partim abstinēti potione. Ceterū si humores adhuc in uentre cōstant, minimē sanē astringere, sed tantum concalfacere oportet. Vbi uero multa pituita in ore uentriculi accruata fuerit, fouere quidem plurimū oleo, in quo ebullierit abstinēti: postea melicratū exhibere, in quo hyssopi, uel quid fimum insutum fuerit: item oxy meli, & piper, & diatrion pepereon, & diospoliticon medicamen. Viētus ratio in summa, incidendi uim habeat. Quae uero ex nimia frigiditate eueniunt exoluciones, eodem modo curandae sunt, quo fulmi, omnimodo calefacientibus. Vinum igitur

Deliquij animi ob sudoris curatio.

Exoluti a plenu tudine quomo do sint curandi.

Viri sofisticatio ni curatio.

Exolutio ob uentriculi imbecillitatem curatio. Venterculum roborantia.

Vinum calidū propinquant in uocula uenteris in.

Exoluti ob praenatu, ventri et suffocant, quomodo curandi sint.

Exolutio ob refrigerationem curatio.

Ex per se huiusmodi abcessum, si totum simul vacuaret, uires ducit.

Hydriū aq̄m non posse totum simul vacuari, obijci deliquio animi.

Dolor uelut uires erit.

Deliquium animi quoq; indicat

Deliquij animi a uacuatione medica, curatio

Profusio melle bra sedam curbicula iuxta mamas appo sita.

Sanguis fluxio in uentre curbicula praecordij admota compescit.

Vinum frigida temperatum, uires exoluti ob immoderat euacuatiōem inflamat.

Vinum quibus non dandū.

Prigida potio quomodo curatio.

Ex quibus fluxio per uires.

Partes per quas sit fluxus, corroboranda.

Caput et frigidum, ubi sanguis fluxio per uires.

eis exhibere oportet, calida temperatū: ac cibos qui calfaciendi naturā habeāt. fricareiq; & calfacere ad ignē simul. Quę ex calore nimio accidunt de liqua animi, q̄s quę refrigerandi & roborandi vim habēt, curant. Statim igitur ipsos corroborabis.

De cura capitis à varijs occasionib. lxxi. Ca. xv.

Igitur symptomatū causā, congruam curationem ostendunt. Veluti si quis doleat caput, si multū fātidat cibos, ex famēq. sentiat moribundationem, iubeudus est ut euomat: nam ubi bilem uomit, ubi pituitam, ubi utrumq. Porro qui cum grauitate dolores capitis fiunt, multitudinē indicant. Qui autem cum mordicatione, uaporis humoris uae acutudinē. Cum pulsu uero, inflammationem. At cum tensione, si quidem sine grauitate ac pulsu, spiritus larulentē & crudi multitudinem. Si uero cum pulsu, inflammationē corporis membranosā. At si adit grauitas, multitudine intra membranas cōtēta ligificatur. Cūm igitur omnia distinxeris, causām ex qua horum singula fiunt, cōsiderare oportebit. Veluti si multitudo uaporis acrie humoris continetur, ad uertere oportet, nūquid ob magnitudinē febrium humores diffusi, ac ueluti effluuētes, ad caput ascenderint, aut propter eius partis imbecillitatē, aut ob totius corporis plenitudinē: lance enim totius corporis euacuacionibus liuid difficaliter curabis. Eam uero quae ex partis imbecillitate cōtingit, partem quidem in cōtrarium trahendo per totū corpus, partim ipsi capiti remediando attingit. Atq. in contrarium quidem trahes, clysteribus acribus, nexibus, frictiōnib. plurimis infernarū partiū, & si expedit, sanguinis aliquatula detractioe. Partem autē sanabis eo tempore quo ad uniuersum corpus retrahis, ut utens asperginibus, quae a capite uim repellendi habent: ac dem euacuabis: postremo deniq. corroboraui. Repellit autē oleū quod immaturum dicitur, ac tum oxorhodium, tum rosaceum, & quaecunq. ex capinibus papaueris, & teneris oliuē germinibus, & hederæ corymbis, menthaq. uindis, & silymbio fiunt. Vtendi uero ipsi, in multitudine crudiori & frigidiore, tepidius in calidiorē autem & biliosiorē, frigide. Eua cuat enī dissoluitq. oleum calidum, ipsum per sese. & magis si annuq. fuerit, & Sicyonium, aut anethū seruēscitū in ipso fuerit. Quod si spōdyllon, uel ferpyllū, uel pulegion comā, uel calamintū, uel methū, uel silymbū, intus decocoris, ita enī crasiores succos uacuauis. Hęc uero ipsi uiriū enī aliqd mēbro imbecillo adq.uit. Quod si enī ex uio uideat, per nares atq. palatū purgatio molitū ē, sternuamētūq. exarandū. Si ad balneae hominē duxeris, ficcis sindonibus caput enī perfundat, saliq. & nitrū, & synapi, sine oleo imponendū. Hae itaq. sint ex partib. imbecillitate, doloris capitis medicinae. At quando ex magnitudine febris accidit, & medicamēta ad habere cōuenit, frigide qualitates ac uires, & quae ex hydreleo & oxorhodo, & papaueris capitis perfusiones cōitant, expedit. In dolore autē capitis, q. sanguinis fluxū, aut uomiū deceptorū significat, remedia inuestigāda nō sunt: cū nō ac cūctis, sed talis dolor bonū existat signū. Si quidē ubi natura excretionē aliam, ac praeuicē uomiū tum, aut sanguinis per nares fluxū molit, hōi in separabile indicū ē capitis dolor. Cōsiderandū igitur ad cognoscendū crīsum, primū quidē sunt febriū species, an calidē sint, atq. uerentes: nā hae per excretionē iudicari cōsueuerunt: quēdam

Capitoli del libro
per ciascun anno
scuola.

Capete delata
Species varia.

Capitis dolor
ob imbecillitate
contractis, cura-
tio,
R. aquilone ma-
de decortis.

Repetite banno
ris à capite, qua
cūmodi pueri.

Vacuare de-
tente; capite lo-
morte quod con-
morte p. l. l. l.

Capitis dolore
ex magnum
ne fides art, et
Fama. 25. 1.

*Ardentes febres
confocervant in
ducere per acuta
transi.*

Espressioni di
valore artistico co-
rrente.

Evolutionis ob
fervu, aut phie
gometi magni
puduit curatio.

உருவகங்கள் எல்லாம்
உருவகங்கள் ,
உருவகங்கள்.

Exaltationis praespectationem obvia curatio.

Exolutionem ob
scuram praecipue
obstruere facit
et a. curatio.

*Evolutionis re
immedica pueri
ant aqua inter
enti euagatio-
ne, curatio.*

Evolutionis ob-
dolosus antithi-
sorum curatio.

Exemplares en-
ta a variação das
oscilações, com a
fig.

Facultas vna
lin. naturalis, et
animalis unde
proficiscitur, et
ex quibus digno
fici eorum ambu
calis si possit.

dum quæ molliores sunt, ac eluti⁹ fumigantes, diu durat, & sæpius in abscessus cõtenet. Secundo loco, an morbus sit salutaris. Nam quis, obsecro, bonã crîsim in morbo pernicioso expectauerit? Tertio ad hæc totius morbi tempus considerandum. Nam si principiũ uel augmenti ad sit igni, minime aut statum, nec cõcoctionis signa in urinis, uel spuris, uel alui excrementis cernantur, nõ est quod bonã spes crîsim. Porro difficilius tolerantia antecedere omnẽ crîsim solet. Quis quidem si in die accideret, crîsis sequeretur noctu. Si aut noctu, in die. Si igitur tale aliquid uideas, considerandum est, quous sit ægritudinis dies. Et si septimus dies, etiã ex paruo naturæ apparatu, ad crîsim per excretionẽ mouet. Sextus uerò magno apparatu indiget, & sæpe neq uilla in eo sit crîsis, nec sine periculo, nec fideliter accidit. Ergo si dolor capitis statim ab initio nõ inuasit, sicuti quoddã ipsius morbi symptoma, sed¹⁰ * in ipsa ante crîsim perturbatione: dein si collit¹⁰ etiã aliquid cõdolescat, & præcordia retracta sint, aut repetẽ superuenierit difficilis respiratio, pulsusq in tumore subito elati, nõ reciderint in paruitatem, neq debiles fuerint, statim crîsis per sanguinis fluxũ & naribus expectanda est. Si uerò nõ modò nõ deciderint, sed etiã in altũ attollantur, & uehementiũ assumpserint, faciem iam egrotantis inspicere oportet. Nam si quod in ea membrũ palpiter, aut uenæ quæ sunt in temporibus pulsant, aut malũ, uel nasus, uel oculus rubidior sit factus, magis etiã talis crîsis est expectanda. Quod si etiã inuiti illachrymẽt, uel imagineĩt se splendores cernere, ac nares ipsas scalpant, tunc nõ iam fluxurũ, sed iam fluentẽ cõspicias sanguinẽ. Nec uerò ex his perterrearis, si hominem desipientẽ, aut resistentẽ uideris. Nam & hæc humorũ repentiũ ad partes superius indicia sunt. Præterea si ægrotus sit adolecens, aut aliquo natura calidus, aut multo sanguine abundans, magis adiuu de hoc sperandum erit. Quod si sæpius etiam antea illi sanguis & naribus fluere est usus, hoc uel solum sufficit fluxus sanguinis spem cõfirmare. Si uerò & tempus anni ætas sit, uel calidus cõli status, & cõ plures eo tempore crîsim ex sanguinis fluxu habuerint, ægrilq corpus plenu extiterit, & cõsuetæ excretiones retentæ, hæc inquit omnia spem uehementius agebũt. Has itaq & alias excretiones omnes prænosce-
re licet, si hæc duo tantũ explorauerimus, & unde naturæ motus agatur, & in quam partem. Si quidem quæ deficiunt adiuauiamus, & quæ immoderate feruntur, coercerimus, si ita nouerimus. Veluti cõsistent sanguinis fluxus ex splene magnæ cucurbitæ sinistris præcordijs superpositæ, faciliẽ retrahunt. At qui ab hepate proficiũt, deatris. Qui ab alijs membris, eadem ratione.

GALENI PERGAMENI de arte curatiua ad Glauc. lib. II.

CAP. I.

DE his aut quæ in singulis corporis partibus sunt passionibus, dein ceps sumus dicturi, ab inflammatione auspiciat: quod sæpius hæc accidat, plurimq ipsius sint differentiar, ex quarũ singulis solent febres oriri. Cõmu-

nis igitur in omnibus est immoderata caliditas, & ueluti quædam effervescentia, unde & phlegmones nomen de ipsis efferre ueteres cõlocuerunt. Propriũ autẽ quandam in singulis differentiam inuenies, ex qua eius speciem agnosces, & conuenientẽ affluẽtiã medelam. Porro prima inflammationis differentia est, secundũ quam hanc quidem humidam, illam uerò esse siccam cõtingit. Humidã quidẽ, quæ ex calida fluxione membrum occupante accidit. Siccã uerò, quando nullo humore influente, calor naturalis effluẽscit. Hæc autẽ, usq ad aliquid quidem, ueluti febris est membrũ. Cũ uerò iam ad immoderatã caliditatem ac siccitatẽ peruenierit, corruptio atq extinctio omnimoda fit. Rursus illius differentiar quæ cum humorũ affluxu accidit, multæ species existũt. Nam fluente sanguine, altera: flaua bile, altera: ambobus simul, alia tercia. Et quidẽ in eorum singulis, uel iam putruit id qd influuit, uel in membro impactũ putrefcit. Præterea uel crassum est, uel tenue, uel optimũ, uel deniq aere. Sanguine igit optimo ac mediocriter crasso ad paricula aliquã cõfluente, atq ob multitudinẽ cõculcato, uehementis dolor arripit hominẽ, nisi hebetis sensus ipsa fuerit particula: pulsusq in profundo permolectus sentit, tendiq omnino et cõtundi membrũ apparet, cum uelimeĩt incendio, renitentia & rubore. Quæ sanẽ passio totius generis uomen recipit, inflammatio uocatũ, ex omni ferẽ occasione proueniens. Quippe uulneribus, distentionibus, disrutionibus, contusionibus, scissionibus, exercitorum laboribus, exartulationibus, ac præterea fracturis, & spõtanis ulceribus aduenit. Quinetiam si quando immo dictã plenitudinẽ uenæ ipse contrahant, tunc id quod superflũ est, effundunt ad aliquam partẽ, quæcunq eo tempore fuerit aprior ad recipiendum. Eadẽ nanq erit reliquis omnibus imbecillior, uel rarior, uel ad morum procliuior, uel minus nobilis. Flaua uerò bilis, quando propriam naturã seruans, unũ cum sanguine per totũ corpus defertur, morbum regũt producit. Cũ autem secerit solũ, in aliquamq decumbit partem, herpetem gignit. Cæterũ si sit cõsistentia crassa, totam exulcerat cutim, usq ad carnẽ subiectã, qui affectus herpes exedens uocatur. Si uerò tenuior fuerit, id quod in superficie est tantũ, ueluti deurit: quæ species generis sortitur appellationẽ, quum simpliciter herpes dicatur. Nam ex reliquis speciebus duabus, * illa quidẽ cuius nuper mentionẽ fecimus, uocatur herpes exedens: altera uerò, miliaris, quod in ea pustulæ parue ac multæ, per summã cutem similes milio, excidentur. Fit autem herpes huiusmodi etiã ex bile quidẽ, sed minus calida & acri, q * illæ species priores. Quod si ex sanguine & flaua bile calidioribus quã oportet, mista ipsa fluxio fuerit: aut ex sanguine quidẽ, sed feruido, & substantia tenuissimo: erysipelas hic affectus uocatur, multo inflammatione calidior, magisq flauũ colorẽ referens. Non dolet tamen affectus hic, quemadmodũ inflammatio: nec ut aliqua inflammationis species pulsus, aut compressio, aut simile inuoluit tensionem. Cæterũ interdũ miscetur inflammatio cum erysipelate. Si igitur in mal

Inflammationis
huiusmodi est
conueniens caliditas.

Inflammationis
prima differentia.

Inflammationis
quæ cum affluxu
humorũ iustit
est, multiplex
differentia.

Inflammationis
erit a sanguine
inducta.

Inflammationis
causæ.

Recipientes
superficiem
cutis, qd alicui
necessario est
debeat.

Herpes morbi
procliuior.

Herpes genitus
est.

Herpes exedens
unde accidit.

Herpes miliaris
unde excidit.

Erysipelas unde
signatur.

Erysipelas phlegmonosum quomodo accidat.
Phlegmonis erysipelas quomodo fiat.

Erysipelas phlegmonis est passio.

Carbunculi generatio.

Bubo quid.
Phyma quid.
Phlegmon.

Ophthalmia quid.
Pleuritis quid.

Synanche.
Peripneumonia.

Inflammationis causa una est fluxus.

Inflammationis certum.

Evacuatio est per quam fluxus per se dissipanda.

Cura inflammacionis curatio.

scella ipsa exuperet propria erysipelatis accidentia, affectus in erysipelis inflammationis participes nominatur. Si uero inflammationis accidentia pæpelleant, dicitur inflammatio erysipelatodes. At si accidentia utriusque esse appareant equalia, tunc erysipelas & inflammatio ex æquo misceri dicuntur. Exquisitum itaque erysipelas, curis solius est passio. Non tam in ipsa inflammatio per tinet tantum ad curi subiectas partes, sed ad has quidem præcipue: nonnunquam uero etiam ad cutim. At uero si sanguis inflatus calidus suffociter fuerit & crassius, quodcumque membrum inuaserit, hoc exurendo, ulcus cum crusta excitat: quicquid autem circumiacet, in inflammationem attollit effluenscentem, grauiusque dolentem: qui affectus carbō appellat. Similiter etiā, si sanguis influens niger exiterit, crassiusque & faculentus, & ferus, simul autem & saniem quandam tenuem admixtam habuerit, pustulas per summam cutis excitat, similes quæque ex igne fiunt. Quibus disruptis, crustosum sub ipsis ulcus inuenit. Qui affectus etiā est carbō. Phlegmone itaque in hac species uniuersales distinguunt, ad quas nimirum referuntur alix omnes particulares. Etenim bubo, phyma, & phlegmon, glandularum affectiones existunt: bubo quidem, inflammatio: phyma, quod strum augeat, atque ad suppurationem festinat. Phlegmon autem erysipelatis participes inflammationis, aut inflammationem erysipelatis participes nominatur. Sic etiā & ophthalmia, eius membræque cornæ inhaeret, est inflammatio. Pleuritidis uero, costas succingentis membræ. Quæmadmodum & synanche gutturis: atque peripneumonia, pulmonis. Eas igitur quæ in partibus apparentibus conspiciuntur inflammationes, promptum est quidem cognoscere. Quæ uero in oculis, & febres omnino asserunt, uon æquè discerni possunt.

De causis inflammationum. Cap. 11.

Eit autem una quidem apparentium inflammationum causa, eam non uisquam occulta, quæ fluxus appellatur: nisi quandoque eis coniungatur, quæ aliqua alia ex causa euidente, factæ uidentur. Cùm enim nulla ex his præcedente, repente membrum inflammationem patitur, ea quæ hunc affectum gignit causa, fluxus uocatur. Affectus autem ipse, dispositione rheumatica. In curatione curis, duo magni committuntur errores, ubi statim in ipsis auspicis, uel nulla de toto corpore prouidentia habetur: uel ipsum calit, atque humectatur membrum. At qui ratione simul & experientiam sequuntur, si totum in primis corpus uacuare quibuscumque euacuacionibus cõsulant: ipsam uero inflammationem partem, perfundere, ac superlinire eis, quæ id quod influit repellendum habent: ac denique quod in membro patiente cõtinetur, educere. uimque ac robur adiungere quæ, quæ iam affectæ sunt partibus. Verum ut rectè quis uacuacione utatur, ætatem, anni tempus, regionem, præsentem aeris itatum, robur eius qui afficitur, habitumque & consuetudinem, necnō ipsius morbi naturam oportet considerare. Ex his namque, quando uacuandum sit, aut minimè, & unde, & quomodo, inuenitur. Si igitur ad genus fluxus ferat, atque id plurimum attollatur, præterea tori corpus sanguine plenum appareat, & ualida laborantis uis,

tempusque anni sit ver, & temperata regio: æger uero sit adolefcent, aut iuuenis: is sanguinis euacuacione ex superioribus partibus indiget: oportetque eius incidere in cubito uenâ, aut scilicet interiorē, aut mediâ: cùm semper fluxiones motum ad contrariū reuellere oporteat. Ipsi autem la borant particule, si quidem nō admodum doleat, emplastrum ex semperuio, & corricibus puniceorum malorum in uino decoctis, & risa, & farina hordei cõstant, est admouendū. Hoc si quidem repellit quod influit, atque id quod continet excitat, & circumiacentia membra corroborat. Cum magno autem dolore fluxus incidente, sufficit uehementia doloris lenire, cum aliquo ex his, quæ ex uino dulci, oleo rosaceo, & pauca cera, in utroque liquata, cõstant. Oportet autem hæc lanis excipere pinguibus, quæ plurimum habent clypy: & ætate quidem frigida, hyeme autem tepida apponere. Sic etiā cataplasmata ex arnogo sfo, lente, pane, & rosaceo oleo adhibere: paulo uero dū pra patientes particulas admooue spōgiâ uino austero intinctam, aut aqua frigida, cui mixtum parum aceti fuerit. Quod si ex hac meditatione magnus usus sentiat, nec alibi pus se ostendat, mollibus medicamentis ad fluxiones utendum. Optima uero ex his sunt, quæ exiccan di & repellendi quod fluit, sine dolore um habent. Quæmadmodum ea quæ uehementer cõtendunt, atque idcirco dolore affertur, plus doloribus ob sunt, quæ exicando proficiant. Tale igitur sit medicamen, quale est quod ex chalcide constat, remissum oleo rosaceo. Si uero lanam mundam uino acerbō humectaueris appoueris, plus iuueris. Quod si pus se in particula ostenderit, cataplasma offerre oportet semel aut bis. Plus uero ad presens iuuat farina hordeacea. Adiuuendum tamè aliquid ut aceti, uel uini. At postquam seaueris, & pus euacuaueris, cauendum est deinceps, ne oleum aut aquam imponas. Quod si quando uulnus abluere oportet, melicrato, uel oxycrato, & uino, & mulso est utendū. Superponendum uero, si adhuc inflammatus, ex lente cataplasma. Si uero absque inflammatione uolueris, aliquod ex his medicamentis, quæ emplastica nominantur, & præcipue quod ex chalcide constat. Imponenda autem super hæc extrinsecus, spongia, aut lana uino acerbō infusa: ad quæ quidem opportunum est, quod aqua marinâ recipit. Vulneri autem, nullum ex pinguibus medicamentis est admouendum: quandoquid ex quilibet exiccare expedit. Ac sic sanè sanare oportet inflammationes ex fluxione ortas. Quæ uero alia de causa fiunt, humectare cal facere, nihil prohibet. Quas quid si perducere ad suppurationem uolueris, cataplasma ex farina trincea, quæ in oleo & aqua ebullierit, est apponendū. Quod si quando scarificatio oporteat, ne hoc quid uerendū est. Si uero eas quæ ex fluxionibus fiunt inflammationes scarificaueris, magnū adferes malū, ac per iniuria præferit. Quæcumque autem ex ipsis, iam inueterate existentes, post totius corporis euacuacionem, quasdam durities atque tignines retinent, ab his per scarificationem sanguinem auferre nō prohibet: & emplastrum ex farina hordeacea, & ceratum, & aliud aliquod medicamen ex discutientibus admooue. Non tamen

Rosaceum facit utam hanc non esse in citram molidam.
Cura erysipelatodes emplastrum commodum.

Cura inflammacionis doloris magnam lenitiuam, hyeme quid sit la bilis, est autem admouenda spōgia.

Represententia esse applicanda paulo supra patientem partem.
Flanquam discutientia etiam uocantur.

Vulnus, si uel per se, quod uisum ab luendum.

Supperanda in inflammationem uolueris cataplasma ex farina trincea, quæ in oleo & aqua ebullierit.

Inflammationem quando scarificanda.

ex uena

ex uena in talibus sanguis necessarius mittendus est: sed uentrem tantummodo expurgare sufficit, medicamine quod bilem fluxum educat: uel solo clysteri acris, si affectus ipse sit paruus. Quæ uerò ex ulceribus fiunt erysipelata, & quæcunque adeò manifestas causas sortiuntur, si statim uolueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si ante scarificaueris, nihil nocebis. At inflammationibus quæ cum erysipelate sunt coniunctæ, & erysipelatis cum inflammatione, adhibenda mitia curatio est: semperq; illi, quod magis præpollit, refistendū. Herpetes autem, quantum ad totius corporis euacuationē attinet, ut erysipelata curare oportet: quantum uerò ad eam quæ patienti debetur particula, non omnibus similis cura adhibetur. Nam qui exedentes sunt, refrigerari quidem desiderant, quemadmodum alij herpetes, & erysipelata: non tamē ea ferunt medicamenta, quæ præter id quoddam refrigerant, lumenectare etiā sunt apta: sed sola admittunt refrigerina, quæ maximè exsiccare possunt. Quare superimponere ipsi oportet, ab initio quidem ex uitis capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & plantaginibus. Post hæc uerò & lentē adiumgere oportet, & aliquando mel, & hordeacum farinam, quodq; antea scripsimus ad inflammationes quæ ex illusione eueniūt cataplasma, dempto ab eo semper uino. Ipsas uerò partes exulceratas inungere medicamentis, quæ ad herpetas in phararmacopœia libris descripta sunt: quæ quidē, ubi nō uolueris, ex uino dulci, aut tenui & albo, & subaustero, minimè tamen acris, liquefacere oportet. Quod si posca aquosa uice horū aliquando uis tueris, nihil deterius feceris. At in longum tēpus protrahis ulceribus, ad id uina sufficiens austerā cōueniunt: præcipuē uerò nigra. Quo tempore ipsæ etiam medicamentā congruū, quæ ad Polydipnā, Pasionem, Musam, & Andronem relata sūt. Herpetas uerò qui summa tantummodo exulcerat, nisi diu perdurauerint, nihil horum inungere oportet (adurunt enim foriter, & uehementer exiccant) uerūm istis sufficiunt, quæcunq; uim glauci habent medicamenta. Quæ quidem aqua diluenda sunt, uel aceto, si nūc ex aqua profecerint. Quod si etiā solani succo innixeris, uel arnoglossis, plus etiā cōferes. In summa uerò, omne ulcus exiccare poscit, idq; medicamento neutiquā irritante, nisi ubi malignum, putrilaginosumq; ipsum ulcus fuerit. Talia siquidem, acriora medicamina postulant, & quæ igneus uires possideant: quale est misy, thalcius, arenicus, calx, atq; sandatacha. Sæpe uerò ubi ista celsierint, admouemus ignē. Eadē ratione uocatis carbonibus, super ipsam crustam, huiusmodi medicamentorū est natura cōueniēs. Non tamen loca circumcincta tangere expedit, alioqui dissolues ea, exulcerans quæ minimè expedit. Sed Andronis trochiscia ponere uendū est. Si quando uerò inualuit rubor, plurimāq; inflammatio, medicamentū ipsum dulci diluendum est, uel succo plantaginis: quemadmodū si magnus tumor simul inferet, uino quidem acerbissimo in principio, postmodum uerò & aceto. Cataplasma enī ex orobi farina & oxymelle connectum, est apponendum: atq; ante hæc omnia,

statim ab initio tantum sanguinis auferendum, quantum sit sanis, nisi quid aliud prohibuerit. Hæc itaq; sunt passionē per genera curationes, quæ pro naturæ instrumentorū patientium uarietate mutantur. Quatuor autē ab his indicationes sumuntur: ab eorum nempe temperie, & formatione, & sitū, & deniq; & facultate. Oportetq; in curationibus intentionem habere ad membri naturam: hæc enim, quousq; infrigidandū, aut exiccandū sit, docet. Nam si carnosæ partes inflammationē patiuntur, paulum statim exiccandæ sūt. Venosæ quoq; quamuis sint carnosæ longè sicciores, nō tamen & ipse multū exiccare desiderant. Sed quæcunq; natura arteriosæ sunt, magis uenosis sunt exiccandæ: atq; his amplius neurosæ: & multo magis cartilaginossæ, ossesq;. Etenim priusq; ad propriā naturā particula redeat, non dum curationi est impositus finis. Porro sicciorē temperaturam inducunt, quæ siccissima sunt: & frigidiorē, quæ frigidissima: & secundum alias qualitates eodem modo. Ad mediocritē uerò habitum referūt, quæ sunt in unaquaq; mediocritate. Ac sic sanè partium temperaturæ, curationes affectuum uariant. At formationes hoc modo. Nam quedam intra sese habent cauitates: quedam extrinsecus, quedam utrobique, quedæ neutra in parte. Quæ igitur neutra ex parte cauitates possident, in quas fluxio recipi possit, eas partes foriter exiccare oportet, nē si fuerint natura sicciores: ut nervos, & præcipuē qui in artubus sunt. At quæ intus & extrā relaxare aliquid possunt inflammationē, nō multum huiusmodi foriter exiccantibus egent: si præsertim laxam carnē habuerint, quemadmodū pulmō. Indicatio autē ex positū, loca per quæ fit uacuum, & quo pacto, demonstrat. Fluxum ergo humorum, reuulsiō medellæ est: deriuatio autē, eorum quæ iam obfederunt membrum. Vtrūq; autem euacuationis genus per cōmunes uenas molendum est. Siquidem à matrice reuelles, si eam quæ in cubito est, uenā secueris: aut * iuxta mamillas cucurbitas admoueris: nec manus cōcalfeceris, fricaueris, deligaueris. Deriuabis autē, si eas quæ in poplitis sunt, aut in talis, uenas diuiseris, & * feminibus cucurbitas admoueris, & crura calcoceris, perfricaueris, atq; uinculo exceperis. Et si quidem in parte dextra matricis ipse affectus consistat, à dextra manu, uel crure, sanguis est detrahendus. Sin uerò in sinistra, à membris quæ illi ē directio sunt. Ceterūm interiores uenas tūc incidere oportet, quod uiciniores, magisq; ē directio sint partibus membris. Similiter si lene inflāmatō sanguinē uis detrahe re, interiores in manu sinistra uenas secato: nē si hepate, eadē ratione in dextra. Si quid uerò ex superioribus inflammationē patiatur, ueluti in ophthalmia, & angina, in ceterisq; infectibus caput, cas quæ extrinsecus sunt, atq; ē directio, pertundito. Si uerò artus patienti, à * coniungatis membris sanguis detrahendus est, siue reuelles, siue deriuare fit animus: præterq; ubi passio fuerit in ueterata: tunc quippe à membro ipso passio detrahimus. Sic ergo in angina eas quæ sub lingua sunt uenas incidimus, ubi totum corpus uacuum cum sit, * producit ipse affectus. Sic

Indicationes
quatuor sunt
ad affectū par
tibus.

Natura partū
afflicta quid in
dicat.
Partium inflā
matum quæ
dam magis, &
quæ minus sunt
exiccandæ.

Temperatura
partū, curation
um afflicta uar
iant.

Formationes
particulæ quo
modo curationē
variant.

Sicut partū aff
licta quæ in
dicationem exhib
ent.
Reuulsiō est
fluxionem humorū
medellæ, ut deri
uatio, eorū quæ
iam obfederunt
partem.

Reuulsiō q; deri
uatio à matricē
est quæ fit mo
do.

Lene inflāma
tio, interiores in
sinistra manu
venas secandas
esse: ut in dexte
ra si hepatis aff
licti fuerit.

Superius parti
bus inflāmatas,
externas uenas
directas esse se
candas esse.

Artus inflāma
tus, à cōiung
atis esse mē
bris sanguinē
necesse est.

Angina protrah
bit, uenas sub
lingua incidat
esse.

Herpetes
morosi.

Vlci omne ex
citari postulat.

Vlcera maligna
quæ alia medica
menta postulat.

Carbonib; qua
lia medicamen
ta conueniant.

Andronis trochi
scia.

*Scarificatione
quādo videtur.*

*Vacuari in quō
modum singula
partes debent.*

*Alius recendi-
ti affectus val-
tiora medica-
ta requirit, quā
si in sup. effus. ſi
ſubter.*

*Ventriculi ſto-
machique affe-
ctus, ſolū talia
exhibentur, quā
lia ab affeſſib.
exſequuntur.*

*Pennis diffu-
ſa.*

*Principia ſacul-
tatem vacuū
corpori, ſub.
par. cor. cerebrū
atq. oſtes.*

aliud quodcumq; membrum affectum ſcarifica-
mus, ſi non amplius humores ſubuant (tunc en-
im magis irritaueris, ipſumq; duplicaueris ma-
lum) uerum ubi uniuerſum corpus iam expurga-
tum fuerit, nec quicq; prater ea inſiit, ſed quod
prius inſluxerat, iam harret in membro impa-
ctum. Et quidem laborantibus conuexis hepa-
tis partibus, quod per urinam trahere oporteat:
concauus autē, per ſubductionē alui, ſitus ipſius
uiceris indicat. Atque etiam thoracem, pulmo-
nemq; per ruſſes expurgari debere: utriculū &
& ſtomachū, per uomitum in teſtina per deſe-
ctiones: quemadmodum per urinas, & ſplenem,
& renes: matricem autem, per menſtrua: cerebrū
atq; eius membranas, per palatū, gargareonem,
nares & aures. Sed & quod his quæ in ſuperficie
ſunt partibus, talia medicamēta apponere oportet,
qualibus eget paſſio: iſis autem quæ in pro-
fundo ſunt ſine & quas per multa interpoſita de-
bit eorum uirtutes attingere, non qualia nunc
ſine, ſed qualia futura ſint, ex ſitu membrorum
agnoſcimus. Tantum quippe aduenienti robori
adtingere oportet medicamenta, quantum in
transitu exſoluitur: ut quod relinquitur, & qua
le remaneat ex, quod ta cū iuuat. Ob id igitur in
thoracis inflammationibus, quæ in ſuperficie
conſiſtunt, ea quæ ſolū laxare poſſunt, ſuſci-
piunt: intrinſecus autem, ſicuti in coſtas cingen-
te membrana, requiritur actiora. In uniuerſis
autem uiceribus eadem habenda eſt ratio. Sc-
pius enim ex medicamentis impoſitis ulceratio
euitis, quamuis durior, minusq; ad patiendum
habilis ſit, quā uicera. Quod ſi ipſis uiceri-
bus medicamenta applicare poſſemus, quibus
frequenter indigent, tantō molliora oportet
eſſe, quāto ipſorū natura, ut aſſiciatur, eſt prom-
pior. Quia uerō hoc ne unquam nobis datur,
ob id nimirum, quæ eduntur ac bibuntur medi-
camenta, conferentia affectibus uicerū, ea mul-
tō actiora & potentiora eſſe cōuenit, quæ, quibus
indigent ipſæ partes affectæ: exceptis tamen il-
lis, quæ uentriculo ſtomachoq; auxiliantur. Hæc
ſiquidem ſola talia exhibentur, qualia a paſſio-
nibus ex-guntur. Reliqua uerō omnia, actiora
& fortiora ſunt, & præteritū quæ uel reum, uel
pulmonis occaſione ſumunt. Sed indicatio quæ
a facultate ſumitur, etiam curationem immutat.
Nam ex partibus corporis nonnullæ ab influen-
tibus uirtutibus gubernantur, quædam uerō ſi
propria atq; nātū. Atq; ex iſis ipſis, quædam ſi
bñplis duntaxat, quædam etiam alijs ſons & ori-
go ſunt facultatum. Et alie quidem opus pecu-
liare habent, alie autem cōmune. Permutare itaq;
opus eſt curationis formam, pro ratione lia-
rum omnium diſſerentiarum. Nam pleraque ex
remedijs dictis, morbum quidem finiūt, ſed na-
tūas membrorū facultates offendunt: quæ quod
offenſio ad totū pertinet corpus, idq; ratio-
ne duplici: uel quia membrum eſt aliquis uir-
tus origo, omnibus partibus cōmunicat: uel
quia ipſius opus uniuerſo corpori eſt utile. Ete-
nim hepar, cor, cerebrum, atq; teſtes, cōmunit
uniuerſo corpori principia ſunt facultatum. At
uentriculo matriciq; propriæ facultates inſunt,
nulli alteri parti cōmunes. Opus tamen uentri-

quidem totū corpori conſert, matricis autem ne
quaquam. Quæ igitur immodicē laxant, exol-
uunt robur, quare & facultatem particulæ. Quæ
autem ſupra modum refrigerant, nātūum calo-
rem exnguunt, qui fortaiſis ſubſtantiæ faculta-
tum exiſti, aut certē primū & maximē necēſſa-
rium inſtrumentū ipſarum. Nēnullæ etiam alie
qualitates * immoderate, facultates exoluere
poſſunt. Ad hanc autem indicationē, quiſpiam
reſerre poſſet & facilem & difficile ſenſum. Ete-
nim quæ facile ſenſū parces, actia medicamen-
ta non tolerant, ſicut neque acres humores: Ob
idq; os uentriculi, atq; eo magis oculus, inſeſta-
tur ab erodentibus medicamentis. At quæ ſen-
ſu in obſcurum habent, cataplasmata graui ſuſti-
nent, atq; medicamenta mordacia. Qui igitur ſe
eundum ſolam, nudamq; intemperiem abiq; hu-
morū alfluxu ſuiſ morbi, per contrarias qua-
litates curantur. vt (exempli grana) calida inueni-
eris, per refrigerantia, ſiue primō, ſiue ex acci-
dens refrigerent. Perſuſio ſiquidem frigida, cal-
facit ex accidenti, ubi caloris reuocationem ſece-
rit: calidumq; refrigerat, ubi calorem ſtaturali
diſcuſſerit. At quæ ob materie inſluxum labo-
rant, ſi quidem fuerint optimē temperata, ſolam
euaſionem deſiderant: ſi uerō diſtemperata
ſint, unā cum euaſionem, per contrarias qua-
litates alterantionem poſſunt. Sed iam dicamus
de œdemate.

De œdemate.

Cap. 111.

Œdema eſt mollis quidam tumor, atq; dolo-
ris expers, ex pituitosa ſubſtantiā, uel ſpiritu uā-
poroso ortus, qualis in cadaueribus, & pedibus
hydropicorum & tabidorū plerumq; cernitur. In
hūc tamen morbis œdema ſymptoma eſt, pro-
pria curatione nō indigena. Sola quippe ſtriſto
ex oxyrhodino, aut ex ſale & oleo, compeſcit ip-
ſum. Cū uero propter inſluxum pituitæ in ali-
quam partem gignitur iſ affectus, ſpongia re-
centi, imbuta oxytrato, quod poiſit bibi, eum
ſedat. Quod ſi ex his non diſcutiatur œdema,
aluminis parum eſt adq̄uendum. Si uerō in ali-
quo artuum tale fuerit œdema, inclioanda liga-
tura eſt ab imis partibus, ſinienda uerō in alio-
ribus: uniuerſis iniectionem & compreſſionē
facientibus nobis, uel in fracturis. Quod ſi
morbus dictis remedijs non cedat, aliquid ſor-
tiorum medicaminū adicere oportet, cui diſcu-
tendi ſimul & conſtringendi facultas inſit.

De ſcirrho.

Cap. 1111.

Exquiſitus ſcirrhus eſt tumor præter naturā,
inſenſatus duruſq;. Non exquiſitus uerō, non
omnino inſenſibilis eſt, diſcitur tamen omni-
nō ſenſu. Porro inſenſibilis ſcirrhus minimē cu-
rationem recipit. Qui uerō cum diſcultate ſen-
ſit, nec incurabilis eſt, nec facilem curationem
admittit. Fit autem ex humore uiciſo & craſſo
* tenaciſſimē partibus induratus inſixo. Scirrhus
itaq; interdum ab initio concretus, atq; augetur
paulatim. Crebrius uerō inſcitina medicorū pa-
rat, ubi uehementer eryſipelata & inflamma-
tiones aſtringunt refrigerantijs. Quod ſi quis
fortiter diſcutienna indurans medicamenta ad-
hibeat, digerit quidem tenuiora: quod uerō reli-
quū eſt cōpactum, lapidis inſtat, relinquet. Non
igitur

*Lactia munda-
re, exoluit
robū atq; facul-
tatem particu-
læ. Calor nātūū
quid.*

*Senſu acutiſſi-
mo prædita, &
actia medicamē-
ta nō tolerant,
ut ea quæ ſen-
ſu obſcuruſ ſuſti-*

*lat, imperio ſui
placito per euaſi-
onē qualitatem
inſtat.*

*Præſeſe poſſe
ſuſſe calſcit ex
accidenti.
Cedendum ex
accidenti refriger-
ant.*

Œdema quid.

*Œdema in qui-
bus ſymptoma
eſt illud.*

*Œdema cu
inſenſu, curan-
dum.*

Scirrhus quid.

*Scirrhus in ſenſi-
bilis, minimē cu-
rationem recipit.
Scirrhus ualde
concretus.*

*Si ſciſus quomo-
do ab inſenſi cu-
rationem recipit.*

In duratis quibus medicamentis conueniunt.

Medulla ceruina ac ceruina.

Adipis differentia.

In duraturis tenacissimis curatio.

Lenis uel emolliens quibus potius tolerat.
Lenis induratio conuenientia remedia.

Lenitas ab flatu diffinita curatio.

Salus flos in aqua appositus, in duratis lenis sanans.

Unguentum firmiter inueteratum est in aqua lenis, cum eo subligatur necesse est hydrophorum.
Heparate induratio curatio.

Flatulentis tumore curatio.

Natura patientum particularum, auctoritatem materiam indicat.
Dolorum in crasso spiritu oborti, curatio.

igitur curandæ uix induraturæ particulæ medicamentis siccat immo dicitur, sed emollienti, quodq; calorem possideat tepidum, humiditatem uero nec multam, nec omnino minimam. Si quidem quod superfluum humorem habet, nihil omnino dissolvit: quod uero modicum, plura quam oportet excitat. Ergo medicamenta idonea scirrhus sunt omnes medullæ atq; adipēs. Ex medullis primas partes obtrinet ceruina, dein uitalina. Ex adipibus, anserinus leoninusq;. At uero qui ex gallina sumitur, anserinusq; ex pardo, leoninum sequitur postea uero ursinum, atq; taurinum. Cæterum qui ex capris accipitur, & crassior, & sicior præ dictis est: idip magis, si ab hircio capiat. Porro tendonibus induratis oportet unā cum prædictis iis quæ simul & emolliunt & digerunt, (cuiusmodi sunt, bdellium, ammoniacum thymiana, solutū in squæcerrimo aceto, opopanax, chalbanumq;) etiam pyritem lapidem candentem, aut (si eius copia nō sit) molarum, acerrimo aceto aspergere, ac dein super ipsum dimouere partem affectam, ut a uapore sursum elato, scirrhus dissolui possit.

De spleure & eorū induratis. Cap. v.

Induratum splenem, nō tantū foris, fortibus medicamentis curare conuenit, sed intrinsecus potioribus uel emollientissimis: nam eas sine molestia tolerat. Inter quæ sanè primas sibi uendicant partes, cortices radicū capparis, & scolopendriæ, & myricæ tum radex, tum germina, omnia uidelicet hæc in aceto & oxymelite cocta. At sæpenumero splen, cum tangitur, renitit uidetur, nō ob scirrhum, sed ob flatulentū tumore. Tunc igitur ubi ipsum abstinēti decocto foueris, aliquod cataplasma mistis facultatibus prædictum superimpones: quale est quod ex sulfure & alumine constat. Verū ubi lien in scirrhum obduraui, præpollere uim digerentem oportet: parum autem eius quod astringendi possidet facultatē, est admiscendum. Merito igitur salus flos induratos splenes sanat, si extrinsecus ipsis in uesica apponatur. Porro leuatis scirrhum, inuito quidem sanauimus: inueteratū autem, neq; ipse potui sanare, neq; alii uidi qui posset. Quippe omnibus ita affectis omnino aqua inter cetera subiequitur. Nec uero persēt hoc uiscus fortia medicamenta, ut splen. Quare si sit induratum, augere oportet ea quæ ratione inflammationis illius apponuntur, in mistura emollientiū: adhibita etiam edgruente uictus ratione, unā cum potionibus & disspantibus, & abstergentibus eum, qui in uiscere continetur, humorem. Admiscere autem oportet, & ex iis quæ ciere possunt urinam, aliquid. Iam uero in omni flatulento tumore, astricquid corpus est relaxandum, exenuandū autē ipse crassus spiritus. Si igitur subtiliori aliquo medicamine anodynū, ubi dolor addit, calceare, id quidem quod densatū est, rarefacies: extenuabis uero, quod crassius est redditū. At patientium particularū natura, coindicabit conuenientem auxiliatorū materiam, in ipsaq; maioris minorisq; rationem. Ac secundum differentiā eandem, materia etiam curationis uariatur, intenditur atq; remittit. Si igitur a crasso spiritu obduratur dolor in uentre inferiore, subtile oleū per

ima, unā cum medicamentis quæ in ipso ebullierint, per clysterem iniiciens, statim dolorem sedabis. Quæ uero debent bullire in oleo medicamentis, cum partium tenuitate calcascia, sunt cumini, apii, petroselinii, marariti, sinonis, anethi, libyritici, fideleos, dauci, atq; spondylii semen. Quod si coniectura comprehendens frigidum esse dolentium partium dispositionem, rutam & marathrum, & grana lauri intus decoques: miscabis asphaltum, ipsumq; oleum laurinum, & si quæ similiter calcascia. At si inflammationem dolori adiunctam putaueris, auferes ea quæ admodum acra sunt, quæq; calcasciant impensius: ad relaxatiā uero, quæ uires illas mediocres possident, transibis. In oleo itaq; anethum coques, miscabis adipem anserinū, dum gallinacē. At uero mediocres dolores extrinseca tantum calcascione iuuantur, ea præcipue quæ ex milia sit, uel ex sale calcacto, uel ex lini semine crudo. Curcubita enī magna cum multa flamma abiq; cutis scarificatione, sepius statim dolore amouit, umbilico admora. Quod si enī tum dolores per manserint, uti medicamentis ex opio ne dubites, quale est quod a Philonē refertur. Sic enim hominem liberaueris a cruciatu, & sequentibus debus noxam ex opio contractam, corriges. Auferrunt enim id genus medicamenta dolorem, nō tamen dispositiones sanant, sed uim sentiendi quodammodo stupefaciunt. Vri autem oportet Philonis medicamentum, omnibusq; ex opio contractis, nō statim, sed post tempus compositionis annuum, aut omnino semestre. Non modica uero sit uirtutis distributio, & ex exhibitis ad inferiores intestinorū partes, dum afficiuntur: & ex iis quæ iniunguntur per sedem, ad superiores, ubi dolore cruciantur. Porro discutiendo statim in partibus carnosīs collecto (qui & nonnunq; uacat dolore, & longiori tempore durat) ea medicamenta congruunt, quæ insigniter sublimi constant substantia: cum quibus miseri debent, quæ molliendi facultatem forisuntur.

De abscessibus. Cap. vi.

Dispositiones in quibus a se inuicem distant, quæ prius se connegebant corpora, cōmuniter abscessus uocantur. Spacium igitur uacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam spirituosam, aut humidam, aut mistā ex utriusque comprehendar. Quæ substantiæ ubi diutius laxerint, uarias alterationes suscipiunt. Nam & lapideus, & arenis, & testis, & lignis, & carbonibus, & limo, & amurcæ, & permulnis alijs id genus similia in abscessibus corpora sæpe contineri inueniuntur. Transcunt uero in abscessum inflammationes quædam, atq; erysipelato-se plegmones, sicuti & erysipelata phlegmonosa non pauca: nimirum ab uno loco humoribus translati in alterū. Quæ igitur per summā, sub cute consistunt, facili dignosci possunt: neq; est sanatio ipsorum difficilis, cum solis medicamentis quæ extrinsecus applicantur, curentur, nec medicamentis intrō assumptis indigent, ueluti quæ in uisceribus accidunt. Curatio igitur earū quæ in superficie cutis abscedit inflammationem, si incipiente quidē iam abscessu, per ea quæ dolorem sedant relaxantur: procedente uero tem-

Flatus diffinita medicamentis.

Dolorem uentris mediocrem uel extrinseca tantum calcascione sedant.

Curcubita umbilico admora, uentris dolorem sedant.

Opio recipientia medicamenta talē dolorem tollunt, ipsam tamen dispositionem relinquant.

Opio constantibus medicamentis esse uentris post tempus cum compositione annuum aut semestrem.

Intestinarum dolores uiscerum, inuicem a se distantes, cum per se distantes in medicamentis.

Abscessus quid.

Abscessus qui in solis uisceribus corpora.

Abscessus curatio.

pore, ad ea quæ cōcoquendi, suppurandiꝝ uim habere dicunt, transferri oportet. Statim igitur aqua abundanti in qua fuerint decoctæ aliee radices, perfundere, atqꝫ oleo calido partem inflammamatam conspergere, necnon ex farina triticea, quæ in aqua & oleo moderatè ebullierit, cataplasma imponere oportet. Si autē suppuratiōnem prohibere sit animus, panē in oleo & aqua plurimum ebullire permissito, postea uerò subigens admoueto. Sit tamen aqua ad oleum proportio multiplex. Plas autem quā hōc suppuratiōne prohibet hordeacea farina, similiter præparata. Si uerò per summa cutis in parte inflammata tensio ualida fuerit, multis ac medicis scarificationibus in superficie incidere oportet: ac postmodū ex farina hordeacea (ut diximus) elixata, cataplasma apponere. Cæterū in quibus difficultet ad suppuratiōnem peruenit, nec facile discuti tumor potest, sed suspicio est humores crassiores & tenaciosi ibi impatiētes exsistere: in ijs tantūm dispositiōibus conuenit ea quæ sit per profundiores scarificationes curatio. Cōuenit etiā id quod ex caricis pinguis, dulcibusqꝫ & decoctis, cōsistit cataplasma. Quarum sanē decocto, aliquando hordeaceam farinam adijci mus: aliquando panē sycnositum, hoc est, miscellaneum, sed quæ ex generoso confectus sit tritico. Porro farina triticea maximè ad suppuratiōnem promouet. hordeacea uerò resoluit plurimum. Si igitur resoluetur tumor, minus tamen quā optes, cum caricis hysopum & organū simul coquere oportet. Quod si uehementius exiccare tumorē uolueris, sal decoctioni adijcias: dein farinā hordeacea, detracto prius fursure, in sperge. & postqꝫ plurimū ebullierit, appone cataplasma. Si uerearis ne tumoris reliquæ in scirrhū durefactæ (quod cōtingit, ubi quis fortiter exiccatibus utitur) radicem agrestis, cucumeris, aut bryoniæ, aut asari, in aqua decoque: sæpius quidem per se solas, nōnunqꝫ caricis pingues adijcias. Deinde aquæ farinam admisce, injiciens aliquid adipis asferini, uel gallinacæ, uel etiam suillæ. Eadem quoqꝫ radices, atqꝫ etiā quæ producit altheam, si post moderatam decoctionē cum pane & adipē contundant, huiusmodi discutiūt tumores. Fortior autē hūc omnibus est draconij radix. Verū fortiter resoluētibz medicamentis semper sunt miscenda emollientia, ne tumoris ipsi in pertinaces scirrhos degenerent.

De rumore suppurato. Cap. vii.

Porro ubi suppurandi tumorē a missa spes est, ex farina triticea utere cataplasmatibz. Dein uerò postqꝫ suppurati secueris, si uideris ea quæ circa sectionē sunt omnino ab inflammatione libera, emplastica medicamentis utitor, sed quibus exicandi resoluēdiqꝫ citra morsum facultas insit. Equidem sæpius in huiusmodi usum flos medicamentis ex sermēto & ostreis cōbustis cōfecto. Si uerò pars aliqua circa sectionē inflammata uideatur, quod ex chalcitide cōstat, liquabis oleo: atqꝫ ubi sensim refrigeratū fuerit, infundens uinū, in mortario emolles & iubiges, ac deniqꝫ usui accōmodabis. Vbi uerò curis per suppuratiōnes plus quā par sit, colligata & ueluti lacerata fuerit, nō facile subiectis corporibus agglutinatur: quare

necessū est ut per linicina latiora uulnus ipsum curetur. De sinu. Cap. viii.

Sin autem amplius agglutinandi cutim subiectis partibus creuerit difficultas (qui sanē affectus uocat sinu) satis est fistulā directē perforatam, uel ex ure, uel ex cornu factam, habere in promptu: aut etiā aliquid ex ijs instrumentis, quibus pus extrahi cōsuevit, quod foramen latissimū habeat: ac per id, exigui medicamentū, 10 si, quod ex chara cōbusta cōstat, liquatū oleo rosaceo in ipsum sinū infundere: ac deniqꝫ linamento cōcepto, ipsius os claudere. Cæterū quæ sic liquant medicamentā, oportet ut sint aciora, quā quæ linamentis excepta illiunt: qualia nimirum sunt quæ omnibus sunt in usu, colore uiridi. Nam cū huc ipsa oleo rosaceo nō pauco soluerē expediat, ut injici possint in sinū, necessā 20 riō certē ipsorū uirtus exoluitur. Quæcūqꝫ igitur medicamenta exquisitē emplastica, quale est Macharionis, Epigoni, & qd hīs cognominat, ubi ad emmotoriū usum perducunt, cerati indigent a dimissione, eadem etiam ad curādos sinus sunt cōmoda. Si quidem quatiōne ipsi ceratū miscetur (nempe quod uires mordaces haberēt, si per se sola liquecerēt) eadem sunt ad sinus utilia. Vbi uerò sinus mediocriter fuerit oppletus carne, tunc agglutinantiā medicamentā apponere oportet: ueluti si recentis, & sanguinolento uulnē 30 eri medicarems. Sciendum autē est interim, omnia metallica medicamenta subtiliorū partiū estē: fortiori maiore uim exiccandi, ubi plussculum ebullierint. Quāto uerò subtiliora medicamenta fuerint, habuerintqꝫ maiore uim exiccandi, tantō plus in sinū operabunt. Porro cū ad superiorem locū ipse sinus extenditur, facile per os humor uitiat⁹ elabitur. Si uerò ad ima decinet, cū retineat⁹ intus, partem aliquam cōtinuare erodit. Quare in huiusmodi sinibus, nisi prius ad effluxum sectionē feceris, nihil proficiscies, nec cū carnem gignere, nec cū agglutinare uolueris. In alijs uerò nō est opus sectione, si modo cōuenientem figuram in patiente parte seruaueris. Ex qua figura potes aliquid sinum ad partem superiorem uergentē, facere ut deorsum inclinet: sicuti & uergentem ad ima, conuere 40 tere ad superiora. Aduerte autem melicratū esse aprum ad conglutinandas penitiores ipsius sinus particulas. Post cuius usum, prius quā aliud glutinans medicamentum adhibeam, aliquando uino solo, aliquando uino mulso, ipsum so 50 leo sinum abluere. Et enim ad abtergendam, expurgandāqꝫ adherentem saniem, melicratum est præstantius: ad cōglutinandam uerò, uinum est melius, & efficacius: præcipuē quod in medio dulcis & austeri cōsistit. Et quidem post medicamentū agglutinantis appositionem, spongia recens ex mulso, aut uino, circumijciatur, quā mollissimē fieri possit. Atque alligatio quidem incipiat a fundo sinus: destinata uerò ad os. Linteorum uerò circumductiones constringantur quidem in fundo sinus, sed non ita ut dolo 60 rem inferant: paulatim autem laxentur, usqꝫ ad os sinus: quod quidem habeat laxam alligatiōnem, emplastrumqꝫ, quod ei extrinsecus admouetur, adeo discissum forficibus, ut ex ore ipsi, humores

Scarificatio-
nes profundio-
res quādam con-
ueniant.

Emplastrum ex
caricis.

Farina triticea
quidem, maxi-
mè ad suppurati-
ōnes promouet:
hordeacea uerò
discutit.

Tumor in scir-
rhū abeuntes
curatio.

Diffinitionibus
fortiter, ut sem-
per sint miscen-
da emollientia.

Tumoris suppu-
rati curatio.

Sinus quid.
Sinus curatio.

Medicamentum
chara cōbusta.

Sinus curatio
resilia medica-
menta quæ sunt.

Metallica me-
dicamenta fortis
maior uim exi-
candi, ubi plu-
ssculum ebulli-
erint.

Effluxus pus
esse faciens
forficibus aperiri.

Melicratum ē
se apertis sinibus
conglutinanda.

Sinus quando
abluendus ex ui-
no.

Vinum spongia
circumijciatur.

Sinus quando
deligandus.

humores vitiosi, si qui excernuntur à sinu, facile effluere possint, paruo aliquo alio ipsi imposito emplastro, usq; ad solutionē: quam tertia quaq; die faciens, auferes hoc ipsum, quod uelut operculum hæret: id quod per totū sinum circumiectum est medicamentū relinquens. Iam uerò ex quāritate, & qualitate emanans humoris, præterea ex dolore, uel indolentia, tumore, uel depressione partis affectæ, cognoscere num pars ipsius sinu profunda sit probè cōglutinata. Siquidem si neq; in ipso sinu dolor sentiatur, neq; tumor appareat, sed totus locus depressus, siccus, atq; expers doloris existat, uiderisq; ad oculū pus exactè concoctū, necnon quantitate paucum, bene sperandum est de sinu glutinatione. Si autē contraria se ostendat, nodum sinus cōglutinatur. Sit uerò medicamentū quod circumlinitur sinui, uehementer ficans, citra tamen mordacitatem: quale utiq; nostrum exiit, sive cera consecūm ex metallicis medicamentis elixans, & oleo cicino, & aceto: quod nimirū uulnera cruenta conglutinat, sinuq; sine molestia ficans, si luxurio prius sordes abluere fuerint. Porro ubi qui abscesserunt tumores tarde secū fuerint, cutis ipsa admodū extenuat, redditurq; laceræ uelut persimilis. Quo tempore utendum medicamentū est, substantia quidem humidis, potentia autē ficans: quale est quod cōstat ex libitargyro, & suillo adipis antiquo, & chalcide, quibus additum sit uehementissimū oleum. Cōfert etiam in lacera cute nodum mel, si usq; ad consuetū emplastrū elixetur. Sanius tamen fuerit ex myrrham subtiliter tritā, aut aloē, aut rhus, aut aliquod ex his, uel omnia simul aspergere, tum præcipue, cum linteo inunctū humidus appareat. Vnus etiam sum aliquod & tenui centauro, qd̄ mēu est ad eiusmodi medicamen. Post ipsum uerò & symphytiū utile est: deinde ierosolync radix. Postea farina ex orobis: omnia hæc & per cribrū subtile transmissa, & inspersa melli, dum ab igne amouetur.

De gangrena. Cap. 12.

Nunc uerò opportunitum uidetur de gangrenā aliquid dicere. Sic enim uocant mortificationes eas, quæ ex magnitudine inflammationum sunt, nondum tamen absolute sunt factæ. Et enim cū ita membrum effectum est mortuum, ut nec punctio ē, nec sectio ē, nec etiam uisionem sentiat, statim ipsum recidere oportet, quā uicinam sanam partem attingit. Cæterū quod sic affectum est, denigratur. Quod uerò in medio consistit ut ad mortem proniciatur, appellatur gangrena. Curatur autem, euacuantibus quidem nobis plurimū sanguinis, qui in patiente membro compingitur: cuius causā mortificationes huiusmodi autem, exhibentibus transpirationem. Igitur aut cutem uniuersam multis sectionibus profundis secare oportet, unā cum subiecta substantia: aut plurimis scarificationibus profundis incidere. Vbi uerò sanguinem effluere permiseris, imponendū aliquod medicamentū est, ex iis quæ ad putrescentia conducunt: cuiusmodi est ex oxymelite farina orobi, lolijæ. Si uerò talia non adsint, fabarum farinam adhibe, atq; ipsum oxymel solli. Quod si fortius medicamen apponeret uis, adijce sal, aut ex trochi-

scis aliquē exquisitissimè tritum, qualis Andronis, & Polydæ, & Passioia, & Musæ existit. Verum qui duras natura carnes sortiunt, q̄ fortissima medicamenta desiderant: mollia uerò, qui teneras. Ad maiorem autem securitatem, quidō abscondis aut circūdis id qd̄ iam putruit, satius est ipsius mali radicem, parti sane coniunctam, adurere, uti sæpius cōsueuimus in pudendis facere, nonnunq; ipsū affectū partibus ad mouentē cautēria, nonnunq; linamentū interponentes. Facta uerò adfusione, solemus uti succo porri, aut, si is non adsit, recitari trochiscis: ad detrahendam autē crustā, medicamentum dicto Cephalico, ex melle uti: aut pane ex hydrelæ decocto. Iuuat etiā hordeacea farina similiter præparata, aut cum ipsa triticea mitta, illitali. Præterea tetrapharmacum, & Macedonicum nominatū sunt crustarum suppurationibus, atq; earū eidentia accommodatissima: & quæcumq; uim habent perducendi ad suppurationē. Panis etiam cum apio, uel ocymo rufus, optimè crustas dirumpit, & à sanis partibus eximit. Ex simplicibus autē medicamentis, iris, uel radix panacis, uel anis olochiz, uel acori ex melle. In mollibus uerò corporibus sat est farina orobi, cum melle, uel thure. Auferit etiam crustas Machæronis medicamentum. Cū uerò exiderint crustæ, atq; huiusmodi ulcera idoneis medicamentis carne repleta fuerint, debet induci catix.

De Cancris.

Cap. 13.

Carcinosis tumores in omnibus consueuerunt fieri corporis partibus, sed præcipue in mammillis mulierum, quæcumq; naturalis sua purgatione priuant. Nam quandiu hæc, ut oportet, adfuerit, tandiu mulier integra sanitate fruetur. Hi uerò tumores omnes ex atræ biliscremento gignuntur. Qui humor facuinaris similis, dum sanguis in hepate sit, ab splene expurgatur, cui est nimirū nutriendo. Cū igitur naturalis temperatura hunc humorē pauca genuerit, optimāq; uictus ratio præcesserit, & ex ipso qui generatur, splen abunde sitis attraxerit, nulla huiusmodi superfluitas coaceruatur in uenis. Si uerò contraria accidant, tunc succus is melancholicus multiplicatur in uenis, à quibus nonnunquam, facultate expellendi extraneæ præditis, per hæmorrhoidas excernitur. Sæpius autem & ad uarices decumbit. Quandoq; ad cutim uniuersam expellitur, ubi gignit elefantiasim. Est cū ad alias corporis partes, quæ cæteris imbecilliores sunt, humor iste decumbit. Quo tempore euidenter apparent quæ in loco affecto sunt uenæ, crassæ & nigro sanguine imbutæ. Qui qui dem quitrō crasior fuerit & nigrior, tanto deterior est passio. In mammillis autē sæpe uisidum tumore figura animali cancro persimilē. Hunc igitur morbum per sui initia sæpe sanauimus, medicamentis quæ atram bilem educerent. Vbi uerò in molem insignē attollit, curari sine chirurgia nō potest. At scopus in huiusmodi curatione est, totū qui circūstat tumorē præter naturam, quæ partibus sanis adlaxet, abscondere: ob usorum tamē magnitudinem, præsertim si fuerint arterig, profusū sanguinis statim pericūlū imminet. Quod si laques ipsa excipias, per consensum

Admodū est
radicē purgati-
ta particula.

Estham quæ
detrahant.

Cancer ubi
ex quo humoris
gignatur.

Atræ bilis ex-
purgetur à lo-
ne, quæ alit.

Atræ bilis quæ
morbo causat.

Cancer duplex
causæ.

Cancer modica
sua perniciosa.

Sinus glutina-
tus ut ex quo-
bus signis colli-
gi possit.

Medicamenta si-
nus circumlinita
debeant uehementi-
ter ficans.

Cutis lacerata in
abscessibus mor-
dicata.

Glystra quid.

Membrum mor-
tificatum, quan-
tum sit abscin-
dendum.

Gangrena cu-
rata.

Putrescentibus
apta medicamē-
ta quæ.

afficient cōtinuè particulæ. Si uerò radices morbi exurere animus sit, neq; huic rei maximū periculum derit, * si prope loca principalia insignia aduſto ſiat. Porro in Alexandria plurimi, ob crasſam uicſus rationē, atq; regionis feruorem, elephantiaſi corripitiur. At in Germania & Myſia, rariffima hæc paſſio uidetur: & apud Scythias laetis portatores, nunq̃ ſibi apparuit. Huic igitur morbo melancholici ſucci conferunt purgationes. Quod ſi ætas atq; uirtus permulerint, ſanguis prius mittendus eſt. Sed neq; in cancriſ inuſile eſt, ubi nihil prohibet, primò ſanguinē mittere, ac dein purgare enocareq; mēſtrua, ſi ſint mulieres, nec attingerint quinquageſimū annū. Ipſi autē patienti particulæ, ſuccus ſolani imponat, uel medicamen ex pompholyge cōſtans, quo uxor ad cancos exulceratos: uel etiam quod ex chalcitide ſit, ſi copia illius nō detur. Quod pertinet ad uicſus rationē, ſuccus piſianæ abundanter eſt exhibendus, & ſerū lactis: at ex oleibz, ſi malua, atriplex atq; hlyſtum. Cucurbitis etiam, ſi

occaſio ſerat, utendum, & piſicibus ſaxatilibus, aulbuſq; omnibz, exceptis paluſtribus.

De elephantiaſi. Cap. xi.

At iſi qui elephantiaſim patiunt, mirabile auxilium eſt uiperarū eſus. Qnas quidē, ubi caput, caudamq; uſq; ad digitos quatuor abſcideris, ex coriariuſq; ac deniq; in teranea exemeris, in olla prius abluas coques, donec exaſſitē molles reddant. Adſicere tamen debes aquam, in qua illæ elixantur, porro, anethumq; & olei nōnihil. Ipſum etiam medicamentū conſectū ex uiperis, conſert in potu exhibitū, iſi qui luuulmodi morbo laborant, uel cuti etiam illitum. Porro ad ſanandas ſtrumas, optima ſunt quæ aſtringere & exiccare, & pus etiam facere poſſunt. Ad meliceridas autē, quæ ipſas diſſoluent uim habent, & quæ pus diſcutiant medicamenta. At uerò curatio hydropū, ad has tres reducit intentiones: ut ſinemus durū tumore, quo uicſus aſſigit: & apponamus ea quæ humiditatē diſſoluit: & propterea medicamenta quæ moueant urinas.

Elephantiaſi
in Alexandria
innotat plurimi.

Elephantiaſim
in Germania re
periri rariffimū
Galæſſemat.

Cancro exulce
rati remedia.

Cancro uicſu
ratio cōſtat.

Elephantiaſi
docu uiperarū
eſus.
Viperæ uicſu
natio.

Theriac de
phantaſi eſt
comēſtat.

Hydropi curatio
paga em.

ILLVSTRISSIMO ET SAPIENTISSIMO VIRO,

D. D. IOANNI FVRTADO A MENDOZZA,

APVD VENETOS ORATORI CAESAREO LONGE DIGNIſſimo, Andreas Lacuna Secobiensis, Doct. Med. miles S. Petri S. D.



Ex maximā inperatūdinis notam, aut declinare, aut eluere, ſemel inuſſam, poſſem, Vir illuſtriſſe, ſi ex lucubratiunculo meiſ, ſub ſymbræ amplitudinis tue ad abſolutionē perduktis, portione aliquam tibi nō impertirer. Nam cū ex mercimonijs ſingulis, quæcūq; inter ſubditi Caſaris in hac Venetorū urbe ſplendidiffima cōtrahuntur, ad egregiū cōſularem Virum Thomam Sornozzem, uel Caſareo decreto, nōnihil fruiſ perſtineat, quod perpe tuo illi patrocinetur, eorumq; diuerſas lites cōponat: multo magis, mea quidem ſententiâ, rationi cōſentaneum uidetur, ut optima quæq; ingenia, quibus cōſtitit huc ſuos labores aduehere, ex mediatio nibus ſuis aliquid dignationi tue literariū etiā tributū pendant, a qua nimirū ſouentur, aluntur, locu pletantur: cuiuſq; inſtudioſos omnes patrocinii atq; benignitatē ſum ipſe omnium maximē expertus. Conſiliū impregmentariū eſt præterire ſilentio immortales iſtas uirtutes tuas, prudentiâ, temperantiâ, cōtinentiâ, cōſtantiâ, animi magnitudinē, multiplicemq; doctrinā, quibus totus ſplendens ne aut earū ſublimitatē claudicante oratione nō aſſequar: aut relictari uideat ſingulari moſtelle tue, quæ ut popularem ſemper auram cōtempſit, ſic nihil magis exoſum habet, quam huiſcemodi encomia. Ampliſſimū quippe integritatis tue, uel me tacente, argumentū eſt, quod CAROLVS V. Imp. præter expectatōnem uocauerit, ut in hac tam anguſta Repub. uices ſuas gereres, grantiſſimāq; adminiſtrares negotia. Cū igitur minimē cōtemnēda artis medicæ pars, in ſuacuatione redūdantiu conſiſtat: ac ſuacutio quidem ipſa, partim per ſenſu ſectiōnem, partim per purgantiū pharmacia exhi bitiōnem, partim per hirudines, cucurbitulas, atq; ſcarificationē ſoleat adminiſtrari: haud ob re me ſa cturū exiſtimauit, ſi Galeni tres cōmentarios de phlebotomia, quorū primo titulus eſt de ſenſu ſectiō ne aduerſus Eraſiſtratū: ſecundo, de ſectiōne ſenſu aduerſus Eraſiſtratæos Romæ degentes: tertio, de curandi ratione per ſenſu ſectiōnem: ac præterea alios tres, ſum de hirudinibus, cucurbitulis, & ſca rificatione: ſecundum, de purgantiū medicamentorū ſuaculatiſſimis: tertio deniq; in quo docetur, quos nam purgare, & quando, quolibzq; medicamentis oporteat, offerre amplitudini tue: huiſq; etiā de luti auctarium quoddam adiungerem libellum de piſana, conſiliūq; à Galeno conſcriptum puero cuidā epilepſia laboranti. Nihil ergo iam ſuperſeſſe uidetur, niſi ſi ipſe, Pater obſeruandiſſe hoſce octo cōmentariolos, puſillos quidem, ſi chartularū tantū ratio habeatur, ſed mortaliū uitæ admodum ſalutares, pignora quædā officiū erga te mei, quam benigniſſimē excipias, muneriſq; tenuitatē non aſperneris, memores eos qui thure carerent, fuiſſe olim dus mola ſalfa litare ſolitos. Vale, Mtuſarū ho ſpitium ampliſſimum. Venetijs, ex adibus tuis, III. Idus Aprilis, M. D. XLVIII.

GALE.

GAL. DE VENÆ SECT. ADVER. ERASIST. LIB.

GALENI PERGAMENI
de Venæ sectione aduersus Era-
sistratum, lib. unus.



Illi quidem illud inquisitione quidli-
gentissima dignū esse uidetur, cur
nam Erasistratus, cum cetera que
ad artem spectant omnia, etiā mini-

Erasistratus no-
n minimum quide-
m firmitatem
fuit de sangui-
nis distributione.

Phlegmonas va-
cuius facillime
peritissimūq;
per sanguinem de-
struatur.

Inedia ut euacu-
etur phlegmon-
em, longū tem-
pus desiderat,
et aquosū resur-
rectionem corpus
maneat.

Inedia longū
qua incouen-
da sit aut super-
uenire.

Inedia vacua-
re sed longo tem-
pore, et cum pe-
nicula.

Natura pluri-
mos morbos sol-
uit per excreta-
mentum sanguinis.

Naturam non
esse impedientē
sed mouentē,
monet Hippo-
crates.

ma quęq; sanis superfluitatē tracta-
rit, de uenę tamē sectione, presentaneo illo uni-
coq; remedio, & quod apud ueteres fuit maximi
ponderis, ne minimū quidem, nisi obiter & per
transennā, sermonē fecerit. Nam dum ait, inflam-
mationes (exempli gratia) quę uulneribus super-
ueniunt, uacuatione quę per inediā fit, esse cu-
randas, miror sanē, quoddā auxilio expeditissimo
omisso, ad tardissimū, minimūq; rurū cōfugat.
Ego uerō, quandoquidē per inflammationes ne-
cessaria uacuatō esse (uel Erasistrati testimonio)
eam omniū facillimē prompissimāq; uenę se-
ctione perfici arboror, utpote per quā ipsas etiā
phlegmonas solas, celerrimē curare possimus:
cū ē diuerso incidit, pręterq; quoddā longū tem-
pus requirant, & qualiter etiā uniuersum corpus
euacuant, id quod certē nō est expediens: ut in-
terim alia recte in incōmoda, quę inediā * long-
gas necessariō sequuntur: cuiusmodi sunt uirtus
defatigata, succi biliosiores atq; amarulentes
effectū, morbus cordis frequētes, inquietudines,
deiectiones suppressę, ac breuiter, omnia recre-
menta * mordaciora & acriora reddita. Quorū
Erasistratus nihil animaduertens, cōtrariū more,
quā amplā cōpēdiōis amāq; & planā uiam in
propinquo habentes, sępēnumo angustā, pro-
lixā, alperamq; errabundā inuenit, & ipse pro-
pinquam admodū, sanisq; expeditā & amonā se-
missi aspērnatus, ad impediriā illā, salebrosā,
& longā se cōsulit: quippe qui hoc tantū cō-
siderauerit, num quō ipse contendit, uia eō uer-
gat: nō autē, an cōpēdiōis, & sine periculo duc-
car. Nam quod uel inedia ad plenitudinē uacua-
tionem cōferat, ego nō eo inficias: uerū longo
tempore, magnūq; cum nocumento, eam effice-
re id proficere. Iam uerō cum Erasistratus per-
petuō admiretur naturā, ceu artificiosā, promi-
damq; animalū gubernatricem, nūquā tamen
eam imitatur. Aut cur illam plurimū morbis san-
guinis euacuatione medentē cernens, ne in uno
quidem, ipse tali pręsidio utitur? Itaq; mihi aut
modis omnibus demē, aut in naturę operibus
quāminimē uersari esse uidetur. At omniū bo-
norum, quę ad medicā artem spectant, nobis
autor Hippocrates, nos monet accuratissimē (id
quod etiam Erasistratus nos monere debuisset)
ut quandiu natura fortis atq; uegeta existens, se-
se ad crīsim accingit, nō perturbemus quiddē mo-
tum ipsius, perficiamus autem ea, quę superata
morbosā causā uel uehementiā, nō potēti ad in-
tegritatem perducere. Quę iudicant, & iudicatū
sunt (inquit) integrē, nec mouere, nec nouare,
sed finire. Istud quiddē habes propriū naturę in-
tegrę mouentē pręceptū. Quod uerō huic suc-
cedit, naturę & ipsū, uerū diminutū ad crīsim
mouenti congruit: eamq; ob rem ut illi simus ad
auxilio iubens, ait: Quę ducere oportet, hæc quō

maximē natura uergit, per loca cōferentia, ducē-
da sunt. Natura siquidē tum temporis expellere
aduersariū conatur: cū autē prę imbecillitate
imponere operi finē nō possit, auxiliū nostrum
implorat. Propterea etiā laborantes dolore late-
ris, iugulū affligente, aut regionē quę supra prę-
cordia est, secta interna cubiti uenę dicit esse ua-
cuandos. Vbi uerō dolor sub septo transuerso
fuerit, ut subdual alius uel nigro uerato, uel
peplio, cōsulit. Similiter in quopis rēti affectu,
uenam quę in poplite est, incidendam censet.
Idem etiā Margei famulam, cui ob contortū ad
uerbebras coxarū os, uteri grauius suppressa e-
rar post partum, atq; inde grauis dolor secutus,
restituit, uenam prope malleolū secans quā tre-
mores torū corpus iam occupassent. Sed neq; ex
his qui rationalem empiricāq; sectam amplexi
sunt, quisquā d uenę sectione abstinuit. Vt autē
naturę opera producamus, quō nō ipsa cunctas
mulieres singulis mēstribus, quod ob ignauitā &
oculū, multitudinē humorū coaceruēt, superfluo
sanguine euacuat? An nō etiā idem post partū
molitur, quīs futura ipsa quēdam species uacua-
tionis exilit? Ad hæc uerō, postquam factus e-
dirus est in lucem, lactūs generano in mamillis
non parua & ipsa euacuatio plenitudini exiit.
Vna siquidem & lactūs & mēstruorum substan-
tia est: amborumq; (ut quispiam dixerit) riuorū
fontes cōmunes, sunt uenę. Quamobrem qui-
buscuq; per artem mēses fluere cessauerit, his
neq; in mamillis lac amplius gignitur. Quęcūq;
etiam purgandi tempora adhuc habent, atq; in-
tēra lactant, ex nō purgantur. Pręterea cum la-
ctant mulieri sanguis per locos erumpit, illic
huic lac euanescit. Insuper quę animalia non ge-
runt utero, his neq; lac unquam adēti: rursus qui-
bus id suppetit, illa etiā ad cōcipiendum idonea
sunt. Porro si mulier per excretionē illam men-
struū pōtē expurgat, nec podagris, nec articu-
lorum doloribus, nec pleurinde, nec peripneu-
monia, nec alijs deniq; ex plenitudine affectibus
infectabit. At mēstruā retentis, eam cuiuslibet ma-
lo implicari facili est: huicq; rursus euacuatio-
nes medent. Ex hominibus etiā, quibuscuq; pro
consuetudine superflus per lizomōmē impeditur
agūt: quibus item supprimunt inanitiones, hi in
perniciōsissima quęq; labunt. Ac proinde cū
uel in temore, uel in hydropem, uel in aliū affe-
ctum frigidum, mas quidem ob lizomorrhoidū,
mulier uerō ob mēstrū retentionem, incidit,
Hippocrates cōmendat meritō euacuationē san-
guinis, per cōuenientia loca, cū nimirū cōtra-
riam contraria remedia existant. Natura quip-
pe (quā ille uir imitatur) inediā adiectione, re-
pletiones euacuacionibus, frigus calfactioni-
bus, caloresq; refrigeracionibus curat. Nam (ut
alta multa subitice naturę miracula) frequen-
ter cōspiciam cū se prouocantem ad uomē-
tum. Vidi & auem Aegyptiā, quę dysimū imi-
tabatur. Gruēs etiā, quāsiatq; pręlongo usq; ad
ultimos terrarū fines uolant, partim frigus, par-
tim æstum urantes, quō cōtraria cōtrarijs pro-
pulsent, digerit leet. Sectio ira quę uenę (ex
uandē digesta est, nostra reuocetur oratio) ob

Plex: itici quo-
modo, fuit uenę
andē ex dōtri-
na supparati.

Mēstrua cor-
muleribus pur-
fiant singulis
mēstribus.

Lactū q; mē-
struā una sub-
stantia est.
Lac q; non gi-
gnitur, quibus
mēses cessauerit.
Lactantis non
purgantur.

Lacti non ad-
ēti quā uenę
non gerunt.

Hemorrhoides
fluentes suppres-
sę q; quorū bo-
norum atq; ma-
lorum euacuand
causa.

Contrariorem
esse cōtraria re-
media.

Bruta suppres-
sionē naturę
dūcunt.

*Sanguis de-
trahendi men-
surā quā alio-
rum exulsiōe,
multo facilius
deprehendit.*

*Sanguis me-
nstruatus sisti-
tur, nec cum ha-
bet liberam pa-
ssitatem, alio-
autē nequaquā*

*Purgatio fa-
cilius procedit
si foras.*

*Cibi in men-
struata errata,
graviora in me-
dia inducit.*

*Inedia, priuatio
cū sit, nec nu-
trire, nec inuol-
vere potest.*

*Intrahi potest ab o-
bstruam inopia
nutritum.*

*Latentia ab o-
bstruam.*

*Inedia non solum
varietatem cito
facit.*

*Inflammatio
omnes sola in-
dicia euacuandi
efficit, hanc Era-
sistratus.*

causas dictas perperā ab Erasistrato omittitur. Quod autē mensura in uenæ sectione multo fa-
cilis deprehendatur, q̄ in ceteris quibuscumq̄ au-
xilij, hinc declaratur. Nam & coloris mutatio-
nem, nunc quidē in ipso fluente sanguine, nunc
uero in ægrotantis corpore, dispicere licet. Ani-
mi quoq̄ defectio in plurimis affectibus sangui-
nis terminum obinet, quemadmodum uacuatio-
nis fluentis uigor languescit, & pulsus mutari.
Adde quod & medicus huius solius euacuatio-
nis liberam habet facultatem sistendæ, quando-
cūq̄ illi placuerit: aliarum autem nullius. Nam
ubi propinandū sit aliquid medicamen, prima
exhibitiō in tua potestate sita est: cetera uero,
fortuna administratrice obtingunt. In gens præ-
terea in propinationibus pharnacorum penicu-
lum est, cum uel non cōmouetur purgatio, uel
quod in aliu attrahitum est, nō facile excernitur,
uel cum dolore, torminibus, refrigeratione, pul-
sū euanescentia, ac defectu animi exprimit: uel
cū corpus uehemēter perturbatur, interimq̄
paulim admodū euacuatur, aut euacuatio mo-
dum excedit quod spissius, ceu extremū malū,
contingit. Neg enim ut uenæ incisæ fluxū mox
digo superposito sistat, sic sistere alui profluuiū
poterit. Cibi etiam cuiusq̄ in mensura erratum
grauissima incommoda inducit: ut in homini-
bus extenuatis & imbecillibus cōstat. In quibus
si quid miuus, q̄ par sit, nutriat, uirtutem tabidis
reddet. Si uero modum exsuperet, naturæ potius
oneri, q̄ nutrimento, fuerit, illamq̄ penitus & ex-
tinguet & suffocabit. Vt autem funditus Eras-
istrati opinio ē eueriam, solam insituentis inedia-
m, ad euacuandas omnes insitimationes, nemo
ignorat, mea quidem sententia, inedia ip-
sam priuationem quandam existere, ac proinde
nec nutrire, nec euacuare posse, cū inter inanitionem
& uacuacionem sit media. Nec uero ex-
stimandum est, aliquem unquam perijisse ob ino-
piam ciborum: alioqui animantia delitescunt
in latebris sine ciborū copia, perdurare nequa-
quā possent, quemadmodū certe perdurant: quia nu-
trimento non indigent: quandoquidem ob de-
sidiam atq̄ torporem, in quo uersantur, necnon
ob astrictam cutem, nihil ab eorum corpore ex-
halat, quod cibo iniaturari possit. Itaq̄ nō inedia,
sed raritas cutis euacuat: quam si frigore &
quiete densaueris, quid commodi fuerit ex fa-
me expectādum? Ceterū dā Erasistratus cuiq̄
instituire inedia contendit, uidetur mihi ipse
& promotor existere.

GALENI PERG. DE VE- næ sectione aduersus Erasistratos Romæ degentes, lib. 7. mus.



Vm Romam ininō uenissēm, incidi
in medicos quosdam, qui a uenæ se-
ctione rantopere abhorrebant, ut
cū aliquando æger quispīam pro-
pter plenitudinē iam præfocaret, ne-
tum quidem hoc auxilio uti uellent: idq̄ secuti
Erasistratū, qui nusquā uenæ sectionē probane,
omnes inflammationes sola inedia euacuandas
esse censēbat. Qua in re quātopere nūc ille ballu-

cinatus fuerit, quis nō cernat? Etenim si ob id in-
edias probamus, quod uacuatis per eas uenis,
affectū minui cōtingat: multo hercle cōmodius
fuerit, ut semel adhibita euacuacione, potissimū
quæ per sectam uenā administrat, ab inedia ab-
stinemus, ut quæ & ægrotos in gēti molestia lo-
lear afficeret, & nigulas, & inquietudines, afflic-
tionemq̄ oris uentriculi, tum corruptionē suc-
corum, necnō alui, atq̄ interdum uirinx suppres-
sionē inferat. Quamobrem nōnulli in Romana
urbe medici, præcipuē qui medebant mulierib.
cū explorassent infelicē cuiusdā puellæ, ob nō
sectam uenā, successum, in quibus sanguis fere-
batur ad superiora, tempore quo eruptio men-
struorū expectabatur, uenæ sectionē iam usurpa-
uit. Nec uero quētē, nec inediā eis inuigebat,
sed medicatū propinabant: nistūq̄ humectante
ac lauariū affiant uti eis permittebat. Ab his e-
nim, si uel mediocri quantitate sanguis fuerit de-
tractus, purgationes exoriri cōstitum solent, præ-
sertim si infra poplitē, aut iuxta talum uenæ se-
ctio fiat. Sen autē quis uenā secta iniunxerit ipsi
mulieri inedia, menses prius fluentes cohibe-
bit, inculpatibilesq̄ reprimet purgationes. Sāguis
nanq̄ ciborū inopia arefcit, ac densior seipso red-
ditur: eamq̄ ob rem, ad fluxum ineptus euadit.
Quæ igitur tum forte iuxerit, melicratumq̄ & ci-
bos idoneos sumperint, ac uinum neg austerū,
neg crassum biberint, his purgationes procul-
dubio cōtingent: ob idq̄ ego inedia post uenæ
sectionem nō frustra tantā, uerumetiam adhibe-
ri cum magno damno proficere. Iam uero cū
nostra hac tempestate mulieres quædam Roma-
næ frigidissimā ex nue potarāt, ob idq̄ aut nullo
pacio purgarentur, aut diminuit: eas tamen
medici sectione uenæ adeo incolumēs seruauē-
runt, ut nec sanguinem ipsuerint, nec e pleuritide,
peripneumonia, aut angina unquā corripentur.
Porro in auspiciis inflammationum, omnis
forbitio nō ciborumq̄ adfectio subtrahenda est:
ntendum uero uenæ sectione. Si quidem inflama-
tiones quæ febres faciūt, ut plurimū ex pleni-
tudine sunt. Quamobrem si nasa nutrimento im-
pleantur, maiores ac uehemētiores ipse inflama-
tiones reddent. Ceterū si adolescentes qui neg
de sanguinis detrahendi mensura, nec de uenarū
secandarū ratione quicquā audiuerint, ad
præsidium hoc sese accingant, ægros in exitium
perducunt. Plures nanq̄ ob perperam sectam ue-
nam perierunt, q̄ quibus adhibuit id auxilij nō
fuerat. Quippe seniores medici tum tēporis u-
enas secantes, utebant alijs euacuatorijs auxilijs,
quæ idem qd & uenæ sectio, uerū longiore tēpo-
re, efficere poterāt: nisi quod quandoq̄ ob prin-
cipem partē affectū, aut ob plenitudinē exupe-
rantiam, æger morte præoccupabatur. Verū qui fe-
bres cunctas in principio uenæ sectione indige-
re autumant, nō mediocri etiā noxa ægrotos af-
ficiunt. Itaq̄ minis aberrare eos consentaneum
est (ut Plato ait) qui nō aggrediunt illa quæ igno-
rant, quā qui ea tractant, quæ didicerunt nun-
quam. Porro quod us aliqd ruptum possit
abiq̄ inflammatione coalescere, dummodo nos
cetera ritē administrauerimus, sanguinisq̄ quan-
tum nobis uisum fuerit, in tempore euacuaueri-
mus,

*Inedia, per u-
dacti, solius
Symptomata.*

*Menses eueni-
unt, si uenæ
poplitæ, in uen-
triculo.*

*Inedia post u-
nā sectionem cum
magno damno
adhibetur.*

*Menses qui-
bus purgationes
aut potius
fuerit, uenæ se-
ctio succurrere
possit.*

*Inflammationis
curatio.*

*Vena sectione
perperam adhib-
uit, nec potius
plures, quā
quibus adhib-
uit id auxilij
non fuerat.*

*Febres cunctas
in principio u-
enæ sectione
curatio.*

mus, liquidò constat. Frequenter liquidè uldimus, quum quibuscumq; pugnandibus singulari certamine totum crus brachiumve dissectum esset, co aluisse tamen uulnus, antequàm inflammatione oriretur: quod quidem multò magis contingit, si (ut Hippocrates ait) jillico sanguis copiosius fluxerit. Scipius etià uulnus in causis thoracis partes illatam, triduo conglutinatum uidimus. Quòd autem Erasistradus nufquam fuerit usus uenæ sectione, hinc perdiscere licet, quòd in plenitudine omni semper inediandū inuagitur: id quod nequam facturus esset, si eam sanguinis detractione uacuaret: quum minimè consentaneum rationi sit, ut quis circa unum eundemq; ægrum, utraq; auxiliâ, nempe inediandâ, & uenæ sectionem, usurpet. Nec uerò existimandū est, phlebotricos omnes sanguinis esse detractione uacuandos. Prius siquidem distinguenda natura plenitudinis est, hâbitu doq; & grâs ægri expendenda: tempus item, regio, & acris constitutio consideranda: necnon quæcunq; antecesserunt, quæq; ipsum ægrum etiamnum infestant symptomata. E conuerso alios pleròque tibi oculos ponam, qui absque repletionem quam sint, uilulominus uenæ sectione non opus habent.

GALENI PERGAMENI DE
cursu ratione per missionem sanguinis, liber unus,



Vi de sanguinis missione speculamur, primò quidè inuehigare debet, quænam corporis affectiones euacuatione indigeant. Secundò, quæ illa, quæ per sanguinis sit detractionem. Tertio, qui innoxie hanc ferre possint euacuationem. Quarto, quonam potissimè tēpore ipsa molienda sint. Quintò, quâ ex uenis secare oporteat: quum tūmirò haud parū intersit, hanc ne, an illâ incidas. Porro hac quoq; contemplatione absoluâ, succedit de scopis oratio. Quibus mentem adhibens quis, uacuationis modum facit per coniecturâ inuenit: nec non in quibus semel anferre præstet, & in quibus repetitâ ablationē moliri: tū in quibus nam inanire usq; ad animi expediat de liquum: & in quibus ill, ceu summū malū, uirare. Cū autem per omne uitam, omnia quæ in questionem ueniunt, duo inuentionis organa obliueant, nempe rationem & experientia: necesse esse arbitror. & nunc quoq; me, aut ratione sola, aut sola experientia, aut iunctis ambabus, quæ propostæ sunt, scrutari. Si quis ergo affectiones quæ uacuatione indigent, uelut experientia collectas exponere, sola opus est ad explicationem memoriam. At si uia rationali id efficere inhiat, necesse est, ut prius cōmune ac generale inueniat, uel illius deinde in species differentias sectione, uix ad species ultimas, affectuum numerum, uacuationem desiderantium, inueniat. Etenim ratio ipsa, hæc quidem, ex cōmuni bus tantūm progrediens notionibus, inuenit & demonstrat: hæc autem, etiam quæ ex istis inuenta sunt, ad demonstrationem adhibet. Ac priori sanè ratione, omnes artes, omnesq; homines uti assolent. Secunda uerò, non omnes homines: nam propriè ad artifices pertinet. Eam igitur nos impræsentari sequenti,

utemur multis, quæ in alijs cōmentarijs sunt demonstrata. Nempe complures esse facultates quæ animalia gubernant: quarum alias naturales, alias animales uocari. Generationes autem principijs pro materia, quatuor elementa subiacentia tota per sese mutuo misceri: effluui in uicem in se agere nata, idq; per qualitates suas effectrices, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatem: ex quibus utique omnium temperamenta constantur. Præterea dari duplicem plenitudinem, nempe secundum uasâ, & secundum uires: primarias actiones, à familiaribus corporibus perfecti: ut secundarias ab instrumentarjs. Quum igitur plenitudinē bifariam & fiat, & dicatur: uno quidè significato, ut ad uires: altero, iuxta laxitatē continentium uasorum. utriq; sanè opus est uacuatione, siue ea in homine ualeat dinario, siue etiam in ualentem contigerit. Voco enim plenitudinem iuxta uasâ, magnam humorū colluuiem, ipsa uasâ tendentium. Iuxta uires autem, eam quæ uel si minimè uasâ distendat, uires tamen grauât, & premit, hominemq; reddit ad motiones pigrum & tardum. Quòd si simul addit ulcerositas etiam aliquis sensus, ac potissimum dum mouemur, si quum est affectum ipsum uitiosi facti esse sobolem. Quandoq; autem & in partibus quibusdam corporis, non in tota mole, plenitudines adfunt similes istis, quæ uni uersum corpus solent opprimere. In omnibus igitur id genus affectibus, maxime ex uis uacuationes humorum, aut uasorum, aut spirituum peccantium: minimè tamen semper sectio uenæ desideratur, sed sufficit interdum purgatio, frictio, balneum, inunctione, ex aliquo digerente medicamento. Quæ autem affectiones uenæ sectione indigent, deinceps dicemus. Non solum uimentum animantibus partibus præstat sanguis, sed calorem etiam naturalem conseruat. Itaque ipsius cordis calor interdum quidem seipso minor efficitur, aut propter sanguinis copiam, à qua nimirum extinguitur, aut propter ingentem inopiam, aut propter frigidam qualitatem interim uerò maior, aut propter calidam sanguinis qualitatem, aut propter exiguâ inopiam. Quicquid autem cor in caliditate frigiditatemq; perperit, eius quoque & alix corporis partes protinus participes sunt. At quæ membra accidunt caliditates, aut frigiditates, eas quæ parti quodam affectu uicines sunt, unâ alterant, in totum tamen extendi corpus, priusquàm cor immutetur, non possunt. Ceterum quandoquidem omnia simul calida & humida cōtissime compreturunt, sanè si quod nutrimentum suggeritur à uentriculo ad hepar, à natura non superfluum, alijs probum sanguinem non conuertitur, alias aliam perperit putredinem. Quum autem tem quæ ex materia putrescent calida, quàm antea calidiora reddantur, calidior profectò erit ipsæ sanguis putrescent, ac proinde etiam particulâ, in qua ei putrescere contigerit. Quia uerò ab insigniter calidis, simul quæ uicina sunt incallescunt, utique calor ille acris & mordax (qualis à putredine oritur) illis quæ uicinas sunt, communicabitur. Ergo si pars quæ hoc pacto incaluit, insignis sit, aut calorem suum in cor extendere ualeat, unâ & ipsum accendet, ut quod natura calidissimum sit. Quòd si semel illud accensus fue-

Faciunt autem animalia diffinitiones sunt plures. Elementa quatuor subiacentia tota per sese mutuo misceri nata, idque per qualitates suas effectrices, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatem.

Plenitudo in uasâ uasâ quid. Plenitudo in uasâ uasâ quid.

Sanguis non solum animantibus, sed calorem naturalem conseruat.

Cordis calor non minor atque maior reddatur.

Cordis inopiam propter caliditatem partium in inopia.

Putrescentia sanguinis calida & humida.

Putrescentia reddi calidiora quam antea.

Indicium est uenæ sectionem si malis circa uenam eundemq; ægrum, uenamq; esse uacuandam.

Venæ sectione plerique indigent, qui tamē extra plenitudinem sunt.

Sanguinem detrahendo quæ uis habenda.

Inuentionis organa duo sunt ratio experientia.

Ratio duplex.

Febri quid-

rit, facit totum ipsius iam corpus simul exaltescit: qui affectus uocatur febris. Nonnunquam uerò, prius quàm computrescat sanguis, ingens ipsius uis decumbit in partem aliquam: quàm aut extinguit omnino, ià ut actio ipsius pereat: aut illi certerè noxam non conueniendam infligit. Hoc siquidem pacto apoplexie prouenit, multo nimirum sanguine incumbente còstertim in animi sensu principium. Quòd si in aliam particulam ruat, tumorem inibi præter naturam excitat. Cuius generis phlegmonæ existit. Verùm si crassior sit, atque bilis magis naturæ fuerit qui decubuit sanguis, scierhorior tumor efficitur: sicuti si piruitior sit fluxio, laxus: & si biliosus, tumor erysipelas dictus. Quum itaque plenitudo (quemadmodum exposuimus) sit duplex: & ex ipsi, ea quidem quæ ad uires refertur, facit in putredinem abeat, interdum in partes quasdam inguens, inibi tumorem præter naturam excitat: altera autem, quæ iuxta uas dicitur, sepe etià in partes quasdam decumbat, tumoresque & apoplexias, uenarumque ruptiones moliat: utramque celeriter euacuare tenendum, prius quàm aliquam perniciem concilient. Si igitur qui plenitudine grauior, aut tenditur, uex puer sit, nec senex, an illi uenam secare oporteat, expendes, præ oculis habens hosce principales scopos: plenitudinis nempe tum quantitatē, tum qualitatem: uirum robur, atque eandem infirmitatem. naturalem totius corporis habebit, tempus, regionem, anteaquam uitam mutet, an cibi potusque copia, & præcipue æstus nutritionis, qui sic affectus est, fuerit usus: ad hæc, còsuetudinem, & res præter consuetudinem actas: quo usque motus exerceat, quas excretionē habuerit, aut præter solitum compescuerit. Præter omnia aut hæc, nūm gracilior, aut crassior euaserit. Porro utriusque plenitudinis quantitas, ex propriorū signorū magnitudine definietur. Quamrò enim grauior sibi homo uidebitur, tantum & plenitudinē quo ad uires creuisse constat. Ad eundem modum, quantum auctus fuerit tensionis sensus, tantum & auctam alteram plenitudinem, quæ secundum uasa uocatur. At utriusque plenitudinis qualitatem, partem ex coloribus iudicabis, memor colorem humorum esse, si quidem ab externo calore uel frigore totum corpus laud immodicè affectum fuerit: partem ex iis, quæ humorum naturæ coniuncta sunt. Etenim calidiores, calidior totius corporis sensus sequitur, ut frigidiores, frigidiorum eos qui in uenis quidem aceruantur humores, uasorum tumor atque distensio: qui uerò in carne, sensus in ea uel grauior sit, uel tensionis, uel etiam caliditatis. Porro dispensantium nos faculatum infirmitas atque robur, propriis indicant functionibus: uoluntatis quidem, illius quæ in nervis cerebroque consistit: pulsificis autem, eius quæ in corde ac per arterias mouetur. Nam secundum bonam nutritionem aut abolitam, & colorem probum, aut prauum, tertia facultas, quæ nutrit est, & à leuore proficiscitur, cognoscenda uenit. Vbi ergo exantibus plenitudinis signis, ualentes facultates exiterint, incides uenam: uidelicet si tensio quidem sit ipsa affectio, nihil distinguens: magisque etiam in phlegmonode: sin uerò degrauens sit plenitudo quæ infestat, haud semper sanguinis molenda detractio est, Nam si-

ri potest, ut crudus per corpus collectus sit humor, à quo talis affectio gignatur. Quem succum sanguinis missione uacuare non expedit, sed frictionibus, uenionibusque medicis exaltescentibus: necnon potionibus cibisque, & humoris crassitudinem incidentibus, & calfacientibus modicè. Si quidem quis ualenter exaltescuerit, nimis subito uires deiciunt, sepe etiam uires adaugent. At uerò qui sanguine recte expletore, in præsens quidem curant, ceterum eam fortiter sunt thoracis pulmonisque structuram, ut uel pauculo plus collecto sanguine, prorsus aut uas alicuius osculum referret, aut ipsum rumpatur: iis, uel si nullum in corpore etiamdum adfuerit symptoma, incunte tamen uere sanguinem mittere oportet. Similiter in iis qui promptè morbum comitalem, aut apoplexiam, aut peripneumoniam, aut pleuritidem, aut anginam incurruunt, cuiusmodi affectus anteuertendi sunt sanguinis detractioe. Eodem modo quibus hæmorrhoides retentæ sunt, potissimum si natura sint atrabilaria, quique quorundam excrete plethorici morbis corripri assolent, & hos quoque ueris initio uacuare expedit: nec secus eos, qui ipso etiam uere illiusmodi malis uexantur. Ceterum intemperantes & uinolentos, uentris & gulæ dedros, nec purgatione, nec missione sanguinis magnopere iaueris: nam per uitæ intemperantiam rursus crudorum humorum copiam quamocysissimè colligunt. Quare iis ne manum quidem admoueas. Eis uerò qui præcepis salutaribus obsequuntur, summo opere profuevis, si principio ueris primùm quidem euacuaueris: dein autem ad exercitia, salubremque uisum rationē perduxeris. Sed nec tantum ubi adest plenitudo, siue ea secundum uires sit, siue secundum uasa, misce prodest uenæ sectio: uerum etiam citra plenitudinem initio phlegmones, quæ aut propter ictum, aut propter, dolorem, aut partium debilitatem proueniunt: quippe dolor sanguinem ad se trahit, & sepe partium debilitas phlegmonem, absque corporis plenitudine, contrahit: quum uidelicet partes fortiores, per uenas, ceu per canales quosdam, propria excrementa semper ad imbecilliores expellant, donec tandem ad partem imbecillimam omnium defluerint, & quæ ex se amplius propellere, quod in ipsa redundat, nequeat: id quod accidit illis partibus, quæ uim excreticem uicinis omnibus imbecilliores possident. Quamob-

Crudo humor
quæ ratione re
creandus.

Sanguinis de
tractioe quæ
sit proficienda
mentis uere.

Intemperanti
cor incalescent
non sit.

Phlegmoni in
apertis, etiam
si plenitudo non
adest, assisten
tiam misce.
Vnde sanguis
trahit.

Imbecilliores
partes à for
tioribus huma
res recipiunt.

Imbecilliores
partes aut uer
um, prima et
repleantur: tunc
missionis modis.
Glandulæ ut
proprie excipiat
fluxiones.
Pulmo.

Lien.
Cerebrum.

Cibus

Apoplexia fons
multæ sanguinis
accumulatio in
autem parte prin
cipium.
Phlegmonæ gene
ratio.
Scirrhus.
Oedema.
Erysipelas.

Neurodynamia
uires facit in
putredinem abeat.

Sanguinem
detractioe quæ
fons prius expe
denda.

Plenitudinis ut
riusque quanti
tas qualitatisque
quibus signis sit
definienda.

Color humores
indicas.

Faculatum nos
dispensantium re
bus imbecilli
tatis, re propriis
inducantur fun
ctionibus.

Sanguinis de
tractioe quæ
de sit plenitudo
uacuanda.

20

30

40

50

60

ribus accidit. Merito igitur in his curandis scopus est, non euacuatio, sed totius corporis roboratio: quam uiam tamen curationis innum illos oriatur a misso sanguine, & si excrementa prauam qualitatem habuerint, una etiam adhibere purgatio. Recte autem admonemur in libro de uicibus ratione in acutus morbus, ut si magnus sit ipse morbus, & æger floreat ætate, adsitque robur, sanguinem detrahamus. Cæterum principes scopi minendi sanguinis, sunt duo: nempe magnitudo morbi præsentis, imminutis, & cum ea uirium robur, quibus si adiciās etiam florentem ætatem, uelut sermone defuerit: modò sub ætate florentie, præcedens sequens illam intelligat, excipiant turgidæ distinctiones, tantum sensus atque purorum æta. Quamuis ætas senilis in uirium uerbo comprehendere potest, quum eorum nulli adsit robur. Si itaque magnam fore morbum si memus, aut iam præsentem est, aut incipit, uenam secabimus, uirum habita ratione, tantumque ex oratione exemplis pueris. Nec uerò ubi tanta humorum crudorum copia accumulata est, ut secandam uenam

* prohibeat, sermo hic redarguitur, quum ipse uirum robur non adsit. Et si hoc indicium hoc haud posse sanguinem missione perferre, * quod præter colorem totius corporis, degenerant in ipse ab eo, qui solet sanguinis copiam ostendere, etiam ipsorum pulsus inæqualis in uehementia & magnitudine existit: præpollentibus secundum ipsam inæqualitatem, imbecillis simul & paruis. Itaque morbo, ætate & uiribus, minuendus esse sanguis cognoscitur. At uacuationis quantitas, cum ex istis, tum etiam ex plethorica uocata syndrome, æris non subueniens temperet, quæ in tempus & regionem diuiditur, antea facta uicibus ratio ne, excretionibus factis, ut impeditur, commodè deprehenditur. Igitur ad hæc omnia respicienda, tum podagricis, tum arthriticis, tum morbo communi obnoxii: præterea melancholicis, quibus sanguinem antea expuerunt, aut thoracis fructum ram fortin sunt ad id malum idoneam: uertiginosis etiam, quibus assidue corripit solent angina, peripneumonia, pleuritis, hepatitis, de ophthalmia uehementi, ac breuiter morbo aliquo insigni, sanguinem detrahare consueui. Porro in redundanti melancholici humoris, sanguinem mittere oportet, aut certe medicamento ut expurgante atramentum. At ubi crudi succi exuperant, antequam morbus inuasit, cautè euacuabis: ubi uerò iam corripuerit febris, nequaquam. Indicium autem et uidorum humorum est color plumbeus, aut albus pallidus, omniaque potius quam rubicunda inæqualis pulsus. Verum si nobis humoris oides suppreffas cumulatæ allicui sit sanguis in corpore, audetis uenam incidere, etiam si antea expertus fuerit morbum non fuerit. Sed nec euacuatio ipse proroganda est, quibus resistit mensura purgatio. Non tamen necesse est, illis semper secare uenam, quum malleolorum scarificatione quandoque superfluitati uacuandæ sint satis. Ple

nitudines tamē a superfluis mensibus ortas, omnino per crura euacuabis, siue uenam secare oportet, siue etiam scarificare. Sed & quippe in cubito uenæ, muliebrem purgationē reuoluit. Iam uerò quæ ex mulieribus albidiores sunt, ætate reuicem sanguinem solent: quocirca scarificatio-

nibus malleolorum adhibita, maxime solent iuari. At quæ nigriores sunt, eas uena scicta curabis, quum tales crasiores sanguinem, ac magis melancholicum gignant, præcipue uerò si magnas habere uenas apparent: id quod accidit illis, quæ graciliores simul atque nigriores fuerint. Et enim carnosæ & candidæ parue insunt uenæ, ac proinde ipsi malleolos scarificare, quæ secare uenam, præstiterit. Porro ualidam sanguinis eruptionem, uenæ scictio longe facpe compelleret, frontum reuolutorum auxilium. Secare autem in cubito uenam, si ex dextra nare prorumpat sanguis, in brachio dextro expedit: si ex altera, in sinistro: minime tamen usque ad lapsum uirium de trahendus est sanguis. Simul autē, quum agis, artubus uincula iniicio, ut ex lana, aut ex canabe, hypochondrioy directè supposito, cucurbitulam admovento: quandoquidem his remedijs semper erumpentem & naribus sanguinem compescimus: quum antea quæ insertur in nares, atque frontum illum uirum, infirma omnia competeremus. Nihil autem quæ ætatem medicis in agendo coniecturalem efficit, ut cuiusque remedijs quantitas, siquidem interdum exploratum habemus, quid nam ægro, quale, & quando sit exhibenda: at quantum exhibere oportet, non exiimua.

Hoc tamen summum bonum in sanguinis missione habetur, quod potes sistere euacuatiouem, dum opportunum uideret: ac rursus si quando animas sit, finire ut fiat, quouique uidebitur tibi rectè se habere negotium: id quod non licet in purgantibus pharmaci exhibitione. Nam quod fides in uentre deuoratum est medicamen, quominus omne sit deuoratum, fieri non potest: necne possibile est, ubi plus quam conueniat, purgare homo, partem oblatis auferre. At uerò dum alicui sanguinem mittimus, nisi quid urgeat, præstari priori missione minus detrahare, iterumque illam repetere, imò, si lubet, tertio. Vbi igitur multam euacuatiōem est opus, sed uires sunt imbecillæ, in his euacuatiōem partiri expedit, uti & me fecisse uidisti, in his quibus crudorum uerat humorum copia. Nam detraheo paululo sanguine, protinus exhibeo melicratum, probe coctum, cum incidentum medicaminum quopiam: uelut hyssopo, origano, nepita, pulegio: aut eære cum melicrato oxymeli, aut oxysglycy: ac sic rursum sanguinem minuo, uti ipso eodem nonnumquam die, interdum die postero: in quo rursum exhibito propofitorum medicaminum quopiam, aliquid de sanguine aufero: ac rursum tertio die similiter bis. Cæterum ubi seruescentis inest sanguinis plentitudo, acutissimam febrem accendens, subito ac simul uacuare expedit, eamque priusquam in principium aliquam partem ingruat, in anire tentandum, uel ad auiui usque deliquium: uirum tamen inspecito robore. Quare nec per noctem sanguinem detrahare ueretur. Vile autem fuerit, fluente etiamnum sanguine, expendere pulsuum diminutiones: ne uidelicet, nobis non aduerterentibus, pro animi deliquio mors hominem occupet. Quin etiam & reuolutorum, non lene & ipsam auxilium, quodvis sipe scicta adhibetur uenam, quando maiorem in numerum particulares auxeris detractiones, tantò efficaciorē effeceris.

Ergo si magnitudo morbi, missione sanguinis

Scarificatio qui bus sit adhibenda mulieribus, & quib. scictio uena.

Vena quib. la ta. & quibus e rumpit uena, malleolus.

Sanguinis eruptione uenæ scictio compescit.

Sanguinis eruptione per narij uenæ per uenæ curanda.

Quantitas reuolutorum præcipue reddat ætatem modicam uoluntatem.

Sanguis detrahens quæ commoedat uenæ.

Pergratissima pharmaca, ubi deuorata sunt in uentre inane, reuocantur in posse.

Tænarationem quæ de partem expedit.

Sanguinis missione quibus ad est crudorum humoris copia quæ uenæ detrahenda.

Sanguis quæ antea missus uenæ sit ad anire usque deliquium.

Sanguis domus sunt, postquam expulsi sunt. Reuoluto per scictam uenam uenæ, quæ ad sua officium.

Sanguinis malleolus principes scopi qui sunt.

Sensu omnes carere robore.

Pueri secandam non esse uenam. Crudo succi repletus ad admittere uenæ scictio non quia carere robore.

Vacuationis quantitas in quibus uenæ scictio.

Sanguis quibus sit detrahendus.

Crudo succi quando uacuare oportet, & quibus inuoluitur. Crudorum humorum in indicium.

Uenæ uenæ, ubi uenæ suppreffas, sanguinem detrahendum est.

Mensura euacuanda per crura: reuolutorum per uenam in cubito scictam.

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

possit, adfectu uiri robur, nulla potest esse tan-
ta crudorum humorum copia, quæ inhibere id
auxilium possit. Cæterum quibus amplè sunt ue-
næ, quibus modicè graciles sunt, nec candidi, nec te-
nera carne præditi, eos copiosius uacuabis: con-
trarios autem parcius, quum exiguum habeant
sanguinis, carnesque facile transpirabilem. Qua
ratione nec pueris pertundis uenam, ante quar-
tudecimum annum: post quem, si multus con-
gestus sanguis appareat, tempusq; anni sit uer-
næ, & regio temperata, pueri natura sangui-
nea, aut alius cuiusmodi morbi discrimen impen-
deat, sanguinem minues, in primis quidem ad co-
tylam usq;: quod si postea uires ualidæ permane-
re uideantur, dimidium eius adijces iterata mis-
sione. At uetèrè, equalis, & magnus pulsus, in-
corruptum uirum robustum est signum. Quare
si in septuagenariis est addit, affectusq; iubeat, etiam
secabis uenam. Proinde non tantum annorum
numero, sed corporis etiam habitus auius in-
tendendus est. Ad hæc, ubi incisa uena effluit san-
guis, mutatione eius, & maxime quum adfect phle-
gmone, labascensq; fluxionis robur, expendere
oportet: sed potissimum alterationem pulsuum:
quibus quidem alterascensibus, aut in magnitu-
dine, aut in qualis inæqualitate, cõtinuò quies-
cendū est. In quibus aut iuxta sectam uenæ phle-
gmone est ingens, optimū est sanguinis & in colo-
re, & in consistentia expectare permutationē. Id
quod semini Hippocrates in curatione pleuritidis,
ait: Secta uerò in cubito uena interna. Nec
uicinis multum detrahere, donec rubior, & la-
uidue multo effluat: aut pro puro ac rubro liu-
dauit: utrumq; enim accidit &c. Eius siquidem trās-
pirationis, quo nonnihil sanguinis à parte phle-
gmone obiecta rapitur in uulnerat uenam, con-
stituit signū, ipsius sanguinis mutationē. Quæ ra-
men nō omni ex parte expectanda est, quā aliquan-
do, priusquam ipse sanguis muretur, cessandum
sit, nimirū duplici nomine: uel ob uires infirmas,
uel ob malignitatem phlegmones, à qua interdū
nihil emittitur, sed inibi foriter impactus est san-
guis. At si ex uacuatione uires minimè resoluui-
deantur (id quod ex pulsa cognoscas) æger autem
fit ætate florenti, expectanda mutatio sangui-
nis est, potissimum si ambiens sit temperatus. Mi-
nus autem detrahimus, quā plenitudo commo-
net, secundum ætates quidem, in pueris: secun-
dum corporum habitus, in cãdida, & carne mol-
libus, cuiusmodi Galli existit: secundum tempo-
ra uerò, sub Cane ita similiter secundā regiones,
constitutioneq; in iis quæ calidiores iuxta & sic-
ciores existunt, quum nimirum hæc omnia, quā
maximè ad resolutionem sint apta. Alia autem ra-
tione in contrariis, hoc est, temporibus & regio-
nibus frigidis, largam fugiemus uacuationē, pro-
pter insequentem refrigerationem. Quare unum
uacuationis modum in distorā singulis defini-
re nō licet. Memini enim quibusdam ad sex us-
que libras sanguinem fuisse detractum, ita ut fe-
bris protinus exingeretur, citra ullam uirium
iacturam: quibusdam uero seculislibram tantum,
nec id absq; insigni damno. Porro ex uenis quæ
ad magnos oculos angulos conspiciuntur, aut sub
lingua, quod certe mentione sit dignum,
effluere non solet: sicuti nec si quis summa in ma-

nu, aut pede uenam secet: quemadmodum pu-
tant, qui liem curari aiunt, à sectione uenæ si-
te iuxta secundum ex digitis paruis. Quod uerò
ad differentiam uenarum pertinet, quibuscunq;
nare ipsæ, hoc est, à directo eruptio sanguinis acci-
dit, summum id commodum laborantibus ad-
fert. Quibus autem contra euenit, ubi iuuat, aut
etiam interdum nocet: quod uires scilicet, citra
morbile uiam, deiciat, ut si liue turgente, dexte-
ra nare sanguis efflueret: aut hepate, ex sinistra.
Dextra igitur nare sanguis erumpens, ad dextrum
hypochondrium fixa cucurbiuila, clare, celeriterq;
sistitur: sicuti ad sinistram, si ex sinistra pro-
fluat. Similiter si uenam reuolutionis studio leces,
secundum reuolutionem quidem secta, oppositis
sanguinis eruptionibus citissime conspiciam uti-
lilitatem adferet. At si contrā feces, nihil sanè pro-
fuert. Quare si liene affecto, perinde adiuuerit ue-
na secta in sinistra manu, iuxta annularem digi-
tum, ac si internam cubiti uenam secueris. Pluri-
mum natiq; iuuat afflictum liem, sanguinis ex
sinistra manu interdum usque ad libram unam,
detractio. Præstat autem non semel quantum cõ-
ueniat, detrahere: sed in duos dies ipsam euacu-
ationem parti. Pleuritis etiam, quæ è directo la-
borantis lateris adhibita fuit sanguis misist, cla-
rissimam spe utilitatem attulit. Quæ uerò ex bra-
chio opposito, aut omnino obscuram, aut certe
post temporis interuallū. Ad hæc, oculorum per-
sepe dolores grauissimos è directo uenæ hume-
ralis sectio, aut medianæ, quæ ab ea deriuata est,
intra horū unius spacium compescit. Conari au-
tem in omnibus affectibus præstat, post modicā
missionem sanguinis, iteratò mittere, interim eo-
die, interim postredie: nisi quando ad animi uolū-
tedi quum, uacuationem ducere oporteat. Ad do-
lente latere, aut pulmone, aut septo transuerso,
aut liene, aut icore, aut uentriculo, secta uena,
quæ per axillas ad cubiti uenarum pertingit, aut
etiam quæ illi & humerali est communis, luculen-
tam utilitatem adfert. Sunt etenim ex tres uenæ,
ex quibus in cubito mittitur sanguis, interior, ex-
terior, & media. Inter quas sanè interior utilis est,
in iis quibus inferiores collo partes patiuntur. Ex-
terior uerò, in iis quibus, quæ his superiorem sunt
ut facies, aut caput. At media, medio genere am-
bigit: quum inter utraq; uerius anterior emat
uum, suos ramos producat. Quare si uena quæ
parti affectu propria est, aliquando fuerit obscu-
rior, cogarisq; ob id aliquam mediarum uacu-
are, conare ut quæ à propria diducitur, eam po-
tius pertundas. Interdum etiam, eas quæ inferio-
res flexura cubiti sunt, nempe quæ in ulna consi-
stunt, nihil prohibet uenas secare, sed tamen recto
tramite particulis affectis correspondentes: idq;
ubi uenæ quæ in cubito sunt, non appareat. E-
quidem diutius cuiusdam æconomum, oculo-
rum maxima inflammatione, aig fluxione affli-
ctum, quamocyssimè in pristinum sanitatem re-
stituit, detractis primū ex humerali uena, libris
sanguinis ternis: ac den, modico interposito tem-
pore, alia. Quæ ratione, solus phlegmone, postea
in palpebris relicta alperitatem absterxi, aliquo
ex medicamentis mordacibus: quod neutiquam
æger ferre potuisset, nisi fuisset prius euacuatus.
Siquidem acra omnia medicamentis parti cuius
admoda,

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Sanguis de-
trahendi scilicet.
Vacuando quo
fuit liberaliter,
et qui parvus.*

*Pueri autē
quatuordecim
annorum sangui-
nem nō esse mi-
tuendum.*

*Vires robustas
quæ pulsus indi-
cat.*

*Septuagenarij
quando multum
dus sit sanguis.*

*Sanguis flu-
tem per scilicet
remans suppre-
mentis esse, quā
alteratur pul-
sus.*

*Sanguinem de-
trahendi per in-
flammatiōem ef-
ficat, donec rubi-
or, & lauidue,
aut liuidus con-
spiciatur.*

*Sanguis mu-
tatur post scilicet
remans, quan-
do expe-
ctanda non sit.*

*Galli parum
sanguinem detra-
hendum.*

*Sanguinem ef-
ficat parum detra-
hendi sub Ca-
ne, et in regio-
nem calidam
et sic, ut in
frigida et
constituenda.*

*Sanguinem si li-
brai rotas daret
fuit sufficiens.*

*Arteria omnia
partes carnis ad-
met. fluxum ad-
augens, nisi por-
tum corpus re-
pererat.*

*Mulieris po-
puleum quæ venæ
difficilis, quaræ
partis afflicta
anxietate ur.*

*Rachis male
afflicta, quæ ve-
na secunda sunt
Veni inflama-
tionem à venis in
ture scilicet inu-
t.*

*Menstrua sup-
primuntur scilicet
in cubito venæ.
Menstrua promo-
uentur scilicet in
cruribus venis
tribus quatuor
ut diximus ante
tempus confecti
artur.*

*Mensis proxi-
mus accipit, a
legimus, a
dilatamur.*

*Fluxus picæ
meritis promo-
uet.*

*Vibula à sangui-
ne orta, scilicet in
poplite venæ co-
ratur.
Plegmonas in-
cipientes, reuulsi-
onem ex
ipso afflicto par-
tibus vacuare
oportet.*

*Vena sub lin-
gua scilicet efflu-
it gutture et as-
peræ arteriæ in-
flammatæ in
apertam in cu-
bitu venam.*

*Vena vicia ma-
gnam oculi an-
gulum, et quæ
in fronte est, scilicet
quæ in
anxietate afflicta
est.*

*Cucurbitula cer-
uicis admet, ex
pauca sed dole-
re.*

admotæ, nisi vacuum excrementa uniuersum corpus repererit, fluxionem attrahunt, phlegmonemque producant. Quemadmodum igitur superius omnes iam dictæ partes, secunda in cubito uenaturantur, sic ipsæ inferiores, in cistis quæ per popliteas & malleolos decurrunt. Sunt autem inferiores dictæ, coxendix, uterus, vesica. At renes, quarum collegio adscribi debeant, ambigunt. Quare misso ex cubito sanguini, interdum auscultant: si uidelicet & reuens ipsa phlegmonem sit, & copia sanguinis addit. Vbi uero propria nephritis infestatur, eam quæ in poplite est, secare conuenit uenâ aut certe quæ in malleolia sunt. Sed utrius inflammationes, magis etiam quàm renum, & uenia in crure secus iuuant. Nam quæ ex cubito sunt euacuationes, purgationes mensstruas reprimunt, sanguinemque retrahunt ad supernas corporis partes. At quæ sunt ex cruribus, tantum abest ut retrahant, ut etiam menses promoueat, si tribus quatuorue diebus, ante tempus confecti mulieri circuitas, administrantur: idque aut uena incisa, aut scarificata unius cruris talis, atque inde exiguus sanguinis euacuato: quod sanè postero die in altero crure similiter etiam faciendum est, sic tamen ut in ipsa dictas in quibus uacuatur, atque in alia ante eam quatuor aut quinque, mulier extenuat uenâ uictu iustitias. Sed mulieribus abunde menses prouocant nepia, pulegiumque, si redacta in pollinem, coctisq; in melicrato, propinentur. Conuenientissimè autem potui tepidus, et à balneo, ad illuc inuoluenda linteo. Valeriana medicamenta sunt sanguis, & dictamnum: quorum usus est antedictis similis. Datur autem hoc tempore & hie ra picra, *illa scilicet in cuius compositione centum aloca drachma, cuiusque aliorum medicaminum sexz tantum miscetur. Quod sanè medicamentum optimum est, ubi cinnamomum receperit. Porro uestigiadas siue coxendices, ubi non à frigore, sed imperia sanguinis quæ in coxa sunt uenia, proueniunt, secunda in poplite uenâ carabis. Scarificatio autem nihil periculis eia prodest. Igitur, ut summariè dicam, incipientes phlegmonas reuulsi euacuare oportet: quæ uerò inueteratae iam sunt, ex ipsis, si fieri possent, affectus paritica: aut, si id fieri nequeat, saltem ex uicinis. Etenim in incipientibus auertere quod influit, expedit: in inueteratis aut, ipsum tantum, quod affectu parti infixum est euacuare. Atque euacuabitur optimè per uenas diductas ab his, quæ in partibus ipsis sunt fixæ. Quocirca quæ in gutture & aspera arteria, graui torquentur inflammatione, nō in principio quidem aperta in cubito uenâ, post principium autem in ipsa lingua, magnificè prodest: incisis uidelicet uenis, quæ sub ea sunt, ambabus. Sic indurata phlegmonatum in oculis reliquit, incisa quæ ad magnam decurrit angulum uenâ, excoluntur: sicut capina grauitas, & inueteratas in eo dolores ex plenitudine, leuare manifestè solet secunda in fronte uenâ. Arincipientes, aut etiam uigentes, per cucurbitam in ceruice procurata retractio, interim quidem solum, interim cum scarificatione. Cæterum præuacuatum esse corpus uniuersum oportet. Eadem ratione incisiones in occipito dolores, aut etiam uigentes, in cistâ frontis uenâ solatur. Quippe reuulsiōnes unâ cū euacuatione adhiberi ma-

gis debent, in fluxionibus incipientibus: eaz uerò quæ sunt ex ipsis affectis partibus, aut illa uicinis, in phlegmonia, quæ ueluti scilicet in naturam referunt. In quibus autem corporibus nulla dum particula affecta est, cæterum euacuatione Verē inueniente antequam: in his, si quidem talia sit homo, ut quædam æstiuo tempore corripitur morbis febrilibus, atque in eo exundantia euacuare studemus, atque pars quærit, ut ex ea detratur sanguis, est commodior: quemadmodum etiam, si arthriticus omnibus articulis affligatur. Quibus autem eximie per quæpiam, aut prius euacuati non fuerint, infestatur, haud perinde licet ex quauis parte euacuationem moliri, uerum sicuti in his, qui partem occupant. Quamobrem podagricos* euacuare ex cubito: comitalibus uerò morbis, uertiginibusque obnoxios, potius ex cruribus. At si et tunc hæmorrhoides mittendi sanguinis occasione præsterint, si quidem cohibere eas uoles, quæ in brachio sunt: sin prouocare, quæ in cruribus consistunt uenas, secare conuenit. In his uero qui reperiuntur menses, semper in cruribus. Jam uerò ad sanguinis detractiōnem, diem numerum confiderandum non est. Si quidem quocunque die mittendi sanguinis scopos in laborante inueniatur: nempe morbum ingentem, & uirium robur, excepta ætate puerili, & ambiente admodum calido: auxiliū illud uō prætermittes, uel si is uigessimus à principio extiterit. Nam exoluitur ut plerisque morbis temporis tractu uirtus, eo proinde mittendi sanguinis occasio, numero dierum deperditur. Poterit etiam quia sanguinem mittere uel quocunque die noctisq; hora, scopum sibi proponens, in febribus quidem, particularium (quæ expectanda est) uel cuiusmodi declinationem: in quibus autem aut ob oculum lippitudinem, aut aliud simile citra febrem, hoc est opus auxilio, magnitudinem aut doloris, aut phlegmonis, aut rotatoria affectus, in quo secunda uenâ desideratur. Vbi uerò nihil eiusmodi aut urget, aut prohibet, præstat manē uenâ incidere, haud proinus ex somno excitis, sed circiter horam unam iam aut euigilantibus. Atque iteratæ euacuationis tempus, in quibus simpliciter quidem euacuare conamur, eodem die esto: in quibus autem reuelleret, si uel post duos deinceps dies fiat, melius fuerit. Interim tamen animus sit circa laborantis uires intentus, manu iugiter arteriis illius admota. Conueniunt etiam medici interdū secare arterias, quæ in temporibus, & quæ secus aures consistunt: illa quidem, in infestantibus oculis fluxionibus tum calidiorum spiritibus: hæc uerò quæ secundum aures, in uertiginibus maximè, & in quæ calidiorum, spiritibus capitis doloribus infestatur. Etenim ubi calidus, spirituosus sanguis in arteriis concentratus infestatur, illic communibus parti affectis secunda arteria est opus. Verum quia uulnerat arteriæ ægræ supprimi possunt, ob id ipsas medici incidere metuunt, quum si quis dum uenam secat, arteriam conuulerarit, difficillimè compelleret erumpentem sanguinem possit: aut si res optimè cedat, ad cicatricem perducta diuisione, tamen aneurisma contingat. Quamquam possumus sanè arteriam uel magnam, absque aneurismate ad cicatricem perduci, totam

*Reuulsiōnes in
cuius ex eis de
inonibus, incipien-
tibus, siue inuetera-
tis, adhiberi
debeat.*

*Sanguinis detractio
in quædam
partes est æqui
appropinquatio in
quæ solum pars
conueniens gra-
uata uacuatione
desiderat, ut in
istis quæ ex a-
quo omnibus ar-
tibus affliguntur.*

*Podagricos esse
uacuare ex
cubito.*

*Epilepsia etiam
esse uacuâ
desiderat.*

*Hæmorrhoides
supprimuntur scilicet
in brachio sunt:
sin prouocantur
autem, quæ in
cruribus sunt per
talis.*

*Sanguinem detractiōnem, diem
aut horarum
numerus non est
siderandum.*

*Sanguis uel
diu per febrem
quidem, in ipso
tempore declinatione,
per inflammationem
aut
ob oculum lippitudinem,
aut aliud
simile citra febrem,
hoc est opus
auxilio.*

*Sanguinem mittere
in febribus
habet aliud uiget,
aut prolixi,
manu iugiter
arteriis illius
admota.*

*Sanguinem in
tempore
quæ de fac
uiget.*

*Arteria in quibus
sanguis affligitur.*

*Arteria uulnerata
ægræ supprimi
possunt.*

*Aneurisma quæ
de cicatricem.*

Arteriam inter
indidem polli-
cem quoniam se-
cussit Galenus
ab infansu ma-
notus, liberatus
est doctore pre-
cordium dolo-
re.

Arteria in mal-
leolo diffusa,
diuturna exa-
dorem soluit.

transuersum secantes. Ego uero aliquando motus
per quendam infirmum, secui dextra manus ar-
teriam, inter indicem & pollicem sitam: permisiq;
ut inde fluere sanguis, donec sicut et sponte su-
biotus diuturnus mihi extinctus est dolor, qui in
illa maxime parte erat fixus, quae iecur septo tra-
suerit committitur. Minister etiam Dei Perga-
mi, à diutino cruciatu lateris, similiter liberatus
est, arteria in summa manu incisa, idq; monitu
infirmi. Porro alteri, cui ex uulnere malloco
infecto, dissecta fuerat arteria, sanguinis quidem
cursus haud quiescit, donec ipse dissecui totam: ac
medicamento ex aloë, manna, ouorum albumi-
ne, & leporis pilis imposito usus, absque aeneu-
sitate ulcus ipsum curauit. Vir autem ille prorsus
satus relictus est à coxae dolore, quo iam diu fue-
rat exiguus temporum interualis uexatus.

GALENI PERGAMENI DE HIRUDINIBUS, REVLSIONE, CUCURBITULA, & SCARIFICATIONE, LIBELLUS.

DE HIRUDINIBUS.



Hirudines af-
ferendo, ali-
dum applican-
do curantur.

Vx hirudines sunt recens capre, eas
diem unum asseruare oportet, pauca
lo sanguine in passum exhibito. Sic
enim prorsus earum uenenum expri-
mitur. Pars autem cui iam ad moueri
debent, nitro prius perficitur, aut unguis scal-
patur: nam sic promptius eam apprehendit. In-
quiescunt autem sunt in aqua tepida usque purum, la-
tisq; oris: deinde spongia eas comprehendentes, ui-
sco sitatem ab eis detergentes, tandem manu ap-
plicabimus. Vbi autem adhæserint, infundendum
particulæ oleum tepidum est, ne scilicet refrigeretur.
At si manibus aut pedibus ad mouendæ sint,
ipsam partem, aquæ cui insunt sanguisq; inmer-
gere oportet. Quid si parum defasciantur, forti-
cæ caudam præcidit, secundum reclinandam
fascientur. Nam effluente semper sanguine, tra-
here non desistent, donec silem, aut cinerem, ipsa-
rum ori insperferimus. Vbi uero deciderint, cucur-
bitula uenenum est auellendum, aut pars fouen-
da ex spongia. Quod si particulam emorfa lachry-
met, cuminit, aut farinam inspergitur superius lana
madidatæ oleo pauillo, inuoluta. Sin sanguis
erumpat, linthea ex aceto iniijcto, aut gallam usâ,
aut spongiam liquida pice madentem, posteaq; u-
tam imposito. Sciendum autem est, hirudines
haud eum qui in profundo est sanguinem, sed tan-
tum quo caro est imbuta, exugere. Virum, eis pro-
cucurbitulis: detrahimusq; ipsas, ubi dimidiâ
sanguinis partem iam extraxerant cõscimus. Prohi-
bemus autem, & nō permitimus effluere, quousq;
quod satis est euacuetur: quandoquidem par-
ticula rum à sanguine ipsa natura frigida, tum
ab æthere nos ambiente refrigeratur.

De reuulsione.

Vehementissimos humorum influxus remedijs
reuulsorij prohibemus. Quæ sunt, incumben-
te in pectus aut in uentrem humore, ad manus re-
tractio. Vomitus, ubi deorsum decubuit. Sicuti in
uomitibus per aciores clysmos reuulsio. Duo uero
hæc momenta, quæ ad superiorem inquam uen-
trem, & inferiorem uergunt, ad urinam, sudore-
stem reuelles. Quin & urina, ad sudores, & deie-
ctionem trahitur. Reuulsorium quoq; auxilij est,

*iuxta mammas cucurbitula admota. Ceterum
hypochondrij affixa, sanguinis ad nares impetu
reuocantur: sicuti & immo de cœu utero effluxit.
Porro uergentes ad caput aut uiscera humor es re-
trahunt acia in sinus imposita medicamina. In
summa, reuulsio molida est, humoribus sursum
fluentibus, deorsum: deorsum uero, in contrariū.
Rursus, in trō uergentibus, foras: sicuti si foras
ruant, ad interiora. Similiter si ad dextram inci-
nent, ad sinistram: ad sinistram uero ad uentrem,
in partem aduersam. Sic quæ retrō concedunt, an-
tè: quæ uero antè, retrō reuocabis.

De cucurbitula.

Cucurbitulæ q̃s qui antè euacuati sunt, conue-
niunt. Nam in plethoricis, minime sanè ipsa uti-
mur. Eadem ratione neque in cerebrum aut menin-
gum phlegmonis incipientibus utimur cucurbitu-
lis: sicuti nec alia in parte ulla phlegmone obfesa:
uerum ubi nihil præterea etiā influxit, facitq; to-
tum corpus antea euacuât, atq; opus nobis iam
sit, aut mouere, aut amoliri, quod in phlegmone
obfesa particula infixum est, aut deniq; foras ex-
trahere. Porro dum affectus etiam nū sunt, haud
in ipsis iam laborare occipientibus partibus, sed
in eis quæ illis cõtinuæ sunt, reuulsionis causâ est
cucurbitula imponenda: in principio autē utendū
repellētib; est. Cucurbitula potest euacuare ma-
teriam, dolorem soluere, minuere phlegmonem,
inflationem discutere, reuocare appetentiam, uen-
triculo infirmo robur recuperare, animi libera-
re deliquio, ab alio fluxione transferre resicca-
re, & sanguinis eruptiones cohibere, facultates
mensium corruptitices extrahere, ac deniq; men-
ses ipsos leuare.

De scarificatione.

Scarificamus partes corporis aut phlegmone
scirrhusq; tetatas, aut tensas, aut dolore uexatas,
aut fluxione affectas, sed quæ iam refutit: aut acri-
mibus materia, aut ubi extrinsecus aliqua uiru-
lenta facultas in corpus incidit, aut ubi materiâ ex
alia parte in aliâ traducere est animus. Veluti etia
ra scarificamus affecto capite, aut materis in cor-
pore exundantē minuere statuentes, potissimū u-
bi exundantia prouenerit à suppressa materia, quæ
solenniter euacuari consueuerat. Sic suppressis hæ-
morroidib; scarificamus eura, prius ea per spō-
giam fontes calida. Nam sæpius uenam incidere
in anno, haud expedit arbitror, quā uindam
sanguine uitalis exhausta spiritus. Prodest autē
scarificatio & oculis diutina fluxione afflictis: tū
capitis affectibus, quib; pectoris arque dorso eue-
nunt: ad hæc angine, argim pactis humoribus.

GALENI DE PURGANTIVM MEDICAMENTORUM FACULTATIB; LIBELLUS.



Ad de causa medici uetustissimi pra
uas opiniones reliquisse irreprehē-
sus uident, quæ grauissimæ etiam deli-
ctæ antiquissimi legulatores impuni-
ta fuerunt. Quæ enim eo tēpore mi-
nor esset malitia hominum, ut qui nec maxima
crimina perpetrare aggrediebantur, nec manife-
stissimis impudentes contradicere, quomodo ali-
quis punitionem eis quæ non dum admissa erant,
præstaret, uel redargueret ea quæ nemo pror-
sus

Cucurbitula by
phosphorus affi-
xa sanguinis ad
nares impetu
trahit, sicuti &
de cœu utero
effluxit. Porro
uergentes ad
caput aut uiscera
humores re-
trahunt acia in
sinus imposita
medicamina. In
summa, reuulsio
molida est, humo-
ribus sursum
fluentibus, deorsum:
deorsum uero, in
contrariū. Rursus,
in trō uergentibus,
foras: sicuti si
foras ruant, ad
interiora. Simi-
liter si ad dextram
inci-
nent, ad sinistram
uero ad uentrem,
in partem aduersam.
Sic quæ retrō
concedunt, antè:
quæ uero antè,
retrō reuocabis.

Cucurbitula
modis esse ubi
corpus antea
de uacuatum.

Cucurbitula re-
uulsio dum uel
leuare est animus,
quod in parte
phlegmone ob-
fesa est im-
peditum.
Inflationem
discutere, reuocare
appetentiam, uen-
triculo infirmo
roborem recupera-
re, animi libera-
re deliquio, ab alio
fluxione transferre
resiccare, &
sanguinis eruptio-
nes cohibere, facul-
tates mensium
corruptitices
extrahere, ac deniq;
mensis ipsos
leuare.

Scarificatio
quæ est in qua
sunt partes
lesionum.

Scarificatio
crura, prius
fuit per spō-
giam calidam
aqua.

Uenam saepe
in anno incidere
non expedit.
Scarificatio
quibus morbis
conueniat.

Delicta graui-
sima cur
antiquissimi legum
latores impuni-
ta reliquerunt.

Reuulsio ma-
di diuersi.

*Præstitum in
dici crevit.*

siue dissixerit: At quia temporis spacio eò crevit ho-
minum præritas, ut nihil non aut facere, aut ducere
auti sint, legum quidem latorum multas puni-
tionum rationes nouas adinueniunt, quibus facio-
rosos plebæ: ueritatem autem studiosi, uarias con-
tra sophistas reprehensionum species excogitant,
quibus ipsos eorrecant: id quod nos imprecanti-
um quodammodo facere cogimur, improba-
ri eos, qui medicamenta purgantibus, uim at-
tracticem humorum quos euacuant, inesse ne-
gant: mutatæque uerò quidam omnium ex æ-
quo illorum, quæ ipsi appropriant, eis tri-
buunt. Quia nimirò facultate aiunt medicamen-
tum quod fluxum efficit bilem, quencungue humo-
rem contingit, hunc in propriam sui speciem mu-
tare: uocariq; medicamentum id cholagogum, quod
bilem fluxum & efficiat, & moueat: aliq; simili-
ter medicamentis sua esse indita nomina, uò qui-
dem ab humoribus quos naturaliter euacuant, sed
ab his, quos suo contractu efficiunt. Ex cuius sanè
opinionis absurditate sequitur, siue bilem ductis,
siue pituitam, siue atram bilem, siue serosam hu-
miditatem, aliquis medicamentum assumpserit,
aut ueros ex uenis humores uacuari, Negalia ra-
tione purgatio ab huiusmodi medicamento peti-
ta, disiceret à sanguinis euacuatione per uenæ se-
ctionem, quàm quòd in hac quidem, ille qualis
prius erat, excerneretur purgationibus autè, inal-
teratur, non colore tantum, sed etiam consisten-
tia: id quod maxime ridiculum est. Si quidem per
detractionem sanguinis æqualiter omnes, qui in
uenis sunt, humores uacuuntur. Per purgatione
uero (quæ scilicet aliquis ipsum purgaret) non
quæ omnes, sed unus aliquis, præcipueq; is, ad
quem naturaliter euacuum medicamentum
est aptum. Atq; hæc sanè existit optima Asclepi-
adem sententia, cui etis ratio simul & experien-
tia patrocinantur. Nam si ex tribus uidet febris la-
borantibus morbo quarto, uni quidem sangui-
nem detrahas, alteri autem medicamentum quod a-
tram educat bilem exhibeas, tertio deniq; propi-
ne pilsarmacum eliciens diffusum illam bilem per
corpus, certe duo illa priores longè deterius ha-
debunt: tertius autem, cui exhibitur medica-
mentum fuerit familiaris succi attractiuum, uariūm
colorem recuperabit. Atqui iuxta illorum insi-
ui, perinde erit siue missione sanguinis, siue me-
dicamento quod bilem ducat, arquo morbo la-
borantem in anas. Idem etiam & in reliquis mor-
bis est incundū iudiciū. Igitur opinionibus ipso-
rum ualere iussis, singula medicamenta purgan-
tia initio familiarē humorem trahunt: postea uerò
illum qui ut sequatur, habilior atq; aprior fue-
rit. Exempli gratia medicamentum quod fluxu bilis
ducendū est, primò quidem illam expurgat: dein a-
quoq; iam humiditate: pituitam tertio: mox atram
bilem: ultimo deniq; sanguinem, quòd fit in natu-
ræ familiarisissimum. Reperiunt tamen aliqua me-
dicamina, quæ statim ab initio sanguinē ducant:
cæterum hi nemò utetur, quan doquidem hoc iu-
gulare esset hominem, nō purgare. Si quidem pur-
gantia, hoc nomine talia dicuntur, quòd repur-
gant sanguinem ab illiscrementis iam ductis.
Quare iuter delectaria, id genus omnia medica-
menta annumerant, quæ sanguinis euacuationem, per
uenas uentris, & intestinorum, moliantur,

GALENI PERGAMENTI, QVOS

*purgare, quilibet medicamentis, & quan-
do oporteat, liberamus.*



Visano sunt corpore, purgationes grauior ferūt. Nam quum purgans medicamentum familiare quib; hu-
morē attrahere desideret, sanè dum
eo destituitur, sanguinē & carnes eli-
10 quat, consumitq; ut quod illis propriū est, trahat.
Porro qui sani quidē iunt, uerum ægotatū, nisi
fuerint uacuat, inaniter uere debet idq; uel
sanguinis detractione, si plethoricis corripian-
tur morbis: aut purgatione, si facili ex corruptione
affligantur. At melancholia, cancer, elephantia-
sis, ceteriq; id genus affectus, qui ab humore atro
proficiuntur, atq; bilis purgatione indiget: quā
non uere tantum, sed aurummo etiam ipse moliri
consequi. Iam comitiales morbi, apoplexici, sa-
20 spuriotiq; uacuationem putare possunt. Atti-
culares affectus, qui quidem unū cum insigni ca-
liditate affligunt, biliosorum: qui autem cum tu-
moribus frigidis, pituitosiorū uacuatione iuuantur.
Quidam æthuo tēpore tertianis febris sem-
per corripit solitus, iam multis annis non febre-
citauit, quòd bilis fluxu purgatione ad finem ue-
rit à uobis administrata, illi prospectum sit. Sic e-
nim satis est tales uacuar: quemadmodum co-
mitialis, articulares, melancholicos, quib; ob
humores crassos ægotant, ineunte uere melius
30 uacuuntur. Cæterum humores crassos & uiscio-
sos prius attenuare & iucidere oportet: ne uacuat
per quos transiunt, atq; trahuntur h; aperire,
ante medicamenta purgantia, si purgatio modis
omnibus optima sit futura, præsertim in his qui ue-
ratum assumpserunt. At uerò qui ægre per superiora
purgantur, h; nisi prius reddantur habiles, præpa-
renturq; ad uomitū, minime assument uerum.
Preparabuntur aut medicamentis uomitorijs me-
diocribus, necnō cibo uberiori, & quete. Etenim
40 nos radicales ex oxymelite propinquimus, quæ
arundine perforatas, ac ramulis ueratri albi tiñis-
xas, per totū diē atq; noctē reliquimus. Atq; eius-
modi ex elleboro facila purgatio erit imbecilla. Ve-
rū qui angustū habent pectus, eoq; etiā cōpres-
sum, ineptissimi ad purgationes existunt, quæ per
uomitū: iam medicamenta sunt, ac potissimū per al-
bum ueratrū: siquidem thoracis aliquod uas, ipsis
rumpit. At bilis (suprà) pituita per inferna uacu-
ari debet. Est quādo eodiaro modo accidit, si qui-
dem in uentriculo pituitosus, biliosus aut iu iute-
stinis humor residet. Melancholicū uerò semper
per inferiora uacuare oportet. Sic æstare quidem
superiores uentres, hyeme uerò inferiores mouere
conuenit, ut auctor est nobis Hippocrates. Sed
regionis etiā, aut tēporis, ætatis, cōsuetudinisq;
non exigua ratio est habenda. Si quidē qui (gratia
exempli) uomere soliti sunt, facilius purgationes
ferunt per superiora: qui non affueuerunt, haud ci-
tra periculum magniq; ex ueratro. Morbi etiā spe-
cies examinanda est. Nam in hydropse, leuco-
50 phlegmatia, medicamento quod pituitam ducat,
egemus: prius sanè per inferiores uentrem, dein
per uomitum, tertio per apoplegmanismos. Vi-
bi enim id quod redundat, per uniuersum cor-
pus dispersum est, omnes uacuationes sumemus.

*Sani cur purga-
tione non grauior
ferant.*

*Vacuando qui
sunt uere incen-
ti & quomodo*

*Atra bilis pur-
gatione qui affi-
citur indiget.*

*Vacuatio pitui-
tis qui uere
pessit.*

*Crassi facies
prius tenuanda
est quā euacu-
entur.*

*Vomitū quā
ter preparari
ægre debent.*

*Vomendo inop-
ti qui sunt.*

*Flaua bilis per
superiora, pitui-
ta per inferiora
maiori ex parte
uacuari debet: atra bi-
lis semper per
inferiora.*

*Hydropici a
uacuando ratio.*

*Sanguis de-
tra fluxu uen-
arū humores
qui sunt in ve-
næ aqua tra-
ciuntur.
Purgatio purg-
cat sanguinem.*

*Regi morbi
curatio.*

*Purgantia me-
dicamenta prius
cipiā quā si-
militer hūm-
orem tribui ga-
strea uerū san-
guis ut supra
purgat est prom-
ptior.*

*Medicamenta
uicinalia statim
ab initio san-
guinem ducunt.*

*Morbus per
gandi ratio.*

Porro in ascite, medicamentū aliquod aquæ cien-
dæ idoneum exhibebimus: sicut etiam in æqua-
ria, quod bilem eliciat. Nam & in his etiam bilem
multifariam suprà & infrà, per urinas, palatum,
& nares, purgare conuenit. Morbi itaq; dispositio
& uacuandum humorē indicat, & locum per
quem debet uacuari. Verbi gratia, ne qui in ieco-
re habent inflammationē, ubi tumor concuctus
fuerit, eius ex purgationē molimur, per inferio-
rem sanē uentrem, ubi causas ipsius partes affectus
occupat: per urinas autem, quum gibbas. Accedit
his omnibus rēbus & occasio. Per initia nan-
que serofos tenuesq; humores uacuabis: in cras-
sis autem & uiscidis, expectabis coctionem. Ad
hæc, in accessionebus quidem, per superiora ua-
cuabis: in remissionebus autem, per inferiora. At-
que hæc sanē, si sponte acciderint, uentrem in ac-
cessionibus quidem, dum multū & uomit, & per na-
res sanguinem fundunt in remissionebus autem,
dum urinx deiectioneq; excreuantur. At tempus
dierum accessio-
rum & de-
cretio-
rum, quum
infrà copiosè
purgare aggre-
deris, cauere opor-
tet. Vbi enim humorum impetus furum uergit,
medicamentū purgantis facultas impediatur. Poe-
rò in morbis diuturnis, semper eorum maturatio
expectanda est: in acutis autem, quum turgent,
ac pruriunt, uel per initia uel medicamentis licet.
Verum quum omnia purgantia medicamenta fa-
cultate caliditate existant: febri autem sui ratione
humectantia & refrigerantia postulet: certè non
ipsius caloris gratia purgatio à nobis admini-
stratur, sed humorum causa, qui nimirum illum
accendunt. Igitur ut in euacuatore, primum san-
guinem disciendum uenit, nunc ager sit ad eiusmodi
purgationem idoneus. Nam qui ex cruditatebus
multis, aut uiscosis crassiusq; cibis laborant, item
quibus præcordia intena sunt inflata, ut supra
modum calida & ignea, aut aliqua inflammatione
laborent, omnino ab purgatione inepti
sunt. Proinde hæc abesse, & humores quāmaxi-
mè licet fluidos facere oportet, hoc est, tenues, &
nullius litoris participes, meatusq; per quos pur-
gatio futura est, adaptatos. In acutis autem mor-
bis ratè per initia purgantibus medicamentis eg-
ebimus, eò quod nec itæ frequenter noxi humores
per initia turgent, pruriunt uemec, si hoc detur,
ager sit ad purgationē idoneus, ac ne tempus qui-
dem nobis præbeat præparandi idoneum. At hu-
mores prurire, seu turgere dicuntur, quum motu
uehementiori agitant, & à partibus in particulas
transfluunt. per morbi initia mulestant, homi-
nem dolore afficientes, irritantes, & quiescere nõ
permittentes. Tales igitur euacuare conuenit. Pæ-
riculū autem alicui infixum, nec alio quodam præ-
sidio mouere oportet, nec medicamentis solici-
tare, priusquàm fuerint concocti. Tunc siquidem
& naturam uacuanti opitulante habebimus:
quippe quæ post coctionē & discernere humo-
res, & superfluum deponere apparet: quo tempo-
re etiam crises accidunt. Quod si natura ipsa ab-
solutè moueat, nihil tunc est opus medicamen-
tis. Vbi uerò imbecillius actionem obit, id quod
deest, oportet nos per medicamentā adficere. Scien-
dum autem est, transfluxiones humorum ab una
in alterā partem raro accidere: sed maiori ex par-
te ipsos in unico loco hætere, inibiq; per totum

morbi tempus ad solutionem usq; concoqui. Si
nunc acutus modò sit ipse affectus, sed etiam cum
febre uehementissima accidat, medicamentum pur-
gans exhibendum non est, præsertim si quis non
habeat naturam ægri exploratam. At si febris
uehementis non fuerit, nonisq; ægotantis natu-
ram minimè abhorre æ cathartica, eleboro nigro
uictris, aut hiera diacolocynthidos, quæ elebo-
rū recipit, absq; sciamonio. Assumpto pharma-
co, cõducit mox superforbere cremorē piscinæ
quid quod in transitu affixū applicumq; est, ab-
stergere, & deorsum trahere qualiter uerò me-
dicamentis, particulis insidentem, contemperare
& inalterare possit. At ubi purgatio fieri incipit,
pisanam amplius non dabimus, ne actio medi-
camenti exoluitur. Porro alius nonnunquàm
medicamentum purganti non cedit: uel ob ægri na-
turæ proprietatem, uel ob medicamentis exhibiti
paucitatem, uel ob seruos durum, atq; in aliquo
intestinarum impactum, quod clystere euacuari
potuisset, autæ pharmaci exhibitionem. Fieri et-
iam potest, ut natura impetu ad urinas facien-
te, pharmacum nihil proficiat. Ex ipsis autem ca-
thartica quæ sua actione frustrantur, hæc qui-
dem interdum non modò nihil offendant cor-
pus, sed alimētū illi etiam fiunt: hæc uerò in cor-
ruptelam atq; exitium uertuntur. Quum autem
omnia purgantia medicamenta uentriculum ui-
nent, præcipue os ipsius, quod maxime sit ne-
uofum & sensile, odoratorum mistura commo-
dè excogitata est, ne uidelicet sula, ac syncera ipso-
rum facultas, os uentriculi attingat. Conuenit
itaq; ea quæ miscentur semina, eiusmodi esse, quæ
& malignitatem possint obtundere, & actionem
iporum non impedire, extenuatoria & incidenti
facultate prædita, quæ crassos humores dis-
cent, & uias ipsorum aperiant. At purgantia quæ
miscentur, sibi inuicem congenera esse, & nulla
ex parte dissidere oportet. Dissident autem, non
quæ aliud bilem, aliud pituitam euacuat (ambo
enim eodem modo uacuari possunt) uerum ubi
hoc statim, illud multo post quàm assumptū est,
purgationem mouere solet. Ita enim in æqualis sit
euacuatio ex illis simul assumptis. Dico in æqua-
lem, quum una cessante, altera uacuatio incipit.

*Cathartica ne
dementa.*

*Pharmacæ af-
fectus est præ-
sentia eremum
seruandum.*

*Pharmacæ al-
ius cor interdum
non solat.*

*Odorata com-
modi nominat-
ur pharmaca.*

*Purgantia quæ
mixta miscentur,
congenera
esse oportet.*

GALENI PERGAMENI CON- siliū puero comitiali morbo laboranti.



Amesti nec siliū tuum uidere, nec
ab initio quæ fuerit eius natura ante
morbum cognouerim, nec etiam nū-
t, ut in ipso morbo se habeat, mihi co-
pertum sit, Ceciliane charissime, sed
id tantum ex te intelligam, comitialibus eum ac-
cessionibus infestari: ut tamen obsecundum tuis
uonis, curabo quam dilucidè fieri poterit, tam ti-
bi uictus rationem præscribere, quæ si (ut par est)
utatur puer, tum non parum iuuabitur, tum ab
eius etiam quæ sibi inopinatè accidunt, minus læ-
detur. Etenim nonnunquam necesse est homines
in frigore atque æstus incidere: ad hæc in ualido-
res uentos, uiriofa balnea, alimenta stupefacien-
tia, reuolutiones uertiginosas, coruscationes,
tonitrua, uigilias, cruditates, tristitiam, iram,
laesi-

*Hæpate partem
affectu quæ sunt
purgare rationem
de.*

*Tenues humo-
res statim esse
uacuandos: ef-
ferum & respo-
dendi esse expe-
ctanda coctio-
nem.*

*Vacuandum in
accessionebus qui-
dem per superiora
in remissio-
nibus autè per
inferiora.*

*Dierum accessio-
rum & de-
cretio-
rum, quum
infrà copiosè
purgare aggre-
deris, cauere opor-
tet.*

*Purgantia omnia
facultate &
se calida.*

*Purgantibus
magis qui sunt.*

*Humores esse in
nari resistentes:
aut per uentrem
aut per uentrem.*

*Acute morbi ra-
tio per initia in
dignè purgatio-
ne.*

*Turgere quon-
do humoris di-
cantur.*

*Humores quæ
de uacuando.*

*Crisis quando
accidunt.*

*Naturam alio
modo esse me-
dicamentis.*

lassitudinem, atque id genus alia, quæ uehementem cōmouent atque perturbant corpus, & morbum memoriam inuouant, tum eius accessiōnem accerfiant. Quare omnia id genus multò antè sunt præcauenda. Quòd si quòdo ubi illa præcesserint, subuegiatur dein morbi accessio, tum temporis puer penitus ab omni motu se abstinat, domi se contineat, ac uictu ualde tenui utatur, quousque corpus exacerbationis molestia prorsus destituitur. Igitur inter ueris iniuria (tunc enim propè contingit eos morbos moueri, qui per interualla redeunt) puerum purgandum censeo, idque purgatione mediocri. Post purgationem autem, hac uictus ratione uteretur. Manè quidem, ubi è lecto surrexerit, primum ad præceptores accedat, modicè inambulet, non admodum tamen citato gressu. Dein uerò usque ad palæstræ tempus, disciplinis ex eius more incumbat. Cum primum autem illinc discesserit, ubi rursus inambulauerit modicum, sic ad prudentem prædottibam commeat. Quippe totius curationis summa in hisce duobus est sita: nempe usque medicamentis olim nibid me dant, & idoneis exercitationibus. Reliqua uerò, tanquam præparationes quedam ad ista existunt. Cæterum exercitacionum scopi, quo ad eorum modum, sunt hic: nempe ut prius quam fatigaretur puer, quiescat: ut corpus illius calseat, nec non moderatè euacuetur. Quòd si ultra hos terminos producat: exercitacio, nonnihil iam attingit solida corpora, atque habitudinem ipsam colligat: ut articuli autem possumunt, atque in musculis, colloquantes congregat: unde urium infirmitas sequitur: dein de uiscerosi sensus, quando uerget conatur aliquam mouere particulam. Atque hoc est, quod acrius appellatur. Scopi autem exercitacionum, quo ad qualitatem, in eo præcipue consistunt, ut inde omnes corporis partes, & caput præsertim, & uentriculus, roborentur: possint illiusque partes, quæ ad os ipsius pertinet.

Morbi qui per interualla redeunt, uere præcipue mouentur.

Epileptici inter ueris iniuria purgandi.

Epileptico puer uictus ratio commendatur.

Exercitacio excedens modum colligat corpus.

Lassitudo quid

Exercitationum uolumentum caput replent.

Frictio ut exercitatio, imbecillioribus præsertim corporibus.

Præcauendo epileptici ratio.

plurimum abstineri cōuenit. Nec palam cum festum puer ab exercitacione egredietur: sed ubi spiritus exactè conquiescit, & quæ exercitacionem sequitur perturbatio prorsus sedata fuerit. Tunc uerò caput lineto diutius est cōfricandum, superiusque pectus utendum. His sic peractis, ad prandium debet accedere, in quo aliquid oleum uentrem mollientium, aut falfamentorum, aut pitane, aut oliuinarum, unum cum terna panis parte ipsi offeratur: in cenam tertias duas partes reliquas cum ualentioribus opsonijs reponentibus nobis. Ex oleis itaque nec laciua, nec melia, nec atriplici, nec blito, ut prorsus abstineat, iubeo. Verum non semper idem, sed modò hoc, modò illud, moderatè sumendum est: nec diutius eorum usus assueciscendum. Huius autem generis est & beta, & brassica. Nam & hæc modicè degustare opus erit. Pariter & porrum, & apium, & smyrnium aliquando cōducere attingere. Ita ex autumnalibus etiam fructibus, quicquid non omnino erudi, & natura cōstituta difficles sunt. Igitur mora, & quæ præcoccia appellantur, & ficus, & si qua alia id genus sunt, citra molestiam descendunt: ad hæc & sania cucurbita, nulli mollissimorum oleum est inferior: pari modo & sycioperones. Præterea & uuis maturis, & mælis, & piris, & palmlis potest uesci nonnunquam puer: parè tamen, & raro. Quos fructus & in arbore, & domi maturuisse prorsum edantur, oportet. Pituitosa autè cibaria summo pere illi uitanda sunt. A fungis etià ut omnino abstineat, cōsilio: quemadmodum & à rapis, & à reliquis alijs, quorum radix est esculenta. Sunt enim hæc ex his quæ crassos humores gignunt, & perij difficles intra corpus elaborantur: ex peps quibusdā, quæ nonnihil acris & calidi in seipsis continent, quemadmodum pascinæ & raphani. Verum raphanos ex aliquo diuino intervallo degustare non prohibeo: horrores tamen, ut pro uiribus à pascina abstineat: & magis etiam à rapis. Ar eorum cibariarum copiosus usus, salubris erit, quæcumque acris quippiam atque incidentis obtinent, citra insignem prauis succi notam, aut odorem aliquem, capiti adferre noxam ualentem. Sunt autem & in hoc genere, quæcumque ob caliditatem caput replent, sicuti uinum, sinapi, petroselinum, pascina, cepa, & smyrnium. Hæc siquidem plus quam par est, exaltant, uiriososque succos produunt. Ar oxymelitis audacter utendum est: ex quo etiam capparum potest sumi, pauxillo olei instillato. Quòd si acutum ipsum scilliticum fuerit, oxymeli longè magis iuuabit. Cæterum si oxymeli bibere puer uelit, reperetur copiosior aqua: & hyeme quidem, calidum: æstate autem, frigidum offeratur: sic siquidem præter cætera, maximè finem sedat. Permittere autem ei palam & in tempore conuenit, quæcumque non insigni noxa ipsum possit afficere, ne clam atque intempestiue eis potius, multò magis lædatur. Quippe uoracius & largius implentur his quæ desiderant, qui palam eis un prohibentur. Porro à prandio, ubi modicum quid interqueuerit, prorsum ad studia literarum accedat, nonnihil ipsum lenè inambulare præcipio. A quibus ubi redierit, rursum ante cenam deambulet modicè: ac deinceps panis offerantur portiones reliquæ: aliorum uerò

Epileptici esse abstinentes à laetitia.

Fructus epileptico dandi.

Cibaria epileptico apta quæ esse debent.

Oxymeli epileptico dandum. Capparum epileptico congruit. Acetum scilliticum.

Pueri cui permissum sit reserere illa quæ non custodiri laudant.

Epileptici quibus visio carnis debet.

Sane extremas partes coqueretur epileptici.

Candimentum simplex ex quibus coquatur.

Legumina congenerentur epileptici quia.

Medicamentum ex sola coctione offerre epileptico.

Oxytelum differtur.

Scilla succum ex optima ratio.

Scilliticum modice optima epileptica.

Scilla arte in scillam affunditur ut non.

unumquodque. Verum carnes omnium ferè uolarilium conuenient, exceptis istis quæ in signis degunt. A quadrupedum autem omnium carnes abstinerè debet. Quod si & quodcumque his opibus sit uti, suis quidè domesticis extremis atque uentris uescatur. Sed syluestribus etiam suis carnes uti poterit. Hædus etiam gustare licet, atque nonnumquam lepores, probè tamen conditos, aut citra nidorè albos. Simplex cõdimentum fit ex aqua, quæ ænethum, porrum, oleum, atque salem receperit. Quantum uerò ad marinæ pertinet, omnia testis infecta sunt pernicio. Ex piscibus autem, faxiles cæteri ex omnibus præstant. Torpedo autem sola ferè ex cartilagineorum genere illi conueniens est. Inter legumina, ptisana quidem primum locum obtinet: deinceps lenteæ, alicæ & pisæ conueniunt: reliqua noxia existunt. In uniuersum autem, quæcumque glutinosæ sunt, & crassæ succi, quæque instillat, & excrementa gignunt, necnon quæ ægrè coquantur, ea prius uitare debet. At uerò medicamento confecto ex scilla, post purgationem, quæ adueniant uere melianda est, uterur singulis diebus, priusquam palatitiam accedat. Et sanè, nisi ualde rebus sit morbus, spero quadraginta dierum spatio ipsum, sola eius medicamentum ope, prius solum iri. Post purgationem tamen, antequam eo medicamento utatur, abstinendum & semel & bis in potu accipere cõuenit. Ceterum oxytel quod acidissimum quidem est, quartam ad mel acetum portionem habet: quod uerò dulcissimum, octauam recipit. At crassæ & glutinosæ existentibus succis, acidiori atque meraciori est utendum. Sin autem minus sint tales, diluitori atque dulciori. Quo pacto autem ipse scillæ succum excipiam, iam adiciet. Primum uas mellitico præparato, in ipsum scillam frustatim manibus cõmutatam inijcio: deinceps angusto operculo cooperiens, & extrinsecus corium uniuerso corpori uasis circumducens, & diligenter ligans, in locum omnino ad meridiem conuersum repono: ita tamen ab aquilonis flibus communitum, ut nullatenus ab ipsis perflatur. Id autem eo anni tempore efficio, in quo exoritur Canicula: nempe ante illius quidem ortum, uiginti diebus, post ipsum etiam rotidem. Tunc igitur per aliquot dies paulatim scillam uasis permuto, ut æque quacumque sui parte incalcescat. Quo tempore exacto dissoluens nas, in eo scillæ corpus perinde ac decoctum inuenio, atque adhuc ex ea humorem quemdam effluere, quem excipiens optimo melle cõdo. Et huius quoridie plenum cochleare unum, in fantibus quidem paruum, adultis uerò magnum, exhibeo. Quineti quod rotius scillæ corpusculum superest, excipere contrandens, & cum melle leuigans, eius quoque cochleare unum, ut prædictum est, porrigo: istud tamen uiribus est longè inferius. Qui uerò scillam in aqua coquentes subigunt, planè illius uires dissoluunt. Quemadmodum quicumque ex aceto eam decoquant, calidum quidem medicamentum abundè efficiunt: at uerum sanè non innoxium.

GALENI PERGAMENI DE PTISANA LIBER PRIMUS.



Vandoquidem composita quædam res est tum ptisana, tum eius cremor (ex hordeo enim probè decoctato, & aqua, & certa quadam cõctione conficitur) prius de illius partibus summam aliquid dicere est animus, quam de eius compositione atque usu discam. In primis igitur ad conficiendam ptisanam, aquam optimam deligere oportet, quæ nimirum nec olfactu, nec gustu, nullam extraneam qualitatem referat. Præterea sit pellucida & pura, operæ precium est: nimirum limosa, sed ueluti exactè colata. Porro huius cremodi aqua, quo ad usum quidem, satis erit accommodata: natura autem ipsa, ne hoc pacto prorsus synœra fuerit, sicut nec ullum aliud sensibilibus elementorum. Exi tamen tenuium partium, atque ad cõcoctionem, distributionemque prompta: nec tantum à naturali calore alterabitur facile, nerumtamen igni externo admodum, protius calefcent: quod etiam testatur Hippocrates, aquam quæ calidè citò, & citò refrigeratur, leuissimam esse existimans: id quod æstimatione ponderis, sed quod partium tenuitate præpollat, faciliè conseruias qualitates recipiat. Itaque huius cremodi aqua, frigida & humida, propriè omnino aqua censenda est. Hordeum autem ipsum, refrigerat excacat: habet tamen non nihil detergens & statuosum. Quod si inspicitur particulas, illius extremus cortex fursuraceus, & hiccior existit, & magis detergens accommodatus. Quod uerò intus, cen carnis uicem gerens, aqua nutriendi idoneum habetur, deterget quidem & id, fed fursure longè minus, & pariter quippiam statuosum in se continet. Quamobrem fursure quidem absterget minus, ualentius autem hordeo. At uerò, quod hordeum ad ptisanam conficiendam eligimus, esse plenum oportet, nec admodum recens, neque antiquum ualde, & quod omnis ascititæ qualitatis sit expertum: tumoremque, dum coquitur, attollatur ingentem. Vbi aquam & hordeum delegeris, ipsum hordeum crudum in aqua præmacerato: deinde ita manibus uersato, quousque deglubatur tennis membrana. Postea rursus ualentius etiam manibus cõfug confricato, ut quicquid paleaceum inest, decidat: nisi quis fortè uelit eam magis detergentem efficere: tunc si quidem satius fuerit ipsum nūdum membrana decoquere. Ipsius autem decocto fistalis, ut primū quidem ebulliat plurimum: posteriū autem lento igne, quousque abundè in incanem uertatur. Hac enim ratione percocta ptisana, quæquid inerat statuosum, deponit, restitque situm, deterget, abluat, facile coquirat, atque abstrictione aliqua liumescat, iam uerò quum cetera uiscida quo ad gustum nullam sanè suauitatem obtrineat, ptisana gustui nescio quid suauis & blandi affert, & præsertim ægrotis. Facile etiam in thoracis partes descendit: estque ad deuotionem, atque distributionem, accommodata. His de causis maxime ex usu est ardentibus febribus: quod nimirum eis quacumque ex parte obstitit, refrigerans & humectans, necnon putridos humores detergens, & corpori non exiguum nutrimentum suppeditans: eos uerò humores qui ex dimidio putrefunt

Ptisana ex quibus coquitur.

Aqua optima qualis nam esse debeat.

Elementum nullum esse prorsus synœrum.

Aqua quæ sit leuissima.

Hordeum refrigerat, excacat.

Hordeum cõfugit aquam ptisanam optimam, quale ad esse debeat.

Hordeum decoquendo ratum.

Hordeum hanc aquam decoctam ptisanam magis detergentem efficit.

Ptisana facilius.

Ptisana maxime ex isto usu ardentibus febribus.

runt concoquens, atq; in optimum succum permians. Præter has itaq; uires omnes, nullam habet aut astrictionem, aut stomachi suberfionem ptisanam. Nam astrictio quantum ad uentriculum roborandū idonea est, tantū ad inersificandos humores prompta: at ea humiditas quæ quod crassescat non habet, facile suberfionem molitur. Pti sanæ sic confectæ, laues, æquales, atq; ex æquo omnes partes continuæ & unitæ existunt. Ceterum nec eam hīs qui in discrimine sunt, porrigere conueniet: nec hīs qui uenæ sectione, aut purgatione, aut clystere, aut fomento indigent: nec eis quæ excrementa plurima in regione uentriculi congeriuntur, aut ingenti dolore uexantur. Sed neq; in sicciſſima etiā morbis eam dare conueniet: quod scilicet ualentioribus egestæ potionibus quā sit ptisana, ut humectetur uenter. Tempus sorbitioni opportunum tunc fuit, quando æqualiter dispositum corpus redditum est: id quod tantum morbo inclinante accidit. Porro morbi sicci sunt, 20 lateris pulmonisq; inflammationes, atque adeo qui cumq; morbi in thorace fiunt, si nihil per excrementum excreant. At morbi qui cetera iccur, & uen-

triculum, & intestina accidunt, tunc sanè sicci dicuntur, quum nihil excreant, aut dura, & non ut necesse est, neq; effusa digna. Siccitates uerò quæ in uenis & arterijs consistunt, ex lingua & exteriori cute noscuntur: pariter & affectus qui in capite sunt, si nihil per salarum excreantur, aut nares. Eadem etiā ratione, & inflammationes & ulcera esse contingit sicca, ex quibus nihil per faciem excrenitur. Igitur in huiusmodi morbis ptisanam minime propinare conueniet, quod factus eos humectare non ualeat. At uerò quando corpus humidius existerit, aut ex pulmone aliquid excreatur, tunc eis semper sorbitionem augere, atq; adicere oportet. Verū neq; ipsam statim ptisanā offerre expedit, sed prius sanè eius cremorem solum, aut cremoris quidem plus, ptisanæ autem parum, mox utriusq; æqualiter: deinceps & solam ptisanam: idq; non ignorantes, ad corporis robur & nutritionem, maxime conducere pti sanam: ad faciliem uerò coctionem, atq; in corpus distributionem, cremorem ipsius.

Siccitates partium colares quibus nam deprehendantur.

Ptisana cur in sicco morbo non danda.

Ptisana cremor.

Ptisana quibus erubescenda non sit.

Morbi sicci quod dicantur.

SECTIONIS TERTIÆ FINIS.

EPITOMES OMNIUM GALENI

OPERV M SECTIO QVARTA.

ILLVSSRISSIMO ET REVERENDISSIMO D. D. PETRO PACHECO, GIENENSI EPISCOPO, ATQVE S. R. ECCLÆ

SIVE SENATORI VIGILANTISSIMO, ANDREAS LACUNA, Secobensis, Doctor Medicus, Miles Sancti Petri, S. P. D.



*I*te corpus erectum sortitur homo, sic animum ad sublimia erigeret, ne utinam cadauerum (ut solet) rerum teneretur admiratione, Pater obseruandis, sed perpetuo & diuina suspicere, & assidue in eorum exereretur meditatione. Ceterum quum ita sit natura comparati mortaliibus, ut pars quidem diuina, ac deluti captiui diuina à suis cupiditatibus, illi tantum inferuiant: pars autem adeo ignaui stupidūq; sint, ut animā habeant nec ne, ignorent penitus: cōtinuū sanè, ut per paucos eorum sursum aspiciere queant (lux enim lippis maxime offendit) sed omnes serè humi serpāt, instar crocodilorum. Id quod certè est in causa, ut si quando uideant canem transluentem per circulum, aut tripudiantem simiam, aut deniq; fœdissimū Scythiam supra funem saltantem, vniuersi, sui ipsorum obliui, confertim ad id genus spectacula confluant, atq; ea quidem admiuentur stupefacti: negleant autem & aspernentur cūditoris illius nostri opera: quæ si, ut decet, expenderentur, omnium spectantium animos in maximā admirationem sui, cōmendationemq; conuerterent. Nam ut impræfensurū præteream ordinatū illas orbium cœlestium lationes, constantissimos ortus fideram, vicissitudines temporum, animarumq; generationes & incrementa, quæ capturnum huminum superant, de ijs autem disserā quæ indies calcantur pedibus, quid obsecro admirabilius possit inquam cōtinere, quā ex eruce, nasturtio, aut alio vix perceptibili semine, vni herbam bicubitalē: ex nucleosq; aliquo exiguo, nasci prodigiose magnitudinis arborem? Etenim posteaquā semē in terram, deluti in matrice quandam, coniectū est, attracti humoris copia intumescit, intumescensq; humapituit, ac duo de se emittit germina: vnum quidem, quo terra adheret, ab eaq; sibi alimentū sugit, quæ est radix: alterum uerò, quod solem versus, à quo vivificatur, erumpens, ab vno caudice in varios tandem ramos diuaticatur. Atq; hic sanè plantarum est ortus: quas quidem vniuersi Philosophi & Medici, animatæ esse dixerunt, neq; id mirria: quod nimirū animantium ritum signantur, crescant, viuant, atq; senio absumantur. Primò siquidē sunt molliscula, ductilesq; et tractabiles, ut infantes. Dein processu temporis adoleſcunt, suūq; articulum roborantur. Postea uerò iam consistentes, ubi crescere desti-

terunt, & veniuntur trahenti, & solida fructuum vberitate pinguescunt: donec tandem concedentes natura, hominum instar senescunt, atq; satifcentes delinquant. Reperitur etiam, ut in animalium generibus, sex sexus itera, in stirpibus. Discernitur autem a facmina masculus, quod folia huius prius germinant, folijsq; facmina sint minor. Quod si masculus adeo cōiunctus sit facminae, ut folijs mutuo sese contingant, aut si ex fragrantia masculi portio aliqua ad facminā, ventorum beneficio pervenerit, ipsius facminae fructus cito ad maturitatem perveniunt. Sunt autem stirpes ut ceteris rebus omnibus longē amoeniores & iucundiores visu, sic earum usus mortalium vite multis numeris necessarii: utpote a quibus non modo alimenta ipsa, sed etiam medicamenta, quibus utimur ad profluendos morbos, multaq; alia pertinentia ad vite commoditatem, proficiantur. Vnde non immerito Marcus Curius, Lucius Quinctius Cincinnatus, Marcus Valerius Corvinus, Cyrus Persarum Rex, aliq; viri gravissimi, alleli plantarum amoenitatem, plurimū agriculturæ indulserunt. Quam igitur viderem cōmentarios Galeni de viribus medicamentorum simplicium: septem, de compositione pharmacorū secundum genera: ac deniq; decem alios de compositione medicaminum iuxta singulas nostri corporis partes (in quibus non modo univēse dotes, ac facultates plantarum, sed varia etiam morborū genera, eorumq; absoluta curationes exas gerantur) superioribus diebus ad græcorū exemplarium fidem restituissem, restitutosq; contraxissem in methodum ut breviorē, sic multo studiosis aptiorē, statui equidem hos ipsos vīginti-octo cōmentarios, Naturæ thesauros quosdam opulentissimos, tibi, Antistes Reuerendissime, nuncupare: idq; non ut ex hac ipsa dedicatione aliquid splendoris accederet Tuae Celsitudini, quæ iam pridem ob insigne prudentiam, variam eruditionem, raram incredibilemq; clementiā, ac deniq; summam pietatem, conciliam sibi omnium bonorū animos, atq; extra omnē ingenij aleam est posita: sed ut tui nominis fulgore illustrati, inirent multo maiorem gratiam eruditorum hominū sub tuorū patrociniis, veluti sub clypeo Asiæ delatēcentes, nō tam facile impeterentur a virulentis quorundam moribus, quibus alienæ famæ detrahere, & exercitium, & summa voluptas est. Siquidem quum olim summi Imperatores & principes, adversus impendentes fluctus & tempestates fortunæ, cōmunirentur literis: nunc ingenuæ artes & disciplinae, ut tutō prodire possint (proh dolor) sautoribus & Mecænatibus egent. Ceterum si T. C. hæc nostras lucubrationes defendendas susceperit, nulla invidia, aut calumnia, in nos quicquā moliri poterit. Quod si quæ barbarorum ac sophistarum cohors (hi nanq; præcipui sunt, infestissimiq; bonarum disciplinarū hostes) accedat propius, ut faceat nobis negocium, consilium in pedes se conferat, vel solus nominis tui fulmine perterrefacta. Adeo si quidem heroicis illas ac nondum satis laudatas virtutes tuas, quadam severitate gravitateq; prudentissima adornas (quod passim de te omnes predicant) ut non minus tetricis ac flagitiosis hominibus, terrori ac formidini sis, quā ingenius omnibus admirationi. Quibus quidem rebus adductus Divinus Carolus V. Imp. Tridentinæ synodo te vnum inter alios omnes præfecit, ut singulari sapientia tua Ecclesiæ causam tuereris: sibi nimirū persuadens, te præsentē, nihil transactum iri, quod non pium, non æquum, non sanctum, non deniq; univēse Christianæ Reip. maximē salutare futurū esset. Quam provinciam adeo alacriter suscepisti, eaq; fide & pietate suam pacem, religionemq; Ecclesiæ restituendam curasti, ut S. D. N. P. III. L. P. M. te inter purpuratos illos Patres censuerit tandem annumerandum: sentiens haud dubiē se nō minus accessu tuo illustraturum Senatū illum Patrum amplissimorum, quā exornaturum amplitudinem tuam tam splendida, tamq; iusta pietatis tuæ, atq; integritatis corona. Quocirca Illustrissimi illi, Reuerendissimiq; omnes collegæ tui, summo desiderio tenentur visende T. Celsitudinis, in eaq; suos pacendi oculos: sed inter omnes præcipuē Illustrissimus & Reuerendissimus D. D. Franciscus a Bonadilla & Mendoza, Cardinalis Cantuariensis, mensq; Mecenas maximus. Qui quidem tuarū virtutum præco, ut est studiosissimus tui, iam vellet ut morā rumpere, quō liceret sibi ac ceteris frui isto conspectu tuo, splendoreq; illustri exoptato. Cui nec potuissē equidem (quod certō scio) rem inquam erratorem facere, quā si hosce labores meos futuros ceu testimonij quoddam arctissima illius necessitudinē, quam inter vos mutuo alius, consecrarem tuo numini: nec potuissē Tuae Celsitudo, quā si ipsos singulari suo patrociniō dignetur. Deus Opt. Max. amplitudinē istam tuā, Antistes observandisq; diu nobis quā florentissimam seruet, ut tum pietas, tum religio, tum bonarum literarum studia, sub tali coryphæa & protectore inualescant. Vale. Venetis, ex edibus Illustrissimi & sapientissimi Viri, D. D.

Ioannē Furtadi & Mendoza, in hac Rep. Oratoris Cæsaris vgilantissimi.

XV. Cal. Maii, M. D. XLVIII.

GALENI PER GAMENI DE SIMPLICIVM medicamentorum facultatib. lib. I.

CAPVT I.

*Simplicium me-
dicamentorum co-
gnitio ad quod
confertur.*

*Medicamentu
quid.*

*Naturamentum
quid.*

*Medicamentum sim-
plex quid.*

Facultas quid.

*Facultas est du-
plex, alia scilicet
et potentia.*

*Medicamentum
singula propria
quidam facultas
inest.*

*Essentia facultatis
sua quibus
corpora consistunt.*



Edicamentorum simplicium facultates exquisitè cognoscere, cum ad uariarum compositionem, tum ad inuentionem opportunitatem, admodum necessarium est. Porro medicamentum omne id dicimus, quod alterare nostram naturam potest: sicuti nutrimentum, quicquid substantiam augere. Refertur enim utriusque ad aliquid. At uero medicamentum simplex, & ipsum per oppositionem ad compositum nuncupatur. Estque id quod secundum naturam suam, syncerum est. At facultas, causa quaedam est effectrix: eam partem actum, ut calefaciendi in igne, partem potentiam, siue futuro tempore: quali mirum calefaciat pyrethrum. Cum autem singula medicamenta propria quaedam effectrix facultas inest, aut purgatoria, aut uomitoria, aut alterius generis alia: nosque alibi demonstrauerimus, ex calido, frigido, humido, & sicco, corpora uenerunt constari, certe facultatum effectricum essentiam (de quibus neque inter medicos, neque inter philosophos conuenit) tum in alijs omnibus, tum in medicamentis, has ipsas qualitates statuemus.

CAPVT II.

*Facultatis indicanda
experimentum
sumum
ad esse ab ea
re, ad quod de-
betur.*

*Aqua frigida
caliditate ex acci-
dentis, ut calida
super refrigeret.*

*Calida et fri-
gida facultates,
quae dicuntur.*

In primis autem ac maxime sumendum est iudicandae facultatis experimentum ab ea re, ad quam dicitur. Nam quod uim in homine aliquod medicamentum habet, in alio animali eandem non necesse est sortiri. Proximè est, ut quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primario & per se. Nam aqua frigida calorem quondam reuocat, eutem refrigerando contrahendog: id quod sanè consequitur reuocatio caloris. Rursum calida quomodo ipsa refrigerat sapenunero, digerendo ex caliditate ientem humorem. Quae igitur admota corporibus nostris, primario ac per se ex caliditate, ea sanè facultate dicuntur calida: si uero contra refrigerent, frigida: non autem quod alba uel rubra sint, tali facultate sunt praedita.

CAPVT III.

*Examinis medi-
camentorum quod
requiritur.*

Etenim quod ab initio ad finem usque dum applicatum est, magis semper calidum, aut refrigerat, id non ex accidenti, sed ex sua natura est tale. Danda autem opera est, ut quodcumque medicamentum in iudicium uocare uelis, diutius haereat applicatum, omnino sit aliene tum frigiditatis, tum caliditatis expertus, ne naturam facultatem illius ascrimina adulteret qualitas. Poterit quaedam tota substantia in sese murio & agunt, & patientur: quaedam una duntaxat, aut duabus qualitatibus. Ad haec, alia quidem tenuis partium sunt, alia crassiorum. tenuium quidem, quae facile ititenues comminui partes possunt, crassarum uero, quae contrari.

CAPVT IIII.

*Aquam esse ad
vitam maximè
necessariam.*

Si igitur primò aquam, quae & communissima uniueris hominibus tam sanis quam aegris est, & ad uitam maximè necessaria, nec frigidam in-

signiter, nec calidam, corpori temperato applicuens: deinde ipsa quae natura sunt intertempata, tertio, quae aliquo affectu tenentur: temperato quidem admota, plusculo tempore omnino ipsum refrigerabit: intertempato uero, citius quidem refrigerabit id quod frigidius natura fuerit, tardius autem quod calidius: semper tamen refrigere rabi, cum uidelicet talis existens, nequeat reuocare calorem, quemadmodum summe frigida, quae si quadrato, aut iuuenilis corpora naturae paulo fuerit intertempata, caloris molietur reuocationem. Sin aliter utaris, semper refrigerabit: id quod etiam facti admota ipsa, qui simplici laborant affectu. Nam ubi affectus compositus fuerit, contingit aliud primario à medicamento fieri, aliud ex accidenti: ut licet cernere in phlegmone, quae calide copiosius fluxionis est foboles. Si quidem quae modicè exallicantur pharmaca, dum superfluitatem euacuant, id quod affectum est, protinus frigidius efficiunt. Aqua itaque potabilis utrobique uidetur frigida: id quod non licet de his asserere, quae sulfureis, bituminosis, aut quae nitrosae existunt. Imò uero neque marina ipsa, priusquam ascritium frigus summum acciperit, admota refrigerare conspicitur. Ergo quae exactè ac syncerè aqua est, omnis alterius substantiae mutatione uacans, ea necessariorum sua facultate est frigida. Si qua uero per bituminosa, sulfurea, nitroia, aut aluminosa loca distillans, aliquid secum eius substantiae absterrent, mista iam ea est, non autem exactè aqua. Quod si etiam ipsi aquae potabilis igneam aut essentiam, aut qualitatē adieceris, sic etiam quodammodo compositam illam effeceris. Quinetiam aqua limosa, qualipote Aegyptum utuntur, composita quadantenus est: sed ea per scitilia uasa optimè percolata, quam purissima efficitur.

CAPVT V.

Indicat autem aqua gustu, uisu & olfactu. Si quidem gustu est pura, si omnis qualitates experta uidetur. Visu, si syncera & pellucida fuerit. Sic nec odorata ullam prae se ferre qualitate debet, ut suat quaedam prauitatis extreme, quae aut aciditatem, aut acrimoniam, aut salcedinem, aut putredinem preferunt. Igitur aqua, quae absque his est omnibus, ut ad naturam certè, ne ipsa quidem ad amulsum syncera fuerit, sicuti neque aliud ulli sensibilibus elementorum, sed ut ad sensum & usum, syncera est. Quae itaque examinanda ueniunt medicamina omnia, omnis extraneae qualitatis ualentisque aliena sunto.

CAPVT VI.

Quod autem omnis aqua dulcis manifestè refrigeret, hinc discas licet, quod si cerè oleo huiusmodi, humidumque ceratū confeceris, ac postea ipsum refrigeraueris, largioris assuisionis frigidae ablutum admoeris, ualenter eos qui febre uruntur refrigeret, si hypochondrijs supponatur: nec non omnem phlegmonem, herpes, carbunculos, erysipelata, phlygethila, & breuiter omnes calidos morbos: id quod non contingeret illi per aliquam nuper dictarum aquarum, quae calidiae aduersatur affectibus, calidè nimirum cum sint.

CAPVT VII.

Ceterum quod aqua quoque potabilis sola sit

*Aqua summi-
frigida in quod
calore reuocat.*

*Aqua potabili-
frigida in quod
calore reuocat.*

*Aqua omnis syn-
cra, est natura
liuè frigida.
Aqua uasa
qua sunt.*

*Aqua limosa
apud Aegyptum
utuntur.*

*Aqua debet in-
dicari recte, ut
sua sit essentia.*

*Elementum pu-
rum mouere
potest.*

*Aqua omnis dul-
cis refrigerat.
Ceratam homi-
dum abluere fri-
gida, calidum re-
uocare affectum
refrigerat.*

*Aqua potabilis
fusa est humida*

inter propofitas humida, ex eadem difces methodo. Nam fi ulcera fupra modum ficca, hac triges, itaſim admodum humida & mollia redduntur, cum alia aque uniuerſe ulcera deficcant, nō nulli etiam ob acrimoniam exaſperant. Quin etiam ſitienti, dulcia aqua remedio eſt: ceteræ uero, acerbiorē enam ſitim relinquunt. Tum aqua inter cūtem laborantibus aduerſiſſimū eſt & poculum & lauacrū aque dulcis. Salſarum uerō, ni troſarum, ſulphurearū, bituminofarumq; omniū, ſanē perutiſe. Imitari autē poteſ, ſicuti marini, ſic aliarum quamlibet, ſubſtantia uidelicet admiſta, quæ in quaq; uincere cernitur.

CAPVT VII.

*Aqua natura.
aquam ſumam
humectare.*

Aque igitur propria natura humida & frigida eſt. Ceterū ſummē quidem humectat, ſiue tepida, ſiue temperata ea ſit: non autē calfacit ſummē, niſi quæ extremē ſeruat. Quod ſi corpus aliquod eucratū, calida moderatē perfundat, in ipſo quidē perſuſione tempore, calidiuſ ſimul atq; humidius efficiet: paulō uerō poſt, id ſeipſo euadere frigidius, nō tamen ficcius, conſpiciet. Nam tamenſi humores qui in uaiſ, aliſiq; cōmunib; ſpacijs ſunt, per id genus perſuſiones uniuerſi exhauriant, ipſa tamen uaiſorū corpora, & uniuerſum genus carnoſum ſeipſo humidius redditur. Quale exemplū, quib; ratione diuerſa, licet uidere in ſenibus: qui cū genuinas partes, quādam adoleſcentes, magis ficcas ſortiant, pluribus tamen excrementis redundant. Hanc itaq; humectandi uim ſolā, nunq; aqua deponit: neq; enim ſiue ſeruens ſit, ſiue etiam extremē frigida, partē cui aſuſa fuerit, ficciore efficit: quanq; ob euaporationē quæ à calida perſuſione excitari ſolet, perſuſa particula nonnullis longē ficciore uidetur, cū præſertim uapor, humor ſit extenuatus.

CAPVT IX.

*Senes partibus
quidem ſolidis
ſunt ſicciores,
excrementis autem
aqua humida.*

Nec uerō uſquadeo abſurdū fuerit, qd facile in ignē uertitur, id calidū facultate putare. Vnū quippe ex ijs quæ facultate ita dicunt, eſt id qd ex propria eius quod dicitur materia, tale eſt facultate. ut, ſi quid facile in ignem uertitur, id nō actū, ſed facultate eſt ignis. Nam hoc quod eſt facultate, ex aduerſo ei diuiſiſ, quod eſt actū: ſicuti & quod eſt per ſe, huic qd ex accidētē cōtingit.

CAPVT X.

*Ignis potentia
eſt, quod facile
in ignem uertitur.*

At quibus conſiliū eſt, utō à rebus extraneis, ad corpora tranſire animalū, uidere primū debet, an tenuis ſit eſſentia, an craſſa, qd explorandum uenit. Secundō, an ſibi connuū, denſumq; ac ſolidum: an interualis interceptū, an rarum.

CAPVT XI.

*Ignis potentia
eſt, quod facile
in ignem uertitur.*

Eorum autē quæ in conſeſſo eſt facultate effe calida, nullum omnino apparet nō calfacere, priuſquā in tenuia ſit cōmutatum. Nam ſi quis piper integrū cuti inſpergat, nullam planē caliditatem percipiet: ſi uerō pollinis inſtat cuti inſpergatur aut linguæ, exalfaciet uniç, ac poſiſſimū ſi fricauerit. Quare multa quidem facultate ſunt calida, facileq; in ignem uertunt, quæ nos tamen

CAPVT XII.

*Calida potēſtate
eſt, ut omni calfacere poſſint, de
beat priuſ in tenuia
cōmutari.*

haud facile exalfaciūt. Ignis ſiquidē, ut qui omnium tenuiſſimus & calidiſſimus ſit, minimo ne gocio penetrat illa, atq; uincit. Noſtra autem caliditas, præterq; quod craſſe eſt eſſentia, halituoſiq; adeo exiſt inſirma, ut ægē quod cōtingit

permutet. Quare nihil eorum quæ calfacere nos uidentur, perinde ut ignis calfacere poteſt, ſed tanq; materia quæ accenditur facile. Siquidē mutatio principium à noſtra caliditate accipiente, ut calami aridi ab igne, nos cōtrā recalfaciūt, & ueluti partes ſunt quædam natū caloris, ut ignis illi. Quare mirandū non eſt, ſi quædā medi camenta primæ quidem mutationis principii à noſtro calore naſta, inde iam pergant, cum quo ſeque qui mutabat, uincere & ſuperare.

CAPVT XIII.

Porro cutis omnis in primo ſtatim ortu ſibi continua cū ſit, temporis ſpacio pertundiſ, ſic ut uniuerſum corpus ſit perſipibile, arteriez ipſæ quæ in cuiſ meatu, quædammodū uenæ, aperiuſi iunde quaq; ſe dilatant, per poros attrahant, nō aërē modō, halitumq; ſed quicquid eñs trahi facile poteſt, ac præ tenuitate ſua, motum ipſius ſpiritus conſequi. Quam obrem quicquid piperis ad exactiſſimū fuerit redactū polli nem, uerūſimile eſt, ſimul cum ambiente aërē, ab ipſis arteriis attrahi, protinuſq; à calore natū alterari, idq; tum ob paruitatem, tum ob ingentiam ut à calore alteretur aptitudinē. Quod quidem ſi ſemel illi inſit, per totum corpus, temporis progreſſu, perlatum, ipſum recalfaciet: prius tamen calfaciē ſibi proximioribus particulas. Vnde liquet, craſſiorū nullum, priuſquā ad uaguem cōmutatur, neq; ipſum à noſtro corpore quicquam perpeti, nec ruruſ in nos poſſe agere. Quod uerō in pipere adduximus exemplū, idem licet ad alia tranſicere, ſiue ea calefaciendū, ſiue etiam refrigerandi facultatem ſortiantur.

CAPVT XIV.

Conſiderandū autē eſt nō ſolidū, craſſiorū ne ſit partū, an tenuiū, explorandorū medicamentorum ſubſtantia: uerum etiam, rarā ne an ipſiſſa, denſaſe. Voco ſanē rarā, cuius partes manibus ſpacijs ſunt interceptæ. Vbi igitur ſpacijs cuiuſmodi à malis, quæ plena ſemper ſunt aërē, corpus fuerit diſtinctū, faciliuſ q; ipſum accendiſ, etiā ſi calidiuſ illo nō fuerit. Nam qui in iſa ſpacijs cōtinetur aër, primo ſtatim ignis occurſu accenditur, atq; inſtāmur (aër enim accenſus eſt flamma, quædammodū terra, carbo) nūā uerō ſecum corpus uniuerſum accēdit. Sic itaq; calamos aridos ignis exurit celeriter, tamenſi minus alia ſubſtantia calidos, idq; ob meatū multitudinem, quos prius aër occupabat, quorū argumentum ſummū, calamorū leuitas eſt. Nam ſiccū natura corpus, leue eſſe alioqu nō poſſet. Quæcūq; autem ſituloſa ſunt, multumq; uacui obnāt, pondere exiſtunt leuia. Ar calamus à noſtro corpore ægē calſieri poteſt, quod eſſentia ſit craſſa. Si igitur aliciuſ medicamentū ſubſtantia tenuiſ ſit & cōtinua, eandem in nos naturā offendet, quem prius in ignē ſin autē rara ſit & craſſa, ſieri poterit ut ab igne quidē alteretur perfacile, nō tamē à calore noſtro, ac proinde nec nos recalfaciat.

CAPVT XV.

Quſuis aqua ipſa tenus ſubſtantia ſit, nō ramen ob id ex ſua natura nos calfacit: nec propriū eſt ignis nutrimentū, ſed porius extinguit illum, ut quod illi ſit aduerſiſſimū. Nec mirum ſi cū igne tum calidiſſimo, tum ſi ciſſimo pugnet aqua,

*Calfacienti a
corpore, ab eo
tamen calore af
ſumere.*

*Corpus uniu
erſum eſt tranſi
bile.*

*Medicamenta
omnia qd poſ
ſunt in corpore
ſunt uis ex
traneis.*

*Rara quæſit
ſunt, quæ
ſiſſa autem
denſior ſunt.*

*Flamma eſt et
aër enim.*

*ſituloſa omnia
ſunt leuia.*

*Aqua ægē
calſiſſima, non
tam facile eſt
humida.*

*Oleum rursus cal-
escit.*

*Aqua feruens
non cum oleo,
tota quam illud
absorbetur.*

*Caliditas alio
et potius, vni
quodque dissolu-
tur dicitur.*

*Concreta in
glaciem facili-
ter, ut per
se, si vero
quodque dissolu-
tur dicitur.*

*Tenuia et
promptius in
glaciem, ut per
se, si vero
quodque dissolu-
tur dicitur.*

*Aqua que dicitur
leuissima.*

*Lae non effe-
similare.*

*Vis
Amara.*

*Acetum maius
ex parte frig-
idum quam cali-
dum existit.*

aqua, frigida & humida exilens. Porro oleum, tamen in flammam uerari facile, non tamen admodum celeriter, nec manifeste nos calfacit, ob lentorem subtilitatem, quo tenaciter iheret ipsa, quae semel coigit: neque ab ambie facit aut extenuari, aut augeri ualeus, nec propterea intus in corpus transiunt. Aqua uero & celerissime in illud soluitur, & expedite digerit. Quod si in idem uas coniectam aquam, oleumque decoquas, prior aqua absorbetur.

CAPVT XV.

Ut autem calfacientium, aliud est simpliciter calidum, ut ignis: aliud exuperantia, ut qui in nobis est calor: sic eorumque facultates sunt calida, aliud quidem ad id quod primo & absolute est calidum, aliud uero ad id quod per exuperantiam refertur. Non ergo quod citius accenditur, protinus ad nos simpliciter apparet calidius.

CAPVT XVI.

Sed neque citra limitationem, ex eo quod ali- quid in glaciem cogatur, debemus frigidum esse colligere. Nam in his quae eandem habent aut tenuitatem, aut crassitudinem consistentem, quod occlusum a frigore coëgelatur, temperantem est frigidioris. Si uero alterum sit tenuius, puta (exem- pli gratia) uinum: alterum crassius, ut oleum: non est necesse aut citius aut magis coëscere quod est frigidius: nisi frigiditatis excessus, quae huic inest, excessum crassitudinis, quae inest alteri, superet.

CAPVT XVII.

Est autem refrigerari, frigidam qualitatem re- cipere: aut congelari, densescere est praeter frigore. Quae cum igitur corpora tenuis essentia sunt, promptum tum incalescunt, tum refrigerantur: at non aquae congelantur, ut aer & ignis. Nam hic plane non congelatur: ille autem, nempe aer, non perinde ut uisum, pax, cera, resina & bitumen: cuius quidem tamen calidissimū sit, retentata tamen crassitiesque, ad congelationis celeritatem adiunt. Porro aquam quae celeriter & incalescit, & refrigeratur, mentis leuissimam esse dicit Hippoc. Nam quanto tenuior fuerit, tanto par- terit proprior. Atque quae tenuior est, minimū habet lumen terrenum. Non ergo absolute ex matere passionibus, ad ignem, coëscere eius ad nos facultate oportet: cum multo securius sit hoc iudicium, quo ad nostrum corpus quippa examinamus. Quod lae simile non sit, nec unde quā sibi simile, co- gulano indicat, quae ferose partes a caesosis faci- le separant. In uniuersis enim liquoribus, qui a fructibus exprimunt, crassum defertur quippa, quod spacio temporis subidet, uocanturque fixi in uino, in oleo aut amara. In aceto uero est eius- modi quippa, ac fortā ipsum est, quod calor est participes. Nam quod frigoris, id quod tenues est. At acetum maiori ex parte frigidius est, quā calidius.

CAPVT XVIII.

Perperam igitur faciunt, qui usque adeo calidū esse acetū pronuntiant, ut cauterio illud assimi- lent: cum tamē nec tantū sensu percipimus in aceto caliditate, nec ipsum crustas, instat caute- ria, excidit. Constat siquidem, ubi per cauteria cō- silium est sanguinem haurire, crustam relinquī haud exigua, quae uelut operculū sit corporibus san- guinem profundantibus. Ac proinde illis cauteria plane caudentia applicamus, quae haud quidem

quod calfaciant, sed quod urant, atque subiectis partibus operculum, quam Graeci uocant escha- ram, relinquunt, fluentē sanguinē supprimunt. Itaque acetū, haud perinde ut crustas facientia me- dicamenta, sed potius ut astringentia, citra cru- stam, sanguinis fluores colibet: quia ratione non excalescere, sed refrigerare potius ipsum existi- mandum est.

CAPVT XIX.

Si uero idiotarum aut plebicum aliquem (nam horum in istiusmodi rebus in corruptū est iudi- cium, quia nulli dogmata seruilius sunt adhaerē- ti) tēperato aceto ex spongia fouerimus, dein autē interrogauerimus, num calorem an frigus perci- piat, fatetur quidē se, primō sanē frigus perci- pere: postea autem, nempe spongia sublara, sen- sim nascens in parte quamdam caloris plantas- sium sentire. Vnde perspicuum est, omnino quidē frigidum esse acetum, obtinere tamen quēdam calorē, qui acrimoniae ratione per accidens suc- cessu temporis corpora calfacit: nisi fortē ubi la- xus ac doloris expertus tumor infestat. Si quis etiā illo ab illa rhaupia urati, arati aceto resingui- tur: non quod acrimoniā & mordacitatē ob- tundat, ut oleum atque rosaceū, sed quod euiden- ter refrigeret. Quare nisi molesta facultatis aspe- ritas illi inest, non alio utendum ad refrigera- tionem foret.

CAPVT XX.

Cum autē aliis ob acrimoniā ipsius, calidissi- mum esse acetum contendunt: alij contra, maxi- mē frigidum, quod putant ipsum grumos con- stringendo dissoluere, uerisimile est id iuxta me- dium consistere. Quippe si longe ab extremis utroque distaret, non tanta inodisset de facultate ipsius controuersia.

CAPVT XXI.

Quia uero quae neutra sunt, dicuntur triplici- ter, secundū diuisionē Herophili, partim ambo- rum extremorum participatione, partim neutrius, partim nunc illius, nunc huius: mihi uero tum a- cetum, tum etiā rosaceū, utriusque extremi neces- situdine, esse neutra uident: & quod nūc quidem sensibilibus calfacere, nunc refrigerare cernant.

CAPVT XXII.

Quod aerō ad aerē spectat, iudicari eius te- nuitas, ex sola in tenuia diuisionis celeritate. Cae- terum si ea ratione ignis sit tenuis, haud omnis ignis tenuis existimabilis, cum & ferrum fiat ignis, non tamen quā antea tenuius. Et siā & cum aliud sint ignis genera, reuera tenues existunt. Quocirca non omnis ignis est tenuis, nec quicquid tenue, protinus & ignis fuerit. Nam prout ignis quidē est, & non tenuis: & aer tenuis, uerum non ignis.

CAPVT XXIII.

Quocirca minimē cōcedendum arbitror, ace- tum, quod mordax & renue sit, calidū continuū esse. Nec enim quicquid mordax fuerit, id & cali- dum est: forte uero, nec quicquid mordax fuerit, & renue.

CAPVT XXIV.

Eorū igitur medicamentorū quae uehemēter aut refrigerant, aut calfaciunt, non sunt facultates ambiguae. Verū ea de quibus dubitare cōtingit, neutra omnino esse necesse est. Pleraque autem, ut ad sensum simplicia, ex pugnantibus facultatibus,

*Cauteria san-
guinem sup-
primunt, quod re-
linquunt escha-
ram.*

*Acetum quae ra-
tione fluens san-
guinem soluit.*

*Idiotarum indi-
cium rursus incor-
ruptum.*

*Acetum est frigi-
dum, quia quon-
dam calorem per-
cipit.*

*Acetū ardorem
à rhaupia ura-
tis non solum re-
frigerare, sed
etiam.*

*Acetū tēperato-
rum non longe
à medio distare.*

*Neutra diu tri-
plici.*

*Acetū quae ra-
tione dicatur
neutrum.*

*Rosaceum qua-
ratione dicatur
acutum.*

*Aer tenuitas
uide indicat.*

*Ignem omnem
nō esse tenuem.
Tenuis autem
non esse ignem.*

*Mordax omnia
non esse cali-
da.*

*Neutra esse de
quibus dubita-
re cōtingit.*

eōstant : ob quas quidē fieri potest, ut acetū uim illam obfcurē faciliendū, quam ostendit, fortia-
tur, existens alioqui tenuē, refrigeratoriū atque
exicatoriū medicamentū. Etenim quidē efflore
scere rubor in partibus ab aceto irritatis conspi-
ciatur. CAPVT XXV.

Aceti facultas.

Facultatum me-
dicamentorū con-
sistū et gradus
descendit effe.

Cāterū nō fat est generaliter uires medica-
mentorū cognoscere, quod hoc uidelicet calfa-
ciat, illud autem refrigeret, nisi etiam ipsarū fa-
cultatum excessus & gradus, accuratissimē didi-
cerimus. In qua quidē cognitione, tum artificia-
lis simplicium usus est constitutus, tum ratione
proficiens ac methodo compositio: ipsorumq;
compositorum recta usui accommodatio.

CAPVT XXVI.

Perperam autē superioris seculi homines ad cō-
positis orsi medicamentis, eorū quē in illa ingre-
diuntur medicamentorū simpliciu uires dīudi-
cabant, cum nō liceat rectē cōposita ipsa cognō-
scere, priusquam simplicia singillatim examinari-
mus. CAPVT XXVII.

Composita cu-
pauit nō possit
simplicia igno-
ratis.

Atq; hi quidē, cū citra uiculiū simpliciterq;
compositis omnibus facultatibus fidem habēt,
uel Empirici ipsis reprehensionis locum & oc-
casionem exhibent.

CAPVT XXVIII.

Cū autem non aliunde ignem calidum ef-
se, ac glaciē frigidam cognoscimus, quā ex
sensu ipso : omnino stupidi sunt, qui sensus esse
sentientes existimant.

Sensus cui non
sunt conueniēdi.

CAPVT XXIX.

Porrō xpiūm tempore oxyraci potu, quidā
planē refrigerant, atq; sitis expertes permanent.
At nōdum constat, an id a cetera causa cōtingat. Dē
exerit tamen aliquis, aquā, tardioris distributio-
nis cū sit, ab aceto, tanq; ueliculo, duci dige-
rigi in uniuersas partes. Sic etiam si cum uino bi-
batur aqua, sitis efficacius exinguit, q; si sola. Re-
frigerationē itaq; sitisq; sanationē ab aqua pro-
uenire, ut quē frigida humiditq; naturē fixa-
terem adminiculo esse, ac ueluti alas illi ad om-
nes corporis partes permeandas, tum uinū, tum
acetū : quē ipsa nequaquā frigida sunt & humida:
alioqui ad retinguendam sitim, præstaret ea so-
la, q; cum aqua, exhiberi. Porrō ut ad uino appa-
ret homini semper sitim incrementē, sic ab aceto
epoto, interitū quidē augeri, interitū uerō sedari

Oxyraci uires.

Aquam ab a-
ceto delucis per
uinoemam cor-
pui.

Aqua uino per-
uenit, quā se-
la, ut efficacius
uinoemam sitim

Uinum semper
dangit sitim.

Uino uide re-
satur.

Acetum cui sitis
medicū sit.

Oxyracium ex
aqua & aceto
constat.

Aqua humidi-
tati uicini est hu-
midissima.

Medicamenta
que indicant re-
laxant, qualiter
expendere oportet.

CAPVT XXX.

Cū igitur sitis, partim humoris inopia, partim
caloris copia proueniat: neq; si sicca disposi-
tione proneniet sitim, neq; si calida & sicca, e-
potum sanare unquam potest acetū. At si quan-
do in unū cōstant humiditas atq; caliditas, eiusse
sanē sitis, acetū medela optima existit. Siquidem
humectare nequit: at refrigerare, non instringere.
Verū sitis quē ex composita affectione, uidelicet
calida & sicca, nascitur, composita medela est
oxyracium, quod ex aceto cōstat tenuiū parnū,
atq; refrigerante: & ex aqua, quē non modō re-
frigerat, sed humidiorū etiā omnū est humidissi-
ma. Nilul enim aqua est humidius.

CAPVT XXXI.

Per se autē solum, quod iudicandū est, expendi
oportet, tum in quā temperatissimē corpori
bus, tum etiam in intemperatis. ac præterea in ipsi

qui alicui sunt morbo obnoxij. In tēperatis qui-
dem, ut suprà : in intemperatis autē, sicut dixit
Hippocrates: Naturis picrocholis utilissimū ef-
se acetum, at melancholicis aduersissimū. Porro
in morbo aliquo affectū, si simplex fuerit, in sim-
plici exploretur affectū: si mixtus alitur, neces-
sum est id cui miscetur, temperaturā sui medicū.
Siquidem quod medio comunētū fuerit, ipsum
eorū quē perficiēti, existit causā. Quare si acetū
simplici cerato cōmiscas, cerato ipso longē frigi-
gidum exploretur affectus: si tibi id reme-
dium uel optimū, ad erysipelata, plethymonas,
herpetes, & carbunculos. Sin autem quod mixtū
est, tanq; simplex expendas, hallucinaberis. Nam
quemadmodum ærugo nequit carnem produ-
cere, sed ceratum quod illam recipit sic ulcerum
glutinatorium, non acetum, sed oxyracium est.
Quippe acetū per se, ulcera erodit & mordicat.

CAPVT XXXII.

Iam uerō cū liceat ex atrictoriis complura
offendere, quæ minime sanē conglutinent: sicuti
ex cōglutinantibus laud etiam pauca, quæ mi-
nimē astringentia uidentur, gallurū q; absurdissi-
mē, qui atrictoria omnia conglutinant, cōglu-
tinantia omnia astringere proficiunt.

CAPVT XXXIII.

Miserē etiam hallucinantur, qui astringentia
omnia refrigerare dicunt: cū si nihil aliud, sal-
tem chalcitis, chalcanthos, & misy, quæ ualent
astringunt, tamen assequuta sint caliditatem, ut
nos etiam exurant.

CAPVT XXXIII.

Herodotus autē & Dioscorides, quod medi-
camenta quædā proliuissimā alui, atq; dysenteris
medeantur, ob id astringentia ea esse colligunt:
cū tamen ne minimū quidem astrictionis for-
tiantur, sed potius rarefacientia & laxantia sint.
Nam (exempli gratia) caprinus adeps, omnibus
causis & gustu & facultate sunt astringētia, aduer-
sissimū est: ipse tamen quæ acris & mordacia per
alium fluunt, manifestē efficaciterq; auxiliatur:
quod scilicet concretat facili, inungaturq; inte-
stinis, ac plurimo tempore inharētis, illa demul-
ceat & foueat: cū uidelicet condensare, con-
stringere & constipare, opus sit astringentium.

CAPVT XXXV.

Vnaquæq; sensibilibus natura, primariū subie-
cta est, tactū quidē caliditas, frigiditas, durities,
atq; mollities: albedo uerō, ingredo, atq; ut sum-
matim dicam, uniuersum colorū genus, usui: a-
maritudo, dulcedo, austeritas, acerbitas, acidi-
tas, salsedo, acrimonia, gustui. Placētq; demens
uideat, si quis gustu colores iudicare tentet, aut
sapore uis: similitēq; de alijs sensib. Siquidē
tactu iudicande sunt differentie: tangibiles, au-
ditu audibiles, odoratu odorabiles. Omnis au-
tē iussuentionis demonstranonisq; principia sunt,
quæ sensui atq; intellectui euidentia existunt.

CAPVT XXXVI.

Porrō Plato in Timæo, sapores (quos Græci
ἁμαρ appellat) duos primū assignat, eosq; ut
speciei eiusdē, sic ratione maioris & minoris in-
ter se differentes. Quorū sanē alterū austerū, alte-
rum acerbum (qui ex illius intensione procedit)
nominat. Secundam speciem facit, eorū qui illis
opposita

Acetum bibulis
esse uicissim,
aduersissimum
melancholicis.

Ceratum sim-
plex aceto ablu-
tum, contra ca-
mores calidissi-
mos esse proba-
tum.

Oxyraciū val-
de astringens.

Astrictoria om-
nia blandissimā
quæ conglutina-
nt, neque gluti-
naria omnia
astringere.

Astringētia om-
nia blandissimā
quæ refrigerant
re.

Dioscorides
sugillas Galie-
nos.

Caprillū adeps
cuncta facit in-
testina condre-
ta, cuius flos-
tate proficiunt.

Astringentium
opus.

Tangibiles qua-
litates.

Visus quæ sub-
stantur.
Gustus quæ sub
stantur.

Sapores duo-
simos ex duobus
Platonis.

opposita sunt, nitroforū uidelicet, salforū & amarorū. Et si ois quod amarus ex nitrofo promittit intentione. Salus uero, ac nitrofo imbecillior est, aut attritionis quoque asinus ali- quid. Deinde at Platone acris expositus est: mox acridus: postremo dulcis. At si Theophrasto addi- tus est unctuosus, quem nimirum omisit Plato, et qui ad gustum nihil attineret.

CAPVT XXXVII.

Exponere autē hos saporē ex acētē, impossi- 10
le est: quandoquid neg aliam uillam senioriam passionē: cum tamen qui tali sensu comunicat, recordari fuerit possibile. Igitur quando quod linguae nostrae fuerit admodū corpus, uehemen- ter deficcet, contrahit, & in multam profundita- tem usq; illam exasperat, sicuti pira syluestria im- matura, & corna, eiusmodi omne appellat acerbum, ab austeris tantū intentione diuersum. At

quod atringens uocamus, idem uidetur signifi- care quod auster, aut etiam cōmune esse genus tum liuus, tum etiam acerbi. Quae uero lingui- dum cōiungunt, nō contrahunt, neq; cōstipant, sed detergunt potius & ablunt, etiam si atrin- gentium quippiam permixtum habeant, hęc om- nia falsa cognominamus. At quae lius etiam ma- gis detergunt, ita ut etiam moleste exasperent, a- mara uocantur. Porro quae mordicā roduntq; idq; cum ualida quādam caliditate, dicunt acia: si nō hęc abstit, acida: ceterū hęc fermentandi quoque uim obinet. Rursus, quae ueluti inungūt atq; implent, in statumq; suū reititūt exaspera- tas ac ueluti erosas linguae particulas, hęc, si cū oleopræte manifesta cōiungant, dulcia: si nō hac si- ne, pingua uocant. Quod si ex calido, frigido, humido & sicco, coeantibus, uniuersa comitent, uerūsimile profectū ē, dictarum quāq; qualita- tum, ex horum etiam mixtura constāt.

CAPVT XXXVIII.

Verū nō quale unumquodq; ex se sit, & ad totam naturā, sed quale secundum corpus no- strum, consideramus. Alioqui nec acetū, nec ma- rina aqua nos exicare possent, sicuti nec sicca di- ci, cū utrumq; illorum sit actū humidum. Cete- rum si nos exicare appareant, sicca dicentur, ad nos uidelicet, & nostram naturam, parem siccam di uim obtinentia: de ceterisq; qualitatib. idem est ferendum iudiciū. Quare facultatū omnīū quae medicamentis insunt, experientia erit cer- tissima iudicatrix. Quam qui relinquunt, nō so- lum falsa pro ueris ducūt, sed tractationis etiam unilitatem destruant. Idcirco prius delendi sunt dispungendiq; omnes paralogismi a discerniūto anientis, quā uera disciplina imbuantur. Nam quemadmodū corpora impura, quantū magis nutritis, tantū magis laedes: sic quoq; si impuri animis nutrites sermones offeras, nō modō nihil prois, uerumetiam magnopere obfueris.

GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum fa- cultatibus lib. II.

CAPVT I.

Non defunt qui nobis, mortales enim si- mus, a sensibus auspicandum esse conten- dant, ad facultates omnes examinandas:

in illis tamen perpetuō immorandū nō esse, sed ad partem diuiniorem accedendum, nempe ratio- nē. Sensum quippe & animantibus inesse ra- tionis expertibus: rationem autem solam, homi- nibus esse cum diis cōmunem. Qui sophistae nō sentiūt, si a sensibus recedendum sit, demonstratio- nis primordia futura esse longe incertiora, quā ea quae demonstranda uiuent.

CAPVT II.

Equidem optatim nullas nō res clare sub sen- sus nostros cadere, nec quicq; esse quod illos fu- geret. Hoc enim pactū nihil ambigū unquam ad anceps foret. Verū quoniam illos quādam effugiūt, rationē ipsis superinducere conandum est, sic tamen ut nec confusa, nec infinita colliga- mus, sed ante omnia, nominū significatiā dilige- ter definiamus: deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidens, separeretur. Irredehī autē metrorū sunt, qui de olei aut rosi colore nimis an- xiē ratiocinant, cū rebus ipsis uariē uim liceat, de illisq; periculū facere. Ac tales meā quidē sen- tentia, perinde facitāte uident, atq; nī qui ex ali- qua imagine cognoscere quempiam conantur, quem etiam uiuū intueri, maxime illis est licitū.

CAPVT III.

Tribus ergo modis in sermone peccant, qui aiunt rosas tēperatura esse calidas, quod sint ru- bres. Primū, quod nō demonstrata hac proposi- tione, Omnis ignis rubet: cōuertere ex hac aliā, uidelicet, Omne rubrū est ignis, tanq; ueram co- nantur. Secundō, quod nesciunt, propositiones quae ex mutuo ueris conuertunt, nō autē simpli- citer cōuertentes, ueras existerē. Tertiō, quod etiam si mutuo conuerterent, nō tamen omne qd colore sit rubro, calidum esse, ex mutua illa con- uersione sequatur, sed rubrū omne esse ignē: id quod minime inuestigamus. Eodem errore te- nentur, qui ex odoribus, medicaminū facultates coniiciūt. Nec enim quicquid bene redolet, cali- dum est: nec quicquid calidū est, bene olet. Qui etiam nec si quid graueolens est, calidum etiam fuerit: nec si calidum, etiam graueolens. Sic nec si quis, quicquid grauitur olet, frigidū dicat: nec si quicquid frigidum sit, olere grauitur, uerū di- xerit. Si quidem calidorū innumera sunt, partim bene olentia, partim grauitur, partim neutra: at- que frigidorū similiter. Quāq; quid calida dico, ac frigida, cū dicere debeam nos calificaētia, & refrigerantia? Etenim aliud est facultate calidū, aliud actū. Et huius quod actū calidū est, aliud absolute dicitur calidum, aliud per exuperantiam, aliud ad symmetriā sui generis, aliud ad quidam obuium collatū. Homo autem nō absolute cali- dus, quemadmodū ignis, sed exuperantia calido- dus dicitur: quod maior in eo portio calidi sit, q̄ frigidi. Ergo & quicquid ad hunc modū dūcū calida potestatem, illū dūcū exalfacere: faciliq; de ipsius iudiciū sumitur per experientiam solam, cui adiunxeris paucos quosdam epilogismos.

60 Quare neq; a calore, neq; ab odore, neq; a consi- stētia, aut huius generis alioqui, de medicamen- torum facultatibus est opus ratiocinari.

CAPVT IIII.

Taceo sophistas minime quidem rationibus sciētiis uti, sed aut inductionibus, aut exem-

Rationē solum esse nobis cōmūnem cum diis.

Sensui deservē de nos esse.

Ambigū ubi sit, si uimna sub sensui cade- rit.

Ratio cur inter paucitā sensui sit.

Rosae quid rube- bra sint, calidas esse dicere, qua- supliciter periculi.

Propositiones quae ex mutuo ueris conuertuntur, sunt uerae.

Oderi nos iudicari facultate medicamentorum.

Calidum multi- pōter dicitur.

Homo non ab- solute sed per ex- superantiam ca- lidus dicitur.

Calorem fas- est ad medica- das medicami- nam uires.

Sophista rati- onis inductionibus utitur.

plus. Differt autem, ex exemplis quippiam suadeas, an ex inductione. Si quidem qui ex exemplis fidem facit, unum aut duo georibus eiusdem affert, aut certe planè paucula, plerisque ceteris præterita. Qui uero ex inductione, omnia comprehendere nititur, quæ per experientiam sunt cognita. Quare talis inductio uehementis est, ac plurimum persuadet.

CAPVT V.

Quod oerò ad oleū spectat, quo de multa Archidamus citra demonstrationē atque ineptissimè prodidit, quæ in ipso coquantur omnia, sicca & friabilia efficiat, contrā quā in aqua contingit: quæ uero sunt illo imbuta, magis propriam humiditatem conferant, quæ si eo madida non essent. Quinetiam scilicet & utricæ morsus oleū per sanat: & cum reliquū uniuersum corpus demulceat, tantū oculos mordicat, necnon guttur exasperat. Subducit autē aluum, lasitudinis tollit, tueturque inunctos à frigore, atque lora emollit, in-
sectisq; animalia perimit. Quorū omnium causam reddere debuisse Archidamus. Porro coci oleo tum carnes, tum pisces, interim dum assant, oblinunt, quod sicce a duntaxat extimæ eorū reddant partes, si assentur citra talem unctionē. At letas etiā oleo gymnastice inungitur, quod præsentē qui dem lasitudinē soluat, occurrat autē futuris: ac breuiter frictionem tum æqualem, tum mitem efficiat, corpusq; ad motus futuros præparet.

CAPVT VI.

At Archidamus nō solum quæ in multis perspicue apparent cōtemnit, sed hæc etiam parte iure taxandus est, quod dicat, meliorē esse frictionem siccam ea quæ cum oleo adlubet, quia corpus durius & siccius his qui inunguntur, euadat: mollius autem ipsi, qui fricatione sicci. Falli præterea milii in hoc uidetur, quod similiter affici putet tum ea quæ in illo coquitur, tum eos qui fricantur. Negi enim eadem agere dixerim oleū calidum, frigidum, temperatum, tepidum, aut feruens, sicut neque aquam ipsam. Nam qui obscuro simile fuerit, herbas in oleo seruente coqueat, ac exercitantū corpora oleo temperato fricet. Et eoim si quis uelit expendere oleum, ab omni prius aliena qualitate (à qua semper propria obscuratur) ipsum liberum reddat, atque ita demum ad explorandum se accingat.

CAPVT VII.

Præparare oleū solemus, nō aliter atque aquam, nempe prius excalfactes, ac deinde in aquam mergentes summè frigidam. Quod si etiā sors in ipsum cum strepitu decidat, uasculo cui inest oleum, antè diligenter occluso, magis quoque ac magis ita reddetur frigidum. Multū item frigeferens, si præcalfactum ita in puteum demittas, ut aquam contingat. Ac sic oleum reddimus frigidum: contrariò autem modo, calidum. Quo factū utitur in refrigeratis corporibus, in alueum qui calidi demittentes, quibus pars quæpi obstupuit, aut qui tremuli sunt, aut cōuulsione, aut tremore, aut motus sensusue oblesione tentantur. Porro fructus ex quo premitur oleum, oliua nuncupatur. & arbor, olea: atque hoc quidem simpliciter & primariò oleum dicitur, reliqua autē omnia per abusum & translationem,

CAPVT VIII.

Ceterū ueri olei plures sunt differentie. Secundum statem quidem, cum aut recens est, aut ætate wigens, aut inueteratū. Secundum præparationis modum, cum simplex atque impermixtū fuerit, aut præparatum cum fale. Secundum fructus diuersitatē, cum is aut immaturus, aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, cum ut ab immo fuit, sic relinquitur, aut candidum redditur.

CAPVT IX.

Experiri autē solum oportet, quæ impermixta sunt, & ab omni extranea qualitate aliena: ealy primū in optima corporis cōstitutione, deinde in imtempertis, demum in morbis simplicibus.

CAPVT X.

At nonnulli medicorum nō solum in explorandis medicamentorū uiribus hallucinantur, oermetiam in opinionibus quas habent de affectibus. Nam oleum quod lasitudinis remedium sit, omnes propemodum consentiunt, ceterum qui affectus sit lasitudo, nō consentiunt: ac proinde secundum ipsum demōstram, nihil certi de olei facultate colligi potest.

CAPVT XI.

Nec uero parū interest, an iniiciatur in uentrē pituita scatentē oleum expers sale, an quod plurimum accepti salis, in uentrem purum. Vtrunq; enim alium subducit, facultatibus tamen diuersis: nempe illud quod sale uacat, in pituitoso uentre per lubricitatem: quod uero salem habet, in puro per acrimoniam, perinde ut muria, & marina aqua. Idcirco sanè hoc radet, alterū nō radet.

CAPVT XII.

Nonnunq; autem mordicationes ex accidenti quod falsuginosum est, sanauerit, unā secum educens acres & mordaces humores, perinde ut cetera omnia quæ abluunt. Sed non statim ubi immissa sunt id genus medicamenta morbus sanant, quin potius tunc etiam magis exasperant. Si quidem euacuacionis, laud mitionis ratione, sanationem molitur. At ceratum ex rosaceo & adipe infusum, spem numero moribus continuò succurrit, idq; cōmissionis ratione. Olei etiam solum, sed dulcissimi, idem frequenter prestat: sicut ceræ adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratum ex oleo dulci. Nos autem spem numero quibus ex frigore torquebantur dolore interna, iniecto oleo calido liberamus: atque ubi maius esse frigus cōiectimus, addidimus & anethū: si uero adhuc etiam maius, rutam quoque & bitumen. Ceteri occurrunt interdum quedam affectiones permixtæ, ex intertempe uidelicet quæ mordicatione, in quibus consueuimus nos anethū, aut rutæ oleum infundere, anserino in eo liquato adipe: is si non adit, saltem galli uaceo, aut aliquo aliorum, aut ceræ mordacitatis experire, qualis nimirū est lora. Vnumquodq; autē medicamentorū temperatum, ubi ualentius euacuat, si humoribus mordicantibus, morbum eorū re-
tundit. Verū si aut ualentioribus facultatibus, aut multis, paucū permixtū fuerit, unā & ipsum corrumpitur, alitq; cacochymia. Quam obrem protinus euacuandi sunt, qui ab his quæ temperandi naturam habent, exasperantur.

Oleo diffusiua
complexu.

Experiri quæ de
quæ de medi-
camentis dicimus
sunt.

Oleum lasitudi-
nem conijcit.

Oleum expers
sale, pituitum,
quæ raturæ sub-
ducant alium.

Saltergus re-
cordit alium
quæ mordicat
interit sanant.

Dolentibus mor-
bibus quæ soluit
opistern.

Cera clata qd
mordicat carnis ex-
pert.

Vacuandis pro-
trahi esse, qui
ab his quæ tem-
perandi naturā
habent, exasperantur.

CAPVT

Inductio quæ
exemplis uale-
dunt.

Oleo effusus ra-
rij.
Oleo macta
uoluntur, sicca

Oleum oculis
mordicat.
Oleum aluum
subducit.
Oleum infusa
perimit.

Oleum lasitudi-
nem leuit.

Archidamus opi-
nio cōuulsitor.

Oleo uiri quæ-
liter expendi-
da.

Qualitas pro-
pria ab aliena
obscuratur.
Oleo refrigeran-
do potius.

Oleo perfuso ca-
lido, quibus cau-
nomas.

Oleum. Olea.
Oleum simpliciter
ex quo per abu-
sum dicit.

CAPVT XVII.

Sic sanē lac frequenter simulatq; sumptū fuerit, alijs accēdit, alijs in nidorē uertitur, priuquā probe concoctū, corruptionē temperet. In quibus utiq; primū cacochymiz pars euacuari debet: atq; inde fumens chondrus, & pīfana, & lac, & alia: quæ ubi probe fuerint cōlecta, conferunt ad boni succi generationē. Porro pīfana, ex sua propria natura boni quidē est succi: uerū interdū unā cum siccis succis, quæ excitant mordica-
tiones, corruptisq; atq; ipsum augeat symptomata.

CAPVT XVIII.

Cæterum cacochymia, non temperando, sed id quod mordicat educēdo, mordicationes sanāt. Ac proinde, donec uacuentur, hominem mordicare non desinunt: & insuper euacuata, in partibus asperū sensum relinquūt, aliud medicamen dediderantē: quod nō faciūt quæ boni sunt succi & dulcis, cuiusmodi existunt chondrus, lac, atq; pīfana, quæ in id genus affectibus & edenda præbentur, & per sedem inīquā, ubi aut mel-
le, aut quopiam eiusmodi, quod infestabat exter serimus. Quo tempore oportuissimū est & adeps, & ceratū dulce, & oleū dulce. Quatuor itaq; indi-
cis, cum possis quod per se leniens est distingue-
re, ab eo quod per accidens, facile cuiusq; talium medicamentorū facultatem inuenies. Primū indi-
cium est, an statim mingat, an nō. Secundum, an simul cum lædennibus euacuatur, an nō. Terti-
um, an asperitatem quandam in corporibus ipsis
relinquat, an non. Quartū, an ita affectūs cō-
modū uideat. Nam cum nec proptius mordicationē sanat, nec intus lædē remanet,
molestamq; asperitatem parti affectæ relinquit,
quam, si denuo offerat, exasperat: argumentū
est rodentis, ac mordicantis ipsum esse naturæ,
ex accidenti tamen quandoq; morbus sanare. At
quod cōtinuō mingat, & nullā excretionē pro-
uocat, sed nec exasperat dum intus manet, imō
exasperatorū medela existit, ipsum quidem nato
ra bonū est: uerū inter dum a cacochymia quæ
ipsum alterat corruptitq; mordax efficitur.

CAPVT XIX.

Lauanda porro est nō modō cera, sed pix, resi-
na, & oleū, omniaq; breuiter, quæ calfieri & fun-
di cum possint, atq; misceri nequeunt. Singula
igitur modicē calfacta, in uas laniosū orificiū &
magnum, cuiq; in sit atq; copia qualitatē exper-
tis, infunditur. Dein tundito & frangito, mani-
busq; impellē subigito. Postea effusa priori aqua,
rursus quod abluitur exalfaciens, in aliam equē
synceram a quam inijcitur: rursusq; in aliam & a-
liam, donec aqua nullam ex eo qualitatē reci-
piat: quod quidem gustu datur cognoscere. At si
quæ sunt lapidosa & dura, ut cadmia, & resina qua-
mā, & q̄a uisum, eam cōminuentem exactē in ten-
nua plurimū terere in aqua fontana & purissi-
ma oportet, idq; sepius aqua priori effusū, aliaq;
denuo infusilla, donec nihil in eo innatet, ma-
neatq; aqua prorsus a contineri medicaminis qua-
litate immunis. Sic itaq; abluta omnia quæ elui
possunt, expertia mordicationis reddunt. Ac præ-
ter id sanē, oleū etiā candidius reddit: mitius ta-
men id nerberari, q̄ alia, debet, ne uidelicet adeo
ipsi aquæ miscerā, ut p̄gre postea fecerim possit.

CAPVT XVI.

Oleum autem quod immaturū nō fuerit (hoc enim stringit) nec preparatū sale, nec recente, ac
ueluti etiam nū seruens, ad hęc a damnsim loris,
id neq; eposū, neq; infusum, excitabit mordica-
tionem. Quod si guttur ad tussis impetū pro-
cet, nō idcirco mordax dicendū erit. Nam quic-
quid mordax est & acre, ad tussim incitat: nō ta-
men quicquid ad tussim incitat, existit mordax
& acre: cum & pinguius mouere impetū ad tussim
apparant. Sequitur itaq; si quid nō ciat ad
tussim impetum, id laudatq; mordax existere:
non tamen perinde constituit, quicquid ad tussim
impetum moueat, cōtinuū mordax esse, nec
si categoricas, nec si hypotheticas cōficiamus
propositiones: quod scilicet ex duabus ueruerba
libus affirmatiuis, nihil cōclūdi in secunda figu-
ra possit, nec cōclusio ex necessitate sit uerā.

CAPVT XVII.

Natura hominibus sternutandi nim indidit,
ut prædicto ipsis, quæ in naribus infesta mole-
stia sunt, propulsarent: tussim de uerō, ut quæ in
gutturē. Connegit autē hæc affectio duplīter:
aut resiccata exasperatū, quæ in arteria est mē-
brana: aut a delato corpore, inæquali reddita.
Hinc siue panis micula, aut alterius cuiuspiā eduli
lij, nobis inuis in spiritus meatū decedat, tussire
a digimur: seu si bibentibus assatim ipsis po-
tus quospiam eo infusar, similiter ad tussim com-
pellimur. Percolatur tamen per asperam arteriā
perpetuū in pulmonem ipsis potus tam exilis
quospiam, ut proptius ab instrumentis raptum,
perfacile quocunq; distribuatur, nec animal ad
tussim irritet. At ubi uel id ipsum pluculum, uel
aliud quodpiam seu liqui dum, seu solidum cor-
pus, per asperam deſcendit arteriā, iam inde tussire
est necesse, donec a spiritus nehemētia mole-
stia id excitatur. Mordacia itaq; gutturis ex-
asperatione: oleosa oerō & pingui, illita, in qua
litate, & ad tussim impetū faciunt. Spiritus liqui
dem in emēntia quæ dā impingens, efficit inæ-
qualem concussionē in gutture, ad tussimq; ani-
mal prouocat. Cæterū nō eo inficiat, ex oleis ef-
se mordicantis pleriq; qualia tum salia, tum re-
centia uident: atq; hæc quidem nō propria essen-
tia, sed quod omnibus plantarū succis geminū
excrementū in sit, alterū crassius, tenuius alterū.
Quæ ambo cum reperiant etiam in oleo, ad con-
coctionē & discretionē tempus sanē possulant.
Procedente uero tempore, quod crassius quidē
est, nuncupatū amurca, subfidit: qd uerō tenuius
& ueluti aquosius, & ipsum compositū quodā-
modo est, ex acri scilicet essētia, & tenui serosa.

CAPVT XVIII.

Cæterū serosum illud rufi coloris est, a crasso
illo scilicet qualitate plantarū. At oleum ipsum,
tum minimē mordax, tum candidum sua natura
existit. Quapropter ubi tenuis hoc excrementū
secretū fuerit, candidius & dulcius reddit. Sepa-
rant autē ipsum, aut insolantes oleum, cōchistā
atrolentes in altū, aut oasculis in quibus est o-
leum, calidos subſcipientes cineres, aut oliuarum
nucleos, aut frumētū circa ipsa apponētes, aut
deniq; medicamenta in uasa ipsa iniicientes. In
summa, quod aquū est consumunt: reliquū uerō

Oleum empha-
ticū stringit.

Tussim excitau-
it non est ne-
cessario morda-
cia.

Tussim minimē
prouocantia, ef-
fi mordacia nō
possunt.

Sternutatiois
origo.
Tussis origo.
Tussis causa.

Petioles destitui-
tate (super ab-
quod in pulmonē
per asperam
arteriam.

Succis plantarū
omnibus duplex
excrementum in sit.

Olei partes.

Oleū repurgan-
do ratio.

Oleo dulcis uatur
et vitæ.

Fritio ex oleo
vitis.

Fritio ex oleo
quidem a-
qualis, sicam
vitis inaequali.

Oleo fritio
bus accommoda-
tissimum esse.

Experiri rati-
onem dicitur.

Medicamenta
qua experiri vo-
lueris, debent
esse alicuius qua-
litatis experta.

Oleo caliditas
quid sit, sed non
evidenter admo-
dum.

Oleo quibus
sit nervorum fla-
vitas.

Oleo videtur
calorem parum
ex quibus appli-
catur accendere.

reponunt. Tale igitur oleum, si salis expertis, lo-
tunij sit, medicamentorum omnium minimè mor-
dax erit, maxime si lumen etat & mollit, si nec sum-
me frigidum, nec calidum applicetur. Porro cui
iniecitur sal est, nonnulla quoque necessarii morda-
citas inest. Fritio itaque ex oleo, magis quam sic-
ca, lassitudine tollit: emollitque corpora, cohibet
occludensque quicquid est nobis foras effluere est
naturum. haudquaquam digerens & exsiccans.

CAPVT XIX.

Quæ autem ex oleo sit fritio, prorsus æqualis
existit: inæqualis uero quæ sicca. Cutim siquid
per siccam fritione manus coadducit, ac ueluti
duplant, uolenterque ac præter naturam compli-
cant. Deinde ubi non amplius potest ueluti dupli-
catio labentes sequi manus potest, ipsa quidem
recurrat, atque ad continuum reuelitur: manus au-
tem semel ac uno impetu in alteram cutis partem
transseunt, inferiorem transgressæ ipsius dupli-
cationis partem: ac proinde inæqualem, duram &
laboriosam talem fritionem sentimus. Quod si
lucus lubricitatis exactè sit cutis, nec duplicari faci-
le poterit, nec inæqualiter admittere ipsos ma-
nuum decursus. Quare externo aliquo medica-
mento indiget, quod rugas impleat, manibusque
lubricitatem cõciliet: quas ad res oleo nihil aptius
inuenias.

CAPVT XX.

Cum autem liceat in hominibus de ipso oleo
periculum facere, nescio quidem quamam occa-
sione ducti cõplices ueteres, ad diuersa alia uter-
tuntur, ut illius facultates explorent.

CAPVT XXI.

At recta experiri ratio, in primis quid est
est, quæ in corporibus sit temperata: dein ea quæ
in imtemperatis: mox, ut sapienter antea mo-
nuimus, quæ in simplicissimis sit, hoc est, calidis,
frigidis, humidis atque siccis affectibus: distin-
guentibus semper nobis id quod per se sit, ab eo
quod ex accidenti. Curandum enim est, ut olei
de quo experimentum sumus, alienæ qualitatis sit
expers: id quod est in omni medicamento obser-
uandum. Si igitur ita oleum adhibeas, manifestè
comperies, refrigerat ne, an sit calfacere natu-
rum. Atque hæc quidem summa est ratio. At op-
pus ipsum quod perscrutur, experientia cõmon-
strat. Nam qui ardore tenentur, tantum abest ut
à calore liberentur, ut etiam magis & crescant, &
processu temporis calidiores euadant. At argen-
tus ex olei inunctione, perspicua nulla aut no-
xa, aut utilitas conspicitur. Ex quo liquet, calfa-
cere quidem ipsum, non tamen admodum, nec
evidenter, ut resina, pix, & bitumen, quæ uideli-
cet spontè fluunt. Nam quæ sicca sunt, ut eis inun-
gi non possumus, sic nec simplicia, nec spontè na-
ta medicamenta existunt. Ceterum in ardoribus,
si salis sit experta olei, persudandaturque frigidum,
nonnullum sanè solatium adfert. In erysipelas
autem, sicuti in omnibus quæ à pura bile sunt
fluxionibus, quantumuis sit frigidum, uel maxi-
mè lphere est naturum. Quæ uero ex sanguine sunt
misso cum bile, eas fluxiones minus aliquotulo
affligit: uideturque calorem parum eis quibus ap-
plicatur, accendere: quandoquidem modicè ca-
lida, calfacit modico: iterum modicè autem illa,
quæ magno ardore fluitant,

CAPVT XXII.

Igitur medicamenta omnia quæ facultate di-
cuntur calida, caloris sui à nobis accipientia prin-
cipium, partim similiter nos recalcifacit, partim
ualentius. Atque ex his sanè quæ nos æqualiter re-
calcifacit, oleum esse mihi uidetur: ac proinde
nec cõuolens, nec tremores, nec sentium tum
difficile, tum deperditum magnopere aut suauiter,
aut lphere potest, nisi accitius sibi cõparat calor
rem: tunc siquid plurimum proderit. Vnde meritò
ueluti materia quædam ceterorum medicaminum
fuerit. Nam si frigida illi cõmiscas, frigidus effi-
cietur quod multum erit: si calida, calidius. Quip-
pe quod ex media temperie est, utrisque summis
inierit ut. Porro non calfacere oleum hac ratione
quis dixerit, quod caliditatem quam reperit, non
augere, sed cõseruare uidetur.

CAPVT XXIII.

Calfacere itaque nos dicunt, & quæ energia, si-
ue actus, sunt calida, ut ignis: & etià quæ potestate.
Hæc tamen parum alimenta sunt, partim me-
dicamenta, partim regumenta. Sed & calidus actus
est, quod simpliciter calidus est, ut ignis: & quod
per exuperantiam, ut animal: & quod ad sui ge-
neris symmetri cõparatur, & quod ad quiduis
obuius. At quod potestate dicitur, primò quidè
distinguit ab eo, quod ex accidenti est. Deinde
tandem habet significationis differentias, quot
actus calidum. Etenim cum sit ueluti quædam
materia et quod est actus calidum, partim ad ea
quæ absolute calida nuncupantur, partim ad ea
quæ per excellentiam quandam, tum ad quiddam
sui generis, aut speciei demig, & ad obuium quoduis
collatum, propria fuerit materia. Quocirca
cum ea calida quæ ad hominè referuntur expendi-
mus, ut alia omnino omittant, æquum existima-
mus.

CAPVT XXIII.

Accidit autem fortassis oleo, ut tanquam alimentum
nos excalcifaciat, ubi intro in corpus assumitur:
cum probans medicis quibusdam uideatur, si-
cut ex cibis, ita ex oleo fieri corpori appositio-
nem. Accidit etiam illi, ut tanquam medicamen-
tum, sit modicè inter nos calcificiens & refrigerantia:
tum ut ipsum nos ueluti regumentum excalcifaciat.
Nam quemadmodum uestimenta à nobis excalfa-
cta, nos excalcifacere cõsueuerunt, ita & oleum.
Et quemadmodum illa excalcificante corpore cali-
diora minimè euadunt, ita quoque neque oleum. Me-
dix siquidem aeris nos ammentis temperaturæ
similis est tum qui à uestimentis, tum qui ab oleo
proficiscitur calor. Quam obrem tum uestimen-
ta ipsa, tum oleum, calfacere nos non propriè, sed
per abusum dicuntur, quod frigori obstitant.
Quemadmodum si duos quæque temperatos ado-
lescentes, qui contingantur mutuo, sese dixerim
mutuo calfacere, tamen si haudquaquam excalcifacit,
sed duntaxat arcant frigoris ambientes. Quæ enim
similia undequaque corpora sunt, à se mutuo nul-
lam mutationem accipiunt. Respondeo itaque calidior
aeri pyreticis, & piper: moderato autem, oleum
& pinguitudo actum tamen aëres sunt calidi, po-
tentia uero, medicamenta. Si quidem à nobis ac-
cipientia excalcificationis principium, partim nos
recalcifacere sunt nata, partim plus, partim mi-
nus. Oleum igitur ex genere eorum, quæ æque re-
cal-

Medicamenta si-
calitate calida,
quædam non
calcifaciant.

Oleo est ueluti
materia rebus
quæ medicamen-
tum.
Medicamen-
tum, utriusque
summa iniecit.

Calfacere nos
quæ dicuntur.

Calidum sim-
pliciter & ad ali-
um, quæque
obuium accipiunt.

Oleo multum
facere debet
nos calcifacere.

Ueluti uestimenta à
nobis excalfa-
cta, nos recalcifaciant.

Oleo enim uestimen-
ta calidiora.

Oleo et ipse
non propriè nos
calcifaciat, sed
obstitit frigori.

Similia corpora
à se mutuo nul-
lam mutationem
accipiunt.

Medicamenta
quædam nos
calcifaciant.

re calfaciunt nos, existens, duplici ratione ut exal-
facere uideatur euenit, quod nimirum inflat uesti-
menti, aut munimentum illinatur: & quod meatus
infarciat, prohibeatque foras effluere magnam ua-
poris huiusmodi caloris partem. Hac ratione, quos lar-
gius sudare uolumus, non protinus quæ ab initio
ad mouemus olei. Verum eos quidem qui morbo
laborant, ubi sudare inciperint, tum ex calfacito
perfundamus: eos uero qui etiam non laborant, ubi
abundè iam satis sudauerint. Porro sanis quauis
occasione exlauiis, mungi & ante sudore per-
mittimus. Verbi gratia. crudioris inest, aut corpus
laborat plethora, has neque in balneo inungi con-
cedimus.

CAPVT XXV.

Quemadmodum inter calfaciētia & refrigeran-
tia, sic oleum mili inter humectantia nos, & sic-
cantia, medium esse uidetur. Atque humectat qui-
dem aqua: exiccatur uero rum laurini, tum cedri-
num oleum. At ex pers quantitas aliene olei, ta-
lem feruat nostram temperiem, qualem scilicet ac-
cepit, uaporosus omnes expirationes uel maxi-
me prohibens. Quod si plustulū membra oleo
frices, cōparabis asinitū calorem: qua ratione
lassos non parū uiuabis, quod uidelicet in minu-
tus corporis meatus pingue ingreditur, ac sic
que durata sunt, molliat: & quod acrem & subti-
lem humiditatem, quæ larebat sub cute, per halitū
digerat. Nam cum in lassitudine similes quidē
animalis partes ficerentur, spaciola autē uacua, re-
nui, acris, & mordaci humoris impleant, ea certē
corpora remedia indigent, quæ & siccitatē irri-
gens, & humorē acrem discutiant. Cui negotio
aqua per se sufficeret, si inlittere posset corpori-
bus.

Quia uero facili distuit, ob id nimirum illi cō-
modissime olei misceat: maximeque ex utroque frigi-
dio auxiliā ficia quibusque corporibus, cum ip-
sius olei ratione diutius aqua adlitterescat. Qua-
re humectantiū & exiccantiū, sicut calfacientiū
atque refrigerantiū, oleum ueluti materia existit.

Nam si exiccanti cōmisceas, totū effeceris exic-
cans: si in humectanti, & ipsum humectans, ac ple-
runque magis quā antea reddideris: ut in aquæ ex-
plo docuimus. Cum itaque omnibus quæ sibi cō-
misceantur subferuat oleum, eā ratione ueluti
omnium materia existit: nam licet eorū necessariū
propriam actionē retundat, ac minuatur, nō tamē
utilitatē imō est ubi eam quousq; adaugeat. Quip-
pe cōtusa cum oleo aqua, magis auxilio est lassitu-
dini, si quæ esset sola: nō sane quod intendat
umbros, sed quod nō quibus opus est, diutius in-
hæreat.

CAPVT XXVI.

Quod autē, nisi mediam habeat temperiem, id
quod ea quæ primario affectibus auxiliantur ue-
luti deuincit, si penumero ipsorum repugnabit
actionibus, generatim quidem ex ipsa rerum o-
mnium natura: speciatim autem, ex medicamen-
torū historia licet ad discere. Etenim generatim,
quoniam id quod misceatur, si in contrarium re-
trahat, admitti sibi facultatē medicamentū uince-
re interim poterit, & in alteram planē speciem id
quod ex ambobus misceatur, transferre. At spe-
ciatim, sic etiam id ipsum cognoscere. Nam si ex-
calfacientiū resiccatumque medicamentorū cui-
piam aquam miscere uelis, non modò nilul eo-
rum quæ agere nata est, fieri uidebis, sed omni-

no obcuratam esse, perinde ac si admitta nō es-
set. Omnino ergo constat mediam obtinere tem-
peraturam debere, quod utrique extremis tan-
quam materia inferuiet. Quem in ordinem si o-
leum statuas, utique nihil peccaueris.

CAPVT XXVII.

Cum igitur oleum ueluti materia quædam ma-
teria sit medicamentū calfacientiū atque refrigeran-
tium, cōstetque tantum ex oleo & rosæ rosaceum
(quod saletem exactum & simplex est) utique & ip-
sum talis temperatura fuerit, qualis rosarū suc-
cus existit. Quare illos qui adustione tentantur,
experieris ab eo refrigerari, protinusque aliquam
utilitatē percipere: qui uero refrigerati sunt, om-
nes lædi. Non tamen ualida in ipso apparebit re-
frigeratio, sed quæ in primo refrigerantium gra-
du collocari mereatur.

GALENI PERGAMENI
de simplicium medicamentorum fa-
cultatibus lib. III.

CAPVT V.

Corporum unumquodque aut calidum, aut
frigidum, aut humidum, aut siccum, & dicitur
& apparet, interim quidem ex sua na-
tura, hoc est, primario, & per se. Interim autē ad-
uentitia qualitate assumpta, quod est per acci-
dens. Porro eorum quæ propria sua natura cali-
da, aut frigida, aut humida, aut siccā dicunt, quæ-
dam actū siue energia talia existunt, quædam
potentia. Sed & eorum quæ actū dicuntur, aliud
quidem absolute est calidum, frigidū, humidū,
siccum, ueluti elementa: aliud excessu, ut homo,
equus: aliud ad iymmetrum, seu generis sui, seu
speciei, ut leo cum homine cōparatus, homo au-
tem ætate florens cum puero: aliud ad quiduis
obuium, ut Dion ad Theonem. Quin & corpo-
ra quæ potentia talia aut talia dicunt, unūquodque
ut ad id quod est actū relatiū dici necessarium
monuimus: id quidem quod facili accenditur, ad id
quod actū est absolute calidum: hoc uero quod
alia calfacit, ad id quod per exuperantiam.

CAPVT VI.

In eo igitur corpore periculū est sumendum,
ad quod unumquodque tale & est & dicitur: a cer-
teris autē recedendum. Elementa namque triuiue
tractionis, in primam quatuor qualitatē, uide-
licet caliditatis, frigiditatis, humiditatis, & sicci-
tatis cognitione cōsistunt. Porro alimentū ad me-
dicamentum differt, quod hoc quidem alteret in
qualitate, illud autē substantiæ corporis assimilēt.

CAPVT VII.

Verum cum duplices sint in genere alteratio-
nes: alie specifice, quæ proprie sanæ & primariæ
dicuntur alterationes: alie uero quæ contun-
dunt & contrahunt corporis nostri particulas,
quas utique per abusione potius quā iam proprie al-
terationes cognominant. In primo lani genere,
contineri uires medicamentorū censemus. Nec
enim quicquid mutari ex specie in speciem possit ei-
tra excalfactionē, refrigerationem, humectationem
& resiccationē, etiam si cōstringatur, cōrū-
datur, cōuulsetur. Dico autē mutari ex specie in
speciē, ueluti cum ex pane fit sanguis, aut ex hoc

Medium esse de-
bere, quod utriusque
extremis ut
faciatur materia

Rosaceum ex
oleo & rosæ con-
sistit.

Rosarum temperi
ei quæ ualeat suc-
cus rosarū uolūt.

Rosarū in pri-
mo gradu refri-
gerat.

Calidum frigi-
dū humidū, sic-
cum, quæ res
du cuiusque
eorum dicuntur.

Alimentū ad me-
dicamentum quo
differt.

Alterationes
sunt duplices.

Medicamenta
uero sub quæ
continetur
alterationi
sunt.

Oleum corpori
illatum, calorem
& sudorem efflu-
um prohibet.
Oleo rogarū
qui sunt, & qui
uolunt.

Oleum esse me-
dium inter hu-
mectantia & sic-
cantia.
Oleo saltem fer-
uat nostrā tem-
periem, qualem
illam accepit.

Lassitudini quæ
lia requiratur
remedia.

Profectu ex hy-
droleas cur facit
corporibus au-
xiliatur.

Oleum est alio-
rum medicamen-
torum materia.

caro. Itaq; nō ab alio q̄ a calore, frigore, humiditate, siccitateq; specificas alterationes singuli corporis affectus accipiūt. Qua ratione quatuor ex qualitatibus elementaribus, primis & specificis nominantur. Earū igitur quī unumquodq; medicamentū in mixtura pollentē fortiat, inuestigamus.

CAPVT IIII.

Cū autem totius nature respectu bifariam unumquodq; dicatur calidum, frigidum, humidum, atq; siccum, partim absolūtē, ut singula elementorū: partim per exuperantiam, ut homo, equus, & bos: minime profectō nos medici inue stigamus, an in aqua marina humidū simpliciter plus sit quā siccū (id enim clarē cōspicimus) sed an corpus humanū facultate sua æqualiter reficere ualeat. Cuius sanē rei sumemus periculū, si eam admodumque corpori, per fomenta aut emplastra: id quod ex accēdēti, ab eo quod propria medicamentū in proficiscitur, distinguentes.

CAPVT V.

Ceterū quod per exuperantiā dicitur, id philosophi accipiunt dupliciter: aut enim secūdum substantiæ molem, aut secūdum cōplicitatē effectū. Atq; hi quidē calidum uincere in omnibus plantis, pronuntiant, ob incremēta carū & germinationes id iudicantes. Quibus sanē, cū de tota natura scrutent, rectē licet & similia alia dicuntur: medicis autē nō rectē. Si quidem nulla plāta, quod plāta sit, calida dici debet, sed quod hominē calfaciat. Sic enim & salamandram, & ci curam, ad hominē frigida esse dicemus: qua ratione sunt alia omnia etiā diiudicanda. Nam ci cuta nō modō sturnos non refrigerat, & eucat, uti nos, sed alit quoq; ob idiq; nimirū etiā & calfacit. Insunt quippe omnib; rebus amicitie quedam, & qualitatium pugnae. Præterea quod familiare est, prompissime assimilatur: quod uero contrarium, ad internecionē ducit, tum animalia, tum plantas. Ceterū familiaritates illas, a totius substantiæ proprietate exoriantur. Porro cū acetum & rosaceum nos primariō & per se refrigerent, nemo ea calida dixerit.

CAPVT VI.

Quod applicit nobis uidet actū esse calidū, eodem gradu quo nos, aut ex contactu similiter calidū reddidit, id ex media esse temperie, nobiscū collatum: ac per se etiā calidum secūdum exuperantiam, quemadmodum nos. At si quid nō dum adeo calidum est sicut nos, nec tale admodum redditur, id temperie humana frigidius est, quantumcumq; in eo caliditas exuperet: ac proinde admodum, nostrum calorem minuet.

CAPVT VII.

Ea autem est cōmunis alterabilium corporū omniū natura, ut in se agant & partiantur admodum: quodq; minus est calidū, a magis calido calidius reddatur: quod uero magis calidum, a minus calido remutatur. Nam id uel ex ipso tactu clarissime discas. Extremum eadem subinde illi tum calida, tum frigida esse uident: calidiori quidem tacto, frigida: frigidiori uero, calida. Quæ sanē causa est, ut in balneis quidem frigida uideatur nobis urina, foris uero calida: cū tamen semper ipsa reddatur tepida. Similiter dum rigemus frigore, aqua ex puteo profundissimo lau-

stam, calidam iudicamus: quæ eadem nobis in balneo, aut balneum egressis, apparet frigida. Itaq; tactum calidi frigidū dignoscendi normā ponentes, atq; eius dispositiōni cuius iudicium omnes tribuēt, meritō sanē crebro fallimur: ut qui quod laud ex se est frigidum, id frigidū esse dicamus: quod uero calidum ex se nō est, id calidum pronuntiemus. Absolutē autē & urina, & aqua putealis, qualis ad nos optimē temperata, atq; ab aliena qualitate immunes uideatur, talis profectō est, & dici etiā potest.

CAPVT VIII.

Cū igitur nec an absolūtē unumquodq; calidum sit, ut ignis: nec an per exuperantiā, ut sanguis: nec denique an cum symmetrio sui generis aut speciei collatum, considerare nobis propositum sit, sed an ad hominē sit tale uel tale: nec rursum ad hunc, tanq̄ id quod ad aliquid aliud comparatur: sed an admodū ipsi, cum partem quam tegerit, reddat aut calidiorē, aut frigidiorē, aut humidiorē, aut sicciorē: certē in experientia omnis iudicandi & dignoscendi consistit ratio: per quam nimirum docemur, & rosas (exempli gratia) & rosarū succū euidenter refrigerare.

CAPVT IX.

Siue enim in his qui inculpati sanitate fruentur, siue in his qui laborat simplicissimo affectu, oidebunt ribi planē oleū quidem in media temperie existerē: quod uero componit ex ipso rosaceum, ex primo esse ordine refrigerantū. Si quidem rosarum succus frigidioris nature est q̄ oleum: sed nō ita multo, cū tepidam quandam in se caliditatem possideat. Eiusdem cum illo ordinis est, quod ad calorem quidem tepidum attinet, lini permon: ab eo tamen haud minimū tenuitate relinquit. Nam rosarū succus est exquisitē tenuis essentia: prouide itcelerrimē arefcit, odorēq; aliorū unguentorū exoluit. Est & chamæmelum tenuitate quidem, rose per simile: calore uero, ad olei uires magis accedens, homini tum familiares, tum temperatas. Quapropter lassitudini, ut si quid aliud, in primis cōstert, dolorēq; sedat. Præterea tensa remittit & laxas: mediocriter dura emollit, cōstipantiq; rarefacit. Ad hæc febres que citra uisceris inflammationē insistant, cōcoctas discunt ac dissoluit: & potissimū qui ex curis densitate & humoribus biliosis proueniūt: ob idq; Soli a sapientissimis Aegyptiorū est consecrātū. Est autem hypochondrijs gratissimum. Quibus etiā lini semen est gratū: minus tamen q̄ chamæmelū, cū & minus calidum sit, & essentia crassē. Ceterū ad ascensum, augmentaq; inflammationū, chamæmelo rosaceum praefertur, cū hic tepida caliditate cum leui astrictione in digeant. In principio siquidem, quæ refrigerant atq; astringūt: per incremēta uero, tepida, & mediocriter cōstringentia: at in uigore ac statu inflammationū, quæ uicq; tum moderate calfacere, tum laxare possunt, magis cōpernificunt in de-

CAPVT X.

Ceterū quæ medie temperaturæ sunt, & quæ utramque in partem declinant leuiter, interm calfacere uidebuntur, rursusq; refrigerare: interm talia seruare corpora, qualia in principio accepe-

Tactum debet esse ab omni aliena qualitate immutū, si finis sit ratiō iudicatorum.

Medicamentorum facultatem in quā modum eximuntur a morbo.

Rosarū ratiō sit, succū euidenter refrigerare.

Oleum esse medium temperie.

Rosacē esse re primo refrigerat tum ordinē.

Rosarum succū a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli facultatem in quā modum.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli sit a tepida quālibet caliditate paulatim ad uiresque aliorum unguentorum exoluit.

Qualitates specificas a quibus sunt, et cur sic dicantur.

Salamandra est frigida respectu hominis.

Cicuta sturnos alit et calfacit.

Conferunt quædam et dissimulant qualitates, ut si ueneris robur.

Familiaritates ratiō exornantur.

Media temperie praeditum, quomodo cognoscatur.

Alterabilium omnium natura quæ sit.

Urina est apparet nobis frigida in balneo.

Putealis aqua est apparet rursus frigida.

*Vrina videtur
in balneo frigi-
da.*

*Rosaceum refri-
gerat & calfa-
cit diuersa cre-
tura.*

*Reductum ad
temperum non
moderata, sed
citius et quod
equi a medio re-
cedit, praesidia
postulat.*

Locutus.

*Gradus virum
medicamentorum,
quomodo inno-
tuendi sunt.*

*Temperatū no-
dicant quod de-
bit.*

*Rosam esse frigi-
dum in secun-
da essentia.*

*Medicamenta
propinqua om-
nia esse compo-
sita, contrariaq;
in se facilius
fortis.*

acceperunt. Nec mirum sanè, cum aqua tepida, urinay, in balnea quidem frigide, argentibus uerò calide apparent. At rosaceum, oleo quidem minus, succo autem rosarū magia existena calidum, refrigerat sanè exstos, idly iux caliditatis tepore: argentes uerò, paulatim etiam exal facit: qui effectus etiam caloris est tepidi.

CAPVT XI.

Quocirca si aut refrigerantibus medicamen-
tis, aut calfaciētibz rosaceū indideris, sicuti nec
magnopere obfusis, ita nec admodum profue-
ria. Nam caliditas tepida, nec est sufficiētia que
r refrigerata sunt ledere, nec eadem curare potēs.
Siquidem quod curari debet, tanq̃ quod ab im-
moderatione ad symmetriam r educitur, non id
quod probè temperaturam sit postulat, uerum id
quod contrariam habet temperaturam, & inque
recedentē a media. Etenim si quod curari deside-
rat, multo frigidius sit, necessarii oportet quod
ipsum curabit, multo etiam calidius existat: sin
paulo frigidius, paulo etiam quod curabit cali-
dus erit: ac de cetera intemperaturis, pari iudi-
cio. Porro si exquiratur utrum nominū appella-
tione, quod medium in singulis est, id eucratum
sue temperaturū dicemus: quod autē ab huius ex-
cedit modo, si ad calidius quidē, tum plus, tum
minus calidum: sin ad frigidius, plus minusq; fri-
gidum: nec de alijs alia ratione. Quisdo quidem
igitur corpora humana, tum ijs quas ab ortu na-
ta sunt temperaturis, tum ijs quas ab ætate pos-
tea acquirunt, tum ijs que ex uitæ cōsuetudine
adueniunt, plurimū inter se differunt, ab ijsdē
ea medicamentis uarij alterentur necesse est.

CAPVT XII.

Medium ergo horum mihi quēpiam intelli-
gas, qui & natura sit temperatus, & moribus &
consuetudine conuenienti, hanc ipsam eucratia
tueatur. Deinde hōa tres optimæ temperaturæ
scopos concipienda animo, secundum corpus il-
lius, ueluti secundum regulam quandam, uires o-
mnium medicamentorū explore. Quodsi simi-
lem illius temperiei caliditatem accendit, tempe-
ratum uocetur, etiam si uel maximè exalfacere
senem refrigeratū uideatur. Quod uerò calfacit
aut refrigerat corpus eiusmodi, illud quidē cali-
dum, hoc uerò uocetur frigidū. Esto autē ipso-
rum excessus ordo, ad frigidum quidem, primus, cui-
us esse dicam rosaceū: secundus, cuius sit ipsa ro-
sa: post hunc tertius & quartus, quoad sermone
ad frigidissima pertigerimus, nempe cicutā, suc-
cum papaueris, mandragorā, hyoscyamū. Rur-
sum ad calidum, anethum quidem & fernūgræ-
cum, prima: secunda uerò deinceps, tertiay, &
quarta, donec ad exurentia peruenit sit. Ad eun-
dem modum in medicamentis humectantibus
& exiccantibus est inuendum iudicium.

CAPVT XIII.

Verū omnia propinodū medicamenta, si-
cet sensu simplicia appareat, natura tamen cō-
posita sunt, diuersissimay in se facultates possi-
dent, excurrentes, sistentes, in crassam di, extenuan-
di, atque alias id genus uniuersa oppositiones.
Nec mirum id esse debet, cum uni eisdem medi-
camento, uim calfaciendi & refrigerandi esse ap-
parcat, aut exiccandi humectandi. Quæ primū

efficacissimæ uirtutes nisi hoc pacto cōspicere-
tur, haud sanè que ex illis sequunt, similiter cō-
plicatę forent. At si nos ipsi ihu succum mellis mi-
sceamus, quod ex ambobus conficit, astringen-
di simul & abstergeri uim possidet: sicuti & co-
hibendi uentria, atq; laxandi. In lacte autē duas
esse facultates, nempe sistentes uentrem atq; eua-
cuandi, nō item concedimus: tamen si casus qui-
dem secretus, uentri sitat, serum autē resoluat.

CAPVT XIII.

Quidd uerò & brasica duas easq; contrarias
in se facultates obineat, neq; id quidem prom-
ptè cōcedimus. Nam tamen si succum eius planē
aut solum, aut ex melle purgare cernamus, attra-
men quonū quod reliquum est, edere minimè
possumus, astrictorū esse id dissidimus. Quāq;
si bis tēue aut quater elixam, ipsam brasicam
edamus, comperiemus sanè, succum eius qui in
aqua fuit relēctus, purgare ipsam uerò uentrem
astringere. Eadem est ratio in betula, lente, atq; in
ijs que testa pro cute integunt: ac breuiter in om-
nibus ferme illis, quibus sapor aut acris, aut sal-
sua, aut nitrosus inest. Gallorū etiam ueterū iua,
uentrē subducit, tamen si caro eundē sitiree pos-
sit. In uiris autem iquam, sicuti duplex qualitas,
ita gemina quoq; facultas inest: nam & astringit
& mordica: tectrū si intra corpus sumatur, pur-
gat quidem uentrem, uerū non cohibet. Quip-
pe uincitur eius astringendi facultas, ab acris pur-
gatoriay potentia, quemadmodum si ihu suc-
cum scammoniz cōmiscas. Sic enim cum mālū
cydonij carne, aut cum alio quoquam eorū quæ
& astringendi & grata uentriculo sint, non pau-
ca purgantium medicamentorū dum mista exhi-
bentur, gustum quidem fallunt, at effectū solo
quid ualeat cōmonstrant. Persæpe siquidem lin-
gua a materie uicta est copia: at a cōlo, pro facultat-
is robore, uiribus perficitur. Itaq; cum sub-
stantia exigua quidem, sed ualida p̃cedita uiri-
bus, mista alteri subtilit̃e plurimæ, eisdemq; im-
becille, corpus ingreditur, gustū quidem fallit,
attramen effectum, q̃ illa, efficaciorē exhibet. Por-
tō si ab alio quod purgat, ab eo quod est astrin-
gens, eluatur (id quod fieri potest per exactā lo-
tionem) tunc certē aut debilitet, aut planē nihil
purgabit: id quod usu etiam uenit acri squame,
atq; uiole. Iam uerò ipsius quoq; qualitatis me-
dicaminosus sapor, primo statim gustū facultat-
is missionē demonstrat. Nam si unica semper qua-
litas, unicuiq; gustū astringentū medicamentorū
inest, haud sanè inter ipsa, alia eius apta, al-
ia medicaminosa existerent, sed raptim intentio-
ne aut remissione astrictionis differrent. At nō
ita res habet: cū uideamus acri squamā mālū cy-
donio astringentē minus, gustū tamen eo longē
insuauiorē existere: quā gustus abfurdit̃e pro-
ficisci a uehementi astrictione, dicere id quiddē
non possumus. Si itaq; ut astrictio, ita etā astrin-
gens unum perpetuū esset, sanè unum quoque
perenniter eius esset opus. Verū cum præter
astrictionem insuper alias qualitates, neq; pau-
cas, sortitur, semper quiddē omnibus illis agit:
sed euidentius alijs per aliam, nempe uincen-
tem: idly ut ad corpora cui admodum est affe-
ctionem, Astringens igitur hac ratione, non est

*Casus fuit
uentrem.
Serum aluum
laxat.*

*Brasica bis ite-
rat et in succum
uentrē soluit,
ipsam autē sup-
primere.*

*Gallorū ueterū
iua uentrē sub-
ducit, caro autē
cohibet.*

*Alii lora aut nō
hōa parum
purgat.*

*Astringens non
esse contrarium
purganti.
hinc tempore
terre.*

*Sicca alibi ac-
cere, aut ope-
rescere, sola au-
tem, oleum, mel
ex vino, in li-
gum tempore du-
rare.*

*Rosacea faciem
affert de raris.*

*Similitudo fran-
gunt contrarium
non mixtura.*

*Similitudo inter
se ac dissimila-
tione differtur
unde nascitur.*

*Liquorem siccum
duo diuersi par-
tes ac diuersi sa-
porem qualita-
tibus afficit.*

*Lipyrus febri-
lis hepatis feb.*

*Saporis quilibet
affert non res
quod autem par-
tes, vel linguam,
licet non por-
de ab eo porci-
pantur.*

ei quod purgat contrariū: quāquā si quis illa esse
contraria statuat, nihil inde absurdum sequetur.
Et enim in roseo succo, aliud quidem grauissimū
est, amurca & sicca proportionale: aliud leuissi-
mum, & ipsum proportionē respondens sori in
quoq; succo supernatanti: aliud tertium, quale est
quod in multo feruet: ad hęc quartū, ipsum uide-
licet purissimū ac syncrētissimū, cuius hęc tria ex-
crementa existunt. Euenit autē alios quidē suc-
cos aut accēscere, aut corruptos putrescere: sola
uero, oleum, mel & uinū, in longum tempus du-
rare. Quare nec per ebullitionē, nec per secretio-
nem in alijs succis, has excrementorū differētiās
inuenire perspicuē licet: uerū protinus ab initio
coctiōne quadam illis est opus, ut saltem alicu-
ius perdurantis succi matura. Nam sic roseū suc-
cum mellī miscētes, aut totas rosas ei immergen-
tes, reponimus. Cū aut rosas uō astringēs mō-
do, sed enā dulcis atq; amara gustanti appareat,
satis apertē ostendit, se habere illorū succorum
quatuor miscellam. Quia etiā uel ex hoc tantū,
quōd nō extremē astringat, aliorū quoq; saporū
mixturam intelligere in eo possumus. Quippe si
solus sapor austerus illi inest, summum idem fue-
rit: quo mōdo si sola corpori cuiuspiā caliditas
summa inesset, id ignis utiq; foret: at si non sum-
mum, sequat quōd neq; etiā solus. In uniuersum
enim contrarium mixtura, similitudo ipsas
frangunt. CAPVT XV.

Atq; in similitudinē quidem corporibus calor,
frigiditytas, siccitas, & humiditas, particulares dif-
ferentias efficiūt: in dissimilitudinē uero acrimo-
niæ, siccitatis, austeritatis, acerbitates, dulcedi-
nes, amaritudines, salidines, aquositates, & pin-
guitudines. Quare unūquodq; corporū simila-
rium, hoc est, quæ nō ex diuersis substantiis con-
stant, in ipsis paritibus uō multas, sed unā ex his
qualitatē obinet: quod uerō totum est dissimila-
re, complexus: quorū hæc quidem astringunt,
lux laxant, aliz aliam facultatem ostendunt, sic
ut omnes quidem linguæ paritibus diuersis, pro
contactus ratione afficiant: affectio tamen ipsa,
ex eo quod primō affectum est, in totam eam
ēleuerrimē diffundatur. Cuius simile in trāquil-
lis aquis uidere licet. Nam si in duas eius partes
duos conieceris lapides uno eodemq; tempore,
si sanē duos efficiēt circulos, qui mutuō per sese
ferent, cōtrariosq; cernes in quauis ipsis a que
particula motus. Quōd si unum pedem in calidam,
alterum uerō in frigidam simul demittas,
haud dissimile habebis etiam exemplū. Quippe
in totū corpus utriusq; affectionis motus perua-
dit, cōtrarij inuicē sibi occurrunt: id quod etiā
euenire autumo in lipyris, & hepatis letribus,
nisi quōd in illis nō extrinsecus, sed ex ipso cor-
pore caliditatis frigiditatisq; affectus oritur. Si
uerō parē aliquid in portione mellī exquisitē cō-
mixtam, lingue imponas, simul dulce & amarū,
quod ex ambobus mistū fuerit, uidebis: cūm nō
alio tempore et mellis sapore lingua ipsa sentiat, a-
lio autē abstruhsit, sed utriusq; simul. Quemadmo-
dum igitur ab nō lingua afficitur, ita necesse est
quāquā aliarū corporis partū ab eis similitudī
affici, etiā si qualitates ipsas nō sentiat. Neq; enim
in patiēdo, aut uō patiēdo, ab alijs linguæ dis-

ferre est putidū, uerū eō quōd ipsam familiarū
affectū, ob exquisitū sentiēdi facultatē, nihil
latere possit. Ad qd sanē nō nihil ipsius cōducit
raritas, sic enim succi facilius penetrant. Porro si
solano & antheride alicui parti simul applici-
tis, neq; ita densa, dura, tensa, luidiāq; reddatur,
ac si solo usus solano esset: neq; adeo rara, mol-
lis, tepida & rubens, ac si antheride sola usus
fuisset, sed dictorū mediā accipere affectionē
particula conspicitur: consentaneū certē est, ut
utriusq; medicamentū secūdo sumam facultatē
esse operatū, ac promde particulam ipsam eodē
tempore cōtraria simul perpassam fuisse. Igitur
quemadmodū mirū non est, si ad medicamentis
compositis contrarij simul affectus corporibus
infigant, ita nec si in simplicibus: cūm & ipsa sensu
quidem simplicia appareant, natura autē cō-
posita sint. Si quidem quemadmodū nos in his
quæ indies componimus, sic natura in simplici-
bus ipsis, contrarios temperare succos consue-
uit: quorū sanē actiōnes, si pari facultate & por-
tione ipsi in mixtura cōstant, euadent similes: si
dispari autē, diuersæ. At uerō, ut astringit quidē
una res est, astringens, duplex. Aliud quippe
summū exiit, ut alumen & galla: aliud autem
quod astringentiū sit particeps, ut pirum, unum,
& rosa: nam huius minimū est id quod astringit,
quare medela exiit inflammationem.

CAPVT XVI.

Rosaceum uerō utpote cuius natura olei ro-
sæ in medio est in inflammationē augmentis,
hoc est, in illarum medio, optimū est presidium.
At oleum cōmo dum est, ubi inflammationes ma-
ximē uigent. Et enim per initia repellere compri-
mereq; influxus oportet: in uigore autē ita per
halitus digerere, ut morbus abiat: at in incremen-
tis, repellere simul ac digerere. Utriusq; autē ro-
saceum prestat potest. Nam praterq; quōd te-
nuum est partium, leuem quandam astringēti-
onē fortitur, nimirum inter oleum & rosam existens
medium. Quippe medium omne ex contrarijs
mistum exiit, ipsū totis per tota cōtemperatis,
aut per exiguas particulas, sensum effugiētes eo-
rum quibus admoventur. Et enim quæ magno-
pere austeræ acerbisq; sunt, primo itatū conta-
ctu superficiem densantia, humorē ingredi pro-
hibent. At quæ modicē astringunt, ceterum plu-
rimum in se continent effluuium tamen tenuis, non
tepidæ, tantū abest ut præ astringētiō ingredi
alijs corpora admoda prolubeat, ut etiam ab
ea, magis scilicet impellent, iouentur. Quæ au-
tem penitus tenuia calidatq; sunt, magis digerēt
humores ex corporibus quibus admoventur,
quā alios ipsa apponant. At quæ frigida sunt
& effluuiæ crassioris, omnino nullum intro-
ducere humorē queunt. Quæ itaq; humida, tenuia
& modicē astringentia sunt, ea inter omnia lū-
meētantia efficacissimē lūmeētant.

CAPVT XVII.

Ad hæc autem omnia nō mediocriter cōfert
innata nobis caliditas, & intro ad sese attrahens,
& cōmēuendo extenuans. Hinc est quōd frigi-
da deletarij medicamenta, utpote cicuta, papa-
uer, hyoscyami semen, mandragora, & alia id ge-
nus, citius magisq; in calidis naturis uim suam
exerant.

*Lingua cur fici-
sum habet ex
pugilum.*

*Simplicia medi-
camenta affectus
cōtrarij ex quo-
rum non est mirū,
cūm natura cō-
posita sint.*

*Astringens de
pica.*

*Rosaceum quō-
da cōmū ac in-
flammationis.*

*Inflammationem
curatio.*

*Rosæci facu-
tas.*

*Medum omne
ex cōtrarijs mis-
tum exiit.*

*Humiditatemque
pessit attrahens
efficacissimē.*

*Calor innatus
ad quod condici-
at. Frigida & de-
letaria medica-
menta, curatio-
magis in calidis
naturis uim suam
exerant.*

exerant. Nam quum sit impossibile ut talia interficiant, nisi prius cor refrigerent, necessum sanè est, ut interdum comminuta ingrediantur id quod ex sua natura prestat nequeunt, crassa & incepta ad motum quum sint. Quare ascitimus caliditatem requirunt, quæ in minima extenuet, ac ut utri manu ducat in subleues meatus. Itaque si quid ex ablutis, cuticulantur, in maioribus herentia meatibus, in ipsius fluctuantia arerit & uenis, temporis spatio aliquod perueniant. Si quidem qualitates omnes quadantenus in sese agunt. Nam & lapsis ab assiduo stillicidio excantatur: gladiis quæ secundo hebescit. Quando igitur solidæ partes (à quibus perficiuntur actiones) à refrigerantibus medicamentis nondum refrigerint, tandem animans superfit, est necessarium refrigerari autem nequeunt, prius quàm illa subierint proprios harum meatus, id quod sua ex natura non possunt. Deducit quippe succos, ut causa quidem primaria, arteria non attractio: ut secundaria uerò & materialis, ipsorum tenuitas: quæ desitura quum sint, frigidiora & crassiorum partium medicamenta his opus habent, quæ præbeat. Cæterum corpora frigidiiora tractum arteriarum imbecilliorè possident, medicamentorum substantias cōminuere oqueunt proinde medicamenta ipsa constari est necesse, processu temporis tum immortis, tum cōcōque quod solet succos lactuce: qui si integer ad cor peruenierit, non secus ac cicuta perimeret. Hæc igitur & similia, nisi celeriter perimant, nullius tandem effectus redduntur. At quæ aut erosione aut putredine necant, his ut tempore uires acquirant, accidit: quum temporis spacio putrescant omnia, eorum magis, quò fuerit humidior atque calidior locus.

Merito ergo fit, ut quæ frigore suo uocem inferiunt, hæc actionis celeritate ad perniciem proficiat: quippe quæ aliquo spacio exalata, uim per quam agunt, deperdit. At quibus in putredine actio constitit, his tempus actionem adiungit, quoniam & putredine. Nullum autem animal interire potest, nisi cor ab agendi uocere cesset: ac fieri ut cesset non potest, citra maximam intemperiem. Cicuta itaque hominem è medio tollit, tum ob meatuum amplitudinem, caloribus multitudine, tum ob ualidam arteriarum in attractio uim, uim ad cor ipsam perueniens. Sturnos uerò ob causas contrarias haud enecat, ut puta quum & retineatur, & coactetur, ac sese temporis tractu concoquit, præpararij à corde patitur: quemadmodum & in ipsa lactuce accidit, quæ moderate quidem sumptæ, alunt hominem: si uero quospiam expressum earum succum largiter hauriat, non secus proculdubio morietur, quum qui aut cicutam, aut papauer sumperint. Ad eundem quippe modum cicuta hominem quidam celeritate distributionis interficit: storn non autem tarditate ipsa, uitrit. Si autem exiguum quippam sumat, mortem homini haud quaquam inferens id quod annus illa Atheniensis experimèto docuit, quæ ad exigui cicutæ portione suspicata, oculo detrimento à permagna progressa est coacta: adeo cōstat uideri esse adicienda natura.

CAPVT XVIII.

Eorum ergo medicaminum quæ frigore interluminant, nullum genere lrale est, sed flos quæritates quum si exigua portione sumantur, mortem non interant. At in erodentibus, putrefaciuntibus, & cal

ficientibus, haud ita res sese habet. Ad hæc, quemadmodum frigida medicamenta, nisi calore ostendantur ualidum, qui cōminuat atque deducat ipsa, non perimunt: sic si quod cōminuat deductum, multo ualutius fuerit, deinceps prorsus, mutabilit, ac alimento ut sibi sit medicamentum, efficiat.

CAPVT XIX.

Quum igitur medicamenta refrigerantia quadantenus à nobis accipit suam refrigerandi uim, sicuti & calfacientia calida (nequidem quicquam moliri possent, abque corporis patiens auxilio) iure potest dicuntur frigida. Nam or actum non refrigerant, non prorsus ex sese obtinent. Eapropter meconium & cicuta, si cum modico eorum minime generoso uino bibantur, ocyus quidem interimunt. Si quum uerò papaueris succum, quantum in terficere potest, hauserit, ac etiamuam tamen superfit, huius large portio omnium uetus generosumque & calidum auxiliabit. Cæterum quod tenui pellucidumque substantia est, colore uermiculo aut flauo, odore grati, quod quidam multam aquæ misturam postulat, id tum admodum ex calfacere est natum, tum facilius undique per corpus uniuersum deferri. Tale ergo natura uiouum, ætate uetus, molitum atque imperitum, non modo perfrigoratorum omnium, sed eorum etiam qui aut ex oris uentriculi, aut cordis dolore, animi deliquium patiuntur, præstantum remedium existit.

CAPVT XX.

At eorum medicamentorum quæ ex erosione atque putredine interimunt, plerique sanè perinde ut illorum quæ potestate dicuntur calida, actum enī calida existunt: sed idcirco nos fugiunt, quoniam aut ipsi plorimum habemus caloris, aut crassa est ipsorum substantia. In balneo quippe urina oobis oidentur frigida, quemadmodum algenibus hyeme, aqua putrealis, calida: cætera autem frigida. In summa enim, pro suo unumquodque affectu, admota consuevit sentire corpora. Sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici acernum immiseris, luculenter calorem percipies. Sin calidam, nequaquam. At si columbino stercorei accumulato, porissimum columbarum syloestriom, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic mus, sori, chalcitis, ærugo, calx, aliæque id genus innumera, si illis acernuat manum alius inficias, prorsus uidebuntur ex calfacere. Cæterum si solum ex eis unum acciperis, cuius extrema superficies ab ambientis fuerit refrigerata, merito nullum percipies calorem. Quam ob rem fieri etiam potest, ut quæ respectu nostri sunt potestate calida medicamenta, ea secundum alterum animantium genus calida esse actio oideantur.

CAPVT XXI.

Quæ igitur nos contracta per putredinem aut erosionem necant, ea recta quidem ratione delecteria humane nature toto genere existimantur, non ot refrigerantia, quantitate duntaxat. Hæc enim interdum oincuntur, & nutrimentum animali redduntur: potrefaciuntia autem, uel si sumantur portione minima, omnino tamè corruptum, quod uidelicet quæ putredini obnoxia sunt, calore humiditateque putrescant, calidus autem humidusque sit sanguis. Proinde longo etiam post tempore à quo sompta sunt, non ulla interimunt, potissi-

Xx

Qualitates omnes qualitates in se mutuo agunt.

Lapsus ab assiduo stillicidio uatur. Gladiis etiam secundo hebescit.

Quæsi à quibus deducantur per corpus.

Lactuca succus, si integer ad cor peruenierit, non secus ac cicuta perimere.

Delecteria quæ potrefaciunt, quomodo ad uim diffundit quæ sua extinctione frigida sunt, inueniunt nulli animal possunt si cor à mouere agendo cesset.

Cicuta cor minimum sturnos necat.

Lactuca succus liberiter sumptum esse letali.

Verula quædam Atheniensis alba haurit cicuta. Constatuendo est adicienda natura. Necantia frigore, non genere, sed flos quæritates quum ea quæ potrefaciunt aut erodunt interimunt.

Medicamenta calida ex frigida à nobis sumuntur uocem aut flauo sua, ac prorsus potestate dicuntur talia.

Cicuta si cum modico generoso uino bibatur, ocyus perimere.

Uinum uetus, generosumque, calidum, auxiliabit uetus refrigerantibus. Uinum refrigerantibus uis, leuare ad esse debet.

Quæsi pro suo affectu admota consuevit sentire corpora.

Delecteria humane nature quæ sunt.

Potrefaciuntia uel si sumantur portione minima, corruptum animal.

modum quæ crassa terrenasque essentia sunt prædita.

CAPVT XXII.

Erodentia.

Interdū autē ipsa erodentia medicamenta adeo exigua fumuntur, ut excerni cum excrēmentis possint, prius quā in iura corpus afficiant. Interdū etiam qui illa sumpsit, opportunis remedijs usus, asseritur. Nam ubi grauis ubi si noxa illata est, malum ipsum fisti nullis prædictis potest. Cæterum cantharides medicamentis diurencis commodè permiscuntur: sicuti alexipharmacis alia pleræque leralia. Feruntur enim alioqui sponte sua per urinam ad uesicæ cantharides, ac sic rodendo illam exulcerant, nisi ubi copia modica induntur. Ex quibus patet, quæcumque frigiditate intermunt, si exigua fumantur, nutrire corpus possent quæ putrefaciendo, nequaquam, quum naturæ humanæ a ducuntur.

CAPVT XXIII.

Vt igitur in alimentis mistos esse uarios sapores diximus, sic in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod iuuenies facile, si consideres granum cuiusmodi solum hoc à enico differre, quod plurimum habet caliditatis. Porro attractio quæ in ipsis cer-

Medicamentis multas diuersi generis substantias esse unum situm.

Purgantium modum amensurum differuntia.

Purgantia, ubi à natura viscantur, talia esse generis humori, qualem delectantur erant.

Purgantia medicamenta esse familiaria purgandi humores.

Magnæ fere est species simile, ut tam feruor, cuius est puritate simile.

Verumtamen alii esturionis.

Attractioes feruor substantiarum similitudine.

Similitudo differens ab identitate.

Purgantium medicamentorum differuntia.

nitis, à qualitatibus proprietatibus, quæ sunt in substantijs, perficitur. Idcirco purgantium medicamentorum, ubi fortè purgatione frustrantur, quædam præter quibus quod noxam corpori nullā inferunt, etiam alimentum corpori præbent: alia uerò in corruptionē ac uenenum uertuntur. Omnis si quidē medicamentū purgans, uel cum uno sale humorem, qui in nostro corpore sunt, similitudinem habet: non autem perpetuō mista est uis uirosa. Quamobrem nec perpetuō licet nō purget, iniuria afficiet, uerūm & concoctionem admittet, talemque producet humorem, qualē erat natum educere.

CAPVT XXIIII.

Pleræque itaque attractiones sunt qualitatibus familiaritate ac proinde singulæ animalis particulæ familiaritate sibi alimentū attrahūt: ad quam sententiā sequitur, medicamenta purgantia familiaria esse purgandis humoribus quodammodo efficaciora, ualēntiora sicuti magnes ferro, quippe qui ad ferri naturam accedit, reperitur in ferri fodinis, eiq; specie magnopere sit per similes: uerūm fortior est quodammodo, ut attrahere sit aprior, quā trahit. Cnicus etiam (quem carthamum uocant) colore quidē pituitæ similis, calore illam superat, sic ut trahere quā trahit sit promptior. Ad eundem modū granū cniuidum, si quēdo à corpore nostro uincat, uice purgationis alimentū efficitur: ueluti uerūtē semper per cornutib. Verūenim uero quoniam attractiones, substantiarū similitudine sūt, necessum est ut si quod purgat pituita est, id quod trahit sit non pituita, sed pituitosum. Differet siquidem similitudo ab identitate.

CAPVT XXV.

Ad hæc, purgantium medicamentorum quodā iam actū possident idoneam ad attrahendum similitudine: quædā ab animantis illam corpore accipiunt. Præterea in unoquoque medicamentum, per misti similitudo sunt alij succi dissimiles, qui partim quidem medicamentosi sunt, partim minime. Quare ubi purgatiuū haud aliquid uertit, quædam in perniciem, quædam uero alimentū uertant.

CAPVT XXVI.

Cæterum ubi purgans pharmacum usque adeo inualuit, ut ius ualorem ad uentrem pertinentium oculis mordicationem apertionem multam relinquit, assidue irritans, consensuēque corpora, ualorum facultates dissoluat, uacuationes immoderate contingunt: ita, ut si quod pituitum educit medicamentum exhibitum fuerit, prima quidem omniū ipsa euacuetur, deui flaua bilis, mox atra, quæto demig loco sanguis. At si quod flauā bilem detrahat, pituita consequetur: postquam atra bilis, quartus demum reddetur sanguis. Sin atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam eliciet: postquam, flauam deui pituitum, ac omnium ultimū sanguinē, tanquam ex inanimia uasis effluentē, ut quæ summa iam imbecillitas occupet, quæque ad extremam oculorum apertionē perueniat. Ex quibus manifestū est, postremū in immodicis purgatiuibus uacuari humorem qui familiarissimus est: aliorum autem singulos, prout crassi existant, aut tenues.

CAPVT XXVII.

Quum igitur uasculum non amplius in se continere succos possint, & oscula eorum reclusa fuerint, neque irritare medicamentū desinat, nec possit amplius familiare succum attrahere, necessum est reliquos quoque, quo diximus ordine, sequi. Fit autem officiorum apertio, ob medicamenti uolentiam, ob quam uidelicet mordicatio etiam prouenit. Vasorum autem imbecillitas, tum ob ingenitum defatigationem, tum ob intemperatū, quæ immodicas purgationes præcedit.

GALENI PERG. DE SIMP. medicamentorum facultatibus lib. IIII.

Constat igitur uniuersas corporis partes per perniciem ab alteratibus qualitatibus, quemadmodum lingua afficitur: sed passionem sensum non exacte percipere at lingua perfectionem quam habet sensus, postulat earum omnium dignoscere: tamen passionum similitudinem inuenire sit etiam in alijs partibus uniuersis, ac præcipue in exulceratis: quandoquidem cutis duritas densitasque prohibet, quominus foris incidentium facultates intrō in carnem penetrent.

CAPVT I.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictum est, Vltimis frigidus mordax: tametsi cuti prius quam exulceraret, mordax nequaquam esset. Porro quæcumque frigus contingit, eorum & contrahit, & condenset, & contringat substantiam, primumque tenues tum excernantur humiditates, sicuti ex oculis lachryma, ex naribus mucus, necesse est: postea uerō etiam mordax appareat, licet alia ratione, quā in calido. Nec enim erodendo quod continuum est, sed diuellendo, mollem substantiam in artū contrahendo, ac breuiter ipsius partis continuatē per diuisionem soluendo, molestum, ac mordax est frigidū. Cæterū ut ius his protinus contractionis cōdensationis: sic in illis quæ calore suo mordant, dissolutionis & fusoris sensus percipitur. Ad hæc, in refrigerantibus quidem uterque tardior est atque cunctantior mordacitas: in exaltescentibus uerō quæ celerim penetrat.

Vacuationes immoderate quædam ex quomodo accidunt.

Sanguinem uacuat omnium ultimū, quoniam natura familiarissimum.

Vasorum repletio imbecillitasque, unde accidant.

Vltimis frigidus mordax.

Periculum quæ rationis sit morbus.

*Mordicantia
alia sunt frigi-
dae calidalia
frigida.*

trat. Quam ob rem medicaminum mordicantiū,
alia sanē calida facultate, alia necessarij sunt frigi-
da. At quæ moderate calida sunt, quæque tempera-
ta potius quā calida dici debent, ut poculum
argy balneū, dum mediā temperiem sortiunt, no-
bis grata & amica existūt. Funditur enim per ea,
quod in corporibus nostris consistat atque con-
cretum fuerat, unde animantibus uoluptas maxi-
ma oritur. At si quis in eis immoretur diutius, sen-
sim quidē & ipsa molesta euadunt, idij non quod
mordicatione infestent, sed quod substantiam no-
stram soluentia differentia, deliquium animi, ac
tandem mortē inducant. Quæ autem his calidiora
sunt, secant, distrahuntque substantiam: quare ne-
cessario mordacia uidentur, ut rum aqua seruata,
tum ignis. Igitur subiectam materiam cōtrahere
condensare, frigidi semper est proprium: funde-
re autem atque liquere, calidi: utriusque uerō im-
moderatus aucti, communis est mordicatio. Verū
quæ à summa frigiditate, aut caliditate ab-
sunt, minimē eutem mordicant. Plurimum autem
id genus affectiones facit essentie medicamen-
torum uel tenuitas, uel crassitudo. Si quidem frigi-
da quæ tenuium partiu sunt, quum magis in pro-
fundum transeat, uehementius mordicant. Cali-
da uerō quæ crassarum sunt partium, quoniam plus
ulcerant, uehementius idcirco affligunt. Tenuio-
rum ita quæ partium aer est: crassarum terra: me-
dium eorum tener aqua. Sed aer accensus sit flamma
ma: terra autem pruna: ar aqua uehementem sanē
caliditate recipit, sed nec flamma nec pruna,
propter innatam humiditatem, efficitur. Si quidem
flamma & pruna ignis sunt genera: ignis autem
rem omnem, calidus est & siccus: ar aqua sicca ut
sit, fieri nequit. Nullum autem est adeo calidum
pharmacum, ut flamma, aut pruna, aut aqua ser-
uata. Procedit tamen usque ad ultionem ipsa medi-
camentorum caliditas, ut in crassa consistit essen-
tia. Quæ uel subtiliū partium sunt calida, nou-
quam omnino nō mordicant, sed calfaciunt
duntaxat. Est ubi mordicant, non tamen urant.

CAPVT II.

Porro quæ celeriter in tenuia soluantur, tenuiū
dicunt partium: quæ id perperam nequeunt, crassa
rum. Quod ergo ea soluantur, calor animalis, cui
applicantur, est causa: quod in tenues crassæque
partes comminuantur, id à propria natura obri-
nent. Quocirca refrigerantium medicaminum ea
quæ crassarū sunt partium, mordicare nequeunt,
quod extrinsecus curis superficiem penetrare non
ualeant. At quæ tenuium sunt partium, maxime
si inæqualem temperiem sortiantur, ualenter mor-
dicant. Sed suprà demonstratum est, inæquabilia
esse: prope modum omnia: ubi ostenderemus, & in
uino, & in oleo, quatuor reperiri succos diuersos,
in summis uero medicamentis facultatibus
cōtrariis consistere. Enim uero acetum, tamen si in-
genitam uini caliditatem amisit, ex putredine
tamen sibi aliam adeptū est. Quippe uinose uini
partes, dum ipsam in acetum transiit, refrigerant:
atque uin recementum putrescent, ascititiū cali-
ditatē acquirit, neque quæ putrescent omnia: sicut
acetum quiddam ex cōtrariis facultatibus mixtū,
partim refrigerantibus, partim calidis: sicut uino
rum lignorum omnes cineres, qui ex aduersione nō
nullas partes igneas conferunt, quas macerati

postea solent in aquam deponere. Hanc enim a-
quam marinæ & mariæ per omnia corresponden-
tem, uulgo lixiuum appellat. In uniuersum
autem, quod tantum est acidum, quicquid id fue-
rit, planē frigidum est, eolui contra omnes cali-
dos affectus commodissimè poterit, ut emphaticū
succo. Quis quidem quum omnino acidus sit, per
seclē etiam refrigerat, unicuique ardoribus prode-
nt, inimicus affectionibus frigidis, quemadmodum
omnia ex quibus refrigerantia. Ea autē quæ quā ac-
ida sint, habent eam saporem quendā acrem per-
mixtum, qualis planē inest aceto, haud dubiē nō-
nihil caliditatis possident. Verum si frigiditatis as-
trictio coniuncta sit, aliud est frigiditatis genus.
Quippe acidā frigiditas tenuium est partium: at
astringens, crassarum.

CAPVT III.

Non igitur sola ratione per methodos logicas
nos exerceri oportet, sed exercere etiam sensum in
saporibus singulis: quod fiet, si omnia ea sedulo
experiamur lingua, quæ unamquodque qualitate
præ se ferunt manifestissimam. Vt, si acrimoniā
cogitatione complecti uelis, in alio, capis, atque
his similibus, ea sæpe gustando te exercere opor-
tet. Sin astrictiōnem, in galla, rhu, & similibus. Si
amaritudinem, rum in nitro, rum felle. Si quali-
tatem saporis expertem, in aqua immuni ab om-
ni qualitate astringit. Nam hinc exoritur, prom-
ptius ad aliorum obscurorū omnium saporum
cognitionem peruenies.

CAPVT IIII.

Sin autem qualē præbet sensum aqua planē om-
nis qualitate uacua, talem in re aliqua sicca inue-
nias, ea uimur medium constitutionem sortitur,
aut certe ad frigidius paululum inclinabit.
Quod si talis quum sit in caloribus & frigoris diffe-
rentia, insuper consistentiū nata sit siccam, terre-
stris sit, ac citra morsum deficiet, est necesse. Atque
huius generis medicamenta omnia, medici appel-
lant emplastica.

CAPVT V.

Duplex autem est emplasticorum natura: alte-
ra ex ætē terrea & sicca: altera uiscosa quidem om-
nino, sed ex aqua & terra, & plerumque etiam aëre,
commixta, sicut oleum dulce. Hoc siquidem ex
aëre, terra, aqueaque essentia constituitur. At omni al-
bumen, ex istis quodammodo, sed magis terreū est
oleo. Quin & quod lactis est caseolum, emplasti-
cum quoque est: & suillus adeps. Nam tauri, & hirci
pinguedo, acrimoniā & multam, & igne eam
posider: bouis uero, ouis uero adeps acris existit. Por-
ro asinis & gallinae ceti calidior est pinguitudo, &
sicior quā suum: necnō subtiliorum partium,
& minimum terrestris, sicuti & aulium omnium.
Quæcumque ergo pinguedines nondum ullam na-
tæ sunt acrimoniā, emplastica & illinendi por-
ros possident facultatē, amplexu tantō efficaciorē,
quānto sicciores, magisq; terrene fuerint. Huius-
modi enim est ceti elera, quæ ex mellis tum aquo-
siorē, tum minimē mordaci consistit.

CAPVT VI.

Astringentia porro terrena sunt, & crassa corpo-
ris consistentia: qualitate uerō frigida. Acida au-
tem, tenuitate possent corpora, sed perinde ac a-
stringentia refrigerant. Ex enim arborū fructibus,
quorū uobis, ubi maturauerit, dulces apparent,

Xx 2

*Lixiuum
Acida omnia
sunt frigida, quæ
tenuia acida.
Emphaticū facit
ita.*

*Condensare
temperā, frigidi
semper est pro-
prium.
Liquare est pro-
prium calidi.*

*Aër accensus sit
flamma,
Terra accensa
sit pruna.*

*Ipsi genera
sunt flamma et
pruna.
Aqua est sicca
non potest.*

*Tenuium &
crassarum par-
tium quæ esse di-
cantur.*

*Mordicare quæ
ualeant.*

*Medicamenta
omnia si uita-
tibus consistant
contrariis.*

*Acetum ex con-
trariis facultati-
bus constat.*

*Acida frigiditas
tenuium est
partium.
Astringens frigi-
ditas est astringens
est partium.*

*Sensu quo pa-
tis curare de-
beamus.*

*Emplastica me-
dicamenta quæ
dicuntur.*

*Emplasticorum
natura duplex.*

Olei partes.

*Adipis differen-
tia.*

*Ceti elera est
emplastica.*

*Astringentium
natura.
Acidorum natu-
ra.
Fructuum sapor
em.*

nuper enati, acerbis sicily sunt cōstitūta: progres-
su uerō tēporis, humidiores reddunt, acquirūtq;
ad acerbitatē, aciditatē quandamq; exuen-
tes sensim, p' ostēdum perficiuntur ac mature-
scent, dulces euadūt. Sunt qui non in arboribus,
sed posteaquā repōiti aliquandū fuerint, dul-
cedinem indispiciunt. Alij nō interueniente aci-
ditate, paulatim in dulcedinē transeūt. Omnes ta-
men coquantur & maturēscunt calido: quod qui-
dem duplex existit: alterum nempe & propriū, &
cuicq; ingēnitum: alterum externum, a sole uideli-
cet, sed uariū ip' forum conueniens & familiare.
Si igitur quum initio acerbū essent, tempore matu-
rescentes dulcescunt, sequitur ex calore ip'is pro-
uenire dulcedinē: acerbitatē uerō aciditatemq;
ex frigore. Ad huc etiam, initio quidem lignosi
quomodo sint, necnon sicci & acerbī, postea uerō lu-
more adueniente reddantur acidi, palim est, sa-
porem acerbū acido magis terrenum existerē.

Fructuum diffi-
rentia.

Fructus omnes
coquantur, &
maturescunt ca-
lido.

Calidū duplex.

Acerbum saporē
acido magis ter-
renum exigit.

Acerbum saporē
est frigidū.

Acerbum & acidū
saporē dicitur.

Astringens om-
ne exquirit, &
si frigidum.

Dulcium esse
nullū frigidum.
Amara omnia
calida.

Acerbum corpus
exulsi triplici-
ter.

scens, aut humefcēs, aut utranq; simul perpeti-
si. Ergo incalēscat duntaxat, solidam dulcedinem
contrahat, qualis castaneis inest. Sin tantum hu-
mefcat, si quidem ea crassior sit partium, & a-
quea humiditas, austerum euadet: sin uerō aëria,
acefcer. Si pariter humefcat & caliat, humiditate
quidem aquea, in dulcedinem: aërea uerō transi-
bit in pinguitudinem. Ac sane secundum propo-
sitam qualitatē mifuras, uarias fructus mu-
tationes sortiuntur. Ceterum acerbis ad extremā
perseuerat fructus illicis, arbuti, fagi, & corni.
Acerbus simul & dulcis, myrti fructus est, piri agre-
stis, & roboris. Austerus aut & dulcis palmarum
fructus. Pinguis ex citē, rū fructus, rū succos olef.

Acerbitati in
alio qualitate
mutata.

Saporum diffe-
rentia in varijs
fructibus.

CAPVT VIII.

Quicquid ergo fructus oleosi duntaxat sunt, e-
dendo q' sunt, & dulces. Quibus uerō altera scien-
tibus amaror aduenit, q' edi non possunt. Quippe
amarum omne edi nequit: talisq; efficitur a calo-
ris excessu. Verum dulce omne calidū est, nec im-
modicē calorem nostrum exuperat, sed inter limi-
tes se continet fundens, leuigans, molliens.
Quum autem quædam sint quæ una, quædam quæ
duabus in sese qualitatibus & agunt & pariunt,
quædam uerō etiam totis substantijs suis: in horum
certē numero medicamenta non pauca ponunt,
sicuti & nutrimenta uniuerfa: quorū duplex est ge-
nus. Siquidem quædam sunt pinguis, ut ipsa pin-
guis: quædam dulcia, magis minusue, ut om-
nia illa quibus nutrimur.

CAPVT IX.

Est tamen & pingue ipsum, & quicquid nu-
trit, dulce. Nam quum nutritio euacuati repleti
sit: quod euacuatum autem est, familiare & beni-
gnum esset: certē etiam id quod nutrit, familiare,
iucundum, & amicum sit est necessē: proinde cal-
idum modicē, respectū illius quod nutritur. Sed in
hoc uon parua est maioris minorisq; ratio: quan-
doquidem nec ad cibos acedimus exactē secun-
dum naturam affectū. Corpus siquidem eorum
qui cibos appetunt, sit duntaxat inanitum opor-
tet, si absoluti futuri sint familiaris ipsorum qua-
litate cognitores. Nā si prius est calidiores quā
conueniat, aut frigidiore euaserint, non solidum
quæ nutrit, uerū etiam quæ refrigeret aut cal-
faciat, postulatū. Quocirca cibi quoq; illis alijs
aliq' iucundiores uidentur. Nam quum duplex sit
genere iucundum: alterum quod implet id quod
uacuatum est, cuiusmodi est nutrimentum: alte-
rum quod medatur ei quod alteratū est, id quod
medicamentum existit: euenit utriq; cibis, ubi uon
modō uacuatis exhibentur corporibus, sed etiam
qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus
defectant, ut cibi scilicet, & ut medicamēta. Quib-
ohrem nec edulcorum nec medicamentorum una
est animantibus omnibus species: siquidē pro sua
unaqueq; familiari substantia simul & affectione,
tum deficiant, tum uiuant ab utriq;. Sed si hęc sic
habent, id quod in cibis minus erit dulce, minus
quoq; erit calidum: quod dulcius, tantō uimurum
erit calidius, quantō uidelicet dulcius: si u ad im-
modicum recidat calorē, nec eiusmodi dulce erit,
sed iam apparebit amarum.

Fructuum qui
nam sint uel
& qui inuani-
Amara est in-
quoniam.
Dulcis saporē
naturā.

Nutrimenta
duplex genus.

Nutrimentum
omne esse dulce.
Nutritio quid.

Nutrimenta esse
modiciora co-
lida.

Iucundum est
duplex genus.

Dulcedo 2 mo
derata calore
prouenit.

CAPVT X.

Ezenim ut a moderato calore bifariis cuiq; cor-
pori dulcedo prouenit: partim enim sunt proprio
&

Austerus igitur acer, exolutus acerbis est. Quā
autem corpus acerbum, terrum sit atq; frigidū,
tripliciter necessariō exoluitur: nempe aut incale-

CAPVT VII.

& infito calore dulcia, partim uerò asciticio: ad eundem modum amara. Alia uerò sunt, quæ sua præ natura exalciantur: alijs autem id accidit ab acquisitione caloris accessu. Porro dulcia omnia proximè accedunt ad naturam eorum quibus apparetur dulcitas: idque ad proprium calorem, ut melius acquiritur, ut sunt omnia quæ ab igne præparantur. At multum non suo modo, sed etiam asciticio calore dulce esse uidetur. Siquidem haud parum ueluti ardoris ex solari calore uina acinis, tū alijs inest fructibus, à quo id quod illis aqueum ac ueluti semicoctum inest, ad concoctionem ducitur. Nam ex quibuscumque pomis, si succum exprimas, cum protinus non secus atque multum feruere depercheudes: tanto ramen feruoris discrimine, quanta erit unius fructus ab alio in calore diuersitas. Ceterum ubi quod semicoctum erat, transfusum iam fuerit, euasuerit in qui excitabat feruorem calor, iam tum ueluti synceris succorū proprietates cernunt, proprijs uimorū natura agnoscitur. Iam uerò quæ inueterant uina omnia calidiora redduntur: ac primum quidem quandam dulcedinem acrimonijs amittunt: quæ uerò prius inerat illis astruō, austeritasque, tempore ipsam deponunt. Dein rursus acrimonia incrementum, dulcedinem indes abijciunt, paulatimque amarescunt. Unde constat, dulce esse calidius austero, sicuti & dulci amarum. Atqui si uerū est dulcedinem provenire à moderatione caloris, patet astrictionem à frigido uincere perfici.

CAPVT XI.

Uti igitur uinum acerbum, tempore dulcius primum, mox acrius amariusque, ultimò uerò planè amarum naturaliter redditur: ad eundem modum quod ueluti rigorem præter naturam perpessum est, protinus acidius efficitur: ac si prius refrigeretur, accedit penitus. Præterea quod in uindemia ipsa per assiduum pluuiam, aliena humiditate fue rit imbutum, leui occasione accedit. Contrà uerò accidit ite quæ talia quomodo sunt, igni admouentur: nam & protinus, & progressu temporis dulciora redduntur: tandemque si periduerint, alijs similiter amarescunt. Quum itaque omphax sit acida, una uerò dulcis, ac fructibus omnibus maturatio à solari calore proveniat, planum est, imperfectius & frigidius esse quod acidius: perfectius uerò & calidius, quod dulce fuerit. Ceterum diuersis uiribus acetum quæ succus omphacis constant. Nam acetum proprio quidem uini calore, est frigidius: asciticio autem, contractioque putredine, calidius. At omphacis succus calorem non habet, ac proinde nec acrimonijs. Præterea omphacis succo acetum tenuius est. Quamobrem frigiditas quæ ab aceto infigitur, excellit eam quæ procedit à succo omphacis, idque & uehementia, & missione. Nam tametsi succo omphacis ne minima quidem caliditas inest, acetum autem acrimonia quidem exalciat: nec materiam sanis non est, ad superandam ab aciditate provenientem frigiditatem: sed potius ueluti sternens uiam, atque aperiens meatus, illius celeritatem promouet. Caliditas siquidem quæ præcedente aceti acrimonia oritur, protinus à frigore insequētis aciditatis extinguitur, ita ut multo maior ex aceto frigiditas percipiatur. Ad hæc autem, si pari mole acetum mellis permisceas, aceti frigiditas superabit mellis caliditatem

eius magis, quo fuerit maior aceti copia. Quod si multo plus mellis quam aceti indideris, parem calorem atque frigiditatem in ea mistura competes. Si quidem multis numeris acetum plus ab ita quæ moderatè sunt calida, ad frigiditatem recessit, quam meli ad caliditatem. Porro omphacis succus, qui & ipse (ut omnes fructus in primo sui ortu) est acerbus, ad audentia hypochondria longè præstantior est, quam acetum: quod nec uolentiam, nec ferientem, nec mordaci calori iunctam frigiditatem sortitur.

CAPVT XII.

Porro quod uina quædam inualida Vere atqueestate accedunt: quodque uehementis mora, in meridianis locis reperitur, idem etiam patiantur: contrà uerò hyme atque uersus a quilonem desolus, integra & secundum suas uires feruent: nonnulli à calore nasci aciditatem existimant. Se autem hæc falsum esse deprehendunt, ubi uiderint non calida & uetera uina, sed quæ principio sunt frigidiora, sic per calorem accerere.

CAPVT XIII.

Per simile autem quid uinis accidit, quæ natura frigidiora aquosioraque sunt, quale siliis exiguis & imbecillis. Quippe si eas ad feruidum solem exponas, prius obscutur, aut etiam extingui cōspicies. Quod si ualido etiam statu concunat infirmus ac parus flammæ, citius illam extrinxisse quàm uerum. Natura enim infirma, ualidum nec morum, nec calorem sustinet. Ceterū multis in locis fortiora uina ex industria commouet & transportant, nec non soli exponunt, & calfaciunt, ac demique ad meridiem obuertunt cellas, ut citius sic maturecant, & potui idoneas euadant. Nam quod multo tempore alijs, hoc ite quæ sic exalciata sunt, breuissimo accidunt. Quæmadmodum igitur exercititia ualida & sol, calida & robusta corpora, etiam ualidiora efficiunt: proferunt autem, digerant, & refrigerant quæ non sunt eiusmodi: sic uina natura calida, motus ueluti uentilans, sol exalciat, flammæque iuxta ardentem, celerius concoquunt: quæ uerò frigidiora & aquosiora existunt, eorum argumentum omnia id genus imbecillitatē, celeriusque perpeti cogit, quæ alioqui post passura essent: quoniam nimirum res quælibet in propria natura seruet calore proprio: corrumpatur autem immoderate extrinseca, non minus caloris, quam frigiditatis.

CAPVT XIII.

In uniuersum autem aciditas nascitur calore quidē mutante, non aut uincit siue alimentum, siue medicamentum: quæmadmodum uidere est in acidis ructibus, qui à semicoctis cibis oriuntur. Quod autem opus sit calore alterante, argumentum sunt lac, & pisinæ succus, quæ tempore p̄tius citius accerunt quam hyme. Quum enim saporis acidi sit essentia simul tenuis & frigida, quæmadmodum constitutio borealis, nasci certe sine calore nō possunt, sicuti nec ille ipse aer: ac proinde licet frigidi sint omnes saporis acidi, nullū tamen eorū quæ extremè refrigerando enecant, acidum est. Exploranda porro acidi saporis natura est in oxalide & oxylapatho, ut in quibus reperitur maxime syncerus & simplex. Etenim quod propriè in saporibus appellatur acidū, à sola lingua percipi potest, sicuti & acce: ceterum quod utrique est commune, nempe mordacitas, etiam à tactu sensu

Acetum magis refrigerat quàm mel calfaciat.

Fructus uicinos in primo sui ortu esse acerbos.

Vinum quod acceruit.

Flammulas extinguat a feruido sole.

Infirma natura ualidum neque mouet, neque calorem sustinet.

Vina calida à quibus concoquantur celerius.

Calore proprio feruentur saporis a corruptione contrariis.

Aciditas uideatur oritur.

Acidi saporis sunt essentia simul tenuis & frigida.

Acidus sapor syncerus in oxalide et oxylapatho reperitur.

Generaciones
omnium corpo-
rum ex quatuor
elementis consti-
tuitur.

ritur. Porro ex quatuor elementis impari mistura
cōstituitur, particulatim omnium corporum cō-
stant generationes. Ex ea autem imparitate per-
ficiuntur proprietates corporum particularium.
Quippe ex elementorum inæquali mistura, plan-
tarum: ex plana autem, animalium proprietates
oriuntur. Ac transeunt sanè quædam protinus in
se mutuo: nonnulla medianibus alijs: ueluti ter-
ra in triticum, hordeum, & alia id genus: rursum
horum singula in carnem humanam: quum ta-
men ipsa terra caro ut fieri sit impossibile, transi-
lenti eam que in medio est mutationem. At eor-
um quæ in sese mutuo transeunt, quædam cele-
rem, quædam diuturnâ alteratione obnitiunt. Ve-
ridem quæ maxime sunt inter se similia, celerè: quæ
dissimiliora, tardiorè. Lingua igitur exactissimò
sensu prædita, omnes qualitates discernit, nec
non familiaria & similia, ab ijs quæ sunt contra-
ria discernit. Cuius usus gratia in hanc solum par-
ticulam complures nerui inferuntur: quò in alia-
rum singulas inferatur ut unus tantum, aural-
ter, nec ijs magnitudine insignis. Quum igitur
quædam naturæ nostræ magis sint familiaria, quædam
minus: atque hæc quidè temperamento huic, illa autè
illis: necessariò plures qualitates ipsius gustus exi-
stunt. Cæterum omnium quæ nutritio cōmunis
dulcedo est: quandoquidem quicquid nutrit, ne-
cessariò plus aut minus fit dulce oportet. Quæ ue-
ro non nutriunt, ea aut non dulcia, aut falsa esse,
est dicendum. At uerò id quod cuius rerum fami-
liare est, unum est nunc & natura eius est una: quæ
autem aliena, complura, partim plus, partim mi-
nus à substantia eius dissidentia. Porro quæ dul-
cia simul & acerbata sunt, ea erasioris essentia sunt,
& temperaturæ frigidæ. Quæ acida simul & dul-
cia, tenuiora sunt quam acerbata, refrigerant tamen
& ipsa. At amara, calida tunc sunt acris his calidiora.
Nutriunt ergo hæc omnia, si iunctam habeant
dulcedinem. Per se autem nullum ditorum nut-
rit, quorum saporum misiones minime quidem
sunt subiectis in alteratione constitunt. Nam ijs
quæ à natura mutantur, sensum fiunt alterationes.
Sicuti igitur quod est summe dulce, aptum esse
est: quod uerò exquirat amarum, ineptum esse: ita
quæ in medio sunt eorum, nutriunt quidem, ue-
rum minus quam dulce. Eadè ratio est in cæteris
qualitatibus: siquidem præter dulcem, nulla nu-
trire potest. At elementa multò sanè etiam minus
nutriunt, nullamq; gustui familiaritatem offerunt.

CAPVT XV.

Elementa nec
uenerunt, nec uol-
unt gustus qua-
litatem offerre.

Condimentorū
usus.

Sed quemadmodum edulia quæ nutritorū
naturæ quamissimilia sunt, ea & dulcedinè præ-
se ferunt, nec ullam præparationem requirunt: sic
quæ temperatam naturam remouent, alia
condimentis, alia coctione, alia utroq; indigent.
Etenim condimenta, quum ex se edendo nō sint,
suauitatem tamen ijs quæ per ipsa præparantur,
conciliant, quò illa reducant ad medium. Appa-
ret etiam natura calidi, quibus admoda fuerit, ea
celeriter alterare, atq; in aliam mutare speciem. Quæ-
dam tamen suauiora, quædam insuauiora igni ap-
plicata redduntur: sicuti & quædam longo tem-
pore, quædam minime ut coquant, indigent. Ere-
nim quæ nutritorū corporum temperatu-
ria similia sunt, ea uel citra coctionem, aut præpa-
rationem, iam dulcia apparent. Quæ uerò dissi-

milia existūt, omnia insuauia sunt, antequam præ-
parentur. Atque ea quidè quæ nimis calida sunt, fri-
gido corrigi debent: quæ uerò impenitè frigida, ca-
lidorum mistura oblationum, & igni. Ad eundè
modum humiditate, quæ terrea sunt & sicca: sicci-
tare, quæ humidiora sunt quam expediat. Maxi-
mam eorum quæ dicta sunt, faciet fidem, quæ in
ore sit transmutatio. Nam qui pluvius sustinuer-
unt ieiuniū, ijs salua falsa redditur: quæ uerò plu-
rimū, amara. Sic etiā uniuersum corpus biliosum
redditur. Est autem ipsa flaua bilis amara: atra uero
tam, acida: sanguis qui secundum naturam est, dul-
cissimus. At pituita linguam contingens, nunc
dulcis, nunc acida, nunc falsa uidetur.

CAPVT XVI.

Nihil igitur mirum, nec cur rerum omnium dul-
cissimū mel, succum generet & amarissimū: nec cur
id maxime ætate florentibus & calidis natura, &
febrentibus accidat. Nam ut foris quum pluvium
igni admouetur amarū efficitur, ad eundem
modum in animalium corporibus, ubi sincerū
ualidumq; naturæ calorem fuerit, biliosum suc-
cum procreat. At in temperatis & affectibus, fri-
gidioribus, facile in moderatum sanguinem uer-
tuntur. Nec uerò ab alio tantū calore, sed à suo
etiam proprio, mel amarū temporis spacio reddit.
Porro lac, etiam si gustu sit dulce, ex se tamen nun-
quam amarū efficitur. Vincitur enim in eo calidi-
tas à frigiditate, ac proinde accescit repostitū. Con-
stat autem ex tribus substantijs, qualitate diuersis:
prima quidem crassa, ex qua caseus conficitur: se-
cunda pingui, ex qua butyrum: tertia aërea, quæ
nominamus serum. Ex quibus pingui quidem,
maximè temperata est: crassa uerò, paululū ab ea
declinat: excrementum autem illud serosum, fri-
gidum est & humidum. Si igitur gustari lac pos-
set, ubi in uentre & per uenas concoctum esset, ipso
melle dulcius inueniretur. Nam quod foris &
nec mel obnitiunt, id dum coquitur lac accipit. Ex
quum admodum ingens calor in animante exi-
terit, tantam acquirit lac dulcedinem, quam
deperdit mel. Rectè itaque ratione euenit. Etenim
quod summe dulce est, ac proinde nihil apponi
ad eius dulcedinem potest, id ut in cōsequenter
uerri pergat qualiter est necesse. At cui quid
deest, id per concoctionem acquirit. Verum lac
ubi cruditer in uentre perperit, in frigidiori
quidè accescit. In calidiorè nidorosum amarūq; effi-
cit: nunquid autem inter coquendum mel acidita-
tem contrahit. Porro utraq; tum quod acidū est,
tum quod amarum, linguam mordicant. Cæte-
rum mordacitas ipsa, à tactu propriè, non à gu-
stu sentitur: tribusq; istis saporibus, acido, amaro,
& acris, est mordacitas communis: uerum acido
quidem, ut frigido simul atq; subtili: amaro uerò
& acris, ut calidi.

CAPVT XVII.

Quòd sapor acer sit calidus, non est cur in de-
monstrando sim anxius: quidquidem in nemo
addubitat: & euidentia sensus, demonstratiois fi-
dem præterit. Porro quæ ex acerbis idonea sunt
esset, dulcem quandam, esse obcuram, necessariò
habent qualitatē admixtam. Proinde multis ipso-
rū pro oblatione utrimq; multis uerò ut condimen-
tis tantum: at ut cibo, ipso omni nullo, idē
ob uirium uoluntatis. Eorum autem quæ non
eduntur,

Alimenta inter-
perata quomodo
conuertenda.

Humorem qui
in corpore sunt
saporem.

Mel quidem in
balne uertatur.

Mel pluvium
igne adcoctum,
amarum est.

Mel temporis
spacio amare
fit.

Lac etiam in
amarum efficitur.

Lac ex tribus
substantijs con-
stat.

Lac incidit in
ventriculo, ingi-
tum calorem, tan-
tum dulcedini
contrahit, quā-
tū amare mel.

Lac quomodo
in alium quæ a-
litem mutetur.

Mordacitas aci-
di, amari, & ac-
ris saporis est cō-
mune.

Acer sapor est
calidus.

Acria saporis
necessario ha-
bent admixtam
dulcedinem.

Acritum meli-
centium diff-
ferentia.

eduntur, alia morifera sunt, alia simpliciter medi-
camenta: omnia tamen cuncti nostre imposita, ce-
lester ulcus molitur. Sunt & quæ ne gustare
quidem audeas, cuiusmodi sunt cantharis, thia-
pi, & ea quæ ex oratione aut putrefactione inter-
munt. Multa uero etiam ipso statim odore pugnan-
tiam cum homine indicat: ueluti & licet ipsa quæ
nunc diximus, & ex summe & refrigerantibus, cicu-
tæ, papaueris, mandragoræ, lycopestis, & hypo-
scymis succus. Terminus autem sine finis saporis

Saporum furo-
ris, qualis sit
aut tunc

Ameri saporis
facultas.

Amera quibus
morbus conue-
niant.

Staphis agria
coliquis cau-
em.

amari, etiam abstrigere: acris uero, urere: at dulcis,
nutrire: ubi in quibus natura absolutio fuerit,
hoc est, minime alienis qualitatibus offuscatur.
Porro quod in ulceribus nati sunt præstare ama-
ri saporis, id ipsum assumptum in corpus efficiunt.
Abstergant quippe & expurgant, quæque in uenis
est crassitiam incidunt. Quamobrem mefens mo-
nent, educendos ex pectore & pulmone puri au-
xiliantur: comitantesque etiam comperunt morbo, si
modò naturam deleterius non habent. His tamen
qui sanguinem expuunt, sunt noxi. Aristolochia
autem, iris, & panax, adeo amara sunt, ut proximi
ad saporem acrem pertingant: ob idque nec ab-
stergant tantum, sed etiam exardant & mordicent.
Staphis agria enim, nihil ab ipsa amaritudine win-
citur, effugiam adeo & acris & calida, ut non mo-
dò fordem ulceribus auferat, sed ipsam etiam car-
nem colliquet.

CAPUT. XXVII.

Acritum saporis
facultas.

Igitur saporis acres, primum exacte esse cali-
dos dicimus: dein exedres, urentes, crustam mo-
lientes, & colligantes, si uel ipsi cuti imponan-
tur. Nam intra corpus assumpti, si quidem tota
substantia animanti aduersentur, ipsum putrefa-
centes corumpunt: sin uero caloris immoderata
duntaxat, si crassie sint essentia atque terrene,
interna exulcerant: sine tenuis, urinant atque sado-
res promouet, in summam incidendi & digerendi
in halitū obnunt faculat. Ex quo genere qui-
dam tum exspuitionibus ex thorace, tum mensi-
moribus auxiliantur. Nec uero sola uehementi ca-
liditate ab amaris acres saporis differit: sed quod
amari omnes non modò calidam habent facul-
tatem, sed etiam siccam & fuliginis asinilem: nimi-
rum a dulcibus excafcatis & exiccatibus suis susci-
pientes generationes: acres autem, qui cum ama-
ri non sunt, admistam nullam humiditatem fortian-
tur: quo fit, ut eiusmodi corporum a nobis non
pauca essentent. Cæterum astringentibus medica-
mentis non parum tenuiora sunt medicamenta
amara: acribus uero, crassiora. Quare nec facile
crassos uicidiosis humores pertranseunt, ueluti ea
que tenuiori essentia sunt prædita: nec ad inciden-
dam inepta sunt, perinde ut crassiora. In medio
siquidem sint utriusque excessus oportet, quæ incisu-
ta sunt. At uero ferro lapidit ignito, ea quæ per
erosionem interitum medicamenta similia sunt:
quæ a corporis nimis calore huc perducuntur:
ueluti chalcitis, misy, fori, arsenicū, hydragryos,
lichargyros, & alia innumera. Crassarum enim
sunt partium id genus omnia, & potestate calida:
proinde temporis spacio accensæ, per eam quæ
ab animante proficiuntur mutatione, non aliter
quàm lapidis feruunt ignitum, uentrem tum exul-
cerant, tum exurunt: quò scilicet in corpus distri-
bui præ grauitate nō possint. His tamen tenuiora

Acres saporis
quomodo ab a-
maris differat.

Incidentia qua-
lia esse debent.
Erosentia me-
dicamenta fer-
ro esse ignito si-
milis.
Erosentis spo-
ries varia.

sunt, calx, cantharis, lepus marinus: necnō aristo-
lochia, & iris: quæ quidem hæc ultima duo, & ma-
gis sunt illis acris, minimeque deleteria existunt.
Cantharis autem modicè sumpta, quibusque opor-
teret admista, non modò nihil offendet uicem, sed
renes etiam expurgat.

Cantharis cum
modò exhibita,
expurgat renes.

CAPUT. XXIX.

Quod itaq; amarus sapor siccis temperie cor-
poribus infit, hinc colligere est, quod & minime
omnium amara putrefacta, minimeque tum ur-
mes, tum animalcula illa, quæ in radicibus, her-
bisque & fructibus putrefactibus oriri solent, pro-
ducant. Maxime namque uidemus in humidis nasci
corporibus uermes ac putrilaginē. Quamobrem
quæ exacte amara sunt, animantibus propmo-
dum uniuersis sunt elui inepta: quum nimirū ani-
mal omne sit humidum. Porro abfinthium non
solum amarū est, sed astringit: marina uero aqua,
salis ponus est, quàm amara. At aqua quæ est in

Amara mini-
mè omnium po-
trifera.

Amara cum ani-
malibus uni-
uersis sint elui
inepta.

Animal omne
est humidum:
Maris uermis
aqua confusa
dis.

lacu Syriæ Palæstinæ, quem alij uocant mare mor-
tuum, alij stagnum bituminosum, alij denique So-
domenum, gustantibus non salis modò, sed ama-
ra uidetur: estque adeo grauis & corpulenta, respec-
tu aliarum, ut ne si coneris quidem insilens, in
profundum deserti possit. Inest enim ei salis sub-
stantia admodum grauis & terræ: ac proinde tan-
tò est aqua quæ in eo lacu est, marina grauior,
quantò marina fluuiali. Poteris autem ipse aquam
marinam efficere, colligato sale in aqua fluuiali:

cognoscere simul quantò grauior reddatur: quo
eiusmodi, quàm sit dulcis. Quin & modum
tam inueniunt moderatū ad salindū efficien-
dū saluginē, si in ea ouum natat uideatur. Quod
si decoquere saluginem ipsam uelis, protinus a-
marior reddetur. Nam quicquid salium plucis-
sum excafcetis, amarum euadet. Ergo in eo Sy-
riæ lacu, quod nimirum aqua quæ in eo est ama-
ricet, nullum neque animal, neque planta inesse con-
spicitur. Imò quum duo in eum longè maximi flu-
uū confluant, piscium copia scaterent, præcipue
qui prope Ierichiontem fluit, quem Iordanem ap-
pellant, nullus omnino piscium fluuii omnia ostia
excedit: & si capros quis in lacum iniiciat, celesti-
ter eos mori conspiciat: adeo est omnibus tum ho-

Saluginē cum
esse ad salin-
dum optima:
cui ouum natat
uideatur.

Salis amara-
reus amplius,
excafcolla.

Maris uermis,
cui nec plantæ
nec animal rle-
lem aliat.

Amara effi-
hantibus atque
planis aduer-
sa.

Salis uicis
et
differencia.

minibus, tum plantis aduersum, quod amarum
existit. Omni autem salis obscura quædam astrin-
gendi uis inest, quæ eas quæ conduntur carnes
constringit ac densat, possimum ubi durus, &
minime fragilis fuerit. Talis est exactissimum
quidem solis serē omnia: minus autem illo, mari-
nus: tum qui multis in locis aquis leuiter salis a-
rescentibus prouenit, tertium locum obtinuit, ab-
stergere maxime quum astringere contrahereque po-
tens, proximas huius Sodomitici habet, æ-
que atque marinus durus.

CAPUT. XXX.

Propinquas est sapor salis amaro, quum ter-
reni sit ambo, & calidum obscurum tamen diuer-
sitate dissident: quod uidelicet amarus a calore a-
rido magis sit extenuatus, & elaboratus. Sic in ge-
nere salis, qui diuor, densior, atque terrefior est,
qualis serē est uniuersis fossilibus, minus existit cali-
dus, subtilium minus partium: qui uero rumpi fa-
cilis, laxusque, tenuior simul atque calidior est in quo
genere & subamarus cõsistit, median naturæ in-
ter saltem durum & aphronitru obnunt. At uero

Salis & amari
saporis dissim-
ilitudo.

Salis genera.

tanquam unumquodque eorum maius iam sit, quam pro capto hominibus plebi, ac sciens illi requiratur uenerabiliorem, quam Medicinam appellat, sicuti & illius professorem. Medicū. Atque luculenti & ipsi procedunt, ut sciatur ulcera ea ubi impleri carne, sordidum purgari debere, aquabile caritate induci non tamen norunt, quid carne impleat, quid purget, quid cicatrice inducat, sed ea iuvenire, una uis opus est medicis. Ceterum qui ferē numerari nequeant omnes particularium uires medicamentorum, si secundo dum singula quae ab eis perficiuntur, dum huic aut illi morbo auxiliatur, imponam uia ipsa debetis nominis: multo sanē precarius uide tuc, missa omni prolixitate, cōmoda species uis cōpositae definire ipsorum facultates compendiosisime, sub quibus ceteris omnes quae dici possunt, cōprehenduntur. Ut si duxerimus, non parum mouendi, aut doloris sedandi in triticis: farinae eata plasmare (exempli gratia) facultati in eis, sed modicetum humidum, tum calidum.

CAPVT II.

Quae in cōmentario hoc discutienda ueniunt, haec quae in alijs exposita sunt, magis ad medendi rationem pertinent. Igitur ab emollientibus & pus mouentibus orsi, dicamus utraque calida & humida existere: ceterum haec quidem, ceu similitum corpori in pus mouendo calorem producere, absque ulla existens in eo humiditatis aut consumptione, aut adiectione: illa uero, ceu maiorem quam pro natura accendenda, nonnullis humiditatis contrahentia. Et autē suppuratio idem quod in pus motio.

CAPVT III.

Sed nec de emollientibus medicamentis, nec de ipsa emollientione, simpliciter loqui licet: quandoquidē nec de corpore duro, uel molli. Siquidē partem absolutē durā dicitur, ut terra: partim per excessum, ut unguita: partim ad symmetriam sui generis uel speciei, ut elephas nimirum ad Herculem: partim ad quiduis obitum, ut Diogenes ad Aristotelem: ac de molli pari iudicio. Omnis tamen significatis ceteris, de mollibus durisq., ut ad eam hominibus temperatissimi, contempletur: quā sanē regulam & mensuram statuimus, omnium quae ita dicuntur. In idem autem recidit, si quod per excessum ad totam substantiā dicitur, sicuturum molle est appellatur: quandoquidē medium quoddam est ratiōis nostrae, ut & Aristoteli uisum est, & Plato quoque sensisse uidetur, ubi ait: Dura quidē, quibus caro nostra cedit: mollia uero, quae cedunt carni. Quod uero in comparatione ad quiduis obitū durum ac molle est, id in eo quod magis minusq. cedat, iudicari uidetur. Hoc cō corporum praeter naturam induratur ad statum naturalem cedit, emollior est.

CAPVT IIII.

Verum quā uariē quidq. efficiatur duritia, nempe aut succescens, aut concrescens, aut nimia repletionē, sic ut uelementer tenditur, aut demig aliquo conuagatione: sequitur ut & propria fualy cuius emolliendi sit ratio. Ceterum quid in se cedit, molle est, si quidem corpus id simplex fuerit. Nam quod ex pluribus constitat, ac se se inuicem contingentibus, ut tritici acerrua: aut inuicem implicata, ut lana, simul & cedere potest, nec rari esse molle. Contrā, in his quae summē plena

sunt, ut utres, neutrum latius in se cedit: nec tamen quod continetur est durū, sicuti neq. id quod continet, quā inters durius, est sit sensus effectum. Ac talia sanē non dura, sed reuicentia appellamur. Ut autē non est una induratum natura, ita neq. una medela. Nam quod a siccitate induratur, est, humectari postulat: quod a cōgelatione, ex caliditate a repletionē, euacuari: quod a siccitate simul cōcretionē, humectari simul & in calefacte, per ea scilicet quae rariō sunt calidiora & humidiora, quāto ita infirmitas fuerit frigidiore & sicciora quod a cōgelatione simul & repletionē, pariter & calidiora & uacuaria. Siccatur porro corpora citra cōgelationem, tum in ualidia exet cistis, tum in sole fuerunt, tum in ingenti inedia, tum in ardenti febris, & medicamentis quae ita siccant, ut nō refrigerent. Congelantur a uel emenn duntaxat frigore: sicuti & impletur a largi rariō humoris affluxu. At siccatur simul & congelatur, cōsistentibus quae simul cōuenire possunt causis: ut si quia supra modum laborat in frigore. Sic quoque cepitur simul & cōgelantur ab influxu frigido ac patitis refrigeratione. Frigora rursus causa triplex est: una, a fortia incidentibus: altera est propria particulae patientia: tertius: terra ab influente in ipsam humore prouenit. Ab emollientia pharmaca peculiariter congruunt ista, quae cōcretionē inducunt, magisq. si in eis collecta sit humor praeter naturā, ueluti in scirrhis. Nam si a siccitate induruerint, humectanda, non emollienda sunt. Similiter quae sunt impleta, nō mollior, sed euacuari postulant: idq. aut refrigerantibus, aut calfacientibus, aut resiccantibus. Vacuant siquidem frigida repellendo, similiter cum calore exprimendo uia poria plurimū ex calfacientia autem, humorē contentum discutiendo in uapore: quae uero propria sicca appellantur, in halitu digerendo: idq. aut euibendo humores, aut totam alterando partem illam. Porro oleum & aqua calida humectat simul & calfaciunt, idq. multo magis, in unū cōsuntia, quā si singula per se adhibeantur. Idem efficit edulior qualitas, si similiter habeat. Quae quidē ob id fami caninae auxiliatur, quoddam affectus in sit frigiditas siccitati coniuncta. Ceterū cataplasma ex farina tritica in temperaria naturis pus mouena, nec naturalē partium humiditatem minuit, nec quicquid illam adauget: sicuti nec calorem intendere potest, nec herberat, sed tantum illius substantiam augere. Id igitur genus medicamentis humidum & calida dicimus, ceu similem habentia nobis temperiem, quae calida existit & humida.

CAPVT V.

Medicamenta igitur quae pus mouent, substantiam similituram particulari secundum naturam se habentium, rariō potius quā aliter est sunt natura, quā nimirum ea similem temperaturam obtineant: humiditatem autem ipsam quae in uacualliteret, atque deo etiam cōtensam carnem immuatur. Etenim quum tres in animalium corpore fiant alterationes, una planē secundum naturam est, quae cibi in cremore nutritionis aptum ueruntur: altera contraria huic, praeter naturā, quae compuit scilicet omnia: tertia ex utraq. mixta, & media est, partim quidē cum prima illa cōmunicans, partim autē cum hac secunda, quā praeter naturā dicimus. Siquidem alterationis secundū naturā, duo hic insunt,

Reuicentia quae induratum uia rariō medelam rariōis.

Frigoris causa triplex.

Emollientia quae humores mouent.

Vacuacionum modi duo.

Famici caninae quae sit affectus.

Cataplasma ex farina tritica factum.

Pus mouentia, quae sunt naturae, quae sunt naturae, quae sunt naturae.

Alteratio in animalibus triplicis.

Alterationis naturalis, praeter naturam, ex modo, quae sunt naturae.

Ubi autem co-
puit quodq.
progradiatur.

Medicamentorum uires
particulares
numeri non possunt.

Pus mouentia
ab emollientibus
quomodo differunt.

Suppuratio
quid.

Catem hominibus
temperatissimi
esse regulam
seu mensuram
quoniam omnia
dyscriminet.

Taliter homi-
ni uisum est
dura esse omnia
rariōis.

Mollitudo quid.

Durum quibus
modo probatur
aliquid.

Mollitudo ratio
non pluri.

Caliditas omnia
uires esse molles.

phanino, ueteri, aut scirryono. Quum autem cera per se minus sit calida, quàm ut tale mouere possit, solis feruentibus phlegmonis a praeparata est, ex calidiorum oleorum quopiam liquata. Igitur quæ pua mouent, naturâ modice excalescentem & humectantem fortificant. Cæterum medicamentis puri mouendo idoneis, facultate quidem est tale ubi uerò corpori nostro est admodum, sit actus tale, siue energiam. Ergo scirrhus uocant tumorem per se naturam, doloris uacuum, sed durum intermedium sensus experit. Oritur scirrhus ex humore crasso & frigido, quales sunt duo duntaxat: bilis uidelicet atra, & super exsiccata pituita. Proinde tumores scirrhusi omnino aut pituitosæ substantiæ sunt, aut atrabilares, aut ex utraque mixti. Proprie autem emollientia dicuntur, quæ medentur scirrhusi tumores, ex pituita exsiccata, crassius humoribus oris. Conseruentur enim hi potissimum in musculorum capitibus gigni. At quæ ab atrabilario facco ducuntur, cancrofa sunt omnia, & ab emollientibus medicina exasperantur. Sed his quoque paulo prospicere oportet, in cômmentarij methodi medendi de cœbimus. Quæ uerò à lento crasso humore concreto indurata sunt, calida in secundo aut tertio ordine ne, sicca autem in primo, medicamenta desiderant. Sed quum non exigua sit in corporibus induratis maioris minoris latitudo, necessum est medicamentorum illis induramentum non parum etiam latitudinem esse. In uniuersum autem, ex emollientibus medicamentis praestantiora sunt, quæ recentia existunt. Si quidem inueterata, ualidius quàm expedit exsiccat. Porro radix althææ & cucumeria agrestis, non uulgaris alie plantæ, partim in oleo, partim in aqua decoctæ, emolliunt: sicuti malus agrestis folia, tum cruda, tam cocta. Atq; hoc simplex medicamentum est, sicut porcinæ adpæ inueterata, cui salis uisibili indere oportet, sicuti nec emollienti ulli. Valde siquidem sal exsiccat. In summa uerò, quæcupalia emollire possunt, calida sunt ex secundo, & interdum ex tertio ordine: leuiter uerò sicca. Sed & his etiam emplastica uia inest oportet, non secus quàm pus mouentibus: at quæ non perinde mætu obstruat, quod magis, quàm illa, euacuare sicut nata.

CAPVT IX.

At indurantia frigida sunt, & humida, ut semperuiuum, portulaca, psyllis, lenticula palustris, solanum: quanquā hoc in medio exiccantium & humectantium consistit, duplicem in se habens substantiam, nempe terrenam, & aquam. At uerò si quid simul & refrigeret & deficiet, sanè & ipsum indurabit omnino simpliciter tamen, quò concrezione potius quàm euacuatione induratur corpus. Illa siquidem potius siccata est, & a proinde non emolliuit, sed humectatione curatur: quæmodum renfio relaxatione, & relaxatio tensio.

CAPVT X.

Porro laxatio in articulis fit, humectata immo dicet quæ circa eam sunt ligamenta, pariter & tendonibus: tenfio uerò, non etiam simpliciter, sed aut puluisc exsiccata, aut refrigerata, sunt phlegmonis affectus, aut scirrhus. In cute autem non tantum ita, sed musculis quoque, quæmodum quoque modo in tumorem subleuatur: quæmodum etiam in inflammationibus accidit. Quamobrem non simpliciter

una est species remediòrum laxantiu: uirpote quum alia humectando, alia calfaciendo, alia emolliendo, quædam uacuando, nonnulla tumores præter naturam purgando, alia etiam per coniugationem, horum quippiam agendo, laxare apossent. Est autem emplasticum medicamentu, quod terrena uisciditate substantia, minime mordaci præditum, illius mearibus corpora tenaciter hæret.

CAPVT XI.

Quod emplastico contrariu est, dici queat porros repurgare, & infarctus liberare: estque nec uiscidum, nec mordacitatis experia, sed subtile & uiriosum. Nam in ratione tantum maioris ac minoris differunt, tum emplastica ab istis quæ sordes nutriunt, tum repurgantia ab extergentibus. Nam quæ porosa obstruções referant, subtiliora extergentibus sunt, emplasticiu cõtraria. Sunt autem hæc, tum nitrosa, tum amara. Cæterum ad extergenda ea quæ in superficie sunt, requiritur ut cuti extime impolita medicamentu ipsa, solis exactissime nitrosam qualitatē possideant. At inrò in corpus assumpta, cuti si aduincta sit quædam astrictio, possint tamē sic quodam magnos purgare abstergeremætu, cuiusmodi in uasis consistunt. Nam foris meatum exiguitas prius ab astrictione occulta, quàm probe queat expurgari, non etiam inde in altum abstergentem substantiam recipit, nec expurgatur. At quæ circa uentrem uisceray sunt partes omnes, quò maximas in se habet mætu, maius accipiunt cõmodum ex ualiorum corroboratio, quàm propter osculorum exiguitatem ledantur. Proinde intra abstergium repurgare potest, foris non potest: quippe quod ex amara acerbata facultate est compositum. Quæcumque igitur reperis nitrosa & amara, ea ad purgandos mætus omnes, ualere noueris. At cutis & ulceris fordeæ, non hæc tantu, sed & uiribus minora possunt aut ferre: quæ sunt dulcia quæ tenuium sunt partiu. Porro scilla, iiria, nitrum per se, sphonitrum, spumantiri, seriphon, abrotonum, cum cibo potu assumpta, crassos uiscidosq; humores extenuandi uim obtinent. Quam ob rem lentia ac pua nitrosiora thoracia pulmonariay humoribus, aut purulentis & incidendis, & extenuandis, & educendis, aptiora inuenire alia præ istis medicamenta non possunt. His ipsa & lecinoris obstruções expurges, & modicas etiam lenis. Nam quæ maiores sunt, uehementiora desiderant: nempe capparis corticæ, radices tamaricis, scolopendrii, & scellam, & asplenon. Sed tamen istis utendum est, ad iecur quidem ipsa per se fere duntaxat: ad lienem uerò, mistis aceto, aut ei incoctis: ad thoracem pulmonemq; melicrato, priânæ, oxymeli, aut dulcium uinorum cuiuspiam.

CAPVT XII.

Quum autem plurimè urinum mouere est consilium, non admodum dictu utendum est pharmacis, sed quæ acriora sunt, & magis excalescent. Est enim omne acre calidum: cuius generis sunt, semen apii, petroselinu, fenuculu, dauci, agriofelinu, smyrnæ, ipsamys fœlicu, ammi, phu, meon, asaron, & cum his acoronis quibus sanguis non excrenuatur duntaxat, sed & funditur & seceruit: nempe seroforu & tenuis seorsum segregato ad renes, crasso uerò in sese coactum. Quam obrem puris ex thorace expulsiōni ea omnia aduertantur, quò nimis

Laxantium species una.

Emplasticiu officina qualis.

Emplasticiu opusculum quale.

Extergentia ea sunt quales, de lentis esse exactissime nitrosa: uisceray autem, uel si aliquid astrictionis non fortiter, nihil inueniantur.

Abstergium intra repurgans mætu: foris ne quoquam.

Medicamenta ad crassos uiscidosq; humores expulsiōnes commenda.

Obstruções iecoris et lienis, quæ purissimè tollant.

Acria omnia esse calida. Diurctica medi camentis quæ.

Pus mouentia modici excalescent, & humectant.

Scirrhus quid, & unde generatur.

Scirrhus qui gignuntur.

Emollientia quæ.

Chancrofa scirrhus ab ipso emollientia exasperant.

Scirrhus à uiscido humore, quæmodum medicamenta emollientia.

Emollientia.

Sal emollientibus inueniendum non est, quid exacerbat alide.

Emollientia de lentis esse etiam emplastica.

Indurantia sunt frigida & humida. Solanum natura.

Laxatio uisceray & quomodo. Tenfio in cute.

rum excaľfatoria exicatoriaq; ſunt, necnon ſecretoria & coaľfatoria. At quę expuſ debet, medio-
crem caliditatem deſiderat, ne uidelicet impenſe
exiccentia: ac proinde medicamenta illis congruen-
tia, eiufdem uſitatis gratia cū ſorbitionculis por-
tionibusq; exlinbentur. Quę uerò renes expurgat,
& ipſa incidend: uim poſidentia, larga humidi-
tate non indigent. Porro quę calloſas conſisten-
tias ſunt incidere idonea, admodum quidem inci-
dunt, ſed minimam ſanè caloris poſident. Calidi-
o 10 ſimas quippe callum pectoris gignit, nō in cidit,
nec diuidit. Cæterum quę & incidunt & medio-
crius calida ſunt, meliora exſiſtunt: ut radices re-
giorum alparagorum, & rubi, & beronica, & po-
limum, ſum ocľra, & utrum uſum, & ex ſcilla con-
ſectum acetum, & conſimilia.

CAPVT XII.

Rarefacientia.

Quę cutis meatus reſerant, ea rarefacientia di-
cimus: quę uerò uſorū oſcula, aperientia. Quin
& illis contrariorū, quod poros cōtrahit, conden-
ſans dicunt: quod autem oſculum claudis, occludens
ſue obſtruens nominant. Cæterum rarefaci-
cientiū quidem natura modicè calida eſt, ac tum
minimè ſiccās, tum tenuium partium: aperientiū
uero, tum craſſarum partium, tum acris ac mor-
dax. His porro contrariorū, condenſantium
quidem, frigida ſanè & aquea: occludentium au-
tem, tum frigida, tum partium craſſarū. Rarefacit
igitur chamæmelis, & althæa, quodq; ex ipſis cōſti-
tuitur oleum: nec minus quod ex agri ethibus cucu-
meribus. Quin & uerus, & cicinum, & raphan-
num, ex eadem ſunt nota. Aperient autem cyclo-
minum, alia, cæpe, ſel taurinum, unguentum yiri-
num & amaricinum, quę & occurrat hæmor-
rhoidas aperient. At condenſantia ſunt, a qua fri-
gida, ſemper uiuū, poſtulaca, trib uis uiridis, pſyl-
lium, auricula muris, lenticula paluſtris, ac deniq;
quę cumq; refrigerant, ſed non aſtringunt. Proin-
de mandragora, cicuta, altercum, papauer, ſi eis
quis modicè uratur, cōdenſandi uim obrinentiſſi-
liberalius, non modò cōdenſandi, ſed ſtupefacien-
di, & necandi. Occludunt porro meatus omnia
quę ualidè aſtringunt, nec tamen acrimoniam ha-
bent adiunctam: quum nimirū eſſentia talium ſit
ſimul terrena & frigida. Medicamenta uerò quę
frigida quidē ſunt aut æquę, aut amplius, ſed ſub-
ſtantiā ſortiuntur aqueam, ea inquam debilitat
& contrahunt & conſtringunt, uidelicet propter
ipſam molliē: quare condenſantia potius quā
obſtruentia dicuntur. Quippe quicquid ualenter
tum conſtipat, tum conſtringere debet, robur
quoddam remittens, & durum, habere oportet.

CAPVT XIII.

Rarefacientia.

Quę itaq; citra moleſtiam excaľfaciunt, ea ſola
omnium ſunt rarefacientia. Si uerò non modò ca-
lida fuerint, ſed etiam cōſiſtentia eralla, ſi quidem
uehementia ſint, & cauſtica, hoc eſt, urentia, ignis
inſtar corpus colliquit, & ſæpe eſcharas ritu cau-
terij inducunt. At ſi debilius ſit ut uere poſſint,
excaľfaciant, anaſtomoticam, ſue aperientiū uim
obrinunt. Quod autem cauſticum, non tamen ue-
hementer eſt, præterea eſſentia tenuioris, id pro-
fus ab omni mordacitate abertit aut cum exguo,
tum dolore, tum morſu eliquabit partes carno-
ſas. Nam quod non conſertim alterat, ut quę ue-
hementer ſunt calida, quodq; non ugrè penetrat,

ut quę craſſe ſunt eſſentia, ea latentem aſtioneſ
obrinunt. Porro alteratoneſ ſubite conſertatq;
mutationes, ſicuti & penetrationum quę uiolen-
tæ ſunt, quales proſiſcuntur a cauſticis & eſcha-
roticis, maxime ſenſibiles ſunt. Cæterum de quib-
us nunc agimus, minimè faciunt eſcharas, uo-
canturq; putrefaciencia, licet improprie, atq; ob
ſymptomatis tantū ſimilitudinē: quā ab uſtrib;
nullo doloris ſenſu corruptio fiat. Nam quę utrè
putrefaciencia ſunt, humectant ſimul & calaľciat.
Multis autem modis corruptum quid poteſt. Cor-
rum puntur ſiquidem plus nimio refrigerata, aut
excaľfacta, aut humectata, aut exiccata. Non ra-
men quicquid corruptum eſt cōputreſcit, ſed qui-
bus id cum ſectore accidit. At medicamēta de quib-
us nunc ſermo eſt, putrefaciencia, qualia ſunt au-
ripigmentum (quod arſenicū uocāt) ſaudaracha,
clryſocolia, dryopteris, ptyocampe, & aconiū,
omnia colliquare ſunt nara, & poſſimū carnem
tenellam, idq; abſq; dolore. Ex quibus quidē non
nulla imbecilliora cæteris, ut uſitæ petre ſlos, exi-
mam tantum ſuperficiem, quam conſtingunt, ex
dendo, ulceribus excreſcentibus cicatricem in da-
cunt: quanquā medicamenta quę uerè ad cica-
tricem perducunt, nec detrahunt, nec liquare car-
nem, ſed durare, & ſiccare ſunt nara: ut alumen,
galla, omphacris, æs uſum, ac maxime lorū, cum
eiſq; fructus ſpinæ Aegypti, ſiccaq; mali granati
putamina.

CAPVT XV.

Id igitur eſt in planis ulceribus ad cicatricē du-
cendis conſilium, ut caro alteretur, ſtariq; cuneis: id
quod perſicitur per ea quę illam contrahere, con-
ſtringere, conſtipare, denſare, ſiccare, & in callum
cogere ualeant: quum nimirū cutis, ueluti in cal-
luri durata caro ſit. Ea ergo medicamēta quę ſic
agere poſſunt, primariò propriè dicuntur epulo-
tica, ſiue ad cicatricē ducendā: cætera uerò quę
exedunt carnem, ſecundariò, & per accidens: ſicu-
ti & ea quę abſq; aſtictione deſiccandi uim ha-
bent mordacitatis expertæ. Nam & hæc quę ex
accidenti cicatricē inducūt: cuiuſmodi urig me-
dicamentum eſt, myrrha, lithargyrus, oſtreum, &
diptyges combuſta: quandoquidem & ipſa cica-
tricem ſæpe inducunt illura. At uerò medicamen-
ta circa morſum mediocriterq; abſtergentia, cau-
lates ulcerum implent.

CAPVT XVI.

Porro attrahentes facilius ſunt, quę ex alto
uellementius extrahunt: repercutientes uerò, quę
in altū occurrentes ſibi ſuccos repellunt. At eſſen-
tia illis quidem calida eſt & tenuium partium: his
uerò frigida, & craſſarū. Attrahit enim perpetuò
calidum: repellit uerò frigidum. Verum quod ca-
lori nullam partem tenuitatem ſortitur, trahit
uehementius: quod autem ea aſiſtudinē frigori,
uiolentius repellit. Atq; aſtringentiū quidem no-
ta eſt eſſentia. Attrahentium autem, alia ſpontè eſt
nara, ut dictatam, propoleos, thapſia, ſigapen-
ſucci Cyrenaiſi & Medici eſſentia: alia uerò *
a putredine exaſperatē ſuam ducit originem, qualis
tum fermento, tum pſorico ineſt. Quod ſi ſimis
quę ex putrefactione generatio conſtat, utiq; o-
mnes attrahendi facilius & pollebunt: ſed non pa-
ua illis differētia ineſt. Nam columbinus admo-
dum attrahit. Ex æquo aut utrinq; ab eo receſſe-
runt,

Corruptio
modo dicitur.Putrefactio
ſerit uicci-
no accidit.Putrefaciencia
quę carat ali-
qua dolo-
re tenent.Cicatricem in-
ducunt uero
camenta quę.Epulotica quę
dicuntur pen-
it, quę ſubſol-
rino.Attrahit calidi
repellit frigidi.Attrahentiū
ſentia duplex.Fimus omni
attrahit.

runt, ad calidius quidē anfrinuis, ad frigidius uerō gallinaceus. Hoc etiam magis uincuntur humanus & suillus. At canum stercus simile est medicamentis extergentibus, maxime si uescant ossibus. Crocodilorum autem stercus magis etiam id perficit. Est & aliud attrahentium medicamentorum genus, quod qualitate familiaritate attrahit: id quod aliud est nihil, quā totius essentia similitudine, ceu quā nutrantur, familiaria nutrimenta attrahit. Talium enim medicamentorum sunt purgantia omnia, & amuletorum nonnulla. Ceterum calida ut sunt id genus omnia est necesse.

Trahentia similitudine attrahunt.

Calidiora trahere potentius.

Alexipharmacarū facultas natura duplex.

Alexipharmacarū esse modum in ter oblati corpora, & delectantia medicamenta.

Quinena inter ea quæ essentia similia sunt, quod calidius fuerit, id potentius attrahet.

CAPVT XVII.

Iam uerō facultatem alexipharmacarum natura est duplex. Quædam siquidem alterant, quædam euacuant uenenum ledens, aut delectant medicamentum. Alterant igitur una qualitate, idque ratione contrarietatis: aut duarum coniugatione: aut denique tota substantia. Euacuant totius substantia similitudine, & caliditate subtilium partium. Ceterum alexipharmaca medicamenta, sanæ facultate sunt media inter corpora quæ oblati duntur, & medicamenta ledentia: ut uidelicet eadem sit proportio corporis ad facultatem alexiteriam, quæ illius ad delectantia. Quamobrem omnia propemodum quæ delectantia aduersant medicamentis, si largius sumpta fuerint, grauiter animantis corpus offendent. Quapropter ea exhibentur moderatione, ut nec copia nimia corpus oblectant, nec exiguitate sua à delectantia uincant. Euacuant autem omne delectant uenenum à foris impositis medicamentis, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantia similitudine. Quā igitur omnia delectantia medicamenta aduersissima secundum temperiē sint corporibus quæ ab ipsis leduntur, certe si à similibus temperie medicamentis uacuent, erunt utique & hæc corporum naturis contraria: ut sunt haud dubie aliqua ex parte contraria, non tamen adeo ut intermiant, sed in corporis peruenient, & medicamentis ledentis medicamentis.

CAPVT XVIII.

Articularis quæ uerē & est & dicitur anodyna, eorum est, quæ primo ordine exalfaciūt, tenuisq; essentiam formantur. Quæ uerō improprie anodyna uocatur, ipsa medicamentis inest, quæ suo ingenio frigore partem stupefaciunt. Est autem stupor paulum minus quā insensibilitas, ac sensus priuatio. Ceterum quæ affectum sanando dolorem seclant, nec merito dici anodyna possunt: nam id est omnium curantium commune. Quæ itaque reuera sunt anodyna, partium sint tenuium, & calidiora quā quæ symmetra sunt, est necessesse scilicet euacuent, digerant, rarefaciant, extenuent, concoquant, & æquabile reddant, quicquid partibus doloris est causa. Quare nihil prius attentionis habere oportet, ne si pars quidem aut affectus exposcit. Ex quibuslibet, quodd interduum affectionem non inuadunt, sed tantummodo mitigabunt dolorem, quando uidelicet uerē anodyna dicuntur. Interduum a diuabant affectū, dicentem simul anodyna, & salubria. Igitur medicamentum anodynorum quædam ex primo sunt calfacientium ordine, quæ proprie anodyna dicunt, ut anodyna facili

anodyna facili sate natura.

Supor quid.

Anodynorum opera.

Anodynū nihil debere iocose affricandum.

Inter

Anodynorum differentia duplex.

thini oleum: quædam similiter ut corpus nostrū, qualia sanè quæ mouentia. Quæ uerō loporem e-pora inducunt, temperiem fouiuntur uel summe aduersam ipsæ quæ reuera sunt anodyna. Refrigerant siquidem omnia corpus, & sensum eousq; stupefaciūt, ut si paulo liberalius bibantur, mortem afferant. Ceterum ad usum propositum optima sunt quæ desiccant. Quæ uerō existentia frigida, humiditatis etiā copia obtinent, ut cicuta, ea potius non sunt utilia. Talis est mandragora, excepto eius cortice sicco: & alterū, prius semen. Sunt itamen & quæ nobis tota essentia aduersent. Proinde si uel minimum eorum assumptū fuerit, omnino ledar necesse est: ceu dryopteris, pityocampe, thapsia, solanum manicum, lydragryos, & fungorum nonnulli: præterea salua & sel animalis uenenosiora. Nam talia omnia genere sunt delectantia, nō quantitate: et proinde nihil corū in alexiterias antidotos indit, ut solet papaueris succus, myrrha, styrax, & crocus. Nam tamen quædam horum dementem largius bibita, quædam mortem inferant, mensura tamen conuenienti permixta alijs, adiuant. Eorum potius quo mentem ledunt, plerique etiam caput degrauiant, uaporibus ipsum implentia. Sunt quæ ad assigant, oblectantia uentriculum. Communiter uerō cerebrum uersa duobus modis insectant: aut totius substantia contrarietate, aut quæ una duabusque qualitatibus illius temperaturam immutant.

Delectantia, sua substantia. Delectantia generis quæ sunt.

CAPVT XIX.

Vocabulū hoc, purgans, una quidem, eaq; communi ratione, de his omnibus dicitur, quæ quouis modo animalis excrementa expurgant: alia uerō de his tantum enunciat per excellentiam, quæ aut per uomitum, aut per alui dejectionem, purgationem moluntur: ita ut ab his diuersi generis sint ea quæ tum per nares, tum per os à capite humores eliciūt. Eundem cum istis finem generis, quæ uulgo admota, ut quædam attrahit illius excrementa repurgant. Quæcumq; siquidem purgare animaduertimus, ea trahendi uim possident, alia unum quempiam succum, alia duos, aut etiam plures: idque illis inter sese commune existit. Nam quæ crassos humores extenuando, aut urinam citere possunt, aut ex pectore pulmoneq; eiciendis excreationibus auxiliari, aut mensurata purgationes citere, purgant sanè & ea aliquo pacto, ut uim antedictis non similiter nuncupantur, sed alia dicuntur diuretica, alia bechica, alia menses mouentia, hæc re à superioribus diuersa, quod nō habeant uim familiaris succorum attractionis, ut illa. Bisaria autem dicuntur bechica: partim quod tussim prouocent, partim quod eandem sedent. Atque contrariæ horum sunt facultates. Alia enim extenuandi naturam habent, alia ineraffandi. Atque extenuandi quidem facultas, in calidis & tenuium partium substantiis sita est: ineraffandi uerō, frigidis, & crassarum partium essentis inest.

Purgans medicamentū multiplex habet significationem.

Purgantium alia duos trahit humores.

Bechica dici bisariam.

CAPVT XX.

Lactis & seminis effrictices facultates sunt, partim in medicamentis tantum, partim in alimentis. In medicamentis quidem, quæ saccos pituitosos exalfacientes in sanguinem uertimus: in alimentis autem secundum substantia totius similitudinem, ubi uidelicet boni sunt succi, & humida,

Humorum corpori humani est peris.

Lactis superis.

Lactis generandi ratio.

Lactis generandi rationem qua probetur.

Sanguis est materia mensium & lactis.

Venas esse communes utriusque & matris.

Lactis mensiumque generandi, eandem vias & medietatem rationem desiderant.

Menses derivati in uterum, non ab illo attrahuntur.

Menses & urinae quae eliciuntur.

Menses derivati à diueris quod modo differant.

& tepide calida, eum ipsum lac. Siquidem sanguis est caloris mediocrius particeps: plus uero quam mediocrius, bilis: sicuti pituita frigidiora. In medio autem pituita & sanguinis lac ipsum consistit, propius tamen sanguinem uersus inclinans. Vbi igitur ob penuriam sanguinis parum lactis in mammis conficitur, humectante simul & calfaciente uictus ratione est opus. Si uero quod biliosus fuerit, in primis purgationem ipse sanguis desiderat: mox uictum quem nuper diximus. At si quod pituitosus, medicamenta requirit ex calfacientia aut primo, aut secundo ordine, non tamē exiccantia. Verum inter ea potiora sunt, quae non tantum medicamenta sunt, sed & nutritiva, uelut eruca, fœniculum, anethum. Intellego enim ipsas herbas etiamnum uirentes & humidas: nam quae siccae sunt, plus quam par sit & ex calfaciunt & deficiant. Huius generis est symonion, apium, polion, eap, prius quam exsiccentur. In summa uero, quae cumque calfaciunt plus quam expectant, quaeque deficiant aut refrigerant, partim qualitate ipsius sanguinis uitantia, partim ipsum minorem reddenda, lactis prohibet generationē.

CAPVT XXI.

Porrò dictis ad similem facultatē obinunt, quae cumque prouocare aut sedare menses possunt. Vt rationem enim communis materia est, nempe sanguis in uenis contentus. Quare ubi hic fluxilis fuerit, & qualitate contemperatus, utriusque abundantem copiam suppeditat. Communes praeterea uerbis utriusque uenae sunt non exiguae. Itaque ubi ad alteram partem sanguis deferretur, altera siccescit. Proinde quibus menses mediocriter deferuntur, ipsa lac minime in mammis colligitur. Quibus uero hoc largē suppetit, ipsi planē menses cohibentur. Quo circa mirandum non est, si tum uictus, tum medicamenta similia sint, nempe & ea quae giungunt, & sedant menses uteri purgationes: & ea quae lactis in uberibus generationem tum prouocant, tum supprimunt: quanquam haecenus differant, quod & calidioribus, & magis incidentibus nonnunquam menses uis purgatio indigeat: quum nimirum ea in parte sicce uenae magis aperiri debeant, quàm quae tendunt in mammas, & sanguinem fluxilem magis requirant, utero ad delationem eius nihil conferente. Mittuntur enim in uenas quae committuntur illi, non attrahuntur menses. At sanguis in ubera non tantum mittitur, sed etiam trahitur: ac proinde leuiori subsidio medicaminum opus habet, quum non abunde in mammis is confluat. Medicamenta etiam quae iuuant ut sanguis in mammillas feratur, imperfectas etiam purgationes promouent. Sin autem nimis obiecte sint, aut planē retentae, nulliusmodi eas sanare potest: uerum fabina, meion, iris, calamineia, pulegium, dictamnium, asarum, costus, calia, cinnamomum, anomum, aristolochia, buniim, & eius generis reliqua, exactas uteri purgationum retentiones persanant: itaque etiam urinam promouent. Sed ab his quae diuretica tantum dicuntur, hoc quidem differunt, quod non uehementer deficiunt. Etenim quae non deficiant, & modice calfaciunt, lactis sunt generandi utilia: quae uerò plus ex calfaciunt, non tamen uale lenter deficiant, menses ueluti dicendi sunt coargua. Verum & utraque haec urinas prouocant, necnon

In primis ea quae deficiantia, etiam calfaciunt. At praeter alia & reddendis ex pectore pulmoneque ex creationibus in eodem sunt deficiantia. Possunt quoque & ipse incidi quidem, non tamen exiccari, ceu & renem uelut eap calculi.

CAPVT XXII.

Semen generant cibi qui probe nutriunt, & flatulenti sunt, familiaresque totis substantiis: medicamenta uero flatulenta etiam & calida. Extinguit autem deficiantia & refrigerantia omnia, quaeque totis substantiis contraria sunt. Porrò prouocant quae cumque calida sunt & flatuosa absque defecatione supprimunt uero contraria. Etenim quum seminis substantia ex bona fluxu sita: generatio nem sortiat, friget etiam flatuosa: bene nutriti & flatulenta sint, necesse est, quae cumque semen aut praeare, aut praeuocare possunt. Quare bulbi, cicet, fabae, polypodes, cornus, edulia multum seminis & dicuntur & sunt. At scincus & sartion medicamenta ad id apta existunt. Porrò simul cibi & medicamina multi seminis sunt, lini semen, & eruca. Ceterum quae refrigerare sunt nara, tam edulia, quum medicamenta semen cogit, in crassantia, & stabile reddenda, uim habent ipsam supprimentem, non aut corrumpentem: ut lactuca, bitrum, arriples, cucurbita, mora, melopepones, cucumeres siue maturi, siue immaturi. Iam uero quae deficiant, ne esse quidem semen permittunt, etiam in natura calida sint: ut rura. Quod si etiam non calfaciat, multo minus: ut nympha. Eandem proportionem tum efculentorum, tum medicamentorum est inuenire, circalac & menstrua. Sub idem genus cadunt, quamuis alio modo, quae respiranti instru mentorum relictis excretionibus auxiliant, quaeque urinam ciere possunt. Haec enim omnia extenuandi facultatem obinunt, uti contraria in crassandi.

CAPVT XXIII.

Tametsi collyrio diarthro, & diapompholygos, & cygnio, & thure, uti possumus ad aures, aut os, aut nares affectas, necnon ad pudendum & anum: quia tamē frequentius ad oculorum morbos igitur utimur, ob id nimirum ocularia medicamenta uocantur: sicuti alia hepatica, alia splenetica, stomachica, secundum differentiam partium larum quibus solent auxiliari creberrime.

CAPVT XXIIII.

Dum autem qui Methodici nominant, metasyncriticas quasdam materias & facultates appellant, praeterquam quod obscura & falsa loquuntur, etiam suae ipsorum haeretic maxime repugnantia astruunt.

CAPVT XXV.

Ex operibus autem contrarias indicare facultates oportet: dicentes quasdam esse facultates emplasticas, & his contrarias, tum extergentes, tum scarificantes: praeter ea emollientes, indurantes, laxantes, & contendentes. Nam astringentes, acres, amaras, acidas, atque dulces, non facultates medicamentorum, sed gustus esse qualitates monstrauimus. Quamquam & harum etiam tum actiones, tum temperatae nobis non inueniunt inuestigandae. Etenim astringens, terrefre & frigidum: acidum, subtile & frigidum: amarum, terrefre & subtile: quod insignis qualitates experti, frigidum simul & aequum acre, igneum: salum, terrefre & calidum,

Semen quae frigunt, emollientia.

Semen praeuocant, ita supprimunt.

Semen supprimunt omnia refrigerantia.

Semen autem quod quidem praeuocant, quae frigidum.

Ocularia meli camosa.

Contra quaeque sunt.

Saporem temperatissimum.

dum, nondum tamen igneum: similiter dulce, calidum, sed nondum urens: quæ denique oleosa sunt, omnia aquea sunt & ærea. Sequuta sanè sunt temperaturas eorū, & opera. Nam astringens, contrahere, cōstringere, densare, repellere, inter asfare, omnia refrigerare, excicare est natum: acidum uerò, incidere, extenuare, fasciū liberare, & purgare citra calfactionem, & cum aliquantula repulsionis potest. At acre similiter ut acidum extenuari & per purgar, necnō perumpit, attrahit, & escharam inducit: ceterum calfaciens, & digerēs. Sic amarū quoque meatus per purgar, abstergit, extenuat, incidit humorum crassitiē ab ipso manifesta ex calfactione. Quod qualitatē est expers, in crassitate, cogit, contrahit, extinguit, stupefacit. Porro salum coarctat, constringit, condendo seruat, defecit citra apertam aut frigiditatem, aut caliditatem. Dulce uerò edocet, laxat, rarefacit: oleosum denique humectat, emollit, & laxat. Ex quibus facit facile iudicare licebit, quoniam sapores

CAPVT XXVI

Symmetrū quid dicatur.

Symmetrū appellare medicamentum conuenit, quod nec ex calfacit, nec defecit, nec refrigerat, nec humectat: nec calidū, frigidū, humidū, siccūmque existit. Quod uerò aut calidius, aut humidius, aut frigidius, aut siccior est, aut uincit, seu excedente facultate cognominatur. Porro per unumquemque excessum quatuor posuisse ordines, quod ad usum spectat, iussit: calidum quidem, exempli gratia, nominantes primi ordinis, quod nos ex calfacit, nō tamen euidenter, sed ita ut opus sit rationali demonstratione. Quæ uerò manifeste calfacere nos dicuntur, ea secundi ordinis esse dicent. At quæ iam uehementer quidē, non tamē summē, tertij. Quæ autē adeo ex calfacere possunt, ut escharam moliant & urant, quarti: similiter in alijs operantibus existimandum. Nam quæ adeo uehementer refrigerant, ut extingunt, & ipsa quarti sunt ordinis. Ceterum nullū inuenire est, quod quarto defecit ordine, quod nō enī urat. At tertij ordinis exiccantium quippiam esse possit, quod minime urat, cum omnia quæ uehementer astringunt: ex quibus est omphaciū, rhus, alumen, balauſtia, galla ophiactis. In his autē ipsa quæda uicina sunt adurentibus, ut squama æris, & æs ustum, quæda inter tertij quartumque ordinē hæreant. In medio tertij est æs ustum, si lotum sit: in principio tertij hypocistis. Sic in secūdo & quarto differentias licet cōstituisse triplices: quam nō perinde urant caoteriū & napy, licet ambo quarti sint ordinis.

**GALENI PERGAMENI DE
simplicium medicamentorum facultati-
bus liber VI.**

Generalis igitur sermo de facultate medicamentorum simplicium, uniuersus iam superioribus libris finem suum consequutus uidetur. Tempus uerò iam est ad sermones particularibus, siue speciales transire, hoc solummodo repentes: primum quidem, in natura temperatissimi: secundō, in intemperatissima deinceps in simplicibus morbis, faciendum esse periculum de facultate ipsorum medicamentorum. Ceterum quoniam

medicamenta omnia, partim quidē sunt animalia partes, aut plantarū, aut fructuū, aut horū liquores, aut socci: partim autē ex metallis sumuntur: optimū mihi uisum est de plerisque ante omnia differere: dein de metallicis pertractare, ac ultimō ad animalia partes transire, idipso obseruato literarū græcarum ordine. Curabitur autem semper, ut (quod mouit primo oraculo Hippocrates, uitam pronuncians breuem, & artem longam) festinantes quammaximo studio, uiam incedamus compendiosissimam, per ea nempe quæ sunt in arte utilissima. Inter omnes porro Dioscorides perfectissimē mihi uidetur confecisse tractatum de medicamentorum materia. At qui aggregauit figurarum herbarum describere, quas ne per somnium quidem uiderunt, si certē uident præconibus similes, qui notas ab alijs acceptas fugiunt: mancipij publicant, quem ipsi nunquam uiderunt, imo quem ne agnoscere quidem possint, si propē assisteret. Illos enī nō possum nō acculare, qui primi herbarum formas, scriptis docere conati sunt, quorum melius existimem ab ipso præceptore oculis discere, ac non assimilari ipsa, qui ex libris procedunt gubernatores.

Abrotonum.

Abrotonum calidum & siccum est facultate, in tertio recessu, aut ordine, qui ad temperatā naturam expenditur, situm. Valde siquidem est amarū: qui sapor, quam essentia terrena sit, à largo est calore extenuatus. Porro si quibus per circuitus redeunt rigores, ante inuasionem rigorum eos abrotono confrices, minus utique concotientur, subitotque sensum caloris percipient. Quod abrotonum etiam lumbricos perimat, par quidem est, quum sit amarum. Ceterum & digerendi & incidendi quandā uim habet, ipsi quoque abſinthio maiorem: quandoquidē paucissime acerbioris particeps est abrotonū, haud autem exigua abſinthii. Vnde inimicum sanè est uentriculo abrotonū, ueluti etiam seriphum: gratū uerò & amicum abſinthii. Per se quippe amarū omnisfarū est in sensum uentriculo: austeri uerò, aut acerbū, aut in summa astringens, amicū & familiare. Abrotoni duæ sunt species: quarum alteram sanè marem, alterā sceminam uocant. Similiter & abſinthij tres species, aut differentia assignantur. Quarum onam eodem cum genere ipso nomine appellant abſinthium: cuiusmodi est Ponticum. Secundam autem Santonicum: ac tertiam denique Seriphum. Quibus omnibus abſinthium quidem minus est calidum, nempe plurimam astringentem obtinens. Nōo tamen minus deficcatorum existit. Ceterorum autem, Santonicū à Santonia regione, in qua nascitur, nomen sortitum, proximam habet facultatem, Seriphō paulo imbecillius in extenuando, calfaciendo, deficcando. Porro ipsum Seriphum Abrotono minus est calidum, uerū calidius abſinthio, stomacho impendio inimicum, nempe cum amaritudine, præ se etiam quoddam ferens falsedinem. Sed nonnullam tamen, etsi minimā, astringentem sortitur. Sic Abrotonom & Santonicum admodum sunt infesta uentriculo. Solom enim inier ea abſinthium, & maxime ponticum, gratū stomacho existit. Abrotonum uctum, calidū siccūque facultate est, magis enī quàm cucurbita siccā uisā, & anethi radix. Illa

*Vita breuis.
Ars longa.*

*Differendum ex
abſinthio trado
disse hystoriam
plantarum.*

*Abrotoni tempe-
ratura & essen-
tia.*

*Abrotoni si quis
perficitur ante
inuasionem,
minus à febri
rigore infestatur.*

*Abrotonum ter-
minus potius.*

*Abrotonum ini-
micum ventri-
culi.
Abſinthium ut
triculo gratum.
Astringentia
sunt amica ven-
triculo.*

*Abſinthij tres
species.*

*Ponticum.
Santonicum.
Seriphum.*

*Medicamenta
in quibus expe-
ri debemus.*

Eucubina res-
pansu videri
congruit.
Abrotonici
ex aliquo oleo
calido, barbam
taridii nascen-
tem elicit.

enim ulceribus humidis simul & citra phlegmo-
nem callo induratis conveniunt: ac proinde ma-
ximè præputi ulceribus congruit. At cinis abro-
toni ulceribus omnibus mordax est: atque idcirco
ex oleo aliquo tenui, cicino scilicet, aut raphani-
no, aut Sicyonio, aut ueteri, & maximè Sabino,
ad alopecia accōmodatur. Tum barbam taridii
nascentem, in eorum aliquo, nec minus leuisticino
maceratum, elicit.

Agnos, Vitex.

Agnos.
Vitex.

Agnos, aut vitex, fruticosa illa planta, calidus
quidem & succus est tertio ordine: uerū multum
tenuis substantiæ, tum gustu acris simul & astrin-
gens: ipsas tamē uices ad medicinam habet inui-
siles. Cæterum folia, semenq. & flos, calida siccally
sunt facultate, nec non tenui substantia: quare sæpe
nobis sunt usui. Porro semen edendo est: tam
perspicuum tamen calfacit, ut capiti dolorem hoc
nomine pariat: quanquā si id frigratur, minus ca-
pui tentat. Vitæq. autem sumatur, flarus uentris
discutit. Præterea tum semen, tum flos, tum folia,
ueneras intemperantias compescunt. Quare nō
tantum est potatū conferre ad calitatem uiden-
tur, uel ueritiam subtrahit: unde planta ipsa,
agnos, hoc est, casta uocatur. At rura quā agnos,
magis quidem excafcatoria & exicicatoria ex-
istit. Ad hanc, agni quidem semen ac germina, mo-
dicam astrictionem ferunt: at rura ubi aruerit, exa-
ctè amara est & acris: quandiu uerō humida fue-
rit, subamara. Nulla ramen austeritas aut acerb-
itas illi inest, aut illa certe obscurissima Quocirca
& ad ecur & lienem indurata & obstructa, agni
semen potius quā rura competit. Præter dicta
autem agnos & mentes mouet, & indurata dige-
rit, & lassitudinem tollit.

*Vitici semen ca-
pitæ granitū
parit.*

*Vitæ ueneras
intemperantias
compescit.*

*Rura facit
agnos.*

*Vitæ astric-
tionem
fert, mentes
mouet.*

*Agnos.
Gramen.*

Graminis radix modicè frigida est & sicca, mor-
dacitatem quandam exiguam, & partium tenui-
tatem obtinet. At herba ipsa primo quidem re-
cessu refrigerat, in humiditate uerō & siccitate ex-
stans quammoderata.

Gramen esculentum.

*Graminis es-
culenta radix erit
et rura glaci-
na, frangit la-
pides.*

Graminis sem.

Eius radix est modicè frigida & sicca: proin-
de i' cruenta ulcera glutinat. Ipsa autem herba il-
la non uehementer refrigerat, in medio consti-
tuta humiditatis & siccitatis. Radici porro mor-
dacitas & tenuitas quædam exigua inest, qua ni-
mirum lapides frangit, si quis eam decoctam bi-
bat. At semen alietius quidem imbecillum etheus
uerō quæ in Parnaso nascitur, urinam ciet, ac flu-
xus uentris & stomachi rescat. Vis enim eius est
exicicatoria, tenuium partium, & subacerba.

De quatuor Anchusis.

*Anchusæ qua-
tuor species.*

*Onoclea quib.
morbus chronicus*

Lycopis.

Onoclea quam uocant, radicem habet admo-
dum refrigerantem, deficcantem, astrigentem,
& subamaram, corporibus condensandis & mo-
dicè extenuandis idoneam: tum abstergeas quo-
que & abluendis biliosis & sillis succis. Quare
auringi & lienosis est utilis. Præterea cum polen
taillia, iuuat erysipelata, & absterge in non modo
epota, sed etiam admodum extrinsecus: proinde ace-
to macerata uirtuigines & lepras sanat. At folia ip-
sua herbe imbecilliora radice sunt, non tamen à
resiccatione & astrictione aliena. Itaq. profluuiū
sanant cum uino pura. Lycopos nominata, ressi-
gerans etiam & siccans, similiter erysipelatis con-

gruit. Cæterum radicem quam onoclea magis a-
stringentem fortitur. Onoclelo cognominatū uis
& calidior & medicamentosior inest. Quare eos
qui à uisperis morbi sunt, admodum iuuat, tum illi-
ta, tum suspensa, tum esca. Reliqua uerō quæ qua-
ta est, & parua, cæteris est calidior, amarior, & me-
dicatior: ac proinde ad laros lumbricos idonea,
oxybapti mēsurā cū nasturtio & hyssopo epota.

Agarii radix.

10 Primò quidē gustu dulcis, sed paulo post sub-
amara apparet, acrimoniæ & astrictionis leuicula
quandam temporis spacio inducit: estq. con-
sistentia laxa. Quare composita hæc radix est
ex substantia aërea & terrea, à calore extenuata.
Minimum autē habet essentia aqueæ. Hæc rati-
one & digerendi uim possidet, & crassitudinem in
cidendi, tum anfractus uiscerum expurgandi. Id-
circo regio morbo laboriles ex obstrucone iec-
cinoris, nec non morbo comitali obnoxios, san-
at: tum rigores per circuitus recurrentes, ex cras-
sis uisciditū humoribus ortos exterminat, iuuat
& morbos à bestis frigore ledentibus, aut comp-
unctos, tum foris in affecta parte imposita, tum
inrō in corpus assumptum, poudere drachmæ
unius cum uino diluto. Est etiam & purgatoriū.

Ageranton.

Facultatem digerendi habet, & leuiter quadam
tenuis phlegmone liberandi.

Adiantum, Polytrichum, Callitrichum.

10 Vulgò capilli Veneris.
In calore & frigore symmetrū est, siccata tamē,
& extenuat, & digerit. Caput ex alopecia glabrū,
capillis uestit: strumas & abscessus digerit: epor-
um lapides frangit uiscidiorum crassitudinem & pe-
ctore pulmonēq. excretionibus, non mediocri-
ter confectat: deniq. uentris profluuium sistit.

Aizoon, Semperviuum.

Aizoon utraq. tum malus, tum minus, defic-
cat quidem leuiter, uirpore astringens modicè: est
autem ex tertio ordine refrigerantium, in cuius
aquea essentia præpollat. Quare ad erysipelata, her-
petes, & phlegmonas à fluxione ortas accōmoda-
tur.

Aegilops, Avena.

Digerēdi uim obtinet, existens leuiter acris. Vn-
de phlegmonas induratas, et ægilops sanat.

Aera, Lolium.

In principio tertij ordinis excafcantiū, secun-
di uerō extremo exiccantium consistit, sic ut acce-
dere magis quā iris, narsæ acrium uideatur: ad
50 quæ ramen essentia renuitate relinquitur.

Aegyrrus, siue populus alba.

Populi flores calidi sunt in primo recessu, pau-
lūq. ad siccis declinat, subtiliorūq. porius quā
crassiorum sunt partium. Floribus familia sunt fo-
lia, licet imbecilliora. Refina etiam floribus simi-
lem facultatem, sed calidiorē obtinet. At semen,
tum refina, tum floribus subtiliorū est partium, et
exiccantiū: non tamen multo calidius.

Acacia.

60 Acacia & planta ipsa acris est, & fructus, &
succus: qui locus acrimoniæ deponit. Porro si par-
ti illinatur, proptius eam sicciorē argi contra-
ctam reddit: estq. tertij ordinis exiccantium, & se-
cundi refrigerantium, ubi quidem elorus fuerit
alioqui si illorus sit, primi. Est autem consi-
stentia terreus, habetq. in se partes quasdam aqueas,
nec non

Onoclelo.

*Anchusæ qua-
tuor species ana-
lyses, lateri li-
bricus peruenit.*

*Ageranton radi-
cem esse crude
Calidum.*

*Ageranton facili-
ter astrigent.*

Ageranton.

*Adiantum.
Polytrichum.
Capilli Ven.*

*Aizoon.
Semperviuum.*

*Aegilops.
Avena.*

*Aera.
Lolium.*

*Aegyrrus.
Populus alb.*

*Acacia facul-
tate.*

necnon alias tenues & calidas.

Acalephe, Vetrica.

Acalephe.

Huius herbe tum fructus, tum folia, admodum digerentia sunt facultatis, adeo ut phlymata & pectoris sanent. Sed & quiddam stituosum exhibent, dum coquuntur, quo extimulati venerit, & maxime ubi semen cum multo bibitur. Quod non col faciat uehementer, sed nimis tenuium sit parum, testimonio est crassior ex pectore educio: tum pruritus quem in partibus excitat. Porro subdudum ventrem nullatenus magis quam purgatione. In uniuersum, quae excicari citra mordicationem possunt, ea conuenienter perficiunt.

Vetrica extimulat ventrem.

Vetrica subdudum alio instillatone magis quam purgat.

Acanthos.

Spina.

Folia quidem medicriter digerentem facultatem obinent: at radix excicatoria est, & leuiter in cistioria, & tenuium parium.

Acanthium.

Radix huius & folia facultatis sunt excalfactoria, ut & ipsae quae conuelluntur auxilientur.

Acanthos leue, Spina alba.

Acanthos leue spina alba facultatis.

Radix eius deficcatoria est, modiceque astringens: quamobrem & coeliacos & dysentericos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, adematamque illam contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluant. Semen tenuis essentiae & calidae facultatis est: itaque porui dari ipsae quae conuelluntur conuenit.

Spina Aegyptia.

Spina Aegyptia facultatis.

Validius quam spina alba, tum astringit, tum siccat. Quare profluuium muliebrem radix eius supprimit. Fructus uero & columellae prodest, & ipsae quae in sede inflata sunt: ulceratque ad cicatricem perducit.

Acoron.

Huius radice utimur, quae gustu modice amara est, odore quoque inuicando. Itaque facit calidam, & consistentiam tenuis. Quare & urinam mouet, & lentes induratos discutit, ceratoidisq; astrictioni detergit, extenuatque. Ad quod succus praestantior existit: calfacit enim & siccat in tertio ordine.

Aconitum pardalianchea.

Aconitum pardalianchea.

Hoc putrefacientis & deleteriae facultatis existit: quare in cibo potuq; fugiendum.

Aconitum lycoctonum.

Aconitum lycoctonum.

Est & hoc similis alteri facultatis: sed peculiari ter lupos interficit, ut illud pardos.

Acle, quam fabucum: Chamacaele, quam

Ebulum uocant.

Vitrag potentiam habet & deficcandi, & conglutinandum, necnon digerendi modicum.

Alimum.

Semen simul & lac haec planta gignit, estq; gustus aeris & subastringentis: sex quibus constat ipsam esse dissimilem. Maior tamen pars eius temperata est calida, cum humiditate inconfecta, & leuiter stituosa.

Aloë.

Hec herba, optima in India nascit, cuius liquor est id quod ad nos importat, cognominatur aloë, medicamentum ad plurimas res, propter siccitatem mordicationis experte, utile. Quod quidem astringit modice, sed fortiter amarum est: ac proinde subdudum ventrem. Est autem tertij ordinis excicantium: calfacientium autem, aut primi intentum, aut secundum remissum. Ad haec uero, gratum est uentriculo medicamen, ut si quid aliud: & sinus glutinat. Sanat ulcera quae aegre ad cicatricem perdu-

ci possunt: & maxime quae in ano sunt & pudendo. Confert similiter si maceretur aqua, ad eorum phlegmonas, necnon eas quae in ore, naribus, oculisq; oboruntur. In summa, repellere & digerere simul potest, cum hoc ut paulum extergeat, quantum uidelicet ulceribus parum non sit molestum.

Alyssum.

Nuncupata est haec herba Alyssum, quod mirifice iuuat morbos & cane rabido. Sed rabiem quoque data, sepe in totum sanat, ob tonum substantiae similitudinis. Siccat autem digerit medicoriter, ac praeterea detergit nonnullum. Qua ratione uini ginem, & epithim purgat.

Albine, Auricula muris.

Haec quomodo essentiae sit aequae, citra astrictionem tum refrigerat, tum humidat. Quare ad ferutes phlegmonas & medioria et visipelata confert.

Amaracon, Maiorana.

Calfacit quidem in tertio ordine: in secundo autem siccat.

Ambrosia.

Illia uim habet astringentem, ac repellentem.

Ami.

Eius semen est admodum utile. Quum enim sit subamarum & aere, constat ipsum digerere, & prouocare urinas. Calfacit autem, resiccitque in tertio ordine in tensio.

Amaranthum.

Facultatis est incidentis & extenuantis. Quare coma eius cum uino pota, mentes educit: omnesque pota fluxiones defecat: stomacho infesta. Grumos etiam sanguinis dissoluere creditur.

Amurca.

Ex secundo est ordine calfacientia: at sicca uis intensio quodammodo magis, terrestri substantiae quom sit. Sic & ulcera corporum temperaturata siccorum curat: quae uero in alijs omnibus sunt, exasperat, periurum ut resina, pix sicca, & bitumen.

Ampeloparion, Porrum agrestis.

Est enim herba haec porrum agreste: ob idque acriter eo, atque siccus, ut agrestia omnia horrentibus. Proinde stomacho quam illud, nocentius. At crassos & lentos humores potius incidit, ualen nusi infarcta organa obstrukcione liberat. Haec quoque ratione sepe prouocauit urinas, ubi a crassus & lentis retinebantur humoribus. Adeo uere est calidum, ut illius cataplasmatibus riuus, exculceret.

Ampelos agria, Vitis agrestis.

Racemi eius extergendi uim possident: ac proinde cuncta extrema ulcera purgare possunt. Sed astrictionem quandam fornuatur extrema germina, quae & sale conditi assolent.

Ampelos hemeros, Vitis satua.

Vitis cultae assimilis facultas est agrestis, sed ad omnia imbecillior.

Ampelos leuce, uitis alba, Bryonia.

Prima huius germina vere edis solent, edulium uentriculo propter astrictionem acceptum. Ceterum subamarum, & modice aerem astrictionem possident: quare & urinam modice cient. At radix & obstringentem, & deficcantem uim habet, & moderatè calidam. Quam ob rem & lentes induratos liquat epota: cum sicubusq; foris imposita, pleor & lepram sanat. Porro fructus eius, racemi speciem praefert, ipsi qui coria deficiunt, est utilis.

Ampelos melana, Vitis nigra.

Vocatur autem haec proprie bryonia, praedix

Yy

Et ad omnia similia, nisi quoddam imbecillior.

Amygdala.

*Amygdalorum
veris.*

Quæ quidem palmam amara sunt, omnino ex-
nuandi uim possident. Siquid ephelim purgant,
& excretionibus ex pectore pulmonisq; crassiorū
lentorumq; humorū mirè auxiliant. Obstructio-
nes præterea iecinoris à crassis & uiscidis succis
tenuis expeditur. Quin & lateris, & lienis, & colici, &
renū dolores, ab huiusmodi causa natos persanant.
Ipsius aiboris etiā radices coctæ illitæ, epilepsia
purgat. Porro amygdala dulcia, quæ & ipsa nōni
hil sortiuntur amaritudinis, moderatè sunt calida.

Ammoniacum.

Ammoniacum.

Cuiusdā ferule est lachryma, intèram emollien-
ti uim possidens, adeo ut articulorū topiis dis-
soluat, & lienes induratos sanet, & chæra das per
hauri digerat. Amomum.

Amomum.

Acoro similit̃ facultatē obinet, nisi quoddā aco-
rū ficius sit, maiore autē concoquendi uim amomū.

Anagallis.

*Anagallis veri-
tis, facul. an.*

Anagallis utraq; & quæ cærulea, & quæ pur-
purea sunt florē, extergentis est facultatis. Habet ue-
rō nonnihil etiā caloris, & quandā trahendi uim,
quæ corpori infixæ extrahunt. Succus earū ex na-
ribus purgat eadem de causa. In summa, deficcā-
di uim habent citra mordicanonē. Quam ob rem
uulnera glutinant, & putrida corrigunt.

Anagyris.

*Anagyris facul-
tis.*

Frutex est grauior olēs, & digerētis, exalfaciē-
tisq; facultatis. Cuius folia uiridia tumores reprimunt
& resiccat, incidiētis sunt exiccētisq; posētig.
Similē ferē uim habet eius radice cortex. Semē au-
tem subtiliorū est partiu, uomitiū tamē prouocat.

Androsamū, Officinis Milseperforata, Hispani-
cis Coraconcillo, hoc est, corculum.

*Androsamū.
Milseperforata.*

Planta est fruticosa, natura duplex. Vnū enim
dicit̃ Alycon, species lyperici: alterū à quibudā
appellatur Dionysias. Est autem semen corū pur-
gatoriū: foliorū uerō facultas modicè extergens
& deficcans, ut & ambusta curare credantur. Ex-
terum in uino austro decocta, uinum ipsum uul-
nerum grandium glutinanturum effugunt.

Androsaces.

Androsaces.

Amata & acris est herba. Potēt autē resiccata
ebibitay tum ipsa, tum fructus eius, magno opere
prouocare urinam, & nimirum etiam digerere &
deficcare. Andrachne, Portulaca.

Andrachne.

Frigida & aquea est tēperie, paucy particeps au-
sterratis: proinde fluxiones repellit, maximeq; bi-
liosās & calidas. Estiq; terris ordinis refrigantiū:
humectantiū autē secūdi. Quare maxime æstiuam
rea adiuuat, tū uētriosculo imposita, tū hypochō-
disiæ præcipue in febris, heclicis. Præter ea den-
tium stuporem lenit. Quoniam autē restringit, utili-
ter dyentericis edis, & mulierib; profluuiū, & san-
guinis reiectionibus. Sed ad hæc sanè multo est
quā herba succus ipsius efficacior.

Anemone.

Anemone.

Radix cōmanā pituitā euocat, succus ē narib;
purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper
sordida ulcerū anemone expurgant, & leprās de-
trahunt, mensēq; apposite eliciunt, & lac trahūt.

Anethum.

*Anethum facul-
tis.*

Ad exalfaciē anethum, ut habendū sit aut se-
cundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccā-
tus uerō ordiuis est secundi incipientis, aut primi

finientis. Itaq; merito in oleo decoctum digerit,
dolorem sedat, somnum conciliat, crudos humo-
res concoquit. Vitum autem, tertij ordinis tum
calfacientium, tum excitantium sit. Proinde ulcer-
ibus nimis humidis prodest, potissimū ijs quæ in-
pu dendas cōsistunt. At quæ in præputio sunt in-
ueterata, ea probè cicatrice inducit. Ceterum uir-
de humidus & minus calidus est: itaq; magis cō-
coquit, & somnum conciliat, sed minus discutit.

Anthyllis.

10

Anthyllis utraq; modicè deficcāt, ut & ulcera
glutinet. At quæ chamæpipyi assimilis est, subtilio-
rum est partium, magisq; detergit, præterea comi-
talibus comperit.

Anthyllis utraq;

Anthemis, Chamæmelum.

Calfacit, & deficcāt in primo ordine, estiq; te-
nuium partium, ac proinde digerendi, laxandi, &
rarefaciendi uim obinet.

*Anthemis.
Chamæmelum.*

Anisi semen.

10

Calfacit & siccāt in tertio ordine. Proinde uri-
nam mouet, ac digerit, statusq; neutris reprimi.

Anisi semen.

Antirrhinum, Anzarinum.

Semen habet inutile, estiq; cum bubonio similis
facultas.

Antirrhinum.

Aparine, Philanthropos.

Aparine.

Modicè extergit & deficcāt, habetq; nonnihil
subtiliū partiu.

Philanthropos.

Apios, Prus.

Pin folia pariter & turiones, austera sunt. Ex
fructu autem, pars una terrea est, alia aquea. Ce-
terum utraq; frigida, necnon alia temperata. Pro-
inde estu pira stomacho grata sunt, & sitim probi-
bent. Illa autē deficcāt, modicèq; refrigerat. Vn-
de etiam uulnera glutinant.

Apios.

Prus.

Achradæ, Pira syluestria.

Magis quā pira reliqua astringunt et defic-
cant: ob idq; maiora uulnera glutinant, fluxusq;
reprimunt.

*Achradæ.
Pira syluestria.*

Apocynum, Cynocrambe, Cynomorum,

Syluestris mercurialis.

*Apocynum.
Cynocrambe.
Cynomorum.*

Canibus iuxta & hominibus est uenenum, her-
ba grauior olens, ob idq; uelementer calida: non
tamē proportionē deficcāt. Itaq; illita, admodū di-
gerentis est facultatis.

40

Argemone.

Et huius herby facultas absterforia est, & dige-
rens.

Argemone.

Arisaron.

Multō minus est aro. Radicē habet oliuæ ma-
gnitudine, sed multo est ipsa acrius.

Arisaron.

Aristolochia.

50

Radix eius est amara & subacris. Sed ex illis om-
nium subtilissima est, quæ rotunda. Aliarum uerō
duarū, quæ clematis appellatur, fragrantior est,
infirrior tamen. At longa, tenuitate quidem à ro-
tunda uincitur, abstergendi tamen calfacienti-
bus et ipsa potentiam obinet: minus sanè quā
rotunda abstergens et digerens, sed non minus cal-
faciens, imo forsā plus. Itaq; in quibus usus est
modicè absterfionis, commodior est longa: ut pu-
ta in ulceribus carne implēdis. At in quibus cras-
sum humorē ualidius extenuare oportet, illic u-
sus est rotunda. Proinde dolores à crasso spiritu
inductos, rotunda exactius persanat, extrahit spi-
cula, putredines corrigit, ulcera sordida purgat,
dentes et gingiuas spēdidas facit: auxilio est asth-
maticis, singulis sentibus, cominalibus, podagri-
cisy, si cum aqua bibatur. Tum ruptis & conuul-
sis, ut si quid aliud, medicamen idoneum est.

*Aristolochia tri-
plex.*

*Aristolochia ru-
tunda admodū
da opere.*

Arceuthus,

Arceuthus, juniperus.

Arceuthobium nigrum. Calida & sicca est tertij ordinis. At fructus, similiter calidus est: siccus tamen in primo ordine.

Arctium.

Quod Thapfo Verbalco est simile, radice tenera, candida, dulci, caule oblongo & molli, femine cymis simili, tenuius est partum: ob idq; facilius modice exsiccat & exurgens. Quamobrem radix ac semen eius in uino cocta, quadanrens dentium dolores mitigant. Porro ambusta & chymetalia non horum modo decoctū, sed & caules teneriores sinare possunt.

Lappa maior, Bardana.

Digerit simul & defiecat: astringit ramem nōni
hil: unde folia eius antiquis ulceribus profunt.

Arnoglosson, Plantago.

Refrigerat pariter & siccat in secundo gradu: habetis nonnihil austerum, ratione terreati partiū. Porro medicamenta, quæ cum hoc quod refrigerat, unâ etiâ astringunt, ea & ad ulcera rebellia omnia, & ad fluxiones & putredines cœnentes, ac proinde & ad dyſenterias. Nam & sanguinis

Ärmen.

Mediocre[m] extergendi vim possidet, estq[ue] primi ordinis calfacientium & exsiccantiu[m]. Radices eius comedie mediocriter humoru[m] crassitieri incidunt, ita ut sint excretionibus ex pectore idonee.

Artemisia.

Duplex est, utraq; ramen calfacit secundo ordine: intenso autem primo, aut secundo remisso desiccat: effig; tenuium partium: unde calculus renum, utriq; fomentatioib; haud mediocriter congruunt.

Argument

Radices eius facillate similes radicibus acori
sunt: intensiores tamen.

Aclepias.

Huius nondum nos periculum fecimus.

Aspalathos.

Acribus simul & astringens est. Quare partibus quidem suis acris exalfacit, austeris uero refri gerat. Itaq; utriusq; ratione deficiat; unde ad pu tredines & fluxiones est utilis.

Alparagus petrus.

Abstergendi uim habet citra manifestam caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac secur infarctu liberat, & maxime radices eius, & semen: quia & dentium dolores sanat.

Afolenum.

Tenuiam quidem partium, non tamen calida

est herba. Hac usque ratione lapides frangit, & li-
nes liquat. Astragalos.

Astragalos.

Radices astringentiores sortitur: quare non infre-
nuē siccat. Nam & ulcera glurinat, & aluum fluen-
tem sistit, si quis in utro decoctam radicē bibat.

After atticus. Bub

Partim quidem digerens est, partim autem refrigerans:uerum id non astringit.

Aftaphis, Vicia paffa.

Cultra quidem, concoquendi, affringendi, & leuiter digerendi, facultatē obtinet. At agrestis, uehemētis acris exilit, adeo ut ex capite purget, abstergatq; ualenter. Itaq; ad psoram accommodata est. Sed & urendi uim habet.

Aphrodete.

Huius radix extergentis est facultatis. Vtæ aũ-
cinis, calidior, exiccantior, subnrior, ac digerere
potentior existit: ac proinde alopecias sanat.

Arrectilis, Cnicus agrestis.

Facultatem habet deficcandi, & modicè digerendi: exi⁹ spinarum est genere.

Arraphaxis, Arriplex.

Humida quidem est in secundo ordine, frigida
uero in primo: est aqua similiter malum. Quia
& uentre celeriter permeat, ut illa, ob lubricitatem.
Horrentes aut atriplex & malus, q̄ agrestes, & um-
humidiores sunt, tum frigidiore: proinde phleg-
monis & phygethis incipientibus, horrentes illi
genibus aut & declinantibus, agrestes magis con-
ueniunt. Semen eius abferendi uim habet, fragi-
lescitur ab obstruente iccinoris ortu auxiliari.

Aphace.

Astringit, editurque ut ipsa lenticula: negrius tamen concoquitur. Ceterum ualentius deficcet, & moderari calor est.

Abies rhinatum.

Astrictoria, amarum, & acrum qualiterum fortitur, exsiccans, extergens, roborans, & exsiccat. Proinde biliosos ventris humores desiccat, ac per urinas euacuat. Verum contentam in ventre pituitam nihil adiuuat sumptis. Sic nec si in thorace aut pulmone cōtineatur nam affringens in eo facultas, quàm amara, ualentior est. Est autem calidum in excessu primo: sicci uero in tertio. At faccus longè quàm herba est calidior.

Balanus Myrepsica, Glans unguentaria.

Succo eius, qui calidus est, unguentarij utuntur. Reliquæ autē unde expressus est succus, vincentibz habent qualitatē amarā, cui admixta est quēdam astringitio. Proinde extergentem, incidentem, contrahentem, & siipantem effectum possident. Quod si quis carnē eius drachmē pondere, cum meliorato bitumē, medicamentū experietur uiciorum. Szpe etiam per infernū alium subducit largiter. Sed lienes liquar, icterij, iodurefcentia : ad quorū viscerum expurgatio nemine, ex oxycorto ipsam exhibere cōsuevimus. Ex aceto etiā lepra, pforas, lentos, utiligines, jonthos, ephelim, exanthemata, zchoras, alio-lygid genus cutis affectus extir. Abstergentē itaq; & incidentem cum astringitōe obtnet facultatem. Cortex autem eius admodum astringitiorū exitit.

Balsamum.

Balsamū deficcāt & exalfacit secundo excessu; est autem & tenuiū partium, adeo ut odoratiū sit. Eius lachryma subtiliorum est partium quā ipse

Balanus nuxi
pfa.
Glans rugosa

Opinion/Verdict:

Carpobalsamum

planta: non tamen adeo calida ut nonnulli existimant. Fructus eius persimilis facultatis est, longé tamen in subtilitate partium inferior.

Balaustium.

Ralaustium, Qytinus.

Flos est agrestis punice, sicuti domesticarum cyrinus. Valenter gustum asstringit. At uero si omne astringens terrestris est & frigidi, merito quis dixerit ipsum ualenter & exsiccare, & refrigerare. Quo nomine ulcera ad cicatricem perducit. Queniam ad sanguinis reiectiones, dysenterias, necnó uentris uterique profluuium, nemo est qui non hoc medicamentum utatur.

Barus, Rubus.

Barus, Rubus.

Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix, qualitate astringente, neque obscura, participat. Sed folia germinaque recens nata plurimum in se habent substantie aqueae, parú uero astrictionis. Quare uulnera glutinant. At fructus maturus, non parú habet succi calidi reperiati, qui existit dulcis: ob idque, & ob modicam astrictionem, non est insuauis gustui. At immaturus, acerbus est, & ualide exsiccat. Ac sane uterque reconditur, ualidius quam recens deficeans. Flos eandem uim fructus immaturo possidet. Vtrique ad dysenterias, uentris profluuium, robur deperditum, sanguinisque expulsiorem sunt idonea remedia. Radix præter astrictionem, non parum habet substantiam in se tenuem, per quam & lapides renum cōminuit.

Batrachium, Ramunculus.

Batrachium, Ramunculus.

Huius omnes quatuor species adeo acres existunt, ut cum dolore exulcerent. Quare si cōuenienter utare, pforas & lepras excoriant, & ungues diuellunt. Tum leprosis stigmata digerunt, & uerrucas detrahunt. Quin & alopecias iuuant exiguo tempore admorsæ. Radix arefacta sternutationem prouocat. Sed & dentes dolentes iuuat, sic ut eos frangat. Est itaque ualde calida & sicca, tum radix, tum uniuersa herba.

Bdellium.

Bdellium.

Quod Scythicum nominant, estque acris & resinosis, emollientis admodum & efficacis uirtutis est. Arabicum autem, quod splendidius est, magis quidem emollientia exiccat: uideturque in poru sumptum calculos tenuem frangere, tum urinas ciedere, & crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores, rupturasque sanare.

Bechion, Tusisilago, Vngula caballina.

Bechion.

Tusisilago.

Vngula caballina.

Tusis & orthopneas iuuare creditur, si quis folia arida aut radicem in prunis urens, ascendentem inde fuliginem inspirauit attrahat. Est autem modicè acris: ut sine molestia, noxæque, omnes thoracis affeetus credatur rumpere. Folia olirena partem recentis phlegmone obfusa illitu adiuuant. Blutum.

Blutum.

Holus est esculentum, humidè frigidèque temperaturæ in secundo ordine.

Bulbus fatuus.

Bulbus fatuus.

Frigidior quidem & crassior agresti est, lentiusque succum procreat. Nam & coctus difficilis est & stultus, & uenere prouocans. Arramen illitus ob amaritudinem simul & astrictionem absterge simul & glutinat, & nimirum etiam exiccat.

Bulbus uomitorius.

Multo est calidioris temperaturæ quàm superior.

Bubonium, Alter arcticus.

Creditur sanare bubonas & illitum, & alligatum

inguini. Digerit enim mediocriter, quia modicè est calidum. Ceterum non ita siccatur, ut tendat.

Buglosson.

Humidè calidèque temperies est, uiniq; iniectionis hilaritatis causa esse creditur. Sed gutturis etiam lenit aspreddinem, si melicrato coctum sumatur.

Buglosson rano, insectum hilaritatem prouocat.

Bunium.

Bunium.

Adeo exsiccatur, ut & urinas moueat, & menses prouocet.

Buphthalmos.

Buphthalmos.

Flos eius floribus chamæmeli est tum maior, tum acrior uel ementiensque digerit, adeo ut & duritias sanet, cerato mistus.

Brachy, Sabina.

Brachy.

Sabina.

Quantum in acrimonia cupressum uincit, tantum ab eo superatur in astrictione: quare illo & calidior est, & potèntius digerit. Quin & similiter cupressi putredinibus accommodari potest, maxime ubi rebelliores fuerint, & diuturniores. Carbunculos itè soluit: mensesque, ut si quid aliud, essentie tenuitate prouocat, & sanguinem per urinas mouet. Fortum etiam uiuentem interficit, & mortuū educit. Est autem hoc medicamentum tertio ordinis tum exsiccantium, tum excrementum, ex numero eorum que uel maxime tenuium sunt partium.

Britanica.

Britanica.

Huius folia asstringentia sunt, & uulnerum glutinatoria, similia agrestibus lapathis. At expressus ex illis succus perinde natus est asstringere, uideturque sanare iam putrescentes.

Bromus.

Bromus.

Illitus desiccatur, digeritur mediocriter & sine morbo. Temperiem autem habet paulò frigidiorē. Nonnihil etiam astrictionis obicit, ut uentris profluuium iuuat.

Bryon thalattion, Alga.

Bryon thalattion.

Alga.

Compositum est ex terra & aquea essentia, utraque frigida. Siquidem & gustum asstringit, & calidus quibusuis illitus, eare refrigerat, adiuuatque.

Bryon aut Splanchnon, Muscus.

Bryon.

Splanchnon.

Muscus.

Vim habet asstringentē in ualidam, ceterū mediocriter frigidā. Nam & digerendi, & emollienti facultatis est particeps.

Gallium.

Gallium.

Inde nomen sumpsit, quod lac coagulet. Facultatem autem obtinet exicatoriam, & subaerem. Flos eius competere sanguinis profluuijs uidetur, & combustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

Gentiana.

Gentiana.

Huius radix efficacissimè extenuat, purgat, abstergit, liberat obstructione, utpote impenie amara existens.

Gigarta, acinorum uux nudel.

Gigarta.

Acinorum uux.

femina.

Ex secundo exicantiū sunt ordine: refrigerantium uero, primo. Omnis autem uentris cum profluuiio iunctis affeibus, impendio cōferunt, utpote quum acerbis appareant.

Gingidium.

Gingidium.

Gustu amarum & astringens quum sit, temperie calidum frigidumque uidetur. Secundo utraque uero qualitatē deficeatorum est. Cetera porro stomacho amicum existit.

Glaciucum.

Glaciucum.

Astringit cum quodam fastidio: tum adeo infignier refrigerat, ut solum sicpe erysipelata, si ualentia non fuerint, curare possit. Constat enim ex aqua terraque substantia, utraque frigida.

Glaux

- Glaux herba.** Ex lactificinis quum sit, calida quodammodo humidatq fuerit.
- Glaux.** Glection, Pulegium.
- Glaux.** Quandoquidem acris & subamara est, ualde extenuat & calfacit. Quare & illa rubricat, & exulcerat si diutius hæreat. Quin etiam humida, crassa, & lenta, ex thorace & pulmone excreta scilicet facit, mensensq mouet.
- Glaux.** Glaux, strigementa balnearum.
- Glaux.** Modicè emolliendi uim obinet.
- Glaux.** Glycyrrhiza, Dulcis radix.
- Glaux.** Similiter radici ipse succus, dulcis leuiterq astringens existit. Proinde non modò asperæ arteriæ, sed uicæ etiam scabritudine lenire potest, idq temperaturæ mediocritate. Quare fuerit sanè natura eius familiaris nostræ temperaturæ. Ceterum tepidam quandam caliditatem sortitur. Porro quoniam temperie quoque est humidum, id quod modicè est dulce, iure sanè etiam sit congruens medicamentum est, nimirum modicè humidum, humanatq natura frigidas. Dioscorides ait, arefactæ radicis pollinem unguibus oculorum mederi.
- Glycyflida, Præonia.**
- Glycyflida.** Radicem habet leuiter astringentē, cum quadam dulcedine: ar si pluculum dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamaram subelle percipies. Proinde menses ceteros meliorat, amygdali pota quantitate. Expurgat porro etiam iecur obstructū, & renes: uentrisq sinit fluxiones, si in aliquo austero uino colata iumatur. Est præterea omino reficatoria: quare ex collo pueri in suspensa, merito comitiali morbum perfunat: idq aut aliquem à se fluorem per infantuli inspirationem immittens, aut aerem absidue mutat, atq alterum reddens. Nam hoc pæsto succus Cyrenæicus columellam phlegmone affectam iunat: & melancholicum palam catarrhos & coryzas deficiat, si quis id in calidum linteum rarum liget, asiductq calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. Quinetiam si compluribus linis, & maxime maris purpuræ, collo uiperæ iniectis, illis uiperam præfoces, eaq postea cuiuspiam collo obuincias, mitificè profueris, tum paristhimijs, tum omnibus his quæ in collo expullulant. Præonia itaq & excicat, & tenuiū est partium: calfacit autem mediocriter.
- Gnaphalium.**
- Gnaphalium.** Folia eius modicè astringunt: quare ex aliquo uino austero dysentericis profunt.
- Gongilis, Rapum.**
- Gongilis.** Gongilidis semen uenerem excitat, utpote spiritum flatuosum glignens. Sic & radix coctū difficilis est: multatq & semen generat.
- Damafoium, Alisma.**
- Damafoium.** Decoctum radicis eius calculos renum comminuit. Quare absterforæ facultatis est percipere.
- Daucus, Staphylus.**
- Daucus.** Domesticus est aprior, sed imbecillior, acrem calidamq facultatem sortitur: ac prouide etiam extenuat. Ac radix sanè flatuosum quid obinet, ac uenerem. Semen autem, domesticum quidem, & ipsum quandam ad Venere tendi potentia possidet: agrestis uerò planè statū caret, ac prouide urinam mensensq ciet.
- Dauci semen.**
- Dauci semen.** Adeo uehementer excalfact, ut inter prima, tum urinam, tum menses prouocet. Multum etiam digerere per halitum foris impositum ualeat. Ipsa uero herba, moderate calida est, similemque etiam uim obinet, ceterum infirmiores.
- Daphne arbor, Laurus.**
- Daphne.** Huius folia calfaciunt & siccant uehementer: at fructus adliu uehementius. Radicis cortex minus quidem acris est & calidus, ceterū plus amarus: habetq etiam astringentis nonnulli. Quamobrem & calculos confringit, & iecori prodest. Bibitur ex uino fragrantem quum obolorum pondere.
- Daphne herba, quum Alexandrinā appellant.**
- Daphne herba.** Euidenter est calida, acris, & subamara: potatq tum urinam, tum menses prouocit.
- Chamaedaphne.**
- Chamaedaphne.** Per similia quid est uiribus daphnæ Alexandrinæ siccari & quod daphnoides uocant.
- Distamnium.**
- Distamnium.** Tenuioris essentia constat quā pulegium, cetera illi simile. At pseudodistamnū ad omnia imbecillius existit.
- Dipsacus.**
- Dipsacus.** Dipsacis spinæ radix ex secundo ordine excicatoria est, habetq nonnulli & absterforum.
- Dorycnidion.**
- Dorycnidion.** Aquea excellit frigidityte. Quamobrem pauculum quidem soporem conciliat: pluculum uerò sumptum, perimit.
- Dracontium, Dracunculus.**
- Dracontium.** Quiddam pro per simile obinet, tum folijs, tum radice. Ceterū illo acris est, & amarius: ac prouide calfacitorum uagis, & tenuioribus partibus. Habet etiam & astringentem leuculam. Radix omnia uiscera expurgat, optimūq remedium est contumaciū ulcerum. Verum extergit etiam cetera omnia quæ extersione desiderant. Folia præterea similem facultatem sortiantur, ob idq si sunt uiridia, recentia uulnera glutināt. Fructus ualentior est, non folijs tantum, sed radice. Itaq & caneros, & polyposas creduntur eliquare. Succus eius quoq uicia oculorum expurgat.
- Dryopteris, Filicula.**
- Dryopteris.** Dulcis, acris, amara, & in radice etiam acerbior existit. Habet aut facultatem putrefaciendi: proinde pilis labram curim efficit.
- Drys, Quercus, Robur.**
- Drys.** Exiccandi astringendiq possidet facultatem, cum mediocri quadam tepidatq caliditate. Ceterum plus ceteris eius partibus astringit, quæ in trunci cortice membrana subest: tum quæ ipsius fructus conuenit carnē. Quamobrem ad profluuiū muliebres, sanguinis expunctiones, dysenterias, & diuturnos uentris fluxus esse credunt accōmodam. Valentius tamen astringunt fagus & ilex. Quarum plantarum folia tenella illa non in hinc nūc deficiant, nec non uulnera glutināt. Eandem folijs uim habet & fructus roboris: eolq Medici nonnulli utuntur ad incipientes atque crescentes phlegmonas.
- Ebuscus, Althea, Agrestis malua.**
- Ebuscus.** Facultate digerendi, laxandi, phlegmone liberandi, mirigandi, & concoquendi difficiles coctū affectus est prædita. Ceterum & radix & semen quā folia, & tenuiorum sunt partium, magis

exicatoriam & exterioriam facultatē ostendunt, ut & ulnigines detergant, & semen renem calculos frangat. At radices decoctum, ad dysenteriam, diarrhoeam, & sanguinis reiectionem est aptum, quum uirum etiam nonnihil astringat.

Ebenus.

Ebenus. Ex ipsa lignis est, quae trita in aqua soluitur. Vis ei inest exalfaciendi, extendendi, & tenuium partium. Quamobrem, quae pupillae offuscant, extergere creditur: misceturque alijs ocularibus medicamentis.

Elaea.

Olea.

Oliuae rami quantum habent astringitionis, tantae sunt frigiditatis participes. Fructus uero, si quid ad unguem maturuit, moderate calidus est: sin im maturus, magis tum astringit, tum refrigerat.

Elxon, oleum.

Eleos.

Oleum.

Oleum quod ex oliuis exprimitur, humectatorium esse, & moderate calidum, iam supra docuimus. Eiusmodi est, quod est dulcissimum: sitque potissimum ex oliuis quas druppas appellant.

Olei diffinitio.

Ceterum quod omotribes & omphacinum nuncupant, quale ab Hispania uenit, id quantum in se habet astringitionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleū uetus quod quidem ex dulci in ueterato efficitur, & calidius est, & potentioribus ad euaporandū uiribus: quod uero ex crudo, id, dum reliquum quippiam seruauerit astringitionis, mixtae permanet facultatis: ubi uero illam prorsus abiecerit, reliquo euadit simile. Quin etiam quicumque in preparando ramos insiciunt, si omphacino simile oleum efficiunt. Porro quod oleum lotum minime omnium mordacitatem contineat, supra etiam traditum est. Sunt autem uaria oleorum genera: quibus sanē cicutum & tenuius, & ad discutiendum potentius est, quam simillimum olen ex oliua uetulo. Raphaninum autem, cetera huic est simile, sed calidius rament. At hoc etiam calidius sin apinum: cui simile est quod ex melanthio conficitur. Pugnans cum istis myrtinum & sesaminum, tum quod astringant, tum quod crassarum sint partium. Mixtae facultatis est leniscinum, terebinthinum, & mastichinum. Non enim tantum emolliunt, sed & astringunt. Amygdalinum porro amaritudinem exuperatorem possidet, ceterum cuiusdam astringitionis est particeps: non tamen caryinum, sed id uel maxime simplicis est digerendi facultatis. Calidius eo est laurinum, & hoc etiam magis, cedrinum. Proximum ei est quod ex nigra specie conficitur. Dadinum, minus quidem laurino calidū, uerum ualentius deficcans. Hypocycinum uero mistae facultatis est, emolliendi uidelicet, ac refrigerandi. Oleum porro cicutinum, uentrem subducit. Hoc uero magis, quod sit ex Gnidio grano. Quod ex aggregati oliuae exprimitur, extergit, si multum astringit. Squalidissimum emolliens est ex omni olei genere: & post, istricum quoque, deinceps illis Hispanum. Anguisimum est Lybicum, & Cilicium: simul autem pingue & tenue, Sabinum. In medio comprehensorum omnia sunt, tum id quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Graeciam, Asiaticum.

Oleum pingue, immodice quatuor admodum tenuius.

Etenim oleum pingue estimatur uiscositate: tenue uero, si pellucet, si purum sit, si plurimum minima eius portio inuiscetur, si facile a cuti combibatur. Omne autem oleum pro cuiusque insectorum natura uariari contingit.

Elatine.

Modice tum refrigerat, tum astringit.

Elaphoboscos.

Exalfacit, & tenuium est partium: ob idque exiccat, maxime in secundo ordine.

Elenium, Enula campana.

Radix eius calida & sicca est cum recrementitio humore. Quare elegantiis quae faciunt ad educendos crassos ex pectore succos, idonee miscetur. Iuuat etiam ad rubrificandas partes uexatas frigida diuturnius affectibus.

Elidiphacos, Saluia.

Euidenter exalfacit, ac leuiter subastringit.

Helleborus, Veratrum.

Tam albus quam niger helleborus extergentis calfacientissus est: potentius. Quamobrem ad albos, lichenas, pforas, leprasque, accedendi modi sunt. Quin etiam niger si in fistulam callo induratum infundatur duobus tribus diebus, callū detrahitis. Denique prodest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine exalfacientium & deficcantium. Porro niger gustu calidior est, candidus amarior.

Helxine, quam Parthenium uocant.

Abstergit, constriungit cum humiditate subfrigida: unde phlegmonas incipientes usque ad augmentum sanat, maxime si calide fuerint. Incipientibus etiam phygethitis cataplasmatibus ritu illinitur: ad auriumque dolores phlegmonosos succus eius instillatur, sicuti ad paristhima gargari-
zatus, conducit.

Helxine, quam cissampelon uocant.

Digerendi obtinet facultatem.

Elynus, Meline, Panicum.

Facultate pauci nutrimenti est, & exicatoria. Sisti nonnihil uentris fluxus, ut milium. Si uero foris illinatur, exiccat atque refrigerat.

Empetron.

Ad solas purgationes esse uidetur commodū, bilem ac pituitam educens: iuuat rament ad alia, gustu salsum existens.

Epithymum.

Thymi facultatem habet, ad omnia efficacius.

Exiccat & calfacit in tertio gradu.

Epimedium.

Refrigerat moderate, cum aqua humiditate.

Verbis illius, sacra est ad seruare potest. Aiuat uero, si potu hauriatur, sterilitatem parere.

Epimelis, Pomus syluestris.

Fructus eius acerbus est, stomacho tamen in-
gratus, & capitis mouens dolores.

Erebithus, Cacer.

Legumen est baruosum, copiosi nutrimenti, alio mouendi habile, eiendae urinae idoneum, lacti & femini generando aptum. Proliciter uero & mens. Ceterum quod arietinum dicitur, efficacius urinam prouocat: cuius decoctum renem calculos frangit. Reliquum erebithorum genus eadem ui pollet, pura attrahendi, digerendi, incidendi, extendendi. Sunt enim calidi & modice sicci: particeps irem amaritatis, cuius ui & lenis, & iecur, & renes expurgant, pforasque, & lepras, & lichenas extergunt, tum paroidas & testes induratos discutiunt, tum ulcera maligna cum melle sanant.

Erebithus aggregis.

Calidior & sicciior domestico est, quantum & acrior & amarior existit.

Erica.

Erice.

Digerendi per halitum facultatem obrinet: sed præcipue flore eius ac folijs utendum.

Herpyllus, Serpyllum.

Serpyllum. Viqueo deo calcificat, ut urinas & menses moueat.

Herpyllus. Edity & gustu admodum acre.

Erysimum.

Erysimum. Semen eius igneum est, & callosiorum. Vile est cum elegantius ad promouendas crassiores ex pectore expunctiones. Quin & parotidis induratas, & duritias antiquas ubero & testiculorum, iuuat: & ut Dioscorides ait, etiam occultos cæcos.

Erythrodanum, Rubis pasciua.

Est autem nictorius, Rubis, radix acerba & amara: quare liem, & secur expurgat, & urinas crassas, multas, & inter dum sanguinolentas promouet. Quin & menses ciet, extingitque mediocriter. Proinde uirgines albas cum aceto illa iuuat.

Eupatorium.

Eupatorium. Tenuium est partium, incendiū & extergendi uim, citra manifestam caliditatem, obrinet: quocirca obstructions iecoris aperit. Inest ei quædam etiam astrictio, per quam robur uisceri addit.

Euphorbium.

Euphorbium. Vrentem & tenuiū partium facultatē fortitur. Ephemerum, Iris agrestis.

Ephemerum. Astringit quidem, estque suavis odoris. Quare & repellit, & per halitum digerit. Non inefficaciter autem radix eius in dentium dolore colluitur. At folia cocta in uino, phymetum augmento & statui congruunt.

Echinus herba.

Echinus herba. Fructus eius acerbus est, atque idcirco repellentis facultatis & excitatorie. Vtuntur eo ad oculorum auriumque fluxiones.

Zeia, Spelta.

Zeia, Spelta. Vniuersa sua facultate, quodammodo in medio est tritici & hordei.

Zingiberis radix.

Zingiberis radix. Escalfacit, sed non primo statim occurru, ut luti piper: unde sanè & minus esse subtilium partium, quam piper existimanda. Etenim illaboratam quandam, & crassam retinere in se uidetur humiditatem, quemadmodum piper longum. Quare diutius persequatur quæ proficiscitur a zingibere, aut pipere longo caliditas, quam quæ ab albo, aut nigro. Porro ubi totum corpus celeritè calfacere cõsilium est, ea tunc exhibenda sunt, quæ & celeritè a caloris nostri contactu incallescant, & promptissimè undequaque ferantur. Verum ubi partem quamuis refrigeratam recalfacere studemus, contra agendum: nimirum quæ tarde calefcentia, plurimo tempore perdurēt, ea præbendo. Cæterum licet zingiber & piper * longum hæc ratione a nigro pipere differant, non magna tamen est differentia. At nasurtium, nappi, thapsia, & agrestium columbarū sterus, maiori tempore perfecte accenduntur, & plurimo tempore perdurant.

Zythus.

Zythus. Non parum est serior hordeo, succique præui, quam ex putredine oritur. Est & statuosus, ac partim acris & calidus: parte uero plurima frigidus, aqueus, acidus.

Zyme, Fermentum.

Zyme, Fermentum. Tenuium est partium, & mediocriter calidum:

proinde citra molestiam quæ in profundo sunt extrahit & digerit. Particeps autem est aciditatis cuiusdam frigidae, & caliditatis ex putredine natæ. Cui accedit ea quæ a sale est, * & quæ etiam a farinæ naturæ.

Hedyosmos, Mentha.

Tam mentha, quam calamintus, gustu aeris, & facultate calida est, ex tertio calfacientiu ordine. Infirmitas tamē est mentha, & minus ex calfacientibus mediocriter ad Venetum excitat: id quod omnibus accidit, quæ humiditatem semicõctam & struosum continent. At calamintus, quum ualentius calfacit & exiccat, habet etiam quiddam amarum in se, atque acerbum. Quare illo quiddem lumbricos perimit: acerbissime uero, si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimi. Substantia est, ut si quæ alia herba, tenuium partium.

Hedyosmos.

Huius semen amarum & subacribum apparet: ob idque potum stomacho graui exstitit, uiscerumque obstructions expurgat. Idem præstatur totius fructus germina.

Hemerocallis.

Radice habet huiusmodi similem, & figura & uiribus: prodegit ut illa, igni ambus, nimirum leuiter digerens, tum nihil astringens.

Hemionitis.

Astrictionem simul & amaritudinem possidet. Quamobrem cum aceto pota lienosis auxilium est.

Erigeron.

Refrigerat & modicè digerit.

Eryngion.

Calore quidem est temperatū, non paruam tamen siccitatē fortit, consistentem in tenui essentia.

Thalietrum.

Folia habet corisandro similia: caulem crassitudine rutæ. Vis eis iussit citra morium excoctoria. Itaque ulcera inueterata ad cicatricem perducit.

Thapsia.

Acritè habet ac ualentè excalfacientē facultatē cū humiditate coniunctā. Quare ex alto uiolenter extrahit, & quod extraxit, digerit: celeriter tamen corrumpitur.

Præsertim aqua, amaritudinē exiit, edity potest, sed nutrimentum fit crassi succi. Vbi uero natiua etiam nūi maritas permanet, extergendi, digerendi uim obtinet. Interficat autem lumbricos, tum illius, tum addito melle linctus, tum ex posca eponus. Quin & decoctum eius lumbricos eicere potest: tum etiam foris identidem persusum, uirgines, achoras, exanthemata, piores, gangrenas, maligna ulcera, iuuat. Expurgat iecur & liem cū rubeo pipere susurris graris sumptum. Elicit menses & steru cum myrris & melle impositum. Lupinorum porro farina, etiam moridicatione digerit: nec liuida tantum, sed & chertæ & phymæ curat, si in aceto, aut oxymelite, aut posca coquatur.

Thermos agrios, Lupinus agrestis.

Amarior est, & ad omnia ualentior domestico, eiusdem genere cum ipso facultatia.

Thlaspi.

Semē eius facultatē acrem fortitur, adeo ut internos abscessus poris diffumat, Menses ciet, & fortum enecat. Per sedem infusum sanguinolentia

Hedyosmos.
Mentha.

Calamintus.

Hedyosmos.

Hemerocallis.

Hemionitis.

Erigeron.

Eryngion.

Thalietrum.

Thapsia.

Thermos.

Lupinus.

Lupinorum farina quib. morbu melioratur.

Lupinus agrestis.

Thlaspi.

euacuans ischiadibus prodest: euacuaturque superne & inferne bilem oxybaphi mensura epotum.

Thridax, Lactuca.

Thridax. Humida & frigida est, secundum aquae fontanæ frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas, & ad paruas & leuiae erysipelata, est comoda: praeterea restinguat sitim. Ariemen potum, genituræ profluuiū cohibet. Sic & agrestis lactucæ semen. Caius holeris colligitur succus, argemae & caliginis purgans, inungitur ad aduersiones cum lacte muliebris solutus.

Thymum.

Thymum. Incidit & calfacit uehementer, ob id iurinum & menses prouocat, sicutum euellit, potum uiscera expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert, ac denique exalfacit exiccat in tertio ordine.

Idra radix.

Idra radix. Admodum gustu est acerbæ. Quare sanguinis effluuiis, lientæ ias & dysenterias, mensesque fluentes suppressit, tum pota, tum enī admodum extrinsecus.

Ixos, Viscum.

Ixos, Viscum. Ex plurima aëre & aqua, paucissima terrena substantia constat. Quare ex alto humores extrahit, eosque diffusit & digerit. Tempus autem ut calfiat postulat.

Ios, Viola.

Ios, Viola. Violæ folia aque & subfrigida substantiam superantem possident. Proinde tum per se, tum cum polemta illita, calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori uentriculi æstuanti, & oculis.

Hippuris, Cauda equina.

Hippuris. Astringente cum amaritudine facultate possidet, ac proinde ualenter exiccant, sed circa morsum. Itaque uulnera etiam maxima glutinat, uel si perfectos esse neruos contigerit. Praeterea uocatas enterocelas glutinat: necnon sanguinis reiectiones, fluentes menses, dysenterias, ceterosque alui fluxus coarctet. Succus uero eius prodest sanguinis eruptioni per nares, & fluxui obnoxio in uentre passionibus, ex austeriorū uinorum quopiam epotus: ac si febre teneantur, ex aqua.

Hippomarathrum.

Hippomarathrum. Vul cum fomiculo & de ipso differemus.

Maria.

Maria. Domestica quidem qua utuntur tinctores, facultatis est ualenter exiccantis, nondū tamen mordentis: est enim simul amara & astringens. Proinde magna uulnera corporum durorum glutinat: & sanguinis profluuiū laborantibus paribus utiliter illinitur: tumores laxos mirifice digerit, simul ac reprimat, & aduersus omnia maligna ulcera mirabiliter resistit. At istas sylvæstris manifeste iam acre quiddam, tum gustu, tum actione praefert. Proinde quā domesticæ magis deficiat, ualentiore etiam putredinibus obstitit: ad cetera iam comprehensū deterior.

Isopyron, Phasiolon.

Isopyron. Semen habet amarum & subacribum. Extergit itaque & incidit humores crassos, cum hoc ut corpora contrahat, constringatque. Quare excretionibus pectoris confert, & iecur expurgat, crediturque iuuare hæmopticoles.

Irea, Salix.

Irea, Salix. Salicis folijs ad cruenti uulneris glutinationē uti possumus. Verū floribus eius maxime prope omnes utuntur ad exiccantis emplastri præparatio-

nem. Est enim uis eorum ita deficcatoria, ut morbo abstinere. Habet uero etiam quandam astrictionem. Porro succus expressus medicamen exiccatorij existit, expressus mordacitans. Nec enim inuenias aliquod medicamen ad plures res utilem eo, quod citra mordacitatem exiccat. Arboris cortex similis facultate obtinet, tum floribus, tum folijs, nisi quod temperatius siccioris existit, ueluti omnes cortices. Etenim cinere corticis macerato in aceto, nonnulli callos atque myrmecias tollunt.

Salix cortice cinere macerato in aceto, callos atque myrmecias tollunt.

GAL. DE SIMP. medicamentorum facultatibus lib. VII.

Calamintha, Nepira.

Calamintha. Essentia quidem est tenui, temperie autem calida & sicca, quodammodo in tertio ordine. Est enim acris gustu, paulumque amaritudinis obtinet. Extrinsecus admodum, primum quidem ualde exalfacit & mordicat, cutemque exigit: postremo etiam ulcus efficit. In corpus autem intro assumpta, tum ipsa per se sicca, tum etiam cum melicrat, perspicuo calfacit, atque sudores ciuit, omneque corpus tum digerit, tum exiccat. Idcirco ea contra rigores repetentes per circuitum nonnulli utuntur, sicuti & contra ischiadicos morbos: trahit enim quæ in profundo hærent ad superficiem, totumque adeo articulum exalfacit, & cutem non obscure adurit, mensesque tum epota, tum apposita, admodum efficaciter prouocat, ac denique elephantiasis etiam probe auxiliatur. Praeterea cicatricibus aris candorem restituit, & sugillata digerit. Praestat autem in huiusmodi, ubi in uino decoxerimus, ipsam emplastri ritu apponere, & uiridem magis quam siccam. At sicca, ad uenentiarum bestiarum morsus assumitur: ueluti etiam cauteria, & quæcunque medicamenta calida sunt & acris. Succus eius aut infusus, aut epotus, ascaridas, lumbricos, & aurium uermes necat. Sic & conceptum interimit, eicitque. Igitur incidendi quidem ei uis adeat, ob calorem, tenuitatem, amaritudinem: abstergendi uero, propter solam amaritudinem. Quare asthmaticis atque ictericis conuenit. Ad omnia tamen dicta, montana efficacior existit.

Calamus odoratus.

Calamus odoratus. Leuiculam quandam astrictionem, ac minimam acrimoniam possidet. Siquidem magna ex parte essentia quidem eius terrena est, & acris: temperies autem, calida & sicca in secundo excessu, uisi quod ualentius deficcet. Porro moderate mouet urinam: ac facultatibusque morbo lecori stomachoque imponuntur, necnon his fontentis quæ inflammato utero, aut mouendis mensibus administrantur, commodissime potest misceri.

Calamus phragmites, Canna.

Calamus phragmites. Radix eius cum bulbus, aculeos stipitesque infixos extrahere ex alto traditur. Etenim abstergentem, minimèque acrem facultatem forsitur, quem admodum & ipsa folia. Cortex uero combustus, admodum tenuium parium & digerentis facultatis efficitur, cum nonnulla absterfione, ut exiccet & calfaciat tertio quodammodo ordine. Ceterum eius flos est uitandus. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter hærens affigitur, ut aulli non possit, auditumque uliat.

Calami flos uis auditum.

Canca-

Cancanus, Caciala.

Cancanus.
Caciala. Radix cancani, crassam, emplasticeam & exsiccatam habet essentiam, sed mordacitatem experitur. Quare macerata uino, sicut tragacantha, & lincta, aut cōmanā, arterie asperitates sanat.

Cannabis.

Cannabis fo-
mina. Cannabis semē adeo status discutit exsiccat, ut si largius edatur, genituram absumat.

Cappinos, Fumaria.

Cappinos.
Fumaria. Acris, amara, & a cerbe qualitatē est participat. Quāobrem urinā biliolam, multamque procreat: sanatur tum obstructiones, tum imbecillitates iecinis. Succus eius oculos aciem acuit, nō parū trahens lachrymarū, ueluti ipse fumus.

Capparis.

Capparis radice cortex uincetū habet qualitatē amarā, proximā acrem, deinde acerbam: ob idly pugnantiū facultatibus constat: quippe abstergere, purgare, incidere, potest amritudine: ex calcare, incidere, digerere, acrimonia: contrahere, densare, astringere, acerbitate. Quare lienes induratos, si quid aliud, maxime potest iuuare, tum foris medicamentū quē illi nuntur admissus, tum intra corpus assumptus, siue decoctus in aceto oxymelitetur, siue cōtus atque illis permixtus. cum nimirū crassos lentosque humores aperit hoc pacto sumptus euacuet: nec eos tantū per urinas, sed per uentrem enam sepe sanguinulentos deferunt: & lienes adiuuati sunt, & coxarum dolores. Quinetiam menses

Capparis radi-
cu cortex iuuat
et foris adhibi-
tur, quā melior-
tur.

Capparis fo-
lia et folia. Capparis radice cortex iuuat et foris adhibetur, quā melioratur. Radix corni fructus proportionē respondet, nisi quod ad omnia fit imbecillior. Imō & folia, & caules similem etiā uim obtinent. Admiscemus tamen illis aliquid, quod eorum uehementiam obtundat. Nec mirum est, quod aurū uermes sua perimant amaritudine.

Cardamum, Nasturtium.

Cardamum.
Nasturtium. Nasturtii semen adurens facultatis est participat, ueluti napy. Proinde omnia quę rubrificationem possulant, eo ex calcaciūt. Miscetur quoque remediis quę exhibentur asthmaicis, tanquam ualentem crassos succos incidere ualeat. Porro & herba arefacta, semini similem facultatem sortitur. Nam quę humida est & uiridis, multis numeris inferiorem.

Cardamomum.

Cardamomum. Quāto suauius magis fragrans nasturtio est, tantō & imbecillior ei calida facultas uest. Nec enim ulcerare est idoneum. Habet autē adiunctū quiddam amaritudinis, quā lumbricos interficit: & cum aceto ualentem piores detergit.

Caron.

Caron. Cari semē calcacit & exsiccat tertio quodāmodo ordine, moderatē acré possidentē qualitatē. Itaque & status exstinguit, & urinas ciet, tum semē, tum planta.

Cassa.

Cassa. Exsiccat & calcacit tertio quodāmodo ordine: & tenuiū admodum partium est, habetque

acrimonie plurimum, ac leuiter nonnihil astringens. Incidit itaque simul & digerit, oburi instrumentis addit. Quare mēibus est mouendis idonea, ubi a copia simul & crassitudine illi suppresis fuerint.

Carya, Nuces.

Arbor tum in folijs, tum in germinibus astrictionem quandam possidet, ceterū euidētem multatū in nucis putamine recentī pariter & sicco. Eius autem succo expresso, ac melle decocto, nos uice stomatichi medicaminis utimur. Oleum quod ex fructu elicitur inueterato, admodum per halitum digerit. Quare nonnulli eo gangrenas, carbonculos, & xyglopos sanant. Sunt qui ad neruorum uulnera utantur. Ceterū si recens sit, astringens nonnihil qualitatē obinet. Nucleus arefactus & ustus, tenuium partium & exicatoriū circa morsum est medicacit. At pontica nux, quam *auxandropis* & *auellani* appellant, plus habet essentie terrestris ac frigide. Itaque a steriō tum cortex, tum planta, tum fructus apparet.

Caulalis.

Excalcacit & deficcacit. Præterea urinam ciet, muralia ad reposicionem conditur.

Carpesium.

Simile est ualeriani, tum gustu, tum facultate: sed plus habet tenuitatis. Proinde magis ea uiscerum obstructiones extergit, etiam mouet, renemque calculis degrauiatos expurgat.

Cenchrum, Milium.

Primo ordine refrigerat, Exsiccat uerō tertio exoluto, aut certē secundo intenso. Paululum etiam tenuitatis sortitur. Quibus de causis inter omnia frumentaria edulia minimum nutritiū largitur. Ventrem tamen deficcacit, foris admodum in sacculis, idoneum fomentum est illis, quę circa morsum exiccati possulant.

Cedrus.

Cedrus specie est duplex: altera fruticosa iuni peto asimilis: altera arbor non exigua. Tragacantha calidē siccitatis temperatū tertij quodāmodo ordinis secundū utrunque. Ceterū cedrea (uocatur ita cedri oleum) quartum etiam ordinem attingisse uidetur, admodum calida & tenuiū partium. Quare mollem uiuentiū carnem promptē citatque dolorem terefacit. Nam mortuorū corpora exsiccat, simulque ad corruptionē tuetur, ut potē humiditates eorū depascens, at solida laudatūque attingens corpora. Nec mirum uideri debet, si cum tanta ui polleat, lendes, pediculos, tineas, auritū uermes interficere ualeat: tum feruēt uiuentem quidem interimat, extinctum autem eliciat: quē admodū & ipsū semē, si coctū di tempore, pudendo ea circumlinatur. Proinde parui aduerum est medicamen. Quod etiā dentium furamentibus instillatū, eos & confringit, & a dolore liberat. Extenuat quoque oculos cicatrices, & usus hebetudini ab humorū crassitudine ortū medetur. Vniunt autem ea plebei, cum ad uulnera ouibus inter tendendum & forfice illata, tum etiam contra ipsarum scabiem & ricinos, quos *leprosum* uocant. At fructus moderatēiores existunt, adeo ut comedi possint. Quāquā si res liberalius utare, capiti dolorem inferent, ardoremque ac morsum in uentre percipies.

Z x

Carya.
Nucis.Nux pontica.
Auellana.

Caulalis.

Carpesium.

Cenchrum.
Milium.

Cedrus.

Cedrea.

Cedri fructus.

Centaurium minus.

Centaurium minus.

Radix eius gustui acris simulq; astringens apparet, cum leuicula quadam dulcedine. Quod uero ad actiones pertinet, menses prouocat, uim factū extinguit, extinctumq; propellit. Præterea ulcera glutinat, sanguinemq; reſcipientibus prodeſt. Exuberant autem eius bixæ drachmæ, febrientibus quidem cum aqua: febri uerò liberis, cum uino. Quinetiam ruptis, conuulſis, dyspnoæ, in ueteratq; ruſis eſt auxilio. Eadem quæ radix, & ſuccus ipſius præſtat.

Centaurium minus.

Centaurium minus.

Huius radix planè inefficax eſt: at cauſis & folia, & flores, utiſſima ſunt. Vincit enim in eis qualitas amara, paululum liabens & aſtriſtionis: ob idq; admodum exiccationem eſt medicamen, ex perâ mordacitatis. Vlcera itaq; magna herbæ ipſius recentis illitu glutinantur: & uetula, quæq; ſggræ ad cicatricem perducî queunt, cicatrice obducuntur. Arefacta uerò glutinatoria & deficcatoria ſuſcitur facultatibus. Muſcetur etiâ ſi quæ rheumaticis medentur aſſectibus. In quibus ea medicamina præſantiſſima ſunt, quæ uelementer deficcantia cum quadam aſtriſtione nullam habent mordacitatē. Decoctum herbæ quidam inſundit iſchia dicis, seu biliola & craſſa extrahit: nam & ita purgat. Succus eius præter dicta, cum melle oculis illinitur, menſesq; & factum euocat. Iecinoris quoq; obſtructiones optime aperit, bonumq; durato lieni eſt remediū, & impoſitum foris, & bibitum.

Ceraſia.

Ceraſia.

Quæ dulcia ſunt, magis alui ſubducunt, ſed minus grata ſtomacho ſunt. Auſtera uerò, contrario modo. At acida, pituiroſis excrementoſisq; ſtomachis ſunt idonea. Si quidem auſteris magis exiccant, & nonnihil etiâ incidunt. Ipſius arboris gūmi, arterias aſperas lenit, calculisq; uexatos adiuuat. Ceraſioſia.

Ceraſioſia.

Ceraſioſia.

Exiccantis aſtringentisq; facultatis eſt, tum arbor ipſa, tum fructus. Qui quidem ſi ſumatur humidus, magis uentrem ſubducit: ſi autem ſiccus, magis eundem ſiſtit.

Ceſtrum, Beronica, Pſychrotrophon.

Ceſtrum.

Beronica.

Pſychrotrophon.

pſyon.

Vim habet incendiij, ut guſtus indicat: eſt enim ſubacris & amaricula. Quare calculos renum frangit: pulmonem, pectus, & iecur expurgat: menſes promouet: comitalibus prodeſt: ru præ conuulſisq; curat, omnibuſq; beſtiarum morſibus illa auxiliatur. Poſtremo acidum ruſtantibus & iſchia dicis, bibita prodeſt.

Cecis, Gallæ.

Cecis.

Gallæ.

Quæ omphacitis dicitur, admodū acerbum eſt medicamen, pleraq; ſua parte eſſentia terrenſq; & frigida, per quam deficcet, repercutitq; fluxiones. Eſto uerò tertij in deficcando, ſecūdi autem in refrigerando ordinis. Altera autem gallæ, ſtaua illa & magis laxa, & ipſa deficcet quidem, ſed tantū minus, quanto minus acerbæ qualitatibus eſt particeps. Coſta itaq; ipſa per ſe in aqua, aut ſi magis aſtringere uis, in uino aliquo auſtero, ac dein trita, cataplaſma eſt non inſeruum ſed inflammatis, prociſidentij. Gallæ combuſtæ, extinctæq; in aceto aut uino, ſanguinis reprimēdi facultatem acquirunt.

Cera.

Cera.

Inter primas quatuor qualitates mediū quodammodo obinet. Habet uerò quiddam craſſæ eſſentia & emplatiticum. Quamobrem aliorum medicamentorum materia exiſtit. Ipſa autem per ſe ex genere fuerit debilitet cōcoquentium. Habet tamen quiddam digerentis, calidæq; potentia, quæ plurima melli inerat.

Cici, Ricinus.

Cici.

Ricinus.

Ut fructus eius expurgat, detergit, & digerit, ſic etiâ ſoliū, ſed undequaq; debilis. Oleum ſq; ex ſemine conficitur, calidius atq; tenuius eſt, q̃ cōmune oleum, ac prouide potentius digerit.

Cinnamomum.

Cinnamomum.

Summè tenuiſ eſt partiū, atq; ex tertio ordine caſſacientū. Nihil autem aquæ deficcet, eorum quæ pariter caſſaciū, propter tenuitatē eſſentia. At Cinnamomis, ueluti imbecilli eſt cinnamomum.

Circæa.

Circæa.

Dioſcorides ait radicem eius ex uino dulci poram, ſecūdas purgare. Eſt enim boni odoris, & caſſaſtoria. Semen autē eius in forbitione exhibitur, ad lætis generationem conducit.

Cithus.

Cithus.

Frutex aſtringens eſt. Folia eius & parua germina trita adeo deficcant aſtringenti, ut ulcera glutinare ualeant. Sed flores eſſicaciores ſunt, adeo ut cum uino pon dyſenterias, uentris imbecillitates, fluxusq; & humiditates perſanent. Cataplaſmatis ita illi, ulcerū putredinola iuuſt. Deficcant enim ſecūdo exceſſu. Hypocitis multo eſt magis aſtriſtoria quàm folia, admodū eſſicax remedium ad omnes fluxionum aſſectus. Quin ſi quam partem roborare conſiliū ſit, quæ uidelicet pluſculo humore exolata fuerit, roboret firmitudinē illi haud ſegnitè addit. Quo nomine auridoro ex uiperis dicitur.

Cithus, Ladanium.

Cithus.

Ladanum.

Primo exceſſu medicamen eſt quodammodo completè calidum, ita ut ſecundum attingat, habens etiâ aſtriſtionem nonnihil. Eſt præterea ſub ſtannia tenui, & emolliens, necnon moderatè digerens, concoquentiſ. Peculiariter igitur ad uteri uſia eſt aptum. Uſiluentes tamen capillos retinet. Cæterum alopecias & ophthalmias ſanare non poteſt, quod ſi aſſectus ualentiora medicamenta deſiderent.

Ciffoſa, Hedera.

Ciffoſa.

Hedera.

Ex contrarijs facultatibus cōſtat. Habet enim quiddā aſtringentis ſubſtantia, quæ terra & frigida exiſtit: habetq; nonnihil acris, quam calidam eſſe uel guſtus comprobat: præterea ſi uiriſ ſit, obinet etiam quandam aqueam & repidam. Vi trita igitur in uino decoſta, grandia ulcera glutinant, malignaq; ad ſanitatē reducunt. Igne factas exulcerationes cicatrice obſtruant: cum aceto decoſta liemoſis opitulantur. Flores autē quodammodo ualidiores ſunt. Succus medicamen eſt erethinon: uerſitas aurium fluxiones ſanat, necnon uetera ulcera tum aurium, tum narium. Lachryma hederæ perimit lentes, piluſq; nudat. Adeo quippe eſt calida, ut etiâ obſcurè adurat.

Cinopodium.

Cinopodium.

Caſſat ſimulq; ſiccet in tertio ordine, eſtq; ſubtilium partiū.

Clenorſis

Clematis.

Clematis. Huius folia acrem & adurentē obtinent facultatem, adeo ut lepras excoiens. Fuerit itaq; in quarti ordinis exscalfacientiū initio. Dicitur etiā Clematis illa herba, quam nonnulli polygonoidem appellant: quæ tantum abest ut exulceret, ut profusius & dyfenteris cum uino pota auxilietur, manſaſq; dentium dolores miniget, ac deniq; doloribus uteri in peſſo admoda ſit uſui.

Cnicos.

Cnicos. Cnici ſemine duntaxat ad purgationes utimur. Eſtq; tertij ordinis exscalfacientium, ſi quis foris eo uti uolet.

Coccus cniſius, Granum cniſidium.

Cocum cniſium. Eripiſum quoq; purgat, ſed acris eſt, adurentiſq; facultatis.

Coccus baphicus, Granum tinctorium.

Coccus baphicus. Aſtringentē ſimulq; amarum poſſidet qualitatē. Vtrq; ſine morſu deficcatur. Proinde ad ingētia uulnera cōgruit, & ad neruorū uulnerationes

Coccyſmele, Prunus.

Coccyſmele. Pruni fructus uentrem ſubducit, recens quidem plus, aridus minus. Xinos tamen ſubducti uia ſunt Damalcena pruna iſis quæ ex Iberia adue huntur. Quin & ipſe arbores fructibus proportionē reſpondet. Porro quorū in germinibus aſtriſctio quædam manifeſta in eſſe apparet, iſis decoctis phlegmonæ in columella aut tonſillis cōſiſtētes idoneæ colluantur. Iam uerō agreſtium fructus, euidenter eſt aſtriſctiorius, uentriq; ſiſtit.

Colla, Gluten.

Colla. Gluten quod ad libros præparant ex ſimilagine & garo, emplaſticę, concoctoriq; facultatis exiſtit.

Colocynthe, Cucurbita.

Colocynthe. Humida & frigida eſt in ſecūdo ordine. Quare ſuccus eius roſaceo miſtus, auris dolori contraſcto ex phlegmone, eſt utilis. Præterea reſtinguit ſitim.

Colocynthis.

Colocynthis. Guſtu amara eſt, uehementerq; purgatoria facultate prædita. Ipſius uirentis ſuccus intritus, ad iſchiadicos prodeſt.

Comarus, Arbutus: cuius fructus Vnedo.

Comarus. Fructus unā cum arbore acerbus eſt. Eſt autem hic & inſenſus ſtomacho, & capiti dolorem concilians.

Commī, Gummi.

Commī. Lacryma eſt cōcrera in truncis arborum ipſam producentiſq; eſtq; exiccatoriæ & emplaſticę facultatis, aſperantibusq; medetur.

Coniz, Lixiuum.

Conia. Omnium maximē abſorſoriū exiccatoriūq; eſt, quod ex cinere ſiccæ & richmalorum effuſiſſimę putrefactiſſe eſt facultatis.

Conyza.

Conyza. Conyza & maior & minor adſimilis ſunt tum temperaturæ, tum facultatis: guſtu amaræ & acres. Luculenter autem exſcalfaciunt, ſiue quis folia cum teneris ramulis parti infricat, ſiue ubi oleo incoxerit, eo utatur. Si quidē rigores per circuitum redeunt, ſanare tale oleū uidetur. Conſimilis quoq; flores ſunt facultatis. Quos quidem nonnulli ex uino propinant, ad educendos menſes, atq; pellendū ſæctum. Eſt & terrimū conyze genus in locis humidioribus naſcēs, utriſq; illis graueolentiſſis & imbecillibus. At primū memoratæ caſſificiunt & ſiccant in tertio ordine.

Coriannon, Corion, Coriandrum.

Hanc herbam refrigeratoriā eſſe Dioſcorides prodidit, quōd miſta pani aut polente, illitali, eryſipelas curret. Quanquam certē exacūm aliqnod eryſipelas, quod utiq; inflammari eſt, & ſtannū, haud unq; tā tali cataplaſmate perſanabitur: ſed illud tantum quod refrigerarum iam fuerit. Coriandrum itaq; ex contrariis facultatibus conſtat, plurimum habens eſſentiæ amaræ, quæ tenuium partium eſt & terrena. Nec parum etiam aqueæ humiditatis obtinet, quæ tepentis eſt facultatis. His adiunctum eſt quoq; aſtriſctiōnis pauxillum. Quōd autem longē tā refrigeratione abſit coriandrum, hinc conſtat, quōd chæradas ſiue ſtrumas, cum lomento diſcuriat: id quod nullum refrigerantium medicamentorū facere eſt aptum.

Coronopus.

Coronopodis radix cœliaciſ prodeſſe creditur manducata.

Coſtus.

Leuicam planē amarā, plurimā autē acrem & calidā in ſe qualitateſ ſimul & ſaculratem obtinet, adeo ut etiā exulceret. Quare in quibus exſcalfacere partem quæſus, aut ex alio inſuperficiem extrahere quippiam eſt opus, ad coſtū conſuſi. Eadem de cauſa urinas menſesq; prouocat: & ad rupta, conuulſa, & laterum dolores congruit. Porro ob amaritudinem quæ illi ineſt, laros lumbricos enecat, maculaſq; à ſole contraſctas exterit, illius cū aqua aut mellē. Inſcit item ſtatuofa quædam illi temperiei humiditas, per quam & uenerem excitat cum uino miſto.

Coryledon, Vmblicus Veneris.

Humidā, ſubfrigidā, obſcurē aſtringentē, ac leuiter amarā obtinet facultatem. Vnde refrigerat, repercuſit, abſtergit, & diſcutit. Itaque phlegmonas eryſipelarodes, & eryſipelata phlegmonode perſanat: æſtuantiq; uentriculo cōmodiſſimum cataplaſma exiſtit.

Crania, Cornus.

Fructus eius admodum acerbus eſt, euſui aptus: proinde ualenter aluum reſtringit, quem admodum & meiſila. Folia quoque & germina peracerba ſunt guſtu, ualenterq; deficcant. Itaq; maxima uulnera glutinare poſſunt, poſiſſimūq; durorum corporum.

Grambe, Braſica eſculenta.

Deficcandi nimis habet, tum eſa, tum ſoris impoſita: non tamen admodum acrem. Præterea & uulnera glutinat, & maligna ulcera ſanat, phlegmonasq; iam induratas, atque egre ſolubiles, necnō eryſipelata id genus, epinyctidaſq; & herpetes curat. Habet quiddam etiam in ſe abſterſorium, quo lepras elicit. Porro ſemen eius poſitū, amarum cum ſit, lumbricos perimit. Eadem facultate ephelidas, lenes, & quæcumq; modicam abſterſionem poſtulant, adiunat. Cineres caulium braſicæ deficcant uſque adeo, ut cauſticę facultatis participes eſſe uideant. Quibus ſanē cū adipe miſtis, cōtra inueteratos lateris dolores uruntur. Sic nūq; ualenter digerēs pharmacū reddiſ.

Grambe agria, Braſica agreſſis.

Calidior ſicciorq; & amariorq; domeſtica eſt: quāmobrem nec citra noxam intra corpus ſu-

Coriannon.
Corion.
Coriandrum.

Coronopus.

Coſtus.

Coryledon.
Vmblicus Veneris.

Crania.
Cornus.

Grambe.
Braſica eſculenta.

Braſica agreſſis.

mitur. Extergit autem & digerit quàm domesticam etiam valentius.

Crambe thalassia, Brassica marina.

Brassica marina. Non solli alius deicit, subfalsa & subamara existens, sed etià est ad externos corporis usus idonea.

Ceratogonon. Cratogonon. Fructus eius & acris gustanti est, & utenti frigidus, similis milio.

Cretimon.

Cretimon. Gustantibus salsum est, cum paucula amaritudine: quilibet uis eius est exicatoria & abstersoria.

Cinthe, Hordeum.

Cinthe. *Hordeum.* Primi est ordinis in exiccando & refrigerando. Habet etiam abstersionis pauxillà. Præstat in cibo fabis, quod statuofam naturam exuat. Quantumcumque enim fabas coxeris, statuosa semper illis natura remanet. Sunt quippe crassiores essentiz quàm hordeū, ob idq; eo plus etiam alunt. At polenta multò plus hordeo deficcatur.

Crimnon.

Crimnon. Plus nutrit quàm polenta, sed agrius concoquitur. Sorbino quæ ex eo conficitur, si ex sea fiat, leuiter uentrem sistit.

Crinos, Lilium.

Crinos. *Lilium.* Lilij flos temperatūrā multam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, partim ex aqua, eaq; temperata. Quare quod ex eo conficitur oleum, digerēdi, emolliendiq; citra morum facultatem fortitur: unde fit, ut uteri sit duritiibus aptissimū. Porro radix foliaq; per se rita, de siccant, abstergunt, & digerunt moderatè. Proinde quoq; ambustis comperit. Radicem ergo rostram, ac dein rosacea contritam, ambustis quoad obducatur cicatrix, imponunt: cū sit etiam ulcerum aliorum remedium. Emollit præterea uteros, mensesq; prouocat. Cæterū cū aut uirilignes, aut ploram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, cōmitemus illi aliquod aliorum medicaminum ualidius extergentium, cuiusmodi est mel. Imposuimus uerò etiam quandocq; foliorū succū cum melle & aceto coctum. Eratq; respectu umvisq; portio ipsius succi quincupla. Atq; ita cōsticuebat utroq; medicamentū ad omnia ulcera, quæ exicari absq; morū postulant.

Crocodilum.

Crocodilum. Crocodilij semen acre est, atq; odoratum, urinam mensēsque ciens: itaque facultatem habet calidam, digerentem, & exiccantem. Succus tum caulium, tum seminis, ut quæ similes sint facultatis, nephriticis adiuuat. Radix pectoris excretionibus ualenter conducit. Trahit uerò etiam per nares sanguinem.

Crocus.

Crocus. Secundi quidem est ordinis exalfacientium, primi uerò exaccantium. Proinde concoquendi quoq; uim obtinet, adiuvante etiam ad id, quædam exigua astrictione.

Crommyon, Cæpa.

Crommyon. *Cæpa.* Cæpa ex quarto est ordine exalfacientium. Essentia eius porus crassiorum est partium. Unde etiam hæmorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alptis abstergit, tum alopecijæ atrita pilos halcyonio citius restituit. Succus eius ijs qui suffusi sunt, aut acie ocu-

lorum obtusam præ crassitudine humorum habent, inunctus prodest. Ob huius temperatūrā tota cæpa statuosa est, manducata. Itaq; quæ temperie ficiore sunt, minus statum generant.

Cyamos, Faba.

Mediocriter exiccatur, refrigeratq;. At caro eius paulū quoq; abstergentis facultatis continet: sicuti putamen nonnihil adstringentis. Porro uerò edulium, statulenta est, & coctū difficilis, si quid aliud: excretionibus ex pectore & pulmone idonea. Vt medicamentum uerò, foris imposita, deficcatur innoxie. In podagricis ea sepe numero usi sumus ex aqua decocta, & ita adipi suo loco amissa. Ad neruorum tum confusiones, tum uulnera, farinam eius cum oxymelite impositimus. Ad eos quos ex ictu iam occupauerat phlegmo ne, cum polenta. Sed & testium & uberi aprum est cataplasma. Quo quidem & lacipsum extinguitur, & puerorum pubes farina fabacea illita, plurimo tempore glabra permanet.

Cyclaminus, Rapum, Tuber terræ.

Abstergit, incidit, ora uenarum aperit, attrahit, & digerit. Succus eius hæmorrhoidas reserat, uiolenterq; ad secessum prouocat, in floccis appositus. Sic etiam facultatibus phlymata, strumas, aliasq; durities digerentibus cōmiscetur: ac suffusus cum melle illatus cōpetit. Ad hæc per nares expurgat. Ad eū uehemēis eius facultas est, ut abdomine illito, subducatur aluum, & scæri perimat. Tota autem radix succo imbecillior est, quanquam & ipsa uehemens sit. Nam & menses siue epota, siue apposita, cuocat, & aurigini prodest. Modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutē detergit, ac tū alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata curat: necnon auxilio est tūni indurato. Fructus etiam alterius cyclamini, quod nonnulli cyssanthemon nominant, cum uno pluribus diebus potus, sanat lienem, urinas auertit, atq; aluum subducens. Locos quoq; ejicit, atque astu marcis auxiliatur. Qualitas eius gustui acris est & sublentia.

Cyminum, Cuminum.

Cymini semen calidius in tertio ordine: urinam mouet, exanguitq; statum.

Cynosbatus, Scænis canis.

Huius fructus non segniter astrictioris est, solia uerò mediocriter. Lanugo fructus, artem uinat.

Cyparissus, Cupressus.

Cupressi folia, germina, pilulæ recētes & molles, magna ulcera glennāt in duris corporibus. Quare resicandis uim habent absq; insigni acrimonia aut calore. Tāta enim ei acrimonia mēst, caliditatis, quanta satis sit deducendæ in altum acerbirant. Proinde in alto lactēs in floccidis putrescentibusq; affectibus humiditatis, innoxie depasit & populat. Sic enterocælicos tuat, excicans, roburq; addens corporis partibus præ humiditate laxatis. Quidam ea uruntur ad carbunculos, herpesq; polensq; miscēta. Sunt qui ad erysipelata utantur.

Cyperus, Iuncus quadratus.

Cyperi radices exalfaciant pariter & siccant absq; mordacitate. Itaq; ulceribus in ueteratissimi

Cyamos.
Faba.

Cyclaminus.
Rapum.
Tuber terræ.

Cyssanthemon.

Cyminum.
Cuminum.

Cynosbatus.
Scænis canis.

Cyparissus.
Cupressus.

Cyperus.
Iuncus quadratus.

risicē profunt. Habent etiā qui p̄iā astringens: quapropter ulceribus nem oris cōueniūt. Quin & incidendi uim quampiam illis inesse testificā- dum est, qua & calculos exterrunt, & urīnā men- sesq; prouocant.

Cypros.

Cypros. Husus arboris folia inuicem germina habent in se quiddā digerēs cum aquea substantia modicē calida: habentq; & astringentem quandam ex terrena substantia frigida. Itaq; eorum deco- cto quidam ambusta fouent, necnō igneas ple- gmonas, carbunculosq;. Nam absq; molestia sic canit. Sed spontē ortis in ore ulceribus comman- sa folia commodissima sunt.

Cynilus.

Cynilus. Cynili folia digerendi facultatem obtinent, a- queæ & temperatæ mixturā, ut malua.

Conion, Cicuta.

Conion, Cicuta. Quod extremē sanē refrigeret, omnes norūt. Conos.

Conos. Coni fructus, quem cocalum & strobilum ap- pellat, uiridis rotas, habet cum humiditate amaritudinem quampiam & acrimoniam. Proinde purulenti, & q̄s quibus faciliē expuere est opus, accommodatur. Quod esculentū est, nutri- mentum est coctū difficile & ualidum. Vt medi- camen autem aspersit leniendæ cōgruit, si prae maceratus in aqua, omnē acrimoniam exuerit. Nam reliqui sic minus mordax effici, in medio calidæ & frigide qualitatis cōsistens, ex aqua & terrea mīstū substantia, minimū participans acri- g.

Lagopus.

Lagopus. Facultratis est deficiantis, adeo ut fluxus alui probe exiccet.

Lathyrus.

Lathyrus. Et succo, & purgatoria ui tithymali refert: nisi quod semen apparet dulce, licet maximē sit purgatorium.

Lampfane.

Lampfane. Esa quidem succus prauus procreat. At illita, abstergendi, digerendiq; nonnullam facultatem sortitur.

Lapathum.

Lapathum. Digerit moderatē. At oxylapathum nōnnull etis repercutit. Manifestē ipsorū semen astringit, ita ut dysenterias & dyarrhœas persanet.

Limonum.

Limonum. Eius fructū, utpote acerbū, ex uino exhibent coeliacis, dysentericis, & hæmorrhoidibus. Iuuat & profusiuū muliebre. Satis est oxybaphi mēiura.

Lichen.

Lichen. Lichenas curat, extergentem, modicēq; refri- gerantem, ac siccantem obtinens facultatē. Nas- citur enim in humidis roresq; persusis faxis.

Leontopetalon.

Leontopetalon. Radix eius digerendi facultatē, & exiccandi, calcificandiq; in tertio ordine possidet.

Lepidium.

Lepidium. Ex quarto est ordine excalcificientium, simile prius nascituro, nisi quod minus deficiat.

Leucas.

Leucas. Acrem possidet qualitatem exuperantē: tem- peraturam uerō calidam, siccantē in tertio quo- dammodo ordine.

Leucacanthos.

Leucacanthos. Huius radix amara est, ac proinde incidit, ex-

licatq; in tertio ordine. Calcificat autē in primo.

Leucocion.

Leucocion. Extergit, ac tenuium est partium: plus tamen flores, ac præcipuē qui sunt sicciores. Iis quippe & oculorū crassas cicatrices extenuant. Præterea menses eorum decoctum mouet: secundas, & partum emortuum elicit, bibitumq; facit abor- tum, maximē amarum cum sit. Quod si eius uires multa missione aque frangantur, erit contra phlegmonas, & difficilia ulcera, cōmodum me- dicamen. Semen enim eisdem est facultatis, ra- dicesq; similiter, nisi quod hæ sunt calidioris es- sentie, terrezq; magis. Cum aceto tamen lienes induratos perianant.

Leuce, Populus alba.

Leuce, Populus alba. Ex aquea, rapida, & terrena extenuata essen- tia consistat. Quamobrem & abstergentis facul- tatis est participes.

Libanotus, Thus.

Libanotus, Thus. Excalcifici secundo ordine, deficiat primo: ha- bet quoq; astringentē pusillam. Cortex eius eu- denter astringit, deficiatq; in secundo ordine. Est autem crassiorū partium quāz thus, & minimū acrimonie possidet. Quare in hæmorrhoidibus, sto- machicis, coeliacis, & dysentericis eo utimur. Ra- mus eius siccioris & calidioris est facultatis q̄ ipsum thus, adeo ut ad tertium usque excessum perueniat. Habet uerō etiam & abstergentiū quid- dam. Vnde expurgare & implere oculorū ulce- ra potest.

Libanotides.

Libanotides. Libanotides tres existunt, una sterilis, duæ fru- ctum ferentes. Omnes uerō emolliētis, digerētis, incidentis, & abstergentis sunt facultatis. Suc- cus tum radicis, tum liberæ mustus melli, obtru- sam oculorum aciem ab humorum crassitudine emendat. Decoctum eius, quam rorem marinū appellant, potum, regio morbo auxiliatur.

Lignys, Fuligo.

Lignys, Fuligo. Fuligo omnis exccicatoria est, ob idip̄ terrēz essentia, habens quādam etiam ignis est pusil- las reliquias: ratione quarum tenuium est par- tium. Cæterum quæ speciatim in ea differentie sunt, ex pro uita materia eueniunt. Thuris fuli- gine unimur ocularibus medicamentis permixta, q̄ uidelicet quæ ad oculos etiamnum phlegmo- ne tenratos, & qui adhuc fluxione affliguntur, exulceratiue sunt, accōmodantur. Nam & illa ex- purgat, & carne implet. Terebinthinæ etiā myr- rhæq; fuligo molestia caret, nō secus quāz thu- ris. Sed styracis quodammodo ualentior est. Ma- gis etiam picta liqui dē. Quæ adhuc magis cedri. Porro acrioribus uruntur ad uitia superciliorū uocata pila, & erosos angulos oculorum, & ci- tra phlegmonem humidos.

Libypticum.

Libypticum. Libypticæ radix & semē, ex genere excalcificien- tium sunt, adeo ut & menses ciant, & urinas prouocent, statimq; discantur.

Linospermon, Lini semen.

Linospermon, Lini semen. Flauosum est esum, etiamq; frangatur. At cal- facit quidem quodammodo in primo ordine, hu- miditatis & siccitatis in medio existens.

Linozotis, Mercurialis.

Linozotis, Mercurialis. Ea uruntur omnes ad subductiones alui dun- taxat. Quāq; etiam admodum, ualenter digerit.

Lonchitis.

Lonchitis. Radix eius, quæ semen gerit triangulare, urinam ciet. Folia eius quæ scolopendrie similis est, uiridia quidem, uulnera glutinant: sicca autem, & cum aceto epota, lienes induratos perſanant.

Lycion.

Lycion. Arbor est spinosa, ex qua lycium fit, medicamen id liquidum, quo ad fucillara, fedis, orisq; phlegmonas, ulcerationes, herpetas, putredines, ulcera cõbturnacia, aures pure fluentes, intertrigines, & paronychias utuntur. Est enim facul tatis exicatorie, compositum ex diuersi generis substantijs, altera quidem tenuium partium, dige rente atq; calida: altera terrestri & frigida, ex qua astrictionem exiguum obtinet. Cæteri dige rit & siccant in secundo ordine: in calore autē me dijs est proximum. Est porro lycium indicū ad omnia ualentiss.

Lysimachios.

Lysimachios. Superantem astrictionem fortitur, per quam omnes sanguinis fluxus reprimunt, tum pora, tum cataplasmatis modo admoda.

Lychnis.

Lychnis. Semen eius calidum & siccū est, secundo quo dammodo, aut etiam tertio ordine.

Lotos herba.

Lotos herba. Lotos domestica, quam trifolium nominant, ut mediocriter concoquendi, sic etiam exicca di uim possidet, in caliditate frigiditatisq; con iugio media quodammodo existens. Semen a greſſis loti, secundi est ordinis calfacientium: ita betis nonnihil absterſorium. Porro Aegyptiæ lo ti semen etiam in panis fingitur.

Lotos arbor.

Lotos arbor. Non ita multæ astrictionis qualitatē est parti cept: sed & tenuium partium est, & exicatoria. Cuius sicce ramenta profluuiū mulebri, dysen terijs, capillorum effluuiū, celiacijs affectibus accõmodant, aut in uino, aut in aqua concocta.

Macer.

Macer. Cortex est qui ex India aduehitur, gustu mul tum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia o dorata. Conſtat autē ex mista essentia, pleraque terrena frigida, pauca uerò calida & tenuium partiū. Itaq; ualenter deficcant, astringitq; ob idq; celiacijs & dysentericis medicamentis miscetur, in tertio exiccantium cõſiſtens ordine: in caloris frigorisq; discrimine, neutrum insigniter præſtās.

Malabathrum.

Malabathrum. Malabathi folium cum spica nardi simillimū obtinet facultatem.

Malache, Malua.

Malache, Malua. Agreſſis quidē, digerētis paululū & emollien tis leuiter est facultatis: hortensijs uerò, quanto plus habet a quæ humiditatis, tãtò facultate im becillior est. Fructus eius tantò ualidior est, quã rō & siccior. Cæteri Althea omnium efficacissimē digerit.

Mandragora.

Mandragora. Refrigerat tertio excessu. Nōnihil tamē pomis caloris atq; humiditatis inest. Vnde soporē concil iant. Radicis cortex nō tantum refrigerat, sed etiam siccant. Quod eo includit, imbecillum est.

Marathrum, Feniculum.

Marathrum, Feniculum. Calfacit in tertio, deficcant in secundo ordine: proinde lac gignit, auxiliatur suffusis, mensesq;

& urinas promonet. Radix & semen hippoma rathri, amplius quàm domestici siccant: quare et uentrem uidentur sistere. Possunt etiam & calcu los frangere, curare ictericos, mensesq; & urinas mouere: minime tamen lac gignere.

Mastiche.

Mastiche. Candida quidē & Chia, astringit simul emol liuit. Proinde stomachi, uentris, intestinorum, ie corisq; inflammationibus compenit, ut puta se cundo ordine exalfaciens & siccans. Nigra uerò, quæ Aegyptia dicit, magis deficcant, minusq; astringit: quam obrem a prior est ad ea quæ uali diorem digestionem per halitum postulant. Por ro olcum, quod præcipue ex Chia conficit, simi lis est cum mastiche facultatis.

Melanthium, Nigella.

Melanthium, Nigella. Exalfacit & siccant in tertio ordine, estq; ama rum, atq; tenuium partium. Quare catarrhos san nat in linteis admotum, atq; aliusdē olfactum: si flatus potum extinguit: lumbricos enecat, non esum modò, sed etiam foris applicitum: lepras, clauos, atq; myrmecias exterius orthopneam iu uat, & menses prouocat. In summa uerò, ubi se ctione, exſtione, deficcatione, exalfactione est opus, præstantissimum id remedium existit.

Melilotum.

Melilotum. Quidā habet astringens, digerit tamen, con coquitq; Copiosior enim in eo est substantia ca lida quàm frigida.

Mel.

Mel. Deficcant exalfacitq; secundo ordine: ac deter gentem facultatem obtinent. Porro coctum, minus acre absterſoriumq; redditur. Itaq; ad sinuo sorum ulcerum glutinationem eo utuntur. Cæ terum quod mel est amarū, mistæ facultatis exi ſtit. At Saccharo, quod ex India & Felici Arabia conuehitur, cõcreſcit in calamus, estq; mellis ſpe cies, minus certè nostrate dulcius, sed ſimiles ei uires obtinens, quod ad abstergendū, deficcandū, & digerendū pertinet. Quatenus uerò nec inimicum uentriculo est, ut nostras, nec ſitum ad ferens, eatenus ab illo substantia differt.

Melissophyllon, Citrago.

Melissophyllon, Citrago. Marrubio similis est facultate, sed plurimū ab eo uincitur. Quam obrem nec utitur eo quispiā, cum larga marrubi copia ſupperat.

Mespilli, Tricocon, quod tria grana gerat.

Mespilli, Tricocon. Fructus eius admodum est acerbus, uixq; edi poluit, uentrem extremē cõſcens. Quin & in germinibus & folijs acerba hæc qualitas nō pau ca reperitur.

Medion, Trifolium odoratum.

Medion, Trifolium odoratum. Radix quidē eius austera est, omnesq; fluxio nes cohibet. At semen tantū abest ut id moliat, ut etiam menses ciat: nimirū tenuium partium cum sit, & facultate incidendi præditum.

Mecon, Papauer.

Mecon, Papauer. Cdm quatuor eius insignes species ſint, facul tas omnium exſtit refrigeratoria. Cæterdm ſati ui semen, mediocriter ſomnū conciliat, uſu can didum: proinde pani ipſum inſpergunt, ac mel le maceratum eſſitant. At ex ſylueſtris, eius qd rucas dicitur, quia ſlos ipſius celeriter deſiuit, ſem in ualidius refrigerat: itaq; nequaquā eo quis ianoxiæ ſolo uti poſuit. Illius uerò quod calicem incidentem

incidentem sustinet, atrum existit semen, medica mentosum, atq; impense refrigerans. Quod autem longiorem emittit calicem, medicamentisimū omnium est, admodumq; refrigerans, idē omnibus paribus suis. Adeo quippe refrigerat, ut stuporem ac mortē etiam inducat. Est enim ex quarto & ultimo refrigerantium ordine.

Mecon ceratit, Papauer cornutum.

Vim habet incidendi extergendiq;. Itaque radix eius in aqua ad dimidium decocta, hepaticos affectus adiuuat. Folia & flores sordidis & contumacibus ulceribus profunt. Sed ea reicere oportet ulceribus iam repurgatis: alioqui sanam carnem excident.

Mecon Heracleia, Papauer Herculeum.

Semen habet pituitam expurgans.

Melea, Mālus.

Mālus non omnis eiusdem naturæ est, sicuti nec eiusdem fructus. Succus siquidem, cortices, foliaq; arborū, etiam inter se differunt. Itaq; si acidiōra austerioraq; sint, illis vulnera glunnare possis, tam in phlegmonarū initio repercutere influxum, ac uentriculum exolurum & languidum roborare: at aquosioribus, mediocres phlegmonas incipietes & gliscētes remutare. Quod autem plurima pomis omnibus recrementis frigidisq; insit humiditas, hinc liquet, quod nullus eorū succus seruari possit: uerū accekat corruptanturq; uniuersi. Solus enim cydoniorū & struthorū (que propter astringentem uehemētem, ceteris minus sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: per se autem minimē.

Melea Persice, Persica mālus.

In germinibus & folijs uicentem habet qualitatē amaram. Proinde folia eius trita, & super umbilicum posita, lumbicos enecat: estq; digerens medicamen. Fructus humidior est, & temperie frigidiōr.

Melea Armenice, Mālus Armenica.

Fructus humidior frigidiōrque est, utrunq; secundo quodammodo excessu.

Melea Medice, Mālus Medica, Citrium.

Quod in fructu semen amplectitur, terrij est ordinis reficcantium atq; refrigerantium. Cortex deficcatur quidem in excessu secundo, non tamen frigidus est, sed temperatus, aut paulo infra. Caro eius pariter crassi succi est, & pituitosa, frigidisq;. Semen amarū est, digerereq; & exicare potens, secundo quodammodo ordine a temperatis recedens. Folia exiccandi & digerendi uim obtinent.

Meum.

Radices eius sunt calidæ terrio excessu, in secundo sicce. Proinde urinas mensisq; mouent. Quod si liberalius fumanē, capiti dolorē concitant. Milax tracheia, Milax aspera.

Varię clauiculis suis arboribus circūuoluitur. Folia eius & acra gustū, & uenti calida existit.

Milax leuis.

Quodammodo iam dictę similes uires obtinet. Morea, Morus.

Mori fructus maturus quidem aliū subducit: immaturus uerō, ubi aruerit, restringit admodum. Quare ad fluentes affectus est cōmodus. At maturorū succus, propter astringentē quam

habet, ad stomatica medicamenta est utilis. In radicis cortice purgatoria uis cum quadam amaritudine exuperat, ut latos uermes enecat.

Myagros.

Oleum quod ex semine ipsius funditur, emplastica facultatem obhnet.

Myrcet, Fungus.

Frigida humidisq; admodū planta est, quare proximē ad enecatē facultatē accedit. Et sanē inter eos sunt qui interficiant, maximē qui ex natura mista habent qualitatē putrilaginosam.

Myle.

Radix eius cōstrahentis est facultatis: quam cum farina lolij apertā uulū sanare ait Diosc.

Myosotis, Auricula muris.

Deficcatur secundo ordine, ceterū nullam euidētem caliditatem fortitur.

Myrice, Tamarix.

Abstergit & incidentis est facultatis, absq; per spicua deficcatione. Habet uerō etiam astringentem nonnullam. Igitur cum aceto decocta prodest lieni indurato. Sanat etiam dentium dolores. Fructus & cortex non paucam possident astringentem. At cinis myricæ, admodum deficcatoris facultatis est, plurimam habens abstergentis uim, astringendi pauxillam.

Myriophyllum.

Adeo exiccatur, ut uulnera glutinet.

Myrrhis.

Radix eius est odorata & dulcis, mensesq; mouet, necnō rhoracem atq; pulmones purgat. Calfacit itaq; secundo ordine, cum partiū tenuitate.

Myrrhine, Myrtus.

In hac planta uincit terreneum & frigidum. Habet tamen aliquid tenue & calidum. Quare ualenter deficcatur. Porro quod ramis & trunco adnascitur tuberosum, quantō ficcius ceteris paribus est, tantō deficcatur & astringit uehementius. Folia item arida uiridibus plus deficcant. Itaque omnes partes eius restringunt, tum foris imposita, tum intrō assumpta.

Moly, Ruta syluestria.

Radice habet nigram, & florem lacteum. Vis eius tenuium partium est, & calida terrio ordine: unde crassos humores deficcatur, digeritq; & urinam mouet.

GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum facultatibus lib. VIII.

Nardu stachys, Spica nardi.

Alfacit exsiccat terrio deficcatur secundo complero. Constat ex astringenti, acri, & leuiter amara substantia. Quare radix iccori & uentriculo cōuenit, & pota, & ad mora extrinsecus. Urinam ciet: morbus stomachi sanat: uentris, capitis, & thoracis fluxiones deficcatur. Valen tamen est Indica, quę nigrior quādam Syriaca existit. Nardus Celica, hoc est, Gallica.

Ad omnia est imbecillior dictis, præter quā ad prouocandam urinam. Nam calidior illis est, sed minus astringit.

Nardus oreæ, hoc est, montana.

Plurima in Cilicia nascitur, sed prædictis infir mior.

Myagros.

Myrcet, Fungus.

Myle.

Myosotis.

Myrice.

Myrris, Tamarix.

Myriophyllum.

Myrrhis.

Myrrhine, Myrtus.

Moly.

Ruta syluestria.

Nardu stachys.

Spica nardi.

Nardus Celica.

Nardus montana.

Narthex. Semen eius calfacit & tenuat. Medulla autem
Ferula. astrictionis est particeps. Vnde hæmoptoicis & celiaci conuenit.

Napy. Calfacit deficcatis ordine quarto.
Narcissus.

Narcissus. Eius radix deficcata aded, ut uel maxima tendonum uulnera glutinet. Habet uero quiddam absterforium & attractorium.

Nearas. Deficcata citra morfum, adeo ut incisus nervus glutinare credatur, ac præcipue radices eius.
Poterrum. Nerium, Rhododaphne.

Rhododaphne. Foris quidem illius is frutex, digerendi uim obtinet. At si intra corpus sumat, uirulentus homini & plerisque pecudibus est.

Nymphæa. Nymphæa. Tum radix eius, tum semen, deficcandi citra morfum uim habet. Itaque uentris profluua, semenq; immodicè profluens sistit. At cui adest candida radix, ea & muliebri uedetur profluuium, ex uino nigro & auiro epota. Vtraque autem abstergendi quandam uim possidet. Quare macerata quidem aqua, sanant alios: liquida uero pice, alopecias. Ad hæc tamen aprior est ea, cuius radix est nigra.

Xanthion. Xanthion. Semen eius digerendi uim obtinet.
Xyris.

Xyris. Tenuius partium, attractoris, digerendi & deficcandi facultatis est, cum radix, tum multo magis fructus: qui quidem & urinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

Xyphium. Xyphium, Gladiolus. Xyphij radix, maximè altera quæ superior est, attrahit, digerit, deficcatisq;

Oï. Oï, Sorbus. Astringentem uim obtinet, at multo q̃ mespilus imbecillior. Proinde fructus eius gustui uicuosus est, minusq; uentrem q̃ mespilus cōstringens.
Oenot. Oenot, Vinum. Ex secundo est ordine calfacientiu: sed quod admodum uetus est, ex tertio: sicut mustum ex primo. Caliditati proportionè respōdet siccitas.

Olymphi. Olymphi, Grosfi. Acrem facultatem sortiuntur. Cocti itaq; duos tumores discutiant: trudi myrmecias & thymos enūciunt.

Olostum. Olostum. Deficcandi uim obtinet cum astrictione: ideoq; proptinatur ad rupta.

Olyra. Olyra. Mediam tritici & hordei naturæ possidet, tam ut nutrimentum, q̃ ut medicamentum.

Olyra. Olyra. Mediam tritici & hordei naturæ possidet, tam ut nutrimentum, q̃ ut medicamentum.

Onagron. Onagron. Huius radix arefacta uinofum quiddam redolet, maximèq; ad uini fucularem accedit.

Onofma. Onofma. Acri & amara substantia constat. Cuius folia in uino pota, factum extinguere expellereq; creduntur.

Onobrychis. Onobrychis. Rarefaciendi digerendiq; uim obtinet. Proinde folia eius uirentis illia, phymata digerunt: arefacta uero, & cum uino pota, striguras sanant: fudoresq; eliciunt, cum oleo iuncta.

Ononis.

Ononis. Radix eius calfacit quodammodo in tertio ordine, abstergitq; & nonnihil incidit. Itaq; non tantum urinas promouet, sed & lapides frangit, & crustas detrahitis. Præterea ad dolores dentium, oxycrato in quo fuerit cocta, colluuntur.

Oxos, Acetum.

Oxos, Acetum. Ex frigida calidaq; substantia cōstat: utraq; ita meo tenuius partium. Verum calidam frigida exuperat. Deficcata porro in tertio gradu.

Oxyacanthos.

Oxyacanthos. Vt specie, sic facultate hęc arbor piro syluestri est similis. Cæterum puri syluestris fructus, proflus * acerbus est: oxyacanthos uero, & tenuius est partium, & nonnihil incisiorum sortitur: estq; rubeus & rarus. Qui quidè affectus omnes fluxuum cohibet.

Opos, Succus.

Opos, Succus. Cyrenais quidem reliquos omnes caliditate & tenuitate exuperat: ideoq; omnium maximè per halitum digerit. Quisquam sanè & cæteri admodum calidi sunt, & spirituosissimi. Porro licet complures etiam sint alij succi, qui effluunt, incisæ radice: ob excellentiam tamen sic dicitur Cyrenais, & Medicus, & Syriacus.

Organus.

Organus. Heracleonica quidem efficacior est onitide: a-gressus tamè est ualentior utraq;. Omnes uero in cidentis, extenuandi, calfaciendi, & exiccandi ob tinent facultatem, in tertio nimirum excessu. At Tragoriganus etiam quippiam astringit.

Orobis, Eruum.

Orobis, Eruum. Deficcata quidem excessu secundo intensio, calfacit uero primo. Porro quatenus amaritatis est particeps, eatenus incidit, extergit, atq; obstructions expedit. Cæterum si sumatur copiose, sanguinem per urinas euocat.

Orobanchæ, Eruangina.

Orobanchæ, Eruangina. Siccat frigidaq; temperaturæ est, in primo ordine. Habet astrictorium quippiam, quare medio-criter alium sistit.

Orchis, Testiculus canis.

Orchis, Testiculus canis. Radici eius bulbosæ & geminæ, uis inest humida & calida, gustantibusq; dulciscula. Cæterum maior radix multam habere uidetur humiditatem excrementinam, & stultentram: quapropter epota uenerè exccrat. Minor uero, cum ad calidius & siccus uergat, tantū abest ut ad coitum stimulet, ut enī colibeat, & reprimat. Eduntur bulborum more, totiq;.

Orchis Serapias.

Orchis Serapias. Siccat ultra primum excessum. Quare non ita est ad uenerem cōmodus. Oedemata illius discutit. Vlcera sordida expurgat. Herpeses sanat. Siccatus multo amplius deficcatur. Nam putrescētia conrumaciatis restituit ulcera, & subastringēs cum sit, uentrem sistit ex uino potus.

Ofiris.

Ofiris. Amara est, & aperiendi uim obtinet. Quare iecur obstrictum adsuat.

Pancratium.

Pancratium. Radix huius, scilicet similem gustum refert, & uires, multo tamen imbecilliores. Ea itaque pro scilla, ubi hæc non adest, utuntur.

Paliu-

Paliurus.

Paliurus. Folia eius & radix adeo perspicue astringunt, ut fluxum ventris cohibent: adeoq; digerunt, ut minora phlymata curent. At fructus, tantam incidendi vim possidet, ut calculos vesicæ comminuat, & pectoris pulmonisq; excretionibus auxilietur. *Papyrus.*

Papyrus. Oxycrato uinō ne macerata, recentia ulcera glutinat, maxime in circuli circumposita, ut materia sanantia in medicamina excipiat. At ubi uestigia fuerit, medicamen exiccatorium existit, ut charta comburatur cinis. * Hoc tamen cinis papyri est infirmior. *Panax Heracleum.*

Panax Heracleum. Ex hoc conficitur opopanax, radicebus & caulibus eius incisus. Porro opopanax ipsum tum mollit, tum digerit. At calfacit quidem in tertio ordine, in secundo autem ficit. Cortex radi-
Opopanax. cis excalfacit etiam & ficit, minus tamen q̃ succus. Ceterum abitergendi nonnullam facultatem sortitur. Quare eo utimur & ad nuda ossa, & ad ulcera contumacia. Sufficienter siquidem quæ talia sunt, carnem procreant. Fructus calidus est & siccus, ac mensibus mouendis accommodus. *Panaces Asclepium.*

Panaces Asclepium. Minus est calidum supraddicto panace. Quare floribus eius & semine melli mistis, ad ulcera, phlymata, & phagedænas utuntur. *Panax Chironium.*

Panax Chironium. Prædicto similem facultatem obtinet. *Paronychia.*

Paronychia. Paronychias & fauos sanat, digeritq; ea quæ discuti possunt. Calfacit enim et deficiat in tertio ordine, estq; tenuium partium, & sine mordacitate. *Pentaplyllum.*

Pentaplyllum. Radix eius deficiat uehementer, nimirum in tertio ordine, citra mordacitatem tamen. Minum siquidem habet cum acrimonia, tum conspicius caliditatis. *Peplos.*

Peplos. Succū habet similem rithymalis, cum in alijs, tum quia purgat ceu illi. *Peplium.*

Peplium. Etiam fruticulus hic succū habet ut rithymali, ualidumq; non tamen admodum utilem. Radix eius uidetur superuacanea. Semē utile est, & sterculentum, pepli seminis similiter purgans. *Peperi, Piper.*

Peperi, Piper. Piperis radix uires cocto similes obinet. Fructus nuper germinantis, longū exiit piper: quare maturo est humidus, At fructus qui uelut omphac est, piper album est, nigro quidē acris. Nam illud iam uelut superaffatū uidet. Vtrumq; tamen ualent & calfacit, & deficiat. *Persea.*

Persea. Persee folia modicè astringūt, ita ut nonnunq; sistere queant sanguinem erumpentem. *Periclymenos, Volucrum maius.*

Periclymenos, Volucrum maius. Fructus eius & folia adeo uehementer incidunt & calfaciūt, ut si diutius bibantur, urinam sanguinolentam efficiant: principio tantum urinam mouentia. Foris cum oleo illa etiam excalfaciunt. Iuant & lenosos, & difficulter spirantes. Competens mensura est drachmæ unius cum uino. Deficiat etiam semen, & (ut quidam tradūt) si liberalius bibatur, sterilitatem inducit.

Perithereon.

Vim habet haec tenuis deficcantem, ut & uulne-
ra glutinet. *Petafites.*

Ex tertio est ordine deficcantiū: quamobrem ad cacoethes & phagedænicā ulcera eam adhibet. *Petrofelinum.*

Eius semen est gustu acre, cum amaritudine. Sic & in operibus calidum, unā cum incidendi effectu. Hunc menses & urinas affari prouocat, flatibus discuti. Calfacit itaq; & ficit in tertio ordine. Tota herba similem, sed imbecilliozem possidet facultatem. *Peucedanum.*

Succus eius admodū excalfacit & digerit, estq; tenuium & incidentium partium. Quare omnibus neruorū affectibus creditur opitulari: tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine humorū ortis. * Nec uerō intra corpus sumptus duntaxat, sed olfactu etiam prodest. Ad hæc sepe forarorum dentium dolores, cauitati impositus, protinus mitigauit. Quinetiā induratos lienes iuuat. Ad quæ omnia, licet etiam uti radice, quæ & squamas celerim ab ossibus detrahut, & arida illa ulceribus contumacibus remediū est optimum: minus quidem quam succus excalfaciens, nempe in secundo ordine iam completo, deficcans uerō in tertio incipiente. *Peganon, Ruta.*

Peganon, Ruta. Agrestis quidem in quarto ordine excalfacit, domesticita uerō in tertio. Est autem non solum gustu acris, sed & amaro. Ex quo sanè digerere, in cidereq; crassos & lentos humores potest, atque mouere urinas. Quin & tenuium est partium, flatibusq; extinguit. Quare ad inflationes competit, ac ueneris appetentiā inhihet: digeritq; atq; exiccacit strenue. *Pissa, Pix.*

Sicca quidē ficit & calfacit secundo ordine. At plus siccare ualet q̃ calfacere. Humida uerō citra, plus calfacit q̃ siccac: habetq; partium tenuitatem nonnullam, qua asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autē cyathū laniasse mensuram melli mistæ. Abitergendi etiā, cōcoquendi, digerendi quandā uim habent, uelut in gustu leuem amaritatē & acrimoniā. Sic leprosos ungues exmunt mistæ cum cera, lichenasq; detergunt. Coquant item duos & crudos tumores, cataplasmatibus inditæ. Atq; ad ea omnia, humida ualentior est: arida uerō glutinandis uulneribus aptior. *Pistaceon.*

Ex humida pice efficitur, genere quidem ei simile, sed essentia tenuioris. *Pistacium.*

Fructus eius quodammodo tenuioris essentia est, subamarum quid & odoratum retinens. Obstructiones itaq; omnium uiscerum aperit, sed præcipue iecionis. *Pryides, Picæarum fructus.*

Astringit, similis acris est, cum amaritudine quadam. Vnde thoracis pulmonisq; expuitionibus confert. *Pitya, Picea.*

Piceæ cortex uincentem facultatē astrictorū sortitur, sic ut intertregines sanat, uentremq; potius sistat. Sed & ambusta cicatrice in cludit. Tede

- Teda cortex.* cortex illi adūmilis est, uiribus tamen modera-
tioribus. Vtriusq; arboris folia glutinant ulcera.
In corni folijs & cortice ualidiora culta sunt, adeo
ut cum molestia mordicet. Fuligo quæ ex dactis
colligit, ad pilos superciliū est cōmoda, iremū
ad angulos oculorū erosos, lippiētes, & lacry-
mantes. Pityusa.
- Pityusa.* Viribus est similis rithymalo, succumq; forti-
tur similem, & similiter purgat.
- Platanus.* Humidioris frigidiorisq; est essentia, non ita
multo quā symmetra. Proinde folia uiridia tri-
ta & illata, non obscurē nascentes phlegmonas
aduūst. Cortex & puluē magis desiccant uim
obtinēt: ut ille quidem in aceto coctus ad den-
tium adhibeat dolores: puluē uero cum adipe,
ad ulcera ambusta. Vitandus est puluis folijs ar-
boris infidens. Alioqui si ateralatur spiritu, ar-
teriam offendit, ualenter siccans, exasperansq;
Necnon uocem laet, sicuti & auditū dūcūm, si
in oculos aut aures incidit.
- Polygonon.* Polygonon, Centinodia.
Vti astrictionis est particeps, ita in eo frigidū,
aqueum uincit: ut secundo excessu refrigeret, aut
enim initio tertij itaq; ætuantis uentriculo, ery-
sipelati, atq; calidis phlegmonia, si illinatur frigi-
dum, auxiliatur. Sicut præterea uniuerſas fluxio-
nes: quæ ratione uidetur exaceruari. Quare ad
herpetas, ulceratq; bonum remedium est. Quin-
etiam cruenta uulnera glutinat, auriumq; puri &
ulceribus confert. Scilicidid & stranguria affec-
tus exhibitur, urinam mouet, ut Dioscorides
ait. Fœminæ ad omnia mas præstat.
- Polygonum.* Polygonum.
Eius folia modicē astringūt. Iuidenturq; si bi-
bantur, lac generare. Itaq; superauerit in eo cali-
dum humicū umiq;.
- Polygonatum.* Polygonatum.
Astrictionis pariter & acrimonie habet quip-
piam, cum fastidiosa quadā amaritudine. Quare
nō usque adeo est uesicū. Sunt qui radicē eius illi-
nant uulnerib; Alij eo uicū in facie detergunt.
- Polemonium.* Polemonium.
Tenuium partium est, & desiccandi uim obti-
net. Vnde quidā radicē eius cum uino ad ischia-
das, dysenteriam, lienemq; in duratū propinant.
- Polum.* Polum.
Amarū est ac modicē acre. Obstructionē itaq;
omnia uiscera liberat, urinamq; & menses pro-
monet. At uiride magna enī uulnera glutinat,
& maxime species eius fruticosa. Aridum sanat
rebellia ulcera, præcipue quod minus est.
- Polum minus.* Polum minus.
Actius & amarius est hoc quā maius, adeo
ut ex tertio sit ordine desiccantium: ex secundo
autem completo calfacientium.
- Polygonum.* Polygonum.
Desiccāt & calfacit secundo excessu itaque &
ipsam uulnera glutinat.
- Potamogeton.* Potamogeton.
Astringit & refrigerat similiter polygono, sed
essentia eius crassior quā polygoni est.
- Polypodium.* Polypodium.
Dulcē simul & auitā uicē obtinet quali-
tatem, ut facultatis sit citra morſum admodum
exiccantis.
- Prasium.* Prasium, Marrubium.
Prasium amarum culū sit, iecur ac lienem libe-
rat obstructionē, thoracem & pulmonem expur-
gat, ac menses promouet. Sed illū etiam deter-
git & digerit. Calfacit itaq; secundo excessu cō-
pleto: siccatur autē tertio ineunte, aut completo.
Succo eius ad aciei oculorū claritatem utun-
tur cum melle: per naresq; aurigenem purgat,
ipsūq; ad inueteratos aurū dolores adhibent.
- Propolis.* Propolis.
Modicē quidē extergit, ceterū ualidē trahit.
Est enim essentia tenui. Excalfacit porro ordine
secundo completo, aut certē incipiente tertio.
- Prarmice.* Prarmice.
Flores eius ciendæ sternutationis uim obti-
nent. Sugillata & cæteras ecchymoses digerit. Vi-
ridis porro calfacit secundo ordine, tertio autem
siccāt.
- Prelea.* Prelea, Vimus.
Vimi folijs quandoq; recens uulnus congluti-
nauius, confidentes astringentem simul & ab-
stergentem inesse eis facultatem. Ceterū cor-
tex magis amarus est, astrictiorisq; magis. Itaq;
cum aceto & lepras sanat. Quod si uiridia circū-
ligetur uulneribus, ea glutinā potest. Radices
etiam eandem uim obtinent. Quarum decoctio
sunt qui perfundant fracturas, quæ callo obdu-
ci desiderant.
- Pteris.* Pteris, Filix.
Radix eius latum lumbicū perimit, si in me-
llicato pondere drachmarum quatuor bibatur.
- Pteris.* Pteris, Filix.
Quare ipsam partem uulū necare, mortuum
autem expellere, non est mirum. Siquidem ama-
ra exiit, paulūq; astrictionis obtinet. Vnde uali-
dē ulcera desiccāt, citra morſum tamen. Similem
ei uim habet Thelypteris.
- Pycnocomum.* Pycnocomum.
Radix, fructus, & folia eius, digerendū attra-
hendiq; obtinet facultatē: acia nimirū cum sint.
Folia eius phlymata furunculorūq; discutiūt. Fru-
ctus ualentior est: nam & palos, & tela infixā,
ad extremam cutem elicit. Radix ad supradicta est in-
firmior, ceterū fluuiam bilem expurgat.
- Pyreturum.* Pyreturum.
Radix eius causticam possidet facultatē, qua
dentes refrigeratos mitigat. Porro ad rigores
ante periodum cum oleo cōficatur: stupidosq;
& resolutos adiuuat.
- Pyros.* Pyros, Triticum.
Foris impositum, primi est ordinis calfacien-
tium: ceterū nec siccare, nec humectare ma-
nifestū potest. Habet uerō etiam quiddam lenio-
ris, obstruentisq; naturæ. Quod ex eo amyllum
conficitur, ipso est tum frigidus, tum siccus.
Quod ex pane sit cataplasma, magis digerit, q̃
quod ex tritico, salis & fermenti ratione. Fer-
mentum quippe uim attrahendi habet, digerent-
diq; quæ in alio residet.
- Rhamnus.* Rhamnus.
Desiccāt & digerit excessu secūdo. Refrigerat
in primo cōpleto, aut secūdo incipiente. Proinde
herpetes sanat, & erysipela nō magnopere ca-
lida.
- Rhaphanis.* Rhaphanis, Radicula.
Excalfacit excessu tertio, desiccāt uerō secūdo.
- Rheum.* Rheum.
Aggreditur in utroq; efficacior est. Semen enī effi-
cacius est planta. Et enim inest digerēdi facultas.

Rheum, Rha.

Rheum.
Rha. Quiddam habet terrestre frigidum, cui indicio est atrictio: adiuncta est illi tamen quedam caliditas. Siquidem si mandatur plusculum, sub-acre conspicitur. Est etiam aeris cuiusdam substantiae subtilis particeps: quod indicat laxitas, leuitasq. Quare cōuulsi, ruptis, orthopneæq. prodest. Sic quoq. liuena & lichenas cum aceto illurum perfricat. Atrictiohis ratione, sanguinem expuentibus, coeliacis, & dysentericis confert.

Rhetina, Resina.

Rhetina.
Resina.
Maisthe. Resinae omnes desiccant & exalfaciunt. Lenti scilicet tamen (quam uocant maisthen) primò de bentur partes. Nam praeter quod pauca et in est atrictio, qua stomachi, uentrisq. & iecoris imbecillitatibus, phlegmonisq. etiam accommodatur, desiccant insuper circa mordacitate. Minus enim acris est, & maxime tenuium partium. Inter ceteras praeter terebinthina, manifestam quidem, nō tamen similiter atq. maisthe, atrictionem possidens. Verū adiuncta habet quandam amaritudinē, per quam magis q. maisthe digerit. Per eandem etiam usque adeo abstergit, ut ploras sanat. Quinetiū q. in profundo residet, magis ceteris extrahit, ob maiore tenuitate partium. Atramen pinea, & hac etiam magis strobilina, acriora ea sunt, sed nō magis tamen digerunt, attrahuntur. Media inter has sunt picea & abietina. Habet porro & emollens quiddam terebinthina. Secundum locū habet in emollendo lentissima, sicuti cyparissina in ipsa acrimonia.

Rhodos, Rosa.

Rhodos.
Rosa. Ex aqua substantia calida, duabus alijs qualitatibus mista, astringenti uidelicet & amara, composita est. Flos tamen magis, q. ipsa rosa, est astringens: ac proinde etiam exsiccatior est.

Rhodora rhiza, Radix rhodia.

Radix Rhodia. Tenuium partium & digerentis est facultatis. In calcifiendo uero secundi ordinis est censenda, aut certe tertij incipientia.

Rhododaphne.

Rhododaphne.
phoe. Tota sua essentia uenens est & homini & pecoribus. Porro calfacit excessu tertio: primo autem desiccant.

Rhœa, Mālum granatum, siue punicum.

Rhœa.
Mālum granatum, punicum. Omne mālum granatū astringentē qualitatē sortitur: non tamen in omnibus ea exuperat. Nam inter ea quaedam sunt acida, quaedam plus dulcia q. austera. Pro ratione quarum qualitatū uincendum, suos usus praestit. Porro acini astringentiores, & exiccantiores sunt succo. Sicuti & his putamina, quae fida dicuntur. Ad similem illis uim habent flores qui cyrtini dicuntur.

Rhus, Sumach.

Rhus.
Sumach. Ad desiccandum & astringendū coriarū hac planta fructicosa utuntur. Medicis in usu sunt fructus eius & fucus, austere admodū qualitatē. Exiccant itaq. in tertio ordine, refrigerant uero in secundo.

Rhypos, Sordes.

Rhypos.
Sordes. * Sordes quae i gymnasiōrū statuis xreis abraditur, digerendi emollientisq. uim obtinet: quae autem ab ijs qui in palaestra exercentur, quantū accepit pulueris, tantū ea est diuersa: atq. hāc sordem *uēpos* Graeci nominant. Prior igitur, quae ob contractam æruginem, acrior etiam existit,

cruda phymata digerit. Secunda autem, optimū est phlegmones mamillarū remedium. Constat enim ex puluere repercutiente, oleo emolliente, ac deniq. sudore & sordibus digerentibus.

Sagapenum.

Sagapenum. Liquor est calidus & tenuium partium, sicuti & alij liquores. Sed absterfione quandam obtinet, qua oculorum cicatrices expurgat, extenuatq. Suffusionibus etiam & hebetudinibus oculorū, quae a crasse humorum proueniunt, non malum est medicamen. At planta ex qua prouenit, ferule asinilis, imbecilla est & inutilis.

Samplyphon, Maiorana.

Samplyphon.
Maiorana. Tenuium partium & digerentis est facultatis: desiccant enim & calfacit ordine tertio.

Saprotēs phos, Caries lignorum.

Caries lignorum. * Caries eorum praecipue lignorum quae parti cipia sunt atrictionis & absterfionis, ut ulmus, expurgat, impletq. ulcera humida.

Sarcocolla.

Sarcocolla. Mistam uim habet ex emplastica quādam substantia, & pauca amara. Itaq. circa morsum desiccant, ac proinde glutinaria ulcera ualeat.

Saryion, Triphylon.

Saryion.
Triphylon. Humidū calidumq. est temperie, ob idq. dulcere. Recrementum tamen & illatiosam humiditatem possidet. Quocirca ad venerem incitat.

Selmon, Apium.

Selmon.
Apium. Aded calidū est, ut & urinam & menses cieat. Flatus quoque digerit, & magis semen quam herba. Oroscelini & hippocelini similis uis existit. Verū Hippocelinum imbecillius est, oro-celinum ualentius.

Seris, Cichorion.

Seris.
Cichorion. Holus est subamarum, & magis quod agreste est. Id namq. est frigida & sicce temperaturae, secundo excessu. Ceterū domesticæ magis quam agrestis refrigerat. Porro atraq. astringentis: qualitas est particeps, ut chondrilla, quae est etiam serere species.

Seriphum.

Seriphum. Absinthio est tum specie, tum gustu simile. Ceterū nō aequē astringit: sed calfacit ualentius, necnon amaritudinem quandam salsuginosam refert, uentriculoq. est insectum: magisq. absinthio lumbricos enecat. Calfacit itaq. secundo ordine intemto, siccant autem in tertio.

Seseli.

Seseli. Aded exalfacit tum radix, tum fructus, ut moueat urinas. Est enī tenuis partium, ut & cominabilis morbis, & orthopneis competat.

Sesamum.

Sesamum. Viscosum & pingue cum sit, emplasticū etiam existit, emollientisq. ac modice calidum. Oleum quod ex eo conficitur, & ipsius herba decoctū, eiusdem fuit facultatis.

Sesamoides magnum.

Sesamoides magnum. Semen eius ut helleborus purgat, similiterq. abstergit, calfacit, & desiccant.

Sesamoides album.

Sesamoides album. Huius semen nonnullam acrimoniam sortitur, uehementerq. est amarum. Exalfacit itaq. rumpit, extergitq.

Sideritis.

Sideritis. Nonnihil abstergit, sed plurima pars eius est

humida & mediocriter frigida, cum exigua astringe-
thone, qua phlegmonē sedat & glutinat. Sideri-
tis autem Achillea, dictam superans astringe-
thone, sanguinis eruptioui, dysenteriae, & muliebris pro-
fluvio est aptissima.

Sicyos, Cucumis.

Maturus, tenuioris essentiae est: immaturus,
crasioris. Sed incidendi & abstergendi facultas
eis inest. Quare & urinā mouent, & corpus splē-
didum reddūt. Sunt enim humidi frigidisq; qua-
si in secundo ordine. At arescēta tum radix tum
femen, siccant primo, aut secundo incipiente, or-
dine: magisq; abstergunt, q̄ ipsius melonis caro.

Sicyos agrios, Cucumis agrestis.

Cucumis a-
grestis.
Elaterium.

Tum ipse, tum eius succus, quem elateriū uo-
cant, aut ex folijs & radicibus pressus, perunlis
ad medicationem exiit. Elaterium itaq; menses
ciēt, fortumq; perimit applicatū, seu alia omnia
amara & tenuium partium. Summe liquidū est
amarum: calfacitq; in secundo ordine, ac proinde
etiam digerit. Sic enim eo angina laborantes
inungūt quidam cum melle aut oleo ueteri. Bon-
um item est regio morbo affecta infusum cum
lacte in nares: similiter dolores capitis sanat. Ra-
dis atq; foliorū succus similem, sed imbecillio-
rem facultatem sortitur. Radix etiam abstergit,
digerit, emollitq; Cortex potentius deficiat.

Silphium, Lasepitiū.

Silphium.
Lasepitiū.

Silphij liquor calidissimus est. Necnon folia,
caulis, & radix, strenuē etiam sunt calida omnia
tamen statuentē magis essentiae sunt, ac proinde
difficilia concoctū. Foris autem imposita cor-
pori, efficaciora, liquor precipue, ad modum tra-
hentem facultatem possidens. Attamen & excre-
scentias exterrit, & quandam liquandi uim pos-
sidet.

Sifon.

Sifon.

Calidus & subamarus exiit. Vnde urinā mo-
uet, concoquit, menses prouocat, omnesq; uiscē-
rum obstructions referat.

Sion.

Sion.

Quantum gustu * aromaticū est, tantū etiam
excalfaciens facultatis est particeps. Quare &
digerit, & urinam mouet, & calculos renū frau-
git, & menses euocat.

Sisaron.

Sisaron.

Sisari radix cocta stomacho grata est, & uri-
nam mouet, secundo ordine excalfaciens, cum
amantudine & astringēte leuicula.

Sisymbrium.

Sisymbrium.

Tenuium est partium, facultatisq; digerentis,
calfaciens, & exccantis in tertio ordine. Quid-
dam semen cum uino exulcent singulitiennibus,
tormināq; patientibus.

Sisymbrium, quod Cardaminem uocant.

Cardaminis.

Si siccum sit, tertij est ordinis calfacientium &
exccantium: si humidum, uirideq; secundū.

Scandix.

Scandix.

Agreste est olus, subacre & amarum. Calfacit
itaq; & siccit secundo ordine intenso: ualenter
mouet urinā: uiscerāq; liberat obstructionsibus.

Scilla.

Scilla.

Admodum quidem incidit: calfacit autem se-
cundo ordine. Porro praestat eam assam aut eli-
xam sumere, quod sic eius uehementia exoluat.

Scolymos.

Radix eius, si quis illam in uino coctā bibat,
grauelentem urinam abundanter elicit, facto-
riq; alarum medetur. Sacus enim eius est purga-
torius. Calfacit porro secundo & completo or-
dine, aut tertio incipiente: siccit uerō secundo.

Scordion.

Nonnihil amarum obtinet, & acerbum, & a-
cre: ipsiusq; acrimonia, aliq; acrimoniae est peris-
milis. Expurgat igitur, excalfacitq; uiscera: men-
ses urinamq; prouocat. Conuulsā, ruptā, dolo-
resq; laterum ab obstructione & frigore obor-
tos, epotum sanat: illurum uiride, magna uulne-
ra glutinat: purgat fordida: in perispermum aridum,
contumacia ad cicatricem perducit.

Scorodon, Allium.

Deficiat & excalfacit excessu quarto. Porro
ophioleorodon, aliū agreste est, domesticū uo-
leimus.

Scorodoprasum.

Vt gustu & odore, sic uiribus inter allium &
porrum mediam naturam sortitur.

Scorpiodes.

Excalfacit ordine tertio: deficiat secundo.

Smilax, Cactus arbor.

Facultatis est uenenosae.

Smirna, Myrrha.

Secundi est ordinis calfacientiū & exccantiū.
Vnde capitis uulnera glutinat. Inest illi amari-
tas non exigua, qua sctum & lumbricos teneat,
enctiq;. Habet etiam & abstergendi uim mo-
deratam. Quare ocularibus melleat medicamen-
tis, & nō quae ad ueterem tūsum, atq; anhe-
lationem aduoluntantur.

Smirna Boice, Myrrha Beroia.

Vim habet calfaciendi, fundendi, emollendi.

Smirnum.

Ex eodem genere cum apio est & petroselinū:
fueritq; apio quidem ualidius, imbecillius uerō
petroselino. Itaq; & urinās & menses prouocat:
calidum siccumq; tertio ordine.

Sonchus.

Dum uiridis est, aquea terrealis essentia con-
stat, utraq; leuiter frigida: uam & astringētionis cu-
iusdam est particeps, & manifestē refrigerat, tum
illurum, tum estus. At arescēta, terrestrior reddi-
tur, modicam ascensens caliditatem.

Sparganium.

Deficcans est facultatis.

Spartum, Genista.

Sparti (quo & iustes alligat) tum fructus, tum
succus uirgā, ualentē trahendi uim possidet,
Staphulinus, Pastinaca.

Satiua imbecillior, agrestis ad omnia potēti-
or est. Vrinās mensesq; prouocat, abstergitq; nōni-
hil, cum herba quidē tota, tum uel maxime semē
& radix.

Strachys.

Gustū est aceti & amaro, tertijq; calfacientium
ordinis. Vnde menses rationally prouocat.
Facit tamen abortum, atq; secundas eiicit.

Storbe.

Fructus eius & folia astringunt citra morda-
citatē, deficcant in tertio serē incipiente ordine.
Quare decoctum eorū inicitur dysenteria, au-
ribusq; purē fluentibus: quod etiam magna uul-
nera glutinat, praecipue cū uino atro & austero.

Valenter

Valenter enim deficiat omnes præter naturā humi-
ditates. Folia uridita illa erumpentē sangui-
nem supprimūt, suffusionibusq; oculorū exiētā
medentur. *Secchus.*

Storach. Amara est & mediocriter subastringens, cūm
nimis ex terrena essentia frigida exigua, & ex
huara altera terrena copiosa, constat. Quare ob-
structione liberat, extenuat, extergit, roboratq;
& uiscera & uniuersum corpus.

Stranotes.

Stranotes. Aquaticus quidem humidā & frigida faculta-
te est: terrestis uerō, nonnihil habet astringentis.
Proinde & ulcera glutinat.

Struthion.

Struthion. Radix eius est aeris, calidā, siccatq; tempera-
mento, ex quarto propemodum ordine exalta-
cientium. Sed & abstergit, & irritat: proinde &
stermationem prouocat.

Stryax.

Stryax. Excalcificat, emollit, concoquit. Quamobrem
tussi, catarrho, pituitæ distillationibus, rancedi-
nibus auxiliatur. Tum menses, seu porum, seu
admotum prolucit. Combusti eius fuligo, tliuris
fuligini est similis.

Syca, Ficus.

Syca, Ficus. Aridæ excalcificat ordine primo aut secundo
incipiente, habentq; partium tenuitatem quan-
dam: quare tubercula dura concoquunt, digne-
runtq; tum ipsæ, tum ipsarū decoctum. Verum
ubi magis concoquere consilium est, miscenda
est farina triticea: ubi uerō plus digerere, hordea
cea. Panis horum in medio. Porro quæ sunt pin-
guiores, magis possunt concoquere: quæ acio-
res, magis tum extergere, tum digerere. Ficus ui-
rides, imbecilliores sunt. Vtræq; tamen & sicce
& humidæ alium subducunt.

Syca, Ficus arbor.

Syca, Ficus arbor. Calidæ, tenuiumq; partium temperaturæ est,
sicuti indicant tum liquor eius, tum solorū suc-
cus. Valenter enim calcificat utroq;. Itaq; nō mor-
dicat tantū, aut uelementer absterget, sed & ul-
cerat, & ora uasorum referat, & uerrucas extir-
pat. Quin & uim purgatoriam habet. Porro la-
chryma & succus agrestis ficus, quam caprificū
uocant, ad omnia, q̄ faciū, ualentior est. Cæterū
ipsarū furculi adeo calidi sunt, atq; tenuium par-
tium, ut carnes bubulas duras, si coquendis adij-
ciantur, friabiles ac teneras reddant.

Symphytum petracum.

Symphytum petracum. Habet quandam uim incidendi, quæ collectū
in thorace pulmoneq; pus expurgare potest: ac
simul contrahendi facultatis est particeps, quæ
ejectionibus sanguinis auxiliatur: estq; humi-
dum, ac non immodicè calidum: unde & dulce
apparet, atq; odoratū iucundum. Ad hæc, man-
sum sitim extinguit, & arteriæ sanat asperitates.
Liquet igitur ipsum etiam & digerere, & cōtrin-
gere posse. Unde & enterocolicis imponit, & ad
conuulsā & rupta cum oxymelē bibitur.

Symphytum magnum.

Symphytum magnum. Similem dicto uim habet. Cæterū neq; uide-
tur dulce, neq; odoratū. Est uerō secundū uisco-
sitate mordacitateq; scilicet simile.

Spondylon.

Spondylon. Fructus eius acris & incidens est: itaq; ad asth-

ma & comitialē morbū aptum est medicamen-
tum. Prodest & aurigini. At radix ultra iam dicta, si
stularū callos tollit, si sit circumrasi. Floris suc-
cus, ad diuturniora aurii ulcera cōueniens repo-
natur.

Schinus, Lentiscus.

Schinus, Lentiscus. Ex aqua essentia leuiter calida, & terrena fri-
gida nō pauca, constat. Desicat itaq; secūdo or-
dine cōpleto, aut tertio incipiente, in caloris fri-
gorisq; medio cōsistens quodammodo. Astrin-
git autem ex æquo, moderatēq; omnibus parti-
bus suis. Succus bibitur & per se, & cum alijs me-
dicamentis, quæ dysenterias & alius affectus san-
nant. Quin & ad sanguinis exuptiones, flores
muliebre, necnon sedis uuluxq; procidentias
idoneus est, utpote ad hypocihida nonnihil ac-
cedens propē.

Schinus anthos, Schini flos.

Schinus anthos, Schini flos. Modicè calcificat, modicèq; etiam astringit, nec
planè à tenuitatis natura est alienus. Quare uri-
nam & menses mouet, siue potione, siue somnō
adhibitis. Prodest etiā iecoris, stomachi, & uen-
tris inflammationibus. Cæterum magis astrin-
git radix, quamq; flos etiam astringit omnibus
partibus suis. Proinde medicamentis quæ hēmo-
ptois exhibentur, miscetur.

Schænos leia, Iuncus leuiss.

Schænos leia, Iuncus leuiss. Quidā oxyſchænos, alius oligoſchænos dici-
tur: gracilior duriorq; oxyſchænos, crassior la-
xiorq; oligoſchænos. Fructus huius somnū cō-
ciliat. Oxyſchæni autē duæ sunt species: altera
sterilis, cuius nullus usus in medicina: altera quæ
fert semen somnū cōciliatiuū, sed minus q̄ oligo-
ſchæni. Vtrūq; si cum uino bibatur, uentris flu-
xus deficiat, & muliebre profluiū rubrū sistat.
Est itaq; eorum temperies composita ex terrena
essentia leuiter frigida, & aqua leuiter calida.

Terminthos, Terebinthus.

Terminthos, Terebinthus. Cortex, folia, & fructus eius astringunt, & se-
cundo ordine excalcificat: unde etiam quod siccet,
liquet. Porro fructus aridus propinquus est ter-
tio ordini defecantū, calcificatq; ualenter. Qua-
te & urinam prouocat, & lienibus auxiliatur.

Tentula, Beta.

Tentula, Beta. Nitrosæ facultatis est particeps, quæ tum dige-
rit, tum extergit, & per nares expurgat. Cæterū
cocta nitrositate exurit, euaditq; leniter digerē.
Ad detergendū tamen digerendūq; ualido est
beta alba.

Tencrium.

Tencrium. Incidit & tenuium est partū: quare lienes san-
nat. Ac exsiccat quidem in tertio, calcificat autem
secundo ordine.

Tephra, Cinis.

Tephra, Cinis. Ex partibus cum terrenis, tum etiā fuligino-
sis (quæ & tensæ sunt, & cum aqua in qua mace-
rant prius fuerint cineres, excolant) constat. Pro
materie tamen cōbustæ differentia, cineris tem-
peries uariat. Quare haud scio quā ratione Dio-
scorides astringere cineres omnes proderit,
cūm siculnens cinis eiusmodi omnis qualitatē

60 sit exspecta, nimirū ipsa arbore nulla parte sui acer-
bam qualitatē reddente. At ex acerbis lignis
cōfectus cinis, nō parū quidem astringit: memi-
nit me eo aliquando sanguinis suppressisse eru-
ptionē. Verū nullus unq; ad tale uti siculneo au-
deat. Siquidē hic acrimonia plerimū, utristiq; fa-

AA

Calx. cultatis obtinet, mixta absterfioni. Est & calx cineris quædam species, cæteris tenuioris essentis, quæ ex lignis fit. Porro elota, medicamen est contra morium deficiens, magis si bis tæne lau-
Cæteris si marina aqua abluta sit, admodum digerit.
Tephium.

Tephium. Exiccandi & detergendi facultate est, non tam insigniter calida, sed forsitan secundo ordinis. Deficcat etiã secundo, intendo tamen, aut tertio principio. Proinde ad putrida ulcera cõgruit, & cum aceto uranij utiliginem sanat.

Telis, Fœnumgræcum.

Telis. Fœnumgræcum. Calfacit secundo ordine, deficcat primo. Proinde feruētis phlegmonas irritat, quæ uerò minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo perficit.
Tithymali.

Tithymali. Tithymali omnes uincuntur habent acrem, calidamque potentiam, cum amaritudine quadam. Validissimus eorum est liquor: dein fructus & folia: postremo radix. Hæc aceto incocta, sanat erosorum dentium dolores: liquor in ipsa foramina inditur. Cæteris si aliam partem cõtingat, cõtinuò adurit ulceratque illam, ex quarto existens calfacientium ordine, quæ ad exurentia pertinet. Sic pilos quoque, & uerrucas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cum oleo inunctus succus euellit: detergitque lichenas & psoras, propter amaritudinẽ: necnon ulcerum phagedenica, anthracode, & gangrænode, quia ualenter calfacit & deficcat, aliquando inuare poterit. Ad hæc fistularum callos eximit. Prædicta omnia folia & fructus præstare possunt, sed imbecillius. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos, uti assolent. Celerrimè enim ab illis in uertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum septem sint tithymalorum genera, ualensissimus est quæ characiam maremque nominant: & femina nuncupata myrsinites: & qui in petris nascitur arborecens. Deinceps qui phlomo asimilis est, & cyparissias. Dein marinus: ac denique helioscopius. Pro portione autem facultatis ipsorum, & cinis & lixiuium existit.

Tragacantha.

Pisces uelut in uertiginem capiuntur: scilicet in fructibus tithymali generis.

Tragacantha. Emplastica facultatem similem gummi obtinet, necnon obtusiores acredinem. Ac sanè similiter illa deficcat.

Tragion.

Tragion. Tragion folia, fructus, lachrymas, trahentis digereuntque sunt facultatis. Est uerò & tenuius partium, & facultate in principio tertij ordinis calida. Stupites, & infixæ corporibus extrahit, lapides frangit, menses mouet, drachmæ pondere potum. Porro in Creta sola nascitur, lentisco simile. Alterum minus, cuius folia scolopendrio similia sunt, uisitur quidẽ multis in locis, sed non parum habet facultatis astringentis, ut & ad fluxionum affectus conueniat.

Tragoriganon.

Tragoriganon. De hoc in sermone de organo diximus.

Tribolos.

Tribolos. Ex humida essentia modicè frigida, & sicca non medio critere, cæteris similiter frigida cõstat. Unde cõtra phlegmonarum generationes, & cõtra omnes influxus cõgruit. Porro tertio critris ipsius fructus, cui tenuius sit partium, porus renu calculos cõterit.

Tripollon.

Radix huius est acris, & facultate calida in tertio excessu.

Tripollon.

Triphyllum.

Calfacit & fliccat in tertio ordine, ut bitumen, cui odore est simile. Proinde potu laterum dolores ab obstructione naros iuuat: & urinæ mensesque prouocat.

Triphyllum.

Trichomanes.

Eadem præstat quæ adiantum.

Trichomanes.

Trychnon, Solanum, Strychnon.

Ekulentum quidem astringit, refrigeratque in secundo ordine. At eorum quæ eius non sunt, unum quidem dicitur halicacabum, fructum habens rubrum, acino uix perisimilem. Alterum uerò est fruticosum, à cõticiando somno Hypnoticum appellatum. At tertium, quod ad insaniam adigat, omnes Manicū nominat. Halicacabum igitur, fructum feruētis urinæ idoneum, compluribus facultatibus quæ ad iocur, uesicam, & renes ac cõtomedantur, miscetur. Solani uerò hypnotici cortex radices, si cum uno bibantur, somnum accersit, drachmæ pondere sumptis, existens succo papaueris similis, nisi quod imbecillior, utpote tertij refrigerantium ordinis, cum ille sit quartus. Huius solani semen urinæ ciendi uim habet. Si plus tamẽ duodecim corymbis hauseris, dementiũ asciscet. Quod reliquum est ex solanis propolis, est ad medicaciones intra corpus inutile. Nam si quatuor eius drachmæ offerant, mortẽ inferent: si pauciores, insaniam. Vnacetẽ innoxie sumit: nihil tamen utile præstat. At foris corpori illitum, ulcera maligna per sanat. Verum ad italia, radices cortex præfert, deficans secundo ordine iam cõpleto, aut tertio incipiente: secundo autẽ incipientẽ refrigerans.

Trychnon.

Solanum.

Strychnon.

Halicacabum.

Solanum Hypnoticum.

Solanum manicum.

Hyacinthus.

Radix eius bulbosa est, deficans primo ordine: secundo autem, aut initio tertij refrigerans. Fructus leuiter extergit astringitque: unde & regio morbo laborantibus exhibetur in uino, ordine quidem tertio deficans, at in medio caloris frigorisque consistens.

Hyacinthus.

Hydnon, Tuber terræ.

Substantiam habet uiuentẽ terrestrem quidem, sed cum paucula tenuitate permixtam.

Hydnon.

Tuber terræ.

Hydropeperi.

Non usque adeo calidum est, ut piper. Vixi dis ipsa herba cataplasmati instat imposita, fugillata & tumores induratos digerit.

Hydropeperon.

Hyoscyamus, Alitercum.

Cui semen atrum est, insaniam ac fœporem inducit: cui uerò medio critere flauum, propinquè ei obtiner facultatẽ. Vtque tamen fugendi sunt, ut deleterij & inutiles. At qui semen & Bos cõdudus, sanitati idoneus existit, ex tertio quodammodo refrigerantium ordine.

Hyoscyamus.

Alitercum.

Hypericum.

Calfacit & fliccat, essentia tenui, adeo ut menses urinasque prouocet. Illitum uiride, ad cicatricem omnia perducit ulcera. Siccum cõtusumque si in spemgas, mollia, humida, & putrida ginola sanabis. Sunt qui & ichthiasie bibem dum propinquant.

Hypericum.

Hyssopus.

Refrigerat tertio ordine, parumque a papauere distat.

Hyssopus.

Hyssoglossa.

Radix eius & succus emolliendi uim possident.

Hyssoglossa.

Hyssopus.

Hyssopum.

Hyssopum. Desiccatur & calcificatur ordine tertio, sed tenuius est partium.

Phaci, Lentesc.

Phaci, Lentesc. Valenter astringit, mediumq; tenent inter ca-
lorem & frigiditatem. Desiccatur tamen in secundo
ordine. Ipsum itaq; earum corpus, siccatur & sistit al-
ium. Exterius decoctum prouocat. Proinde prior
aqua abijciatur, ubi retentio causa exhibenda.

Phacox, Lenticula palustris.

Lenticula palustris. Humida frigidaq; temperaturæ existit, utrin-
que ex secundo ordine.

Phaleris.

Phaleris. Succus, semen, & folia rursus, commodè potari
creduntur cetera uelice dolores, cum in se habeat
tenue quiddam & calidum.

Phalangites.

Phalangites. Sic dicitur, quod moris à phalangis auxilio
sit. Est autem facultas tenuius partium, & exci-
cantis, quare tormina lenit.

Philomus, Verbaſcum.

Philomus, Verbaſcum. Huius herbe duæ sunt species. Quædam enim
folijs est candida, quædam uerò nigra. Rursus,
albæ quidem mas est, cuius folia angustiora for-
mina, cuius maiora uisuntur. Est & alia philomus
agrestis, flores habens aureos & luteos: nec non
alia quam philomida appellat. Priorum duarum
radix acerbæ gustu est, & fluxionum affectibus
prodest, atque adeo dentium doloribus: quanq;
folia digerendi uim habent. Similiter & aliarum
folia. Omniū quippe folia desiccandi & deter-
gendi uim possident.

Phoenix, Palma.

Phoenix, Palma. Astringitior facultatis est particeps omnibus
partibus suis. Siquid ramorum succus austerus est,
ex aqua substantia tepida, & terra frigida con-
stitis. Similis facultatis est eius cerebrum, cui aprum.
At fructus, & maxime dulcis, non paruam ob-
tinet caliditatem. Qui quidem cum edendo sit, ma-
gno est usus, non tantum foris impositus, ubi ro-
borare, desiccare, contrahere, stuporem est consi-
lium, sed tanquam abesse sumptus, & simul cum
alijs, & per se. Porro tenerum palmæ germen, can-
dem cum eius cerebro facultatem sortitur. At cor-
tex astringit quidem, ac plus quam dicta omnia
desiccatur: utpote minimè habens humiditatis.
Quare ad ulcera putrescentia, laxatos articulos,
hepatitis & uentriculi imbecillitates, eo intrus & fo-
rus administrato utuntur. Radix citra morsum
desiccatur, cum nonnulla astringente.

Phormion.

Phormion. Phormij semine cum melle ad leucomata utun-
tury. Sed spicula etiam extrahere creditur, uel
lun & ipsa herba. Quare tenuius partium, & at-
trahendi digerendiq; potentiam obtinet.

Phu.

Phu. Odorata quodammodo eius est radix, uero
uicibus similis: ad plerq; tamen infirmior. Mo-
uet autem urinam, ut nardus gallica.

Phycos, Alga.

Phycos, Alga. Ex mari exemptus & uiscus, siccatur refrigeratq;
in secundo ordine: habet enim quiddam modice
acerbum.

Phyllitis.

Phyllitis. Acerba cum sit, merito & diarrhoeas & dysen-
terias epota iuuat.

Phyllon malabathrum, Folium malabathrum.

Nardo similem possidet facultatem.

Chalbane, Galbanum.

Folium mala-
bathrum.
Chalbane.
Galbanum.

Succus est plantæ ferulaceæ, molliendi & dige-
rendi ui: calcificatur enim ordine tertio incipiente,
aut completo secundo: siccatur uerò secundo inci-
piente.

Chamadrys.

Vincetem habet qualitatem amaram. Est &
quodammodo acris: quare merito lenes colla-
gum, urinas & menses prouocat, crassitudinem
humorum incidit, uiscerumq; obstructions re-
purgat. Calcificatur itaque & desiccatur tertio ordine:
plus tamen calcificatur quam siccatur.

Chamaecissos.

Flos eius admodum amarus cum sit, iecur ob-
structum aperit: daturq; & coxendicæ laborantibus.

Chamaelea.

Vincetem habet qualitatem amaram: quare
admodum fordida ulcera, & quæ maximè indu-
ta sunt crustis, purgare cum melle est potens.

Chamaeleuce.

Calcificatur quodammodo tertio ordine, siccatur pri-
mo.

Chamaeleon.

Nigri quidem radix, letale quiddam obtinet.
Quare foris usus eius ad ea quæ absterſione pos-
sunt, administratur. Præterea digerentibus &
emollientibus pharmacis commiscetur. Etenim
siccatur tertio ordine, calcificatur autem secundo abso-
luto. At albi radix quod non sit perinde acris, po-
tius datur cum uino austero, mensura oxybaphi,
laborantibus aqua inter cutem.

Chamaepitys.

Magis amara est quam acris: quare abstergit,
purgatq; uiscera, magis quam calcificatur. Proinde
auginosus, & quibus facile iecur obstruitur, bo-
num remedium est. Quin & urinam, & menses
ducit tum pora, tum illa cum melle. Viridis uul-
nera magna glutinat: ulcera putrescentia sanat:
durities uerò discutit. Est enim in siccando ter-
tio ordinis in calcificando, secundum.

Chamaeryce.

Abstergeti simul & acrem uim possidet. Itaq;
acrochordonas & myrmecias, caules eius tene-
riores intriti, quib; ex eis profluit liquor, auser-
unt. Cum melle crassas oculos cicatrices detur-
gunt: hebetudinem uisus & crassitie ortam, adiu-
uant: sicut & suffusio eum principia.

Chelidonium.

Admodum extergit & calcificatur. Succus eius ad
acuendum uisum est commodus. Quiddam radicè
eius ad auginè ab obstruente secoris ortam,
in ulno albo cum aniso propinat. Mania etiam
confert dentium doloribus. Chelidonium mi-
nus, cum maiori sit acris, celeriter cutem exul-
cerat, unguisq; scabros eicit. Succus eius per na-
res purgat. Hæc itaq; siccatur & calcificatur in quarto
incipiente ordine: at chelidonium maius in tertio.

Chondrilla.

Eiusdem ferè est facultatis cum feri: nisi quod
60 amariuscula est, ac proinde siccantior.

Chondrus.

Nutrienti quidem est optimè, sicut triticum.
Vt medicamentum autem, emphaticè est facultatis,
et perie tritico similis, nisi quod uiscosior existit:
qua ratione plus illo nutrit. Est porro hoc semè

ueluti materia quædā idonea excipienda medica-
mentis siccantib. Ipsum uero ex numero conco-
quentiū existit, ut triticū, quæ minimè profectò
desiccant. Chrysocome.

Chrysocome. Radix uincetres habet acrem & astringentem
qualitates: quare non admodum multi usus est.
Quantū cocta in melicraro, peripneumonijs &
morbis hepaticis auxiliat. Sed & mensuris pur-
gandis est utilis.

Pseudodictamnium.

Pseudodictamnium. Vim dictamni, sed imbecillam fortitur.

Psyllium.

Psyllium. Semen habet admodum utile ex secundo re-
frigerantiū ordine. In desiccando uerò & hume-
ctando, quodammodo est symmetrum.

Ociumum.

Ociumum. Ex secundo ordine calfacientiū. Habet au-
tem recrementitiam humiditatem: proinde nec
cōmodum est, ut in corpus sumatur. At foris ul-
timum, concoquit digerit.

Ocimoides.

Ocimoides. Semen tenuius est partium, & citra morsum,
facultatis deficatoriæ.

GALENI PERGAMENI

de simplicium medicamentorum fa-
cultatibus lib. IX.

Quotquot plantarum sunt partes, fructus,
succo, & liquores, suprà dicta sunt omnia.
Nunc autè de reliquis medicamentis, quæ
ex metallorum sunt genere, quæq; species ipsius
terre existunt, differere propositū est. Post quæ
deinceps nonnihil tractabitur de partibus ani-
malium, quibus ceu medicamentis ad curatio-
nes utimur. Meminisse autè in uniuersum oportet,
astringentibus medicamentis facultatem in-
esse cum acrisbus pugnantiissimam. Astringentia
siquidem contrahunt, constipanſq; & conden-
sant substantiā nostram: ac proinde in quamuis
corporis nostri partem extinsecus imposita, cō-
tinuò illam & rugosam, & cōtractam efficiunt:
contrā quā acria, quæ ad motu cuncti, perspicuè
eam excalfaciūt, atq; in molem attollunt, ruben-
te colore: ac si diutius immorentur, exulcerant.
Hæc itaq; euidenter apparent incidere, excalface-
re, & uicinisq; partibus ad sese sanguinē trahere.
At astringentia, refrigerando, cōtrahendo, con-
stringendoq; in illis etiam contentū repellere.
Porro combustorum nonnulla calidiora q̃ antea
reddūtur, & ad gustum, & ad tactum, & ad eam
quæ in usu cernitur, facultatē. Quædam contrā,
ab unctione minus apparēt calida, id quod tactu
& usu manifestè dāc. enſi. Igitur aquia multū cal-
loris amittunt uſa: quæ uerò nō sunt eiusmodi,
assumunt. Cæterū combustorū nullum planè est
frigidū: reliquitur enim in illis ueluti acrimo-
nia ignis, quæ per ablutiones extergitur: ita ut
aqua in qua medicamentum ablutum fuerit, cal-
idam facultatem comparat, eamq; tenuius par-
tium: quod reliquū uerò est, fit terreum simul &
frigidum, ac deficcare citra molestiam possit.

De differentijs terre.

Terra differens. Terra cōmuniter ac secundum agricolar, dici-
tur illa quæ agriculturæ est aptissima, quæq; hu-
more macerata, lūm efficitur. Atq; in ea sanè pla-

res differentias constituunt. aliam (exempli gra-
tia) pinguiē esse dicentes, ex qua lutum fit uisco-
sum & leniū: aliam cōtrario modo dispositam,
hoc est, quæ lutū efficiat friabile. Atq; hoc unum
uocabulū terre est omnibus uſitatū. Alterū est
solis Philosophi uſurpatū, cū aiunt, elementa
corporū esse terram, aquā, aërem, & ignem. Cor-
pus nanq; extremè siccū & frigidum, terrā num-
cupant. Secundū quos nullum compositorū cor-
porum terra censetur elementaria. Aiunt tamen,
quantū corpore fuerit duriore, tantū magis ea
esse terræ: contrā quā agricolæ, qui eam exa-
ctissimam esse terram cōtendunt, quæ longis-
simè à faxi consistētia recessit. Pro hoc itaq; se-
cundo significato, quod à Philosophis celebra-
tur, tribus claudunt generibus differentijs ipsius
terre: quorum unum genus est lapis, alterū cor-
pus metallicum, tertium terra quæ colitur.

De differentijs nominatæ passim terræ.

30 Terra itaq; uel Latini enſi dicitur uſitatē, quæ
iniecta aqua soluitur, & fit lutū. Quæ sanè quas-
dam differentias fortitur: secundum propriam
quidem rationē, ut uidelicet pinguis si sit & ui-
scosa, quæ utiq; omnino & atra colore est: aut
contrā friabilis, & pinguitudinis experta, quam
argillam appellant, quæ quodammodo candi-
dior existit: aut si inter has maximè cōtrarias la-
beatur. Secundū mīsuram autè alienorū cor-
porum, ut dum dicimus lapidosam aut arenosam
hanc esse terram. Porro talis substantia admixta,
segregatur larga quæ affusione, maceratione ei-
us, donec uniuersum perſuatur. Sic enim quod lapi-
dosum & arenosum est, subſidit, & terra exacta
superuat: in quē modum præparat etiam & ter-
ra Lemnia, quam aliq; spiragida Lemniā (ob im-
pressum illi sigillum Dianæ sacræ) cognominant.

Quæ quidem à Lemnia rubrica differt, quod cō-
tactu nō cōtaminet, perinde ut illa: quodq; secū-
dum collem in Lemno, qui rotus colore est ful-
uus, & in quo nec arbor, nec faxū, nec planta ui-
ſcitur, tantū huiusmodi terra uſitur. Ceterū eius
tres differentie assignant. Vna quam Lemniam
ſpiragidem diximus: quamq; aliq; nemini, præ-
terq; uni sacerdotiſſe, cogitare fas est: altera ue-
rò eius, quæ multo est, siue rubrica: ac denique
tertia, quæ detergendi uim habet. Vtrunt autè
priorè illa ad uulnera uetera & aduerſum, ad co-
munesq; ferarum morsus, ſicuti aduersus medica-
mentia letalia. Distinguere itaq; ab ea terra quæ
colitur, medicamentosa oportet, quæ ad cura-
tiones utitur. Tametſi eius quoq; quæ colitur,
si qua pinguis est, utilis ad curationes existit: ea-
rum omnium partium, quæ deficcari poſſunt.
Deficcant namque uim terra quæuis poſſident.
Cum enim eius corpus natura sit ſiccum, omni-
noq; igne ſubstantia experta, citra mordacitatē
exicat. Ad quod quidem etiam ablutio iuuat.

De terre lotione.

60 Ac lauatür aqua terra omnis, ut Lemnia. Pri-
mò siquidem maceratur aqua, quæ nulli habet
medicamentosa qualitatē ſuſpicionē. Dein ef-
funditur quod innat, colliguntq; id quod est
à lapideis & arenosis ſecretū. Guſtus autem do-
cet, quænam terra lotionē indigeat, aut quæ mi-
nimè. At Lemnia, cū sit à ſacerdote abluta, ru-
ſus clui non exigit. De

Elementa corporum.

Terra pinguis
recitata descripta
& complet.

Terra purga-
da causa.

Lemniam ſpi-
ragidem.

Lemniam rubri-
cam.

Lemniam
differens.

Terra quæ
ſecretū non poſ-
ſidet.

Terra ablu-
da nota.

De terra Samia.

Samia terra.
Samia asper.

At Samiam ne lauari quiddē est opus. Vimur autē altera eius specie magis, quā Samiū altera cognominant, ad sanguinis expuitiones, mulebriāq̃ profuua, ueluti & Lemnia sigillo, necnō aduerius ulcera dysenterica, priusq̃ putrefacta euadant. Quariq̃ etiā & putrefactibus, quæ depalcenra uocant, interdum Lemnia ipsa profuit, insecta quidem per arugiosiss succū, bibita uerō ex oxytrato aquoso: prius tamē ablutis ulceribus idq̃ primō quidem, melicrato: dein autem muria. Ceterū Lemnia terra q̃ Samia nō parum efficacioribus esse uidet̃ uisibus. Quare ab ea, quæ phlegmona tentari cōperūt partes, exasperantur, cum tamen à Samia inuentur. Ex qua & oleo rosaceo misisimū conficitur pharmacū, etiā cōtra alias feruentis phlegmonas, incipientesq̃ bubonas & fluxiones po dagricas, & ad ea breuiter, quæ refrigerare cum mitigatione est animus. Unde conitat Samiā refrigerare. Quin & magis aërea eius essentia exiit, collata ad Lemniā, cuius argumētū est leuitas. Aëstibus porro omnē terram medicaminosā, tum leuitate, tum grauitate: præterea circa gustū asperitate & lenitate: ad hæc tenacitate & abstergerendi potētia. Tenax enim & uiscosus est Samius asper, cum & Lemnia sphragis eiusmodi gaululū quiddā habeat. Absterforū quoq̃ facultatē moderatā obuenit & Selinusia terra, & Chia: quæ mobrem mulieres quædam ipsæ ad faciem utunt. Porro quicquid abstergit leuitat, producentē ulcerū carni est idoneū. Quod si etiā siccet, cicatrici inducendū est habile. At omniū aptissima sunt & ad ulcera quæ in summa cure cōsistunt, & ad ambusta, illa quæ circa moriūm exciscit, nec manifestō exalfaciūt, nec refrigerant. Quocirca terra Selinusia & Chia, pulcherrima sunt ad ambusta ulcerum remedia. Iam uerō Cimolia terra cum misq̃ sit facultatis, partim sanē refrigerat, partim leuitat digerit, operaturq̃ pro natura illorū quibus miscet. Verū unicē ambustis cōuenit, ueluti & alix omnes, illix ex aceto, aut oxytrato: nimis bullas existere prohibentes. Aduertendū tamen est, corpora mollia ualentem medicaminū uim haud posse perfere: dura uerō posse. Terra itaq̃ missionis expert, uim habet circa moriūm siccandi. Cdm autē nullū reperire sit corpus à mitione alienum, inspicundum est, qualem nam miscellam ipsa terra fortiat. Si qua ergo in ea astrictione sentatur, tantū frigiditatis assumpsit, quantū habet astrictionis. Sin acrimonia, tantum scito illi inesse caliditatis, quantum & acrimoniæ. Similiter, quantū leuior terra ipsa fuerit, tantū acrior existit. Quātō grauior, tantū enām lyncerior terra. At propriū terræ est, quod igni admodum non soluitur, aut liquefit: id quod accidit plumbo, stanno, auro, & argento. Cdm igitur auri nominare terram argenteam, aut auream, minime intelligas ipsum argenti, aut aurū, per totū terræ corpus misceri: sed particulas quasdam exiguas tum auri, tum argenti, illi coniunctas, atq̃ conliguas existere: easq̃ ab ignis in fornacibus fusas coite inuicē. Eundem in modum quæ uitri con-

Vitrum continet terram.
Aurum reperitur in auro.

dam reperiuntur arenis. Terrarū autē id genus omniū quæ in metallis sunt, ubi ab eis separatur id metalli aut teris quod continent, reliquæ uidentur lapides: nec macerari, rigari, aut humectari per totam substantiā possunt: ut medica minosa illa, quæ cum aqua in lutum degenerat: quæq̃ uiti circū illa nascentes in ea uermes interimit, unde Ampelites uocatur. Cadmia etetium id illarū lapidearū est genere, neq̃ rigari potest. Terra Cretica admodum imberbilla est, multi habens substantiæ aëris. Inest tamen ei quædā citra moriūm uis extergendi. Eretrienfis, q̃ Lemnia, ualentiorē possidet astrictionē, hæctenus tamen ut nodum mordicat. Expediit uerō hæc terram bis terq̃ lauare, ut Cimoliam, quid modera tior reddatur. Eam etiam urunt, ut subtiliorem, acriorem, & magis digerentē efficiant. Quod si posteaq̃ combusta fuerit, abluatur, replendis & cicatrice inducendis ulceribus multo magis opitulatur. Ceterū quæ colore cineritio est, illi quæ alba existit, præfertur. Est & alia terra dicta Pignites, tota quidem facultate terræ Cimolix affimilis, ceterū atra colore, quædmodū Ampelites. At terra, siue lapis, siue bolus Armenus, colore est pallido, promptissimeq̃ solui in leuorē omnino æqualem, ut calx, ualidamq̃ desiccā uim possidet. Si quidem ad dysenterias, uentris profuua, sanguinis expuitiones, catarrhos, & putrefacta oris ulcera, in primis cōperit. Quin & illos magnificē iuuat, quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit. Quare & his quibus ex tali occasione anhelitus difficilis est, ualde auxiliat. Sed & eos qui tæbe laborat, adnuat: ulcus enim ipsorū desiccat. Maxime etiā cōfert Armenus bolus contra pestilentes affectus. Si quidem usu eius non perlanantur, qui prius immedicabiles sunt. Ceterū bibitur ex uino albo, cōsistentia tenui, modicē diluto, si is qui morbo est correptus aut plane febrī careat, aut leuior ea teneat. Sin grauius febrat, admodum aqueo. Non sunt tamen calore uehementes febres pestilenciales.

De lapidibus.

Ex corporibus sponte natis sunt lapides, hæc diuersi à uulgo nuncupata terra, quod rigari nō sustinent. Vires habent partim secundum torius substantiæ proprietatē, partim secundū qualitates effectrices. Nunc autē sermo nobis esto de illis uiribus, quæ secundū effectrices agunt qualitates in quibus sanē est & utendi ratio & methodus. Nam facultates quæ proprietatis totius substantiæ ratione insunt, à methodo sunt atq̃ ratione alienæ, & per solam experientiam nō sciuntur. Nam cur hic lapis tacto uulnere non sanguis promptē, cursum eius reprimat, haud nouimus. At cur hematites lapis in oculares facultates indatur, nouimus: quod sit rationis inuentum. Nam si in corae oculari quæ aqua eum rears, donec accipiat crassitudinē mellis, astrigentem facultatem percipies. At didicisti, quod gliscientes etiamnum phlegmonas restringebunt medicamentis repercutere oporteat: ubi autem iam sanguis nō fluit, astringentibus medicamentis digerentiā adiungere, & sensim ad ipsa sola transire. Itaq̃ de his lapidibus prius disserā, qui mortarij aut conis attriti, in liquorem soluunt.

Ampelites terra.
Cadmia.
Cretica terra.

Eretrienfis terra.

Pignites.

Bolus Armenus de serpyra.

Febres pestilentes non esse reuoluerit calidas.

Facultates quæ proprietatis ratione insunt, effici à methodo alienas.

Elevationis lapidis conis oculares facultates medicamentis miscetur.

Phlegmonarum generalis curatio.

Cileires, Pumex.

Cypris. Pumex quidem abstergit. Sed Smiris acrimoniae quiddam obtinet. Proinde causticis & desiccantibus facularibus additur, eisque quae curant gingivas laxas. Pumex autem si coëburatur, haud erit inferior Smire, eisdem ad usus.

Lapides qui in spongiosis reperiuntur.

Spongularum lapides. Frangendi uim obtinent, non tamen ita ualidam, ut lapides in uesica coënuant. Rumpunt eos tamen qui cognuntur in renibus: ueluti qui so aduehuntur ex Cappadocia.

Ostracites.

Ostracites. Hunc lapidem autem desiccandi ualenter facultatem habere, temperatam ex attritione, acrimonia: ut Grodem expurgare pupillas, uberumque & testium fuisse phlegmonas, inunctum ex aqua. At cotis Naxiae ramentum uirginibus mīmas prohibet tumescere: sicut & testes puero rīntanquam facultas refrigeratrix sit particeps.

Ophites.

Ophites. Extergēdi cōstringēdi uim possidet, ceu etiam uitrū. Admodum enim ipsum ex uino albo ac tenui epotū lapides uesicę conteri, atque cōstringit. lāpis uiridis.

Lāpis uiridis. Ventriculū adhēsū, ipsiusque os adiuuat. Porro Ophitem lapidē suspensum, iuare morios a uiperā tradit. Sed eiusmodi facultates nō cōstant methodo. Veluti enī cūm Hieracites & Indicus proluentē ex hēmorrhoidib. sanguinē sūstint.

Sapphirus.

Sapphirus. Ictos a scorpione uiuare creditur.

Aplroscelusus.

Aplroscelusus. Liberat cominali morbo uexatos: id quod nondum sumus experti.

Dioscoridis Thytes.

Thyites. Subuiridis est ut lāpis, soluiturque in succū colore quidem lacteum, gustu uerō acrem: ac proinde nemo illum oculorum miscet medicamentis, nec fluxiones repercutientibus, nec ulcera sanantibus. Sed eo tantum utitur ad purgandum & abstergendum, quae pupillam ad phlegmone offuscant: quales sunt cicatrices recentes, & pterygia non nimis dura.

Iudaicus.

Iudaicus lapis. Colore est candido, specie cōcinna, lineas habens ceu torno ductas. Viuntur ad uesicę lapides in cote soluentes, & ex aquae calidae tribus cyathis potus praebentes. Praecipue uerō ad eos qui in renibus haerent, est efficax.

Pyrites.

Pyrites. Validam possidet facultatē, eoique utrimque digenti emplastro admisso. Adicitur etiam ei & scilicet flos. Ab hoc medicamine & spumae expenit, & consistencia grumosa in spaciis intermedis muscularum nara, per halitum sunt digesta. Nisi autem dum in usum ueniunt, pollinis instar coënuantur hi omnes lapides, ut profundū corporum quibus applicantur subeant, asimiles manent istis marinis fluuialibusque arenis: quae & ipsae cōmunem omnium lapidum uim possident. Si quidem exsiccant tumentem ab aqua iuter cutem carnē, si in ipsis excafactis decumbat æger. Non tamen ad aliud quippiam eis utimur.

Phrygius.

Phrygius lapis. Hoc semper utor combusto quidem ad ulcera

putrida: idque ipso aut per se, aut ex aceto, aut oxenoclitre, aut oxycrato. Ad oculos uerō ex eo permixto alijs, medicamentū siccū efficio. Valide enim desiccant, habēs quiddam attritionis simul & mor dicanonis.

Ageratus.

Astringit simul & digerit. Atque attritione quidem euidenter iuuat phlegmone columellas grauat.

Alsius.

Colore & consistencia est topio similis, friabilis, laxusque. Innascitur ei quiddam instar farinae tenuissimae, qualis in molarum parietibus adhærescit. Appellatur hoc medicamentum petreæ Asiae florem. Est uerō & tenuium partium, ut sine moris nimis fluidas carnes eliquet. At petra ipsa in qua nascitur, actionis uehementia est inferior. Haberetiam & salcedinē quandam ipsae Asiae petrae flos, ita ut inde uideatur ducere originem: quod ros ex mari in petram residens, a sole posita excutitur.

Gagates.

Colore est atro, qui ubi igni fuerit admodum, perisimilem bitumini odore exhibet. Conferat autem ad discutendos stultulentos tumores consistentes in genu, diuturnosque & ægre curabiles: ac præterea cruenta uulnera glutinat. Est & lapis Thracicus, cuius in hunc modum Nicēder meminit:

Si lapis ueretur candente Thraciæ igni, & si lapis madefiat aqua, flagrabat apertus idem. Mox oleo affuso penitus resurgitur. Nullus tamen eius in medicina usus, nisi quod suffitus abigit feras.

Magnitis, Heraclia, Magnes.

Asimilem haematitis uim obtinet.

Arabius.

Lapis est elephantio similis, desiccantis abster gentisque potentior.

Alabastrites.

Combustus in medicinæ uim ingreditur. Quiddam eum bibendum dant stomachicis.

Smiris.

Vehementer quidem abstergit: quare ipso ad annulos exculpendos utuntur, & ad dentes purificandos.

Haematites, Galactites, & Melinites.

Haemantes & Galactites lapides, a colorum similitudine, quos representant, sic nominantur. Ille siquidem sanguinis, hic in succum solutus, lactis uideretur similis. At Melinites, non a colore, sed a sapore mellis talem uocem claturam sortitur.

Cum igitur succus omnis dulcis a temperato calore proficiatur, astringens uerō a frigore, habebit sane haemantes lapis tantum frigiditatis, quantum & attritionis: Melinites uerō temperatam caliditatem: ad medium utriusque temperiem Galactites. Merito itaque ocularibus medicamentis lapis haematites miscetur. Ac solo uero possis supercilij exasperatis: si quidem cum phlegmone sint aspera reddita, ex ovo ipsum diluens: ac si magis, etiam per decoctū fœnigræci. Sin uerō citra phlegmone, ex aqua. Hic idem lapis similiter in cote cōstruit, sanguinis expunctioni cōducit, ulceribusque uniueris. Porro siccus, redactus in tenuissimū pollinē, reprimat excrecentia: ipsaque oculorum ulcera solus per se cicatrice includit attritus, ceteri aut affusus, aut inunctus. Sicutos.

Arenas quomodo excoctas tamen ab aqua in ter eandem carum

Phrygius lapis.

Ageratus.

Alsius lapis.

Petreæ Asiae flos.

Gagates.

Thracicus lapis.

Magnitis.

Magnes.

Arabius lapis.

Alabastrites.

Smiris.

Haematites.

Galactites.

Melinites.

Dulcis succus.

Excoctas tamen.

Ab aqua in ter eandem carum.

Phrygius lapis.

Schistos.

Schistos.
Galactites.
Melinites.

Hamatiti perlimilem uim obtrinet, sed infirmiorē Schistosac post eum Galactites. At Melinites nonnulli caliditatis ascium. Ut igitur unusquisque leuiter ac sensim ab hamatitidis facultate recedit, ita in usum oculorum accommodatur: est ita men mitior. Etenim mitiora remedia partibus etiamnum phlegmone afflictiis semper graviora sunt. Quæ quidem, liberis iam a phlegmone partibus, infirmiora sunt, si uel persanare ualeat. Porro cum lapidibus omnibus commune sit ut deficcant, quotquot ex his in succo soluti, aut redacti in poluim, nullam cōtinuū qualitatem in gustu obtinent, hos putandum est esse tum infirmisuios, tum mitissimos, tum minime mordaces. At qui manifestā qualitatem exprimunt, si pro qualitate ratione potentiam possident. Ac si quidem astringant, ad cōprimendum, cōstringendum, spulandum, & cōtrahendum: si uerō mordicent, ad excalfaciendum, digerendum, & colligandum. Mediq̃ eorum sunt, qui abstergent citra mordicationem. Igitur Hamatites, Schistos, Galactites, & Melinites, in succo uertuntur. Quantū sunt & alij in succo solubiles, ut Moroxus qui in Aegypto nascitur, omnium dictorum minime qualitatis participes. Quare tantū deficcandi uim possidet.

Metallica medicamenta.

Metallica quæ dicuntur.

Metallica medicamēta appellare medicis mos est, quorū generatio in metallis cōsistit, siue spontanea, siue per fornacē facta. Ut igitur lapidibus uniuersis, & terræ medicaminosis cōmune est ut ficcant, ita metallicis quoq̃ medicamentis omni bus. Est enim essentia eorū terræ, secundum elementaria terre signifi catū. Porro caliditate diutina, mistam ex terra & aqua, nonnunq̃ etiā aërē, substantiā unientē, temperantē, ac postea deficcantē, metallicorū medicamentorū cōsistentiæ proueniūt. Quænammodū igitur in differentiis terræ, plurima essentia terræ elementaria habet, paulum uerō aëris, ita in metallicis multū ignis substantiæ est immixta. In medio autē eorū sunt lapides. Proinde alia metallicorū semel aut bis, alia frequentius lota, idonea sunt, ut citra morsum exciccent. At locorū, in quibus hæc proueniunt, natura, prout plus minusus est frigida, alia plus, alia minus, cogit, congelatq̃.

Hales, Sales.

Hales.
Sales.

Sal partim ex mari fit in salinis, partim ē terra effoditur. Cæteri utriusq̃ uis est asinimilis, impen sē uidelicet exsiccatrix. Porro aplironitri sapor amarus est, & abstergens: salis uerō, tantū in abster gendo inferior, quantū in astringione superior. In utriusq̃ medio sapor nitri consistit.

Armeniacum.

Armeniacum.

Vim habet extergentē cum leuicula tum acrimonia, tum astringente. Unde merito miscel oculiariis facultatibus. Præterea ipso per se redactō in poluim, atq̃ sicco, uruntur ad pilorum in supercilijs incrementum: ubi præliumorum acrimonia partim excidunt, partim nec crescūt, nec nutriciunt.

Arhenicum, Auripigmentum.

Arhenicum.
Auripigmentum.

Facilitatis est causticæ, tam combustū, q̃ usio nis expert. Cæterum per unctionem tenuiorū par tium efficitur. Vtuntur porro ipso ad denudan-

dam pilis quamuis particulam. Verū si diutius hæreat, ne cuti quidem parcit.

Aphronitrum.

Aphronitrum a b aphronitro differt. Nitri enim spuma medicamentū exsiccorū exstitit, aspectu triticæ faring similis. Etenim alba est, nō ut Alsipetræ flos cinericeæ. Aphronitrum uerō farinæ speciem non habet, neq̃ solumum est, sed cōcretum & congelatum. Quod quidem adeo extergit, ut non modō fordes expurgat, sed etiam pruritum sanat. At spuma nitri, euident cum nitro est tum naturæ, tum facultatis: licet essentia tenuioris. Dictum autem est paulo antē, in medio aphronitri & salis, facultatem nitri consistere. Aphronitro enim sola inest uis detergendi: salis uerō etiā astringendi, sed multo magis quam detergendi.

Gypsum.

Gypsum quidem tum deficcant, tum uires habet emplasticas. Quare siccis medicamentis quæ ad sanguinis eruptiones accommodantur, utiliter cōmiscet. Nam ipsum per se lepidosum fit, coactum & congelatum. Ac prout diluendum est oui tenui & cādda albugine, quæ & ad ophthalmias est utilis, admixto illi tenuissimo farinæ triticæ poluim, qui residet in molarū parietibus. Excipere uerō quod sic maceratum est, nellas leporis pilis, aut qui perinde sunt molles, expedit.

Gypsum uisum.

Nō habet æquē emplasticā uim, cæteri tenuiorum est partū, & ualens deficcant. Quin & re percussorū est, maxime si maceratur oxyrato.

Diphyryges.

Mistam habet tum qualitatem, tum facultatem. Habet eum in se quiddā & mediocriter astringens, & mediocriter acre: unde ulcerū rebellium oprumū medicamen est. Eo siquidē ad putrescentia oris ulcera, siue per se, siue cum melle, cum de tracta erat spuma, tum ad anginā, ubi iam per astringentia medicamēta cōstitit qd̃ insuebat, ac breuiter ad collumellam præcisam, puden diq̃ & ani ulcera cicatrice obducenda, sum q̃licetissimē usus. Porro quo pacto adulterentur dictorū medicamentorum singula, non uidetur præciū opere scribere, cum plura possit discere homines sceleratissimi in lucro ponant.

Thion, Sulfur.

Sulfur omne trahendi uim possidet, estq̃ temperamenti calidi, atq̃ essentia tenuis, adeo ut ad multa uenenatorū animalium resistat, si succum icthui in spargatur, aut cum salua, aut urina, aut oleo ueteri, aut melle, aut resina terebinthina illueatur. Quin & pforas, & lichenas, & lepras, nō raro hoc medicamentum cum resina terebinthina sanauit. Extergit enim omnes id genus affectus, alijq̃ hoc ut in profundum repebat.

Los, Aerugo.

Gustantibus aërem exhibet qualiteratem, digerens, detrahens, & liquans non teneram modō, sed & duram carnē. Hallucinantur igitur qui talia medicamēta, epulorica appellant, hoc est, quæ cicatricem inducūt: cum nimirū epulorica pharmacā contrahant, consistant, & in calli morem ipsam carnem indurent. Quin & gustum mordicat ærugo, non tantūm ulcera. Quod si paulculum eius cerato nō pauco admisceas, id quod

ex ambobus mistum est, citra morsum extergit.

Cadmia.

Cadmia. Cadmia fit, ubi in fornacibus æs paratur. n. ē per tota terra, aut lapide ex quo æs gignit, in sublimem partē fornacis egerente, ueluti fuliginem aut fauillam quidam in argenteis etiam metallicis simili secretionē efficitur. Quin & ex pyrite lapide in fornacibus usto fit cadmia. Cæterum absq; fornace in Cypro cadmia inuenitur, quam iure quispam lapidem uocet. At eius quæ combusta est, aliam botrytin, aliam placinn Medici nuncupant. Botrytin quidem, * quæ in editori bus ipsius fornacis muris colligitur. Placitin uerò, quæ in humilibus. Ac liquet sanē botrytin partium esse tenuior, crassiorum uerò placinn. utraq; autem ui deficcanda, ac mediocriter digerendi prædita. Quæ autem colligitur in fornacibus, igne qualitate necessariō etiam aliquid habet. Merit itaq; eam abluentes, medi camen efficiunt mediocriter tum deficcans, tum

Cadmia diffi renia.

Cadmia rita.

extergens absq; mordicatione: utile ad cau ulcera præhumida, & putrescentia, quæ in oculis & in toto corpore habentur. Igitur respicientes ad temperatē & mediam inter omnes excelsus naturā, leuiter deficcatoriā absterforiamq; cadmix inesse facultatē dicimus. In caliditate autē & frigiditate differētia, cadmia quodammodo temperata existit.

Cinnabari.

Modicē acrem facultatē obtrinet. Habet uerò & astrictionis quispam.

Citrus, Pumex.

In sarcotica medicamenta inditur, & ea quæ dentes extergunt, partim unctione non expertus, partim etiā exuissus: quandoquidē alijs omnibus combustis similiter, substantiæ tenuioris efficitur. Cæterū unctione quiddam acquirit acrimoniæ, quam rursus lotionē exuit. Vident autē poterit, & conciliare splendorem, non tantū facultate, sed etiā asperitate: ueluti si smirin, aut testam tritam admoueas. Eundem in modum cornua deusta dentes reddunt splendidos.

Cinnabari.

Citrus.

Pumex.

Exusta omnia rudi subtilitate tenuiora.

Cornua deusta dentes reddunt splendidos.

Cruia.

Lixiuum.

Cin.

Abluto cinere fit. Cinerem autem, ustorū corporum reliquias Latini nuncupant. Fit ergo lixiuū pro eius quod eluitur natura. Cineris si quidem qui acrimoniā igneam habet acerrimā, ipsū quoq; acerrimū est: eius quod tale nō est, etiā moderatius. Quare & putrefaciētibz medicamentis miscet, utpote causticā facultatē possidens: sed propter substatitē suę tenuitatem, citra dolorem adurens.

Cyanos, Cæruleus.

Acrem possidet facultatem, ac rum detrahendū digerendūq; cinnabari, potentiorē. Inest quoq; ei nonnulla astrictio.

Lepus, Squama æris, & ferri.

Squama, alia est eris, medicamē mālō utilissi mum: alia ferri, & stomomans: alia deniq; quam nonnulli uocant helin. Atq; omnes sanē uehementer ficiant. Cæterū helites principē io deficcādo locum obtrinet. nam subtilissimę omniū substantiæ est, nimirum quæ æruginis nonnulla a sumptis. Maiore obtrinet astrictionē squama ferri, & hac etiam maiorē stomomans. Quā-

1 epin.

Squama.

Helin.

obrē ad contumacia ulcera meliores sunt quā squama æris. Detrahit & liquat carnem potentius squama æris, & hac etiam ualentius elutit. Omnes autem squamæ nō infrenuē mordaces sunt. Quare essentia ipsarū nō est admodū tenuis. Siquidem inter ea quæ parum uim possident, minus est mordax quod est tenuius.

Lithargyros.

Deficcatur quidem, sed omoiū moderatissimē: & secundū alias rum qualitates, tum facultates, quodāmodo in medio consistit. Modica tamen astringendi, abstergendiq; facultas ei inest. Cæte rum ad intertrigines femorū unis medela est. Iu re itaq; mediū ordinis in metallicis habet. Proinde frequenter utitur lithargyro ceu aliorum materia: sicuti in liquecentibus ad plerq; medicamenta adhibemus ceram, tanquam materiam mediū eorū quæ ualentem possident facultatē.

Natrum.

Inter aphronitru & saleū uires medias fortit. Cæterū uisum propius ad aphronitru accedit, utpote ex unctione tenuius redditū. Deficcatur itaq; & digerit: quod si intra corpus sumat, secat & extenuat crassos & lentos succos, multū potētiū q̄ sal. Aphronitru uerò, nisi grauis orgeat necessitas, deuorandum nō est, nimirū inimicū stomaclo: quandoquidē plus etiā nitro incidit. Porro ad suffocantes fungos, nitro usto simul & nō usto, & multū etiā magis eius spuma, uti cōsueuimus.

Melanteria.

Valde quidem astringit, astringentiāq; omnia propemodum tenuitate superat.

Melan graphicū, Atramētū scriptorium.

Admodum & ipsū deficcatur aqua solutū. Vl cera autē igni ambuta protinus illatum iuuat: & si acetum quoq; habeat, multū magis.

Misy.

In metallis ipsi, super chalcitū nascitur misy, ut ærugo super æa. Ac suspicor etiam fori lon go tempore mutationem in chalcitū posse accipere. Quare mirum non est, ita hac medicamē na eiusdē genere facultatis esse, fori dico, & chalcitū, & misy, tenuitate & crassitudine inter se diuersa. Crassissimū enim est inter ipsa fori, tenuissimū misy: mediam utriusq; facultatem habet chalcitis. Adurūt utiuersa hæc tria, & escharas efficiunt. Attamen nōnihil etiam astringunt. Cæterū misy ad morū corporibus duris, minus chalcitide mordcat, tamen ei nō minus sit calidum: id quod beneficio tenuitatis foritur. Porro cū utraq; hæc in decoctionibus fundantur, & magis chalcis q̄ misy, fori tamē nō liquecit: nimirū quod lapidosius sit, & uehemens cō pactum. sicuti rursus misy, quia a congenito calore elaboratus est, ac proinde ficius chalcitide, idcirco merito quoq; liquefit ægrins.

Molybdena, Plumbago.

Similē lithargyro uim possidet, tantū à media tēperie ad frigidius paulū quid recedēs. Sed neq; abstergentis facultatis est particeps. Vtrūq; autē medicamētū liquari potest, celerrimē, ubi oleo nōnihil aceti est additū. Liquant tamē etiā ad mista aqua, sed coctione lōgissima. Vidi equidē molybdenā prosectā plurimū cū multis alijs lapidibus, in ea uia quæ ad ergasteria ducit à Pergamo.

Molybdos,

Mordacia m nōniffe que sunt tenuiora, si parum facultatem obtrinet.

Lithargyros.

Cera.

Natrum.

Aphronitru in mic stomaclo.

Melanteria.

Atramētum scriptorium.

Misy.

Ærugo.

Sors.

Chalcitū.

Molybdena.

Plumbago.

Molybdos, Plumbum.

Molybdos.
Plumbum.

Facultratis est refrigeratoriæ. Siquidem nō modo multā habet substantiam humidam ā frigore cōgelatam, sed & aëriam paucam autē terreā. Igitur quod plurimū habeat essentiz humidæ cōactæ ā frigore, indicū tibi est, quod ubi ad-

motum est igni, celeriter funditur fluitq. Quod uerō & aëris sit particeps, hoc habero signum. Omnium quæ nouimus, unicū plumbum tum mo-

Plumbum rari-
tū mole & pon-
dere aërior.Plumbum mor-
tariorum conferre
ad conficienda
medicamenta re-
frigerantia.

le ipsū, tum pondere aërior, si condatur in xdi-
bus subterraneis, aërem habentibus turbidum,
ita ut quæcūq; illic ponantur, celeriter sibi con-
trahant. Iam uerō si in mortario plumbeo liquo-
rem quemlibet plumbeo pistillo contriueris, ita
ut ex pistillo ipso, atq; etiam mortatio exprimal
etiam aliquis succus, id quod ex utroq; constabi-
tur, multo erit frigidus, q̄ liquor infusus fuerat.
Ceterū si uis magis refrigeratoriū medicamen-
efficere, oleum omphacinū, aut rosācē, aut me-
linum, aut myrtinum, sit liquor is, quem infun-
des: eritq; remedium optimū ad sedis phlegmo-
nas cum ulcere aut rugis, q̄ liquor infusus in pu-
dendis, testibus, uberibusq; constitunt: similiter
aduerfus ceteras omnes fluxiones, quæ articu-
las accidunt. Sed & ulceribus rebellibus etiā uile
est. Nam ad canculos eo utēti, uirtutem medica-
menti miraberis. Quod si celeriter multū succi
plumbei uelis colligere, conare in sole terere,
aut quocūq; certē modo aëre excafcato. Multo
autē utilissimū habebis medicamentū, si assu-
so refrigerantium succorum aliquo teras, ut sem-
peruini, coryledonis, intybi, lactucæ, condriles,
psylli, omphacis, portulacæ. In laminam etiā di-
ductum plumbū, lumbisq; admotū, pollutionē
per infortia cōteret, nimis haud obicere refri-
gerans. Sed & bractea tenuis probē gauglio illi-
gata, ipsum dissipat. Illigabit autem probē qui-
quis ab Hippocrate didicerit, in ipsam uoxā po-
tius firmandum, q̄ hinc uel inde. Porro plumbū
utilum, ac dein ablutum, refrigerat, conseritq; ad
implenda ulcera, eademq; cicatrice obducenda.
Conuenit & chironiæ ductis, & omnibus can-
crosis ulceribus. Ante lotionē autem, ukeribus
pcttinacibus etiā auxilio est.

Plumbi Lemina
ad moue lumbos
aut toruere pel-
les ueni conserit.Plumbū uisum
quibus cicatrice
afflicti sunt.Ostracum.
Testa.

Deficcandi abstergendiq; uim possidet, maxi-
mē quæ ex fornacibus est. Ex qua quidem præ-
parata emplastrum, optimē cicatrice inducit.

Pompholyx, Spodium.

Pompholyx.

Pompholyx sit & in aris fornace, ueluti & cad-
mia: sitq; & idum in fornacib. cadmia uritur, ni-
mirum ab ipsa cadmia in rectum fornacis qua-
dam fauilla ascendente, quæ dum colligitur est
pompholyx. Nam quod reflectens in pauimen-
tum recidit, nominatur spodium. Cui uidetur si
mitem habere facultratem, quod antipodis ap-
pellā. At ego illo uisum fuisse, cum largē mi-
hi semper p̄p̄oloxis sup̄eretur. Nec enim quis-
quam ubi lixæ adit, spodio uti uelit, nedum an-
tipodio. Est autem pompholyx medicamentū
prop̄ omnium quæ citra morsum deficcant, si
clora fuerit, præstantissimū. Quamobrem ad ul-
cera cancrofa idonea est, & ad alia omnia mali-
gna. Itaq; indurq; colligiq; quæ ad uolorū im-
ponunt fluxiones, quæq; bullas in eis natus cu-

Spodium.
Antipodium.Pompholyx quo
lūm uisum.

rant. Præterea ad pudendorū & sedis ulcera o-
ptimum est remedium.

Sandarache.

Vrentis est facultratis, ut arsenici. Merito itaq;
digerentibus facultrantibus & extergentibus cō-
mifcetur.

Sandarache.

Sandyx.

Qua sit facultratis prædita, in sermone de psim-
mythio explicabitur.

Sandyx.

Scoria.

Scoria omnia refrigeratoriū est medicamen-
tissimū autem ferri. Siquidem ad laxiorem redi-
gens ipsam in aceto facerrimo, posteaq; deco-
quens, ad aures iam pridem fluitēs pure, ea uitor
pro medicamento maxime exsiccatório.

Scoria.

Stimmi.

Cum facultrate delicatiora habet astrictionē
adiunctam. Quamobrem & ocularibus medica-
mentis mifcetur.

Stimmi.

Styteria schiste, & strongyle, & hygra. Alu-
men fissile, rotundum & humidum.

Alumen uehementissimē astringit. Cæterum
cū sit crassum partium, tenuius quodam-
modo est quod uocatur fissile. Proximum est
rotundum, & astragalorum. Admodum cras-
sum est tum liquidum, tum placites & plinthi-
tes dictum.

Styteria rida,
Alumina diffu-
sionis.

Tiranos, Calx.

Viua quidē uehementer urit, adeo ut crustas
efficiat. extincta uerō protinus etiā crustam mo-
litur & ipsa: at post diem unum & alterū minus
urit, minusq; inducere crustam potest. At uerō
temporis progressu proflum nec crustā quēdam
gignere ualet, tamenq; etiamnum califaciat, car-
nemq; liquet. Porro si lauetur in aqua, suā mor-
dacitatem exuit, efficitq; nuncupatum lixiolum.
At ipsa absq; morsu deficcatur.

Tiranos.
Calx.

Hydragryos, Argentum uiuum.

Non est ex sponte nascentibus medicamen-
tis, sed ex iis quæ parantur: ueluti psimmythiū,
xerugo, pforicum, lithargyros. Cæterum interi-
mā ne deuoratum aut admotum extrinsecus,
nondum feci periculum.

Hydragryos.
Argentum uiuum.

Phycos.

Facultratem eius, ubi de psimmythio agetur,
exponam.

Phycos.

Chalcantios, Atramētum sutorium.

Chalcantios, qui in Cypro ex uiridi quadā
aqua concrefcit, extima sui parte in chalcitim
temporis processu degenerat. Habet autem cum
astrictione maxima, caliditatem non uulgarem
coniunctam. Vnde omnium maxime condire ser-
uareq; carnes humiditas potest: nimirum calidita-
te humiditatem absorbens, astrictione substantiam
contrahens, atque constipans. Constringit
itaque, siccat, & contrahit in sese totius sub-
stantiam carnis.

Chalcantios.
Atramētum su-
torium.

Chalcitis.

Mistas habet astringentem acremq; facultra-
tes. Cæterū unicit acris, utpote adeo uehemens,
ut carnem urat, necnō inducat echaram. Vitum
hoc medicamentum morsu mordicat, nō tamen mi-
nus deficcatur. Verim non parum astrictionis re-
merit. Itaq; melior est uel equaq; chalcitis tum
adusta, tum lora, cum euadat sic manus uitor dax,

Chalcitis.

Chalcos cecaumenos, Aes usum.

Chalcos cecaumenos.
Aes usum.

Habet & acrimoniam quandam, sed & astrictionis est participes. Proinde si laetetur, pulcherrimum est medicamen cicatrici inducendæ.

Chalcos anthos, Flos æris.

Chalcos anthos.
Flos æris.

Tenuioris essentia est quæ aut æris uisum, aut squama. Quare ex eo factis collyrijs exurgunt, auferuntq; superciliorum magnas asperitates.

Cluryscolla.

Chrysocolla.

Carnem liquat, non tamen ualenter mordicat: quiaquam fit faculitate admodum digerente, exiccanteq; Preparare autem hanc cluryscolla debet tempore æstiuo, aut ære prorsus calido: urnam pueri, mortario & pistillo, utroq; ex rubro ære, contundens. Hoc medicamentum aptissimum est ulceribus contumacibus, tum per se, tum alijs misculum. Nam quanto plus quæ cluryscolla metallica deificat citra morbum, tanto enim ipsam excellat tenuitate.

Psimmythium, Cerussa.

Psimmythium.

Si ex aceto soluiatur, gustu tamen neque acere erit, neque mordax, sed emplasticum, & refrigeratorium. Cerussa adusta, in sandyca transit, medicamentum seipso tenuius, non tamen ex calfaciens. Phycos autem seruata cerussa frigiditate, tenuitatem assumptit.

Pioricum.

Pioricum.

Conficitur dupla chalcite admissa lithargyro: ante tamē utrisq; accerrimo aceto solutis, sicq; in ollam nouam concessis, quam limo xitate media diebus quadraginta obruant sepelies. Hoc medicamentum magis delicatioris est, minusq; chalcite mordax, cum partibus sit tenuioribus.

GALeni PERGAMENI de simplicium medicamentorum facultatibus liber X.

Expositiuis igitur quicquid cōmentarijs prioribus, qualitates quas secundas appellant, in medicamentis quæ effectricibus qualitatibus agunt, pro earundem effectricium specificarijs qualitatibus misculata nasci. Ostensum præterea est, quo pacto uniuersalis facultas unica experientia inueniat: neque ea uulgari, sed quæ certis adhibeat limitari onib; Porro in sexto, septimo, & octauo libro, materijs quæ ad plantas pertinet, explicauimus: in nono autē, eam quæ circa terrena & lapidosa uersatur. Reliquum uero nunc est, ut eam quæ ab animalibus sumitur, in hoc decimo persequamur materiam. Nam ad finē undecimi agemus de ijs, quæ proueniunt in aqua, nec plantis, nec terra, nec lapidis, nec animalia iunt.

Hæma, Sanguis.

Hæma.
Sanguis nullus est frigidus.

Pro natura animalium uariis. Hinc siquidē animalis est liquidior, siccior illi, calidior alteri. Nullus autem sanguis est frigidus.

Sanguis iuualis.

Sanguis iuualis, temperatior est humanis perfusio.

Humidus & minus calidus est, temperie humano perfusius. Siquidem & carnes suam similes humanis exiunt. Vnde quidam ab hospitibus prauis appositas, auidentissimè humanas carnes ederūt. Et eum ex ipso sanguine, tum generatio prima, tum postea nutritio ipsis carnibus consistit. Itaque quisquis humanum sanguinem morbo aluiui utilem esse ait, in iussu primum id

comprobet. Nam etsi aliquatenus inferior is sit humano, saltem asimile quippiam efficiet: quo cognito, ab humano plenior fore utilitate sperabimus. Porro similia efficere posse similia, experti sumus. Nam colubæ sanguinē, qui capitis ossa cōfracta perforant, in crassum cerebri inuolucrum effundere assolent. Quidam autē, cum non esset columba ad manum, palumbi sanguine est usus, feliciterq; successit. Alius turturum eodem ad usum applicans, nihil hominē lpsit. Similibus siquidem ad eisdem affectus utimur, ubi quæ antea experti sumus non ad sunt.

Hæma perstiteris, Sanguis columbæ.

Et ad hypophthalmata in oculis cōsistentia quidā utunt, uenis ad alarū exortū incisus, quos sanguis calidus effluat, ut sic ad multos usus idē perducat animal. Alij pullos teneros extractas pennas, quæ humore redundant, in ipsum oculum exprimūt. Quamq; sunt nobis collyria uaria hypophthalmatis oculorū aptissima, cuiusmodi est quod plurimū recipit myrrhæ, & quod multum thuris admittit: necuon quæ ex croco constans. Quin & fenigræci succus sanguini columbino in hoc utiq; præstat. Præterea lexcentos non ui eorum quibus Romæ perforata fuere capitis ossa, nec quicq; ab usu rosaceo, citra sanguinē columbinū, ostenso. Quare id calidū sit æque atq; colubæ sanguis, necesse est. Cæterū præter moderationē caloris (cuius forte cōtractu iuuat) leuiter etiā astrigit. Itaq; minus inuenire nihil possis in capite plorato, quæ ut probo rosaceo utaris.

Hæma nyctideris, Sanguis uespertilionis.

Si ubi hoc sanguine axillas illeueris, postea chalcanthron aut cicuta semen interspergas, Xenocrates quidem ait, aut sub illis prorsus pilos non prodiuros, aut certe lanuginosos. Alij uero & pueroꝝ pudendis sanguinē uespertilionis illunt, ut glabras illas partes cōseruent. Ergo ex refrigeratione parui uehementi, cuiusmodi quippiam posse cōngere, non est à ratione alienum. Non tamen adeo frigida facultates est sanguis uespertilionis, cum in totū nullus sanguis sit frigidus. Porro hæc in sanguinē feruaculū cum pari aceti portione, hæmo procois iuuare prodidit etiā Xenocrates. Quod remediū turō experiri poteris, ubi nullum aliorū ad manum suppetet.

Sanguis uridum ranarum.

Cum afferret quidam, illū hunc prohibitarum quo minus euulsi semel palpebrarū renascuntur pilū, falsum esse id experimento didici.

Gala, Lac.

Perfectissimū lac, nempe quod ab omni aliena qualitate est immune (hoc est, odoris experta, aut exigui boni odorem referens, præterea gustu suauē, pauculum habens dulcedinē: sicuti & saluberrimus sanguis, ex quo & lacti generatio consistit) ad acres & mordaces fluxiones est commodissimū, non abluens modò eas ratione feri ab assuetis particulis, sed etiā ob pinguitudinē corpora illinens, ut non in nuda cadat, quod deflueret. Porro cum lac omnīu alteretur facillimè, præsertim si ambiens fuerit calidus, multū à dicta facultate amittit, nisi prorsus quis ab uberrimo effuso ipso calido utat. Maxime igitur mulier bene habet & frigida uictus ranonē seruatis, lacte

Columbinū sanguinem infundere per crassam fracturam.

Sanguis columbinus hypophthalmata conseruit.

Hypophthalmata quæ tenues sunt.

Rosaceum comedere infundere per crassam fracturam, efficitur non minus calidum sanguine columbino.

Sanguis uespertilionis.

Sanguis nullus in totum est frigidus.

Sanguis uridum ranarum.

Gala. Lactis optima nota.

Lactis resus.

Lac alteratur omnium facillime.

Lac multum est hominibus sanis inuicissimum.

lacte utendum: nam id humano corpori est longe familiarissimum. Deinde aliorum animalium, quæ quidē ab humana natura nō longissime ab sunt: id quē scies ex carniū odore. Nam fastidiosus est eorum quæ multū diuersam habent temperiem, ut canis, lupi, leonis, pardalis, uulpis, hyænx, ursi, & similia. Non inuicundus est eorum quæ nō porro ab sunt, ut suis, capræ, equi, bouis, ouis, & asinæ. Quocirca etiam homines docti experientia, caprinū, ouillū, bubulū, asininūque lacte utuntur, & caseos ex eis faciunt, excepto asinino. Nam id planē tenue est, & plenū humoris serosi, ueluti bubulū crassum: ceterū consistentia mediū caprillū est. At suis crudū aqueumque lac obtinet. Iam uerō lac omne ex tribus constat essentis, caseosa, serosa, & pingui. Hanc plurimam habere conspicitur bubulū, ex quo butyrū conficitur, facultatis cōcoquentis & relaxantis. Quare maxime illū utitur ad parondas & bubonas.

Serum lactis.

At serum extendendi potentia possidet, adhibeturque subducendi uentris gratia, ac per dytenteriam inquit, extergens & abluens sine mordacitate acrimoniā intestinorū. Præterea si quis ulcera quæ sanie infestant acri, uice aquæ sero collata, optime sanē fecerit. Quæque etiam medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero quæ aqua dānere. At quod lacti caseosum inest, illud adhæret magis: ob idque acrimoniā retinuit. Atque ubi aliam quampiam desiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est dysenterię remediū, & omnium uentris acrimia fluxionū. Eam autē accipit a lapidibus, aut etiam ferreis cylindris, qui prædicto lacti iniungunt igniti. Ferrum siquidem astringentis facultatis etiam est participes. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorū quopiam, est utile: præterea ad hypopiam & lyposophagmatā. Quin etiam palpebris extrinsecus, ubi qui ophthalmia laborat, somno sese dānt, impositū simul cum rosaceo & ouo, phlegmonas eorū concoquet. Sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expressum.

Infundimus ipsum & utero ulcerato. Sic eo & ad sedis & pudendorū ulcera utimur, & ad omnia breuiter, quæ leniri possunt. Exapropter & cancriosis applicat ulceribus, medicamentis a dynis cōmisum, quæ sunt quæ constant ex pompholyge. Collurū etiam, oris phlegmonas mitigat: necnon tonsillas, columellam, antiadas phlegmone affectas, ac proinde etiam anginam lenit. Est itaque medicamen leniens, totam quidem substantiam habens mordacitatem expertem, sed multo magis ubi concoctione moderata, potissima pars feri consumpta fuerit. Sic mihi uidentur etiam medici ad uenena quæ erosione intermunt, lac propinare: ueluti sunt lepus marinus, & cantariis. Sunt etiam quæ merito id exhibent, hæc qui acinorum & thapsiam deuorant.

Caseus.

Vbi pinguitudo cum toto lacte concreuit, seroso duntaxat humore per coagulationē secreto, pinguis caseus efficit. Qui quidē qualiscumque sit, temporis spacio acrimoniā acquirit, quam deprehendens gustu & olfactu. Ceterum impen-

sē acris inueteratusque iam redditus, maceratusque decocto sullarum carnium, toplos arthriticorum discutit. At recens caseus & mollis, mirè uulnere glutinat: nam reperiendi uim possidet, leuiter nimirum refrigerans. Ceterum oxygala cōtinus, præter hæc, digerendi etiam quandam uim lenem obtinet.

Butyrum.

Facultas est cōcoquentis, paulum etiam habens digerentis potentia, in medijs nimirum corporibus secundū duritiem atque molitiem. Nam corporum planē duriorū tumores præter naturam, hoc nequit medicamen digerere. At quæ in mollibus sunt phlegmonas, eas & cōcoquit & digerit facit. Nam parontidas, & bubonas, & oris inflammationes, propterea illo solo curamus: nimis puerilibus corporibus, muliebribusque eas perpernentibus. Sed & gingiuis puerorū dentientium assidue illitū, nihilo imbecillius melle, extenuat exitū dentibus: ceterosque omnes oris phlegmonos affectus, posteaquē fluxio restiterit, digerit pariter, concoquitque. Proinde cataplasmatibus inditur quæ extrinsecus imponuntur parontidibus, hypochondrijs, bubonibusque. Deuoratur etiam, distributumque, magnifice confert expuitionibus ex pulmone, idque in pleuritis peripneumoniosis affectibus: cum hoc quod eos etiā concoquat. Quod si solum linguam, magis quidē concoquit, uerū educit minus: sicut cum melle & amaris amygdalis, minus educit, sed minus cōcoquit.

Pyria, Coagulū.

Coagulū omne acris & digerentis potentia est, atque etiam excitatoris: nam necessariū id superiora comitatur. Ac leporis quidem coagulū comitale morbum, si cum aceto bibatur, præterea profluuium muliebre sanare proditum est: necnon coactū in uentre lac dissoluere: id quod nos sumus haud dubie experti, non solum in leporino, sed in aliorum etiam omnium animalium coagulo. Sed & sanguinem in uentre cōcretum simili modo eorum coagulū leporinū dissoluit, ac efficacius quidem ceteris: uerū non solum, cum hoc omni sit commune coagulū.

Coagulū phocæ.

Huic nonnulli uires castorei tribuunt.

Chole, Fel.

Hic succus omnium in quoque sunt animalium calidissimus est. Ceterū pro uaria animalium temperie, calor eius variatur. Sunt autem in uniuersum quatuor in singulis animalium sanguine prædicatorum humores: sanguis uidelicet, piruita, & bilis tum flaua, tum atra. Verū dum absolute dicimus bilem, semper intelligimus flauam, quæ in iecoris uesica colligitur. At ipsam flauam bilem interdum medici pallidam nominant. Sciendū tamen est, flauā tantū esse pallidā calidiore, quanto & crassiorē. Nam seroso recremento flauæ bilis permixta, pallidam constituit cōtingit: sicuti & flauam plurculum excoactā, consistentia reddi

flauam, colore autē flauam. Quia & in animalibus apparere flaua quidem, hæc quæ magis sunt calida: quæ uerō minus, pallida. Est ubi animalia calida, aut fame, aut siti torquentur, ad atrum colorem uergit, interm illū habens æruginosum, iuterum cæruleū, interm accuratē fuscū. Porro ubi

Butyrū facultas

Butyrum extenuat infansuū exitū dentium

Butyrum vocatum pleuritidis expuitionibus confert.

Pyria. Coagulū. Coagulū leporinis facultates in se habet.

Coagulū uimne dissoluit lac, & sanguinem in uentre cōcretū.

Chole. Fel.

Humores sanguine prædictorum animalium quatuor sunt.

Flaua bilis pallidæque distincta.

Lactis asinum est plenum humoris serosi. Lac bubulum. Lac caprillum. Lactis subitanea implex.

Serū lactis quæ præstat.

Caseosa lactis substantia est.

Ferri facultas.

Lactis usus.

Lactis columellæ augmen lenit.

Lactis auxillari quæ uenena erodentia terant.

Caseum.

Caseus immutatus est acutus.

ocularia medicamenta preparant, callionymi, scorpij marini, hyemg, galli, perdicis, & aliorum quorundam animalium bilem admiscunt. Quare color eius est explorandus. Iam uero tantorum bilis calidior & siccor est, q̄ boum castratorum: nam castratū animal semper simile redditur foeminae, & ijs quæ sunt ætatis minoris. Itaq̄ ut hæc humore superatū adula & perfecta, uincuntur ab ijsdem caliditate: ad eundem modum bos castratus à tauris. Vt igitur urina à modica portione modicè pallere: & sicim famemq̄, & multum laborem perpessus, flaua esse cōspicitur: impletis uerò atque inebrians, hic canis: ita bilis colores mutat. At uerò quod hic humor sit acris, hinc dūcas licet, quod reserat hēmorrhoidas, quodq̄ illis ijs qui uruntur, mordicare percipitur. Ac prout de cauemus, ne ad alium morbū, aut symptomā, bilē inurpemus solam, atq̄ per se. Quippe dum oculis ipsam accōmodamus, miscemus illi tum mel, tum fœniculi succum, tum opobalsamum. Domesticarum suum bile (quæ imbecillima omnium, ac maxime aquea existit) uruntur quidam ad aurium ulcera: medicamentum certè non reprobū. Cæterum ubi alius diuturnū fuerit, ac multum sanie & pus cōtineat, etiā sicciore bilem perferet, puta osium, quæ paulo est acrior suilla: hac enī magis caprarum, cui ad similes quodāmodo est urisum & boum. At taurorū huius ualentior est: inferior tamen bile liynarum: & hæc quoq̄ inferior bile callionymi, & scorpij marini, & maring testudinis. Volantū bilis omnes tum acriores sunt, tum sicciore q̄ quadrupedum: & inter ipsas quoq̄ uolucres, gallinarū & perdicum bile ad medicinæ usum probatior habentur. Miluorum uerò & aquilarum, impendio acres sunt, erodentesq̄: quamobrem colore ærugineo uidentur, ac nonnunquam atro. Licet ibi itaq̄ tibi secūdum euentiam affectū, hæc differentias suis methodo ad experientiā reducere. Hydros, Sudor.

Hydros.
Sudor.

Eandem quam urina & materiam & modum generationis fortitur. Siquidē nūtrig generatio ex bibito humore cōstat, ex caliditate simul in corpore, & biliose nonnihil subtilitatis adeptō. Verum sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutem usq̄ permeatis omnibus quæ interius partibus, peruenit. Sudores autē inter sese & urinas differre necesse est, tum pro animalium temperaturis, quæ & uatura, & statum ratione non parū dī se inuicē sunt diuersæ: tum pro ambientis uis aeris temperie. Quod sudor saliginosus qualitas sit particeps, gustus testimonio probat. Nam sapenumero uolentibus in os deflūens, dictam qualitatem indicat. Sape uerò etiam nō obscuram præfert amaritudinē. Sed color etiam eius naturam designat. Nam sicuti urina naturalis modicè est pallida, sic & sudor. Porro tenues exercitatorum sordes, plus reperiuntur q̄ sudor: minus autē digerūt. At ubi sudor illis permittus est, multum facultatis digerētis acquirūt. Quare tumores præter naturam discuntur: ad phlegmonasq̄ uberum, præstantissimū sunt remediū. Quod si sicciore esse sordes uiderantur, cyprinum superungito: aut eodem ipsas, si ualide sint siccæ, subigito. Si uerò cyprini ad manū nō sit, rosacē bo-

nū miscuisse sufficit. Hoc medicamentū est admodum uile, ad resurgendum & discutiedū lac à partu in mammis concretescens.

Vrina.

Quantā est in animalibus bilis diuersitas, tanta item est in urinis. Atq̄ omnes quidem facultates sunt calidæ, sed plus tamen animalium calidorum, minus autem frigidorum.

Vrina humana.

Hæc aliarū omnium est imbecillima, excepta illa quam reddunt porci domesticī, quibus excelsi sunt testes: quorum ut temperies, ita urina similes humanæ existit. At montanorū aprorum ualida est, ut uel ex odore acerrimo cōstat. Sed & in animalibus cæteris ex odore uim eius cōscire licet. Nam degustare ipsorū urinas, planè fuerit abominandū: cum ne pueri quidem urinam uis quidam honestus uita pariter & moribus, ebibere sustinuerit, etiā pessiferæ ægrotares in Syria, ubi multi ab humanæ urinae potione sese libera-
10 ros profectabantur. Et enim urina hominum, ut si quid aliud, extergendi uim obtrinet: id quod sanis fallones indicant, qui sordida uestiam expurgant usu illius, atq̄ extergūt. Quod cōspicari nō nulli medici, ea pforas & lepras detergant, persunditq̄ ulcera præhensida & sordida, multoq̄ magis cōpūtescētia. Sed & pudendis ubi sic afficiuntur, urinā infundunt, & auribus pure fluentibus. Quā & achoras & furfures ea curant, caput identidem persundentes. At nos hæc facere odimus, cum ad manū sint alia, quæ illis conducant, medicamenta. Quantūq̄ ulcera digitorū pedis, maxime quæ ex illusione infecta essent, siepe numero, ubi careat phlegmona, & ipse urina curant: idip in feruis, & hominibus rusticis. Cæterum medicamentū quod ex urina pueri consistit, quod quidem Chrysicollam appellant, quia eo ad anni glutinationē uruntur, ad ulcera difficilia sanatu optimū esse affero. Fit autē id, ubi in mortario atris rubei, pistillo etiā ex rubro
40 ære cōfecto, puerilis urina tandū tan calido colore runditur, donec ob eliquationē attritionemq̄ pistilli & mortarii, mellis crassitudinē cōtrahat. Sielon, Salina.

Ut urina & bilis, sic etiam salina, sumpto quidem cibo, imbecilla est: ualida & acris eorū qui ingenti aur sit, aut inedia premuntur: in medio utrinq̄ est, eorum qui probè concoxerunt quidem, non dū tamen cibum potum ue hauserunt. Hac ergo salina nutrices pueris lichenas curat, parū uidelicet digitorū rigantes, ac deinde tantum affectat contrahentes. Sed & triticum man-
50 dentes rustici non pauci furunculis imponunt: nam celeriter eos digerit, concoquitq̄: cū si macerarent aqua, non æquè prodesset. Ex quo liquet, salium iuuandū robur adferre. Atq̄ corporibus mollioribus, aut puerorum, panem, nō triticum, imponunt igitur eorum commanum. Porro commanā omnia digerunt & fragillara, & cætera ec-
60 chymomata omnia, maxime ubi panis simul cum pauco radicula fuerit cōmanus. Iam nō uinera substantia sua uel maxime adueria est salua bestijs hominem interficientibus.

Stercus caninum.

Stercus omne uim maxime digerentem obtrinet.

Castratum animal reddi simile foeminae.

Bilem quo palli accōmodatur oculis.

Aures parte fluente, quæ specie bilis uincuntur. Bile differentia pro animalium diuersitate.

Sudores esse saliginosum.

Sordes exercitatorum.

Vrina omnia fa-
culat eā calida.

Vrina huma-
na.

Vrina humana potione multo si liberat: si per
fallones morbo
percepta sunt.
Vrina humana
facillime.

Chrysicollam fa-
cienda ratio.

Sielon.

Salina inima
ventriculi ad
qua uincuntur.
Triticum man-
dentes furunculis
concoquit.

Salina huma-
na aduerter
bestijs hominem
perficuntibus.

*Caro proprie
qua duo membra
sunt.*
Tarsachyna.

eam quæ reperitur in musculis, solam Medici carnis appellantur dignantur. Nam carnem viscerum nonnulli parenchyma uocandam censent, propterea quod ex uenia effusus sanguis, circû uâ la omnia (ut ipsi arbitrantur) concrescar. Sed nos nominâ consentione uellecta, persequamur proprietates particularum.

Caro uiperæ.

Non omnes animalium carnes hominẽ nutriunt, sed quorundam enim letales sunt. Tum inter eas quæ hominem nutriunt, quædam tantum sunt nutrimentum, quædam etiam medicamentû. Nam uiperarû carnes palam uidere est excafcientes & exsiccentes, ubi condiuntur, ceu anguille, oleo, sale, anetho, purro, & aqua: horum omnium seruato modo. Quod autem totum corpus per cutem uacuent, uel hinc tibi discere licet, quod elephanti quidam prorsus sine restituti, ex potu uiperarum quo uiperæ quædã fuerat extincta. Præterea

*Carnis uiperæ
facilis est con
cinanda me
dicina.*

*Elephantis
curatio.*

*Viperarum os
suum maximè
infert.*
*Viperæ cur
appellatur dip
da.*

non elephanti cum quædã, missa prius sanguine, atrati bile medicamentis purgata, uiperis quas ca piebat ut iussimus, preparatis in olla, anguilla rum more. Atq; ita sanatus est, euaporato per cutem affectu. Porro uiperarum caro adeo ualentẽ obtinet delicandis uim, ut quidam qui eam esira runt, ueluentissima fuerint sibi cruciati. Quã obrem eas dipdada nominant. Sunt tamen quæ dicat demorosâ ad uiperis fariari potu nō posse, sed dirumpti potius quam liberari sibi. Cauendũ autẽ est, ne in loca mari proximis, salisuginosissimẽ, uene

*Carnis anima
lium cum cibo
mactari.*

*Viperæ caput
nō caudam ab
que oportet ad
confundendi ar
ticipi theriaci.*

*Artifici theria
ci confusio ra
tio.*

mur uiperas, seu ad eum, seu ad Theriacis anti duri præparationem: quum uersimile sit, earum quæ in id genus locis capiuntur, carnes saluas exi nere. Si quidem cum cibis etiam animalium mactantur carnes. Porro quoniam ex more dum arti ficos Theriacos paramus, non tantum caput, sed earũ etiam caudam abijicimus, subijt mihi frequẽt rationabile fortassis esse, caput quidẽ torũ abij cio, ob uenenum quod ore continent: uerũm irra tione alienum esse, adimere & caudam. Theriacos aut ipsoz artificios fac præparamus. Purgatas illas in aqua cū anetho elixamus tandem, donec â carne separari facili possint spius. Mox pani purissi mo, probè cocto in clibano, salisq; & fermenti quod sit satis habenti, ac breuiter resiccato, & ad læuorem trito, necnun macerato cum ipso uiperarum decocto, carnem prius in mortario tufam miscemus. Postea uerò paruon artificio fingentes, atq; in edibus calidis & siccis siccantes, in talibus eas tandem reponimus. Hos ergo ineunte ætate conficimus, sicut & salem ex deusta uiperis, quo potissimum tempore optima ipsarum est caro. Vt uim eis postea cõstula denud & cribratis, rursusq; ad læuorẽm redactis, adijcientes nonnihil & salis, ad suauitatem composui, cuius etiam ali quod ipsi theriacis inficimus. Itaq; caro uiperæ sic car, ualentius digerit: excafcit uerò modocri ter. Propter enim uis eius ad cutem, per eam ul delicet, quæ in corpore sunt recrementa exigua.

*Carnis uiperæ
vires.*

*Cacchymia
symptomata.*

Quibus igitur copia mali succi in corpore abundat, & pediculorum numerofa multitudine exoritur: & acutè ceu quædam squama abscedit, deciditq; cunicula extrema, ad quam utique solent si sti crassi terrosiq; humores: quibus sanè plorẽ, se præ, & elephantes nascuntur. Quod autem ad animalia cætera pertinet, proportionẽ qua in tem

peratura excedunt, & carnes quoq; eorum disse ruit atq; exuperant. Proinde talium animalium carnes perpetuò exhibere oportet, quale uolu mus corpus humanum reddere. Nec parua exi sti carnium differentia, dum quasdam sale condi mus. Nam interdum animalis temperiei humidissi mi caro salita, longè exsiccantior euadit ea, quæ sicca natura exstet. Verũm inter eas quæ salit nō sunt, siccior est asina, quàm quæ in aqua est eluxa.

*Carnes affe
ctiores sunt do
xi.*
*Mystela caro o
piletica accen
ditur.*

*Cochlearis car
nis, & fici.*

At uerò caro mustelæ arefacta, ualentius digerit, deficiatq; proinde morbo cominali affictos iu uat epota. Salitorum etiam aduipos carnem ad læ uorem contritam, palos & spicula educere auiunt, impositas: sicuti & murulorum carnem ulceri bus â mordente cane infictis congruere. At co chlearũ caro, prius in mortario cõstula, ac postea ad læuorem redacta, omnium ualentissimè defic car partes superfluo humore grauatas, ad eò ut conueniat hydericis. Ipse autem humor solus, thuri, aut aloẽ, aut myrrh permissus, quod cera ni accipiat crassitiẽ, medicamẽ fit tenax, deficcetq; purulentos aurum humores. Sed & froni im po situm hæret, oculorum fluxiones exiccans. Qui dam etiam ad palos eximendos uisuntur tota u nâ testia, ad læuorem triti: alij ad sistendos mētes. Carnes etiam solæ cum farina pollice tritz, con tusantur uulnera glutinant. Ipsa cochlearum hu miditas pilos superciliorum præter naturam ha bentes glutinat.

Pinguedo & adeps.

Differt â pinguedine adeps, quod crassior sit ac propterea animantibus totam naruram terro siorem habentibus, ut bobus & capris, adeps pro uenit humidioribus autem, ut suisibus bene habi tis, ipsa pinguedo. Proinde pinguedo celeriter in ignem posita colliquefit: nec facili uel semel li quata fuerit rursus concrecit, aut cogitur. At adeps nec facili funditur liquefcit, & fusus cele rime cõgelatur. Porro â deps suillius, aliorum om nium est humidissima, ob idq; actione sua uicin am oleo uim possidet, quæ quod oleo magia tum emolliat, tũ concoquat: quamobrem cataplasmata quæ ad phlegmonas accõmodari solent, miscet. Qui uerò mordicationes perpetuant aut in recto intestino, aut in colo, nã potius caprillum adipem quàm suillũ inficimus: nō quod plus â crimonias obtundat, sed quod cõcresecat citius, suillius autẽ in stur olei destituit. Quare caprillus potius dysente ricus & tuncinosis innicitur, quando morsum eo rum mitigare est consiliũ. Quanquã ob ten uitate essentia nonnulla magia acrimonias retundunt, ubi in alto mordicatorum corporũ, quod mole stius est, hãerit. Hæc ratio ne adeps asnerisum magia obrundat quæ in alto corpore mordicant: præ te rea suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinæcorum & gallinarũ adeps. Porro calidior semper & siccior est masculorum animalium â deps: & horum ipsorum excoctum minus tum calidus, tum siccus: quippe mās castreus eiusdẽ semper generis fœminæ assimilatur. Omnia igitur pinguedinis faculas est humectatoris & ex calfa cloria humanorũ corporum. Cæterum pin guedo sua, ut ad nos quidem, largius humectare potest, sed nō uet excafcare, sicuti neq; oleum ra tem quippe caliditatem obrinet, qualis spectat in nobis. Taurorũ adeps suillo multo calidior & siccior

*Pinguo
Adipi.*

*Dysenteria ca
pitulorum capri
lis adeps.*

*Adipem differt
ra.*

*Castreus ma
sculinus eiusdẽ ge
neris fœminæ as
similatur.*

ficcior est. Sic & adeps uulvinus taurino minus rum calidus est, tum succus: & herodorum quam caprarum. At caprarum minus quam hircorum. Rursus taurorum minus quam leonum. Nam horum adeps omnium propemodum adipem potentius digerit: quippe & caliditate exuperat, & parum tenuitate. Quare nimis uera & phlegmonas irritat. Inueteratis tamē tumoribus, atque scirrhi in morte duratis, tū nervorum curaturis apertissimus est: in quibus sanē suillus uidet minimē efficax. Taurinus autem quāto calidior ficciorque suillo est, tantō superatur a leonino. Itaque tanquam in medio consistens, meritō utriusque medicamentorum miscetur generi, & scilicet quod scirrhus medet, & quod phlegmonas ad suppurationem perducit: cuiusmodi est tetrapharmacum, ex cera, resina, pice, & adipē cōstant. Verū omnibus quibus caro est mollior, adeps suillus conuenit magis. Duram autem & siccam habentibus, taurinus. At uerō adeps dum inueterascit, seipso & calidior, & aerior, & tenuior efficietur: ac proinde ualentius siccas & digerens, id quod omnibus inueterascentibus accidit, nisi interim computrescant. Porro uisum adipem alopecias curare uerē est proditum: quā tamen ad eum affectum probatoria remedia habemus.

Myelos, Medulla.

Vim habet corpora indurata & scirrhusa emolliendi. Optimam semper suam expertus ceruinam: dein uulvinam. At hircorum & taurorum, tum acrior est, tū ficcior: itaque duriores scirrhusos molliare nequit. Ex uulvina igitur & ceruina pessi edponuntur ad emolliendos uteros. Et extrinsecus uteris medicamenta imponunt, quæ ex medulla parantur, uim emolliendi habentia. Accipitur autem non solum medulla ex omnibus, quæ sanē reuera est medulla: sed ex spina etiam, quæ rō durior, tū ficcior est altera. Viranque autem hyeme collectā, in sicca eduaque domo cum solis lauri succis reponit, ne uideatur cōputrescat. At si quando ambiens te existente calido, austrinoque, medullas aut adipē uelis reponere, utris ad id cubiculo quammaximē fieri poterit temperato, quodque ad aquilonem obuersum, apertas habeat paruas fenestras, ut per petuū flatus inspirantes excipiat.

Caput menidium.

* Maxidū sale inueteratarū capinbus uisus, ad sedis fissuras utebatur quidam: & ad columellam diu indurata. Videtur ergo uis illarum esse deficcatoria, non admodum acris. * Nam ut acrimonia adustarum nonnullis inest, sic omnibus uis exiccandi.

Caput leporinum.

Allus capite leporis uisio utebatur ad alopecias cum adipē urino.

Caput saurum.

Sauri caput contritū quidam palos & spicula extrahere prodidit: memoriz: tum myrtemias, acrochordonas, & clausos eximere.

Cerebrum leporis.

Id attritū & esum, uile dicimus esse pueris dentientibus. Quiddā etiā aduersus tremores uulueri edicere cerebrum hoc prodidit.

Cornua ceruina & caprina, uisita.

Dentes candidos reddūt, fluidasque gingiwas cōtrahunt. Quod si ceruinum ad uisione lauerit, dysenteriam, & sanguinis excretionem, pręterea

celiacos affectus sanat. Anagristi etiam dicunt id esse uile. Ex quo quiddā duo calubri cochlearia ad omnia ista pręcipiūt. Quiddā etiā ipsum miscerunt collyriis deficiantibus oculorum fluxiones.

Pulmo agninus & porcinius.

Intertrigines & calceamenta curare credit. At uulpinus si bibatur siccat, affluantque iuuat.

Iecur canis rabidi.

Si assum edat, remediū existere his quibus ipso rabiente cane fuerit emorisi, quibusdā proditū est.

Iecur caprinum.

Quidam ipsum affantes, sanieque excipientes fluentem, ea utuntur ad nyctalops. Vaporem autem eius, dum elixatur, oculis apertis excipiendū pręcipiunt. Quin & assum si edatur, & ad eosdē affectus accommodari aiunt, & eos qui comitiali morbo sunt obnoxii, coarguere. Idem potest iurcinum hepar.

Iecur lacertæ.

Erosi impositum dentibus, eos dolore liberare nonnulli scriptis mandarunt.

Venter mergi.

Quod de hoc & de interna tunica uentriculi galinarum proditum est, id uanam esse promissionem comperimus.

Castorium.

Testiculos castoris, uocant castorū medicamentum & celebre & multi usus. Euidenter siquidem calfacit. Quam autē calfacientia omnia, quæ cōsistentia sunt sicca, ubi cōtractæ substantię quippiā digerunt, continuō etiam illa deficiunt: manifestum utique est, castorium etiam deficiat haud obsecure: id quod illi cum mulas est medicamentis cōmune. Quia uerō impense subtilius est partium, ob id plus ualet quā alia, quæ similiter ut ipsum rum calfaciunt, tum siccant. Nam quæ tenuiora sunt paruum medicamenta, his quæ sunt crassiora, efficaciora sunt, etiam si parum fortita sint facultatem: uimque quia magis penetrat. In consilio ne igitur plenitudine, quæ in neruis est, orta, & bibendum castorium exhibe, & cuncti foris etiam impone. Vbi uerō ex ficitate nimia consilio obuenit, scito hoc medicamentum illic esse aduersissimū. Ad eundem modum qui prę plenitudine aut tremunt, aut singultum patiuntur, est aduersissimū: aduersissimum uerō his, quibus id ab inanitione, aut acrum humorū morfu accidit. Vbi atque ex calfactione, aut reficcatione, aut utraque simul actione est opus, maximam in usu castoris experire commoditatem: nec ullam partem alicui noxam asseret, potissimū si homo uos febricit, aut febrim non admodum calidam perpetiatur, sed tepidam, qualis maxime in cataphoris & lethargis accidit. Ac mulas sanē castoriū cum pipere albo, utrunque mensura cochlearij, ex melicrato propina nimis: nec quicquam illam percipit noxam. Sed & reuensis mensibus, ubi per uenam que in talo est, modicā euacuasse sanguinem, oblati castorio unā cum pulegio, aut calaminiha, semper medicamentū hoc sum expertus purgationē citē, citra ullū assumens lēxionē. Pręterea locos morantes excipit: ealy omnia ex melicrato potū efficit. At quibus ab occasione frigida ita uenter statu distendit ut ægrę curationem admittat, eos ex oxerato potum castorium adinuat. Quæ porro iuat in corpore intro sumptum, ipsa prodest quoniam cuncti im-

Pulmo agninus, porcinius, vulpinus. Iecur canis rabidi. Iecur caprinum.

Iecur lacertæ.

Venter mergi.

Castorij uires.

Lethargicorum solutio esse signum.

Mensis reuocatio de ratia.

fitum, cum Sicyonio, aut ueteri oleo. Quæ uerò ampliori calore indigent, si etiam per se infiricari debet, luvat etiam, si quis suffusum eius prunis impositum, inspiratione hauriat: illos præcipue affectus, qui in pulmone consistunt, aut capite. Attamen leihargicos & cataphoricos affectus, qui quidem habent adiunctam febrem, præstat non dictum oleorum aliquo macerantes curare, sed potius ex rosaceo capiti colloqui imponere.

Lumbi scincorum.

Quæ circa renes scincorum sunt, bibunt, tanquam pudenda intendere ualeant. Contrarium aut moliri uidetur semen lactuæ porum ex aqua, Vngues caprarum & asinorum.

Quidam ungues caprarum deustos, mox in aceto persusos, alopecijæ illinunt. Itaq; fuerit & talis cinis sacularis exicatorix. Sunt qui combustos asinorum ungues comitalem morbum curare dicant, si scilicet assiduò bibantur. Si uerò macerati oleo applicentur, digerere claudas. Sed & ipsum cinerem, si sicus inspersus fuerit, sanare peruenies.

Ossa combusta.

Admodum digerentem, exiccantemq; uim obtinent, maximeq; (ut quidam serunt) humana. Noui siquidem nostratum quosdam* combusta ossa humana potat exhibuisse, ac multorum sic epilepsiam & Arthritim curasse.

Senecca serpentinis.

Hanc scribere quidam in aceto bullitam, dentium mederi doloribus.

Pellis ouina recens detracta.

Circumposita uerberatis, eos die ac nocte una perfricat. Concoquit enim & discutit sub cute cõcretum sanguinem.

Equorum lichenes.

Eas aceto tritas comitales curare scriptum quibusdam est. Alij uerò & ad cuiusvis feræ morsum adhiberi consulant.

Tela aranæ.

Hanc scribunt nãnulli à phlegmone tueri summe cutis ulcera.

Coria uetera usta.

Eorum cinis exicatorius existit. Quare ulcera ex attritione, & amputa, & intertrigines quæ in feminibus sunt, perfricat.

Ostrea.

Ostrea quidam nuncupant testacea omnia: ostreum autem, unam tantum testaceorum speciem. Buccinæ & purpuræ.

Buccinarum & purpuræ si testa usta, edactaq; in tenuissimum pollinem (quod fieri ubi commune præceptum in testaceis & lapidosis omnibus) desiccandi uim obtrinet, ac proinde ulceribus malignis opularatur. Ad quod etiam commune est omnium quæ circa insignem morsum uehementer desiccant: quippe quam aliquo fluxionum causa existant. Hec etiam est omnium id genus commune, quod ex aceto, aut oxyerato, aut oxomeline, aut oxymelite, idonea sint ulceribus putrescentibus.

Ostrea.

Ostreorum testa usta similis est facultatis buccinarum testis, tamen minus crassq;. Et enim omnia id genus cogendi quando in se facultatē obtrinet, per quam condensata eorum essentia, dura terro-

risq; sunt reddita. Quæ ubi per unctionē posuerint, digerentē facultatem asiscunt.* Quod si ea, ubi usta fuerint, laueris, quicquid habebant igneum, in aqua ponunt. Quare aqua sine ipsa exalfaciens cum tenuitate redditur, adeo ut puri elacui interdum: reliquum uerò terroium, morius expers efficiatur: maximeq; implendis & cicatrice claudendis humidis ulceribus auxiliatur. Ceteri uero ulceribus causis & fistulosis, fluxionijq; obnoxij ulceribus, ex fusillo adipis inueterato foris circūspouo ipsam: in sinum aut aliquid eorū quæ talia carne impleant, impono, quale exiit diaphanes uisum. Quis & dentes splendidiore testatur cinis est. Cui, nō tantum extendendi potentia, sed & asperitate subtilitatis: ueluti & pumex, & testa clibanum. Verum in usu cuiusmodi, non est necesse quæ sic usta sunt admodum leuigare, sicuti dum insperguntur ulceribus. Porro excrecentiam mediorum exterius, cõprimunt. Ad hæc, usta omnia id genus cum sale, deunum singulis efficacius reddunt, ut non modo laxitatem molliemq; gingivarum deficiet, uerum etiam ulcera putrescentia adiuuet.

Sepis testa.

Sepiarū testa admodum laxa est, non ut ostreo rum lapidosa. Itaq; absteris illi cū alijs testis communis est, ueluti & desiccario: exterius partium tenuitas eximia illi præ ceteris inest. Quo circa uita est utimur ad unguines, ephelides, lenties, & piosas. Quis & fossili salis mista, in oculis existentes unguis, & lycoses uocatas eliquat. At anteq; ual, dentibus splendore conciliat, & ulcera desiccant.

Opercula purpurarum.

Ea quidam prodiderunt memorix turgidos lienes sanare: suffusi eas quæ ueteri suffocatione periclitantur, inuare præterea retentos ejicere loeos.

Lana succida.

Idoneæ excipit irrigationes quæ adhibentur cornulis, aut quouis modo percussis, ut quæ utilitatem ex illis proficietentem promoueat: idij propter celsipon. Lota uerò, apta est humoribus qui irrigantur, excipienda. Porro usta uim habet acrem, pariter & calidam, unā cum partium tenuitate. Itaq; molles præhumidatq; uicem carnes celerim eliquat. Inditur & lu medicamen desiccatorium. Vito eam tanquam alia plurima, ollam implens nouam, effuat tegat opetculū multis foraminibus petrusum.

Pili usti.

Similiter uste lanæ exalfaciendi exiccandi q; possideat facultatem.

Ouorum facultates.

Oua partes animalium non sunt, sed proportionē habent in quæ adnascuntur. Sunt autē facta ad propagationem generis, perpetuatemq; ac sunt utilia, ceu nutrimenta. Porro ouorum album & tenue illud, quo item ad ophthalmias urimur, ex numero est medicamentorū minime mor dicantium. Ad unam prauitatem solum patiant oia, quam scilicet asfert uetustas: tamq; facillimē effugias, si uraris recētib;.

Est autem ouum symmetro temperie frigidius. Vreudum autem est oui albumine, non tantum ad oculos, sed ad alia omnia, quæ medicamenta requirunt suauissimā: ut sunt uniuersa sedis & pudendorū ulcera cõtuma cia. Miscetur quoque idonei medicamentis profluuium sanguinis ex cerebri molucriis reprimētib;.

Scincorū lumbi.
Semen quæ promouent & arceant.

Vngues caprarū,
asinorū.

Ossa combusta.

Ossa humana.

Eximius serpēti.

Pellis ouina.

Equorum lichen.

Tela aranæ.

Coria uetera.

Ostrea.

Buccina.

Purpura.

Ostrea.

Tegularum cinis.

Sepis testa.

Purpurarū opercula.

Lana succida.

Oxygon.

Lana uita.

Lanam virens.

Pili usti.

Ouorum facultates.

Oui imperies.
Albumen oui
quibus afflicti
conferat.

Vulnus ca-

tibus, quæ nimirum citra morsum illinuntur, astringuntur. Ceteri & ipse vitellus asinilis est natura, ac proinde miscetur ceteris morfus expeti- bus. Verum quanto plus deficiat quæ sunt assa oua, tanto minor mitigatio vim obtinent. Mi- scetur & cataplasmatum phlegmonem exstingu- entibus. Iam uero crudo toto ouo utimur admo- ro facio, ad palpebrarum, aurium, mammarum, alia- rumque omnium partium phlegmonas. Ad hæc, in ace- to coctum ouum si fideat, ventris fluxiones deficiat.

Ouum in aceto
proculum quæ
que, dynteria
analis.

Quod si etiam eorum quæpiam, quæ ad dynteria- rum aut colicam affectum conueniunt, adiun- xeris, atque in igne modico, sumis ex parte fruxeris, edendumque ita præbeas, non minime sanè ita la- borantes adiuueris. Ad ambusta enim ouum est, protinus impositum, utique siue quæ forsum albu- men duntaxat ipsum molli lana excipiat: siue e- tiam cum vitello confundens, comiscensque, appli- cet. Mediocriter enim refrigerat, & citra morsum deficiat. Tale quum sit, & ad anacollemata uoca- ta, quæ fronti imponunt, eo utimur, & pilos pal- pebrarum agglutinamus: nimirum admo ita idoneo- rum quopis, cuiusmodi est thus, potissimum pingue, ac non inueteratum & sicum. Ouum igitur me- dicamentis quæ humiditates deficiant, a ut elixi- ut, aut assum, aut frictum, tanquam materia miscet: ita uero quæ lenior em humorum in pectore pul- monisque incidunt, forbile: id quod in aqua coactis elixari debet, donec incalcescat. Simili modo sum- ptum, gutturis, stomachi, ventris, intestinorum, atque uelice medetur asperitatibus.

Ambusta ouum
opaculat in-
possum.

Anacollemata.

Echinus, hoc est, cinereus, combustus. Erinacei utriusque rum marini: ruterrestris cor- pus usum, cinerem efficit facultatis rum extergè- tis, rum digerentis, rum extrahentis. Cochleæ, siue limacis.

Ouum ferbile
quæpiam.Echinus.
Erinaceus.

Cochleæ si totum testis urani, admista galla omphacinde, simulque pipere albo, mire profunt dyntericis, in quibus ulcera cõpurescere nõ co- perant. Conuenit aut ut piparis sit pars una, gallæ uero duæ, quatuor cochlearum. Hæc ubi ad un- guem leuigaueris, cobis inspergito, bibendumque aut ex aqua, aut ex uino albo & austero, præbeo.

Cochlea.
Limacus.Dynteria opti-
mæ medicamen-

Cæterum absque gallæ missione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obinde item non nihil ex usuque calidum. Porro cochleæ quæ uestionem non sunt expertæ, si una cum testis tri- tæ imponatur, & toti uentri aqua inter cutem laborantium, & in articulos tumoribus, ægrè quidem diuelli poterunt, cæterum impensè defice- cant, uel si uisidus crassius humor in alio contri- neat. Et sanè inhaerere sinere oportet, donec spon- te decidant. Idem faciendum in tumoribus ex ic- tu natis, difficile solubibus.

Carcini.
Canceri.

Carcini, hoc est, cancri, uili. Fluitatium cancerum cinis, quæ similitur prædictis exicatorius est: substantia tamen pro- prietate mirabilis est eius in iis qui à rabie cane sunt morfi, effectusque solum solum, tum cū gentia- na & thure, multo præstantior. Artibus partem esse unam oportet, quinq; gentiang, cancerorū de- cem. Ex quo quod medicamine Aesculion Em- piricus, concius atque præceptor meus, iis qui à ra- bid cane emorfi fuerat, quotidie diebus quadra- ginta mensuram cochlearis magni cum aqua bi- bendam dabat. At si non protinus ab initio, uerū

Galeni præ-
ceptor fuit Aes-
culion Empiri-
cus.

aliquot post dies, cursu percipit demorfi, tunc quo- tidie duo cochlearia aque inspergebat. Ad ipsum uero uulnus applicabat emplastrum, quod ex pice- bruria, opopanax, acetoque conficitur: habens pic- cis libram unam, aceti acerrimi sextarium unum Italicum, opopanax uero uncias tres. Hæc itaque monita uolui de cancri, quæ nulla coram qui uis illo medicamento fuerunt, extinctis sit.

Morfi à rabide
cane caridæ ran-
da.

Chelodones, siue hirundines, uisæ.

Sed & hirundinum cinere permissio melli per- multi utuntur, contra omnes affectus gutturis. Vrantur & ad acendum uisum nonnulli hoc ci- nere. At alij eas arefactas drachmæ pondere biben- das exhibent.

Chelodones.
Hirundines visæ.

Tettiges, hoc est, cicadæ.

Cicadæ etiam nonnulli utuntur ad colicos af- fectus, cum paribus numero piparis granis. Alij assas edendas offerunt, quibus affecta uesica est.

Tettiges.
Cicada.

Corydones, Galerita.

Galerita, aus illa pusilla, quæ in capite ueluti gal- leria ex pilis habet constilum, in iure elixa colica adiuuat, ueluti & ipsa herba eorydalis appellata. Verū aliud eam simul cum iure esse necesse est.

Corydones.
Galerita.

Alectorides, Gallinæ.

Gallinarum ius simplex retinendi uim possi- det, uti gallorū subduendi. Concoquendi autem sunt cum sale diutissime.

Alectorides.
Gallinæ.
Gallorum ius.

Gale, hoc est, mustela.

Eius cinerem cum aceto illitum podagricis iu- uare est proditum: nam uero arefacta prodesse co- mitialibus morbis.

Gale.
Mustela.

Ranae uisæ.

Ranarū inspersum cinerem sanguinis erup- tioni mederi referunt: cum liquida autem pice sanare alopecias.

Rana visæ.

Hippocampus.

Huius etiam cineris alopecis prodesse est proditum, facultatisque exiccantis & extenuantis existere.

Hippocampus.

Tellinæ falsæ.

Salsæ tellinæ uisæ, adeo uentis efficere cinerem alunt, ut is cum cedria euulsis radicibus ex palpe- bris pilos, in illarum in locum, eos renasci prohi- beat.

Tellinæ falsæ.

Testina terrena.

Contrita, neruisque diuisa imposita, mirū in mo- dum ea prodesse est proditum. Præterea cum ui- no pota, medicamen esse monendæ urinæ idoneū.

Testina terrena.
Lumbrici.

Cimices.

Eas cum aceto bibirās, ejicere hirundines aiunt: quæ nos semper cū aliorum cicinibus.

Cimices.

Cantharides.

Cū idoneis emplastris impositæ, a deo scabros ungues educunt, ut toti cadant. Præceptor aut meo rum quidam, earum nonnulli solet diureticis me- dicamentis iniicere. At nonnulli solas alas & pedes iniiciunt: alij eorum. Cæterum nos totas indimus. Porro aptiores sunt eæ cantharides, quæ inuictæ in frumeto, lutea transfuerunt in alis cingula obtinent.

Cantharides
faciles.Cantharides
dignæ variæ.

Buprestis.

Animal est catharidi tui specie, tui uiribus simile.

Buprestis.

Pityocampe, Eruca picearum.

Elusum sunt facultatis.

Eruca picearum.

Salamandra.

Salamandræ cinerem quidam septicis, lepricis, pso- ricis miscunt facultatibus.

Salamandra.

Narce, Torpedo marina.

Si applicet uisui cui caput dolet, fieri potest ut dolore liberet similiter alijs quæ sensum obstupe- scunt.

Narce.
Torpedo mari-
na.

B D 3 faciūt.

Draco marinus, & Triglia, & alia id genus.

Draco marinus
Triglia.

Vitæ etiamnum hæc animantes apertas, & protinus prout affectus appositas, prodesse traditum est. Nempe draconem marinum in suum ipsius iectum impostum: similiter & Triglia in draconis: mures domesticos in iectum scorpi, ueluti & sauram: mygalem in suum ipsius: & sauræ Chalcidicam, quam ex uino bibendâ præbent, tanquâ suum ipsius morbum sanent. Porro scorpium suum ipsius morbum curare, si tritus imponentur, necnō si assus edatur. Congruere autem aiunt & ijs qui a uipera sunt emori: a scilabotam uerō ijs qui a scorpio. Referunt etiam & in Aegypti regionibus arefactum asiracum exhiberi quæ qui a scorpio percussus sunt: & uocatum cybiu, uulneri uulneri a cane inflicto adhiberi. Ceterum in oleo frictis totis animalibus, ipso oleo utebantur nostrarum Medicorum quidam: sed & superiorum nōnulli ad pilorum effluuium: nempe pityocampis, urticis marinis, lepore marino, & scolopendro marino. ad aurium uerō dolorem, filphis in oleo coctis, & ijs quos Graeci oniscos, Latini mulpedes uocant.

Asilabota.
Affracum.
Cybius.

Pityocampis.
Urtica marina.
Lepus marinus.
Filphis.
Oniscus.

Vulpes.
Hyæna.

Vulpes, & hyæna.

Oleum in quo elixa unipes est, nō est potentioris in digerendo facultatis, quā in quo hyæna: quæ si similiter in oleo elixeretur, oleum ipsum longe potentius: facultatis in digerendo redditur. Talia autem medicamenta uim habent, ea quæ in alto corpore delitescent, ad extimam cutem trahendi, atque eo nomine quandoque dolores sedandi. Quare qui utantur uulpibus, & ipsi oleum digestorium efficiant, atque inde implens eo alueolis, totos arthriticos in eos demittunt, multo tempore inibi immorari iubentes. Ex quo fit, ut nō tantū qui circa articulos sunt tumores uacuentur, sed etiam uiueretur corpus. Vnde certe magnum cōsequitur commodū, quom nihil præterea amplius in affectas partes sit defluxurum, uimur euacuato iam corpore.

Oleum vulpū
summi auxilia
ri morbis articu-
laribus.

10

20

30

40

50

Alcyoniarū fa-
cultates & dis-
ferentia.

Adareion.

Adareion.

Essentia quidem sua uelut spuma est aquæ salis cōcreta, idque circa arundines & farragines. Est autem acerrimum, similitudo calidissimum pharma cum proinde & per se inutile. Verum commisceri solet ijs quæ uim eius retundunt: sicut fit multo utilissimum in ijs affectibus, qui exaltesci postulant, foris impostum. Nam id intra corpus sumi impossibile est.

Alcyonia.

Alcyonia omnia detergant ac digerunt, qualitatem habentia acrem & calidam. Est autem eorū unū densum & graue, odoris prauo. Oler enim pisces putridos, spongæ in specie simile. Alterum uerō figura longiuscula, leue, & rarum, odorem habens similem physcijs. Aliud tertium uermi simile specie existit, colore purpureo, cōsistentia molli: uocant id Milepsim. Postque quartum, secundo quidem iam posito similitudo leue & rarum, uerum lanis succidis simile. Denique & quintum, extrima superficie læui, ceteram internam substantiā asperam, nullius odoris, gustu tamen apprensus acere. Quod sanè omnium alcyoniarū ijs calidissimū, adeo ut pilos deurere possit. Itaque quom duo prima licentia, alphas, piores, leprasque adiuuēt, præterea cutem splendidiorē efficiant, idem præsta-

re non potest hoc ultimo loco positi. Nec enim perinde ut illa cutem duntaxat summā extergit, sed etiam excoriat, ita ut ulcera inducat. Porro quod tertio ordine recensimus, omnium tenuissimū est. Quare uisum alopecias curat illi cum uino, colore quidem fuluo, tenui tamen essentia. Quartum autē eundem cum hoc specie uires obtinet, uerum haud parum imbecilliores.

Sal.

Sal eiusdem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: uerū hoc differūt, quod salis è terra effluis: substantia magis compacta sit, ac proinde in eo maior partitio erasitilis, & stringendi potestas. Marius itaque affusus aqua liquefit protinus: id quod non accidit fossili. Eiusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdam saluginosis nascitur, ætate uidelicet aquæ ex ijs æstu absumptis: cuiusmodi est Tragalis, non procul à Smirnio. Igitur quom qualitas salis digerat simal & contrariat contactum ab ipsa substantia, aphronitrum in hoc differt, quod in ipso unum saporem exuperantem sit uidere, quem uocant amarū, uim habentem digerendi, haud item contrahendi, uis sal. Nam hic, quicquid in corporibus humidum est, id totum absumit: & quod reliquum est substantiæ solidæ, abstractione contrahit: ac proinde etiam conditura sua carnes seruat, ac putredinem ruerit. Quippe quod putrefcit, excrementitium humorem continet, substantiamque tum dissolutam, tum minime compactā. Quibus ergo corporibus, nulla prorsum inest superflua humiditas, eo melius optimo, & substantia solidæ & compacta est, ut lapidibus, ea ut putrefcat est impossibile. Quare in ijs salis non probat usus: sed in illis tantum, in quibus suspecta est putredo.

Sal usum.

Digerit quid potest, quom uestionis experta, quanto scilicet subtilius ipsius corpus accepta ab igne facultate, redditur.

Litrum, Nitrum.

Ostensum est hoc medicamen in medio salis & aphronitri uires habere.

Halos antheros, Flos salis.

Liquidum est medicamen, tenuiusque quā sal usum: præterea qualitate acris, facultatisque admodum digerentia.

Halos achne, Spuma salis.

Spumosa est salis efflorescentia, multo tenuioris naturæ, quā ipse sal. Quare & extenuare, & digerere quā ille multo plus potest. Verū quod substantiæ est reliquum, contrahere ut sal nequit.

Aphaltron, Bitumen.

Vnum & ipsum est ex ijs quæ in aqua marina proueniunt, & in alia quapiam que non est marina dissimilis, ut in Apollonia Epri, ubi reperitur hoc medicamen in aquis sponte nascentibus, uelut spuma quædam innasans. Quo sanè tempore est molle: postea uerō reficcatum, pisce sicca durius efficitur.

60

Bitumen proueniens in mari mortuo. Optimum uerū bitumē in mari quod mortuū uocant, prouenit. Caius medicamina uis est tum refectoria, tum excafactoria in secundo excessu. Merito itaque utitur eo ad cruentorum uulnenum glutnationem, & ad alia omnia quæ exicari debent, cum modica excafectione.

Spongus,

Salis differentia

Salis qualitas
tu facultas.
Aphronitrum.

Salis facultas.

Petroglimum
substantia.

Petrofere quæ
modo modo pos-
sunt.

Sal usum.

Litrum.
Nitrum.

Halos antheros.
Salis flos.

Halos achne.
Spuma salis.

Aphaltron.
Bitumen.

Bitumen quod
in mari mortuo
nascitur.

Spongia vlla.

Spongia, Spongia.
 Spongia ista, acris est & digerentia potenter.
 Vtebatur ea præceptorum meorum quidam ad san-
 guinis eruptiones, quæ manuali opera indigent.
 Porro admovebat eam partibus sanguine pro-
 fluentibus etiam non ardentibus, ut & crusta parum in-
 duceret, & ipsum spongiz corpus, seu operculum
 adhereret. At uero spongia noua, non sicut lana
 aut linamentum, materia duratior est quæ humo-
 res irritandos excipiat, sed etiam manifestè defici-
 at. Quare uulnera glutinari, si aqua, aut oxycera-
 to, aut uino admoveatur imbuta: à qua sanè, quæ
 antiqua est, longo spacio relinquatur.

Cerus.

Garus.
 Faciliorem habet admodum calidam atque sic-
 cam. Proinde eo quidam ad ulcera usi sunt putre-
 scentia: tum dyentericiis tæchiadiciisq; inhiçunt.

Halime, Salsugo.

*Halma.**Salsugo.*

Similiter garo ad putredines accommodatur: &
 ad tæchiadas & dyenterias inhiçitur. Etenim acrimo-
 nia sua humores coacti infestantes attrahit: ob
 idq; per intestina euacuat putrescentia uero ulce-
 ra in dyenteria colluit, & siccat. Maxime tamen
 sanguine salisum silariorum & mænidum ad talia
 Medici utuntur.

GALENI LIBER DE

substitutis.



Vbstituta medicamenta dicuntur, quæ
 ad tæchiadas & dyenterias inhiçitur. Etenim acrimo-
 nia sua humores coacti infestantes attrahit: ob
 idq; per intestina euacuat putrescentia uero ulce-
 ra in dyenteria colluit, & siccat. Maxime tamen
 sanguine salisum silariorum & mænidum ad talia
 Medici utuntur.

PRO**ABrotono****Abinthio****Acacia****Acoro****Aerugine****Amianto****Agallocho****Agarico****Alga****Aloe Indica****Alumine****Amma****Ammoniaco thym.****Ammoniaco sale****Amomo****Amylo****Amygdalis amaris****Anchusa****Aniso****Arace****Aristolochia rot.****Argemone****Armenio lapide****SVSTITVVS****Origanum.****Abrotonum.****Succum lentisci.****Radice avari.****Atamentum futorium.****Aplironitrum.****Calamum odoratum.****Euphorbium, aut epithy-****musum.****Anchusam.****Aloë uridis folia, folium,****uel glaucium, uel finum****ibis, uel Lyciū, uel centau-****rium.****Salem (salsilem).****Anisum.****Propolim.****Cappadocum salem.****Acorum.****Gyrin siccam.****Abinthium.****Hyacinthum.****Daucum.****Sesamum.****Aristolochiam longam.****Sisymbrium.****Atamentum Indicum.****PRO****Asbello****Aspalatho****Asphodelo****Alaro****Afolapide****Auripigmento****Balaustio****Bdelio****Bitumine****Britia pice****Buccina****Buprestis****Butyro****CAdmia****Calamo odorato****Canchri****Cantharidibus****Capparis radice****Cardamomo****Casia****Castorio****Cedria****Ceraunio****Ceruius adipem****Cera****Cerui cornu****Cerussa****Chalbane****Chamædry****Cicuta****Cinerula Cypria****Cinnabari****Cinnamomo****Clinopodio****Cnico****Colocynthide****Colophoniz pice****Corallio****Costo****Coryledone****Crinanthemo****Croco****Crocomagmate****Crocodili adipem****Cumino****Cynosbaro****Cyperis****Cyphi****DAmasonio****Dauci semine****Distamno****Diphryge****Dorycnio****Dracontio****EBeno****Ebisci radice****Elaterij succo****Ellebori nigro****Enucaphylio****SVSTITVVS****Adarcem.****Eriolæ semen, aut uiticis.****Succum betæ.****Zingiber.****Gagarem, aut salem ammo-****niacum tostum.****Sandaracham.****Malicorium.****Sphagnum odoratum.****Picem Brutiam humidam.****Picem in aceto seruata.****Ostreum.****Laser, aut hirudinem.****Lac bubulum coactum.****Leucographi in Aegyptis.****Sphagnum.****Baccæ lauri.****Phalangia.****Ericæ radicem aut myricæ.****Fructum myrti.****Cinnamomi dimidium.****Silphium.****Ladanum.****Leucographin.****Anseris adipem.****Fabam fructum cum propo-****li coctam & tritam.****Caprinum.****Scoriam plumbi.****Sagapenum.****Lapathi radicem.****Semen coriandri.****Cinerem foliorum oliuæ.****Rosaceos pastillos.****Calicis duplum.****Heliotropium.****Uiticis semen.****Ricini semen.****Apochyma.****Moly, aut symphytum.****Cedri fructum.****Anagallin.****Aphrodisiam.****Crocomagma.****Agallochum Indicum.****Canis marini adipem.****Brassicæ semen.****Solani uescariæ semen.****Juniperum magnam.****Caricam uisam.****Eryngium.****Sq. semen.****Salsiam.****Purgium lapidem.****Alterci semen.****Aron.****Loti arboris lignum.****Folia mori.****Eiusdem herbæ succum.****Papyri radicem.****Potamogetonem.**

BB 4

PRO	SVBSTITVTES	PRO	SVBSTITVTES
Epithymo	Colocynthis semen.	Myrrha Troglodyti	Calamum odoratum.
Ericis fractu	Gallam immaturam.	Myrthi oleo (de	Mori succum.
Erini folijs	Stercus ibis.	Misy Cyprio	Ocluram Cypriam.
Erucæ femine	Erysimi semen.	Misy rosto	Diphrygem.
Erucis pini	Vefpas cum cedria.	Nardo Syriaca	Iuncum odoratum.
Eryfimo	Struthij succum.		
Euphorbio	Stercus columbæ agrestis.		
Eupatorio	Chamæpityn.		
		N api	Rapæ semen.
F elle cameli	Fel Afcalaboti.	Nepita	Agrestem mentham.
Felle mustelæ	Fel cameli.	20 Nucleis pineis	Cucumeris semen.
Felle hyæne	Fel perdicis.	• Nucepinca	Gallam.
Felle uiperæ	Fel ichneumonis.		
Flore æria	Squamæ aris.		
		O chra	Misy Cyprium.
G alla	Palæstræ sordes.	Ocimo	Sifymbrium.
Gentiana	Radice apij odorati.	Ocimoide	Mentham agrestem.
Glycyrrhizæ succo	Mori succum.	Oenanthes succo	Vitigenum succum.
		Oefypo	Vituli medullam.
H ederæ succo	Perfex succum.	Oleo Cicino	Laurinum, aut uetus olei.
Hedychroo	Amaricinum.	Oleo ueteri	Feruefactum duplum.
Hyacintho	Florem Isatidis.	20 Oliuæ lachryma	Hypocistidis succum.
Hyæne adipe	Vulpis adipem.	Ompace	Gallam immaturam.
Hyofcyamo	Solani uescicaræ semen.	Opobalsamo	Guttam myrrhæ.
Hippuri	Atingam.	Opopanace	Lac sycamini.
Hyperico	Anethi semen.	Oryza	Farinam hordel.
Hypocistide	Acaciam.	Orminio	Lini semen.
Hyssopo	Thymum.	Ornithogall	Anthylin.
I ri Illyrica	Helenium odoratum.	P apaueris succo	Mandragoræ succum.
Iunco odorato	Cardamomum.	Plu	Sphagnon.
Iunco palustri	Polygoni radicem.	30 Pipere	Zingiber.
		Pipere albo	Nigri duplum.
L apathi radice	Pyrethri radicem.	Polij femine	Erucæ semen.
Lapide phrygio	Lapidem argyritem.	Polypodio	Chamaeonis radicem.
Lapide asio	Gagatem lapidem.	Polytricho	Abfinthium.
Lapide pyrite	Lapidem pyrobolon.	Pompholyge	Cadmiam usitam.
Lauri baccis	Serpyllum aridum.	Populi gemmis	Sampfuehum.
Lathyri	Granum Gnidium.	Propoli	Ladanum.
Lentisco	Terebinthum.	Pŷllio	Lentem palustrem.
Lepidio	Rubiam.	Pumice	Terram Creticam.
Lepidiæ radice	Folia capparidis.	40 Pyrethro	Zingiber.
Lepore marino	Leporem fluuialem.		
Lini femine	Fabulum.	Q uercus uisco	Chamaeonis uiscum.
Loti femine	Betæ semen.		
Lupi adipe	Vrsi adipem.	R apa	Heliotropium.
Ligustico	Pastinacæ semen.	Raphanino oleo	Ricini oleum.
Lyfimachio	Spinæ Aegyptiæ semen.	Refina pini	Terebinthinum.
		Rofeæ pastillis	Sinopidem.
M agnete	Hematitem lapidem.	Rofa ficcis	Perfex folia ficca.
Malabathro	Nardum Indicam.	Rhu Syriaco	Oxyacanthæ fructum.
Malo cydonio	Melilotum.	50 Rubigine	Squamæ ferri.
Malua	Fenumgræcum.		
Mandragora	Dorycnium	S agapeno	Refinam pini ficcam.
Manna	Thuris corticem.	Salua	Calamintham.
Mastiche	Lentifci caulem.	Salamandra	Lacertam uiridem.
Medulla cerui	Vituli medullam.	Sale ammoniaci	Salem Cappadocium.
Meliloro	Lotum herbam.	Sambuco	Spinæ uiridis folia.
Melle	Sapam.	Sampfueho	Rhus coquinarium.
Melle Attico crudo	Mel despumatum.	Santonico	Abrotonum.
Meo	Myrobalanum.	Saryrio	Erucæ semen.
Myrsinæ	Succum mori.	60 Scammonio	Ricini semen.
Molybdæna	Lithargyron.	Scilla	Bulbum efculentum.
Mori succo	Rubi folia.	Scoria plumbi	Plumbum productum.
Myrobalano	Glaucium.	Scoria Cypria	Melanteriam Aegyptiam.
		Semperuiuo	Lactucam.
		Sepiæ crusta	Pumicem.
		Sesamo	Lini semen.
			Sesamoide

PRO	SUBSTITUTIS
Sesamoide	Amaranthi cremorem.
Sinapi	Nasturtium.
Sifone	Anisum.
Sisymbrio	Ocimum.
Solano uescaria	Semen solani hortensis.
Sphagno	Iuncum odoratum.
Spondylio	Folia olivæ.
Stercore uulturis	Columbinum stercus.
Stercore turturis	Stercus columbi.
Stercore felis	Ichneumonis stercus.
Stribio	Aeris squamam.
Seruthij radice	Elebori nigri radicem.
Succo calpsi	Succum myrti.
Succo peucedani	Glycyrrhizæ succum.
Succorhododaphnæ	Viscum quernum.
Succo cyrenæico	Syrizæ succum.
Succo papaueris	Mandragoræ succum.
Succo salicis	Hederæ nigræ succum.
Succo gallæ	Succum mori.
Succo panacis	Lac fysiimori.
Succo polygomi	Succum plantaginis.
Sulfure uino	Sandaracham.
Symplyto	Centaurium.
Serri	Lithargyrum.

Terra Samia	Leucographen terram.
Terra æria	Calcem Thæbaicam.
Terra alana	Plumbaginem.
Terra æteri	Cinoliæ.
Terebintlina	Masticen.
Thapsiæ succo	Chamaeleonis nigri succu.
Thymo	Satureiam.
Tithymalo	Chamaeleon.
Thure	Ampelitin terram.

Verbenaca	Chamaeleucen.
Viola	Florem radiculæ.
Vino Rhodio	Austerum uinum.
Vino Falerno	Vinum Mendesium.
Visco queruino	Chamaeleonis albi uiscum.
Vulpis adipe	Vrsinum adipem.
Vuluris stercore	Columbinum stercus.
Vua domestica	Pulpa palmularum Syriæ carum.

Xylobalsamo	Radice uiolarum albarum.
-------------	--------------------------

Zingibere	Pyrethrum.
-----------	------------

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secundum genera, lib. I.



Vandoquidem ex cōmentario quem iam pridem de compositione medicamentorum conscripsi, priores duos libris, qui exierant in lucem, una cum alijs in apotheca, quædam uiam sacrâ est, perierunt, dum Pacis delubrum totum, & ingentes Palatij bibliothecæ maximo confabragrarum incendio: equidem amicorum precibus uictus, cogor nunc illos eosdē recuderendos ab eodem inno aspicar, à quo in illis exortus fuerit. Siquidem statim in auspicijs primi cōmentarij moncbam, esse exterminandos sophistas, qui traditionem medi-

caminum compositorum medio tollunt, nonnullis simplicium peculiare quoddam facultates inesse indicantur: eos enī excipientes scōmare, qui de illis aliquid prodiderunt. Qui quidam adeo vires medicamentorum ignorant, ut nesciant propterea, à marino lepore pulmonem solum exulcerantur, quicquid solam à cantlantibus. At uerò Empirici cognoscunt quidem ex æturgine cerato simplici admixta, confici optimum laron cum medicamentis: tamen neutrum eorum per se, carere gignere possit, quia autem ratione id coningit, ignorant.

Sunt igitur vires medicamentorum simplicium, non generant tantum, sed particulariter etiam inuestigandæ. Siquidem non sat est nosse hoc pharmacum calfacere, nisi etiam quod gradus id efficiat noris. Calfaciunt quippe resine omnes: attamen maioris minorisq; ratione plurimum inter se earum calores differunt. Atqui in curatione particulari impense refrigerant, medicamē admouebimus admodum calfaciens: illi uero quæ paululum ab habitu naturali recessit, calorem modico prædit.

Merito itaq; nos quatuor ex calfacientium ordines statuimus, separantes à modice calidis ea quæ eui denter eiusmodi qualitate præcellunt: tum quæ magna, tum quæ uehementi adeo, ut uere iam ut deantur: atq; in singulis hinc ordinibus latitudinem momentaneam constituentes: similis in excessibus reliquarum qualitarum, ratione. Porro medicamentorum materię, quædam sanè à plantis, quædam à metallis, nonnullæ ab animalibus proficiuntur. Iam uerò, præter simplicia omnium medicaminum facultates, omnium etiam præter naturam affectuum differentias ad unguem nouisse expedit. * Quippe primus curationis scopus à morbiuicis dispositionibus nascitur: cum quibus simul indicat curationis natura particulæ affectus.

Sed ætiam etiam nos ambientis temperiem, constitutionemq; præterea ætatem, tempus, regionem, uitæ studia, & mores, multo præstantissimi Medici nonnā cum illis inspicunt. Ergo si simplicibus tantum medicamentis, uniuersos præter naturam affectus curare liceret nobis, nunquam egeremus compositis. Quam autem sepe numero aliquatenus calfacere corpus nolentes, simplex nullum, quod præstare id possit habemus, ex uarijs nam cōficiamus medicamen, quod eodem, quo affectus, gradu à mediocritate recedens, id quod ex usu est, molitur.

Taceo nonnulla simplicia, citra alterius medicamenti miscelam, non posse adhiberi in emplastro: alia, nisi retundantur, aut mitigentur, administrari non posse. In morbis enā qui contrarias simul facultates desiderant, ut, repellendi & digerendi, detergendi ac trahendi, uel atrendi simul & incrassandi humores, maximus compositum medicamentorum est usus: nec secus ubi unum medicamen habere cupimus, quod multa uenenum euaculantibus feris, ac pharminus exaltibus aduersetur.

Quum autem oleum uetus & adeps, utri digendi fortiantur: chalcitis autem & palmæ fœcus, repellendi, astringendiq; ex his ipse pharmacum phœnicum dictum compositus, glutinandis ulceribus, cicatrice obducendis, & phlegmonia cuiusdam accommodum: quo iam compitua uiuantur. Enim ratio compositionem inue-

Sarcocollum aptum est ut ex æturgine cerato simplici admixtum.

Resina omnes calfaciunt.

Calfacientium ordines quatuor quosdam resperit in ceteris qualitatibus.

Medicamentorum materię a natura proficiuntur.

Scopus curationis a morbiuicis dispositionibus nascitur.

Compositis medicamentis curationes.

Phœnicum pharminus compositus est & qm.

Pacis delubrum confabragratum est. Cum ex bibliothecæ palatij cōmentarij Galeni, septuaginta extiterunt mandatis offi.

nir: experientia, de inuentorum uirtute decernit. Cum prædictis autem debet coqui lithargyrus, donec consentiant consequatur emplasticam. Adepti porrò ipse fit tum infusus, tum uetus, quodammodum etiam oleum: quæ sanè quæ uetustiora fuerint, eo digerit promptius, phlegmonæq; diuturniori atq; contumaciori erunt magis accommodata. Verum ad incipientes atq; augeſcentes phlegmonas, ut quæ astringere atq; refrigerare oportet, præstat emplastrum ipsum ex uino, uel aceto, uel aqua, uel oleo immaturo, uel astringente, liquare. Cõmunis autem compositionis modus est talis. Verusti adipis lib. 2, olei ueteris lib. 3, lithargyri tantundè. Chalcidinis vnc. quatuor. Liquato adipe reliqua elegantur atque artificiosè miscantur, feruentisq; simul, ac rudicula palmæ uiridi & succulenta moueantur, donec sibi emplastri consentiant contraxerint. Quo quidem medicamine, ad ulcera quæ non facili cicatrice obducuntur, & ad cruenta est utendum. Auxiliatur etiam inflammationibus, articulorum morbis, bubonibus, phymatis, amboſtis, perniciosis, fracturis, contusionibus, rheumaticisq; uariis constitutionibus, cuiusmodi plures solent Romæ inuolueri. Cæterum in phlegmonarum principiis uim repulſoriam esse ualidiorem oportet: in incrementis uerò, hæc imminuenda: quæ digerit uirtus, augenda est. Vigente phlegmone, pares inuicem esse conuenit facultates, nisi uehementis dolor pharmacum leniens requiratur. Ad inclinatè phlegmone, uim digerendi augebis. Quæ ex methodo licebit tibi secundum uarias indicationes uti prædicto emplastro, uariis oleis atque succis liquaro. Ego uerò ad phlegmonas eryſipelatoses soluio ipſo ex rosaceo utor. Cui etiam si æstas fuerit, uix æcerbæ simul & portulacæ, uel semperuiui succi immisceo. Quippe uix æcerbæ liquor per se, plus q̃ oportet astringit: tanta autem astrictio lædit eryſipelas, aut quæ calidè ipſorum, cutè densando, includit. Igitur in exactis eryſipelatis, ea quæ aduenientia sua frigiditate auxiliatur, ubi cõperint incallescere, sunt mutanda. Postea uerò quàm in eundem conqueuerit, aut si nec perfectè planè ab initio eryſipelas fuerit, * haud amplius aſcitium frigiditatem desiderabimus: uerum iſe succis diluemus phœnicini emplastrum, qui moderatè refrigerent. Ab his iam & lini seminis, & ehamæmeli succum miscemus: ipſoq; folio, sed fuso postea utemur emplastro, nihil aliud il li miscentes. Quod si quando liuidum, ob refrigerantium usum, eryſipelas ipſum euaserit, solum phœnicinum emplastrum, ueteri oleo liquidum, id discutere potest: quo rēpore partes liuidæ, aqua fœuentur calida, atq; etiam scarificantur. Sunt qualescuius nonnihil ipſi pharmacum immisceant. Intrepide itaq; in rheumaticis affectionibus hoc utor medicamine: utpote quod tum astringat, tum digerat, tum robur particularum cõfirmet. Etenim non semper ob calorem immodicum fluxione affliguntur particule: sæpe quidem ob propriam imbecillitatem, quæ ab intemperie frigida ut plurimum proficiscitur, tali cõrripiuntur affectu. Quare si humectet eas quilibet, calſciatq; medicamentis laxantibus, dissoluitur protius & imbecillæ fient. Sin tumores uehementer astringat, initio quidem iuuare uidebitur: cæterū quod ex

eis reliquum est, contumax atq; scirrulosum reddiderit. Sed neq; id genus disposicionis ferunt nimis astringentia medicamenta, ut i quibus dolor & tensio affligantur. Atqui omnis dolor inflammata exacuit, irritatq; & fluxionibus occasiōem præbet, uel si rheumatica intemperie æger non afficiatur.

Sunt autem complura medicamenta, quæ phar maco cui miscentur, uim nullam aut perexiguam exhibent: cõmoditate uerò materię præstant, ut uel emplastri, uel cerati speciem referat. Atq; ex eo rum sanè genere existit argenti spuma, uulgam in signem posidens facultatem, præter siccandi modicam. Quæ ratione attrita femoræ ex innere adiuuat. Est autè ex iſe pharmacis quæ liqueſcitur posunt, etiam argenti spuma, quam Graeci lithargyron uocantur chalcidis quoq; & misq; Cæterum e hactenus quidem omniū celerrimè funditur: tardissime argenti spuma: at in horum medio ærugo & misq; cõstitunt. Porro candidū medicamen, quod ad par uia ulcera utor, ex oleo, aqua & argenti spuma cõficiunt, ita ut libris duabus aquæ, tres uncis purissimi splendidisimiq; olei, totidemq; spumæ argenti inſiciantur. Debenz aut simul coqui ad ignem minimè sumidum, id est in loco sub dio atq; soli exposito. Siquidem ut aer nubilis pharmacū ipſum denigrat, sic syncerus ad candorem eius plurimū confert. Hòc aut fit glutinantius id medicamen, quod plus liquoris indideris. Aqua etenim substantia propria semper humectat, refrigeratq; . At oleum si recens sit, pharmacum minimè reſciuitur. Permanet itaque liuidum, ac modicè frigidum, quali maximè tenera corpora & cacochyma indigent. Et go liuidum cõditiō emplastrum, pruritus, deſquamata, & ut uno uerbo expediā, ulcera exigua perſanat: utpote exulceratis partibus ne quid inſuſat, impediens: & quod iam inſuſus, denudat partes cõmſtantes retrudens. Aduerte autem, nullum humectans nec propria ratione, nec ex accidenti esse ulceribus utile.

Conſicitur etiam pharmacum id ex oxaleo & lithargyro. Cæterum medicamen medio criter siccans sit, si utriusq; nēpe olei & aceti, duplo maior portio quàm argenti spumę miscatur. Copioſior uerò duplo utriusq; mensura, ualennus facit pharmacum. Ipſe enim triplam utriusq; nonnunquā miscens, tota die medicamen coquere ſoleo. Atq; hoc sanè modo confectū, colore atro splendescit, maximèq; siccandi potentia pollet, ita ut curet ulcera cõrumenta, cruenta glutinet, fistulas in calum non induratas, adducat: ac breuiter, circa morſum excicat.

Ex aneleo etiam lithargyroq; similiter medicamen paratur. Equidem per æſtatem sub ſole ardeat, ex uino Falerno, aut alio tenuiū partium, lithargyrum conterere ſoleo, idq; continuis quin decim diebus. Quibus exactis, medicamè ipſum excicans, repono: quo postea ex oleo ſoluto, in rheumaticis affectibus utor, necnon ad uulnera glutinanda. Cruda itaq; ac per se, argenti spuma, attritiones corrigit. Ex aceto aut aut uino trita, ſiccaturq; ulcerum quæ ob humiditatē ægrę cicatricem recipiunt, remediū fit. Quod si ipſam cupio roſionis expertem, elora utitor. Ac minimū quod roſionis exhibet, si uino uel aceto abluta. Cõuenit tamè curioſè toto die contriti, cū liquore per noctem

Dolor inflammatus exacerbat fluxionem, nec sanum præbet.

Lithargyri facultas.

Chalcidis omnium celerrimè funditur.

Candidum medicamen dicamus Galenus.

Aerem nubili denigrare pharmacum. Syncri conferre ad erum candorem. Aqua propria facultas.

Candidi emplastrum Galenus facit.

Ulceribus nihil humectans est utile.

Lithargyri præparatio Galeni.

Lithargyri facultas.

Lithargyrum resoluere expertem roſionem si ex uino uel aceto abluatur.

Et ceterum

Roma inuolueri in complures dispositiones rheumaticas. Phlegmonarum curatio.

Emplastrum facit.

Eryſipelatis curatio.

Linimentum eryſipelas curatio.

Emplastrum phœnicinum facultas.

Fluxionum curatio.

tem relinquere: quem postero die manē effundemus, alii denud instillantes, ac postea rursus tuentes: id quod singulis diebus facere sub feruenti sole (hoc enim fit cōmune præceptum in lapidosis omnibus) minimè desistimus, donec unum humore ceu quidam flosculus ipsius argenti spumæ cernatur.

Quæ ex lithargyro cōponuntur, fieri possunt etiam ex molybdæna. Cæterum molybdæna subtilius crassioris ac frigidioris quam lithargyrus est: ac medicamenta quæ ex ipsa parantur, cunctis redduntur. Quum igitur discitur quid uolueris, lithargyro potius quàm molybdæna uitor.

At cerussam uel coloris causa ad emplastrum candida conficienda medici lithargyro immiscet: uel ut quandam astringendi refrigerandique uim medicamento conciliet. Sed resinam etiam iniungere assolent, quod sequax ac sibi continuum fiat pharvacum. Verum quum minime omnino resinae sint tum terebinthina ipsa, tum illa quæ larix dicitur, has misce præstiterit, dum conficere tale medicamentum est animus. Multo etiam leniora resina omnia sunt, tum quæ resina constant, si ceræ quid addiciatur: tum quæ ex cera, si modicum resina recipiant. At candido emplastro alba cera desiderat: quam, si sponte sit nara, prius ablucere oportet: nimirum liquatis ipsam, ac mox in aqua founti mercentes, cōmouentes, ac repurgantesque ratione eris pax, resina & physma, ablucenda sunt.

Vbi igitur cerussa, spumæque argenti, adeo præcoctis ut minimè inficiat manus, cera simul cum resina fuerit admixta, candidum emplastrum habebis, cui aqua aut oleum miscere poteris. Ex oleis autem omphacium, Hispanicumque, pharvacum uim astringentiorum adiungit. Isteru uerò cum exigua astringitione quandam amaritudinē refert. Atqui principio ulcers, sinig, potiora sunt astringentia: dulcia autem in medea. Pondus ergo huiusce emplastri sit tale: Cerussæ, lithargyri, singulorum lib. i. olei lib. s. ceræ lib. s. Terebinthius vnc. 40 s. Quibus omnibus licetbit tantum thuris, quantum & terebinthinae, aut eris dimidiam portionē addere. Quia in duftria medicamen maximè anodynum reddetur, sed ad cicatricē inducendū ineptius: quandoquidē ex ipsius usa caro ulceri extrescet, tum thus sit faculitate sit coricum. Taceo laxantia medicamenta corporibus plenis & cacochymis admoda, fluxum ad affectas partes citare. Sarius itaque fuerit, tum ad cicatricē inducendam, tum ad digerendū exactius, aluminis scissilis, can dididit, vnciam unam, piperis semunciam miscere.

Candidi ex pipere medicamenti, quod ad senilū ulcera, & eorū qui mollem sortuntur cuticulam, persananda est efficax, quodque refertur ad Aerialū regem nostrum, qui olim Pergamētiū imperabat, composito habet in hunc modum: Argenti spumæ, cerussæ, sing. lib. i. olei lib. s. ceræ lib. s. terebinthinae vnc. s. thuris uel tantundē, uel medietas, aluminis drach. 6. piperis drach. s. Verū apud Romanos librarij quidem dicuntur solidi, ut mensuræ humidæ. Metallica in primis sub sole coquantur, donec derisculam consistentiam adipiscantur: quibus reliqua postea misceri debeant arctiosius. Hoc pharvacum ulceribus humidiorebus, atque abratibus medetur.

Alba quæ oleo recenti & aqua citra piperis atque

thuris misturam confici docuimus, uehementer cōporis partes offendunt. At minus illis Attalicum lacerare soler, eod quod terebinthina, oleum uetus, thus, & piper, adiecta sunt. Ad commorā nāq; minimè alumen conducit: quum opus hūc sit non astringentibus, sed abunde extrahentibus ea, quæ in alto neruo punctis affigunt, & uenenatam animalium saluam. Distinguentem tamen suar cacoethē ulcera, ab ijs quæ non facile ad cicatricem perueniunt: quum non omnia cacoethē ulcera ægrè & citariē cedant. Porro si blandius medicamentum, ad sedandūque dolorem cōmodius, cōficere uis, aliquid adipis inserui, uel gallinacæ, uel porcini immiscebis. Sic nāq; magis anodynum efficeris: minus tamen idoneum cicatrici inducendæ. In uniuersum autem, nemo probè uti possit medicamento cōposito, qui simplicium uires prius non accuratè didicerit.

Aliud album Andromachi. Lithargyri, cerussæ, sing. minam Atticam, ceræ partem quartam, resinae terebinthinae tantundem, olei heminas s. a. quæ heminas duas. Conficito. Nōnulli porro vncias 30. minam continere tradunt: nonnulli sexdecim. Atqui miretur quispiā, quomodo Romæ degens, pro libra nominatim heminas: cui urbi fuit familiaria uocabula, libra, sextarius, & vncia. Ex multis autem medicamentis iampridem conscriptis, priusquam potentia Romanorū usque adeo creuisset, sum cōiectura assequatur, quam illi uocarent heminam, fuisse æqualem nouem vncijs unius libæ Romanæ.

Aliud album Andromachi.

Argenti spumæ drach. 160. cerussæ drach. 100. ceræ drach. 50. terebinthinae drach. 14. olei heminam s. a. quæ cyathos 6. Conficito.

Aliud candidum ab Hera descriptum. Ceræ albæ Pont. lib. s. lithargyri chrysidia lib. i. cerussæ tantundem: myrrhe, medullæ ceruinæ, singul. vnc. s. thuris infest vnc. i. olei ueteris sextarium unum. Lithargyry oleo incoquitur: ubi uerò sortidum crassitudinem acquiserit, cera, mox cerussæ, aspergitur, moueturque. Vbi unita fuerint, nec iam polluant, ab igne extracta medulla inijcitur. Postquam refrixerit medicamentum, myrrha & thus alijs miscetur. Deinde emollitū, subactumque manibus, ad usum seruat. Etenim rabidos uel morbosos auxiliatur, tum uulneri impositum, tum mole uellente uicis, cataporsij instar exhibitur, quadraginta diebus. Ad hæc, abrafæ, sugillaria, & ulcera quæ difficile admittunt cicatricem, persanant: ad aliaque plerique est utile. Ego tamen propinare pharvacum hoc contra canis rabidi morsus, nunquam fui assus: quum uis haberem aliud, nempe ex cancris confectum medicamentum, ad sanandos illos maximè efficax. His enim remedijs ipse ut semper conatus sum, quæ licet nonnunquam præsidij quod allaturæ essent, dubiam spem promitterent, uenitquam tamen obesse possent. Porro Herae cum heminam scribit, sextarij Romani dimidum indicare uidetur, continentis vncias uiginti, quas cornibus maiori ex parte metantur, incisæ extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus. In uniuersum aut, nisi metallica medicamenta plenius coquant, emplastrū ex eis constans adeo friabile edetur, ut adherere curi alibi que delibatur a non possit. At coquantur

Compositi quæ continentur medicamenta.

Cicatrice uelut ad omnia esse distigenda.

Compositi resinae uires potest, quæ simplicium uires non deducit.

Candidum Andromachi.

Heminam fuisse æquale nouem vncijs libæ Romanæ.

Candidum ab Andromachi.

Candidum Herae.

Morsus rabidi canis auolueri medicamentum contra canis rabidum.

Seuerum Romanorum ceteris vncijs 30.

Lapidosis omnia quæ abluuntur, sub ardente sole sunt ex humore aliquo laniganda. Molybdæna facilius.

Cerussa resina.

Terebinthina. Larix.

Cera ablucenda ratio.

Vicibus incipiens potiora esse astringentia. Anodyni pharvacum.

Thuris carum cognit. Laxantia plenius & cacochymia admoda, fluxum ad affectas partes citant.

Aerialis Rex Pergamēti Galienus. Candidi ex pipere compositi.

Librantur solidi. Mensuræ humidæ.

largius, dum maiorem liquidorum mensuram in
mista continent. Quod uero ad adipis differen-
tias pertinet, in omni animantium genere iuu-
nilia perfectius humidiores, minus calidum a-
dipem possident.

*Candidum
Mafsa*

Album quod ad Mafsam refertur, ad diutur-
na & difficilia conferens. Lithargyri, cerussæ, sin-
gulorū drach. centū; ceræ drach. 50. terebinthinæ,
thuris, sing. drach. 25. aluminis fissilis drach. 12.
olei heminas 1. Nec uerd differre putatis, si drach-
mas centū alicubi scriptas loco unius libræ inue-
nias. Libra liquidum drachmas sex habet ad no-
naginta. Selibra, octo & quadraginta. Sic & Chuius
rursus dimidium, uiginti quatuor.

*Libram conside-
re drach. 90.*

*Dyspulsoria
ulcera quæ da-
cantur.*

Porro quæ ulcera ex humorum confluxu, uel
malorum, uel acrimiarum oriuntur, ita tamen ut lo-
cus affectus huiusmodi in se dispositio nem non
habeat, qua influentem humorē, quamuis bonū,
corumpat: ea dyspulsoria, hoc est, ægrè perue-
nientia ad cicatricem appello. At quæ dictam di-
positionē sortiuntur, singulari uocabulo cae-
thæ, hoc est, malignantis nature uocantur. Qui-
bus sanè omnibus illa medicamenta conueniunt,

*Vitiorum dys-
pulsoria atque
maligna, quæ
ita medicantur
ta conueniunt.*

quæ absq; rosione & morsu deficiunt: quæ præ-
terquam quod non erodant, aut manifestò astrin-
gant, detergere etiam possint. Siquidem plurima
his generis ulcera, seu ab exsiccatione malignorum
humorū sint causa reddita, impleri possulant. At
qui omnia quæ eam gignunt medicamenta, de-
tergere facultatem sortiuntur. Multa etiam alia
sicā possident uim, ulceribus id genus curandis
cūmodam. Eorum tamē meminisse impræsentia-
rum oportet, quæ aut tueri cōfecti emplastri can-
dorem possint, aut non uisquædeo uitare. Talia
autem sunt, cadmia, pompholyx, calx, ostrea com-
busta, purpura, buccina, & sepiæ pars ossia. Parū
officiet color, & aeris squama: & exusta chalciti-
de, id quod cinereum est, aut subalbidum. At uerò
dictorū quodq; si lauerur, totam rosionē amittet:

*Cera Tyrrhe-
nica.*

quædammodū cum cera, quæ medicamini efficien-
do admiscebitur, tum resina. Ceterum ut cera Ty-
rrhenica uel Pontica est ad caudidi emplastri præ-
parationem præstauit: sic resina, tum quæ larix,
tum quæ terebinthina appellatur, ad ulcera mali-
gnantia magis conducunt. Sed thuris aliqua por-
tio etiam indenda est, ut ulcerum malignorū ipsa
dispositio coquantur, & ad suppuratorem perue-
niant. Iam uerò ad prætumida ulcera, ex aceto &
marina curio seluulgari debent metallica. In qui-
bus autem acre & mordax est quod in ulcera fer-
tur, ex aqua potius maceranda singula sunt: quæ-
dammodū magis ex uiuo, ubi copiosius humor
ulceribus influens apparet. Vbi igitur lithargyri ce-
russæq; utriusq; libræ unam cum tribus olei, &
selibræ aquæ simul & accuratè coxeris, resinæ tere-
binthinæ, aut eius quæ larix dicitur, ternas uncias
inficito: ceræ autem duplum sufficit: nam thuris
sat erit si unciam & semissem potest etiam & resinæ
indideris. Deinde metallicorū tres uncias addes,

*Metallica ab-
luenda modo di-
uergi.*

*Vnicū conside-
re drachmas.*

quas drachmæ quatuor & uiginti cōstituant. Im-
pones autem duorū, trium, plurium, atq; omnū
quæ numerat: ita ut si omnia habes, æquam sin-
gulorum portionē inficias, cadmiæ nempe, pom-
pholygis, buccinarum cineris, uel ostreorum, &
æris squaræ, singulorū denarios septem, qui tres
uncias absoluit. Quod si calcem lorē immiscas,

singulorum in drachmæ quinque ponentur. Si usam
chalcitidem, singulorum drachmæ quaternæ: sic
ut ex omnibus in uuum cōiunctis, tres tantum
uncias cōsistentur.

Candidum emplastrum Damocratis, ad abra-
sa, ambrasa, & ulcera summam in cute suborta.

Cerussæ lib. 1. lithargyri, terebinthinæ, sing. unc. 16.
ceræ Ponticæ unc. 5. terebinthinæ purissimæ unc.
1. thuris mannæ, uel thuris unc. 5. olei candidi lib.
1. aquæ sextarius. Cōficiatur ut decet. Porro in istis
qui molli sunt carne, in sensibusq; atq; his qui malo
sunt prædicti corporis habitu, aluminis licetibi e-
riam quatuor uncias miscere.

*Candidum Da-
mocratis.*

GAL. DE COMP. MED. SEC. GEN. LIB. II. compositione medicamentorū se- cundum genera, lib. II.

Uti igitur si quando perdidimus librū, cui
iulcripæ infini medicaminum consuetu-
rum compositiones, similia reficere am-
plius ualeamus, necessariū in primis est, nos uniuer-
salem quandam uix formulam didicisse, quæ pro-
positum inueniamus, & dein uerd secundum hanc
in multis particularibus exerceri, scientes absq; ta-
li exercitio nullum posse rectè opus absolui. Pro-
ponatur itaq; uobis cauum ulcus curandum. E-
tenim docti ab ipsa ratione, cauum ulcus curam cu-
rationem subministrari succrescente alia carne lo-
co deperditæ, ex ea uidelicet quæ subiecta ethoci-
tamus fieri hoc non posse, si in ulcere sordes, aut
copiosa humiditas subsit. Verū sordes medica-
mina detergentia auferunt: humorem, exiccantia
discutunt. Quo circa necessum est huiusmodi phar-
macorum materias cognoscere, id uero simpli-
citer secundum genus eorum facultates conside-
rantes, sed inuenientes etiam quo ordine, quod
gradu, aut excessu, singula suas uires fortiant. Fin-
gamus ergo nobis ad manum tantum adesse ce-
ram, æruginemq; quibus caui ulcus replicamus.

40

Quum enim compertum habeamus, ceram qui-
dem solam, uleeris sordes minimè prohibituram
esse, ut quæ nec detergere, nec exiccare possit: æru-
ginem autem per se adhibitam, excitaturam tum
rosionem, tum phlegmonē: unig horum utrumq;
uitabimus, mediū autē ex ambobus cōstituemus,
ut imbecillius ærugine, sic ceræ ualētius. Quia ue-
rò paulo hæc intervallo relinquunt, ab eo quod
cōmodè administrari possit, ærugo autē magno
id ipsum excedit, ob id sanè multæ quæ modicam
ærugine admiscebimus. At quantū certū misce-
re oporteat, certè ante experientia exatè quidem
nemo inuenire poterit: cōficere autem poterit,
iudicareq; & ita cōficere pharmacum, ut primò
nullum infelicem successum fieri habuerit: quemad-
modum aliquando ego in quodam uico cōfeci-
ci, cum ceræ fusæ ex oleo rhodino libra unia, un-
ciam unam æruginis temperans. Ceterum ualida
corpora ualidiora medicamenta sustinent: quæ
uero imbecilliora exsistūt, hoc est, humidio & mol-
li habitu prædita, haud item ita perferunt. Dura
itaq; corpora ex copiosiori ærugine ceræ admi-
strat, recipiant carnem: molliæ ex pauciori. Quare
ipsa experientia docebit, quatenus uel augere, uel
remittere, uel tueri pharmaci facultatē expedit.

60

Sunt namq; omnia medicamenta ei optima, qui rat.

*Ceram per se
non exiccare ul-
ceris sordes.*

*Ærugo per se
adhibita, rosio-
nem & phleg-
monem excitat.*

*Corpora ualida,
uulnosa, ualidiora
medicamentis per-
ferre possunt.*

*Medicamenta
molliæ ex esse
prima, qui esse
sunt quibus re-
sistuntur, quo
rat.*

asse-

affectus quibus singula offeruntur, cognoscit.

*Viride medicamen-
tum Galli.*

Viride medicamen Galli, ad glutinanda maiora uulnera potentissimum, ab Andromacho scriptum. Refinae strobilinae drach. ccc. cere drach. c. xurginis rase drach. l. thuris drach. xxv. Acceti quod sit satis. Hæc Andromachus. Cæterum quum strobilina refina aliarum omnium longe calidissima sit: ambobus autem qualitatibus moderatissima, quæ terebinthina uocatur: certè multò satius uidet hanc omnibus medicamentis, quæ rectè curabunt ulcera, permiscere: quandoquidè primus, præcipue in eis scopus est, ut id quod offertur, non mordeat. Cõmendanda est autè ipsa thuris cõmisio, quod emplastri consistentiæ adiunget, dolorè simul leniens & cõcoquens. Quare si in ea cõposuione ipsa ipsius porno coniuncta xurgini esset, tenacius & mitius ipsum redderetur medicamentum: xurginis ramen exiccationem fsculatem exolueret, quæ ulceribus ægrè admittentibus curationem desiderat. Meminisse autem oportet, forum medicamentorum ex aceto diebus plurib, contritorè, morsum & acrimoniâ obtundi, uires sugeri. Eadè ratio est in meralicis medicamentis combustis. Hæc tamen ex ignis cõmercio nonnulli mordax siue erodens perfecti: quod elota deponunt, ac lenius proficius redduntur. Propositio itaq; emplastri, si ex rosaceo liquefacto utaris, proderit sordida, humiditasq; ulceribus. Pura uerò erodit: ac proinde miscendū est et ceratum liquidum ex cera & refina confectum, uel ex rosaceo, uel oleo liquatum. Est autem olei nomen unum, qualitas & facultas diuersa. Quippe omphacini frigidius est: ex maturs oleis presfus, calidius. Temporis autem progressu, calfaciendi nimis augeat. Sic etiam quod salem habet, quæritur ex illo fumperit, tanto calidius est: magisq; fccat, quàm quod ipsius est expers. Iam qd furculos olei continet, uisnerius astringit. Indica bit autem quod utilis est, & ulceris forma, & corporis ægri natura. Viciu siquidem cõtrarij remedium curabitur: corpus ulceratum, similibus. Rosacea uerò præstantissimum esse nosti, quod solis rosæ pluribus, oleo citra salem preparato, plenius maceratis confectum est. Quæ omnia si quis memoriter teneat, nec oblitus sit uirium medicamentorum simplicium, & si uaria emplastra uiridia componet, & compositorū singulis quam rectissimè metat. Porro durioribus corporib, magis exiccata medicamenta exhibenda sunt: minus aut, mollioribus. Ad hæc intendemus exiccantis medicamenti uim, ubi opus esse uidetur, admisso melle: remittentibus autem & mitigabimus, ex oleo, & cerato, uel oleoso quæsum. Igitur cauum uleus in sano corpore, uiridi emplastro, quod ex xurgine, cera & refina conficitur, liquato ex rosaceo, cura bitur. In cuius medicamenti compositione, æquidè ceræ & refinae soleo portiones pares misceræ: xurginis sibi duo decimæ, uel decimæ, uel octaua, numrum pro uleum corporum diuersitate. Atq; erit sanè duo decima, si ceræ pondo, & refinae tantidè, xurginis uncia duas temperemus, decimæ & octaua ad portione, quod cerum.

*Viride Phoraceu
drachmæ duæ.*

Viride Hecatondrachmon dictum, quod centum drachmas medicamentorum recipias, ad magna uulnera glutinanda, & purganda foridissima, maxime utile. Ammoniaci drach. viij, squamæ drac.

xij, mannæ drach. viij, refinae sicca drach. xij, xurginis drach. viij, seui ululini drach. xij, ætrefug terebinthinae drach. viij, cere drach. xxx, olei quaretem cyathi partem, aceti quantū satis esse uideatur. Conficito.

Viride Epigoni, ad carnem gignendam efficaciss. Aeris squamæ, xurginis, guttæ ammoniaci, ari strobilinae, thuris, sing. vnc. j. Aloei, myrrhæ, chalbani, sing. vnc. s. Aluminis rotundi drach. vii, refinae colopliouæ drach. cc, cere drach. c, olei hemina dimidium. Misceto.

Viride Pasionis ad extrahendū & digerendum urile.

Refinae colophonie drach. ccc, cere drach. cl, xurginis drach. viij, aluminis rot. tantundè: squamæ aeris drach. xij, thuris drach. xvj, æris combusti drach. viij. Salis Ammoniaci tantundem. Olei dimidium cyathi: ceteri quod satis esse uideatur. Conficito.

Viride Lite appellatum. Refinae lib. xij, cere lib. viij, xurginis rase lib. ij. Seu ululini lib. ij, aceti lib. jo. Ego autem mannæ libram inficito. Liqueat igitur acetum cum duobus xurginis libris, & una ipsius mannæ, leuigandum esse, ac dein liquida ipsa miscenda. Hoc medicamentum emollit, concoquitq; adipis atque mannæ ratione.

Porro ad efficienda uiridia medicamenta, xurginem non modicam immittere oportet, ut cætera in suum colorem permittat. Quare quæ per tinaciter proprium colorem tuerentur, ea simpliciā ab hac miscella abigenda sunt. Sed neque inter coquendum est incicienda ipsa xurgio: uerum ubi in mortario unitas facta est, tunc miscenda.

Consilia igitur curandorum ulcerum sunt, fordidis sibiliter abstergentia medicamenta: profusentibus exiccantia: atque id quod in fluxu est, repellentia. At si copiosum & contumax sit quod fluit, fluoris causa prius est imputanda. Constat autem, inflammatorum ulcerum prius esse sananda phlegmonem: carnem interpetaram, reducendam esse ad temperiem: cui sanæ quatuor modis simplicibus, non demij composita, per contrarias qualitates succurritur.

Porro ubi finem impleat & proponimus, medicamentum Ipsi uocatum, aut Machæronis emplastrum liquatum ex copiosiori oleo, per foratū cornu infundendum est: ad quod etiam pyulcis unimur. Est autem ipso medicamento tunc meraliori utendum, quum sinus oppletus esse sordibus: ut soluto ex oleo largiori, dum magis purus exilit. Cæterum si parue adhuc phlegmones finem infestantis suspicio adsit, medicamentum ex rosaceo liquabitur. Pari modo & medicamentum siccum, quod ex chara combusta constat, rosaceo copiosiori diluente, ipsi finui infundimus. Quemadmodum uerò sinus liquidioribus pharmacis indigent: ita quæ superficiem corporis caues ulcera infestant, erasibus medicamentum potestulant. Merito igitur in id genus uiridis, ceratum ualide abstergentibus admiscemus: in sinibus oleum, uel rosacei plurimum. At uerò medicamentum ex salibus constat, ubi animus est carnem gignere, offensa non fuit. Sal quippe magis astringit quàm purget: fccat uerò nihil minus quàm nitrum ac aphronitrum.

Viride Epigoni.

Viride Pasionis

*Viride Lite de
flam.*

*Viridia efficien-
da ratio.*

*Vlcerum curan-
dorum uariæ
sana consilia.*

*Vlceris inflam-
mati curatio.*

*Sinus impleti de
ratio.*

*Sinus liquidiora
pharmacis
sunt.*

Salis facultas.

*Melinorum atque ueridis di-
scrimina.*

Quemadmodum uiridium emplastrorum plu-
rima, propter xruginem præpollentē talia sunt,
ita quoque melinorum nonnulla. Sed uiridia crugi-
nem incoctam habent: melina oerō coctam, sed
mediocriter.

*Melinum An-
dromachi.*

Andromachus igitur cōplura melina scripsit,
ad glorianda ulcera, carnem ingendā, indu-
cendamque cicatricem idonea: quale est quoddam
subdum. Lithargyri drach. iij. olei hemioam qui-
dem æstare, hyeme autem tres cyathos: ceræ drac.
xlviij. colophonie tantundem: ammooiaci thy-
miamatis drach. xxiiij. æruginis rase, chalbani,
myrrhæ, sing. drach. viij. Conficito. Aliud sim-
plex. Lithargyri drach. c. axungie drach. lxxv.
olei oeris tantundem. Melle. Cœuenit enim car-
ne molli præditus, digeritur. Aliud Heractidis,
interiores abscessus sine dolore discutiens. Lithar-
gyri, cerussæ, sing. drach. c. ceræ drach. lxxx. resio-
ar drach. lx. ammoniaci thymiamatis drach. l. 30
chalbani drach. xvi. olei oeris heminas ij.

*Melinum Hera-
clidis.*

Melinum Menæti.

Lithargyri lib. iij. olei lib. iij. terebinthi lib. ij.
ceræ lib. j. xruginis, thuris, chalbani, sing. vnc. iij.
ammoniaci thymiamatis vnc. vj. Conficito.

Melinum Serapionis, ad uulnera, & ad
resolouendum.

*Melinum Sera-
pionis.*

Lithargyri drach. c. ammoniaci thymiamatis
drach. xxviij. ceræ drach. lvi. æruginis Cypricæ drach.
ix. myrrhæ drach. ij. colophonie drach. lvi. chal-
bani drach. viij. olei heminam s. Quod si æstas sit,
quantam partem hemina: Adæorte autem, myr-
rhā non sustinere coctionem: quam nec thus,
nec aloë ferunt.

*Collocum non
sustinet myrrhā
nec thus, nec a-
loë.*

Hygieni emplastrū ad multa: quo ad ulcera uix
cicatricem ducens nollum melius extat. Li-
thargyri chrysididis minas: ceræ tantundem:
chameleontis nigri radicis drach. xxxvj. ærugi-
nis rase drach. xviij. chrysocolli drach. xl. olei u-
teris hemioas iij. Conficito. Preparatur optimē ar-
genti spuma, si intrita uiuo Falerno sub æstu Ca-
niculæ, dein ascleetur.

*Emplastrum ex
chameleonte.*

Emplastrum ex chameleonte, quod cicatricem
ulceribus difficillimis, callosis, & inoeteris in-
ducit. Lithargyri minas ij. ceræ mioas vj. æru-
ginis minas iij. chameleontis minas viij. olei mi-
nam unam. Conficito ut decet.

De rufis emplastris.

*Rufis empla-
stra fieri per loo-
gam callosorum
æruginis.*

Quemadmodum propter crudam quidem æ-
ruginem sunt uiridia emplastra: propter medio-
criter autem coctam, melina: sic rufis euadūt, ubi
liberius ea coquitur. Manifestum igitur est, me-
lina ruffa oleum copiosius, quā uiridia, reci-
pere. Ruffum potō, quo semper mea industria
parato utor, in hunc modum coquitur. Argenti
spumæ cū oleo prius coctæ, metallica ex aceto læ-
uigata immitto, & sic coquo, donec amplius ma-
nus non polluat. Impono itaq; olei oerustioris li-
bras quatuor, argentæ spumæ lib. iij. aceti quā-
am acerrimi lib. ij. Horum trium metallicorum, squa-
mæ ætis oigri, æruginis, chalcitidis, sing. vnc. ij.
Ceterum hyeme plus olei quā per flatat miscen-
dum est. Ac sanè hoc medicamen cruenta uulnera
glutinat, magis in duris corporibus: curatque
difficillima ulcera concoquit. In summa uerō, so-
lum hoc sinus glutinat, astringit fistulas, excicat,

& prorsus claudit. Ipsum tamen inuat spongiane
cens ueteri uino reperia. Deligatur in sinibus
ab imo fiat, uersus ulceris osculum.

De ijs que cicatricem obducunt.

Quāto autem plurimā sarcocitis magis di-
cuntur ficcare, tantō glutinantibus epulotica, si-
ue cicatricem facientia. Ea tamen ex aliquo astrin-
gēti oleo (cuiusmodi rosaceum, aut myrteum est)
solent admisceri. Porro inter ea quæ apud om-
nes magnificē cōmendantur, iocundē cicatri-
ci præstantissimū est quod ex cadmia, quodq; ex
ladano consistit.

Emplastrum ex cadmia.

Cadmiz uisæ, & ex uino preparatæ, chalciti-
dis tostæ, sing. drach. lxxx. picis colophoniacæ
vnc. viij. uini Phaleri quod satis est. Confici-
to ut decet.

*Epuloticum ex
cadmia.*

Aliod etiam ex cadmia.

Cadmiz tostæ, chalcitidis tostæ, diphrygis, sing.
drach. xvi. ceræ, resinæ frictæ, olei myrti, sing. sēd
bram: uini Italici quod sit satis.

Aliud ex cadmia.

Argenti spumæ, cerussæ, cadmiz, diphrygis, re-
sinæ, sing. drach. viij. chalcitidis drach. ij. ceræ,
drach. viij. myrti olei, & uini Amini quod satis
esse uideatur.

Emplastrum ex ladano.

Chalcitidis, argenti spumæ, ladani, singulorū
drach. xxiiij. bituminis drach. viij. ceræ vnc. ix.
myrti heminam, oioi tantundem.

*Emplastrum ex
Ladano.*

Emplastrum Pyricauton dictum.

Olei hemina, aluminis fissi, manni, thuris, ar-
genti spumæ, chalbani, singulorum drach. l. cer-
ræ drach. xxiiij. anchusæ drach. viij. medullæ cer-
uinæ, adipis suillæ, æruginis, cerussæ, sing. drach.
ij. ouorum trium lota. Conficiatur ut decet.

*Emplastrum py-
ricauton.*

Medicamen Magne dictum, ac uerē magnū cō-
tra ulcera que difficulter cicatricem admittunt:
quod ex rosaceo dilutum, etiam sedis affectus au-
nat. Argenti spumæ drach. c. ceræ drach. l. Cer-
ussæ drach. c. terebinthi drach. xxv. thuris tan-
tundem: aluminis fissi drachmas xij. olei heminas
duas. Conficito.

*Medicamen Ma-
gne dictum.*

Aliud Thelamonis, accommodatum carbon-
culis, sinuq; excicans. Pityriæ, ceræ, calcis uisæ,
lithargyri, sing. drach. l. cerussæ drach. xxv. olei
tres cyathos.

*Emplastrū Tho-
lamoni.*

Aliud Moschionis onice cōferens ad amouen-
dum ulceris callum, sanandosq; sedis affectus.
Argenti spumæ, cerussæ, calcis uisæ, sing. drach. viij.
medullæ ceruinæ, ceræ, utriusq; drac. xvj. olei myr-
tei quantum sit satis.

*Emplastrum
Moschionis.*

Epuloticum medicamen Andromachi.

Cadmiz lib. j. chalcitidis uisæ, ceræ, sing. ran-
tundem: resinæ aridæ lib. ij. myrti tantundem.
Vinum ficis immiscetur.

*Emplastrum
Andromachi.*

Aliud eiusdem candidum epuloticum.

Argenti spumæ mioas ij. cerussæ tantundem:
ceræ, resinæ, sing. minas iij. olei heminas iij. aq; q;
hemina.

Candidum Telephanis.

Argenti spumæ drach. lxxx. cerussæ drach. cxx.
myrrhæ drach. ij. obo. ij. Sagapeni drach. v. thu-
ris drach. vj. obo. iij. olei hemioas ijs. Omnia
simul coquito.

*Candidum To-
lephanis.*

Aliud ad herpetas, carbunculos, cōdylomata,
&

& rhagadae maximè ualena: quod etià phlegmonas arceat. Adipis fuilli drach. lxxviij. ceræ candidæ drach. alviij. ceruffæ drach. xij. argenti spumæ tantundem. Conficito.

*Cephalicaphar
maca unde do-
lle, & qua fa-
cultate prodita*

At uerò nonnulla emplastra cephalica, & catagmatica nominant, ponissimū a caluarie fractura, quibus solent opirulari. Sunt autem talia, abstergentia, digerēdi, & siccandi potestare prædita. Pierig tamē paululum ex astrigentibus phar macia cis admiscet: ut id quod affectus paribus influit, repellatur, & abstergentium facultas in alium usq; descendat. Cæterum nisi astringentia cōteratur in tenuissimum pollinem, magis ob sunt, quàm prosint, ita quæ trahendi uim obtinēt.

Catagmaticum optimū ad Asclepiade traditum, ad confirmanda fracta ossa.

*Catagmaticum
Asclepiadi.*

Argenti spumæ, bituminia, sing. drach. cc. picia arida, ceræ, sing. drach. c. terebinthiuz drach. l. aluminia scissita, propoleos, sing. drach. xxx. ammoniaci thymiamatis drac. xxiiij. fruginis drac. 20 x. olei sextarios quatuor.

*Catagmaticum
Molchion.*

Molchionia catagmaticum ad fracturas, con-
rusionēs, arque recentia uulnera, aliisq; affectua complures celebre. Argenti spumæ minam i-
picia tantundem: seu uirulini tantundem. Tere-
binthinz drach. octoginta: manne thuris tan-
tundē: ceræ drach. xl. eruginis, opoponacis, chal-
bani, sing. drach. viij. olei cicini, aceti, liquoris sy-
camini, sing. heminam: picia liquidæ heminæ di-
midium. Conficiatur ut decet. Pro mina impræ-
sentiurum intelligo vncias uiginti: quarum sin-
gulæ pendent octo denariis. Sic itaque contine-
bit mina, centum sexaginta denarios. Proprie
autem dicuntur emplastra cephalica, ea quibua
Medici in ijs capitia fractura, quæ ad diploen pe-
nerant, utuntur, ad extrahenda ex alto, superfi-
ciem uersua, non ossa modò, sed his multò magis
humores crassos & uiscidos, inrua desilentes.
Quare acrimoniam quandam sortiantur oportet.
Itaq; catagmatica cephalica generosiora ex-
sunt: quæ quidem multa ceræ, carnem possunt
producere. Quocirca sarcoicis quodammodo
sunt similia.

*Mina continet
vncias xx.
Vncia consistit
viij denarij.*

*Cephalica ad
qua Medio vid-
etur.*

Cephalicum optimū ad capitia fracturaa ab
Hera descriptum.

*Cephalicum
Hera.*

Squæmæ græ drach. xxv. aluminia, aristolochiæ
longæ, sing. drach. xx. ammoniaci thymiamatis,
thuris, sing. drach. xxv. myrrhæ drach. xij. seu tau-
rini, terebinthinz, pitying, sing. lib. iij. oki hemi-
nam: aceti quantum sit satia. Conficito.

Aliud eiusdem, arcis phlegmonē, maximè ad
fracturaa, & puncturaa neruorum conducena.

Argenti spumæ drac. xxv. bituminis aridi drac.
c. picis aridæ drach. l. ceræ drach. l. resinz pitying
drach. xxv. ammoniaci thymiamatis, fruginis, a-
luminis fissi, propoleos, sing. drach. xv. olei uete-
ris lib. iij. Conficito.

*Catagmaticum
Andromachi.*

Andromachi catagmaticum.

Argenti spumæ picia, ceræ, seu taurini, thuris,
sing. minam: picia liquidæ, heminis dimidium: li-
quoris fycamini heminam: terebinthinz minam:
opoponacia, chalbani, fruginis, sing. drach. viij.
ricini heminam. Ammoniaci thymiamatis drac.
xxv. Ex uino austro diluitur.

De emplastris glutuantibus.

Quidam hæc ἰσχυρὰ & τραπηχεῖα nominant

estq; opua corū coniungere, & diuisas partes con-
glutinare, reducereq; ad pristinam integritatem.
Sunt autem sarcoicæ ipsa glutiniora feciora.
Ad hæc, sarcoica quidem detergerendi uim, sed abs-
que rōsione possident: Glutinantia autem, tan-
tum desiccantia esse debent. Cæterum cicatricem
inducentia medicamenta, præterquam quod a-
stringunt, sciciora etiā sunt glutinibua. Etenim
glutinannū est finis, nullū inter coitura subnaici
humiditatē permittere: cicatricē uerò inducentiū,
non modò hanc prohibere, sed consistētē etiā in
ijs quæ cicatricē sunt receptura, cōsumere præterea
callo obducere, & astringēdo obdurare. At sarco-
tica sanguinē ad rēfectū onem idoneum tam quan-
titate, quàm qualitate tuentur. Iam quod nullius
sit mordicationis particeps medicamē, purum ul-
cus conseruat, si quidem tale illud acceperit. Por-
rò molliora humidioraq; corpora, imbecilliori-
bus medicamentis indigēt: ut uelientioribus,
quæ prorsua contraria existunt.

*Glutinantium
medicamentum
ῥῖν.
Sarcoicæ fa-
cultas.
Epuloticum
opua.*

*Molliora corpo-
ra imbecilliori-
bus medicamen-
tis indigent.*

Glutinatorium ab Andromacho scriptum,
nomine Barbarum,

Picia, resuzæ, bituminia, sing. drach. cc. thuris
drach. xxiiij. olei heminam. Conficito.

*Glutinatorium
Andromachi,
Barbarum no-
mine.*

Aliud eiusdem.

Picia lib. ij. bituminia, ceræ, picis lib. ij. Ammonia
cl thymiamatis, manne, sing. vnc. vi. cerussæ vnc.
iij. olei hemine dimidium: aceti heminas iij.

Aliud euzemon Iuliani.

Argenti spumæ, bituminis, ceræ, picis brutiæ,
singul. drach. a. resinz frictæ drach. xv. aris squa-
mæ drach. xij. thuria drach. xij. chalbani drach.
viij. chalcindia drach. iij. aloes drach. vi. gallæ
drach. iij. myrrhæ tantundem aristolochiæ lon-
gæ drach. vi. aristolochiæ rot. drach. iij. olei uete-
ris heminas iij.

*Euzemon Iuliani
mi.*

Nigrum euzemon ab Hera conscriptum.

Ceræ, picis, bituminis, pitying, sing. lib. ij. man-
næ vnc. vi. cerussæ vnc. iij. chalcianthi tantundem:
opoponacia vnc. ij. olei semiminam: aceti heminas
duas. Conficito ut decet. Valer ad diuisiones no-
tatu dignas, maximè capitis: ad fistulas, sinus, fra-
cturaa. Cohibet mirificè sanguinem crumpen-
tem. Canum hominumq; moribus auxiliatur: ac
prorsua phlegmonem arceat.

*Euzemon nigrū
ab Hera.*

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secun- dum genera, lib. sextius.

Q Vandoquidem quæ putrescūt omnia, ex h-
miditate & calore id patiuntur: certè in uul-
neribus obnoxia putredini, curationē per
siccantia & refrigerantia molindam esse, semper
mecum existimaui. Rursum apud me contemplat-
us, frigidum neruis ab Hippocrate inimicum di-
ci: opimum fore medicamen ueruorum uulne-
ribus intellexi, quod & sicceret, & medium esset
inter ea quæ calfaciūt & refrigerant: uel quod pa-
rum ad calfacientium latus ab ipso medio recede-
ret. Possē etiam calidum abunde esse pharmacum,
modò siccandi fa culrate polleret. Quippe calor ci-
tra humiditatem humescere nō potest. Cæterum
ubi nudatis neruis medemur, tunc prædictam au-
xiliorum integram indicationem assumi ratio est.
Vbi uerò punctus, ita ut partes interiacentes sint

*Putrescentiæ ca-
ratis per qua fa-
ci debet medi-
camentum.*

*Nudatis neruis
quasi medendi
rationem requi-
rant.
Puncti neruis
qualis medica-
mentum possint.*

sanæ, tenuius pharmacum inueniendum est, cuius uires interiacentes particulas permeando non dissoluatur, sed in altum penetret. Hoc autem facere poterit pharmacum uelementer exsiccatum. Quod quidem, etiam si non sit in calore & frigore symmetrum, offendere neruum læsum non poterit: quum facultas calfacendi aut refrigerandi (quæ illi inest) admodum imbecillior reddatur, dum particulas neruosi corpori præpositas permeat. Porro uiter omnia quæ refrigerandi uim habent, tenuiorum partium acrum est quamacerimū: quod etiam caloris modici est particeps. Inter calfacientes autē liquores, qui partium tenuitate sint præditi, primæ tribuuntur partes Cyrenæo succo. Cæterum si eius facultas non detur, utemur Medico, uel sagapeno uocato, uel euphorbio. Panacis etiam, & nithmalorum liquores, & opobalsamū, tenuandi facultatem sortiantur. Ex terrestribus etiam nitrī spuma, aphronitrum, benoniceū nitrū, petra asia, elusiy hos, partium tenuitate insigniunt. Ex metallicis auripigmentū, & sulphur, si subtile, si calida sunt. Quibus succedit misy, æris squama, & chalcinis, parum simul astrigentia. Citra calorem uerd manifestū tenuis essentia metallica sunt, spodium, pompholyx, & storiolum. Subtile abunde est & chrysofolia. Ex succis, laurinus ualenter calfacit, ac præterea tenuandi uim possidet. Nilui autem minus eo cedrinus calfacit: calore tamen qui sensibus subijcitur, propter substantiæ tenuitatem, illi cedit. Eiusdem generis eum cedrinus est lixiuia, quam statē uocant. * Quæ quidem si ex tenuiorū partium materia uita sit, cedrinū oleum uirtute superat. Jam ex cercalibus, subtilissimus est erua, sine insigni calfacendi uisiolem uerd, cum insigni. Hordeum nequaquam calfacit. Mediam inter ea materiā obtinent, qualitatibus amara: ut quæ multum tenuibus substantia cedant, & crassi nihil possident. Igitur medicamentorum materiæ non semel aut bis, sed frequenter sunt explorandæ: quandoquidem sensibilibus rerū cognitio, inspectione sedula cōfirmatur. Cuius rei indicium euidentissimum est, quod gemelli per omnia similes esse nobis uisi, differētes apparere illis, qui non per transennā, atq; obiter, sed accuratē inspicere eos consueuerunt. Itaq; herbarum, fruticum, arborum uerū materiā, prius quā in terra eximantur, cōtemplari pulcherrimum est, dum fructus uidelicet futuri sunt, dum arduunt, dum augeant, dum uigent. Ex hac nanq; speculatione assequeris, quando exerpēdi sint, in sciclisq; domunculis reponendi. Etenim commodè reponuntur in locis nec subterraneis, nec sub tegulis constitutis sed medijs, atq; ostia ad meridie cōuersa habētibus prope quæ tamē reponi medicamēta non debent. Amicos aut omnes adhortor, si artis opera pulchre obire uoluerint, ut me imitentur, qui ex omni natione quorūnis præstantissima medicamenta ut mihi adferant euro, nō quod per diu illi omnigenarum rerum cōemptores, illa in dies adulterio cōbramant. Cōuenit præterea medicum, non modō affectiois, quam singula medicamenta inducunt, qualitatem, sed etiam ipsius (ut ita dixerim) quantitatem cōnecturæ. Quippe quod humore copioso est auctum, non simpliciter humectari potuit, sed opus est ut sic citatis quantitas, copię humiditatis respondeat.

Porro neruofarū partium doloribus à frigore obortis, uicē opitulatur emplastrum ex euphorbio, oleo, & liquata cera confectū: ad computrescentes autem circa articulos partes, confert cataplasma ex hordei farina & stillarino lixiuo paratum. Perfundendæ autē liberaliter partes circumiacentes sunt oleo calente postea uerō, ubi lana sicca, totus maior fuerit exhaustus, humido cerato, & cui euphorbio admistū sit, illinendæ. Porro secunda die, pro hordeacea farina, misce eruiū cōsueui: atq; ubi iam totū quod cōputruit exemptum sit, paulatim primō quidem ac carneminguētia, dein ad obducētia cicatricē trāsire. Quando aut mihi neruosi aliquis uulneratus occurrat, interim per liquida pharmacaurationē molior, interim per emplastrā iam extrinsecus quammolliūsimā, imbutamq; oleo calente, applicans. Quod si medicamentum ex acero uisum per, aceti modicum oleo admiscens, bis tēue quondē soluo, & oleo calente foueo. Si noctes longē fuerint, etiam in his soluere consueui: idiq; magis, dum ulcus à medicamentis eroditur. Oleum autem quo fouebimus, satis calens esto: uerdū ita, ut uulneratam partem offēdat. Nam ut frigidiū huiusmodi affēctibus aduerfissimum est, sic tepens non omnino utile. Nam quemadmodum aqua ipsa, quatenus calet, aut frigit, maximē contraria facere nata est, ita quoq; oleū. Frigidū siquidem corpori admodum, perspiratum ipsius obstruit, & prohibet: calidum uerū digerit, extenuat. Porro ab aque usu in tota curatione ita tēpero, ut ne attingat quidem ulcus. Proinde, quū sanguis in initio ita tū à uulnerata parte abstergendus est, ex oleo id facere expedit. Jam uerd acetum, si quando ipso ad affēctos neruos utamur, in se nihil uisiolem contineat. Oleum autem omni astrictione uacet, sitq; omni ex parte tenuissimum: quale Sabinum exstitit. Memini autē me, quum alia remedia desessent, neruorū uulnera propoli recenti curasse, in tertium etiam antiquiorū fermento: quæ ambo aliquando commiscui.

Verus etiam euphorbiū oleo læuigans, instatq; cataplasmatis adhibēs, aliā tendinem punctum sanauit: id quod, euphorbio recentī adhibito, nequaquam successisset, quum calorē magnum, moridicationemq; atq; dolorem excitet. Eorum tamē euphorbiū est, quæ calorem caducum, atq; statim euāescētem sortiantur. * Ceterum alijs multis pharmacis accidit, ut pauculis annis eorum uis resoluatur: id quod, post thapsiam, nullo minus euphorbio conningit. Quippe thapsia bimale expirat penitus, quæ euphorbiū uires ad sexum usq; annum seruari possint. Porro ubi pliat macū consistētia simile acōpiā dīctis unctiois habere uolueris, oleum sit quadruplum cerę. Vbi uerō emplastri speciem referat, parē cerę portionem oleo expedit temperare, maximē si sicca & læta fuerit: ac tum sanē ipsi cerę sic temperat, poteris sextam partem euphorbiū recentis adficere: ita ut illius sex drachmæ, cerę sex, atq; item olei sex misceantur. Licebit etiam resū aut piceis alijs quidē emplastro ipsi adficere, ut glutinosius enadat: tunc tamen minus, in fundendum est olei. Ac resinatū quidem omnium siccissimū est, quam alij phryctam, alij colophoniam appellant. Huic succedit quæ ex figulinis impura sumitur: quam si purges,

Aërii facultas.

Succorum calfacientium differentia.

Terrestria partium tenuitate prædita.

Sensibilibus rerum cognitio, inspectione sedula cōfirmatur.

Medicamenta reponendi ratio.

Galenus ex omni natione præstantissima medicamenta.

Neruosarū partium doloribus quid medeatur. Paragisticum circa articulos partium ceratū.

Nerui uulnera in curatio.

Tepidum oleum calis neruū non euāgnet.

Aqua rŕum uolneratū efficitur inuicissimū.

Euphorbiū ad paulos tradideris facere.

Euphorbiū nimis auarificere.

Thapsia bimale expirare potest.

Resinatum defecum.

purgis, in phryctem mutabitur. His ambabus sic erit, quæ dicitur ptynon phytema. Ego tamē ad rem propoliā phryctē utor, & liquidis. Harum rursus nonnullæ diutius liquidæ permanēt, quemadmodum tercinthina; alij citō inarescūt, ut strobilina: media utriusq; est abietina. Quin eris facillatē calidior est quidem strobilina, mox uerō abietina, deinde tercinthina. Poteria autem medicamē quod euphorbia receperit, experiri in tuo crure, uel brachio: atq; ita ex affectu quem inferet, aut remittere ipsum, aut eius vires intendere: remittere quidē, mistura cerati intendere uerō, appposito euphorbio. Quod si propolim pinguem habueris, eam omnibus resinis aptiorem fore tibi intelligito: ut quæ uaporem spiritus crassitiei, humoreis superfluos eliciendi, atq; ex alto foras extrahendi, natura uim habeat: quæ facultas ueteri etiam fermētō inest. Iam uerō ad uulneratos nervos, nonnunquā sum usus sulfure uiuo, sicuti & arsenico, & sandaracha, & calce tum uiua, tum extincta, lotaq; illorū singulis nimirum horū per se cum tetrapharmaco temperatis. Porro Empirici ex casu unum aliquod simplex medicamentum uile ad proposita inueniunt: at rationalis methodus plurimā simul inuenit, & uarias ipsorum compositiones. Etenim quæ ex alto humores educere, digerereq; possunt, nervorū uulneribus sunt ex usu. Quandoquidem uerō uou- nulla horum qualitates habēt immoderatas, alia eis immiscenda sunt, quæ ipsorū excessus, illa exa- cultare, retundant. At resitē hoc fieri nequit, uisi cuiusque medicamenti non modō qualitas ge- nus, sed ipsius etiā qualitas gradum, quantita- tēque cognoscas. Quocirca Empirici, quod igno- rant naturam simplicia, homogenia tantū, at- que similia commiscunt: quemadmodum alij ple- riq; quod excessus quantitate nō assequantur. In uniuersam autē, pharmaca liquidiora minus molesta sunt, cū alijs, tum uel maximē neruo- sū uulneribus. Cavendum tamen perpetuū est, ne aquis lesa particula respiciatur. Verū qui pul- cū uulneris uulneribus prospēctus est, etiā particularum naturā scit peritus oportet. Est autem curatio communis, sicuti & periculum par- tum in contusis ac uulneratis nervis, tum in sic affectis tendonibus. Poerō in uulneribus iuxta se moris longitudinem factis, deligatura uulnerati musculi parnibus inuicē cōtrahendis sufficit. Per transuersam uulneri accepto, nihil deligatura cō- tulerit, sed sola sutura totū opus absoluit. Hæc igit nifi quis altas faciat, musculi partes permanebunt inglutinatæ. Confundendæ etiā sunt membranz ipse cum musculis quibus cohærent. At tendines, membranarum instar extensos, & dilatatos, non mediocri cum periculo confuses. Ligamenta autem quomodocūq; afficiantur, ab omni sunt re- mora periculo: uopore insensibilia existentia, & ex ossibus, non ex musculis, ut tendines, orta: neque ex cerebro aut spinali medulla, ut nervi. Igitur me- dicinæ partes mutuam opem requirunt, tum quæ manu, tum quæ medicamentis, tum quæ uictu me- detur: maximē illa quæ manu curat, reliquis dua- bus indiget. Porro punctiōnes nervorum angu- stam cūis diuisionem habentes, non eodem cu- rantur medicamento, quod nudato neruo auxi- liatur: sicuti neque id quod puncturis medetur,

neruo nudo est ex usu. Quippe multo calidius est magis morder, quā uel nudas nervus ipsum perferre possit. Præcipue autem danda opera est, ut oræ angustiorum punctuum apertæ sint, quod calidum medicamen ad motum extrinsecus, per eas uapores eliciat, attrahens humiditatem circa affectum locum intus delatentem. Quamobrem orificium duabus in cure sectionibus ad rectos angulos diuidere oportet.

Punctiōnes autem oræ quomodo dilatanda.

Confectiones medicamentorum ad neruorum uulnera.

Ex metallicis astringentia uiranda sunt, præsertim ubi nervi sunt puncti. Detergentia autem conserunt: quæ tamen sub stituo sole, ex acerrimo, uel tussissimo, substantiis tenuissimæ aceto leuigata oportet, quod felicius crassitudo partium, qua omnia metallica prædita sunt, auferatur. Quāto autem longiori tempore attrita fuerint, hoc re- uuior et consequenter substantia: erunt: igit aptio- ra angustis uulneribus: quemadmodum uel nerui carne nudatis, admodum tenuia, exedentia quæ cadē sunt: quibus sanē passilli Andronis, Polydæ, & Passionis congruunt, ex sapa, quam Sirum uocit, appliciti. Ad punctos autem nervos equidem cōpositis medicamentis omnibus illud præstantius semper esse usu ipso comperi, cui copiosa æris ignam inest: deinde chalcitis cōbusta, postea misy. Porro ubi nervus qui nudus erat, ab impos- to medicamento iam rectus fuerit linamentis extrinsecus, unū aliquod ex ijs quæ ad angustia conueniunt uulnera, superponendū est: aliud ei- dem materię toti affectæ particule circumdandū, ita ut sanas quoque partes, præsertim superpositas, plurimum comprehendat. Quum autem permagna differentia humanorum corpo- rum sit, ob id ijs unicum medicamentum omnibus cōuenire nō possit, duo semper in promptu habe- to: alterum nempe ualentius, sed ex similibus ge- nere cōfectū: alterum mitius & blandius: quæ inuicem temperans, dum postulat usus, pro u- rierate mittitur, permulta alia media inter ipsa con- stituit. Est igit ualentissimum metallicum tale: Chalcitis erudæ partē i. misyos crudi partes ii. squamæ partes tres. Præterea ceræ in ualentissimo duplum: * in mitissimo duplum, atq; ipsius dupli di- midium misceretur: at in medio, duplum, ac ipsius dupli quartā partem miscere oportet. Quum igit ualidissimum ex sex partibus constet, duode- cim illi ceræ partes miscēbū. Imbecillimum au- tem, quandoquidē ex senis etiam constabat, octo decim (quod duplum, ac dupli dimidium est) reci- pier. Medicocri uerō dimidiū harum partium om- nium indei. Atqui octodecim & duodecim triginta partes constituit: cuius numeri dimidium con- tinet quindecim partes. Tot igitur medicocri me- dicamento adijciuntur ceræ portiones (id quod erat duplum, & dupli paes quarta) siue ex drach- mæ sint, siue uncie, siue etiam libræ. Porro men- sura quæ Romani meriuntur oleum, est cornes, discretisq; circularib. lineis, totam ipsā diuide- ribus in duodecim partes. Arque integra quidem mensura ab eia appellatur libra: ut eius duodeci-

Nervi uulnera tū qualis medi- camentis cōgruant.

Medicamenta duo, cū ijs qui deo generi, sed facitatis differe- rentia, ad uulneratos nervos cur in promptu haberi semper oporteat.

Propolis uires.

Fermentum facillat.

Nervi uulnera tū qualis medi- camentis cōgruant.

Empirici ex sim- plicibus tantū me- dicamenta con- miscunt.

Aquam nerui lesi esse inuicem.

Tendinum atq; nervorum affi- ctio aq; per- culsio affici- dentis, modis rariore de- sidera- rare. Remota uulnera glutinanda ra- tio.

Tendines non abiq; periculo confuses. Ligamentorum affictio cur per- culsio ualeat.

Medicina par- tes mutam opem requirunt. Punctiōnes neruorum angustas non ipsa me- dicamentis curan- tur, quibus nerui nudati.

60

ma portio, uncia. Iam uero de prædictis pharmacis omnibus, iuxta ceræ portionē, addatur oleū effentius tenuioris, minimèq; astringens, quod quidem ceram ipsam dimidio superet: ita ut octo illius uncij, duodecim olei miscantur. Quinetiam ubi metallica pluribus diebus in mortario trita ex aceto fuerint, commodè illis trita candidissimum atq; pingue miscetur. Cuius quantitas medicamenti portioni fit par: quam licet ibi augere aut minuire, prout uolueris efficere medicamentum minus, aut acius. Ceræ etiam oleo liquare, poteris aliqua refina ex prædictis inficere: sciens acius futurū pharmacū, strobilina iniecta: mitius, terebinthina: mediū utriusq; abietina. Ex harum genere quoq; et larix, ceterūq; prædictæ humidior, liquidæ: picæ subitanea similis. Mischebis igitur ceræ, sextam unius dictarum resinarum partem, si uis ut medicamentum emplastrum formam retineat. Chalbani uero æquali ruri poudus iudes, ubi minimū reddere itarus: dum ualennus, dimidium: quando o ipsorum medium, id quod inter quale & dimidiū est. Inest porro chalbano, ut emollientibus omnibus, etiā putrificū quidāque nudaria neruis non usque adeo conuenit. At si nudus neruus nō sit, haud mediocriter permissio ipsius ad dolorem leniendū confert. Omnia quippe metallica exasperant, dolor emig exoritur: ut ex humidis etiam, acetum. Quare dolori ab his excitato, plurimum auxiliatur torus ex oleo & chalbano mista administretur. Nihil autem minus chalbano dolori lenit adeps tenuiter subintrix præditus: quā si feris, & agrestibus animalibus sumitur. Nam animalium quæ conclusa in urbibus degunt, adeps est & humidior, & crassior. Ex his igitur quæ leniant dolorem, habere aliquod medicamentū expedit, quod ex metallicis composito possit interdum miscere.

De medicamentis ex euphorbio confectis.

Verus euphorbii recētiū longè est inferius. Si igit anniculus sit, etiā Cyreno succo, quē nunc habemus, & cuius irrigacione stupes augēt, & succu lētas reddūt, magis ex calcificat. Porro colore quidē uetus recētū flauidius pallidiusq; apparet: substantia, duriora & sicciū. Conficit aut ex recētū euphorbio calcificatū medicamentū in hūc modū. Euphorbiū vuc. i. ceræ vnc. iij. olei vnc. xij. quo smegmate intrepidè uti ad puncturas poteris, dum ueteris ne oscula ipsa * conueniant. Quod si imbecillius fuerit euphorbium ipsum, augenda eius mensura est, pro imbecillitatis ratione. Ceterum confectura ceram euphorbiū triplicatam continens, aliarum est ualentissima, quam illud recens miscetur: quincuplam autem recipiens, inualidissima. At quadruplū capiens, medio inter utraq; gradu cōsistit. Quod si unguenta propopas facere, qualia summa nuncupantur, oleum ceræ quadruplum immiscibus: si uero, ut in fracturis, liquidum ceratū parare, duplū. At emplastrum medicamentum cupiens conficere, oleum pari mensura ceræ immisceatur, si quidem ambiens fuerit calore temperatus. Sin autem ille frigidus sit, cerā autem uetus & arida, paulo ampliori misceri debet. Ut autem tenacius hæreat, terebinthinam, aut colophoniam, quo oleo emplastro adncere. Pix etiam, ceram consistentiam tuetur. Multo autem præsterit medicamentum, si resina, pictisq; loco, propolim ceræ

parem adiunxeris. Quæ si pinguitudine careat, cum pinusq; ut adhiereat pharmacū, terebinthinam, uel laricem, uel syncomitem pineam, uel resinas suas sponte fluentes, miscebis.

Medicamentum confectum ex liquabilibus.

Ex aceto citra ignē liquefit ammoniacū rhy-miama, sagapenum, & opopanax. Igni uero soluantur, propolis, cera, resina, & consimilia, quæ in duplici uase liquare est melius: nempe quum in cacabo aquam calidam continente, incumbenteq; prunis, alterum uas consistit, præter liquabilia etiam chalbani contiū. Valentissimū igitur ad uulnera neruos medicamentum sit huiusmodi. Opopanax ex aceto dissolutum diutius conteritur. Postea liquefacta illi super igne, propolim, ehalbanum, & resinam terebinthinam misceto. Singulorū itaq; aliorum pars una esto, propoleos recentis pinguisq; sex. Quæ si careas, eius loco picem pingue inde, qualis est brutia. Quod si lixæ non adsit, utriusq; terebinthina. Ego nō nunquam uel solum medicamentum ex pingui pice cōfectum imposui, quo etiam ad canum morsus uniuir. Id autem recipit, picis lib. i. opopanax vnc. iij. aceti, in quo illa coquantur, sextariū Romanum. Etenim puncturæ oras cōnuere non sinir. Sic tamē cōposito, in duris tantū uteremur corporib; . Nā in mollioribus, ex aliquo molliori, sed digerente, unguento uel oleo liquandū est. Quod si loco opopanax, sagapeno prius in pila trito ex aceto, liquefacta resina, propolim, & adipem quandam acriorem adicias, eiusdē generis medicamen habebis. Mollius tamē est quod ex resinis, propoli, seuis, ac cera colligatur, absq; aceto, conficitur. Ceterum quod indetur seum, sit ac: quia le est quod ab agrestibus animalibus sumit, quodq; neruū exstirpat. Porro ex medullis, ceruina, uirga linaiq; antecellunt.

De pharmaco ex columbarum stercore confecto.

Columbarum turricolarū stercur aere est: quo tuterim ruri sum usum in adolefcere, ne ui uulnerē affecto. Cuius sanē tum compositio, tum usus, idē est: qui medicamentum ex euphorbio inest: alijs quidem cōtrem modo se habentibus, sed euphorbiū loco, stercore indito.

De medicamento ex herba confecto.

Ex herbis etiam tenuium partium, amaritudinem absq; astrictione, aut acorem modicum, referentibus gustu, haud in idoneum ad uulneratos neruos confici medicamentū potest. Tales enim sunt dictamnium, amaracum, aristolochia, polium, argemone, chamæpitys, centaureum, atq; id genus alie: quemadmodum etiam radices omniū aristolochiarū, dracunculæ, cucumeris agrestis, bryoniae, altheæ, iridis, acori, mæri, asari, plu. gentianæ, & panacis: quæ omnes, perinde ut collyria arida, læuigari in tenuissimum pollinem debent. Nam quod erassa est substantia, neruis uulneratis conducit nihil. Læuigatum autem medicamentum, alio quod cerati modū habeat, est excipidum: idq; ex tēperatura, quæ in euphorbio prius indicata est. De sumptiosis pharmacorū compositionibus, uulneratis neruis conueniunt.

Sia autem qui odoratis & preciosis oblectant medicamentia, in hunc modum illa soleo conficere. Cinnamomi, dictamni, mari, singulorum drach.

Resinarum def-

formata.

Emollientibus
omnibus infestis
paraffin quæ
Chalbani par-
tis neruis cōdi-
cat.

Metallica om-
nia dolorem ex-
citant.

Adeps tenuis-
simus, lenit
dolorem.

Euphorbium ex
tuo reserui et
si inferius.

Medicamentum ex
euphorbio ad
memorosum par-
tium com-
munem.

Medicamentum
varius confectis
nunc parandum
ita.

Liquandū medi-
camentum in do-
pulo rasiato.

Medicamentum ex
pice, uel ad can-
um rabidi mor-
sus.

Medicamentum ex
columbarum ster-
core.

Medicamentum ex
herba confecto.

Medicamentum
sumptuosum vul-
neratis neruis cō-
ueniens.

drach. xl. amaraci pauxillum. Hæc reducta in tenuissimū pollinem, cum cerato ex opobalsamo primo, & cera Tyrrhenica facta, confundunt. Debent autem ceræ partes octo, opobalsami decem, in id ceratū coire. Addeio etiam partem unā terebinthinae odoratæ, ut medicamentum non sit friabile, sed sibi mutuo cohereret. Sed ex eodē cerato, & li quore Cyrenaico, similiter aliud medicamentū compono, mixtura pro portione euphorbio fastiditertiumq; aliud ex utriusq; temperatis constat: quarum deinde, quod in se myrrisali statim recipit. In quibus autem neruus est nudus, ibi ceratū ex cera quæ vocatur myrrispe, & unguentis apud Romanos foliatis & spicatis dictis, compono, duodecimam partem pompholygis ei admiscens. Licet autem ex Tyrrhenica cera id conficere: quā si lam nihil etiam prohibet ex nardo optima liquefacere, idipsum duplici usque quod in omnibus unguentis sit cōmune præceptum. At raso cerato, spicæ uardi, amomi, folij malabathri, & eloræ pompholygis, partes singulorum portiones miscibus. Etenim in puncturis, acriora pharsma ex usu sunt, quæ uulnus apertū consueverunt. Denudatis autem, mediocri astrictione, cum digerendi uirtute abig morfu, prædita offerre conuenit. At amomum, astrictionis cuiusdam est particeps. Magis autem ipso nardi spica, & malabathri solum.

Quæ alij scripserint ad sananda neruorum uulnera.

Quidam nostræ ætatis Medicus utebatur medicamentum, similiter meis confecto, ex metallicis. Recipiebat enim ceræ vnc. vi. olei vnc. ix. masyos drach. vi. chalcitidis drach. i. squamæ æris vnc. ij. s. thuris vnc. i. s. chalbanij vnc. i. Cera & chalbanū liquata, metallicis æro intritis superfunduntur. Porro si neruorum uulnera non comiterit phlegmone, molliora humidioraq; sitim ad principio inur priora medicamentis durius, ac sciccioribus: præstatū liquata ipsa in digerente quopiā, uel mitigatorio medicamine admittitur. Voco digerentia quidem, uetus oleum, & ricinum, & scycyonium: mitigatoria autem, rosaceum, clusam melinū, & quod ex albis conficitur. His fortiora, eoq; durius corporibus magis idonea sunt, quod ex cucumeris agrestis radice oleo decocta exprimitur: & quod ex iride, bryonia, & aro paratur. His ualentius est, ex dracuculo, aristolochia, & panace factū. Non frequenter usū oleo sumus ex abietis femine, populij flore confecto.

Clusidij Philoxeni Aegyptia, neruorum uulnera, alijsq; congruentis affectibus.

Argentij spumæ, ceræ, sing. drach. lx. ammoniaci thibermatis drach. lxxx. propoleos drach. xl. effusæ sicce, terebinthinae, squamæ æris, thuris, sing. drach. xvij. lanæ succidæ exusti, squamæ sto momaris, sing. drach. viij. opopanax drach. iij. ricini heminas tres. Conuicio artificioso.

Fulcum Andromachi, contra puncturas.

Ammoniaci, ceræ, terebinthinae, æris combusti, sing. drach. viij. picis aridæ drach. xl. lithargyri drach. liq. aloes Indicæ, aristolochiæ, chalbanij, sing. drach. ij. eruginis drach. i. thuris drach. ij. olei hyme quarant liemini partem, xstare oclauam: aceti tres cyrhoris, quibus ammoniacum dissoluatur. Con-

ficito.

GALENI PERGAMENI DE

composicione medicamentorum secundum genera, lib. IIII.

Quandoquidem ex dysepuloticis quidam, sanies humorumq; ulceratis partibus influentium uirio, ægre cicatricem admittunt: quædam ipsa affecta sede influentem succum quamlibet probum corrumpente, secunda ratione ulceris dysepulotici & cœthæ propriè nominant: in quibus interim totam partem affectam excindere, uel adurere nonnulli coguntur, sui medicamentis eructant inducentibus, sui igne utentes.

Quum autem ampla utrinque latitudo sit, in eo quod sterum altero magis dysepuloticum malignumq; est, tot sanè desideratur auxiliorum plures maca, quot fuerint ipsorum ulcerum differentie. Quare duo ut minimum, quæ idem pollicentur, eandemq; facultatem offendant, differant tamen maximi minimiq; ratione, in promptu adesse illi conuenit, qui omnia id genus ulcera constituerit curare. Cæterum ubi nullus ulterius succus ulceratas partes infestat, tale requiritur pharmacū, quod influentē quidem humorē repellat, infusum aut parti, discutiat. Atq; hæc sanè uires contrarie præstant. Siquidem influxu reprimunt astringentia: impacta digerūt, quæ trahendi potestate sunt prædita. Porro quæ astringūt, maiori ex parte exa ipsè, atq; hac occasione molesta sunt. Trahentia uerò & c digerentia ex alio humores, nō citra acrimoniā id faciunt. Ac acrimoniam dolor aliquis necessarius sequitur, mordens ulceratis particulam: unde influentes humores irritati cōngit, ac proinde in ulcere phlegmonem exciunt. Ex quibus liquet, medicamentā dysepuloticis malignisq; ulceribus cōgrua, esse quamdifficillima inuenta.

Inuenienda tamen aliquis eorum materia est, quæ ulcus citra dolorem siccescat: quod accuratè fieri nulla ratione licet, ignorante medico, quem effectum admodum medicamen offendit. Quippe ex erodente simul & astringente, ualidū conficitur pharmacum. Cæterum sordes humoris ulceri incumbens, pharmaci rosonem exoluunt. Itaq; perpendendum est, quantū primus usus humiditatis ac sordium in ulcere deficiat ueris: atque ira secundū, tertiumq; uti illo debemus, donec siccum & purum ulcus ipsum appareat. Vbi uerò id tale contempserit, ad aliud medicamentū te conferes, eiusdem quidem speciei, sed priore imbecillius. Scire autem oportet, medicamenta ipsa non alia ratione mederi ulceribus, quā quod in exulcerata particula eam siccitatem inducant, quam fortioribet quum se haberet secundum naturam: id quod factum intelligimus, ubi ne penitus amplius sanies influit, nec pus produciatur. Reuocanda igitur ad memoriam sunt ea quæ citra morbum exciunt, cuiusmodi complura metallica existunt.

Meminissem etiam oportet, combusta, & lota, acrimoniā, quā prius habebant, amittere: ac proinde ipsi utendum esse, in ijs qui molli carne sunt præditi, admodumq; ad sentiendū prompti, necnon eacochymi. Nam in alijs corporibus illa etiam usurpata licet. Siccat igitur modicè, Lemnis sphragis, cadmijs, præsertim quæ sponte nascitur: quam sub æstiuo sole pluribus diebus ex aceto, aut uino giūo pellucidoq; interfrā, exciunt

Dysepuloticū differentia.

Vulnibus tot de siderum pharmaca, quot ipsorum sunt differentia.

Vlceratorem partium, quatenus in ipsi non infuset, ut singulis faciat, ratio.

Dysepuloticis congruentia medicamenta, ut sunt difficillima inuenta.

Vlceribus quæ ratione medicata morata mediantur.

Vsa & lata medicamenta acrimoniā quam prius habebant amittere, & ubi ipsi uiculi esse in mollioribus & eacochymi corporibus.

*Chalcitis cru-
das excitat.*

Chalcanthum.

Diphyryen.

*Alumine sile-
ceus nō sit ad vi-
cera utendum.*

*Siccantia citra
resinā qua sine*

*Siccantia simul
et astringentia.*

*Vicribus cito-
maribus adole-
scit tum elusa,
tum acuta.*

*Vlcra quomo-
do sine traic-
da.*

torem reddo. Chalcitis combusta, quam cadmia, ualentius siccant. Per se autem, nec combusta, si admixtetur, crustas excitat. Lotum igitur ipsam, deinde siccant habere et satius. Minus enim lota quam combusta defecant, tum longe minor est, minusq; mordax. Per simile luti medicamentum est etiam xerugo combusta. Nam quæ ignem non est experta, fortissimū medicamentū est, sicut chalcitis. Verum hæc nonnihil etiam astringit, & ea multo magis chalcanthum, quod inter metallica maxime ficit. Misy autē & fori chalcitidi sunt cognata: tenuius tamen misy apparet, minusq; mordax & urens: crassius fori, & utriusq; siccant imbecillius: quemadmodum & stimmi maiorem astringendi, siccandi uim, ac fori, possidet. Porro diphyryes ulceribus ægræ humoris uitio ad cicatricem uenientibus, apertissimū medicamen exsistit: ualidè namq; siccant, et si fori mordax modicè. Ad hæc, præter acrem tum qualitiuam, tum potentiā, uim astringentioris possidet. Iam omnes differentię alumina, ulcera satis excicant, generosè astringentes: quare uero solis ipsi ad ulcera utuntur. Igitur quæ plethora, uino olisq; succo laborat corpora, quæq; tenera carne prædita, & ad sentiendum maxime prompta sunt, facili ex morbo, rosioneq; phlegmonem cōtrahunt: quare minora medicamenta considerant: cuiusmodi sunt, sarcocolla, chelthyocola, chrysolcola, plumbum uinum, fori, stimmiq; similiter etiam combusta. Insuper plumbi scorïa, probè siccant: quemadmodum ferri squama, quæ etiam abstergit, purgat: unde puria ulcera reddidit, quod reliquæ squamæ non possunt. Quare si hæc omnia medicamēta arida ulceribus malignis contumacibusq; insperferit, mirifice uidebis citra rosionem ea defecari: sicuti ubi buccinorum testas cōcremasas, purpurarum, ostrorum, aliorumq; id genus similitur adhibueris. Lapis etiam diaphaneus, siue specularius dictus, leniter & sine morbo excicat. Eiusdem facultatis est uitrum utrum. Quin etiam Aegyptiæ spinæ fructus, galla immatura, rheon, malcorium, siccant & astringendi facultatem fortificant. Aristolochia etiam, iris, acorum, artemisia, panacis radix, argemone, chamaeleontis uigri radix, cyperus, dracunculus, & gladiolus, asfarum ficcant. His euidentius adliuc centaurium & polium: quibus paulo imbecillior est terra eretria dicta: uiri ualentior, uocata ampelitis. Porro xerugo ignem non experta, calx uis & illora, & molle apirionitrum (quod reuera apirionitrum est) solis per se non admoventur ulceribus. Nihil autem nobis in prædictis ulceribus tam uitandū est, quam tum oleosa & mollia medicamenta, cuiusmodi sunt omnes adipēs, & quæ scirrhus emolliunt: tum acuta, ut piper, zingiber, sinapi, & alia id genus.

Medicamentis prædictis quomodo sit utendum.

Vbi igitur siccum aliquod pharmasum ulceri imponere est animus, sordes prius sunt exprimendæ, molli, puro, atq; sicco lintelo. Medicamentum iam indito, plastyia em emplastro labris atrenuandis cōmodo, extrinsecus superdandum est. Huic rursus linamentum undiq; æquale foris injciendum: cui spongiam ex aqua aut uino tintam applicabimus: quæ ut frigida maneat perpetuo, per assiduum frigida forum curabimus. Porro

deligatura ipsa in ulcere inchoanda est, atque tunc ducenda uersus partes superius: quam tertio quoq; die, non in finguis, soluite expedit. Tunc autem si ambientes ulcus partes aliquid phlegmones referant, meo Phœnicino emplastro liquato ex oleo, cui plurimum uini astringentis permixtum sit, exterius plastyimatis partes quatuor imbuere expedit. Verum non ex obuiō quouis oleo phlegmaticū liquare oportet. Sed si rubor quidem, argo omnino caliditas dominetur in adiacentibus ulceri partibus, ex aliquo astringentū atq; refrigerantium id solues: cuiusmodi sunt myrted, melinum, & omphacinū. Sin durities aliqua conspiciatur, oleo ueteri, uel riciniū liquandum est. Tutius autem fuerit, uel si nihil in ambiente ulcus loco uinofi appareat, superpositæ regioni ipsius medicamen apponere, ut repellat si quid prius uel prauū, uel plus quam par est, insit: uel maxime quod trure ulcus obortum, superpositam habet uariem. Quæ dum sanguine melancholico turget, excidenda uenit: quibus iuxta excisionem ipsius, ulcus malignū & contumax interdū oriri solet. Igitur in id genus uitis præstat, uiribus ægri cōiunctis, si sectione uenæ auspicari: idem phar maco purgare melancholicum succum, similitur etiam pituitosum uacuum: quoniam si quoq; interdū unā cum melancholico insit, dum uirices gignuntur. Postea uenam ulceri suppositam in longam scarificari cōmodum est. Vbi abundè uacuasit, ei ipsi uenæ sectæ prius medendum. Postquam exsiccata iam cicatrix uidetur recipere, tunc aggredere maligni ulceris curationem. Iam uero licet nonnunq; malè affectus, uisiois talis humoris est autor: sicuti & lecur: quibus ubi in primis consultum fuerit, sic tandem accedere ad curandum ulcus oportet. Pari modo si uniuersum corpus plethoricū, cacochymumue existat, id prius uacuare, expurgareq; expedit, quam ulceri medicamentum admooueas. Cui quidem dum mederis, si ualentioribus absterforis pharmacis ad mitiora, lenioraq; digredere, si ulcus adamusissimè est purum uidetur: quemadmodum in sordidus ad magis abstergentia transire cōuenit, nisi ex rosione medicamenti sint facta sordida. Sæpe siquidem ab acri medicamento colluxa & soluta caro, in uinosam saniem degenerat. Cæterum cauitas ulceris maior, oreq; rubentior, & calidior efficitur ceruuntur, quom ob medicamenti acrimoniā ipsæ sordes accrescunt.

Compositio emplastrorum.

Quandoquidem malignorū & difficulter admittentium curanonē ulcerum, summus scopus est, ut medicamentum citra morbum excicet, aqua uerò & oleum maxime omnium humectant, ab eis abstinere oportet. At cetera deligenda est recens & pinguis: qua in sole emollita, aut apud ignem subacta, & in calidam aquam immersa, arida medicamenta prædicta excipimus. Mediocre autem medicamentum fiet, si quarta pars metallicorum ipsi ceræ adijciatur: ualentius autem si tertia. Et uim quā haud exiguo discrimine inuicē corpora differat, unum omnibus medicamentum rectè preparari non potest. Erat ergo temperari pharmaci cōpositio huiusmodi. Virisq; æ ruginis, xris combusti, sing. drach. j. aluminis sciss. drach. s. ceræ drach. x. Conficito. Minus autem mordabit, si loco aluminis integræ diphyrgis drachmam adijcias.

*Deligatura uer-
teris, qualis sit
adhibenda, &
quando soluen-
da.*

*Repellentia esse
applicanda ro-
gionē superposi-
ta uicem.*

*Variis quidē
excidenda sicut.*

*Vlcus cui uari-
tis mobilis, co-
tatio.*

*Sordes ab acri
medicamento ex-
citata, quomo-
do differenda
ab ei quæ ui-
ci propriæ ra-
tione producat.*

*Vlcus cito-
maribus, ut
alium ex aqua
adhibetur.*

*Vlcus cito-
maribus phar-
maceum tempo-
ratum desinhi-
tur.*

adificias. Quod si expurgat sordes confilium fit, sic conficiemus. Aeris, æruginis ultæ, diphrygiæ, sing. drach. i. æris squamæ drach. s. ceræ pinguis drach. x. Miscebo. Cæterum si cera ipsa sit ficcor, emollienda est aliquo astringente oleo, uel larice, uel terebinthina.

Ad chironia & difficilia ulcera medicamen ab Asclepiade proditum.

Aeris (squamæ vnc.). æruginis rase tantundem: ceræ felibræ: resine laricis vnc. s. Quæ liquari possunt, aridis affunduntur: quibus exceptis, ac curiose emollinis, utitor. Cæterum plarysma exiguum soli affectu parti, ut ulcus tantum comprehendat, imponitur. Ambientes autem particulas pharmaco quod phlegmonem arceat, circumdare oportet. Inter curandum tercio quoque die soluere, dein fomentis mitigare, ipsiusque emplastrum quod plarysma uocatur à latitudine, abluendo emollire, ac rursus imponere, donec cicatricem inducere incipiat. Ego certe Attico nonnunquam cæpo cerâ tem-

perant. Meminisse autem oportet, qualitates omnium uiciorum corporum, mutuo in se agere, etiam si alterum ipsorum multo ualidius sit. Unde processu temporis quodmodo euadunt similes. At ubi qualitas medicamentis curando corpori spe cie similis fuerit, maior utilitas sequitur. Porro diphryges, si uel solum inspergatur ulceribus quæ difficulter cicatricem admittunt, probè illis medetur: item & æs combustum. Aerugo autem exedit atque mordet insignitur. Itidè calx ignem non exper-
tâ, quâ insignitur mor dicit, exigua portione æris medicamentis à nonnullis miscetur. Exincta medice est pharmacum. Eloia prorsus lenè, & mor dicitatis experta.

Pharmacum ad mitiora ulcera à cicatrice inducenda, ab Andromacho scriptum.

Cadmio to fix lib. i. chalcididis ultæ tantundem: ceræ lib. iiii. resinæ aridæ lib. iiii. myrti lib. iiii. Vinum miscetur aridis. Quâ autem ad maligniora ulcera ualentioribus utendū remedijs sit, ut imbecillioribus ad medicorū aliud medicamentū subdam, quo utor ad dysepulotica. Aeruginis, & squamæ, sing. vnc. i. ceræ vnc. vii. miscantur. Si igitur causâ sit ulcus, in dno medicamento repleatur. Post hoc rursus aliud plarysma superaccommodabitur, quod & labra comprehendat. Huic deinde linteus frigida madens tantus undique obijciat, ut medicamentū occultet. Postremò sponsia mollis, fascia ex linteis excepta, uel semel, uel bis, affectam partem orbiculatim ambiens, rursus marginidinis, quò totum ulcus cum labris, ac superpositioribus ipsi aliquid, subiectioribus, cõplectatur.

Deligatio autem ipsa à duobus instans fiat. Vocant si quies tota pars media uinculi affecto loco incumbit: utrunque autem crus in oppositam regionē deducitur. Vbi lux primo die peregeris altero aquam frigidam per spongiam irriga-
to. Si ambiens aer calidus & ficcus fuerit, bis hoc tunc in dies singulis est faciendum, ac deligatur tercio quoque die soluenda per hyemem, quarto. Affectus autem ipse indicabit, num fortius, uel mollis, uel simile sit imponendum pharmacum. Emollies ipsum paululo myrtini, aut rosaci, aut melini, aut lentiscini, aut malthicini, aut cyprini instillato. Validius reddes, aliquid squamæ, aut æruginis addens.

Aliud ad obducenda dysepulotica aptissimum.

Chrysocolle, squamæ, sing. drach. ii. ceræ drach. vi. diphrygiæ drach. ii. lithargyri drach. vii. Confundito. Aduertendum autem est, mitia pharmaca mihi dici sarcocollam, chalcidionem ultam, æs, æruginemque combustam, atque chalcanthon: quæ ignem non experta, acris omnia sunt: combusta, moderata: lota post combustionem, lenia, rosinis expertia.

Mitia medica mitia que sunt

Aliud mitissimum.

Eloii plumbi drach. ii. spodii, cadmiæ, diphrygiæ, sing. drach. iiii. terebinthine qua excipiuntur drach. vi. Zeno addit chalcabni drach. s. Etenim si atus est modica portione miseri pharmacum id genus, quâ nimirum cõfectum sibi saxeam duritiem cõtrahant. Porro in hisce omnibus, illa quæ liquari possunt, liquefacta & refrigerata, abraſis, ficcâ diligenter redactis in pollinè, admisceo. Nam si liquida ipsi affundas, in grumos concreſcent, maxime ubi inualuerit frigus. In sole autē feruenti si mixtura fiat, licet ea superfundere, mouendo rudicula primum, dein cochleario: præstat tamen ad omnia hæc, amicusulus palmæ.

Aliud ad desperata ulcera ex collectaneis Primionis.

Sorores drach. xxiij. alum. nis scissilla, malicorh, calcis uiuæ, sing. drach. xvi. thuris drach. xxxij. gallæ omphacitidis tantundem: ceræ drach. cxx. leui uitulini (aut eius loco, adipis porcini & uetuli) drach. lx. olei ueteris heminam. Conficito. Porro fori, alumen, malicorh, galla, non digerendi facultate, sed astringendi eximia, sunt prædita. Etenim sub astringentiū genere cõtinentur auſtera & acerbæ: sed illa quidē astringunt medio criter, hæc aut, hoc est, acerbæ, uehementer. Omnia igitur astringentia cõtrahunt, ac densant meatus, uincuntque & cõtinent parti sibi coherentium substantiâ: quo fit ut alius ipsorū uirtus penetrare non possit, nisi si ab alijs acribus, atque subtiliū partium ducantur: id quod ipsi calx in præscripto medicamentū præstat. At uerò duritiam ulcerū labris multò utilius medulla ceruina adhibetur: quæ si non adfit, uitulista. Porro inueteratū oleum ab adipe suillo (quæ oleo cõmuni liquatum inſtitiores pro oleo utuntur) ex odore & consistētia discernes. Vtrunque tamē inueteratū, roſionem quandâ acquirat: quo nomine ad ulcera præter modum maligna conueniunt. Talia enim appello, in quibus aut pars affecta tam uitioſo habitu est prædita, ut uel optimi sanguinè, qui nutritionis gratia conſtitit, corruptum pat: aut id quod inſiuit, adeo peruersum exiſtit, ut etiam si pars rectè se habeat, ab ipſo ramē solo erodatur. Igitur ut citra a rationale methodi medicamentum componere, ita uiu illorū certò & accuratè cognoscere sine experientia nemo potest.

Astringens esse genus cõtinent auſtera & acerbæ. Astringentium facultas.

Vitæra malignæ naturæ que ſiut.

Epulotici Critoni ex Ladano

Pisic arida faciliat.

Vicioribus difficilibus, phar-macū Asclepiada.

Viciorum corporum qualitates in se agere mutuo.

Aeruginis faciliat. Calcei vires.

Vitæra maligna, ualentioribus quæ re medicamentis subdam, quo utor ad dysepulotica.

Deligatio erodentis partem cuius malitiosa sit.

Vitem canem et
puris, à quibus
facit medicam
mentum.

Metallica dis-
tincta culla, ma-
gis sicat. Et ma-
gis redant.

Medicam Cri-
tione ex chama-
leonte.

Lentissimè oleo
facit.

Subtiliora fieri
que laugitior
acetoque et vi-
no, magis oca-
strat obducere.

Archigenia ad
ulcera circumma-
cia remedia.

ferimus. Igitur cauum & purum ulcus, à medio-
eriter siccantibus medicamentis curatur: sordidum
verò & malignum, & oris duris & prætumi-
dis quidem, sed carne iuxta cutem fluida, ualidissi-
me siccantia requirit. Verum quæ metallica, ut sic-
cent sine ullo morbo, præparas, coquere diutius
oportet. Sic siquidem magis siccant, ac minus ero-
dunt. Porro ladanū ipsum solum ex uiso o trisū, ul-
ceribus ægrè ad cicatricem ueniensibus auxiliatur.

Medicam ex chamaeleonte à Critone deseri-
ptum, inducere cicatricem periculosis & callosis
ulceribus. Lithargyri drach. c. ceræ drach. s. æru-
ginis drach. xxiij. chamaeleontis drach. xij. olei
minam. Conficito. Ego tamen huiusmodi em-
plastris adhecere lentissimum cōsueui, quod emol-
liat nō uihū, digerat, & astringat: quæ omnia, diffi-
cilia ulcera cum labris induratis, desiderant.

Aliud Heracleidis Tarentini aduersus
ulcera uetera.

Squamæ drach. i. æruginis rase drach. iij. ex-
cipiantur drachmis octo myrtæ cerati. Misce. Est
nim metallicorū facultas à quouis cerato resoluū.

Aliud. Squamæ trix acetum affundito, eamq[ue]
sub Canculæ exortu læuigato usq[ue] ad erasitudi-
nem mellis: uel etiam incoquo. Postea exciccatæ,
redactæq[ue] in puluerem, cerati partes octo misce-
to. Valer aduersus recentia uulnera, & ulcera in-
ueterata. Licet ut etiam ad ignem excicare ipsam
squamam, si alio tempore medicamen id confi-
ciamus. Porro subtiliora sunt quæ ex aceto læui-
gantur: atq[ue] ob id melius purgant, attenuant, &
siccant. Verum ad cicatricem inducendam sunt ex
uino trita meliora.

Aliud Andromachi cicatricem ducens.
Oleum uisitorum drach. iij. mannæ drach. j. cad-
mix obolos. iij. tritis utitor.

Aliud eiusdem, quo malignis cica-
trix inducitur.

Piceæ corticis drach. vj. cornu ceruini usti drach.
iij. cadmix drach. xviij. mannæ drach. iij. ærugi-
nis rase drach. ij. siccis utitor.

Aliud ad excrescentia ulcera cicatricem
abscq[ue] morbo ducens.

Sandarachæ, chrysocolle, arsenici, singulorum
partibus æquis confusis, aridissq[ue] utitor.

Ad ulcera quibus callus obducitur non po-
test. Ex Archigene.

Cōmuni quodam oleo expurgatis, uetustissi-
mum cū linamentis imponit. Aerugo rase cerato
rosaceo, quod paulū refinæ habeat, excepta, im-
ponitur. Item squamæ æris rubri quamplurimū ce-
rato myrteo exceptum usurpatur.

Eiusdem ad putrida & nomas.

Sori crassiusculè tritum, inpersumq[ue], coudit-
cit. Vel aristolochis rotundam, & gallam, æquali
pondere ex oleo inungito. Vel cumeris agrestis
radicem cum folijs illigatam, calido cinere recon-
dito: quom autem emolliet, contriti imponito.

Eiusdem ad cancerosa.

Canceri fluminalis usti, & cadmix, pares portio-
nes tritas inpergit. Vel cinerem cancerorū cum
cerato imponito.

Eiusdem ad callosa.

Nitrum torrefactum & calcem uiuam cum lo-
tio pueri impubis læuigata circumlinito. Confe-
runt etiam caustica medicamenta,

Andræ emplastrū ab Asclepiade scriptum, om-
nem excrescentiam reprimens, atq[ue] arceus infla-
mationem. Argenti spumæ lib. iij. squamæ æris,
chalcididis, æruginis rase, sing. vnc. vi. aceti hemi-
namolei ueteris lib. viij. Misce.

Asteria medicam ad idem.

Lithargyri lib. i. olei ueteris lib. ij. s. æruginis,
chalcididis, squamæ rubræ, sing. vnc. i. aceti hemi-
nam. Conficito.

Iis emplastrum rufum, ad fluida, diu-
turna & maligna ulcera.

Argenti spumæ drach. c. minij sulphoric drach. iij. emplastrū.

vij. diaphrygis, ceræ, chalcididis combustæ, sing.
vnc. i. chalcididis crudæ drach. ij. olei heminas ij.
Conficito ut decet.

Aliud Scribonij Largi, ad eadē accommodatū.

Ceræ drach. c. lithargyri drach. l. olei myrtel
heminas j. misq[ue] combustis, chalcididis uisæ, alu-
minis siccis usti, cerussæ, resine terebinthinæ, sing.
drach. xij. Conficito.

Aliud ex chamaeleonte, ab Asclepiade scriptum
ad fluxionā & ægrè curabilia ulcera. Lithargyri
lib. l. olei ueteris lib. ij. chamaeleontis radicis trien-
tem: aristolochis rotundæ: chalbau vnc. ij. gal-
læ vnc. ij. rhuris tantundem. Conficito.

Aliud ab Asclepiade scriptum ad ulcera quæ
uix curationem recipiunt.

Squamæ æris, æruginis rase, sing. vnc. i. ceræ seli
bram, resinæ laticis vnc. s. Conficito.

Decleonis cephalicon ab Asclepiade scrip-
tū, à quo educunt ossa corrupta. Aeris squamæ, man-
næ thuris, resine sicce, sing. drach. c. aceti heminas
xij. Therio squamam ex aceto, & quam læuis facta
fuerit, thus in pollinē redactū adijcitur, resinaq[ue]:
atq[ue] pastillos fingito: quorum assiccorū iū um-
bra miscens partem unam cum cerati ex rosaceo
cōfecti pari portione, ipsa utitor.

Aliud Hygie-
ni scriptum ab Hera, utile ulceribus ægrè ad cica-
tricem ueniensibus, necnon paronychiæ. Lithar-
gyri chrysidis, ceræ, sing. minam j. chamaeleon-
tis nigri radicis drach. xxxvj. æruginis rase drach.
xviij. chrysocolle drach. xl. olei heminas ij. Confic-
cito ut decet. Aliud egyptium. Ceræ, picis, bitu-
minis, sing. lib. i. mannæ, æruginis, gallæ, spumæ æ-
gypticæ, irisidis Illyricæ, aristolochis rotundæ, chalcanti-
thi, singulorum vnc. iij. aristolochis longæ, æris
combusti, utriusq[ue] vnc. ij. Conficito.

Aliud. Bi-
ruminis, aluminis liquidis, sing. lib. i. picis, resine pi-
tyngis, ceræ, sing. lib. ij. mali teræ rotundi, gallæ, spi-
næ ægypticæ, sing. vnc. viij. malicorū, cris usti, man-
næ, mali teræ longi, sing. vnc. iij. olei ricini, aut
ueteris, lib. ij. Conficito pro dignitate. Aliud quo
utor in molli carne prædatis. Ceræ lib. i. rosacei ran-
dudæ, cerussæ vnc. viij. salis ammoniaci vnc. iij.
squamæ Cypricæ vnc. ij. thuris, calcis uisæ, aluminis,
æruginis, malicorū, sing. vnc. i. Conficito diligenter,

GALENI PERGAMENI DE
compositione medicamentorū secun-
dum genera, lib. V.

Polychresta medicamenta, siue ad multos us-
us utilia (de quibus agere in præsentī com-
mentario est animus) ex conarq[ue] pharma-
cis constant, etiā iuxta qualitates secundas, nō tan-
tū primas. Etenim primas appello, calidiores, frigi-

Andræ empla-
strum facit ad
excrescentia ul-
cera.

Asteria me-
dicam.

Iis empla-
strum.

Hygie-
ni scriptum.

Cephalicon
ossa corrupta
ducens.

Polychresta
pharmaca ex
conarq[ue] qua
fiunt.

Qualitates pri-
mae & secunda
que dicuntur.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

Calidiores
frigidiores.

frigiditatem, humiditatem, & siccitatem: tum ex harum coniugatione compositas: secundas autem, quæ hias ipsas primas sequuntur.

Panacia Hera.

Ex ipsa est emplastrum descriptum ab Hera, boni coloris, epulonicum, glutinans, implens, ualensq; ad Chlironia ulcera: cuius temperies est talis. Cereæ lib. ij. phrygæ lib. ij. æruginis rase vnc. vj. mannæ vnc. ij. olei heminas v. acetæ sextarium. Conficito.

Panacia Heræ, ad omnem malignitatem ulcerum mirè còducens. Rumpit arq; dissolvit quicquid corruptum est: omnem sanguinem erupione suppressit: hæc morrhoides ipsas consumit & rabetat: omniq; ulcere impolita, quamvis agrestis, mitius ipsum statim reddit. Chamepitys, chamæleonis, symphyi, marrubij, singulorū drachmas iij. polij, centaury tenuis, singulorum drachmas vj. helenij, aristolochiæ, singulorū drach. iij. thuris drach. xij. s. myrrhæ drach. iij. aloës drach. vj. chalbani drach. vj. obolum unum: olei drach. clxxx. mellis drach. xxx. propolis drach. xij. s. aluminis scissus, terebinthinæ, calacitidis, sing. drach. vj. obo. s. bituminis, terræ ampelinis, lithargyri, drach. l. gallæ & pulueris iridis sing. drach. iij. Conficito diligenter. Porrò marrubio uel solo uti etiam queas in ipsa qui carnè abundè humidam & sordidam circa ulcus habent. Helenion uerò haud item conuenit solum inferum: sicuti nec aliud quoduis acre. Nosti siquidem acria irritare, mordere, calcare, & fluorem concitare ad infectas particulas: amara uerò exicare citra morsum atq; calorem: eoq; exulceratis conducere. Iam uerò thus concoquit, & pus mouet intemperatis naturis: nam in corporibus humidioribus carnem producit. Nullum autem eorum quæ concoquant, ac pus mouent, ualenter digerens est: sicuti uerq; acre. Siquidem eiusmodi medio erit ex cal

*Acriti facilius
Amara curare
ulcerata conducent.
Thuris facilius*

*Purpureum
facilius.*

Olei facilius.

Chalbani uires

Terebinthina.

Bitumen.

Propolis.

*Mel non putrescit, putrescit
bary maxime
congruit.*

*Putrescit quæ
fuit apertissima.*

*Uti Epigoni, ad
milita uirile me
dicamen.*

faciunt: emolliuntq; magis, quam exiccat. Oleum lenit, ac ualida pharmaca obundit. Terra ampelitis tum siccata, tum digerit. Chalbani emollit, còcoquit, lenit, atq; dolorē sedat: quas uires thus, licet imbecilliores, sortitur. Terebinthina detergit, disciunt, & quodammodo còcoquit. Bitumen cum calore non admodum uehementi, etiam siccatur. Propolis attrahit. Mel siccatur, & digerit, putrescentibusq; est maxime congruens, ex ipsi exstems quæ minime computrescunt: quare composita huiusmodi a putredine seruat, præterquam extremè ad putrescendum promptæ, quæ humida sunt & calida. Myrrha & aloë citra rationem siccant. Cæterum aloë astringit: myrrha tenuiorum est partium, magisq; siccatur.

Ipsæ Epigoni ab Hera traditum, ualens contra omnia uulnera, puncturas neruorū, hominumq; atq; canum morbus. Venenū à bestiis illapsum extrahit: curat fracturas artuum cum uulnere, fistulasq; omnes abscissus sanat: atq; omnē fluxionem sistit. Cere drach. c. terebinthinæ drach. cc. squamæ rubri æris, æruginis rase, aristolochiæ rotundæ, thuris, salis ammoniaci, guttæ ammoniacæ, singul. drach. viij. aluminis usti drach. vi. æris usti drach. viij. myrrhæ drach. xij. chalbani tantundem: olei ueteris heminas acetæ acris heminas ij. Còficito. Etenim hoc medicamine Epigonus còclusus in carcere, curauit quendam ex ualde potentibus, unde confestim dimissus est. Ego uerò

prædictis etiam radicem dracunculæ adscicio, quæ uel per se, in orbiculos secta, aliccatatq; & redacta in pollinem, si inferspatur, malignis ulceribus auxiliatur.

Emplastrū ex Dictamnno ad eadem faciem. Olei ueteris heminas ij. lithargyri drach. c. æruginis rase drach. viij. squamæ drach. vj. colophonis liquidæ drach. l. mannæ drach. xij. ammoniaci thymiamatis drach. xxvj. æris combusti drach. viij. diaphrygis drach. vj. gentianæ tantundem: aloës drach. viij. chalbani drach. xij. propolis drach. viij. cere drach. xxv. aristolochiæ drach. x. dictamni Cretici tantundem. Conficito accuratissime.

Emplastrum ex utraq; aristolochia, cephalicis enæmum, callosis ulceribus congruens, atq; articulos solutos confirmans. Picis, cere, bituminis, terebinthinæ, sing. lib. j. mannæ, æruginis rase, cerussæ, sing. selsibari: chalcanti, aristolochiæ longæ, iridis Illyricæ, sing. vnc. iij. malicorij, galli maris, æris combusti, sing. vnc. ij. spinæ vnc. iij. aristolochiæ rot. drach. iij. acetæ heminam. Ricini ni, uel olei còmunis tantundem. Conficito. Porrò manna exigua astringendum possidet. Vocant enim sicquod à thure excutitur, nonnulli etiam illius corticis obrinent.

Emplastrum Azanitzæ, malignis ulceribus, necnon ambustis conueniens.

Picis aridæ vnc. iij. cere, adipis suilli, seui taurini, cæsyli, sing. vnc. iij. resinæ picis vnc. v. Conficito.

Emplastrū Halietæ ex sinopide, nihil minus quam priora utile.

Cere, lithargyri, utriusq; minime manna, terebinthinæ, chalbani, sinopidis, sing. drach. viij. olei ueteris heminas duas. Conficito.

Emplastrū Machæronis à Critone descriptū, phlegmonē arcens, mirèq; conducens ulceribus. Aristolochiæ rot. chalbani, opopapanis, æruginis, iridis Illyricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sing. vnc. i. terebinthinæ vnc. vii. s. cere vnc. lx. s. olei obo. ueteris vnc. vii. s. Conficito.

Emplastrum ex salicibus à Critone in multis usus descriptum.

Misq; chalcitidos, æruginis, cerussæ, galli, aluminis scissus & rotundi, cere, suoris, sing. vnc. vi. cere, resinæ piri, picis, bituminis, salicis foliorū, sing. vnc. ij. olei heminas ij. vnc. iij. chalcitidis vnc. vj. malicorij tantundem: acetæ sextarios sex. Còficito.

Emplastrū uenatorū, ad quadrupedum ictus, morbusq; & ad reliqua uenenata. Argenti spumæ minis olei ueteris, squamæ æris rubræ, cere, resinæ phrygiæ, sing. lib. ammoniaci thymiamatis trientem: chalbani, minij sinopici, sing. vnc. ij. còficito.

Viride Alcimionis, còueniens fistulis, educe ossa, & frumens discutiens.

Chalbani drach. xvj. æris usti drach. viij. squamæ drach. xxiij. cere drach. l. seui caprilli, uel uulini, drach. xxx. thuris, resinæ sicce, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, niri, aristolochiæ, sing. drach. xxv. bryoniæ drach. xij. orcheos drach. xij. iridis aridæ drach. iij. aloës Indicæ drach. xij. scissus drach. viij. felis taurini tantundem: acetæ, olei, utriusq; heminam. Conficito.

Viride ad herpetas, & ad Chlironia ulcera ab Andromacho scriptum.

Hordei combusti drach. x. æruginis drach. xx. cere drach. lxxx. cyprini hemina. Cæterū quod medi

Emplastrum ex dictamno ad multam uirile.

Melna quid sit

Emplastrum Azanitzæ.

Emplastrū Machæronis.

Viride Alcimionis.

dicamen æruginem multam continet. Porro com-
bustum hordium, uel si per se inaspergatur, chiro-
nia ulcera iuuat.

*Passilli Aristar-
chi.*

Passilli Aristarchi *αριστάρχου*, hoc est, ad mul-
tos usus. Nam præter alia utiles sunt in principio
phlegmæ, huiusmodi, coeliacæ, & dysentericiæ, tribus
obolis in potu datæ. Myrrha drach. vi. eroci,
erocomagmaris, sing. drach. iij. citrinorum, chal-
canthi, aluminis fusiis, aloës, sing. drach. vi. exci-
piantur uino Falerno, singanturq; orbiculi, & af-
ficari in umbra seruantur.

Polyidæ Sphragia.

Malicorij drach. vi. myrrhæ drach. viij. aluminis
fusiis drach. v. thuris drach. iij. chalcidii drach.
iij. fellistaurini drach. vi. Vino dulci excipiuntur.

Passillus Threpi ad aures pure fluentes, carnis
excrecentias, & narium ulcera.

Malicorij drach. x. gallæ omphacidiæ drach.
viij. aristolochiæ tantundem, aloës drach. iij. myr-
rhæ drach. viij. fusiis drach. ij. thuris drach. iij. pas-
so excipiuntur.

Passillus *αδ* & *χλωιδ* ad nomas &
scabiosos affectus.

*Passillus dactyl-
lem.*

Licij Indici, aloës Indici, myrrhæ, æris, alumini-
s fusiis, citrinorum, thuris, sing. drach. iij. succi
myrti hemine dimidium. Coeficito.

Passillus ulger, quo uxor.

Malicorij drach. x. aristolochiæ, gallæ, singul.
drach. viij. aluminis fusiis, aloës, sing. drach. iij. myr-
rhæ, chalcanti, sing. drach. ij. thuris drach. iij. Vino
excipiuntur, & quæ res exigit, uino dulci diluuntur.

Ad erysipelata.

Acaciæ drach. viij. misyos drach. iij. opij drach.
ij. thuris drach. iij. cū aceto excipiuntur. Faciunt
etiam ad herpetas.

Ad herpetas, Tiberij Cæsaris.

Diphyrgis, meconij, aluminis fusiis, acaciæ, sing.
unc. ij. aceto uel aqua diluente uitor.

Aridum putrefaciens absq; morfu, ex
descriptione Andromachi.

*Putrefacti absq;
que morfu.*

Sandarachæ, arsenici, sing. drach. ij. calcis uiuæ
drach. iij. tritis uitor.

Passillus sanguinem comprimens.

Chalcitidis, misyos, mannx, sing. drach. iij. tri-
tis uitor. Ad ani uicia, alumine liquido nu-
cie magnitudine cum mellis cyathi duobus co-
cto uitor.

Aridum cephalicum ab Asclepiade scriptum,
quod tollit squamas, ossa corrupta educit, & caua
implet. Iridis Ilyricæ, panacis, sing. drach. iij.
Aristolochiæ drach. ij. mannx tantundem: contu-
sis cribatisq; uitor.

Aridum Asclepiadis, cicatricem
inducens.

Calcis uiuæ drach. vi. mannx thuris, squamæ,
fog. drach. iij. redactis in pollinem uitor.

Cruetas inducens, Asclepiadis.

Chalcitidis crudæ, cadmijæ, sing. drach. iij. leu-
nus ex salua excipio.

Medicamentum Diatesaron.

Chalcitidis tostæ, misyos tostij, diphyrgis, chal-
canthi, sing. drach. iij.

Ad nomas Asclepiadis pharmacum.

Sulfuris uiui, auripigmenti, squamæ, sing. drach.
j. æris combusti quantū color exigit. Arido & ex
melle uitor. Etenim putrida ulcera, quæ ambi-

tes partes depascunt, nomas propriè appellant.
Qui affectus uehementissimis medicamentis in-
digent, ut sepe in eis etiam cauterijs utamur.

Apellis medicamentū *αδ* *χλωιδ*, quod nomas
nō solum sistit, sed incipientes prohibet. Chartæ
combustæ, plumbi uisij, æris uisij & lotij, arsenici,
squamæ stomomaris, singulorum æquas portio-
nes, sulfuris uiui dimidium: tritis uitor, uel cum
melle, uel ex rhodino.

Ad carbunculos.

Nitri rubei, arsenici, sandarachæ, chalcitidis, a-
tramentis uitorij, diphyrgis, singulorū parem men-
suram aceto leuigans, exicansq; postea eis tritis
uitor. Etenim carbunculus uisij est crustam ci-
to cum ualida phlegmone circumsistentem parti-
cularum excitans: adeo ut febres uehementes, &
extrema pericula inferat. Quare ipsi crustæ uali-
dum medicamentum imponere expedit, & ex ijs
quæ ad nomas conducunt.

*Noma qualis
noma sint, &
qualia medica-
menta possint.*

*Medicamentum ex
charta combu-
sta, æris com-
positum.*

*Carbunculus
quid, & quali-
bus egerat medi-
camentis.*

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorū secun- dum genera, lib. VI.

IN præsentis cōmentarij ad ea *αδ* *χλωιδ*, hoc est
multi usus medicamenta, me conuertere est a-
nimus, quæ tum ad alia multa singulatim fa-
ciunt, tum ad putrescentes particulas aliter qui-
dem affectas quàm illa ulcera, quæ difficulter cu-
rabilia appellantur. In putrescentibus siquidem
ipsa putredo uagatur, ob idq; tales dispositiones
edplures Medicorū *αδ* *χλωιδ*, hoc est, depasiones ap-
pellant. In illis aut, affectus secundū unum locum
est circumscriptus, absq; ulla putredine: ita ut pla-
gedæ uocatz, excedant quidem partes uicinas,
non tamen putrefaciunt ipsas, nec febres inferant,
quæ consequi ad depascentes affectus cum putri-
lagine, consueuerunt. Hæc igitur quæ nunc scri-
bentur omnia, mordacia sunt, si quis ipsis solis nō
cerato temperatis utatur. At quæ cerato miscen-
tur, purgare quidem ulcus fordidum, & carne re-
plere possunt, atq; etiā duritiem quandam & ten-
sionē discutere: uō tamen difficilia curare. Quo-
circa tum plurimū cerati miscemus medicamen-
tis acerbis, quū ulcus purum & siccum est: corpus
autem curandū, & molle, & ad senium prom-
ptum: paucissimum uerò, si ulcus quidem ipsum
sordibus, humiditateq; redundet plurima, ægri
autem corpus sit durum, & parum sensile.

Noma.

Phagedæna.

*Cerati plurimū
quid acerbis
medicamentis
fuerit, & quā-
do contra, pau-
cissimum.*

Anicetos Cironis, quasi ducem insupe-
rabile pharmacum.

Extrahit, rumpit, purgat, glutinat, pus educit,
duritias discutit, lassitudines lenit, fracturas cum
uulneribus auxiliatur, curat hominū atq; ferarū
morfus, ad innumeraq; alia conducit. Squamæ æ-
ris drach. lviij. pyrethri, raphisagris, cocci igni-
dij, sinapi seminis, cachrysos, columbini, stercor-
is, aristolochiæ tenuis, æruginis, cyperi, erucæ
seminis, cumini, singulorum drach. xvi. nitrij, salis
ammoniacy, singul. drach. xxxij. baccarum lauri,
mannx, iridis, singul. drach. cxx. aceti acris sexra-
rios sedecim, decocti caricarum cyathos iij. & se-
mis. Tusa cribrataq; omnia simul cū aceto sub æ-
stu caniculae lauiantur. Vbi siccum & uiride e-
ualerit, siccum decoctio addicitur, & simul emol-
lita tollunt, & in olla æris rubri asservantur. Visus
autem

*Anicetos Ciri-
m.*

*Medicamentum de
tuffarum.*

autē una ipsius medicamentū parte aceto diluta, usq; ad consistentiā sordium, permista sex resine portionibus, cui nōnihil cergit temperatū. Scribitur etiā impingini agrestis cōgruere. Sic enim uocant, quæ à medicamentis imbecilliter siccantibus nihil inuatur irritatur autē à ualidis. Porro caricarū decoctum lenissimū est, & maxime concoquit, simulq; digerit. Acetū uerō efficacī aliorum medicamentū inuatur. In quo quidē quæ macerantur sub sole citius, tenuem substantiam acquirunt, eoq; alius uirtus ipsorum penetrat.

Emplastrū serapiūnis, cōtra omnia uulnera, punctūs & parotidas maxime ualens. Educti etiam pus, glutinat, feniliat, & chironia perfrant. Olei ueteris lemnias in argēti spumę drach. cc. ammoniaci thymiamaris drach. clxviij. resinę colophonę, perynæ, singul. drachl. lxviij. cerę drach. clxviij. chalbani drac. xx. xurginis tantundem, myrrhę drachl. viij. Conficito.

Humidum Andromachi ad nomas.

Cerę, resinę terebinthinę, utriusq; drach. viij. adipis taurini curati, drach. iij. chalcitidis drac. iij. squamę aris drach. iij. manne thuris drach. ij. gallę immaturę drach. iij. olei myrti lemnias v. Arida aceto & melle excipiunt, dein liquida superfunduntur. Porro quod auxiliōri quędam à ratione sola inueniunt, quæ uerō per rationem sperata sunt, confirmantur experientia. Cū igitur omnia artium opera frequenter exercitio absoluantur, non satis profectū est generalia duntaxat ipsorum addiscere, sed etiam in particularibus subinde exerceri oportet. Nam actionū usus exercitatioq; ad perfectiōis possessionē est uia.

Ægyptia Andromachi.

Argēti spumę drach. xliij. ricini lemnias vice rę drach. cxliij. ammoniaci thymiamaris drac. lxxij. terebinthinę drach. xxxvi. laug usq; drach. xviij. squamę stomomaris, squamę aris, aristolochiæ, thuris, singul. drach. viij. myrrhę drach. iij. opoponacis drach. ij. marinę aquę, ad conspergendam ceram, drach. l. Conficito. Etenim argenti spuma, quum mediū temperamenti sit, quod pertinet ad calorem & frigus, paululum ad siccitatem inclinat. At cerę, materię locum obtrinet, non uirtutis efficaciam adiuvat: tametsi uis quędam ei perexigua emolliendi tuit. Iam terebinthina, q̄ cerę, magis molit, calcificat, & digerit. Porro ammoniacū inter emollientia principatum obinet in digerentibus mediū est. Quare compositum ex oleo ricinino & gutta ammoniaci medicamentū, abundē potest digerere, emolliere, & nimirū etiā siccare. Iam lana cōbuita, aristolochiæ plurimū digerūt, exiccantq; , thus autē digerit cōcoquit. Myrrha etiam nō ignauiter calcificat & exiccat: sed utrunq; opoponacis præstat multo absolutius. Cæterū squama aris, stomomarisq; , præter q̄ quoddalidē siccant, uim etiam astrigendi formuntur. Consentaneū autē est, Andromachium pro hemina uncias uouem mensurales accipere, ita ut sex heminæ uncias

quinguaingenta quatuor mensurales absoluant: quod idem est ac si dicas, mensurę Romanę lib. iij. s. Ego uerō olei Romanū libram, quam per dissecta cornua mentiunt, ponderatū quandoq; , dicere cupiens quantū grauitatis pondus cōtineret, inueniē q̄ duodecim mensurales, decem unctis ponderis æquales existere. Præscriptum igitur medicamentū, cruentis uulneribus, ulceribusq; alijs nō paucis bonum medicamentū redditur: sicuti & ad abscessus, & omnia quę discutī possunt. Nec ignorans, medicamenta quę simul cum digerentibus etiam astrigentia recipiunt, longē tutiora esse: quæ uerō absq; astrigentibus digerūt, efficaciora quidē, nō tamē perinde rura. Sæpe siquidē fluxiones attrahunt, dum corpus quod curatur, plethoricū est, aut prauis succis redundat. Adeo itaq; digerit generosē prædictum pharmacū, ut etiam pus, si nō admodum copiosum sit collectum, discutiat, absq; incisione cauta: emolliatq; callosa, & quomodoq; indurata possit. Cōgruit etiam nudatis neruis, & si in parte quapiam abfecti fuerint. Etenim prædicti nerui, tametsi periculo qd cōfortij lege oboriri solet, careant, tamen eas partes, in quas inferuntur, sensu destituūt: taleq; medicamentū desiderant: nam quæ humectant, faciliē eos putrefaciūt.

Medicamen fuscū Andromachi, Athene dictum, ad difficilia ulcera congruens.

Argenti spumę drach. c. terebinthinę drach. xxxvi. cerę drach. xxv. minij sinopici drac. xliij. ammoniaci thymiamaris drach. xxxvi. chalbani drach. xij. aloę drach. viij. dipterygis tantundem, aris combusti, mastichis, sing. drach. vi. aristolochiæ drach. v. propolis tantundem, manne drach. vi. squamę aris tantundem. Lapidis asij drach. iij. triolij seminis drach. ij. symplitis radicis drach. l. & obolos iij. olei lemnias iij. Conficito.

Hellepontiā Andromachi, propulsans phlegmonem, strumas, panos, & parotidas curans: necnon pus maturans, abscessusq; rupens & glutinans. Argēti spumę drach. c. picis drach. l. ladanij drach. xxv. xurginis rase drach. viij. aris combusti tantundem, squamę drach. ij. olei ueteris drach. cc. Conficito.

Tyria Damocratis, ulceribus ac moribus quadrupedū congruens.

Lithargyri lib. v. cerę lib. ij. piriynę pinguis lib. ij. xurginis, chalbani, aris combusti, squamę, singulorum unc. iij. pinguis olei lib. xvi. curiose conficito.

De emplastris digerentibus, & attrahentibus.

Attrahentiā medicamentā nōnihil etiam discutiant: & quę discutiant, pariter etiam attrahunt. Verū in digerentibus medicamentis, discussoria uirtus: in trahentibus, attrahērix præpollet.

Salsum Andromachi, digerens, extrahens, ad multatū uale.

Salis cōmunis lib. iij. squamę uris vnc. iij. mannis lib. s. manne lib. i. cerę lib. xij. olei Cyprini lib. xvi. quibus acetum affunditur.

Aliud Cretiphonias, paritū discutientis, paritū enocans, atq; detergens.

Aphoniir lib. minz thuris tantundē, lixine stractę lib. Sunt qui addant etiam libram acetī.

DD

Impetigo agrestis.

Caricem decoctum. Acetis facilius.

Serapiūnis emplastrum.

Humidum medicamentum Andromachi.

Artium opera frequenter exercitio absoluantur.

Ægyptia Andromachi.

Ammoniacum inter emollientia principatum obinet.

Heminæ.

Libram mensuralem olei, contere vnc. x. p. drach. vi. Galatæ pectus qd.

Digerentia quibus astrigentibus sunt mellea, esse laugi tataræ sed uim qd faciat illa quæ tantū digerant.

Humeclantia, prædictis neruis facile putrefaciunt. Athene Andromachi.

Hellepontiā Andromachi.

Tyria Damocratis.

Attrahentiā digerentibus discutiant.

Salsum Andromachi.

Medicamentum ex
hæcæ lauri.

Refine, nitri rufi, ceræ recentis, baccarum lau-
ri, colophonæ, feui utulini, ammoniaci thymia-
maris, fing. drach. lxx. Cyprii decimam sextâ hẽ-
minæ partem. Conficito.

Digerenti Ale-
xandri.

Alud attrahens & digerens, ad multa utile.
Argenti spumæ, cerussæ, chalbanî, fing. librâ:
falsis fossilis, argurinis rufis, fing. felibram: olei se-
xtarius tres, atramenti futorij vnc. ij. Conficito.

Alud digerens medicamenti, Alexandri.
Salsi Hîspani, argenti spumæ, cerussæ, fing. li-
bram. Ceræ, terebinthinæ, utriusq; vnc. i. chalba-
nî, uel opopanacis vnc. ij. sinapios vnc. vi. olei
ueteris lib. iij. aceti sextarium. Confundito.

Alud episthaticum, discutiens stumas, paroti-
das, atq; omnes abscessus, conferensq; ad articu-
lorum unita. Salsi fossilis lib. fringenti purifsi-
mi lib. iij. Chalbanî drach. i. Conficito.

Alud, quo usus est ad eadẽ Andromachus.

Cerussæ, falsi fossilis, fing. drach. lxxx. chalcan-
thi drac. xij. olei ueteris heminas iij. aceti hẽmi-
nas iij.

Alud Asclepiadis ad eadem, quod
ualenter etiam mammarum abscessus digerit.
Ceræ, terebinthinæ, nitri, olei ueteris, singulorũ
libram, aquæ heminam. Ntrum in aqua solutũ
igni admoueto, uasq; cooperto, coquito, mo-
uens ex intervallo. Cũ autẽ strepere adeo de-
fuerit, liquida infundito, mouens assidue, donec
non conuinent. Postea in mortariam transu-
sa, rursus rundito: inde excipiens, utitor.

Alud ad eadem.

Ceræ, terebinthinæ, singul. drach. c. nitri spu-
mæ, olei ueteris, mannæ thuris, fing. libram: la-
pidis asis floris felibram: chalbanî, propolis, am-
moniæ thymiamaris, fing. drach. xij. aquæ lĩxi-
næ quod sit satis. Conficito.

GALENI PERGAMENI

de compositione medicamentorũ se-
cundum genera, lib. VII.

Malgumata
quæ dicuntur.

Malgumata siue emollientia uocant Me-
dici, quæ partes præter naturam indura-
tas emolliunt, calido omnia rẽperamen-
to prædita: non tamen exsuccata, quemadmo-
dum nec manifestũ humectantia. Nam cũ exa-
ctẽ emollientia medium quendã oĩdinem inter
humectantia siccantiaq; sociantur, indurescen-
tia subitaneæ uelut fusione quandã molliun-
tur. Vbi uerò fusa durities fuerit, digerentiũ
medicamentorum usus succedit. Porro leoninus a-
deps ualentissimè tum calcit, tum digerit. Pro-
ximũ locum habet parsi adeps, ut qui modicè
emolliat. Vm minorem in calcificando ac dige-
rendo habet anserinus: habet tamen aliquate-
nus maiore in molliendo. Pari spacio ab hoc re-
cedit gallina cœus. Sullus adeps, m. ollissimus, hu-
midissimus, atq; aliorũ imbecillissimus est: quare
teneris corporibus conuenit. Caprarũ & boum
adeps quãto sũllior est ualidior, tantò magis cor-
poribus & natura durioribus, & inter duriora
scirrhosisioribus congruit. Taurinus hircinusq;
adeps ualidioribus tum corporibus, tum affecti-
bus auxiliatur. Est autem commune tum phleg-
mone, tum scirrho particulis laborantibus, re-
nũ præmentibus digitis: distinguunt tamen affe-

ctus ij sensu doloris & indolentia. Igitur magna
phlegmone cataplasmatũ & humidis quibudã
medicamentis sanatur: parua, cui scirrhosa du-
rities permixta fuerit, tum cataplasmatũ, tum
medicamentis cerati modo cõfectis: liquidisq;
emplastris atq; emollientibus.

Medicamen Parygreon Heræ, quod medetur
particulari exigua phlegmone afflictiis, non multò
post cõfectionem in tempore. Si uerò duritiem
abique dolore pars affecta contraxerit, aut si
phlegmonode affectu sit libera, paulò etiam
recenti uersutius utile fuerit. Eius itaq; compo-
sitiõ est talis: Adipis suilli recentis curan vnc.
xliij. ceræ vnc. xxiij. cerussæ vnc. vi. argenti spu-
mæ tantundem. Conficito. Ad duritiem in scir-
rhũ abeuntẽ, ualentiora pygidia persanant:
cuiusmodi sunt, tum medullarum genus, tum
bellum utrunq;, Arabicũ nempe, & Scythiciũ:
necnon styraces, ex quibus eligendus est palli-
dus: nam niger deterior est. Iam ammoniacũ thy-
miama, inter ea quæ emollit durities annue-
ratur, præcipue quod pingue est & recis. Medul-
larũ optima est utulina. Ex resinis aptissima est
Chia uocata, & larix. Post has pinea. Inde abietina.
Strobilina uerò uel emittit est acris. Pityria,
quã propriè phylema uocant, pinguius dimis ex-
pers, exiccat admodum. Has igitur fingere, Chia
uerò & abietina uti oportet, non ipsis per se, sed
cum cerâ, & aliquo aliorũ, quæ cõducere affectũ
uideant. Brutia pix & ipsa eandem obtinet uim,
nõnihil pinguis & tenax. Pix alia nõ est miscẽda,
sicuti nec bitumẽ, ut pote iusto ficiiora. Exiccantia
quippe, mollientibus sunt cõtraria. Quoniam
uerò & picis, & phrycten resinæ, & colophonæ
appellare cõsueuerũt, sciendũ est & alia colopho-
niam quandam haberi, Chiz masticeæ similem,
quæ nõnihil molliens sortitur, quemadmodum
ipsa mastice & thus. Ad hæc Aegyptia mastice
nõnihil emollit. Thus etiam quandam mollien-
tũ uim obtinet: uerum hoc quidem cõctum ex
usu est, ueluti & fenigræci semen: hoc etenim
probè cõctum emollit, ac magis adiuu, si a di-
pi temperetur. Quæ citra cõctionẽ liquari, diluigi,
ob consistentiã ficiorẽ, nõ possunt, oleosũ ali-
quo indigent, cuiusmodi sunt, tum oleũ ipsũ,
cui nihil astringẽs inest tum balneorũ strigmen-
ta, & quod uocatur Sufinũ, & hoc multò magis
Comagenũ. Huius generis est buryrũ, althææq;
& fenigræci decoctum. Porro inter ea quæ e-
molliũt, & ea quæ ualidissimè (cuiusmodi existũt
styrax, & bellũ) ammoniacũ thymiamia idem
potest quod propolis. Ceterum Scythicũ bel-
lium Arabico est multò ad emolliendũ præstan-
tius. Chalbanũ & opopanax, præter q̃ quod di-
gerunt, etiã aliqui d molliens sortuntur. Opopa-
nax tamẽ digerendo, chalbanũ molliendo, co-
quendoq; præcellit. Ex his igitur quæ produxi-
mus, ualida ualidis, imbecilla imbecillis sunt ad
hibenda affectibus. At ubi post primã pharmaci
impositionẽ, denuò ipsũ applicas, oleo pingui
partẽ affectam fouere conuenit. Ex ijs autẽ quæ
ixiimus (quod tenacius hærent) uocant, nul-
lum auferendũ est prius, q̃ sua sponte abscidit:
sed ut adhæreat semper finem da sunt, etiamq;
ægotans laetetur. Vitanda autem omnino sunt
medi-

Phlegmone quo
humidicamentis
tu indigeat.

Parygreon
Heræ.

styracis diffi-
culta.

Medullarũ opti-
ma q̃ utulina

Resinarum dif-
ferentia.

Colophonia de
plea.

Masti. bæ.
Thiu.

Fenigræci
semen.

Bellũ.

Ammoniacum
thymiamia.

Chalbanum.

Opopanax.

Tenacia medi-
camentis nõ esse
auferenda prius,
quã sua sponte
recidant.

Digerentibus
quidẽ reser-
uanda adq; differe-
nda.

medicamentofarū aquarum lauacrā: præsertim quæ clualcanthum, alumen, & sulfur referunt. Cum igitur malaſticorum sint uarij gradus, & differentiæ, certè malaſticus primi ordinis ad exiguā duritiem, atq; in mollibus utemur corporibus: ut secundi, ad fortiores tum affectus, tum corporum habitus: ac similiter tum tertij, tum quartij, nimirum pro illorum ratione.

Malaſtica primi ordinis.

Butyrum, uel refina colophonia, & cera candida non netuſta, ſingula ponderē æqualia, inui cem liquata, primi ordinis malaſtica ſunt. Liqui dum ſimiliter medicamen, quod Parygron uocant, primi ordinis eſt. Emollientiū imbecillimū eſt cera cum butyro ſoluſa, aut ex ſuſino, aut comageno. At his imbecillius cereſon dictum. Iam ex ouis cerata facta, exiguum quandam relaxandi uim poſideat. Valentiſſa huſus, uerū imbecilla adhuc & ipſa, cerata ex cryſſo, refina, & cera pari pondere liqueſcētis.

Malaſtica ſecundi ordinis.

Emplaſtrū quod ad Meaſaū refertur, rectiſſi me ſecundo malaſticorū ordinis aſcripſeris: nimirum conſiſtens ex oleo ueteri, argenti ſpuma, & ſuiſſo adipe. Ceterū ſi omnia illa fuerint recentia, imbecillimū pharnacum fiet. Validiſſus autem, oleo quidem præſente ueteri: adipe autem recente. At ualidiſſus adhuc, ex uetuiſtis ambobus conſiſterit. Quocirca ſecundum uetuiſtatem qui dem olei & adipis, pondus autē ſingulorū quæ induntur, uarias diſcretas ipſum medicamentum ſuſcipiet. Copioſa quidem argenti ſpuma inieſta, medicamēto teſtate molliuſ euadet: pau ciore, ualidiſſa: ac magis emolliet, ſi plus adipis immittamus: digeret fortius, ſi augeamus oleū.

Amythaonia malaſta ad Aſclepiade ſcriptum.

Ammoniacy thymiamatis vnc. xxxvi. ceræ tantundem: terebinthinae vnc. vii. bdellij tantundem: chalbani, thuris, myrrhæ, ſing. vnc. iij. Cyprini heminae iij. Conſicito. Diſcutit omnē duritiem. Valet contra præcordiorū tenſiones, im peditoſq; articuloſum motus.

Malaſta Dioſcoridis, ad eadem.

Ceræ minū unam: refinae phrycæ, chalbani, iridis Illyricæ, ſing. minz dimidiū: irini ſeculæ quod ſatis eſt. Vni quantū uolueris. Conſicito.

Malaſta Lucij omnē duritiem digerens, articuloſiq; impeditos relaxans.

Bdellij, ſeu uitalium, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, ſing. drach. xvi. opopanacis, chalbani, cachrys, ſtyracis, thuris, ſing. drach. viij. piperis grana xl. irinæ ſeculæ quod ſit ſatis: ceræ, refinae terebinthinæ, ſing. ſebimari. Vni quod ſatis eſſe uideatur. Conſicito. Eſt enim extremi emollientium ordinis, ut quo nullum du reſcentia magis emollire comperas.

Malaſta Neapolitæ ad Aſclepiade ſcriptū: cōtra omnes durities: qd etiā pleuritici auxiliā.

Vini piſatę ſextarios ſex: ceræ lib. vi. ammoniaci thymiamatis, phrycæ, utriuſq; vnc. iij. terebinthinæ, thuris, myrrhæ, aloë, aphronitri, lapidis Aſi ſloris, gentiane radicis ſucci, ſing. vnc. vi. ſagapeni, ſulfuris uiui, propolis, ſing. vnc. iij. panacis rad. ſimplyli, piperis albi, ſing. vnc. iij. Conſicito, & untor.

Malaſta Andromachi.

Picis lib. iij. ceræ lib. ij. refinae libram: chalbani vnc. ij. ammoniaci thymiamatis tantundē: man næ vnc. iij. acetī ſextarios iij.

Malaſta Andromachi ex meliloto.

Nardi Gallicæ drach. x. cyperi, cardamomi, ireos Illyricæ, myrrhæ, ſing. drac. viij. croci drac. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis drach. viij. terebinthinæ drach. t. ceræ recentis drach. c. cyprini heminae dimidiū: acetī quod ſit ſatis. Conſicito.

Malaſta ex bacis lauri, Andromachi.

Ceræ, picis brunæ, baccarū lauri, nitri, refinae phrycæ, ſing. drach. lxxv. chalbani, ammoniaci thymiamatis, cachrys, ameos, ſing. drac. xij. pi peris albi drach. xvi. cyprini hem. vi. Conſicito.

Ad iſchiadicis gener olium.

Rutæ agreſtis ſeminis, ſilipij, baccarū lauri, aphronitri, abrotoni, colocynthis, cardamomi, ameos, ſing. drach. iij. Rutæ uiridis, picis, terebinthinæ, ammoniaci thym. ceræ, ſeu, ſing. mi næ partem octauā: chalbani drach. vi. opopanacis drach. iij. ſulfuris uiui tantundē. Conſicito.

Ad lienofos.

Ceræ minam: ammoniaci thymiamatis minę dimidiū: aluminis liquidi drach. l. ſtrigmenti he minam. Capparis rad. calaminthæ rad. myroba lani ſecis, quod magna uocāt, ſing. drach. t. acetē aridiſſo, oleo adiecto liquidiſ, untor.

Malaſta ad hepaticos.

Ammoniacy thymiamatis, bdellij, ſing. drach. cxiij. croci, myrrhæ, ſing. drach. xij. ceræ drach. cxiij. acetī quartam partē heminae: cyprini he minam. Conſicito.

Malaſta ad rheumatismum ſtomachi & inteſtinorum.

Oenanthe vnciam: omphaq; vnc. iij. phœni cobalani carnis vnc. ij. acaciæ, roſarū, aloë, ſingul. vnciam: gallicæ, aluminis, picis, ſing. vnc. iij. 40 ceræ vnc. iij. Vini aridiſſi aſſunditur.

Ad hydropicos & ſtatuſoſ.

Picis liquida, ceræ, utriuſq; librā: nitri, ſulfuris uiui, aluminis ſiſſi, ſing. vnc. vi. Permiſceto.

Malaſta Antipatri ad colicos.

Silipij drach. ij. eleſtiſiaci, caſiæ, medianthij, ſtaphidis agnæ, chalbani, ſtruthij, ſulfuris uiui, ſing. drach. iij. panacis, propolis, pyrethri, ammoniaci thymiamatis, nitri, ſing. drach. vi. Aſi ſloris drach. xxv. ceræ drach. cl. refinae tantundem: olei heminam. Conſicito.

Anodynon Nicolatri ad podagram.

Ceræ libram: ammoniaci thymiamatis vnc. iij. opopanacis vnc. iij. s. meconij vnc. iij. cyprinum ad conſuſionem eorum adhibetur.

Aureum malaſta ad arthriticos.

Refinae ſtrobilinae lib. ij. chalbani drach. xij. a xunginæ porcinae tantundem: ceræ drach. xxij. baccarum lauri drach. xij. Incoquiro ut decet.

Alud ad laterum dolores.

Cyperī, cardamomi, manne, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, ceræ, iij. ſing. libram. Miſceto. Porro pſilegmones, ſcurthij, eadē quo dammodo generatio & curatio eſt. Naſcitur enim ex conſuſa humorum uterq; affectus: cura rur ſiſdem uacuat: quanquā euacuationis mo

Malaſta Andromachi.

Emplaſtrum ex melilotis.

Malaſta ex bacis lauri.

Iſchiadicis eadē plaſma.

Lienofis opoiſ cataplaſma.

Hepaticis conueniens malaſta.

Rheumatismo ſtrobili & inteſtinorum malaſta.

Hydropicis conueniens malaſta.

Colicis malaſta Antipatri.

Anodynon ad podagram.

Arthritici aureū malaſta.

Pleuritici conueniens malaſta.

Inflammationis

curatio.

Scirrhi curatio.

Scirrhi incur-

biles, ab iis qui

passi sunt curatio

ut sciatur, quo

modo differantur.

Phlegmona quod

do in scirrhis de-

generetur.

Pari quomodo

generentur.

Calculus ut gi-

gnatur in reni-

bus.

Refrenantia

quando iis scirrhis

proluant.

Inflammationi-

bus quae medica-

menta commo-

te tollantur.

Aropa medica-

menta quae san-

tate debent.

Refrenatio diffi-

ciliata.

Adeps diffren-

tatio.

Dura corpora

valentiora me-

dicamenta po-

tulant, quon-

iam quae molli car-

ni sunt prole-

dua utrobique idem non est. Quippe inflammationis quidē partibus tum repulsoria medicamentorum qualitas, morbi initio, tum discussoria, semper ex usu est. Scirrhus autē sola discussoria, sine repellente. Itaque summē indurata scirrhi, prorsus insanabilia sunt. Dignosces autem ipsa hinc, quod nullus sensus partibus affectis superfit. At in quibus sensus quidē est, sed obscurus, haec curantur pharmacia digerentibus in crassum huius mori. non tamen ualde, ac uniuersim hoc agens

10 tibus: quod epispastica solent. Quocirca minimē sanē oportet mirari, si partes inflammatae scirrhum interdum contrahant, dum uidelicet humor quidē influens est simul crassus & viscidus: curatio autē medicamentis ualde exsiccanibus administratur. Nam quemadmodū in externis rebus, permulta corpora quae ignē contingunt, ab ipso torrentur, atque rursus ab aqua emolliuntur: ita in particulis inflammatis, ex humore ipso, & calfacientibus & exsiccanibus acerrimē desiccato

20 re, relinquuntur quippe crassum & viscidum, nimirum omni tenui discusso. Atque hac sanatione in morbis articularibus poro gignuntur: nec secus per nephritidas calculi. At si fluxio, quae phlegmonē gignit, tenui substantia sit, curatio eius per siccantia & calfacientia pharmacia administratur, nihil scirrhusum relinquuntur: imō refrigerata uelementer, alstringentiaque, scirrhus procreare tunc solent. Unde multis per erysipelata uelementer refrigeratis, occidescere solent

30 haemores. Igitur optimus usus in dolentibus inflammationibus est, qui medicamentis abundē humidis simul & modicē calfacientibus administratur. Alter paulo crassioribus & siccantioribus constat. Tertius relaxantibus nominatis, quae nonnulli inter malagmata collocant. Sunt autem inter ea, maximē emollientia quidem, quae cōstentiam cerati referūt, cum ex butyro, cera, adipibus, oleoque relaxante constent. Temperatur

40 ipsis atque, resinae, & picis, modicē sicuti & thus & chalbanum, & nonnulli ieros Illyricae.

De acopis, siue laboribus lenientibus. Acopa medicamenta omnia, liquida cōstentiaque necessariū esse debent, inter quae sanē oleum per se, eos laboribus qui summā cutē infestant, persanant: alius autem ingruentes, uel ementiores, alicui relaxanti, & modicoiter calfacienti cōmixti: ut chalbano, resinae terebinthinae, colophoniae phrygiae appellatur. Quibus calidiores sunt abietina, & strobilina. Terebinthina uerō la-

50 rix nonnulla calore superat. Ceterū id genus omnia relaxantibus oleis miscentur, quale est Sabinum, iniecta interdum & cera. Iam uerō ualentior unguen est, ubi dolor altius infestatur, medicamentum semine abietis, chamemeli, aetheris, & floris populi: praeter ea sissimum, gleucinum, & comagenum, & quae tum ex medulla, tum adipe componuntur: suuilo quidem, moderatissime relaxante gallinaceo autē, his uelamentius: & hoc adhuc magis aserino. At adeps leoninus, & pardus, ualidior est, ut iam uelementer calfaciat, eoque discutitur in signatur. In medio horū, bubulit & caprilis, consistit uulgius atque hyxnae adeps. Meminisse autē oportet, dura corpora requirere ualentiora pharmacia: mollia uerō & humida, minimē ra-

lia medicamenta perferre posse. Nec ignoratur, quae dicuntur myrracopa medicamenta, ex acoporum cum unguentis temperatura fieri, nihil o ceteris praestantiora, nisi odoris fragrantia.

Acopon Themifon ab Asclepiade scriptū.

Sampfuchi, orismarini foliorum, fennigraeci, sing. sextarii unū: cardamomi, brathyos, sing. sextarii dimidiū: uini dulcis sextarios tres: olei uenifranis trepōdo: ceræ lib. ij. Cōfictio ut decet.

Acopon ex melle.

Mellis, irini, rosacei, cypriini, gleucini, ceræ, terebinthinae, sing. vnc. ij. Cōfictio.

Acopon Aphrodisiade scriptū, hoc est, sextidum appellatur.

Ceræ, terebinthinae, sing. drach. viij. chalbani drachi. vi. olei ueteris heminas duas: medullae ceruinæ drach. viij. Cōfictio.

Aliud ad omnem nervorum dolorem.

Resinae terebinthinae drach. lvi. ceræ drach. xxvij. ammoniaci rhytmiamati drac. xxxij. chal-

50 bani tantundem: medullae ceruinæ drachi. xxiij. olei ueteris heminas duas. Cōfictio.

Aliud Aetii in Asclepiade, hoc est, ex castoreo quod solutus, & omni diuturno malo auxilium.

Ocyphi vnc. ij. medullae ceruinæ vncias iij. terebinthinae vncias iij. ammoniaci rhytmiamati, chalbani, castorei, piperis albi, euphorbii, adarces, nitri spume, opoponacis, sing. vnc. ij. olei sty-

60 racis vnc. i. olei irini vnc. ij. olei ueteris heminā unam: ceræ selibram. Cōfictio.

Vnguentū dolores articuloꝝ discutienti.

Thuris, piperis albi, sing. drach. x. aphronitri drachi. viij. myrrhae drachi. iij. ammoniaci rhytmiamatis drach. vi. acetū quod sit fatiat: olei Cypriini heminā unam.

Medicamentum ex populo.

Populi nigrae furculorū minam: cucumeris agrestis rad. lib. iij. calicis fistulae lib. ij. unguentis crocini lib. ij. et oxi vnc. iij. uini odorati sextarios

40 xij. olei Sabini sextarios x. sampsiichii, ceræ, sing. lib. iij. Sarcosoli populi diligenter cōstusos in na se duplici unguentario cōtinet: quibus sampsiichium, cucumerisq. radices cōstusae adijcitur. His uinum superfunditur. Omnia diebus nouem macerari sinito. Sequenti die oleum adijcitur, & rursus accuratē tunsa, igne non acri incoquito. Postea liquori expresso ceram subactam, & medullam leuem factam indito. Igni imposta coquito. Vbi liquata fuerint, ab igne tollens, crocinum adiungito, mouetorque continuo. Crocinum uerō laue factum, terrefactis testudinis sanguine excipito, ut olei ueteris crassitudine habeat. Li-

50 quata croco iniecta rursus tridito, atque exceptis uitior. Arthritide & Clethiade liberat.

Aliud Plauti Clementis, cuius usu nouimus homines totos distortos corporis, conualuisse à podagra, chiragraque. Olei Sabini lib. xij. cucumeris agrestis rad. lib. iij. ceræ, terebinthinae, medullae ceruinæ, chalbani, sing. lib. i. Olei diuidimus, & seorsum in eo ranas, seorsum item radices incoquimus. Dein liquore percolato, ad pharmacia cōfectionem uitior.

Acopon uiride Halici.

Ceræ, terebinthinae, olei ueteris, sing. selibrae: aphronitri vnc. iij. chalbani, fruginis rase, sing.

60 vnc.

Acopon Themifon.

Acopon ex melle.

Acopon Aphrodisiade scriptum.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

Acopon ex castoreo.

vnc. iij. opopanax vnc. vi. ammoniaci thymiamatis, manthe, sing. vnc. iij. aceti, melini, cyprini, irini, sing. vnc. ij. seu capilli vnciam. Conficito.

Casti Acopon, ad diuturnos affectus & consualiones.

Acopon Casti.

Pythelae, Syriaci unguenti, utriusque sextarium: ireos Ilyricæ parent modum: terebinthinæ lib. axungitæ tantundem. Ratiore navalis unciam. Incoquito, rursus uridis mousens.

Gileuini confectio Andromachi.

Gileuini confectio.

Myrrhæ, mardî Indicæ, cuiusque lib. ij. costi lib. iij. styracis libellæ, sampluchi, xylobalami, iunci odorati, cardamomi, spathæ, ireos Ilyricæ, misyos, asari, sing. lib. ij. metiliori, nardi Gallicæ, sing. libram: aspalathi, calami, sing. selsibri: aristolochiæ longæ tantundem: coriuarini feminis sextarios duos: thuris, casicæ, sing. lib. iij. scenigræci sextarios duos: sphagni, amomi, sing. lib. ij. cornici thuris libram: rosarum siccatû lib. ij. earpobalsami tantundem: croci vnc. iij. baccarû lauri libram: pipetis albi tantundem: opobalsami uascula tria: malabathi foliorum lib. ij. uasculos pineos urides duos: rursus uridia vnc. ij. fals ammoniaci, nitri, cuiusque vnc. iij. vini ueteris sextarios duos: musti boni uascula duo. s. olei ueteris lib. v. præparato diebus quinquaginta. Ad dolores lassi tudinemque tollendam, medicamen est longè accommodatissimum.

Acopon Hære.

Acopon Hære, ad diuturnos dolores coxendicis, articulos impeditos, & paralyti, admodum efficax. Olei ueteris, irini, laurini, pyracini, ceræ, sing. lib. vi. terebinthinæ, piperis, euphorbiæ, sing. uasculi ij. ammoniaci thymiamatis vnc. iij. castorei, opopanax, chalbanî, medullæ cervinæ, sing. vnc. ij. Liquebilia liquata siccis affundito, & unitis utitur.

GALENI PERGAMENTI

de compositione medicamentorum secundum loca, lib. I.



Curatio quæ uidebitur.

Vod uon modò affectus ipsi, sed etiam ægri temperies, naturæque partis affectus, ipsam curationem commouent, alibi à nobis est demonstratum. In hisce autè cõmentarijs, de compositione pharmacorum ad singulas corporis partes cõgruente, disserere est animus: ad quod tam negocium accingimur, à utriusque capillorum exorssî. Porro generano pilorum, eadem est quæ plantarum. Nam quemadmodum ex istis quedam arte & arbitrio agricolæ, quedam iuxta naturales causas proueniunt: eodem modo & in animalium corporibus, aruo quidem alcuni trini cum, aut horde, aut aliud quoddam cerealium seminum in se insita habent, caput assumilatur: alijs uerò herbis que in aridioribus crescunt regionibus, reliqui totius corporis pili similem generationem sortiuntur. Si quidem non secundum primam rationem, sed per accidens quoddam natura ipsos consuevit pignere. Igitur affectus pilorum sunt, tum de perditio omnimoda: tum coloris mutatio, qualis in utiligine alba, tum leucem uocit, fieri cõsuevit. In id genus autè affectibus, sicut in alijs omnibus, summè curandum est, ut quæ præsidia adhibebimus, aut iu-

Pilorum affectus.

uent, aut certè non nocent. Atqui usus pharmacorum amethodos, non modò non prodest, sed etiam obest frequenter.

De alopecia, caluine, & ophiassi.

Quemadmodum ex plantis ipsis, nonnullæ quidem ob humorum inopiam reficaciter exarabescunt: nonnullæ autem, quod humoribus à sua natura alienis imbuuntur: eodem etiam modo capilli, aut propter penuriam humorum à quibus consueverunt nutrirî, aut propter præuitatè, corumpi assolent. Ac propter inopiam quidem, caluites accidunt: propter uitium autè succorû, alopecia, & ophiassi. Etenim læsa capinis pars, serpennî similis in ophiassi apparet. Alopecias autè, ob id ita appellari ferunt, quod uulpius frequenter accidant. Iam uerò quales tandem sint ipsi corrupti humores, ex colore cuius in capite facile licebit tibi discernere. Alijs namq albidior apparet, alijs nigrior, atq pallidior alijs. Quare in istis primò tonus corporis purgationem molieris, aut pharmaco pituitæ ducente exhibitio, aut quod bilem pallidam, aut nigram eliciat: coniectura redundantis humoris, ex colore cuius inuita. Ego uerò hiera exhibitâ semper ipsius purgati: aliquando nigro ueratro adiecto, ubi melan cholicum succum uacuare erat animus: aliquando scilmonio, si amara bilis purganda esset. Vbi uerò pituitosiores exuperare humores conieci, nihil admiscui. Tales siquidem, præsertim ex capi-

te, hiera ex colocynthide purgare humores consuevit: similis cum his alopecias quodam, etiam scammoni, aut ueratrû nigrum, aut euphytmû, non addatur. Catapotia etiam ex aloë, quæ tum scammoni, tum colocynthidem admixtam habent, cõmodius ita affectos purgare solent. Post totius autem corporis purgationem, apophlegmatis pituitam & capite detrahente præstat, ac dein localibus uni auxilijs. Cæterum incipientes ophiassæ & alopecias, per astringentia & refrigerantia præsidia colibere cõuenit: adultæ autè, digerentibus discutiendæ sunt. Ego uerò quendâ adolefcentie in principio affectionis curauî sola purgatione ex hiera diacolocynthidos. Prius tamè catapona ex aloë uidebam ei exhibuerâ, cicerum magnitudine. Habent autè catapotia hæc, colocynthidis partem unam: aloë & scammoni, utriusque partes duas: quibus partem unam singulæ abinthij addo. Antea uerò etiam mastichem Chiam, & bdelliâ immiscebâ. Porro pharmacû extrinsecus adhibendû, si præter hoc quoddam uisum humores discunt, etiam idonei sit ad probum sanguinem attrahendû, ueluti est thapsia, censendum sanè est optimû medicamen. At uerò cum thapsia longè calidior sit, quam affectus possit, merito eius per se usum uitamus. Exulcerationes quippe excitare consuevit, ac omnino quosdam inflammatos tumores. Quamobrem quædam illius uehementi mingent, necessariò admiscemus: id quod ceratum ex oleo aliquo tenuium partium (cuiusmodi Sabinum est) præstat cõmodo poterit. Vfus quidquid sum etiam sola thapsia, sed uehementi illius faulcare, lar ga aquæ affusione exoluit. Porro ex pharmacis prædicto affectui congruentibus, uehementèr quidem calfacit euphorbiû: sufficenter autè laurinu,

Medicamenta sunt semper talia, ut si non proficiunt, non laedant.

Capilli à quibus tantis corrupti solent.

Caluities, Alopecia, Ophiassi.

Color cuius quæ breuem humorum substantiam purgationem indicat. Pilorum corruptionis curatio.

Hiera ex colocynthide.

Catapoterum ex aloë compositum.

Thapsia faulcat.

Euphorbiû, Laurinu.

sive oleum, sive unguen. Licet igitur ipsa per se uti, euphorbio quidem, oleo intrito, ac laugato: laurino uero solo, citra alterius admisionem illito. Si tamen nimis fluidum appareat, parum ceræ ipsi addatur. Cum uero multo calidius sit recens euphorbium, si quidem bimo, aut trimo ipso uraria, ad librā unam Romanā olei, euphorbi unciam unam iniicies: recenti autem euphorbio, sicuti & thapsia, & omnibus fortibus pharmacis, parcius utendum est. Peccatū liquidum infra modum, uellum detrimentū adfert: supra uero, aliquando exasperat, exulceratque cutem, atque inflammationē excitat. Similiter etiam fugienda sunt omnia ualde uersuta pharmaca: quandoquidem uel metallica ipsa, ubi nimis attinga sunt, suas facultates amittunt. Vniuscuiusque autem medicamenti uigorem, sijs qui sepe ea conspexerunt, licet cognoscere, tum ex odore, tum ex gustu, atque adeo interdum ex colore, consistentiaque. Est itaque inter ea quæ alopecij conferunt, calidissimum medicamen euphorbium: eo autem minus calidum est thapsia: post hanc, sinapi nassurtiumque. Iuxta alium autem modum liminis (quæ adarcium & adarce uocatur) nulli horum secundum est. Post hæc succedunt sulfur, & niri spuma, ipsimum nitrum molle, usum, & quod Berenicariū uocatur: quemadmodum & aphrolitron album, læue, atque laxū. Dein de uetratrum utrumque, & eruce semen, & laurini unguentum, aut oleum: ad hæc alcyoniū utrumque, uisum, & uon usum: calamiq; tum radices, tum cortex, ambo usæ. Quin & pix liquida, & cedrinum, quod cedriam uocant, & murium steracis, utriusque adeps. Hyænx etiam, leonis, pardalis, anserisq; adipēs congruunt: & quicunque tenuium partium substantiam fortissimum. Amygdale etiam amare totæ usæ, cōmodæ sunt: & thus aceto acerrimo maceratum. His itaque omnibus pharmacis licet utaris, fortibus quidem, ceratū liquidum temperas: debilibus uero, laurinum oleum immiscens. Rursus inueteratas quidem, ac difficulter curabiles, cum fortibus persanare conaberis: incipientes autem & paruas, cum imbecillis.

Ad alopecias composita.

Euphorbii, thapsiæ, laurini, sing. drach. ij. sulfuris uiui, ueratrij, utriusq; drach. i. ceræ drach. vi. Misceto, utriusq; hoc, seu fortissimo pharmaco, ad inueteratas, ægrely curabiles alopecias. Si thapsia non adsit, pro ipsa licet tantundem & disperere feminis nasturtij, aut eruce, aut iphusmet nasturtij. At loco laurini, picē liquidam pones. Admiscui etiam aliquando mel, nec deterius euasit pharmacum. Porro quæ ex adipibus, ac modica item thapsia constant, similiter profunt, præsertim si euphorbium & adarcium addatur. Sit autem adipis leonini, pardali, & hyænx, cuiusque pars una, quibus miscere anserinum atque ursinum poteris: ita ut ad duodecim adipium uncias, thapsiæ aut euphorbii unciam unam iniicias: quanquam ambo etiam potes adijcere, si efficerē fortius pharmacum uelis. Auspicari autem semper à leuioribus cōuenit, & respectu effectus, quem pharmacum primò ad motum produxerit, sic facultatem eius aut lenire, aut augere.

In alopecia igitur, primū quidem capillos non uacula tollere expedit: dein affectum cutem per linetolium nec alperum, nec molle uimis, confricare: ac uidere ad quantum ruborem per huiusmodi morionem peruenerit. Magnam namque per successuræ curationis tibi iniicies, si per modicas defrictiones rubescat: quæ moderate affectionis significatio exhibet. Si uero per multas frictiones tandem succedat rubor, grauiorē tum sfectionem, tum curationem indicat: præsertim si quædam cuticularē, etiam si multum coarsuerit, non rubescant. Præ omnibus autem cauendum est, ne in forium pharmacorum ad morionem, curis ultra quā par sit, concalescat: id quod tum ex colore ipsius, tum tactu deprehendes. Colore nanque flauior apparebit, & digitorum contactu satis calidam agnosces. Quare tunc ad molliora transiendum: aut eodem utendum quidem, sed cerati, aut adipis, aut liquoris cuiuspiam oleosi, uel ipsius exoluta. Utendum est & olei calidi dulcis irrigatione, & carapissate ex pane, fomentisq; & scarificationibus: necnon cucurbitis, & cerati inunctionibus. Ceterum perseverante affectione, utendum est assidua rasura, & rubificatione ex sinapi, præscriptisq; frictionibus: sequentibus autem diebus, illita pice, aut oleo cedrino, & post frictionem, scarificatu. Quiddam uero acicularū acero affectam cutem compungunt. Post hæc omnia, pharmacis quæ ex alto euocare, & meatus transmutare possint, utendum. Curandum autem perpetuo est, ut in ære calido, insolatop (si id fieri possit) omne pharmacum applicetur. Hyemis uero tempore, præstiterit in balneo his pharmacis uti. Porro alcyoniū usum, illitumq; ex lucernarum oleo, mediciores dūcunt alopecias, pharmacum mediocre cum sit. Est autem lucernarum oleum communi magis tenuium partium.

Aliud Heræ, ad molli carne præditos, Sem. eruce, & nasturtij, niri, sing. partorij: contritis affundito picem liquidam, utriusq;.

Aliud à Critone descriptum.

Erinaceorum cinere permisso urfino adipi, utitor. Aliud. Calami radices usas, adipisq; ut sino exceptas, impone.

Aliud ad inueteratas.

Muscæ, thuris, cuiusque drach. ij. aceto acerrimo dissolutis utitor. Aliud. Cinerum ranarum minimarum in ollula usatarum, muscæ, ueratri albi, radices calami usæ, piperis albi, singulorum æquis portionibus aceto exceptis, fricato.

Aliud ex libris Cleopatæ.

Sandarachā tritam, largoy usco querno exceptam, loco per nitrum prius preparato, imponito. Aliud. Scillæ, ueratri albi, utriusq; drach. i. ex aceto triæ, prætrasis & nitro coarctis, imponito. Aliud. Muscarum capita contrita affrica.

Aliud præcellens. Murium domesticoꝝ usitorum, panniculū ampelini usi, dentium equinoꝝ usitorum, adipis ursini, medullæ ceruinæ, corticis calami, singulorum æquis portionibus simul exceptis melle, utitor.

Aliud Archigenis, ad alopecias in altum progressas. Cum aceto, niri gleba, aut fici folijs,

Alopecia facile curabilis agnoscitur.

Alopecia rubellæ curatio.

Alcyoniæ.

Lucernarum oleum est res uis composita.

Procrata infusum non ad frictū determinatum.

Versuta pharmaca sunt facilius amittuntur.

Vigore medicamenti ex quibus nota exprimitur quærat.

Alopecij conferuntur medicamenta simplicia.

Liminis.
Adarcium.

Alopecij inueterati optimū medicamen.

Leuioribus medicamentis esse in primis utendum, quod est alogymedum.

*Alopecij alius
progreſſus reme-
dia Archigena.*

lijs, uſque ad dilanizationem defrica: deinde deterſo ſanguine, betam ex uino coctam impone. Aut caricas uſtas, cum uino, aut lentis farinâ ex uino, pro caraplaſmate adhibe. Aut cantharidas uſtas, pice liquida exceptas, aut ceratij liquidâ formam redactas, impone. Aut teſtudinis marinis ſanguinem illine. Aut thapſia ſuccum ce-
rato exceptum illine.

Aliud Aſclepiadis Bithyni.

Spumę nieri partes duas ſalis ammoniaci par-
tem unâ quibus tot uſtis, rum tritis, acerrimolę
aceto dilutis, perſcapſi leuiter alopecij illinuto.

Aliud Sorani.

Stercoris felis aut crocodili drach. viij. ſina-
pis drach. liij. ex acri aceto læuigatas imposito.

Aliud. Fici ſolia cū aceto, donec lanugo prodie-
rit, affrica: dein ſterbes ſuccū illine. *Aliud.* Locū
per pumice prioreto, & ſulſurais, ſpumę uirri, a-
moniaci, ſing. æquas partes mixtas cū aceto illini-
to. Ad caluſcentes præter ſtatē, & ad men-
tri pilos nō naſcentes, remedium.

Adipis taurini inſolati lib. i. adarces vnc. i. ſuc-
ci thapſia vnc. i. s. myrrhæ vnc. i. polytrichi, cal-
litrichi, ſing. lib. s. membri afinini, ſplenis afini-
ni, ladani, ſing. lib. i. Ladanium in modico uiuo
conterito: adipem ad aquę uaporem liquefaci-
to: dein afinum membrum aſſatum, donec in-
ſumatur, radito: ſplenem uerō cum polytricho
& calluricho in noua olla roſefacito: omnia de-
nię conuſa gleuino, aut fabino excipito, & an-
te balneum q̄ uitor. Sciendum autem eſt, lada-
nium ſordes eſſe ab hircorū barbis deſumptas,
quas illi ſic ex cithiâ madore contrahant.

De capillorum deſſuuo.

Eſt & alia pilorum aſſectio, quę ad raritatem
curis, in opamij ſubſtantie pilos gignentis, con-
ſequitur, maxime ſuperueniens à morbo conua-
leſcentibus. Quapropter curatio etiam hoc mo-
do leſorū nō eundem ſcopum, quem alopecie,
habet. In alopecijs ſiquidem, ut uirius humor
conſumatur, primariū ſropum habemus: in leſo-
uor, ut capitis habitum roboremus, & alimen-
tum boni ſucci attrahamus, cutis denſitatem &
raritatem moderatē reſtituamus. Quamobrem
ad pharmaca humectantia aliquid moderatē a-
ſtringens admicere oportet, quale eſt ladanium,
quod utraq; in ſe moderatē complectitur, quę
ad hoc ſymptoma conueniunt: caliditatem nem-
pe mediocrem, & aſtringendi uim moderatam.

Quare ſi capiti prius raſo, perſſicatioq; aliquo
mediocriter aſtringenti oleo (cuiuſmodi Hiſpa-
num, & lentiginum eſt) illinatur, maxime ex uſu
eſt. Nam quę uehementer aſtringunt, omnia et-
iam refrigerant, & alimenti influxū reprimunt:
propter cuius inopiam capilli deſſuūt. Atqui in-
tentio noſtra eſt ſanguinem aſſluentem non mo-
do non expredire, fed etiam proleſtare: cogere
autem ſenſim, & aſtringere rarefactam cutem.
Quare ad deſſuuos capillos omniū præſantiſ-
ſimum medicamen eſt, quod ex ladano, & len-
tiſcino oleo conſicitur. Quod ſi large deſſuant ca-
pilli, maiori uſu datur eſſe raritas curis, pro len-
tiſcino, myrteo utendum. Licebit aliquando un-
guentum adhibere nardinum, in ætate frigida,
& hyemali tempore: ſicuti in diuinibus ſolatiū,

& ſpicatum. Debet autem ladani liquari in du-
plici uafe, ac reliqua poſtea illi miſceri. Atq; hæc
ſanē medicamenta mihi ſuffecerunt, unâ cum re-
ſectoria, ſalubriter uſtus ratione, quę in pleriq;
etiam ſola ſufficit.

*Archigenis remedium contra de-
ſſuuos capillos.*

Ladani & abſinthij æquales partes, & iunipe-
ri baccas x. tritas, in linteolum diligato, & in oleo
per dies quinq; macerato, ex eorū caput illinuto,
& neq; capilli decident, neq; gignitur ſurſurus.

*Aliud Cleopatrę, capillos augens citō,
denſansq; & denigrans.*

Ladanum ex oleo, uinoq; dulci læuigatū in-
crasſatumq; præſcriptū illinuto.

*Comptoria ab exornatoria medicinz par-
te, quomodo differat.*

Comptoria quidem ſcopus eſt, inducere pul-
chritudinē. Exornatorie medicinz partis, quic-
quid ſecundum naturam eſt, id omne in corpo-
re cultodire: ad quod etiam naturalis pulchritu-
do cōſequitur. In decoro enim aſpectū eſt caput
etiam uitiatum: ſicuti etiam oculi clię & ſu-
percilijs nudan. Non ſolum uerō ad pulchritudi-
nem, fed multō prius ad ipſam partium ſanita-
tem, pilū conducunt. At faciei colorem per pha-
rmaca nitidiorē, aut rubicundiorē reddere,
aut pilos capitis criſpos, aut ſuolos, aut nigros,
aut auctos: hæc inquam comptorie præuatiū,
non medicæ arti ſunt opera.

De riſtutis capillorum.

Quandoquidem tamen iam conſuetudo hæc
inualuit, ut uerulę quidem paſim capillos de-
nigrent, tanquam turpe ſit canos habere: mari-
ti autem id probent, ſpectaculum permoleſtum
centenſes, uxorem aniculum cano capite habe-
re: ſanē quęcumq; præ delicijs leiſipias ornant, ea-
rum nulli tale quippiam à me petenti, exhibui:
quęcūq; uerō honeſtiores, tum ut noxę culpam
eſtingerent, tum ut moleſtias maritorū uitarent,
capillos ſuos nigros reddere optarunt, ijs certē,
ne ex aſtrictoria uim nigrorem inferentū oblate-
rentur, conſuluit, ut cedri liquore uterentur, ita
ut tribus aut quatuor horis ante balneam illine-
rent, & poſtea detergerent: dię per quatuor aut
quinq; dies facere pergerent. Cedria ſiquidem
non modō nihil lædit, fed etiam cōmoda eſt eis
quę facili offenduntur à frigore, abundē uideli-
cet calfaciens. Ad hæc, deſſuentes capillos corri-
git, & non deſſuentes, auctiores reddit. Contra
uerō, quę ex auſteris & acerbis compoſita ſunt,
magnopere lædunt. Ceterum materia ex qua
conſtant hæc, etiam quippiam tenuium par-
tium habear oportet, quō nō in ſuperficie tan-
tum, ſed in profundo etiam cutem permeant,
progrediendo uſq; ad capillorum radices. Non
ſolum autem in periculo uerſatas ſæpe ſcio ſæ-
minas, ſed & mortuas, ex perſſigatione capis-
nis ad huiuſmodi medicamentis inducta. Offen-
duntur tamen citius, quæ frigidis capitis tem-
peramentum ſortuntur. Frigidę namque particu-
lę frigidis aſſectionibus, calidę calidis cor-
rumpuntur facilius. Verum minus periculum
ſubeunt, utpote cū à minori cauſa lædantur,
quę frigidis habent temperamentū. At calidę,

*Comptoria ex
exornatoria ar-
ti pari quomo-
do differant.*

*Pili ad quid cō-
ferant.*

*Aniſol ex ca-
no capite uerū
habens, ſpecta-
culum ſollicitu-
dam cogitaret.*

*Capillos drai-
gran cedri li-
quore.*

*Similibus aſſe-
ctionibus ſeci-
bus ſingulis cor-
rupti, minus læ-
duntur periculiari.*

propterea quod ægre & uix tandem lædi à frigidis causis possunt, si quando à magnis fuerint exuperatæ causis, maiorem læsionem incurrunt. In morbis siquidem minus perscrutant illi, quorum naturæ, ætati, habitui, ac temporis, ipsa ægritudo congruit.

Tingentia capillos, ab Arcligene prodita.

Perscrutari in morbis minus, quibus cingatur

Capillos tingentia, ab Arcligene prodita.

Radice capillis cum muliebri lacte uel aſſino ad tertias cōcoquiro, & ad noctem per capraslimate imponiro. Aut urina canis in quinque aut sex dies aſſeruata lauato. Aut cornicis salicis succum ex oleo affricato. Summè nanque denigrat. Denigrant barbam iuber andum & plumbum uſum, cum betæ crudæ succo mellis spissitudine illata. Fuluos autem reddunt capillos lupini crudi cum aqua & nitro illiri.

Crispos reddes capillos, si spuma salis cum myrrha conficiueris.

De pharmacis corruptentibus pilos.

Pilos corruptentia pharmacica.

Ex pharmacis corrūpennbus pilos, quædam propriè pilolitora nominantur: quædam capillo rumpi attenuantia: quædam penitus extirpantia. Atq; hæc sãuè ultimò nominata, periculosi sunt uſus. Ex liquidis igitur est luxurium tali uel prædictum. Ex aridis autè & meralliciis, arsenicū, & sandaracha, & calx non extincta. Manifestum itaq; est, uelocitèmentè ipſorum uim, per admiſſionē imbecilliorum pharmacorum frangi: quorum congruentem miscellæ modum cōſuet primò, quo ipſorum uires cognoro. Dein uerò per experientiam defectum corriget, aut etiam addet.

Pilolitora Critonia.

Pilolitora Critonia.

Calcis uiuæ partes duas: auripigmenti partē unam. Hæc in mortariū plumbè coniecta, aqua aut priſanæ succo aſſuſo terito: atq; ubi nigra red duntur, calſacta illini, maximè in balneo, iubeto.

Aliud. Amyli, calcis uiuæ, auripigmenti, ſing. vnc. i. contritis untor ex aqua dulſita.

Quæ pilos disperdant.

Pilos disperdantia.

Diſperdentia pilos componunt ex lepore marino, hepate thunni putrefacto, cedria, ranarum cruore, maris teſtudinis ſanguine, lachryma uitis albe, lachryma hederæ, ſimiliterq; bryoniæ, atq; oleo iuſſuſo. Ex marinis item ſcolopendria, urticaq; marina, & ſtellis marinis, nitro, & amurca, ad hæc admiſſis. Quin & fortiora his ex erinacis & ſalamandra cōponunt, in oleo coctis. Admiſcent autè ipſis alcyonia, & ſandarachien.

Quæ pilos attenuant.

Pilos attenuantia.

Attenuantia pilos, deterſoria ſunt facultatis. Igitur hordei, fabarū, atq; erui farina, ſpuma nitræ, atq; ipſum nitrum, familiaria pharmacata ſunt, omnibus ad tollēdas ſordes uſurpata. Aſſiduus autem eorum uſus etiam pilos attenuat. Quæcunq; uerò fortius detergent, in iis qui ualde du ros & magnos pilos habent, adhibere oportet. Ac talia ſanè ſunt, nitrum uſum, tutri ſpuma, & aphrolitrium ipumofum, pumex, teſtæ uſtæ, os ſepis, utruſq; ueraturum, ſtruthium, bryoniæ & dracunculi radix, aſtrolechia urrag, candry, radix panacis, argyrd genus alia. Quod ſi hæc ipſa odorata facere uis, cyperum, melilotum, roſas ſiccas, iunci odorati ſtorem, iridem Illyricā, meliſophyllum, & cydoniam herbam eis admi

ſcebis. Si uerò pro diuiniſ pharmacum præparaes, ſpicam nardi Indicam, Celticamq; & montanam inſicias: necnò Eretria terra, ſolium malabathri, amomum, myrrham, crocum, coſtum, & hedychroum.

De furfuribus.

Quibufdam ſe ſcalpētib; furfuribus ſimilia ex capitis cute decidunt: ob idq; medici hoc ſymptoma furfures uocant, à uitiolis iſdemq; ſeroſis ſuccis proueniens: quos aſſumere propoſitū eſt, q̄s qui huic malo mederi uolūt. Maniſteſtum igitur eſt, diſcuſſoria & exterſoria pharmacata adhibenda eſſe, præparato prius uniuerso corpore, ſi uinofis ſuccis redundet. Admiſcuerūt quidam huicſcemodi pharmacis etſi aſtringentia nõnulla, quibus partē leſam ita corroborent, ut non facile influentes humores ſuſciperet.

Remedium Archigenis contra furfures.

Nitri ſpumā, & atramentū ſutoriū æquis partibus, cum uino rundo, utriusq; ter ut quater in menſe. Aut uini Rhodiæ ſecem, & pumiciæ, & nitri, pares portiones, cum lupinis affrica.

De phthiria, hoc eſt, morbo pediculari.

Pediculi nõnulli in capite acutiatim gignuntur, ex multis humoribus calidis quidem, ſed nõ ad tantam caliditatem progreſſis, ad quam perueniūt acres atq; ſeroſi humores. Quare maniſteſtum eſt, in profundum cutis, pedicularis morbi affectionem fieri, ubi etiam animalcula huiusmodi gigni poſſibile eſt: nõ in ſuperficie, in qua ipſi conſiſtunt furſures. Pharmacata itaq; ipſorum neceſſariò exſiccantia ſunt, & quæ ex alto trahere & euacuare poſſiunt, magis utiq; quàm ea, quæ conueniunt furfuribus.

Remedia Arcligenis contra morbum pedicularem.

Staphidis ſylueſtris partes ij. ſandarachæ & nitri, utriusq; partem i. cum aceto & oleo capiti illine. Aut oxyſpathi radicem cum oleo.

Aut ueratū album, & ſtaphidem ſylueſtrem, & utriusq; pari pondere cum oleo in balneo adhibe.

De actioribus, hoc eſt, ulceribus capitis manantibus.

Inter affectus inuadētes capitis cutem, actior annumeratur, ex genere tumorum præter naturam exiſtens. quo affectu inſectata particula, ſoraminibus quibufdam tenuibus eroditur, tenui humore modicèq; uſcido redundantibus. Ad ſi multitudinē uerò eius proximè accedit alia cutis affectio, quæ Cerion Græcis, Latinis ſauus uocatur, habēs maiora ſoramina, in quibus humor hymetio meli ſimilis conneſcit. Generatio ipſis ex humore mixto eſt, qui partim tenuem, ſeroſumq; ac mordacē, partim craſſum ſuccū in ſe ſibi bet. Tenuis itaq; humor, utpote mordax, primū quidem ad ſcalpēdiū ipſos impellit: progreſſu uerò temporis, ad ſcirpura tum tumor augetur, tum ſoramina circa ipſum erumpunt. Maniſteſtum igitur eſt, humores qui affectionem gignunt, debere uacuari. Qui ſi etiam fluant amplius, prohibendum in primis eſt ipſoru influxus per capitis atq; uniuersū corporis euacuationem. At uerò ſi affectio ipſa ſit parua, ſola remedio localia ſufficiūt, uel ſi minime toti corpus uacuet. Ea igitur pharmacata idonea erunt, quæ craſſum humorem

Furfures capitis à ſeroſis ſuccis oriuntur.

Furfures capitis curantur.

Pediculi in capite à quib; causis oriuntur.

Pediculorum morbi remedia.

Acherm.

Cerion.

Acherm. & auerum curantur.

Acriti facultas.

humorem incidunt, quique facultate sua necessarii discutiant repellantque. Atque acetum ex incidentium ordine existens, ultra hoc quoddiscutitur, etiam reprimat, depellitque id quod influit: cum tamen secundum substantiam suam habeat exiguum quiddalidipulvinitum autem frigidi, sed tenuium partium. Esse autem debet acetum exquifitè acidum, in quo nulla penitus vini qualitas perferantur. Ac tali profecto pharmaca metallica imbuere, achoribusque ex ipsis medebetur. Incipere autè ab imbecillioribus præstat, præsertim si simul dolor infestet. Apra igitur ad hanc rem sunt, Cimolia, Cretica, Lemnia, Samiaca terra: præterea pompholyx, spodiū, lithargyros, & cadmia tenella. Quodd si his remediis malū non cedat, pharmacū ex charta sicci, aceto dilutū illi nitro. Prius tamen capillos abrades. Quodd si quando in ulcus manans inflammatur simul & afflicto dolore incidat, lenies primū dolorem ipsum per humectum concoctorumque & emollientia pharmaca; & quod acrimoniam accere possit: cuiusmodi sunt nunc uocatū Parygon, tunc quæ sedis ulceribus, & cancri opitulatur.

Remedia Archigeni ad achoras.

Cadmia cum oleo ueteri illinito. Aut cinna bari similiter triti imponito. Aut chalcitidem cum myrteo oleo, vel fusillo felle liquido inungito.

Remedia Apolloni ad achoras.

Caput succo betæ illinito, aut laurino oleo, aut erocino unguento, aut taurina, aut camelina urina. Vel fursurū chemicum dimidium in aquæ heminis duabus madefacto, postea lyterito, eremoremy excolato, cumque dimidia aceti hemina ad lini spissitudinē coquito, & ex eo caput fricato. Vel cucumeris agrestis radicū coctarum succo partē laesam illinito. Vel argenti spumę drach. viij. foliorū rutæ tenerorū drac. v. olei drach. viij. aceti quartam partem hemina, simul trita capiti illinito.

Quæ Criso ad achoras prædicit.

Ficulnæ furculos, aut folia tenera trita cum aqua imponito. Aut recementi ferri, & rosarū gar pōdus cum uino tundito, imponitoque. Vel lithargyri drach. x. foliorū rutæ tenerorū drach. xxv. aceto diluito: & rosaceo, aut myrteo excepta, cum penna illinito. Vel, si affectio fuerit inueterata, ladani, cerussę, sing. drach. viij. sulfuris uini drachmas iij. uino & myrteo oleo subactis utitur.

Ex libris Cleopatæ ad achoras.

Fenogrecæ tenui cocto, & in betæ nigre succo macerato, caput eluatur. Post ablutionē uerō myrto cum uino & oleo trita, illinal: superneque betæ folia imponant. Vel cerussę, thuris, sing. drach. ij. sulfuris drach. i. trita ex oleo illinito.

Remedia Sorani contra achoras.

Plumbaginis, sulfuris uini æquales partes terito, & affuso rosaceo, aut myrteo, aut lenificiuo, illinito. Vel sulfuris uini, lithargyri, cerussę sing. æquas portiones, croci dimidiā, trita cum passio Cretico illinito.

Ad psyllydracia & eruptiones, pustulasque ulcerosas, & eruptiones in capite.

Ad affectiones præscriptas, conuenienti uti oportet uisus ratione: corpusque atque caput pur-

gare, catapotia ex aloë, colocynthide, & scimono, succo brasice coacta. Dein localia remedia adhibenda sunt: cuiusmodi existit adiantum ex rosaceo illitum: aut fenogrecæ decoctum afflicto: aut malua cum farina hordeacea pro cataplasmate imposita: aut mellisotū cum farina fenogrecæ, cicetumque decocto impositū: aut ipsum met cicet decoctum, impositumque: aut amarynucos comanse & illire. Discutit autè maximè & lithargyri radix afflicta: & thus cum uino & aqua, & lupinorum amarorū decoctū, & bulbi cum nitro afflicti: thus præterea ex aceto illitum, putamen mali punici cum laurino illitum, & anchusæ radix uita, tritaly cum oleo, & per pinnā inuncta.

GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorū secundum loca, lib. II.

Quia citra distinctionē scripserunt auxilia doloris capitis, maius detrimentum quod emolumentū attulerūt ipsi, qui eis fidem adhibuerunt. Nec enim omnes ob unū affectionē caput dolent: sed tum ipsę affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singularim propria existit. Vna etenim affectio est iuxta intemperiem simplicē citra humorū affluxum: alia iuxta humorū qualitatem uersatur: tertia secundum eorum solam multitudinem accidit: quibus accedit quarta, cum transitus liquorum atque uaporum ipsi humores obturant: ac præterea quinta, dñm in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatē spiritus statuosus innascitur. Est cum ob causam aliquam procatarteticam (cuiusmodi sunt ardor extrinsecus, aut refrigeratio, aut ebrietas, aut ictus) dolor capitis accidet. Vehementissimi igitur capitis dolores sunt iuxta caliditatē & frigiditatem, maximè cum inæquales fuerint: moderati autè iuxta siccitatē ad humiditatē uerō nullus consequitur dolor. Eodem modo cum ob redundantes humores capitis dolor oritur, uehementior quidem ob calidos & frigidos accidit: moderatior autè, ob exiccantes citra calorem aut frigus. Humectantes uerō, penitus nullū dolorē inferūt, quantum ad qualitatem quidem ipsorū attinet: nam ob multitudinē sanè, instrumentaliū partū morbos efficiūt, nō tamen similariū particularū ullum aliquē: cum nimirū earū morbi in pura intemperie consistant. Ad hæc affectiones ob ipsi humorū ortu, citra quiddē obturationē caput grauit: cum obturatione uerō, si quiddē moderata fuerit, moderatè dolorificæ sunt: si fortes, uehementè affligunt. Quodd si etiā mordacem qualitatē multum humorū sortiatur, etiam iuxta hanc dolorē augebit. Quod uerō ad naturam affectarū particularū pertinet, interdū quidem extra caluariam affectio sit, aliquando intra: & interdum quidem omnes externas, aut internas partes infestat: interdum autem nō omnes, sed unam tantū speciem corporis, artentiam nempe, aut uenam, aut neruum, aut membrum, aut cutem, aut ipsum denique cerebrū. In uniuersum igit, singularū affectionū curationis scopū ratio nos docet. materię uerō facultates experientia cōmonstrat. Poterō aliquādo sola intemperie

Capitis doloris
distinguitur, &
generatim tra-
ctat.

Dolor capitis
notum ad hunc
dilectum consi-
quatur.

Similiter parti
caluariæ morbi
in pura intemperie
consistunt.

Capitis doloris
distinguitur, scilicet
dum distinguitur
affectionum parti-
cularum.

Postulatur capiti
in medicatio.

calida ex infolatu laborat caput: aliquando cum ipsa interperit: ac credit etiam humorū affluxus, precipue cum uniuersum corpus laborat plethorā, quæ sit ipsi quatuor humoribus ex æquo autē: aut enā sanguine solo. Nam cum alius quispiā humor redundaret in corpore, nō plethorā, nec simpliciter plenitudinem, sed pituita, aut bilis flauæ, aut atræ, tuæ plenitudinem dicimus.

Plenitudo fieri, quæ ex ardore contrahitur indicatur, & curatur.

Doloris capitis ab ardore contrahitur indicatur, & curatur.

Igitur eis qui ex ardore caput dolēt, cuius tactui aridior ac primū contactum apparet: oculosq; rubros habent; ac frigidis tum perfusionibus, tum illitionibus, oblectantur. Principio itaq; repulsoria curatione est utendum, ex refrigerantibus, astringentibusq; cōstante. Postea uerō mitigatoria & concoctoria pharmaca, ad repulsoria miscere oportet. Deinde etiā ex disculsiōis quipiam addendum, paulatim detractus pharmacis quæ repellunt. Optima sunt autem cōfenda, quæ subitanea tenuiū parnū sunt prædita. Quapropter in principio quidē melius est frigidissimum rosaceū perfundere, iuxta frontē nēpe, & tēpora, & occiput: nō tamē longē inferius. Neq; enim facile exuritur ea pars: neq; etiam citra noxam, refrigerantia sustinet, propterea quod illic principium medullæ spinalis exstat, ad istipis modū in ramulos cōpures diuisi, uidelicet in sexaginta (ut existimo) neruosi. At uerō regio capitis iuxta sinuiput, propter laxitatem coarticulationis ad coronalem futurā, & ob osium tenuitatē & raritatem, facile tum caliditatem, tum frigiditatem omnium quæ adhibentur pharmacorū, intro distribuit. Quare siue refrigerare oporteat: ex caliditate ardorē, siue calicare & frigiditatē, apusissimus est capitis iuxta sinuiput locus. Rosaceū autem ipsum, quo in exultis uteremur, ex oleo: uero (quod omphacinū appellant) citra sulis admixtionē, confici debet: nempe rosæ q̄ plurimum in eo maceratis. Si autē rosaceum nō uetus, sed eo ipso anno cōfectum. Proximū ā rosaceo clame melinū existit, quo utendum in ijs corporibus est, quibus inducere uehementem frigiditatem ueremur: qualia sunt feminarij, eunuchorum, puerorumq; ac breuiter eorum omnū, qui molli carne sunt præditi, albumiq; colorem sornuntur. Refrigerabis autem quæcunque adhibere uoles, in aqua uehementē frigida collocata: quæ si non adsit, niuem uasculo circumpones. Etenim frigidorum fontium & niuis maximi Romæ est ubertas, quemadmodū apud nos in Pergamo. In regionibus autem calidis, qualis Ægeus

Occiput non facile exurit, nec citra noxam refrigerantia sustinet, propterea quod illic principium medullæ spinalis exstat, cum sit.

Spinalis medulla in fœta quæda nerui diuisus.

Sinapicis regionem esse apertissimam ad transfusionem vires applicandorum medicamentorum.

Rosaceum ex oleo cōfectum, quod est cōfictum dicitur.

Chamamile uero in quibus sit uetustum corpus.

Refrigerantia in modicam rationem.

Pergamus Galie in patria.

Staphylococcus, & quæ uoluntate astringit refrigerando, uisita in capite doloris est.

Refrigerantia sunt, quæ refrigeratione manifeste altumant: aut perexiguū quid ad refrigerantia miscendum, si quando necessitas postulet: propterea sunt & solani succi aut nunq; penitus, aut modicē certē admiscemus: sic etiā & mali punici, & mali cydonij, & melipii. Ad hanc tamen rem maiorū punicorum acidorum succus præstantior est:

Refrigerantia sunt, quæ refrigeratione manifeste altumant: aut perexiguū quid ad refrigerantia miscendum, si quando necessitas postulet: propterea sunt & solani succi aut nunq; penitus, aut modicē certē admiscemus: sic etiā & mali punici, & mali cydonij, & melipii. Ad hanc tamen rem maiorū punicorum acidorum succus præstantior est:

Refrigerantia sunt, quæ refrigeratione manifeste altumant: aut perexiguū quid ad refrigerantia miscendum, si quando necessitas postulet: propterea sunt & solani succi aut nunq; penitus, aut modicē certē admiscemus: sic etiā & mali punici, & mali cydonij, & melipii. Ad hanc tamen rem maiorū punicorum acidorum succus præstantior est:

Refrigerantia sunt, quæ refrigeratione manifeste altumant: aut perexiguū quid ad refrigerantia miscendum, si quando necessitas postulet: propterea sunt & solani succi aut nunq; penitus, aut modicē certē admiscemus: sic etiā & mali punici, & mali cydonij, & melipii. Ad hanc tamen rem maiorū punicorum acidorum succus præstantior est:

magis enim refrigerat. Equidem aliquando curabitur cremorē permiscui omphacio. Poterit etiā quæ similiter seridis succo uni, necnon tum hortensis, tum syluestris lactuca. Quin & mororum nō admodū maturorū succus est aptus ad refrigerandum. Si igitur caluus sit riger, aut breues habeat capillos, uehementē refrigerari poterit, tum per iam dicta, tum per omnia illa quæ erysipelata auxiliant. Quin ex frigore caput dolent, ijs facies decolor, minimè arida cōspicitur: & frigidus uerq; gaudet, neq; item iuuat. Si igitur frigiditas ipsa sit recens, solum rosaceū oleum, si calidum affundatur sinuiputi, perfectē hominē liberat. Si uerō uehementiori calore sit opus, euphorbiū oleo indat, & pharmaca quæcunque constant ex pipere. Inungenda autē est facies, ac tum aures, tum nares, præcipue irino, amariacino, & uardino unguentis: necnon foliatis spicasq; uocans. At opobalsamū sæpe expertissimus ad nullā affectiōē calore iudigente, euidenter opitulari. Sampsuchiū autem, laurini, & serpyllinū cōdem. Propinanda præterea ijs est unum tenuium partū: & motus corporis præcipiendus, lauacraq; calida: & quandoq; ā raphano uomitus. In capitis autem inueteratis affectibus necessariū pilos radimus, aut præsecamus ad curm usq; ac rasis quidem admoueimus pharmaca emplastica: liquida uerō ijs, qui breuissimè habet capillos præfectos. Ac sanè me dicamenta refrigerantia, ex ijs quæ erysipelata curant, sunt transferenda: calfaciētia uerō, ex pharmacis calfacientibus cōficienda: quorū simplicissimū est ex euphorbio compositū. Sufficit autem unciam euphorbij unam, ad tres ceræ liquefactæ in olei libra una, cōmiscere. Atq; utendū quidem astringenti oleo, ad affectiōnes quæ indigent calore, nō est: sed aliquo tenuiū partū, cuiusmodi Sabinū existit. Quibus autē ob positionem calidiorū uinorum, caput repletum uaporibus aut humoribus calidis (solent enim hi uel absq; uni pota, suapte natura ad caput attolli) dolore affligitur, ubendi nō sunt, si crudū adhuc in eis unū permaneat, ut hausta aqua tepida uomant. Quod si etiam post cōcoctionē caput doleant, refrigerantibus ac repellentibus est utendum: quale est rosaceum per se, & cum aceto, aut lictere & brassicæ cremore. Quin & ipsa brassicæ folia calida macerata, capitiq; circūposita, ac obligata, naturaliter ebrietati resistunt. Cæterū (omni quæsiens cura in primis habenda est: ubi uerō per totū diem quæserint, ad uisceram lon, cibis boni succi nutriendi sunt, nou tamen calfacientibus. Sunt autē tales, prænæ succus, & sorbitio ex alca, & panis ex aqua, & oua forbilia absq; garo. Admiscetur autē eis ex melle, uel ex sale condimentis aromatū præparato, quantum sit satis ad suauitatē saporis. Ex oleiibus congrui illis lactuca, nēpote boni succi atq; refrigeratoria: necnon brassica, ut quæ uapores resiccet: sic & ex leguminibus lena. Poru uerō omnino aqua utendū est. At quia nōnullis uentri culus ā frigide potu subuertitur, mālū puniciū ipsi superfundendū est, aut solū per se, aut cum aliqua staccida calida, probe cōcta. Quin & mālā Ceibana appellata in urbe Roma, citra cocturā quidem

Doloris capitis ubi a frigore contrahitur, & curatur.

Opobalsamum ad affectiōnes calorem, non magis opitulatur.

Doloris capitis inueterati curatio.

Doloris capitis ubi ab ebrietate contrahitur.

Cogitatio mala

quidem sunt austeri: post cocturam uero, stoma-
cho euadit comoda. Coquenda autem sunt ad
uaporē atque suspiria. Abstinendum uero à pal-
mulis est, ut quæ ex proprietate dolorē capitis
excitant. Quod si moderatē iam habeant, & a-
quam bibere nequeant, permittendus est eis po-
tus alicuius uini diluti & aquosi, quale est in Ita-
lia Sabinum, in Asia Titaczenum. Quin & mo-
deratē habentibus, gallorū testiculū & alarū, & Sa-
xanles pisces, mollesq; exhibendi sunt: necnon
columbarū pulli. Hæc uero omnia, citra garum
& unum, in albis simplicibus coquantur iuri-
bus, quæ ex aqua, oleo, anetho, ac modico porti
constant: ad cocturā finē, salis paucillo adiecto.
Ceterū ante cibum quidem pluribus deambu-
lationibus est utendum: post acceptū uero cibū,
breuib; ac lentis. Oportet tamen nec multa e-
disse, nec statim post cibū sumptū inambulare,
sed post duas, aut tres, aut plures horas. Quod
si quando à uaporibus aut humoribus in caput
sublatis, reliquæ quædā supersint, in poris ipsis,
meatibusq; angustis impacæ, & ob id etiā per-
seueret capitis dolor, non rosaceo, sed utendum
primū chamæmelino est, moderatē calido: po-
stea uero irino. In balneo uero caput calida per-
fundatur, non modo ut aliquid eorum quæ cir-
ca ipsum consistunt, discutiatur, sed somni etiam
conciliandi gratia. Quapropter secundū etiam,
aut ternū, ad uesperam, balneum apparandum
est: post quod exhibendæ lactuæ ex aceto, citi
paucillum, aut omnino nihil dari additum sit:
uerū aqua assuā multa, ita ut aceti exequet:
nisi acetum sit planē aquosum, quale utique illi
desiderant: quandoquidem quod acerrimū est,
aliquem calorem sortitur. Post hæc uero poste-
ra die, quæ magis caput calcificat, administran-
da sunt: ita ut ad irinum, aliquando amuricū
unguentum, aliquando nardinum addamus.

At capitis dolor ob plagam conspicuam or-
tus, nihil est aliud quā inflammatio, quæ uon
ex plaga solum aut calū, sed absq; manifesta etiā
causa, iuxta omnes partes fieri ob affluxum hu-
morū consueuit. Si igitur plaga uulneris
aut contusionis existat causa, plures scopi erunt
ad inuenienda præsidia. Vnus qui circa uulnus
uersatur, quod, posteaquā fuerit restrictum
fibulis, gluantia & acientia phlegmone me-
dicamenta postulat. Secundus contusioni est in-
tentus. Tertius totus in doloribus est: qui interdū
quidem in ipsis solis percussus partibus
fiunt, plurimum autem ad uicinas etiam par-
tes se extendunt. Etenim pericranium, & eius
cū exterior, propriam continuamq; substan-
tiam habent, per totum caput extensam: ob idq;
sanē contingit uniuersum caput dolore affici,
præsertim si ad periosium membranam, quæ
cranio est adhærens, plaga ipsa penetret: cui me-
debimur diuidentes pericranium membranā,
substitutim illi os radentes, utq; illi rursus con-
crescat caro, curantes. Quod si ob cōmercium
illud quod per suturas periosion habet cum du-
ro cerebri inuolucri, etiam intra caluariam dis-
tribuat phlegmonē, non absq; periculo talis
dolor contingit. Conningit autem non rarū, ubi
quis ex sublimi cecidit, ut aliquid circa cere-

brum, aut membranas eius, rumpatur: quod ubi
cōtingit, adhuc amplius inualefcit ipse capitis do-
lor, affectioq; tota ægræ curabilis redditur, & pe-
riculum maius, magniq; præceps imminet. Opi-
um itaq; fuerit in his, nisi ætas prohibeat, uita-
lisne facultas appareat debilis, curationem à ue-
næ sectione auspicari: & conuenientibus capitis
irrigationibus subinde un, oleo dulci imbueres
lanam, capitiq; illam circumponentes. Quod si
aut per ætatem, aut uires, non liceat sanguinem
ipsum detrahere, deicienda alius per clysmum
est, tum ut eius excrementa uacuentur, tum mul-
tō magis ut reuellantur humores q; qui confue-
uerunt ferri ad affectas particulas. Postea uero
auxilijs utemur ad inflammationes congruen-
tibus. Si igitur membrana cerebri uulnerata fue-
rit, egregiē ipsam conglutinat (ut ait Archige-
nes) calamintæ succus infusus, & farina mi-
lij arida inspersa: deinde butyrum & rosaceum,
ac adeps: suillus infusus, uetusq; omnia in unū
cōmixta, tepescitq; & infusa. Hoc modo affec-
tos, à uino & cibis crasioribus abstinerē oportet,
maximē si correpti sint febri. Etenim affec-
tio ipsa nobis auxilia indicat: quantitatē autē
tem singulorū, particularemq; materię differē-
rentiam, tum affecta particula, tum ægrī tem-
peramentum cōmonstrat: necnon uitalis facultas,
deinde ætas, ambientisq; nos aëris temperies,
iuxta regiones, anniq; tempora, & prædominan-
tem anni constitutionē euariant. Porro ad phre-
ninos, quando quidem omnia, quæ extra calu-
ariam circa cutem atq; ipsum pericranū consi-
stunt, immunia ab affectu sunt, rectē, mea quidē
sententia, alijs pharmacis acetum miscue-
runt ueteres. Siquidem ad affectiones in pro-
fundo delitētesq; pharmacis diuersa ab his, quæ
affectibus in superficie hærentibus congruunt,
debent administrari. Exoluitur namq; omnium
ipsorū in transitu per profundū: & ob id ad
propria affectioni auxilia, aliquando cōtrarij,
& nocentia facultatis pharmacā temperamus.
Quippe acetum ex se, cum nec mitigandū, nec la-
xandi uim habeat, præter rationē miscetur auxi-
lijs his, quæ ad dolentem inflammationē admini-
strantur. Quia uero per fincput pharmacū pe-
netrare uolumus, ob id sanē aliquid eorū, quæ
in profundum deducunt, miscemus: interdum
quidem frigida facultate, sed tenuium partium,
præditū, cuiusmodi acetum existit: interdum
uero calida, quale est euphorbiū. Quocirca, dum
crasse membranæ cerebri nudæ instillamus ro-
saceum (quod fieri solet, ubi osiculum aliquid
est exemptum) solum ipsum leniter tepescitū
infundimus. Cū uero per citra denudationem, in-
tegra existente caluaria, rosaceum cupimus ut
per fincput ad membrā cerebri penetret, acetum
illi, ut ipsum perducatur cō, temperamus: cu-
ius uellemus facultas, tum per uiarum transi-
tum, tum per rosacæ miscellam, exoluitur. Iam
uero inflammationes quæ in capitis cute, aut et-
iam in pericranio consistunt, si quidem citra ue-
hementem dolorem accendant, per modici aceti
ad rosaceum mitionem iuuari possunt: laxen-
tur autem, si & magnæ fuerint, & dolorē uehe-
mentē induxerint. Ad hæc, rosacū cum aceto,

*Palmarum expro-
priate excita-
re dolorem capi-
tis.*

*Albi iuri com-
positum.*

*Balneum cuncti-
at feminum.*

*Capitis dolor
ob plagā ortum,
qui modico, sic
pos largiatur.*

*Dolor capitis
ex alio uulnere,
qui sepe exten-
ditur per peri-
cranij caput.*

*Capitis dolor
ex plaga, quan-
do cū illa peri-
cranij.*

*Meningem cere-
brali uulnerata in
conglutinatione*

*Afflictione fra-
ta profunda dis-
curia pharma-
ca ab his, quæ ha-
rēt in superficie,
desiderant.*

*Acetum cum mi-
scetur rosacæ
ad phrenitidē.*

*Fracta cranij,
cum ad osiculi
laxi uisum te-
pore in rosacæ
meningem.*

*Acetum quan-
do sit rosacæ mi-
scendum ad af-
fectu capitis*

*Acetum rosacæ
miscellam, quibus
profus, ut quibus
obstus inflamma-
tione no.*

incipientibus: in uigore uero consistentibus, ro-
saceum solū administramus: quemadmodū etiā
in induratis, absinthium ei atq; pulegium misce-
mus: nam quæ absq; duritie iam decreuerunt in-
flammationes, pharmaca laxantia desiderant.
Porro ad dolores capitis, in quibus exicare est
animus, commodissimū caraplasma ex lolii fari-
na & adipē asserino conficitur. Sciendum autē
est, myrrhæ odorem plurimus etiā sanis dolo-
re capitis conciliare: unde eos ipsos qui iam
caput dolent, non parum offendet. Opiō autem
eo tantū tempore uti cogimur, dum præ dolo-
ris uehementia æger de uita periclitatur. Ex-
tinguit siquidē sensus, maximeq; solidas partes
offendit, adeo ut postea correctio sit opus.
Cū autem difficile sit, ut qui homo est non in
multis hallucinetur, quædā uidelicet penitus ig-
norando, quædā malē iudicando, quædā negli-
gentius scriptis tradendo: mirum cuiquam esse
non debet, si aliquando deliquisse comperiatur
Archigenes, in ijs quæ de curatione capitis dolo-
ris conscripserit.

De capitis dolore à uentriculo exorti.

Nonnulli autē uel si modicus humor in eorū
uentriculo colligatur, & præsertim circa os eius,
statim caput dolent: atq; ob id, si diutius à cibo
abstineant, offenduntur. Augetur quippe ef-
fluentibus eiusmodi humorum malina. Cū igitur
huiusmodi affectus capiti proprij non sint,
sed ab humorum noxijs uaporibus à uentricu-
lo uolitantibus exoriantur: quemadmodum et-
iam ob id genus fucos, alijs suffusiorum sym-
ptomata eueniunt: capiti adhibenda remedia
non sunt, sed iocelerimē qui in uentre cōstant
fucci, uacuandi. Vacuantur autem in ijs qui ad
uomitum sunt proclues, faciliē ab aque potu:
æger uero uomentibus, difficilior. His igitur co-
nabimur q̄primū cibum boni fucci, ac uentricu-
lo cōmodum exhibere, si res ita ferat, à bal-
neo: si non, ante balneum tantum cibi offere-
mus, ut non lædantur inde postea lauantes. A
cena autem modicum absinthij in potu dabi-
mus: postbidie uerō, in posterumq; similem ui-
ctus rationem illis instituemus, donec exactissi-
mē concoquant. Quo tempore iam licebit illis
modicum panis præbere circa tertiam aut quar-
tam horam, aut citius, aut tardius: sic tamen, ut
sanis amplum spacium ad consuetam balnei ho-
ram intersit. Quod si qui panem absque obso-
nio edere nequeant, his oliuas, aut palmulas,
aut uuas, aut tale quippiam addemus, iuxta na-
turæ cuiusq; proprietatem. Cæterum ad prauo-
rum in uentre colligendam succorum copiam,
plurimū conducit tum imbecillitas cōcoctricis
potentior, tum oris uentriculi infirmitas: quem-
admodū etiā ad capitis hinc dolores gignen-
dos, tum facilitas sensus, tum caput ad eiu-
smodi humorum uapores insipientios promptum:
scitū etiā & in nonnullis oculi. Qui igitur pro-
pter acres humores caput dolent, mordacem
dolorem, uon tensionem, percipiunt: at fames in
tensionibus comoda est: contraria autem ijs,
qui mordaces humores collegerunt in ore uen-
triculi. Quum itaque hic mordax humor fue-
rit amarus, pallida & flaua bilis uocatur: quæ

ob leuitatē insitam sursum fertur, ad os uentri-
culi: cū uerō pituitosus, aut acidus, aut salsus
fuerit, magis in totius uentris spacio cōtinetur:
ac fuerit sanē optimū, si in fundo uentris is con-
tineatur. Omnū autem est pessima constitutio,
dum uitiosi humores, uentris tunicis ineludibi-
ter sunt defixi, & imbibiti: quibus educēdis opti-
mum remediū est hiera picra, cuius talis sit com-
positio: Aloës drach. c. cinnamomi, spicæ nar-
di, xylobalsami, chizæ mastiches, asari, & croci,
sing. drach. vi. Præstantius autem est phar-
macū, ubi minus de aloē additur, minusq; etiā ex er-
oco: quandoquidem nōnulli ex usu ipsius obla-
duntur capite, id quod sæpe ex solo eius odore
perpetitur. Quare optima erit ea compositio,
quæ aloës drach. xc. croci quatuor receperit: qua
sanē ipse uxor. Præstat etiam pro asaro carpesū
conijcere. Propinatur ad summū ex pharmaco
drachma una cum aque calide cyathis tribus:
minimū uerō, dimidiū eius præbetur. Cōfert au-
tem hoc pharmacū ijs qui suffusiori afficiuntur
symptomatis, & mulieribus quæ nō pro digni-
tate purgāt. Quemadmodū autem in uentris
& intestinorū regionibus eo calor is dissimilariū
dolor oritur. Dissoluantur autem ipsam, et odenta,
disscantia, disidentia, uehementer calfa-
ciencia, atq; refrigerantia. Si igitur erosio sit, aut
punctio sit sensum percipiant ægri, acredo uel
humorū, uel flatus, causa putanda est. Si uerō ci-
tra morsum tendantur, tensio ipsa uel ab spiritu
stultento, uel ab humoris colluie, oboritur:
quo in genere plegmone erysipelasq; cōstitit:
plegmone quidem, ubi plurimū sanguinis affe-
ctus particulam occupat: erysipelas uerō, ubi
biliosus fuerit is humor. Quod si ab utrique re-
dundantibus aliqua pars repleatur, aut inflam-
matio erysipelatoīa, aut erysipelas inflammatū ta-
lis affectus erit. Maximē itaq; artis curandi con-
iectura in affectionū cognitione consistit: quæ
ubi in uentre fuerint, curationē nō coniecturali-
ter, sed scientificē indicant: cum hoc quod etiā
cognoscere datur, q̄ ægrē aliquæ affectiones me-
delis cedant: in quibus ut utamur semper reme-
dijs ab indicatione profectis, rationi est conso-
nū, tameti nihil uisare in principio uidean-
tur. Aliquando enim adeo uehementer in angus-
tis meatūs flatus uaporosus, atq; cō adhuc ma-
gis uiscidus crassus ue humor impingit, ut mul-
to tempore ad curationē sit opus. Ac sanē quæ
sic infarcta sunt, attenuare oportet, dilatate
mecus per quos excernant, habita simul pro-
uidencia, ne quid aliud amplius infuset: utq; pars
affecta corroboret, ne ipsa etiā stultentum gi-
gnat spiritū. Qui igitur primi ad eiusmodi affec-
tiones pharmaca cōposuerūt, merito habuerūt
opus materia uaria: si quidem influentē substan-
tiam, siue humor, siue uapor ea sit, repellere ne-
cessarium

Myrrha odorem
conciliare dolo-
rem capitis.

Opiō quando
ad capitis dolo-
rem uis debita
est.

Humorem in
multis halluci-
nari.

Capitis doloris
ob uentriculi cō-
stentum aborti,
& indurati, &
corati.

Vitiosū facies in
uentriculo colligenda, quæ con-
ferant.

Panem aduer-
sari qui mor-
daces humores
collegerit in ore
uentriculi.

Hiera picra op-
tima medica-
mentum ad expor-
gandos humores
in ore uentri-
culi insitos, de-
scriptus.

Croci uideri
fuerit caput.

Hiera picra
quibus cōgruit
afficiantur.

Dolor ualde ex-
tremus.

Continuū etiam
quæ faciant.

Plegmone si à
sanguine.

Erysipelas ori-
tur à flaua bile.

Tumores compo-
siti.

Coniectura ar-
tis medica, in of-
ficientis cogniti-
one consistit.

Præsidia opti-
ma earū sēpe in
principij uel
uicari uidean-
tur.

*Impacta esse
quida, autem
da, distendit*

cessarii existit: impacta uero cōcoquere & attenuare, eandem ipsam discutere: ac uilominus, imò longè magis, affecte parti robur inducere, ne uidelicet qd influit, suscipiat: utq; attenuari excedat, impactumq; concoquat, atque subtilius reddat. Ergo in propofita dispositione, si dolorificus calor una cum spiritu subtiliō prepolleat, in principio quidem repulsoria curatione est utendum, quæ ex facultate refrigerante constat. Quod ubi factum moderate est, ex mitigatorij & cōcoctorij quippiam ad repulsoria miscere oportet: dein disculsoria addenda, ita ut paulatim repulsoria detrahamus, donec pharmacum ipsum plurimū quidem digerens attenuatoriumq; reddatur, minus autem concoctorium & mitigatorium, minimum uero repulsorium. Portulaca igitur refrigerantis & aquosæ substantiæ est: minus ea polygonū: in solano tantum crassæ & terreæ est admittum, quantum astrictionis. Aeternum repulsorium simul & attenuantiam, imò & disculsoriam facultatē sortitur: utpote quod secundū temperiem, frigidaque quadam tenuium partū præpolleat, nō secus q̃ exquisitè serenus boreas. Rosaceum porrò, repulsoriz, cōcoctricis, mitigatricis, ac deniq; disculsoriz facultatis est particeps. Vt ergo sermonem iam habitū repetam: neq; in biliosis causis iniungenda est inedia: neq; utendum uenæ sectione, si puer aut senex sit æger, aut uirū imbecillitas adfit. Licebit autem uni ualidis clystims, quodd maxime meli possint reuellere à capite, uacuareq; non modo quæ circa uentrem & mesenterium consistunt, sed etiā quæ in simis hepatis latent. Com mendat autem Archigenes irrigationes ex ruta, oleo, & aceto intrita, ad dolores capitis: sicuti & succum bacarum lauri cum aceto & ruta. Scien dum uero est, aridam rutam esse multo acriorē, & calidiorem uiridi. Qui caput ob humorem biliosum dolent, q̃ signa similia sunt eis quæ ab ardore proficiuntur. Accedit his maior morsus, & faciei pallor, & nonnunquā oris amaritudo. Aetati autem uigoris, & temperaturis calidioribus, & uitæ solitæ, & ijs qui stauam bilem accumulantes, hæc affectio præcipue contingere solet. Itaq; balnea temperata, & unctiones, & potus dilutus, eis exhibenda sunt, omniūq; uicibus ratio tum * humidior, tum boni succi, constituen da. Euacuandus item biliosus humor per abstinētiæ cremore est, aut per aloē, & per ipsam picram antidotum, per se datam, aut modico scammoniij adiecto: uel per cataplasia ex aloē confecta. Ulinenda frons paphio croceo, aut appellata Trigono, aut aliquo alio his simili. Si cum uenerio corpore caput confortij lege afficiatur, prospiciendum illi est. Igitur si plenitudo humorum, ac maxime circa uenas constitit, tandem uenam. Si uero magis qualitas inualuerit, utemur purganti pharmaco. Si caput uni tantū parti condeat, ut hepati, uentri, aut ipsius oris, illis in primis opitulabimur: nempe calida in ipsi præpollente intemperie, panem ex diluto uino exhibentes, foribonesq; ex alica: ac foris etiam uteantes irrigationibus, quæ tum refrigerent, tum firmiudine addant. At si ob uiscidos & crassos in uentriculo cōrentes humores caput

quis doleat, etiam hos exturbabimus, acetū mulsum in potu præbendo. Ex hyssopo etiam originolij potionibus, & quæ his adhuc ualentiores sunt, magistis incidendi uel præditæ, utemur: nec non à radiculis uominis, irrigationibusq; & cataplasmaris calidioribus. In doloribus autē capitis qui ab initio in uasculis q̃ febribus, uena secunda est, post primā aut secundam remissionē, nisi quid impediat: & præsertim in corporibus bouæ habitudinis, & multo sanguine reduntantibus. Quod si serius post septimā diē dolor ipse prehenderit, alio prius abundè per clysterem foluta, cucurbitulæ ad occiput, aut ceruicem, sunt affigendæ: caputq; irrigationibus ex oleo fouendum: rosaceum quidem, & cum modico aceto, in calidioribus, & tempore æstiuo: chamæmelino uero, in frigidioribus habitudinibus, ac hyme, quiuta parte acetū illi adiecta. Ulinenda frons in frigidioribus quidem est, ex cyphi: ex crocōa gmate autē, in calidioribus. Porro uitanda sunt in omnibus capitis affectionibus, ea quæ subduntur: nepe uiscis semē, abstinēti succus, lac in potu, glandes quærcin in cibo, oliuæ nigra, arbuti fructus, eruum, quod etiam excoluit articulo: ampulius autem offendunt myrrha, thus, liederæ caucina. Mentē etiā perturbant lentissī fructus, crocus, peucedanū, ciclamini sicca cum uino epota. Syrax modicus quidē potatus, tristitiam uultus discutit: multus uero, somnos turbulētos conciliat.

De Cephalæa.

Cephalæa, inueteratus & ægrè cedens capitis dolor uocat, qui ex leui occasione maximæ exacerbationis habet, ad eū neq; strepitū, neq; uoces uehementiores, neq; lumen splendens, neq; uini potum, neq; odoramenta caput replentia, ægrī perferre possunt, neq; itē mori: sed in quiete & tenebris decumbere ob doloris magnitudinem uelint. Etenim tanquam à malleo percussī si bi uidentur. Sunt qui ueluti contusī ac distendī sibi ea quæ circa caput sunt, sentiunt: non paucis uero usq; ad oculorū radices ipse dolor progreditur. Habet autē hæc affectio aliquid quidem continuos dolores, aliquando uero exacerbationes, & interualla. Manifestū igitur est, hanc affectionē consimilē aptitudinē capitis, ut oblectatur facili, habere, quemadmodū in cephalalgia. Verim ad maiorē imbecillitatē deueniunt in hac affecte particulæ capitis. Ac sanè quidā ex sic affectis, cerebri inuolucra dolitant: quidā pericranij duntaxat. Dolores igitur cum grauitate, multitudine humorū significant: cum mordacitate uero, aut humore, aut uaporū accredit: ut cum pulsū, ob ortū inflammationē: at cum tensionē, si quidē citra grauitatē & pulsū accidat, spiritus renuis ac statulenti multitudine indicat: cum pulsū uero, membrano si corporis inflammationē: at si cum grauitate distentio accidat, humorū multitudine intra membranas contentam arguit. Rursus, dolores quidē in superficie hærentes, pericranij affectionē significant: qui uero in profundo sunt, cerebri inuolucron. Qui uiscusq; autē affectio intra caluariā est, ijs usq; ad oculorū radices dolor extenditur, propterea quod oculorū tuniceq; ex cerebri inuolucris suam

*Capitis dolor
enim sibi ab
itis diffinitionem
curatur.*

*Cucurbitula
quoniam de affigenda
de occupis.*

*Capitis in omni
dolore qua sint
ritanda.*

*Crocus pertur
bat mentem.
Syrac facul
tas.*

*Cephalæa
dysipena.*

*Cephalæa mag
is deiciat facul
tatem, quoniam ce
phalalgia.*

*Cephalæa rari
a symptomata
a causis di
uersis produca.*

*Dolor capitis in
tra caluariam
sicut, cum exten
datur ad oculo
rū riq; radices.*

Aetiofacilis.

*Rosa frigida
tem esse tenaci
partium.*

*Rosaceum facul
tas.*

*Inedia non esse
ritanda in cau
se biliosæ.*

*Vena in quibus
non sit ritanda.*

*Clysteres for
tis ualide reuel
lere à capite.*

*Capitis dolores
ritanda.*

*Capitis doloris
à bilis exten
ditur curatur.*

*Bilis quibus
decompositi pur
ganda.*

ducunt originē. Si uerō putrefactus humor calidior fiat, cum febris capitis dolor inuadit. Febricitant autē omnino, & qui dolent propter inflammationem. Si igitur tonus corporis plenus sit in causa doloris, sanabis ipsum, corpore uniuerso uacuato. Si uerō imbecillū existens caput, sublatos ad se humores ac uapores susceperit, materiam reuellere oportet in totū corpus, atq; ita mederi particulis. Reuellemus itaq; & clysmis, & uncualis extremorū, & pluribus infernariū partium frictionibus, interdum etiam sanguinis ex cubito detractiōe. Quid si amplius redundare sanguis uideatur, etiam referata in naribus uena, & sanguine, quantum par sit, uacuato. Dein hieram dabimus exacuatam: posteaq; apoplegmatismas elicientibus pruitam, & medicamentis quae naribus inferunt, utemur: qualia sunt quae ex elatrio, & cyclamini, cum lacte & porro apparant. Caput autē curabis, quādo quidem reuulsorij non oportet, per repulsiōis irrigaciones. Ceterū post totius corporis euacuatiōē, uteris caput uacuatibus: dein ijs qui firmitudinē addant. Repellit igitur immaturum oleum, rosaceumq; perse, & cum aceto, & ex papaueris capitulis, & oleis teneris germinibus, & hederæ cuminumibus, & mentha uiridi præparatū. Applicetur autem remedia tepida quidem, ubi frigidior & crudior multitudo humorū existit: frigida uerō, ubi calidior, biliosiorq;. Digerit autē oleū dulcisissimū calidum, & magis inueteratū, itemq; sicyonium, Si uerō crassior sit copia humorū, ipondylium, aut serpyllum, aut pulegiū comam, aut calaminthen, aut mentham, oleo incoquens, multitudinē euacuabis. Eadem si ex partem artium firmitudinē addunt: quapropter usq; ad perfectam curationem ipsis utendum est. Omnino porro longē maxime discuit, perfectē corroborat, uerbena recta oleo incocta. Consequenda etiā ad eam crocodiladis, præsertim iuxta aquas nascentes, radix. Maxime etiā conferunt usq; hydrya aselli nascentes, si oleo incoquant. Aduerte autē, caput papaueris usum, tempestiuum esse incipiente affectione: nocere autē, si ijs in dolore inueterato utantur. Inuant uerō non insistentia fomenta tum ex semine lini & rosaceo, tum etiam confecta ex milio. nam quæ ex sale sunt, ob grauitatē capiti negotium faciunt. Archigenes inter cataplasmata uaria, iusticis semen, perseæ uiridis folia, & myrrhæ æquis portionibus mixta, excepta ijs Aegyptio uingūto, fronti admoere præcipit. Ceterum in sola Alexandria ipse perica m arborē uidit, cuius fructū in Persia quidem letalem esse, in Aegypto autē innocuū, iūnt qui cōtendunt. Porro sanguinis à locis affectis detractiōis cōuenire in affectibus inueteratis, non Archigenes modō, sed omnes ferē medicī conserunt. Verū cucurbitæ occipiti affixæ, ex reuulsorij auxilij sunt, cum humores ad oculos, aut ad anteriore capitis partem ferri consueuerit, auertere propterea. Iubet autem Archigenes ut sternutatoriū quatuordecim caput, fasciolaq; circumposita collo, spiritu colubino nō moliamur. Iam uerō ad affectiones frigidas inueteratas, equidē medicamentā ex thapsia & sinapi soleo adhibere: minimū autem ad calidas. At chianæ medi (quā anthemiden

uocit) flossem quidem, olfactu auxiliari dolenti capiti, ait Archigenes: folia autem nocere.

Sternutatoriū ab Asclepiade scriptum.

Veratri albi, rad. cucumeris syluestris, struthii, sing. partes ij. acoris, acori, nitri ubei, euphorbij, cumini Aethiopici, sing. partē i. trita infusata. Medicamen ab eodem traditū, quod mansum caput purgat.

Piperis albi, origani, staphidis syluestris, casie, 30 sing. drach. ij. excipiant passulārū exacinarū, aut caricarū carne, & mandenda exubeant. Ceterum nō statim à principio efficacissima adhibere cōuenit, sed à debiliōibus auspicari. Porro fortia pharmaca, quibus ad mouenda sternutamenta utimur, mitigat oriorū admistiōe lenita, moderata sunt. Ob id quædā ipsorū mulierū hāc recētī & qua dūo: post hoc oleo dulci deinde betæ succo: & anagallidis quæ florēt caruleū habet, indein succo: atq; ita sensim in usu eorū progredior, donec postremū etiā per opobalsamū talia dissoluo. Ego autē melanthij soleo insundere naribus: ab quando quidem aceto acri præmaceratū, aliqūdo oleo ueteri intritū. Interim uerō dum æger erithinus uisit, habeat os aqua plenum.

De hemicrania.

Hemicrania uerō affectio dolorifica est, dimidia tantū capitis partē infestans, interdū quidem dextram, interdum autē sinistram: quæ futura extēsa secundum illius longitudinē, ter minatur. Vt plurimū autē per circuitus exacerbatur, influxu uaporū, aut humorū, causam dolori suggerente. Quidā igitur ipsorū circa temporū musculos uehementē dolent: quidam dolore ad uulterius progredientē habent. Sunt qui ad ocellienter crucient, ut ne manus quidē contactū facile ferant in quibus palam est, pericranij affectum esse, neq; eius cutē omnino immūne ab affectione existere. Rationi igitur cōsentaneū est, uaporū aut humorū, aut utrorūq; influxū, aut à cerebro & illius inuolucris, aut ab uniuerso corpore illuc trāsmitti. Quapropter ubi quæ hemicraniam curare aggreditur, prius quali purgatione, aut uenæ sectione æger indigat, consideret: atq; ita deinde ad capitis auxilia progrediendo, tum per digitos suæ manus, tum per lintēdā, dimidia frontis partē, & eam maxime quæ circa temporis musculū est, conficando exalfaciat: id quod ante exacerbationis tempus faciendū est. Post exacerbatiōē uerō, pharmacis hemicranicis dictis utendum: si quidem multa caliditas in doloribus percipiat, ijs quæ refrigerans quipiam habent: citra uerū lancis, eis quæ sufficiēter exalfaciūt. Vtriusq; tamen aliqūd ex ijs quæ robur & firmitudinē addunt, misceat, quod astringentem uidelicet facultatē fortiat. Porro ex meis præceptoribus quidam ad hemicranias inueteratas utebatur piperis albi, & crocomagmaris, singulorum drachmis duabus, mistis cum euphorbij drachma dimidia. Cū autē citā facultas euphorbij exoluitur, in huiusmodi sanē medicamentis nō est utendū ueteri. Est autē candidius, quod recētē est: nam qd inueteratū existit, flauiores aut pallidiores sibi colorē cōtrahit. Similiter etiā & columbarū turricolarū, sibi uisū quærentium, stercoreis, & atramenti scriptorij, licebit addere

Sternutatoriū ab Asclepiade scriptum.

Apophlegmatismas Asclepiades.

Erithina quibus leuari debet liquoribus.

Os aqua replendum esse, dum quæ erithinus uisit.

Hemicranicæ de scriptio.

Hemicranicæ causa.

Hemicranicæ curatio.

Hemicranij in ueterata remedium.

Ex phorbium recētē quidē esse candidum, pallidum autem inueteratum.

Reuellendi à capite modo de uerbi.

Venam reseratam in naribus conferre ad dextram capitis.

Erithina.

Caput esse vacuandum post totius corporis vacuationem.

Repulsiōis.

Digermaia.

Verbena recta fasciata.

Aselli.

Papaueris capitibus quādo sit uobis utendum.

Sal est ad capitis fomenta incipiam.

Perica fructus in Persia letalis esse, in Aegypto autem innocuus.

Cucurbitulis in affectibus capitis quādo utendum.

Colubina spiritus.

addere utriusq; dimidiam drachmam, ex ipsiq; omnibus aceto accerrimo dilutis, cōficere medicamen hemicranie sanāde idoneū. Ad hanc aut rem, Pergameni nostrum atramentū multo est præstantius. Aliud pharmacū, ad hemicraniam, & omnē inueteratam capitis affectionē summē utile. Croci drach. xv. chalcanti drach. x. aluminis scissilis drach. xij. myrrhe, opii, omplacij, sing. drach. iij. gummi drach. xv. omnibus tritis uinum Falernum adijce, & rursus tanquam collyrium tere, deinde in pastillos redige. Postea uerō ex posca dilutus utere. Sæpe simpliciter euphorbij illitione misti cum olco & cera, sum usus. Sufficit autē ad libram olei cuiuspiam tenuis, ceræ quadrantem inijcere, & euphorbij unciam vnā: quo quidem medicamine utendum in ea tantum hemicrania est, quæ a frigidi causa oritur. Iauat etiam hœs, si oleum tepidum instilletur in aurem, euphorbij vnciā, cum libra olei prius temperata.

GALENI PERGAMENTI
de compositione medicamentorū secundum loca, lib. III.

De affectibus aurium.

Aurium dolores nōnulli quidem sunt ex frigidityte: nonnulli ob inflammationē, uel cūns meatū auris ambiens, uel etiam nerui auditorij. Quæ uerō ratione inflammatio ipsa partes inflammatas diffundens, dolorē excitat, eadem statulentus spiritus, transitū non habens, dolore cruciat. Consimilis etiam sit dolor a serofas humoribus in toto corpore genitis, ei qui ex mordacitū lumorū forisfucus aduenientium illapsu cōtingit. Dolores igitur a sola ore frigidityte, calcificentia quam celerimē curant. In quem usum solent nonnulli rustici exenteratas cepas olco replere, & in feruenti cinere modicē calcifacere, atque ita auribus ipsū infundere. Alij nō cepas modō, sed allium etiam oleo frigentes postea ipsū instillāt auribus. Ego uerō euphorbio omnino modico, ad multū uetus oleum admisto nitro, ueluti etiam pipere exquisitissime trito. Prodest etiam amaracini oleum ipsis infundi, & optimū nardum. Quod si aliquod oleum tenuiū partū, in quo rutū præcoxeris, auri infundas, magnopere nueris. Magnificē autē eos mitigat oui candidū: quo etiā ad lippitudines nimirum: itēq; lac muliebre. Plurimū iuuat item ex adipē asinerio, uulpinorū: infundi tamē omnia debent mediocriter calida. At si inflammationē adit, nardini uinguentū, cum pharmaco appellato Basilico, cōmodissime infunditur. Porro medicamen Basilicon, cōmo nomine dicitur te trapharmacū. Est etiā & Cōmagenum perutile, & ex adipibus pharmacū. Cogente uerō dolore, necesse est enī ipsi que sensum stupefacit, uti. Miscet autē opii muliebris lacti, & oui candido: que ipsa per se, sæpe aurū inflammationibus contulerunt. Miscetur etiam & castorio opium: uerum multo ante usum tempore, præparatū id esse oportet: & miscetur quidē, in uehementissimis doloribus, pari in minoribus autem, duplo. Li- quor quo hæc diluēt, sit sapa ex melle: multo nāq; magis hæc, q̃ dulcia uina, dolorē sedat. Verū

ego nullum pharmacū dolore uexatis infundo, neq; etiā per lanam instillo: nimirū experientia edoctus, quod præter neq; omnino contingere doloris tempore auditorij meaturum. At remisso dolore, per anniculare specillum, obuolutū lana mollissima, partē dolentē fouco, pharmacumq; inijcio modicē tepectū in aurisfollis specillo: postea uerō forisfucus tum orificio auditorij meatus, tum uniueris auri, mollem lanam impono. Iam quæ ex fomentis crassa & spissa fuerint, cuiusmodi sunt spicata & foliata unguenta, diluēda sunt unguēto nardino: uel si ritas sit, & calor sensus ægrum in aure inflamata infestet) rosa eco, uel amygdalino. Confititur bonū rosaceū ex olco immaturo, salisq; experte, in quo plurimæ rosæ sint macerate. Si uerō statulentū spiritū, aut humorē crassum & uiscidū, qui transitū non habet, inclusum esse concieris, etiam ex pharmacis liberantibus ab obstructione, quipiam admisce. Porro frigidityte antegressa, spiritus statulentus colligitur: grauiate uerō capitis, cibisq; pituitosis & mali succi, frigidi & crassi humoris: quibus si accedat frigiditytas, dolores contingunt. In his igitur spuma nitri, & nitrū ipsum molle, cuiusmodi aphroditrū, & oleum amygdalini, rationabiliter in pharmaca auricularia miscuntur. Ex hoc genere est utrunq; ueratrum, & struthium, & amygdalæ amaræ, & ex tribus aristolochijs, que cunctis fuerint ad manū, & cis illyrica. Inijcies autem & cinnamomū si habueris: aut, si id non habearis, casiam, tum eam que Zigir, tum que Moros uocatur: ac præterea Carpesium. Aurium etiam meatus ab obstructione liberant, que lapides in rebus atterunt: atq; omnia breuiter, que tenuium partū substantiam absq; mordacitate sortiuntur. Ex quorū numero est etiam cucumeris syluestris radix, iremip bryonijs, & ari, & dracunculi, & centaureæ, & polij, & omnino amarorū omnū. Rursus, moderate aurium inflammationes, & nō pulsantes, rosaceo & aceto simul temperatis, tepectisq; atque infusis curantur. Glauciū etiam ex aceto in cote medica tritū, doloribus a modica inflammatione ortis opitulatur. Præstat autē pastillum ex glauccio, multæ sanē utilitatis pharmacum, prius præparatū habere: qui sit ex glauccio probe cum aqua pluuiali trito, deinceps in pastillū coactū, excitatū. Licebit uerō de cimāquintā gummi ad glauciū portionē addere, ut mediū compingi in pastillū possit. Quin & collyria ex glauccio codē modo cum aceto trita, eisprofunt, auribus instillata: atq; his nihil minus collyria ex croco. Videra aurū recentia, tum glauciū solum cum aceto tritum curat, tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco & ex rosæ cōfecta: quemadmodū etiam q̃d Nali dicitur. Curat item ea Damocratis collyriū ex myrrha. Quæ uerō pure manēt circa do/orē, atq; id moderate patiunt, ipsdē medicamentis curant. At que fortiter affligunt, per eiusmodi qualis est pastillus Andronia, & qui ad Masam referē, sapa, modicoq; aceto dilutus. Quod si hæc ab ipso morbo uincant, scoria ferri ad plurimos dies in sole ex accerrimo aceto cōtrita, lœnigatq; est intrepidē uendū. Huiusmodi etiā ulcera pastillo meo ex chiara combusta, ipse ali-

Dolore affligente, prolixi omni ne non tangere auditorij meaturum.

Rosaceo optimi compositionis.

Dolore aurium a statulento spiritu, aut a crasso humore, excitato, curatio.

Aristolochie tritæ.

Cassia duplex.

Aurium meatus obstrictus que reijciunt.

Aurium moderate inflammationes rosaceo et aceto simul temperatis curantur.

Pastilli ex glauccio, ad inflammationes auris.

Aurium recentia aurium remedia.

Aurū parulens aurium curatio.

Pastillæ charta combusta.

Pergameni per Galeni.

Hemicrania si quæ a frigida causa oritur.

Dolore aurium quo causa exenterare possit.

Dolore auris a frigidityte uel remedia.

Aurium inflammationem matarum curatio. Basilicon pharmacum. Tetrapharmacum.

Opium quibus miscetur debet ad auris inflammationem.

Sapa ex melle dolorem sedat.

Papaveris succum aurium dolores mitigat: et folliculæ autem non sanantur, nisi ex acido quodam.

Stupesciunt enim quando coqueatur res medicamentum.

quando curant. Porro per papaveris succum mitigantur aurium dolores: haud item affectiones iuvantur: nisi forte ex accidente: quis eas iuvare dixerit, quod nimirum sedato dolore, atque inde somno sequuto, natura ipsa affectus dolorem gignentes concoquat. Per aurium autem inflammationes, gallinaceus atque asperinus a depra, si quidem euacuatum corpus inuenerint, & humorum, qui inflammationem excitant, non amplius influentem, dolorem leniunt, affectionem auxiliantur. Si vero humore adhuc fluente adlabentur, affectioni quidem nihil opitulantur, leniunt tamen doloris symptoma: ut si ob humorum acredinem aliquis morbus contingat. At pharmacæ ex papaveris succo omnia, sensum stupesciunt: & ob id sanè tunc solum illis cogitur uti, ubi nullum alium mitigantium doloris contulit. Miscetur autem castoreum papaveris succo, ut vehementem eius frigiditatem terendant: quo nomine etiam meconium ipsum, & quidem rectè, nonnulli torrent: quoniam fatius mihi uidetur uti illo minime torrefacto, inueterato tamen, & cum castoreo permixto. Porro galbanum sulfino unguento dilatum, mellis & rosaceo commistum, adscutit citra molestiam aurium inflammationes, in quas nihil fuit iam amplius, doloribusque à frigore opitulatur.

Ad vehementes aurium dolores medicamentum ab Andromacho scriptum.

Castorei drach. ij. succi papaveris drach. iij. opopanax drach. ij. spumæ lycij drach. i. passio excipit, & tepescit utitur.

Aliud eiusdem ad purulentas aurium & veteres affectiones.

Fabæ Aegyptiæ internæ amara, aluminis scissæ, piperis albi, spumæ nitri, croci, opij, malicorij, myrrhæ, thuris, nardi, sing. drach. ij. castorei drachmā i. aceti & mellis quod sit satius. Conficito.

Aliud eiusdem, ad dolores fluctuantis, & aurium sonitum congruens.

Nitri, myrrhæ, sing. drach. i. rosacei cyathi i. 40 aceti tantundem: simul tritis utitur.

Aliud ad aurium sonitus.

Veratri albi drach. i. castorei obolum i. spumæ nitri sesquibolū: tritis cum aceto optimo utere.

Aliud ad purulentas aures.

Alumen scissum usum, & myrrinam cum melle terito, & prælorem auriculæ pharmacum lana exceptum imponito.

Auricularis compositio probata, ex Apollonii libris.

Myrrhæ, thuris, sing. drach. ij. nucum amarum drach. i. spumæ nitri drach. ij. aluminis scissæ lib. malicorij, sing. drach. i. spicæ nardi drach. ij. aloës drach. ij. uini mulsi veteris cyathi in. Arida trita uino mulso admisceto, & cocta in stanneo uale reponito, ac tepido utitor.

Ad carnem excrecentem in auditorio meatu, quo usus est Heraclides Tarentinus.

Aeruginis rase drac. viij. squamæ xis drach. iij. mellis hemina dimidiū. Arida trita, ac melle excepta, donec rubescat, cogro, & ablaris utitor.

Aliud ad sanguinis ex auribus eruptiones, Heraclidæ Tarentini.

Marrubij succum exprimito, & aceturum dilu- rum infundito. Aut mali punici in aceto cocti

succū exprimito, infunditote. Aut polygoni succum cum modico aceto. Ad uermes innatos auribus, ueratrum album cum melle immute, aut aridum infusum: aut rubi succum infunde.

De sonitu aurium.

Ex sonitibus aurium, alij quidem, spiritus flatulenti sunt soboles: alij uero ob exquisitū sensum audiendi subrilatē sunt: quemadmodū etiam in oculis oriri solent suffusorū imagines, ob uapores exhalantes ab ore dētriculi. Ceterū neutrius affectionis exacta cognitio haberi in principio potest. Porro si in febribus sonitus fiat, minime interturbatū sunt: ut plurimū nāq; statim sedantur. Si uero ob flatulentū spiritum, cui non pateat exitus, sonitus fieri suspicatus quis fuerit, & ob hanc rem dissecantibus, attenuatoribus, ac discussoribus ad moris pharmacis, nihil cōtulerit: simulq; apoplethmarismis usus sit, & uniuerso prospexerit capiti: huic merito in hac suspitionem inclinatū animus erit, uidelicet sensus audiendi exquisitam facilitatē, causam eius rumoris existere, præsertim si acuto audiendi sensu præditus esse eger appareat. In talibus igitur, ex sensum stupesciētiū quippiam soleo admiscere: cuiusmodi est mādragoræ, & papaveris succus.

Ad sonitum remedia ab Archigene prodita.

In sonitibus repentinis acetur cum rosaceo instilla. Aut cuminum, & oleum, crassitudine mellis. Aut radices syluestris cucumeris succi. Si uero protrahat, omnibus amaris, acribus, attenuatoribus & discussoribus, quibus urimum ad dolorem ex crasis humoribus ortum, utaris, singulis in aceto coctis, admiscitoq; melle. Aut reclinato ægro, & nitro trito in aurem inaspero, acre acetur infundere tepidum, ac postquam feruere desierit, exterge lana, & nucū amararū succū infunde, lanaq; obtura. Ceterū quibus ob maximā ad audiendum facilitatē id genus sonitus fuit, castoreum & cicutæ semen cum aceto trita instilla.

Ad auditus grauitatem.

In surditatibus, qui exiguas quidem uoces omnino non audiunt, magnas autē uix percipiunt, hoc ipsum symptoma ualde suspectū habere oportet: paulatim nāq; temporis progressu augescens, perfectā surditatē inducit. Quapropter per hieram purgati sunt, & per catapona ex colocynthide: pituitaq; eis per apoplethmatismos detrahenda, & caput reficandum est, eiq; ut robur addatur, omni studio curandum. Utendum enī attenuatoria uictus ratione. At in ipsam aurem pharmacā injicienda sunt, que crassos uictus dosiq; humores cōmnuant, & dissecant. Cuiusmodi existunt hæc, quæ Apollonius prodidit: Caprarū succo & resina oleo dilutis, utitor. Aut oleo nucum & resina misce pariter utitor. Vel adipem aserinū, & sel bubulum, ac laurinū, ex æquo mista instillato. Porro surditatē cōtrarijs præsidij habent opus, ijs qui aurium doloribus infestantur. Quippe in doloribus affectæ partes exquisitam quietem desiderant: surditatē uero, uehementē motū postulant, trāsmutationemq; in contrariam ei, quæ iam adeit, dispositionem.

Fomenta ad aurium dolorem ab

Apollonio scripta.

Fomentis porro utendū est per spōgias aqua calidā

Aurium uermes exterminantia.

Sonitus in auribus causa.

Sonitus aurium per febres, ut quæsi componendum.

Sonitus auris ob exquisitū sensum audiendi, causam eius rumoris ostendit, ratio per stupesciētiā.

Sonitus auris medicamenta ab Archigene prodita.

Auditus grauitatu curatio.

Aurium excrecentia ueteris remedium.

Aurium sanari non effusum remedium.

Aurium dolari fomenta.

calida imbutas, ac sufficienter expressas: itemq; per cucurbitas affixas. Amplius uerò & per uaporem ex arundinibus perforatis allatū. Oportet autem alteram arundinis oram, auriculæ cavitati adaptari: alteram uerò in ollam perforatam habentem operculum, & undiq; obturatū, incumbere. Sit autē in olla abinthium in aqua seruifacitum, quod uapo inde sublatu perferatur ad auditoriū meatum. Confert etenim hoc fomentum etiam auditui graui.

Archigenis ad surditatem remedia.

Chalbanū cum aceto & melle seruifacitum in stilla, Aut collyrio ex nigro, sicu, & sirapi immisso, per triduum id non extrahimus. Postea uerò assiduus acutisq; uocibus, & uicissim grauib; inclamamus: & per tubam sonitu in cūcto, conatur malum depellere. Post hæc & asphodeli radices oleo ueteri incoscās, commodè infundimus, caprināq; asidua elusmas urina.

Eiusdē de corpufculis quæ auribus illabunt.

Quod si aqua illabatur aurē, auxiliatur acetum, & cum altero pede, qui respondet affectu auri, exillire, aliquoties se ipsum in cūctio: hoc enim modo facili exierit. Quin & exuctio simplex per os, aut enī per stipulā, egregiè aquam extrahit. Si uerò calculus, aut faba, aut cōsimile quid in auditoriū meatum illapsum fuerit, eluito: in lana circa auriculā spēcillum obuoluta, & resina tincta, extrahito. Idem & per glutinosum aliquod pharmacum fieri potest. Quod si neque sic sequatur, sternutatorio in nares injecto, os ac nares obturato. Facta nanque spiritus inclusi extensione, id quod est illapsum, efflabitur: idq; assidue, donec excidat, facito. Nam si intus manserit, aut inflammata conuulsiones inducet. Optime etiam confert ad eorum quæ illapsa sunt eiectionem, cōcusio. Si itaq; puer fuerit, pede comprehensum, & in caput sublatum, conticiens ipsum, uibrabis. Si uerò perfectè ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectam aurem reclinatam, caput ad tabulam firmare iubeto: dein leuata tabula iuxta caput parte, deferri sinato, idq; sepius facito. Mouebit etiam sic quod incidit, & ad expeditores meatus partes progreditur. Atque ita angusta & concaua specilli parte immissa, scitè extrahito. Si uerò faba, aut cōsimile quispian in aurem illapsum, ita ea hæreat, madefactumq; & tumefactum dolores inferat, impossibile quidem est integrum ipsum eximere. Quare per specilli concauum diuidere id industriè expedit, atq; ita particulam extrahere: deinde sapam, aut uinum dulce calidum infundere, ac lenire meatum ex lanciactione oblectum. At uerò si animal aliquod sit illapsum, scammoniū aceto dilutum, aut abinthii, aut peucedani succum, nitrumq; ac sulfur, cum radicula succo infillato.

De parotidibus.

Parotides ē genere quidem inflammationum existunt. Funt autem, glandulis secundum aures affectis. Ceterū prima parte curationis partium inflammatarū in eis minimè utimur. In illis liquidè plurimum curatione reprimente, repulsoriaq; uti conuenit, præcipue cum nec malignum sit, nec multum quod insit: nec uniuersum corpus plethoricum. Sic namq; spongia sola ex posca impolita, incipientes inflammationes repressit. Verum in parotidibus contrariam curationē molimur, neq; pharmaca attractoria adhibētes: & si hæc nihil memorabilè efficiant, etiā cucurbitulas affigentes, aut fomenta assidua adhibentes, conantesq; ut infestans humor ad cutem ipsam trahatur, præsertim si affectio in capite hæreat. Similiter cum natura per acutas febres, redundantes humores ex uasis ad regionē inter cutem & subiecta corpora pellit, quandoquidem illis etiam glandulæ imbuuntur, multo satius uidetur tunc opulari naturæ, febres per abscissus curanti. Verū si uehementi impetu insuuant humores, nihil nos curiosius agētes, omnia permittentes naturæ. Nam huc cucurbita, siue aliud pharmacū humores ex alio eliciens, admouerimus, uehementē dolor hominē apprehendit, unde & uigiliæ & febres oriuntur, atq; exoluitur uires. Mitigare itaq; tunc, & non influxum prouehere, oportet, per cataplasmatū maxime lenientiū usum: cuiusmodi est quod ex frumēnti, aut hordei, aut feminis lini farina, cum melle, aut fœnigræci, aut altheæ, aut chamæmelorum decocto conficitur: & quæcūq; nō modò humectam habet caliditatē, per quam mitigare dolores ualent, sed etiam influentes succos possunt cōcoquere, suppurareq;. Quod si etiam sanguis redundare uideatur, per uenz ipsum sectionē uacuabimus, præsertim si liceat per uires. Ergo si humor non discutitur, suppurantibus pharmacis est utendum: cuiusmodi est frumentifarina cum oleo & caricarū decocto: item quod ex polline & fermento consistat pharmacum. At si suppurata fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, aut per pharmacū abscissum rumpere, quale est Smilii uocati, & qd ex alijs constat: aut tentare, ut ipsum per attractoria & tenuiora medicamēta discutiamus, bis in die ipsè ablatis, & fomentis admodum, donec dolores remiserint. Vbi uerò iam plurimū puris discussum fuerit, tunc iam primū semel soluere ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet: dein uerò neque ex re est id facere, sed ipsis pharmacis permittere, ut si quid reliquū in profundo hæreat, ipsum discutiant. Quod si durities addit, ea ipsa quoq; mollienda est, emollientibus medicamentis ad attractoria admissis.

Archigenis ad parotidas.

Rumicis radices in uino tenuium partium coctas, applicabis parotidibus citra uehementem dolorem ortis. Aut buccina marina, aut purpura uitas, melle aut axungia exceptas imponito. Aut sic aqua marina muriæ incoscā, admoue: aut lanā etiā butyro imbutā. Cōmendat etiā usum plātaginis, tametsi ex mistis facultatibus, discussoria nempe & repulsoria consistet. Ego uerò nunquam pharmacis ad parotidas destinatis repulsoria admisceri oportere precium existimo, nisi forte aliquando pauxillū repulsorū multo discussorio addatur: idq; ubi citra uehementē dolorem ipsæ uruant parotides.

Aliud Archigenis ad discutendas parotidas.

Lupinorū amarorū farinam cum melle coctā, modica calce uina addita, pro cataplasmate im-

Surditas remedia ab Archigē.

In auri illapsa corpora quo modo ab Archigē.

Parotidis modica.

Natura impetu quando moueri se incipit.

Cataplasma do lorem leniens.

Suppurato quando & quibus medicamentis uti molenda. Pusi suppuratorum parotidem quo modo rucandam.

Parotidibus uena remedia ab Archigēne prodita.

Plantago constat ex facultatibus discussoria simul & repulsoria. Repulsoria quod discussoria modica remedia parotidem.

Parotidis effectus glandularum secundum aures inflammationis.

Inflammationum incipientium curatione.

ponito. Aliud. Picis brutæ, manne thuris, utriusq; drach. i. terebinthinæ, palmularū Syriacarum non uetustatū, pinguium, carnis puræ, utriusq; drach. ij. omnibus simul unitis untor.

Aliud. Caricari, chabani, nutri, sing. drach. i. sulfuris tertiam unius drachmæ partē: terebinthinæ, opoponacis, utriusq; paxillulū: simul unitis untor. Quod si medicamentis parotis nō cedat, Archigenes consulit esse conflgendū ad cucurbitulam, adhabita scarificatione. Porro simplices parotidas curant, emplastrū Mafæx, & quod ex succis cōstat, & quod ex pīlata. His molliora adhuc sunt, cerati forma, tum ex butyro, tum ex ælypo cōstita, oīstres, aut buccanis, aut purpuri utis additis, adipely porcino salsæ experte, singulis quadrantis pondere. Sic ipsū etiam licet cōficere: Butyri vnc. l. ceræ vnc. ij. s. oīstresq; uīstros, redactūq; in pollinē, vnc. ij. Cōficito & untor: efficacissimū nāq; est ad parotidas. De affectibus narium.

Polypodes.

Ex genere tumorū præter naturā polypodes in naribus generantur, ut ozenæ ex genere ulcerum. Secundū genus autē excretionū præter naturam, sanguinis effusiones contingunt in morbis acutis. Primū itaq; de ozenis sermonem faciam, quæ ex humorum acrimia, putrilaginosorumq; influxu gignuntur: nam si nō duntaxat sint acres, & grē curabilia ulcera inducunt, graueolentia uerō non item. Cæterū cura cōmunis tum his ambobus, tum etiam polypo est, primū caput siccare, corroborareq;: cū palam sit ob redundantiam uitioforū humorum, fieri ab eo in ipsas nases defluxum. Capite roborato, naribus adhibenda curatio est, scopo in ozenis proposito, ut affecta pars per mixtæ facultatis pharmaca tum repellentia, tum discutientia, exerceat. Repellent itaq; tum austeria, tum acerbā, quæ cōmunem astrigentū appellatōem sortiuntur. Discutiant calidam & siccam uim obtinent.

Ozenæ à quibus gignantur humoribus.

Ozenæ atque polypū curatio - non curatur.

Repelebatia quæ. Dissoluentia quæ.

Ozenarum remedia.

Polypū descriptio, causa, remedia.

Ozenarum remedia varia.

Archigenis remedia ad ozenas.

Obline eos chalcitide, uel atramento sutorio, uel pīorico, ex melle tritis. Vel iridem & sandaracham cum melle illānto.

De polypo narium.

Polypus tumor est qui præter naturā in naribus generatur, polypoides carni assimilis. Quæ affectu ex crassis & uiscidis humoribus gignitur: ob idq; mista medicamentorū materia indiget, quæ partim astringat, partim secet & tenuet, partim etiam discutiat, condensetq;.

Asclepiadis ad ozenas remedium.

Aluminis scissi drach. ij. myrrhæ, sandarachæ sing. drach. iij. gallæ drach. i. aris uti tantundē. Tritis utere, naribus prius uino o dorato elotis, & pharmaco per specillū extremum admoto.

Lamponis ad ozenas, xigilopas, polypos, & quæcūq; uelq; citra sectionem, uisionē uæ extirpare, remedium. Scobis aris rubri vnc. i. salis ammoniaci sextantē: ammoniaci thymiamatis tantundē: aluminis rotūdi quadrantē: acetī acerrimi heminas sex. Arida terito, & assuso aceto, omnia in uas aris rubri cōiçito, in eolq; ad solem sub ardore Caniculæ cum rubri aris radio agita to, donec exareseat pharmacum: quod postea in mortariū translatura, diligētē terito, in fistulā

reçedito. Vsu uerō exigente, aquam sorbendam dato, quæ ut ore cōminal, præcipito dein pharmacum per fistulam insuflato, uel etiam melle exceptum immittito. Cæterū post huiusmodi pharmacorū adhibitiōem, etiam sternutatio rīis utitur, quō uidelicet testoria ulceri obducitā excutiamus, quæ tribus aut quatuor diebus ferē excidere consueuerūt. Vbi uerō exciderint, adipe asinerio, ac butyro cum cerato curantur.

Porro ipse in ozenis polypis præstantissimū pharmacū reperi succū ex mālīs punicis tum dulcibus, tum austeris, acidisq;, & maturis & integris, parig magnitudine & numero maceratis, expressum. Cæteri s̄ humectiorisq; polypus uideatur, plus ex austeris mālīs est cōstundendum. At ex aridis pharmacis, diphyrgæ citra mordacitatem aliquando per multū tempus consumptū polypum noui. Probatu etiam prædictū ex mālōrum succis collyrium, si ubi exaruerit, redigatur in pollinem, indeq; exussit, ut etiam per specilli nucleum in datur. Omnia autē hæc aliudē facere oportet, ut nunq; ab affecta parte absit pharmacū, cūm facile ab humiditate cluatur.

Iam uerō rosæ siccæ cōstusæ, inditrey, in ijs qui molli carne sunt præditi, citra noxam curare aliquando solent polypos. Nam plerq; uerū quæ polypodas exterant, eos exacerbant, si quando ab scopo aberrarint. Cæterū ulcera in narium meatibus semper per passillos curauit, Androniū uidelicet, & Pasionis, & Polyide, & Bithynum, & per eum quem ipse composui. In diuite uerō quopiam, qui odoratum pharmacum exogebat, hedychroi usum excogitauit, ipsūq; Falerno ueteri dilui, & mirum quā breui affectu ipsa est curata.

Heracleidæ ad sanguinis ē naribus eruptiones remedia.

Vbi grumos sanguinis duxeris, lanam specillo obuoluito, eamq; in lycio aqua diluto imbuta, & sanguine manantē loco illum. Aut linamentū ex elychnio cōtortū, madidatūq; aqua, & chalcitidis polline inspersum inserito. Aut menthā tritam indito. Inuat etiam frontē spongiis refrigerare, extremāq; uinculo excipere, qua parte magis contracta uidentur: obturareq; uasres, & os plauiali aqua & frigida opplere.

Asclepiadis remedia ad sanguinis effusionem ē naribus.

Spongiā crudā pice imbutā, & linamento exceptā indito. Aliud. Peraminis oui, & gallæ omphacitidis, utriusq; partē unā. Trita linamento intorto, aqua aut aceto madefacta, excipito, inditoq;.

Andromachi ichthemon.

Chalcitidis drac. c. chalcitidis drac. c. misyos asani drac. xxv. aris uīstis drach. xij. & s. tritis utere.

GALENI PERACHMENI
de compositione medicamentorū secundum loca, lib. III.

De oculorū affectibus, ocularijsq; medicamentis, agere in præsentī cōmentario est cōsiliū. Pompholyx igitur loca nullū pharmacorū mordacitatis expertū inferior est: atq; ob id ea utitur ad tenues & acres o colorum suæones, sed uacuato prius capite & uniuerso corpore.

Epitharax in opem naribus, excutitā sternutatio efficit.

Pompholyx faciem ad ozenas polypūq; magis sic commendat Galenus.

Reserum pulvis in quibus corat polypūq; solent.

Narium uicera quibus medicamentis curant.

Sanguinis à naribus eruptionis remedia.

Pompholyx opem in modicis oculorum suæonibus.

pore. At hacuamus quidem corpus uenæ sectio
ne, purgatione: caput autem per apoplegia
tūmos uindictamus à pūritate. Potest tamen pom
pholyx lota, quemadmodum etiam spodium,
atq; amyllum, simul & moderatè resiccare humo
res: simulq; ne per runiculas euacuetur ea quæ
in magnis oculorum uenis superflua humiditas
continet, prohibere. Quare si quis prius q̃ caput
ab humoribus ad oculos defluenibus purget,
utatur obturandis pharmacis, uehemētes do
lores ob runicas diftentas inducet, & ob multitu
dinem influentiū humorū, aliquando ipsarū ru
pturam aut erosionē pariet. Eiusdē generis cum
prædictis pharmacis subtenitis ouorum liquor
exiit, abundè ualens humiditates oculorū abu
luere, & exasperata lenire: obturandi autem te
nues meatus non parè illis facultatē sortit, sicuti
nec similē uim resiccandi. At fenigraci succus,
q̃d ad uiscositatē attinet, similis est ouorū albu
mini: discufiorum tamen possidet facultatem, &
moderatè calfactiorum: uo idiq; multos dolores
mingare cōsueuit. Maximè prædictis cōtrarij
secundum genus exsunt liq̃ores acres, ut Cyre
naicus, Medicus, ac tum sagapēnū, tum eupho
rbium, omnesq; breuiter, qui citra exasperationē
calfaciunt uehementer. Forti autē facultate sunt
prædita extergentia medicamēta, cuiusmodi est
æris squama, chalcitis uita, æs uisū, flos æris, mis
sy, forti, atq; stibium. His adiuu aliud genus adia
cet, erodentium uidelicet, siue putrefaciendum:
quale est auripigmentum, & sandaracha, & Alise
per æstus: cuius facultatis misy etiam paululum
particeps est. Est & aliud genus pharmacorum,
quod in oculares cōpōsitiones inicitur, eorum
uidelicet quæ natura astringunt. Quæ igitur me
diocriter hanc uim habent, influxus repellunt:
quæ uerò uehementer, ampliore dolorē insig
nunt, tunicas exasperando, q̃ uiuent influxionū
impetū repellēdo. Porro quæ mediocriter astrin
gunt, lipitudinibus cōmodissima existunt: con
ferunt autem & reliquis serè omnibus affectio
nibus ulcerum, pustularū atq; fluxionum. Sunt
uerò huiusmodi, folia rosarū, & flores, & suc
cus erice fructus, spica nardi, malabathri foliū,
crocus, lycium, & hypocistis. Vehementiorē hui
astringendi uim acacia & omplacium habent,
quæ & ipsa in succorum genere numerantur. Ba
laustiu etiam, & cytini, & galæ omphacitides,
ex genere eorum sunt quæ multum astringunt.
Inflāman oces & alias affectiones concoquunt,
myrrha, crocus, castorium, thus, & cremor fe
nigraci decocti: quæ etiam discufioria facultate
sunt prædita, & præsertim ex ipsis myrrha.
Hæc itaq; sylula oculorum medicamentorū ex
istit. Porro quæ medicamenta substantia terrestrī
sunt, citra manifestū calorem aut frigus, ea em
plastica nominantur, uim habentia contrariam
is, quæ ab obstructione liberant: quali facultate
insignitū famius aſter, pompholyx lota, eiusq;
onis elorus, atq; etiā cadmia tum uisā, tum lota,
cui deteriorū etiā nōnihil inest. Pompholygi
uerò & spodio parū quid inest astringens, quæ
admodum etiam plumbo possit exuſione. Nam
& hoc plarumq; omnis mordacitatis est ex
pers, parum tamen quid astrictionis sortitur.

Amyllum etiam exactè lotum, q̃ mitissimū est, &
medium, ut nec astrictionē nec acredinem ha
beat: hoc est, nec calorem, nec frigus. Quin & ce
russa lota proximè accedit ad facultatē plumbi
uſti atq; eloti: manifestè tamē astringit: amyllum
autem & famius aſter, quatenus ex gustu & odo
re licet colligere, sunt penitus qualitates ex
perts. Igitur uniuersum lusuſmodi pharmacorum
genus, siue modicū in gustu aut odore quæ litatē
exhibeat, siue penitus nullam ostendat, ueluti a
que purissimæ, ex pers qualitatibus uocā, modera
teq; per solā terrestrē substantiā secundū propriā
naturā siccit. Ac sanè sola hæc medicamēta cōue
niunt in erosionibus corneæ runicæ, ipsiusq; rha
goidis prolapsibus, ob influxū tenuiū atq; mor
daciū humorum ortis: cum nimirem astrin
gentia cohibeant effluentes humores, atq; ob id
dolorem ex mordacitate ipsorum ortum inten
dant: acrit uerò affectionem simul adaugeant.
In uniuersum tamen ipsi particula affectus, quod
facilius curationem recipiat, propiciamus, tum
uniuſi corporis purgationibus, tum reuulsio
nibus: primū quidem ad infernam corporis
partem: dein etiam ad occiput, & ad capitis cu
tem. Vitumur etiā sectionibus articularum, inter
dum quidem incidentes eas quæ retro caput iux
ta aures sunt ex portectis: interdum autē earum
partem, quæ temporibus inest: idq; ut medica
mur dispositioni, quæ tunicis oculorum est geni
ta, ob quā etiā optimus sanguis ad tunicas ipsas
delatus corrumpitur. Ad has igitur solas dispo
sitiones conuenire uidetur prædictorū medica
mentorū genus, citra mordacitatem exaccans in
aſticta parte cacochymia, à qua id quod influit
corrumpitur. Vocant autē colliria quæ ex eius
modi medicamentis constant, tum Libiana, tum
Cygni: nempe ob candorem, qualem cygni pos
sident. Præualeat quippe in ipsis amyllum, & terra
Sama, & cerussa Rhodia, quæ præstantior est &
cauidior. Sunt qui colliria id genus in conbus
terant, lacte boni succi ex nutritis uerbis in
stillaro: ut astrictionem uim quæ ouillo inest, ef
fugiant. Etenim cum in lacte serosa quædam ex
terioriaq; facultas inſit, eius usus congruens est
ad propositam curationē: quippe ulcera exple
nda, extergentibus citra acrimoniā habent opus
medicamentis. Quod si huiusmodi haberi lac ne
queat, per fenigraci decoctū terere colliria præ
stiterit, utpote quod exterioriā quandā uim ha
bet, quæ oua omnino sunt definita.

De asperitudinibus palpebrarum.

Cūm ægrè curabiles prædictæ dispositiones
existant, adhuc earum difficultatē adaugent pal
pebrarum asperitates: à quibus etiam in lipitu
dinibus, runicæ oculorū commoror, asſignatur
dolore. In illis tamen audemus ad pharmaca in
flāmanoni congruentia, nonnihil extergenti
bus immiscere: ueluti est colliriū ex uino, aspi
rudinibus accomodatū, quod primū ea quæ
ad palpebras succreuer, deprimentur. Nam ubi
oculi minus inſistantur inflammatione, ea quæ a
spredines expurgare possunt, administramus.
At dum cornea exulcerata est cum mordaci in
fluxione, impossibile est tali aliquo uti phar
maco, Cornea siquidem ipsa amplius exasperabi

Amyllum.

Aque purissima
sunt qualitates
experts.

Cornea tunicæ
troſa, quæ medi
camentis cōgruit

Arteria fere
arrit. Et tempo
ram, quando in
oculoſa sunt.

Colliria Libia
na & Cygni.

Colliria leni
genda medas.

Lactis meli
bris rſus timo
dissimus rſicor
bus curas ex
istit.

Fenigraci deco
ctum.

Colliriū ex
uino.

tur: uera uero impensius prociat, hominemq; uehementem dolor corripit, augebiturq; ipsius fluxionis malignitas. In huiusmodi itaq; affectionum miscella, solent medici, præ inopia consilii, palpebras ipsas reuertere, atq; absq; medicamentis purgare, idq; tum specilli concavo, tum molli spongia. Quidam ex præceptoribus meis, ex pumice leuigato, cum tragacantha aut gummi, collyrium faciebant, eoq; ab extensis atq; reuersis palpebris, aspritudines deradebant. Vbi uero temporis progressu per prædicta collyria fluxio fuit resedat, audemus tunc iam ea quæ palpebras extergunt, paulatim adhibere medicamenta: quæ admodum ubi fluxus omnino fuerit iam relicta sunt, & palpebræ moderate habuerint, caua ulcerata sunt collyrio ex thure complenda.

De lippitudine, siue ophthalmia.

Ophthalmia est inflammatio periositæ membræ, quam etiam agnatam uocant, quod alijs, quæ oculum ipsum constitunt, tunicis forinsecus agnascitur, ligamentum existens toti oculo, ad circumscissa ossa. Ob id enim omnia quæ circum oculos sita sunt, usq; ad malas quandoque simul per uehementem lippitudinem intrinsecut. Igitur pharmaca omnia huiusmodi affectionem curantia, ex genere eorū sunt quæ medentur inflammationibus: assument tamen necessaria non nihil, pro ipsius partis natura, quæ excellemmentem molliorem, atque eximiam quandam super omni totius corporis cutem, ad patendum facilitatem est nata, ob sensus subtilitatem, ac raritatem substantiæ. Adhibenda itaq; sunt pharmaca repellentia, minimè tamen exasperantia, hoc est, non uehementem attractionem sortita: sed quæ tum propria sua substantia moderatiora sint, tum lenitui liquoris admixtione adhuc magis talia reddantur. Voco autem lenitiuos liquores, qui candidum, & ferrugineum decoctum, magisq; adhuc ipsum lac. Vt plurimum uero albumen oui cum accommodatis pharmacis lippitudines curare sufficit, per collyria uidelicet uocata monohemera, hoc est, diaria. Sæpe siquidem magnas inflammationes, hæc adeo mitigauerunt, ut in uesperam quidem homo balneo uteretur: in sequenti uero die, nardino collyrio ad infusauctionem & corroboracionem in ungeretur. Admiscere autem ei circa primam inunctionem minimū quiddam acrum & sistendum medicamentorum oportet: ut circa secundam paulo amplius quiddam priore. Sufficiunt namq; hæc duo pharmaca adhibiciones, & deambulatoria aliqua non multa ante balneū. Foveri tamen oculi per spongiam debent ex meliori & ferrugine decocto, semel quidem aut bis in die, si me diocrit sit dolor: sæpius autem, si uehementior.

De ulceribus oculorum.

Oculorū ulcera eandem secundum genus curationem requirunt, quam reliqua omnia: ob ipsius tamen partis naturam, quæ nimis est adhibenda sunt, quale est, quod ex lora pompholyge constat. Admiscitur ipsi etiam succi quidam non solum mordacissimi expertes, sed qui etiam uehementissimos mitigare dolores possint, ueluti mandragoræ succus. Quodam etiam polygono succum miscuerunt, ut alij ipsorum ouorum

candidum. Quæ omnia, dum tempus utendi infirmitas, miscenda sunt, propterea quod facile accedunt: quo tempore etiam rosarium additur succus. Eorum autem omnium esse debet scopus, ut ulcus mundum fruetur: utpote partium naturam ipsum replente, atq; ad cicatricem ducente. Si itaq; inflammatio adhuc oculū urgeat, ut quippiam etiam mordet, collyria ex thure, & metallicis lotis, & succis mordacitatis ex perib; adhibenda sunt. Vbi uero sordida reddita ob eorū usum ulcera fuerint, ex repurgantibus quippiam miscendum est: quale existit Paccianum crocum, ex uino: quod etiam aspritudines extertit, pterygiis attenuat. At uero ulcera quæ per erosionem tunicæ corneæ sunt, ita ut aliquid ex ipsa rhagoide prociat, repellentibus & asstringentibus pharmacis opus habent. Discussoria autem postulant tum pustule, tum pus intra rhagoidem contentum. Recentia igitur & adhuc inflammata, pharmacis ex myrrha, thure, & croco sedantur: uetustiora autem, non nihil ex discussorijs desiderant, quemadmodum etiam in duratis tunicarum inflammationes.

De ocularium pharmacorum uiribus.

Igitur omnimodæ acrimonie sunt expertes hi tres liquores, ferrugineus decoctum lac, & candidum oui: ex quorum genere exaltare oportet tum gummi, tum tragacanthiam. Quippe nisi prædicta illa tria, tum copia, tum usu, prompta & expedita essent, possemus utiq; parum gummi, aut tragacanthie in multa aqua maceratum, in eundem usum ueluti illa assumere. & per ipsa etiam in medica cote collyria terere: & per sola insula, serofos in affectus oculis generatos humores eluere. Oculariū itaq; pharmacorū unum genus in illis tribus liquoribus, atq; etiam in tragacantha, gummi, metallicisq; elotis consistit. Alterum uero genus eorum sit, quæ modicam mordacitatem sortiuntur, propterea quod quædam eis sunt admixta, quæ parum astringunt de terguntq; qualia sunt, rosæ, & thure: illæ quidem, pauculam attractionem: thure uero modicam extergendi uim possident. Habet tamen ob moderatum calorem thure etiam & concoctorium quid, ac doloris mitigatorium. Ex eodem genere cum ipso, quantum ad concoctionem & discussionem attinet, censendum est crocus & myrrha: quæ inter se in eo differunt, quod crocus quidem moderate asstringat: myrrha uero citra attractionem non intrinsecus discutiat, & resiccat humiditates. Suntq; hæc uiribus præstantiora thure, & ob id etiam maiorem discutendi uim habent: cum autem careant uti detergendi, ad ulcerum curationem thure inferiora existunt. Huius generis medicamentorū, concoctorij inquam & discussorij, lyctum quoq; est, & castorium. Sarcocolla etiam concoctorij & discussorij medicamentum existit: ac magis quam ipsa, chalbanū. Melioris uero decoctum ad concoctoriam facultatem assumptum etiam quid attractorij, eiusdem seris generis cum croco existens. Inijcitur etiam in oculares compositiones lapis hyematites uocatus, humores resicandi uim habens, ueluti & cadmia. Mitius tamen pharmacum lapis ipse quam cadmia existit, utpote ex humida sub-

Paccianum collyrium.

Oculorū medicaminum tres.

Communi. Tragacantha.

Ocularium medicamentorum genera tria.

Thure dolorum lenis, & constringit.

Crocus moderatè asstringit.

Myrrha citra attractionem discutit, & resiccat.

Lyctum, Castorium, Sarcocolla, Chalbanum, Melioris decoctum.

Lapis hyematites.

Cadmia.

Antia,

Aspritudinis palpebrarū causa.

Lippitudo. Ophthalmia est inflammatio periositæ membræ, quam etiam agnatam uocant, quod alijs, quæ oculum ipsum constitunt, tunicis forinsecus agnascitur, ligamentum existens toti oculo, ad circumscissa ossa.

Ophthalmia est inflammatio periositæ membræ, quam etiam agnatam uocant, quod alijs, quæ oculum ipsum constitunt, tunicis forinsecus agnascitur, ligamentum existens toti oculo, ad circumscissa ossa.

Lenitiuus liquor.

Oculorū ulcera, quæ medicamentis possunt leniri.

Schistum lapis.
Schistum.

Art. vitum.
Art. squama.
Squama.

Chalcitis vitia.
Lata exadere
imbicillata.

Misy.
Aerugo.
Galle.

Chalcanthum.

Stomomatis
squama.

Thuris cortex et
manna.

Omphacium
Hypocistis.

Glancium.
Acacia.
Cercocarpus
vitum.

Albi facultatis.

Sedibus palpe-
brae qua ap-
p-
tata.

Induratis tuni-
ca oculorum qua
conferant.

Suffusio re-
media.

Oculis roborati
pharmacum.

stantia, non terrestris, ueluti cadmia, generationē indeproba. Huic similis est lapis Schistus dictus, sed fortiores obinet facultates. Quod nō stibium uocat, illotū quidem, fortem astringendi facultatem ostendit: lotum autem, exoluitur, ut propē ad uim mordacitatis expertum accedat. At as uim uehementem extergendi posuit det facultatem, itemq; squama eius, & flos. Nec minus efficax, sed minus mordacitatis experta, elalcitis uita est. Quod si lauentur ita pharma-
ca, exterioria quidem adhuc manent: tantū tamen imbecilliora, quantum amiserunt mordacitatis. Huius generis sunt etiam misy, & xruco, fortissima pharmaca, q̄a quae sycosi & callis conueniunt, admittit. Sunt qui etiam gallas admisceant, uehementer astringens pharmacum: sunt qui etiam chalcanthum, quod unā cum acedine uehementissimē asstringit. Moderatius tamē redditur uisum, & lotum. Ad hanc sylvam pertinet & stomomatis squama. At thuris cortex, as-
stringit quidem & ipse admodum, praedicū tamen est longe inferior. Porro māna thuris & thuris ipso dissert, quod exiguum quid astrictionis fortiat, ratione corticis thuris, cuius nonnulli contraxit. Quaecunque igitur ex asringentibus multam terream compagem habent, aspritudines, & sycoses, & callos consumunt. Ceterū quae ex succorum genere sunt, ueluti omphaciū, & hypocistis, eluunt facili in subitionibus, disfluunt simul cum lachrymis. Ex hoc genere est glaucium & acacia. Circa mordacitatem uero ex terget ceruicornu uisum, ueluti etiam capinū: non tamen dolore sedant, nec concoctiora facultate sunt praedita, ut thus, frigidi nimirum & sicci temperamenti existentia. Mixtae facultatis est aloē, quemadmodū rosa. Habet enim quod extergere est natum, aliqd in se amarum: sicuti & astrictionum quippiam, ut & cōmetat, & ad cicatricem perducit.

Quae ad scabras affectiones conueniant. Ex q̄a quae ad scabras palpebrarum affectiones conueniunt, sunt sales ammoniaci, & lapis Asinus, tum ipse, tum eius flos: & quod p̄soricū appellatur, nō simplex, neq; sponte natum, sed praeparationis modum indeptum. Admiscetur q̄a & misy uisum, & sandaracha, & arsenicum. Ex medicamentis uero aromaticis, casia, malabathri folium, & amomum, cinnamomumq;.

Quae induratis auxiliuntur. Compositiones quae ad induratas oculorum tunicas congruunt, ex succis constāt, & ammoniaco thymamata. Miscetur autē eis myrrha, thus, chalbanum, & consimilia.

Quae suffusis medeantur. Ad suffusos habetur compositū medicamentum, ex succo feniiculi, hyemae felle, ac melle Attico constans: cui nonnulli caprillum fel addiderunt. Nunc autē in precio habetur pharmacum ex fel lescarorū compositū: sicuti & quod ex myrrha facte conficitur: quorum omnium promissa magna, effectus autem inter dum nullus.

Pharmacum aridum ad ruendam oculorū ualitudinem a me compositum.

Lapis phrygi ter uis, totiesq; extinctū: sed prima quidem extinctione, butyro: secunda, ui-

no odorato: tertia Attico melle, ad ipsum extinguendum, inieci lib. i. aeris uisū, piperis albi, folij malabathri, sing. vnc. i. stibij drach. xij. Postquam uero omnia fuerint leuigata, & reponere medicamentum uelis, adq̄e opobalsami Syriaci vnc. i. s. Porro uisū ipsum ad solas palpebras competet cum specillo induci, citra tunicarum ipsius oculi contactum.

Aridum ad circumsos oculorū angulos ab Asclepiade scriptum.

Spodij Cypri drach. iij. omphaci aridi drachmas ij. nardi obolos tres: piperis fricti grana xv. tritis utere.

Pharmacū callablepharon, exornandis palpebris accommodatū. Facit & ad lippitudines ueteratas. Stibij uisū acuiuo extinctū drach. xvi. plumbi uisū & loti drach. viij. fuliginis thuris, sp̄e ex nardi, myrrhē torrefactae, croci, squamę aeris, sing. drach. i. omnibus tritis ac repositis uitior.

Aridum Philoxeni ad pruriginosos & circumsos angulos. Facit & ad obtusum uisum. Cadmiae drach. iij. salis ammoniaci drach. ij. piperis albi drach. i. tritis & leuigatis uitior.

Liquidae oculares compositiones ad omnē extuberantiam carnis tollendam, & ad incipientem lippitudinem.

Cōpositio qua uisū Philippus est in Caesaria. Misyos affati drach. viij. myrrhē drach. iij. cadmiae drach. viij. croci drach. ij. salis ammoniaci tantumdem: nardi Indici, piperis albi, utriusque drach. i. mellis Attici cyathum unum. Misceto.

Panclicreos Erasistrati ad lippitudines omnes, & ad purulentas aures.

Aeris uisū, myrrhē, sing. drach. i. piperis obolos ij. misyos totū drach. i. croci obolos iij. uini Cliij heminam i. p̄asi eretici hemine dimidiū. Coquantur ad lentum ignem, ut decet.

Philoxeni liquida exacuens uisum, ac cicatrices & callos exterens.

Ammoniacy thym. drach. iij. xruiginis drach. ij. uino diluta, & contrita, melle Attico excipito.

Compositio Largi exacuens uisum.

Succi radices feniiculi partē unā: mellis tantumdem. Misceto. Alia. Succi radices feniiculi, succi chelidoniae, mellis Attici, sing. drach. i. Misceto.

Ad tingendas albugines.

Gallam tritam per specillū nucleū calfactū imponito: dein chalcanthū aqua dulutū admoneto.

Ad glaucos oculos, quod pupillae nigrae reddantur.

Malicorij dulcis succum infundito: dein post temporis interuallū hyoscyami florem cum uino tritum instillato.

Ad paruos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscissus.

Chalbanī partem unam cum modico nitro mixtam imponito.

Cataplasma Heraclidis Tarentini ad uehementes oculorum dolores.

Rosarum uindum, aut siccatū drach. iij. croci drach. i. op̄i tantundem: excipito melliori decocto, aut passo, utrior. Alud. Rosarū, uolarum albarum, mellis, capiti papaueris, sing. drach. ij. croci, op̄i, myrrhē, sing. drach. i. oui affari uisum. Tritus & passo subactis uitior,

Ocularia medicamenta uaria, à medicis uarijs conficta.

Oculorum rebe-
mū dolorē sol-
uerat catapla-
smata.

Agglutinatorium ad repellendas fluxiones ab oculis.

Pollinis, myrrhæ, mannæ thuris, singulorum drach. i. candido oui excipito, temporibusq; fronti admoeto.

Collyrium Moschionis, ad epiphoram, dolores, atq; fluxiones cōgruens.

Glaucij drach. vi. sarcocollæ drach. viij. croci drach. iij. gummi drach. ij. tragacanthæ, succi mandragoræ, sing. drach. i. opij drach. i. Aqua pluuiæ excipito, utritorq;.

Paccijs spiragus.

Cadmix usq; & lacte caprili, siue mullebræ, extinctæ a lotæ, assiccatæq; in umbra, drach. x. æris usq; a loti, acaciæ, utriusq; drachmæ x. opij drach. vi. croci tantundem: gummi drach. xv. aqua pluuiæ excipiantur.

Collyriū ad acerbissimos oculorū dolores.

Cadmix usq; & lotæ, acaciæ, stibij usq; & loti, aloës Indici, sing. drach. viij. croci, myrrhæ, opij, sing. drach. iij. gummi drach. viij. aqua excipe, utritorq; ex ovo. Ego etiam pompholygis & thuris, utriusq; drach. iij. addeci.

Malabathrinum nostrum ad uexationes oclorum.

Cadmix drach. xvi. acaciæ drach. xl. æris usq; & loti drach. xiiij. opij, lycij Indici, malabathri, nardi Indici, castoreij, croci, aloës, sing. drach. ij. myrrhæ drach. iij. cerussæ drach. viij. stibij loti tantundem: gummi drach. xl. aqua excipito, & utitor ex ovo in principio affectionū, & enī in declinatione, *ubi panchrestum ab ipsa parte remoueris.

Collyriū albū tryphera dictum, admodū lenne, ad epiphoras maxime cōgruens.

Cadmix lotæ drach. xvi. cerussæ drach. viij. amyli, gummi, tragacanthæ, sing. drach. iij. opij drach. ij. aqua excipito, & cum ovo unitor.

Cygnus inscriptus Reginz, ad maximos oculorum dolores.

Cadmix drach. xvi. cerussæ lotæ drach. viij. amyli, tragacanthæ, acaciæ, opij, sing. drach. ij. gummi drach. xij. excipe aqua pluuiæ, & dum uti uoles, adde candida ouorum quatuor recentium.

Aerianū pharmacū ad ueteres ac recentes affectiones accommodatum.

Cerussæ drach. xiiij. cadmix usq; & lotæ, stibij usq; & loti, thuris, singul. drach. x. squamæ æris drach. v. opij drach. iij. myrrhæ tantundem: gummi drach. xij. aqua pluuiæ excipitis, utere ex ovo.

Collyriū ex cornu ceruino, ad ulcera & pustulas, quod cicatrices exterit.

Cornu ceruini usq; & loti, thuris, plumbi usq; sing. drach. iij. squamæ æris lotæ drach. ij. opij drach. i. gummi drach. iij. excipe ex aqua pluuiæ.

Collyriū diarthodon, ad fluxiones atq; dolores oculorum congruens.

Rosariū drach. c. croci drach. i. opij, myrrhæ, sing. drach. viij. gummi drach. t. uino odorato excipito, utritorq; ex ovo. Ego uero pro folijs rosarum, tantundem earundem florum inieci, feliciterq; successit.

Lyncæus, ad affectiones callosas, exacuens uisum.

Cadmix, æris usq; & loti, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. xij. myrrhæ drach. xvi. lapidis

hæmatitæ drach. vi. opij tantundem: aloës, fellis taunini, chalbanī, sing. drach. iij. pruginis drach. i. opopanacis drach. iij. salis ammoniaci drach. ij. gummi drach. vi. Aqua omnia pluuiæ excipito.

Melinū Lucij præceptoris, ad scabros & corrosangulos, intēfos pruritus, oculos humectos, omnemq; heberudinē uisus, cicatrices etiā & callos extensos. Cerussæ, croci, sing. drach. xiiij. ammoniaci thymiamatis, falsi ammoniaci, nardi Indici, opij, myrrhæ, omphacij, sing. drach. vi. gummi drach. xiiij. Excipiantur aqua pluuiæ.

Quæ Archigenes ad oculos affe-

ctos scripsit.

In fluxionibus oculorū primo conuenit cibi atq; potionis parciat, aque potus, ac maximè rei ueneret abstinentia. Subducatur alius, & facies assidue primū multa frigida, dein oxycrato abluatur. Fugiant odores acres, & pulueres, fumumq; & tum solis, tum lucernarū splendorem. Si augeat fluxio, dolorq; accedat, cōfert etiam phlebotomia. Circa frontem porrō & tempora conueniunt medicamenta asfringentia. At super oculos lana pura oui candido madefacta imponatur: aut ouia si luteum, aut melilotum in passo coctum. Omnia enim ex asfringentium genere in principijs conferunt. Ad plagas illatas oculis facit columbinus sanguis instillatus, & præsertim si qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum etiam oui eodem modo in oculum instillatum, ac præterea lana exceptum, & superne impositum. Prodest etiam melotū coctum cum uno, impositumq;.

Ad palpebrarum defluuiā, xeruginis tritæ partem unā, ammoniaci thymiamans tantūdem, trita imposito. Ad iniurias atque pungentes palpebrarū pilos. Vbi aulsi fuerint, illinito sanguinem cicicum, & nō renascuntur: aut chamæleonem albam & tritam, cui uiridium ranarum sanguis sit mistus, inungito. Oculū canōnē omnem, incipientemq; suffusionem, sanat sel omne, cum marrubij succo ac melle Arnico. Ad pterygia. Chalcantli, & falsi ammoniaci æquales partes: gummi dimidiū: cum aceto in collyrio formato, illinitorq;.

GALENI PERGAMENI

de compositione medicamentorū secundum loca, lib. V.

De suggillatione, quam Græci hypopion nominant.

Hypopion ex genere effusionum exiit, estq; affectio cutis ipsi oculo subdita, ubi confusio uenis qui in ea sunt, sanguis per fissuras effunditur: qui quidem nisi discutiatur citò, interdum progressu temporis liuescit & denigratur. Quare merito ad eius curationem statim festinant medici. Cæterum quum tunica uenarum, ex quibus sanguis exiit, rum patitur, parum quiddam ex asfringentibus ad discutienda admiscetur. Vbi uerò ad propriam naruram redierint uenule, tunc discussorij solis uti admodum opportunū uidetur: ex quibus tamē imbe-

Oculorum afflictiōis remedia ab Archigene scripta.

Oculorum placentia opusculum.

Oculorum fluxionibus repellens agglutinatorium pharmacum.

Malabathrinū medicamentum rubentibus oculorum doloribus.

Collyrium tryphera nomen habet.

Aerianū pharmacum afflictiōis oculorum accommodatum.

Hypopion. Suggillatio quod sit.

Suggillationis curatio.

Imbecilliora quidem in primis sunt adhibenda, fortiora uero inueteratis & denigratis conueniunt. Ego igitur Ndi collyrio diarthodon, in oculatioribus concula ex aqua trito, parte suggillatâ illino, fertur campanæ ac fernigræ decocto prius pro fomento usus: quo ipso decocto, postea etiâ collyrii dissoluo: ac dein etiâ ex solius fernigræ decocto. Quod si quæpi affectionis reliquis resistit, in fernigræ decocto collyria ex myrrha dissoluo, illinoq. Vbi uero affectus his remedijs nõ credit, collyrii ex sandyce est cõmodum. Archigenis pharmaca ad suggillata.

*Suggillatis
pharmaca ab
Archigena pro
data.*

Summe facit ad recentia & liuida suggillata, spongia maris intincta, & assidue imposita, sublaraly: postquam, fomentũ ex aqua calida prodessit. Cataplasmate autẽ utere faba fresa contrita, abinthio, hyssopo, origano, raphani cortice, uua passa exacinata, unoquoq; per se cum melle, aut aceto, aut aqua. Minime tamen recte mihi uidetur præcipere, ut in differe nter uno aut alio utamur. Aqua quippe acrimonie omnis expernissima est. Mel autẽ ulceribus mordax, cutẽ haudquã offendiã: acetum uero utriusq; mordax existit. Aliud. Aut fabam fresam cõmanam, cum melle imponito. Etenim faba lomentũ, etiam citra manducationẽ cum melle subactũ, liuida discutit. Ex manducatione autẽ, summe discussorium efficitur, nimirũ uiribus à salua assumptis.

Lomentum fabaceum.

Aut cerassæ & lithargyri partes æquas cum melle terito, atq; admixta faba fresa, ad cerati formam reducto, utiturq. Aut hordeaceâ farinã cum aceto multo costã imponito. Aut thus & thapsiæ æquis portionibus cum rosaceo cerato. Hæc Archigenes. Dicitũ autẽ à nobis est, quod ex discussorijs medicamentis in principio prætantiora sunt, que modicè stringendi uim possident: qualia sunt rosæ, melilotũ & crocus. Apollonius autẽ ad inueterata suggillata, ari radicem rasam, mellely subactã impositãq; cõmendat. At Crito bryoniæ ra dicẽ tritam cum melle, aut rosaceo ce-
rato exceptã, inter remedia suggillatorũ recet. 40

Medicamen Heræ conscriptũ ad suggillata.

*Suggillatis me-
dicamen ab He-
ra scriptum.*

Succi cicuræ obolos ij. croci drach. ij. myrrhæ, acaciæ, sing. drach. i. opij drach. ij. succi thapsiæ, gummi tragacanthæ, sing. drach. i. cũ aqua cogito. Tribus enim horis (ut inquit Heras) suggillata dispungit. Ego uero nũc per ætatem iam oleagiosam effectam expertus per aliquid quando ad cruentatos facientem.

De ægilopis.

*Ægilopis deseri-
ptio & curatio.*

Inter nasi os & magnũ oculi angulum, parũ quoddam exiguo abcessu perfimile tuberculũ nascitur: quod sanè sepe in ipsum angulũ rumpitur, ægrius curationẽ admetit, nisi maturẽ illi oc-
currat. Igitur mederi ipsi oportet medicamen-
tis que abq; mordacitate discutiũt. Quippe co-
afficitur ab acris oculis, ac sic inflammatio
particulæ augetur.

Hæc ad ægilopas.

Maluæ folia cum sale & melle trita imponito. 60
Alica etiã in aceto cocta, incipiti ægilopi opitu-
latur. Archigenis remedia ad ægilopas.

Ægilopas eruo cum melle integimus, aut el-
nere uiticis cum aceto subactis. Probẽ facit &
thus cum recenti columbino stercore impositũ.

In nondum foratis, staphidem syluestrem, & ammoniacũ thymia cũ melle, ueluti spleniũ, imposito: aut alumen scissile cum terebinthina.

Si morbus his remedijs nõ cedat, diuiso angulo, ossile nudato, cauteriũ admove: si quidem decedunt squamulæ, atq; ipsum malum curatur.

De variis.

Tumor paruus & durus in faciei cute oboritur, varus Latinis, Græcis ionthos dictus, & crasso cõ-
cretus succo, ostendens meridiusissimus cura-
tionẽ futurã per emollientes & discussorias phar-
maca.

*Vari descriptio
& curatio.*

De scissis tumoribus.
Vna quædã hæc affectio est ex ijs quæ in men-
to enascunt, differens à uariis in eo, quod nõ so-
lum crassus sit qui hos tumores excitat humor,
sed serosa etiã tenuitate participet, ob quã exul-
cerantur citò, si nõ, ut decet, curent: & ob id ma-
gis exiccantibus pharmacis q̃uari opus habent.

*Scissus tumor à
varo quo modo
differt, & qua-
lia medicamen-
ta possidet.*

De lichenosis in mento tumoribus.

Et hæc affectio ex mixto quopis generat hu-
more, serosis nimirũ tenuibus & acrisbus suc-
cis cum crassis mixtis: quapropter facile etiã in
psorã ac lepram transit: indigetq; etiam ipsa
pharmacis fortiter exiccantibus. Vbi uero in psorã
aut lepram transierit, ultra hoc quod resiccanti-
bus indiget, etiã repurgantiã & exterioria desi-
derat.

*Lichenes à qui-
bus generantur
humores, à qua-
lia medicamen-
ta desiderant.*

De menri eruptionibus.

Hoc eruptionum, siue exanthemati nomen,
quidam in cõmuni usurpant de affectionibus ul-
cerosis & asperis in mento sua sponte oborienti-
bus. Indiget uero & hæc ipsa affectio resiccanti-
bus medicamentis.

*Exanthemata
resiccantibus me-
dicamentis indi-
gent.*

De furunculis.

Furunculi, Dorthienes Græcis uocati, ex simi-
libus humoribus, ueluti uari, exiguuntur, per u-
niuersum corpus duplices exsistentes: nonnulli
quidem uarioli, duri, & ægre concoctiles: aliqui
uero inflammari: in quibus aliquando febris cõ-
sistit, & tumor exerecit in magnitudinẽ, & in
pus transmutatur. Vnde curatio ipsorum ut plu-
rimum eadem quæ inflammationum existit.

*Furunculorum
species.*

Crionis ad varos remedia.

Mellis Attici, & acerrimi aceti, sing. cyathum
unum misceto, ipsiis uaros illino, cum digito
perfricando. Vel amaras amygdalas aceto intri-
tas, faciei illine. Aut alumen scissile probẽ la-
uigatum terebinthina excipito, imponitoq;.

*Vari remedia
scripta à Crion-
e.*

Ad varos callosos.

Saponis gallici drach. iij. ammoniaci thymia
maris drach. i. thuris drach. i. aqua dissoluitur, &
cerati spissitudinem facio, eolq; illino, & post
horæ interitum calida abluerẽ iubeto.

Ad affectiones eminentiores, ac prin-
cipium elephantiasis.

Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulfuris uiui,
sing. æquales partes aceto dilutas ac probẽ tri-
tas, in pastillos redige, eosq; in umbra exicca: usu
uero expetẽt, aceto diluto illine: atq; ubi resic-
cati fuerint, subscripta cõpositione deterge. Sapo-
nis gallici lib. i. ammoniaci thym. ranndum:
thuris, mastiches, spumæ nitri, sing. vnc. ij. Sapo-
nem & ammoniacũ in sicile uas cõiecta, & aq;ue
sextarij duobus affusa, coquo: atq; ubi diso-
luta fuerint, arida contusa atq; cribrata adjecto:
deinde in mortariũ trãsusa, & probẽ cõqualia

*Elephantiasis
incipiens medi-
camentis egredi-
tur.*

in uafe uitreo reponito. Vñ uerò postulante, faciem ex eo smegetate inquinato, et post modicò teporis larga aqua molliter perficidò ablueto.

Eiusdè ad ficosas menti populari eruptiones.

Spumæ argenti, misys crudi, æquas partes tritas insperge. Aliud. Atramenti iutorij, sulfuris uiui, sing. drach. ij. fruginis drach. i. nitri rubri drach. ij. trita insperge.

Andronis pharmacij ad idem accommodatù.

Chalcithi, myrrhæ, sing. drach. ij. thuris, aluminis scissi, sing. drach. 4. malicorij, gallarù, aristolochiæ, sing. drach. viij. uino austero exceptis uitro.

Critonis remedia ad lichenas.

Tritici grana multa imponito in incudem: de inde laminâ xris candente tritico superponito: & resolutù ab eo liquore, calidum adhuc, ausereto, illinitoq. Aut portulacæ succum assiduè illinito. Quod si inueterati sint lichenes, capparis folia trita cù aceto imponiro. Aut corticè radicis hortensij rumericis, similiter ex aceto tritam.

Patulli lichenici.

Glutinis fabrilis, chamaelonis, sing. drach. iij. sulfuris uiui, thuris, sing. drach. ij. aceti hemina dimidium. Glutinum aceto dissoluitur, dein arida assunditur. Vñs tepore, quantum satis est, aceto diluto, calidum impono.

Humida ad impetiginosos affectus.

Misys peregrini, thuris, myrrhæ, aluminis scissi, sing. drach. viij. aloës, sulfuris uiui, utriusq. drach. iij. Passio excipito, ad spissitudinem stringenti, & bis aut ter in die perficitis illine.

Emplastrum lichenicum.

Ceræ, picis coctæ, terebinthinæ, sulfuris uiui, sing. libras dimidiū quidam committit arida.

Excoriatorium lichenum.

Squamæ xris drach. vi. auisipimenti, fundarachæ, utriusq. drach. iij. xris uhti, ueratij albi, sing. leliquidrachmè: uenturium cantharidij tantundem. Singula per se terito: dein simul musta, cedria excipiro, & ad stringenti spissitudinè reducta, pyxide xris cyprj reposito. Cæterù antequàm excoriatoria imponantur, circumfictas & uicinas licheni partes pharmaco aliquo inflammationem arcente in splenio excepto, integre ac tueri oportet. Post excoriatoriorum usam emplastrum uiride Pamphili ad lichenas.

Ceræ libram: æruginis rase quadrantè: resinæ pliryctæ lib. ij. olei cyathos iij. aceti scerrimi quod sit satis. Conficito ut decet.

Vinde Herophili.

Æruginis drach. ij. mannæ drach. iij. adipis uirulini drach. xij. distalbanij drach. iij. ceræ drach. lxxx. resinæ drach. xlv. aceti quod sit satis.

Emplastrum album, quo Magnus circularor est usus ad excoriatos lichenas.

Lithargyri, ceræ Tyrrhenicæ, sing. lib. i. olei sextarii i. cerussæ lib. i. aquæ sextarii i. Conficito.

Aliud. Lithargyri, cerussæ, plumbaginis loræ, sing. drach. xxv. ceræ, terebinthinæ, sing. drach. xvi. olei hem. i. aquæ tantundem. Conficito.

Compositio Menecratis squamas decidere faciens, & corpora attenuans.

Picis brutiæ pellucidæ, ficis, & electæ, drach. ij. s. resinæ pinus pellucidæ lib. i. & quadrantè, ce-

ræ ponticæ tantundem: chalbanij quadrantè: aceti hemina unam. Conficito diligenter.

Heracidæ Tarentini ad capitis & mentis ficosos tumores.

Elaterij falsisq. partes cõfundito uti torq.

De dentium affectibus.

Equidem in mersio manifestè aliquando percipitur, nò dolentè modò, sed etià pulsantè dentè: quemadmodò carnosæ partes inflammatione uexatæ consueuerùt. Quare mirari sanè, quòd in dente oriri inflàmationem possit. Atqui cum etiam alio tempore dentem doletem, perspicuè sensi, nò ipsius dentis, sed gingiuarù inflammationem, eum dolorem existere: ita ut etiam citra coarctatam dentium doleant, uo uicinitatè rament durorum dentium illis inaueret dolor. Vtriusq. itaq. doloris sensum expertus, aliū quidem in gingiua, alium in ipsius dentis substantia esse, clarè scio.

At uerò, & quòd neruus quidem a radice dentis subtrahatur, aliquando etiam doleat: imponatur autè nobis, ut credamus ipsum dentè dolere, consentaneū rationi est. Etenim quòd dente exempto remaneat adhuc exigua quiddam portio doloris, id ob nerui inflammationem contingit: cum nimirà tuuc dolor nerui leuior tantum reddatur, eo quòd nò amplius ab offe, cui coherbar, tendatur: & quòd iam liberius peripierit, fruaturl medicamentis quæ illi adhibent. Neg enim per contractù, nec per distributionè possibile fuerit inflàmatio neruo mederi, utring à dentium locellis coarctato, & ab anteriori parte ab ipso dente. *Iam uerò cum liuidi tota substantia sua interdù reddant nerui, nihil mirū sit, si phlegmone simile quid patiant. Cui rei licet maior accedet fides, quòd tum natriant, tum augent per totū serè ipsius uitæ curculi: id qd euidenter sæpenumero in his dentibus liquet, qui sunt exemptis oppositi, utpote qui semper augecunt. Siquidè quantum augent dentes, tantum in ciborù

40 læuigatione atterunt. Cum igitur illis absq. nutrimento augeri uò liceat, utiq. duabus affectionibus, & his contrarijs, obnoxij erùt, inopiaz scilicet & redundantiz alimentij, eòd ipsi suppediatur. Inopia ergo, aridiores & tabidiores, atq. ob id tenuiores eos efficit: redundantia uerò, confusilem in eis excitare affectionè potest, qualis est circa carnosas partes phlegmone: ac prouide curandū est, ut redundantia euacuet, partim discutiendo, partim eam repellèdo. At tenuitatis dentium ob alimentij inopiā, nullū remediū est, cum tunc necessarij laxent moucantur: nempe cõpage ipsorù laxiori reddita, ob tenuitatè nò modò dentij, sed locellorù etiā eos amplectentiū.

Hæc itaque affectio senibus accidit citius aut ferius, ueluti etiam magis aut minus. Quæ uerò phlegmonè refert, magis iuuenes corripit. Auxiliari tamè etià oportet senibus, auxilio gingiuas adhibere. Eas autè astringentib. medicamentis robustiores, & magis circa dentem astrictas facere cõuenit: tanq. ipsæ ad stabilitatem & firmitudinem dentij, aliquod etiam conducant. Porro forantur dentes ab humorù actum & erodentiū influxu: quemadmodum etiam cutis citra externam causam solet exulcerari. Verù cutis exulceratur assiduè & multis: ossa autè rarius, quòd ob dunticem

Patullus in mersio
erumpitibus
medicamentis cõ-
gruentia.

Lichenum re-
media scripta à
Critone.

Impetiginis con-
gruentia reme-
dia.

Lichenis excori-
atorum.

Lichenas excori-
atorum sanantia
medicamenta.

Dentes dolere
& pulsare.

Dentes interdù
nonnulli fundè
inflàmationem
percipi.

Dentes augeri
et uariis, quod
linget ex eo quod
sunt corpus ap-
positi.

Dentes duabus
sunt obnoxij est
sustentibus.

Dentium tenui-
tate ob alimenta-
re inopiam esse co-
arctabilem.

Dentes à qui-
bus forantur ha-
moribus.

*Dentium for-
torum curatio.*

duritiem ægrius quàm cutis ipsa patiantur. Igitur corporum erosorum medela, erit reficario utiati insuavis humoris: qui si paucus fuerit, per localia exiccantia auxilia absumetur. Si uerò multus, uniuersè capitis prouidentia est habenda: quod quidem si ob uniuersum corpus affectum sit, huic etiam est prospiciendum. Etenim erosos ob mollitudinem dentes, diutiores impatibilibus res per auctera & acerrima medicamenta reddenda sunt. Ad liuidos redditos, per siccantia curare oportet, ut qui ex uiuoriorum humorum infusum id patiantur: unde de similem cum foratis curationem desiderant.

*Dentium liuidi-
ri causa & cu-
ratio.*

*Gingiuæ infla-
matæ alio im-
pugnatum persua-
dend.*

De gingiuarum medela.
Gingiuæ ex inflammatione dolentibus, optimè pharmacum est oleum lenissimum recens, calis-
tum in duplici uase, atq; ore retentum. Repellit enim citra molestiam, discutit absq; mordacitate, cuius rei inflammationis præcipuus est usus.

Quæ Archigenes ad dentium dolores conscripsit.

*Dentium dolo-
ris, medicami-
na ab Archige-
ne prodita.*

Dolentes dentes colluant acri aceto calido cū galla. Aut pinguius redis in aceto seruata. Aut myrti ramulis cum pice in aceto tepesactis. Aut hyoscyami cum aceto. Aut agrestis cucumeris radice, uel marrubio, singulis cum aceto, pipere, & citro. Aut pulegii decocto. Muricæ facit dens caninus usus & treues, deinde cum aceto coctus, & ore retentus. Aut scillam, aut radicem hyoscyami in aceto coctis colluito. Aut pyrethrum cum lysipso, & colocynthidis medulla similiter coquito, liquorem ex eis longo tempore spacio in ore retento. Hæc Archigenes. Porro solummodo suprafaciendum sensum duntaxat, auxiliatur dentium doloribus.

Ad foratos atq; dolentes dentes remedia ex Archigene.

*Foratorum atq;
dolorum denti-
um remedia.*

Sory Aegyptium resina terebinthina exceptis obline, inde intra dentis cauernulâ. Aut seneciam anguis dentibus apprimito, et excidit. Aut uermes terrenos tostos cauernulæ præmundare inspergito. Aut piper, uel rorismarini semen optimo exceptum, in cauernulam inde. Aut in aurem denti uicinam oleum sesamium, in quo uermes terrestres concocti fuerint, insilla. Ipso autem dolente dente hyoscyamum cõterant. Erosi etiam atque dolentibus dentibus, candens admoouet cauterium. Præstat ad eliciendam pituitam, staphidem agrestem per se, & cum pulegio mandere.

Fomenta ad dentium dolores extrinsecus sunt ex sale & millo, simul & torrefactis, & coniectis in sacculos. Dolenti autem denti affricetur origani ramulus, oleo seruato insinatus. Aut opoponacem & peucedani succum unctis, lincolo illigato, & intra oleum seruata, denti dolenti apprimito. Aut bene coniecto, & hiare lasso, hyoscyami semina in suffimentum adhibe.

Ad extimendos absq; dolore dentes.

Pyrethrum acerrimo aceto ad dies quadraginta condito, terro, & reponito. Vix uerò exigente, reliquis cere obduratis, dolentem ipso pharmaco integro. Deinde hora interposita, digitis extrahito, aut scalpello exigit. Dentes educunt fortiter tithymali succus, & fori, cum clialbano imposita. Apollonius autem radicis betæ succum per

*Dentibus exti-
mendis citra do-
rem remedia.*

se lubet instillari in nares, ad soluendum dentium dolorem.

Eiusdem, ne erosi dentes uacillent, ne uel ferorem edant, remedium.

Veratrum nigrum erui magnitudine, melle cocto exceptum, caueris inde.

*Dentium forati
remedia.*

Eiusdem ad dentes denigratos optimè dentifricum.

Alabastris usi drach. viij. pumicis usi drach. iij. salis torrefacti drach. iij. tritis untor. Ab horum usus colluriue utendū est, ex uino odorato, in quo ad multum tempus iris sicca fuit macerata.

*Dentifricum a-
piatum.*

Asclepiadis remedium ad dentes motos.

Cornu cerui usi drach. viij. Rhois rubri drach. iij. omphacii drach. ij. balsami drach. iij. corticis pinus, myrrhæ, sing. drach. j. tritis untor.

*Dentes confir-
mans remedia.*

Collurio eiusdem ad molarium dolores.

Radicis smyrnæ cum aceto multo coquito, & excolatum liquorem ore tenendum dato.

Ad erosos dentes præstat uatium.

Zingiber cum aceto multo coquito, ac probe terito, indet in cauernam in dito, forisq; dentem ex eo indet. Aut hederæ lachrymam chalybano misceto: aut tithymali, uel ficus sylvestris succo dissoluit, ac untor.

De mobilibus & prominentibus dentibus:

Vbi dentes absq; ictu præcedente mouentur, ut risibile est neruos radicibus eorum adnatos, præ nimis humiditate laxatos efficit idq; siccantibus medicamentis eis esse opus. Quum autem emoti dentes prominentiores sint reliquis, præcipue ubi ex plaga mouentur: sunt semper optimè iudi caui fore, si sic affecti, in tantum attererentur lima, quantum super reliquos prominent: idq; ne oppositos sibi offenderent, in loquendo, mandendo: quod consilium semper mihi satis feliciter cecit. Oportet autem gingiuæ lineo: uam molle usq; ad radices dentium circumdare: dein digitis sinistræ manus leniter amplecti, simulq; & citra compressionem, ne concutiatur cui limulam adhibemus, claurigiam ipsam aggredi: eamq; nō una uice absoluere, sed pluribus. Imperandum etiam est ægro, ut nec loquatur, nec durum aliquid cibum accipiantur: autem alimento fuc co pristinæ, & sorbitione ex alica, & pane madido, atq; alijs id genus mollioribus.

*Dentes promi-
nentes extirpa-
ndos.*

Ad firmandos dentes, ex Archigene.

Myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amyli, æquales singulorum partes tritas admo. Postea aluminum lac colluant calidum, aut acrum, aut uinum, in quo malicorium & galla sint cocta. Ad dentium autem stuporem portulacum aduocant.

*Dentium stupi-
ri portulaca ad-
uocant.*

De dentitione puellorum, eiusdem.

Dentienti infanti, si doluerit, canino lacte gingiuæ obline. Aut si leporino cerebello gingiuas eius illeueris, citò dentes proueniunt. Mulcet gingiuas dolentes æteri cum hyoscyami radice incocta fuerit. Quod si emascens dentes eggerum par, & compungat gingiuam, cyperum ex butyro & unguento fusino iuxta extorrit illinit.

*Dentium puer-
um congruen-
tia medicamina.*

Præseruiatua dentium ab Archigene prodita.

Alumine scisso & modice myrrhæ conficito, nec erodent unquâ. Aut ridem Myricæ mādito-

*Dentes præser-
uantes citra o-
rificationem.*

Compositio Andromachi eadem hora dentium dolorem sedans.

Piperis, pyrethri, succi rithymali, chabai, singul. dracti. j. chalbano excepta in cauerna indoto.

Alia. Seminis hyoscyami, opii, niri, myrrhæ, pyrethri, piperis, singul. drach. j. chalbani drac. ij. tritis ex uino utitur.

Collutio ad moros dentes, Critonis.

Lentiscum, myrrum, gallam, in uino cocta coluenda præbeto. Eiusdem ad corrosos dentes, Capparis radicem cum acri aceto ad dimidias coquito, & colluto tepidum.

Dennificiū ad gingiuas madore laxatas, putrescentes, & truentatas, conculcos dentes, ozænas, parulidas, dolores, & omnia oris ulcera,

Perdici recentia drach. x. mella, aluminis scissuridis llyricæ, singul. drach. iij. piperis albi drac. viij. nigri dracti. iij. pumicis, pyrethri, hyssopi, pullegi, seminis apri, singul. drach. ij. myrrhæ, menthæ siccæ, herbæ fideridii, singul. drach. iij. salis fossilis drach. iij. Per dicium, fideridem, mel, & gallem, mista urito: alumē uerō per seustum uino extinguit: deus omnibus simul confusus urito.

Smeagma dentes reddens candidos, eosq; ab erosionē defendens, orisq; bonum odorem eccliana.

Nuri, nitæ sepi, myrrhæ, sing. vnc. i. trinis urito. Aliud ad idem. Aluminis scissi scicū comestiches vnc. j. comæ rosarum quadrantem: iridis trientem. Tritis uetere, indeq; aquam tepidam coluendam præbe.

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secundum locos, liber VI.

Quamuis plurimū interest, ex uiuine aliquis uoce, an ex libris discat, non tamen parū commodum studiosis ex commentariis accedere: ob idq; ad hocq; confribendos me accinxit, quum rationalia auxiliorum inuentio præstet illi, quæ soli experientia innitit. Igitur in stomatice pharmacia, de quibus agere in præfenti commentario est animus, primus medicū scopus est communis omnium partium inflammatarum: secundus autem, proprius illius cui medemur. Porro inflammationes, ex influxu calidi sanguinis sunt: qui repellendus est, nisi uereamur ipsum ad partem aliquam principem recursum, atque illic grauiorem alique morbum excitaturum. Vtrum igitur uenæ sectione, & purgatio, & clysteribus, etiam inedia, ubi totum corpus plethoricum, aut cacoclythum existerit. Si uerō necutrum fit horum, ita impropæram ad curationem per loca remedia, impofibile autem est, pharmaco ritè uti cum, qui uim ipsius non cognorit, secundum quam auxiliatur. Porro medicaminum repellentium genus, quibus utimur in principis inflammationum, in materia refrigerantium consistit: quorum sanè eæ quæ astringendi natura prædita sunt, efficaciores uim habent, ad ocus repellendum influxum. Inest quippe ipsis ita etiam facultas cogendi & densandi superficiem corporis cui admoventur.

Communis itaque scopus in oris inflammationibus est, proluendi eos dum incipiunt. Se-

cundus autem ab ipsa particula sumitur, quum sciamus longè rariorem atque molliorem esse oris tunicam, cute quæ uniuersum integritur corpus. Taceo tunicam oris, medicamentorum in suauitatem percipere: postq; medicamentis ori indurata deluere in uentriculum & pulmones: quorum neutrum cuti reliquæ adest. Quare fortibus medicamentis, cuiusmodi chalcantidos existit, quæq; uenenosam facultatem fortuntur, uti ad oris affectiones non licet, nisi magna urgeat necessitas. Ergo succus mororum solus, recensq; si fructu ipso expressus, ad incipientes oris inflammationes est melior illo, qui, ut asseruari diutius possit, ex melle coquitur: quamquam ad sequentia inflammationis tempora, unior est qui ex melle est coctus. Nam quemadmodum in principio uris sunt pharmaca repellentia id quod induit: sic post principium usq; ad finem, pharmaco opus est ex utrisq; misto, repellente uidelicet facultate, & discutiente prædito: ac primo quidem tempore, astringens præcellere oportet: ad finem uerò discutiens: atque interpositio tempore æquales utrorumque partes esse conuenit. Quando uerò uelut induratum quippiam ex ipsa inflammatione relinquatur, penius non conuenit astringens ad discussorium miscere, * si prius uniuersum corpus fuerit uacuatum. Similiter neque in principio bonum est discussoria miscere astringentibus. Merito autem qui pharmacum diamorum composuit, parum ex croco & myrrha ei commiscuit, quod communem habeant facultatem concoctoria inflammationum: prius uerò crocus quidem astringat: myrrha autem calfaciat in tantum, ut sufficienter discutiat, tenuium partium etiam substantiam possidens, quæ faciliè in alium subire possit, uiresq; aliorum medicamentorum deducere. Soleo autem ipse in principio ad pharmacum diamorum miscere rhois succum, aut omphacium, aut florem rosarum, aut ipsas rosas siccas, necnon balaustum, cynosol, malicorium aridum, gallam omphacitini, pini, thurisq; cornem, hypocistidem, lentisci succum, ac breuiter astringentia omnia, præter ea quæ corruptentem possident facultatem, quæ & deleteria dicuntur, & letalia species quædam existit: quippe cum non omne letale, necessariò etiam deleterium, hoc est, uenenosum existat. At ubi inflammatio iam constitit, sufficit ad mororum succum addidisse tantum crocum & myrrham, ut ipsa inflammatio coquatur. Quæ ubi concocta fuerit, ad addere aliquid ex discutientibus licet, cuiusmodi sunt niri spuma, nistrum Berenicarum, sulfure uiuum, sapa, origano interdum in cocto, aut hyssopo, aut pulgione, aut thymbra, aut rithymo, aut calamintha lioriens & agrestis. At uerò Erasistratus, quum mororum succus illi ad manum non esset, rubi cremore usus, seipsum curauit. Ego autem pharmacum ex succo nucum uiridium coquebat, facultate ad oris inflammationes ceteris omnibus stomaticis plurimum antecellens. Cuius compositio est huiusmodi. Succum externi nucum uiridium corticis cum mellis uisita portione coquo, donec ex utroque mellis crassitudo consistat. Hinc autem liquer, qualis sit eorum corticis succus, quantaq; astringendi uis, quod ne per fortissima quidem exterioria, nigredo diu possit ab eorum manibus, qui

Oris affectionibus cor exhibenda non sunt fortia, nec uenosa medicamenta.

Oris inflammationibus quæ astringentibus medicamentis.

Digerendum si in uridum esse, ubi duritas aliqua ex oris inflammatione relinquatur, ceterum prius coque uenosa remedia.

Cretis facultas. Myrrha astringit.

Diamorum medicamentum.

Letalia omnia non esse deleteria. Oris inflammationis concocta quæ coquuntur.

Rubi cremor.

Stomatia ex succo nucum uiridum, ad oris inflammationes conuenientissima cum posita.

Nucum succo uiridum ad oris inflammationes potissimum.

Dennificiū ad emollienda gingiuas cum acro tritis faciem.

Dennificiū infusum.

Inflammationem rationalem auxiliorum præstare illi, quæ soli experientia innititur.

Inflammationis causa, & curatione.

Astringentia faciem.

qui virides nuces decorticant. Atqui nisi in profundum manū illa facultas descenderet, non certe xegerē eluibilis esset. Quam autem descendat, indicat planē lubilitas succi, tenuium parium esse. At rationi est consonum, astringendi vim esse maximē ex usu, ubi in eiusmodi cōtinetur lubilitas: in epiam autem existeret, quæ et assilū partium substantiæ est coniuncta. Optimum itaque simul suauem esse nucum succū mihi per fusadēna, cum in quatuor partes diuidi & ad primam itatim aliquid ex astringentibus miscuo: ad secundam, ex croco & myrrha: ad tertiam, sulfuris & ni tri non niliū. Quartam uerō solam synceram seruo, ob dulcorē futuram uniem pueris, mulieribusq; & uiris effeminata. Est autē quod ex succo rubi constat, fortius eo quod ex moria conficitur: quemadmodum hoc eo, quod ex multo paratur: omnibus tamen præstat quod ex succo fit nucum. Porro in pharmacis quæ deglutiunt, maximē coniectare oportet naturam eorum quipaisa fument. Nam quod cum molestia aut fastidio accipitur, os uentriculi euerit. In stomatis autem medicamentis, eiusmodi syncratem interduum contemnerē licet. Si quis igitur medium aliquod medicamen conficere omnibus aptū uelit, ut (exempli gratia) quod constat ex succo mororum, ad quinq; libras succi, unam mellis adiciat: croci autem & myrrhæ, utriusq; drach. j. s. Vini item austeri heminā unam: omphaci, drach. j. Quod si non addit, pro ipso rhioia succum ini-

Astringentium tuum substantia tantū esse maxime ex vi ad repellendā inflammationem.

Stomatium ex succo nucum, extra omnia præstat.

Stomatium diuino compositum apta omnia habet.

Aromaticorum complurium rerū, per cuiuslibet exal.

Ora induratio inflammationis huiusmodi sine apta medicamentis.

Ora viginti inflammationis quæ huiusmodi ex alia medicamentis.

Punicorum malorum speciem tres, aut quatuor, dulcium & acidum.

Stomatium ex punicorum succo.

tunditur etiā cum illa & rubi fructus: cuius succus similiter præparatus succo mororū, melius illo pharmaco redditur, sed minus ualidum eo, quod ex nucum succo paratur. Quin & mīlorum cotoneorum, & pīrorum sylvæstrium, ac mēspīlorum succus, similiter præparatus, stomaticum pharmaco redditur, apertius enim ut deo retur: quū hoc quod ex nucibus cōstat, deuorare nō liceat. Verū quod ex punicis constat pharmaco, apertius est exoluto & cibis fastiditi uentriculo: deficit tamen ab eo quod ex mīlis cōstat. Inno-

Stomatium ex nucibus deuorandum non esse.

cus est enī rubi mororū succus uoratus, ueluti & ipso mororū: sed succus rubi mororū habet quid quod stomachum roborat: quod ipsum, mororū tremor non habet. Iam uerō uis succu nucum plurimo melle opus habet: & post eum, rubi mororum: modico autem, mīlorum & punicorum, & pīrorum sylvæstrium. Medius inter hea est mēspīlori succus. Ex cornis etiam, brabylisq; & prunis, stomatica præparantur. Ceterū si crassus esse uideatur succus, statim mel admiscere oportet: sin liquidior, præcoqua: ut. Suscipit autem pīrorum atque mīlorum succus parē mentisuram mellis. Succus uerō eorum quæ nimia acerbant, ueluti est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplum mellis desiderat. Porro si aīramenrum sutorium admittum sit, non admodum degluri e oportet conficium pharmaco, præter quā si iuxta stomachum aut alium ulcerosam affectionem fieri ueremus. Quin & si in ipso ore maligna ulcera fiant, præstat ex atramento sutorio medicamentum. Sufficit autē drach.

Rubi mororum succus si uentriculo roborat, id quod iuxta mororum ad iust. Sutorium quod nō plus, & quod minus requiritur mellis.

ad prædictam compositionē admittit, in qua anī mellis libram coniūgi dicebamus. Iam uerō quum rhus sit duplex (alter enim obsonis inspergitur, stomacho commodius: alter coriorum tinctores utuntur) uterq; sanē multo incoctus, stomacum efficitur medicamen. Mustum etiam solum, citra mellis mixturam in melia compagem redactum, bonum fit pharmaco in principis, augmentis, atq; uigoribus. Ad declinationem autem præstitit, si in ipso diem integram tēdas pingues præmaceraueris. Quod si preciosius efficere pharmaco uis, inq; uis etiam calix corticem, aut nardū Indicum, aut malabaritū solum, singulorū nempe unam drachmam. Ad induratas autem: nīllas mōnes cōiūciuntur quæ generosius discutere possint, rusa uidelicet, & eribara: idq; ubi olla ab igne est exempta. Ac talia sanē sunt, eorum, amomum, macer, Cyrenaicus succus, Medicusq; Pau-

Calceanthos quando stomacum uisere expedit medicamentum. Item duplex.

Melle quando & qualiter præparare uisum in ore inflammationis.

De uicinis pharmacis quæ non sunt.

peribus tamen pro sumptuosius discutorijs pharmacis, aut dictamnium, aut acoron, aut meon, aut pyrethrum, aut cardamomum, aut sinapi inscien dum censio, pari ponderē: ita ut ad triū drachmarum pondus, eorum mīlorum moles perueniat ad prædictā symmetriā, in qua melia libra habebatur. Verū pro cōstitutionis affectū uū proportionē augeri ac minui pharmacorum uehementiam oportet. Ergo pharmacis cōficiētes ex multo, ad decē multū heminas, tres inq; ciemzā heminas rhioia coriariorū, aut eius qui obsonis inspergitur. Si uerō uirgū inscienzā, utriusq; una & dimidia inscienzā est. Iuxta proportionem etiam, ex discutorijs, quodcūq; randem in promptu habeamus. Quod si unum tantum suppetat nobis astringēdi uim habens, quod in principio inscien-

Stomatium ex melle compositum.

Inflammationi
inapertenti, an-
stria: regenti,
moderata in
clinant, magis
digerentia con-
ducunt.
Astringentia pa-
rati sunt.
Digerentia me-
diocriter.

Digerentia va-
lent.

Stomacis an-
dromachi ex mu-
sto.

Stomacis ex
balsa Andro-
machi.

Columella lava-
ta remedia.

Stomacis ad
omnia reme-
dia.

Stomacis
Aclepiadis.

mus aut unicum discufforium, quod iuxta finem
ex illo roborum pondus explebitur, quod ex omni-
bus alioqui fuisset confandum. In uniuersum au-
tem, austeriora quidem, in principijs, & uehemen-
tibus infussionibus congruunt: moderatiora in
uigoribus: ut magis discufforia in declinationi-
bus. Porro ex astringentibus facilia paratu sunt,
rosæ, bacæ myrti, myrtus, lentiscus, rubus, canrus
bos, galla omphacitis, fructus Aegyptiaci spina, o-
mnia aluminis genera, unns & alter rhus, glauci, 10
omphaciū, cytini, & balaustra. Ex discennibus
moderate, parantur caricarum furfurumq;
decoctum, aut mulla, in qua origanum, aut hy-
sopum, aut rhyum, aut calamintha, aut pulegio,
aut hedyosmum concocta sint: quæ si diutius co-
quantur, fortiora redduntur: amplius autem &
niteri spuma, aut ipsam nitrum usum. Fortius ue-
rò his est fufur uiuum. Recte autem Andromachi
medicamini ex succo mororum cōfecto ad-
didit glycyrrhis am, ut exasperata leniret, asperita
temper astringentium minorem redderet.

Stomacum Andromachi ex mu-
sto, quo utitur.

Gallas xxx. Rhois coriari sext. ij. multi sext. vi.
Gallas contratas per diem & noctem in mu-
stocero deinde coquo, donec ex roto quarta su-
per sit portio: quam per lintreoli colatam, expres-
samq; in olla ad mellis crassitudinem spissat: de-
in trita addito, aluminis scissi, croci, myrrhæ, sin-
gul. drach. i. permista reponito, tandemq; eis uti-
tor. Iam nērō, quod ex dulci confectum est mu-
stus, magis mitigatorium & moderatum erit, sed
minus efficax: id autem quod ex acerbis fit uisus,
uehementius quidem astringit, leniendi uim ta-
men non habet: ex medio uero paratum, mediam
facultatem sortitur.

Stomacum ex balsa, anginis congruens,
ab Andromacho scriptum.

Sem. anisi, api, ammi, floris unci odorati ro-
tulinis scissi, iridis Illyricæ, balsa (hoc est, semi-
nis rutæ syluestria) cinnamomi, myrrhæ Troglody-
ticæ, aristolochiæ longæ, casij, rosarum siccarū,
crocomagmatis, sing. vnc. i. croci, cineris hirundi-
num tenellarum, utriusq; quadrantis: croci sequi-
uinciam, nardi Indici, amomi, utriusq; vnc. s. gal-
las viij. tritus cum melle utitur.

Stomacum Asclepiadis.

Hirundinū syluestriū ustarum cineris drac. iij.
croci, nardi Indici, utriusq; drac. i. melle excipio.

Aliud Andromachi, ad columellam laxatam.

Aluminis liquidi lib. i. florum rosarum lib. s.
succu hypocistidos quadrantem. Alumen in mel-
le coquito, dein sicca inspergito, unitorq;.

Aliud eiusdem ad omnia uisus oris.

Crocomagmatis drach. ij. iridis drach. iij. san-
darachæ drach. s. terbinthinæ drach. ij. lychni
Indici drach. i. uuae passæ drach. viij. aloës, ompha-
ci, singul. drach. i. nucum pinearum tostatarum
drac. viij. succu glycyrrhizæ, aluminis scissi, balau-
stræ, singul. drach. i. floris rosarum drach. ij. mellis
hem. ij. s. Conficito.

Stomacum Asclepiadis.

Succu hypocistidos drach. ij. balaustræ, lycij, aca-
ciæ, sing. drac. i. excipio oliuæ immaturæ succo,
& postea melle subactis unitor.

Si uerò aeger stomatica id genus fastidiat, in mo-

deratis quidem inflammationibus sufficienti suc-
ci soli fructuum iam dictorum, ut rubi, & moro-
rum, punicatorūq; aliorum, & coronarū. Quin
& succus nucum ubi cum solo melle paratur, gu-
stui suauis existit: itemq; multum ex uisus acerbio
rhus presium, si rhus in id coniiciatur, optimum
pharmacum redditur. Ad eas uerò inflamma-
tiones quæ multa astringitione indigent, austeriorū
panicorū, aut coroneorum, aut urrorūq; succus,
melli admixtus, sepe meli fuerit. Singulis autē
horū succorū licet omphaciū adijcere. Vehemen-
tissimū medicamen reddet, si punica integra ran-
das una cum corticibus, indeq; succū exprimas:
argi hoc magis si acerbæ fuerint. Acerbissimum ue-
tiam fiet, si ad panicorum austerorum ita rui-
dum succum, omphaciū superaddideris cum mo-
derato melle. Præstantius adline reddes phar-
macum, si rora confusa ponica mella, passo cocta ex-
colaueris. Ne uerò ualde exasperet, glycyrrhizæ
succum admiscens, conficies optimū pharmacū.
Si quid uerò indurati apparer, his succis quæ me-
dias facultates fortiantur, inq;ies aliquid, dum
coquantur, ex pulegio, aut rhyso, aut origano,
hyssopo, mentha, aut calamintha: deinde colabis,
& habebis optimū medicamē. Quod si calidius effi-
cere uelis, piper addes. Omnibus tamen si glycy-
rrhizæ succus addatur, melius pharmacū efficiet.

De crustis.

In calidis & humidis corporis partibus, qualis
est os, ex quacunque tandem causa fuerit exalcera-
tio, citò putredo oboritur. Ad cuius ulcera for-
tissimis sepe uti cogimus medicamentis. Atqui
fortissimæ sunt, quæ escharam instar cauterij ex-
citant. In externis igitur corporis partibus, ubi
pari crande crusta fuerit indurata, si foribus uis
perfedemus pharmacis, transgredientes ad deter-
soria, quæ escharas tollunt. In his uerò quæ in ore
excitantur sunt escharis, tutius mihi uidetur esse ad-
miscere ad exteriora pharmaca, alia quædam for-
tiora, & quæ per se admodum, crustas etiā inurent.
Melli itaq; maxima extendi uti prædico, crustifi-
ca medicamenta immiscemus: quemadmodum ad
sordida quæ in corporis cuticula oriuntur, misce-
re illi licet ex tergentia solemus, ut rhus, eruum,
iridem, aristolochiam, & alia id genus. Porro An-
dromachus, ad os crustas, ex nucibus pineis, a-
mylo, alumine scisso, florum rosarum, croco, & mel-
le, composuit optimum stomacicum.

Critonis ad os crustas medicamentum.

Misyo torrefacti drach. iij. mellis optimi cy-
thos sex: miscebo & utitor. Idem enim præstat
chalciris affata cum melle.

Archigenia ad crustas oris remedia.

Commodissimum est stercus canum, altorum
osibus, ex melle illitum: quod etiam in angina au-
xilial. Aurhus Syriacus ex melle. Aut hirundi-
num ustarū & stercoris humani par modus cum
melle illitus. Aut heparis lupi aridi cochlearia
duo trita bibenda dato. Ego uerò medicamē ex
rhoë damno, quod astringens sit facultatis, quæ
minime crustis cōueniat. At hepar lupinū eupato-
rio mistum, ad heparitis etiam bibet affectiones.
Sorani stomacicum ad crustas, scitentesq; gin-
gias & humore prægnantes.

Misyo usti drachmas viij. iridis Illyricæ dra-
chmas iij. croci drach. i. Trita in pyxide lignea
reponi-

Acerbissima sto-
matica efficitur
dato.

Induratio infl-
ammationis, ap-
ta stomatica.

Glycyrrhizæ
stomacicum ad
os, ipsa meliora
reddet.
Putredo obori-
tur citò in cal-
da & humidis
partibus.

Oris passio ex
torpido melle
ad exteriora
se referentissim-
a pharmaca.
Crusta per se ad
mella, extricare
possunt escharas

Oris crustis de-
lenda remedia
varia.

Crustis non con-
uenire affragan-
tia.
Hepar lupinum
conferit hepatis
ex.
Stomacicum
Sorani.

*Arteria apti
macum fit ex cer-
to & argenteo.*

macum efficit. Nam quemadmodum ex cerato & argentine incantans efficit pharmacū solet, tamen si ambo per se sint contraria carni gignenda: eadem ratione ex oleo & chalcide aptum medicamentum conficitur.

**GALENI PERGAMENI DE
compositione medicamentorum secun-
dum partes, lib. VII.**

De affectionibus contingentibus circa
respirationis organa.

*Arteria phre-
nica qua de-
cavit.*

*Aspera arteria
ex quibus con-
stitit pars interna.*

*Vox quando
intercipitur.*

*Raudo quon-
do gignitur.*

*Vox organo
qua.*

Aspere arterie pharmaca, mos est appellare arteriaca. Vocant enim arteriam asperam, ut illi quae ducit ad laryngem ad pulmones, ex cartilaginosis corpusculis, bronchiis dictis, constitutam; unde etiam tota arteria, interdum dicitur bronchus. Vestit autem ipsam intrinsecus quædam crassa membrana, quam ob crassitudinem uonnulli tunicam nominant. Scripserunt porro veteres multa & diuersa medicamenta ad affectus organorum respirationis ad uocem tum interceptam, tum raucam. Etenim ubi intrameta uocis ab humiditate uehementius atque tenacius impacta fuerint imbuta, uox intercipitur: quæ uero moderatus humiditas sunt, oboritur rauco. Organa uocis quæ dico, intellige arteriam, & laryngem, & pharyngem, & epiglottidem. Qui igitur ex uehementi clamore uocem amplius obliuiscunt habent, ipsi similia quædam affectum cõtingit in illa tunica asperæ arteriæ interna, ei quæ manibus, cruribus, & musculis, ubi plurimū laborant. Ceterum curationis genera euariunt. Si quidem crura & manus confricare per oleum licet, quæ per cutem in adiacentibus musculosa penetrare ipsius potius facultas. Luxa asperæ uero arteriæ cartilagine post cutem fite, proliunt in subiectâ pelliculam transfrangit facilius unguentorum mollium, itaque auxiliari materia congruenti respirationis organis, quæ ab alijs petenda est, tum etiam ad balneis dulcium aquarum, cibis & lenibus, & laxantibus. Si uero asperæ fenestram, cibis utendum est: qui diutius hæret partibus quæ cum loco affecto commercium habent. Est enim una, eademque sibi continua & coherens tunica, quæ pharyngem, laryngem, gulam, & internam ipsius asperæ arteriæ uestit, obducitur. Quare cibi congruentis tunc erunt, qui ex lacte, amylo, alica, ouis, & libis dulcioribus constant. Si uero per hæc non eurentur affectio ipsa, iuuenta sunt a medicis pharmaca sub lingua tenenda, ob id quæ hypoglottidem appellat: quæ eadem facultate cum arteriæ uocatis prædita, ex uino Theriaco, gummi, tragacanthæ, & glycyrrhizæ constant: quæ leniguit quidem reprimunt omnes asperitates, quicquid uero reliquum est ex inflammatione, concoquunt, & citò perferunt. Qui autem pharmacum linguis subder, patienti sit laboris oportet, ut ipsum paulatim liquefcat, in laryngem excipiat, renitens interitum rursus, si quæ excitari uideatur. Impossibile tamen est, ut hi claram uocem elidant, citra usum pharmacorum absque acrimonia exergentium: qualia sunt faba fresta elixa, pistana, æ semen lini torrefactum. His magis detergent refina cerebintina, thursi, ac despumatum mel, & amygdalæ amaræ: quemadmodum istis rursus fortiora sunt farina erui, semen homini, radix iuridis, panacis. Cete-

*Respiratio or-
ganis male affi-
cta remedia in
de petenda.*

*Tunica eadem
uestit gulam,
pharyngem, la-
ryngem. Et in-
terna aspera ar-
teria.*

*Hypoglottides
ex quibus con-
flectur.*

*Hypoglottidis
quomodo sit re-
tendum.*

*Exergentia a d-
reparantem
faciunt, quæ
sunt.*

rum his omnibus uina molliis, & passum Creticū, & Theriacum, & Scybelatæ, & sapa, & decoctū caricarū, conueniunt. Est autem ab affectionis principio, usque ad finem eiusdem, paulatim progredendum a leuissimis tum cibis, tum medicamentis, ad ea quæ discutiunt detergent uehementius. Igitur primi ordinis sunt tragacantha, gummi, famis asster, amylo, sorbitio ex alica & trago, iac, panes dulciarij, oua sorbitia, scisma, & nucæ pineæ, quas strobilos uocant. Ab his autem deinceps est butyrum, & glycyrrhizæ decoctū: id quod præstiterit ad saphæ ex musto, uel ad Creticū passum miscere, rursus coquere. Hæc itaque in affectionibus inflammationis circa arteriam atque laryngem ortis cõmoda in principio sunt, donec moderata inflammatio fiat: ac præ omnibus a uini potu hoc tempore abstinentum est. Quum uero moderatio facta inflammatio fuerit, uinum dulce Theriacum, aut Scybelatæ bibere licet: quo tempore etiam butyrum est aptum, & sorbitio ex amygdalis, necnon ex lacte & melle diutius coctis, amylo miscito, aut filigine. Quæ sanè uicis ratione inflammationis quidem ipsa sedatur: relinquunt tamen humiditas multa, ob quam impossibile est claram uocem proferri. Quare transire tunc cõuenit ad his edulsijs, ad omnia ex melle cocta, & ad fabam frestam elixam, & pistanam, & brasicam, & porrum probe coctum. Similiter etiam pharmacorum usus idoneus est, quo tempore inflammatio aut aspersio præcellunt, eorum quæ detinentur sub lingua: post hæc magis detergentia & resiccantia excludemus: id quæ gradatim facimus, donec ad ea quæ credimus nonnulli fortis sunt, perueniamus. Deinceps igitur ex arteriis quæ ad ueteribus prodita sunt eligens præstantiora, huius methodo adiciam: quæ quidem nec discernere, nec his potest, qui in cõmentarijs simplicium medicamentorum accuratè non fuerit exercitatus.

De arteriis ab Andromacho scriptis.
Thuris, myrrhæ, croci, sing. drach. i. scilicet drac. ii. passu Cretici sextar. iij. Scilla in passu coquitur, donec inspersetur passum: dein scilla abiecia, insperguntur reliqua: sing. et ceteris, hoc est, delingibile pharmaca.

Alia arteriaca confectio.
Alcis sextantem, croci vnc. i. maritiches tantum dem. Conficito. Solutum enim alium, concoquitur (croci ratione) ea, quorum gratia exhibetur.

Alia leniens exasperata, concoquensque & exergens.

Thuris, succi glycyrrhizæ, sing. vnc. i. tragacanthæ drach. vi. nardi drachmā i. myrrhæ, amomi, croci, sing. drach. iij. mellis Attici quod sit fatiat. Conficito.

Alia arteriaca, optima ad rabidos, & omnes inueteratos pulmonis & thoracis affectus. Cinna momi, thuris, utriusque vnc. i. succi glycyrrhizæ, myrrhæ, tragacanthæ, nardi Indici, amomi, sing. drach. iij. croci drach. i. Melle Anico excipito.

Alia ad arteriæ affectum, ulcera pulmonis, puris & sanguinis reiectiones, fluxiones in thoracem, & ad ea quæ exgeredu possunt uehementer efficac. Refine cerebuthus, croci Cilicij, thuris, myrrhæ Troglodyrice, cinnamomi, amomi, nucis pineæ, glycyrrhizæ absque medulla, arteris famij, chalbanij, costi, sing. drach. iij. nardi Sy-

*Voci aut impe-
ditæ, aut rauca,
ab inflammatione
afflictæ, cer-
ta laryngis, aut
asperæ arteriæ
obortæ, quædam
uicis et medi-
cina ratio con-
ueniat.*

*Arteria, hoc
est, ad affectum
organorum uo-
cis et respirationis
congruentia,
pharmaca a An-
dromacho.*

*Tubida arte-
riæ optima.*

*Hæmoptica
arteriæ pro-
ficio.*

ritæ drach. ij. s. casie nigre drach. ij. tragacanthæ, palmularum Syriacarum carnia, sing. drach. iij. Mellis Attici heminas iij. Confectio.

Hypoglotides, hoc est, orbiculi sub lingua tenendi, ad asperedines duntaxat, interceptis uocem, & sanguinem reiectant. Tragacanthæ drach. vi. gummi drach. v. thuris drach. ij. obol. i. myrrhæ drach. j. obol. ij. croci tantundem: succi glycyrrhizæ drach. j. obol. ij. aut rad. drach. ij. s. piperis albi grana xxv. palmularum pinguium carnis drach. iij. Tragacantham passo maceraram & triam reli quas trinis cōmittito, singulis caraporia magnitudine fabæ.

Arterice delingibilis, ad tabescentes, purulentos, atque hydropas incipientes, & rufes in uetera cōgruens. Datur per diem & noctem cochlear iij mensura. Succus scilly sext. iij. passus Cretici sext. iij. vini Falerni sext. viij. mellis Attici sext. iij. myrrhæ trientem: croci, thuris, utriusq; sextantē: aristo lochiæ oblongæ minam j. s. glycyrrhizæ minam unam: radicia eryngij sextantē: casie, nardi Celticæ, singul. vnc. j. xylobalsami bessem. Lignosa illa conculsa in uino macerato per triduum, dein ad lennum ignem ad tertias coquito, atq; ita exprimito, & retinentis abiectis, passum, mel, & scillæ succum cōiungito, & ad mellis crassitudinem coquito. Crocum uerò, thus, & myrrham, cum uino terito, atq; ubi optime habuerit pharmacū, addito: postquā uerò fuerint modicè fusa, ab igne tollito, & reponito ad usum.

Alia arteriaca media, medijs congruens arteriæ affectibus.

Croci, unæ passæ ex cinar, utriusq; drach. j. amygd. dulciū drach. viij. myrrhæ obolos iij. tragacanthæ drachmas iij. piperis albi obolos iij. melle cocto excipiantur.

Critonis Arterica, ad uocem interceptam.

Ficum & eryngium probè coquito, & ad decoctum ipsorū gummi addito, ut melle durior confectio fiat: exhibetorū ad noctem.

Alia eiusdem, faciens ad affectus arteriæ, & ulcera tum aurium, tum etiam pudendi. Thuris obolos iij. myrrhæ drach. ij. passus cyathos iij. Passum ad mellis spissitudinem coquito: dein myrrham & thus cum passo semicocto ablato, misce. Facit etiam ad dysentericā & colicā. Residuum autem fecerit, qui arteriacas concoquens atq; lenientes, in duplici uase coxerit: nempe uasculum quod coquendum pharmacum continet, in aliud plenum aquæ feruentis imponens.

Confectio Critonis ex capitibus papaueris, dia-codyon dicta, ad affectus organorum respiratoris conducens. Capita papaueris agrestis ostingenta: aquæ sextarios lxxx. Coquito ad tertias, hoc est, donec flaccida appareat: atq; expressis addito mellis lib. x. Si uerò uariam efficere uis, adde croci, myrrhæ, succi hypocistidis, sing. drach. xj. thuris drach. vi. acacie drach. xj. Optima tamen est simplicissima.

De usu confectiois ex papaueris capitibus. Vnus eius est in ijs qui somno opus habent: quibus etiam ex opio confecta sepe exhibere cogimur. Opus habent maximè huiusmodi pharmacis iij, quibus tenuis fluxus & capere ad asperā arteriā destituit, non permittens dormire ob consequentē

rufum. In talibus ego etiam ex sapa, hoc est, hepse mare, siue multo cocto, quod etiam siron uocis, pharmaci compositionem parare soleo. Quin & per passum aut Theriā Creticā melius est quam per mel cocturū fieri, ubi fluxus ualde tenuis extiterit. Mel siquidem fugiendum tunc est, quum tenues fluxiones augeat, facultate tenendi præditum. Admifcetur etiam huiusmodi pharmacum glycyrrhizæ, ita ut simul cum ipso coquatur. Si uerò in pulmone consistat copia humoris delapsi à capite, confectio ex melle est præstantior. Datur cōmoderata mensura duorum cochleariorū satis magnorum copia. Augēbis autem & minues hanc copiam, respiciens ad magnitudinem corporis cui exhibiturus es, necnon ætatem, anni tempus, atq; regionē. In omnibus enim his, frigidioribus minimū dabis, calidioribus amplius.

Artericæ ab Asclepiade scriptæ.

Brasice succum melle coctum lingendum ex aro hibe. Alia. Cremoris eryngij in aqua cocti, heminas ij. Cremoris caricarū similiter coctarum, tantundem. His adde gummi subtilessimè dissoluti drach. viij. coquito diligenter ad artericæ spissitudinem, & inde cubitum iuris ad cyathi mensuram lingendum dato. Alia. Chalbani drach. vi. piperis drach. j. nitri tantundem, mellis Attici cyathos vi. Chalbani & mel coquito, densatq; ad dicto ceteris, utriorij. Alia insignis. Croci, myrrhæ, succi glycyrrhizæ, thuris, casie, singul. drach. j. piperis grana xxiij. passus Cretici sext. iij. mellis Attici cyathos vi. utere.

Hypoglossis Dioscoride.

Croci, myrrhæ, tragacanthæ, succi glycyrrhizæ, sing. drach. j. nucis pineas repurgatas, contrasas, numero. lx. amygdalas mundas totidē. Excipiantur melle decocto. Datur nucis ponticæ magnitudine sub lingua tenenda.

Alia Muldradina.

Myrrhæ, croci, utriusq; drach. iij. nardi Indici, terēbinthinæ, utriusq; drach. ij. thuris, casie, cinnamomi, sing. drach. j. passus Cretici heminas iij. Passum & terēbinthinā ad perfectum compagem coquito, & cum ficcā cōmittito: iudeq; ad nucis ponticæ magnitudinē sub lingua tenendum dato.

Alia mirificæ faciens ad affectus thoracis.

Faring fabacæ toste sem. j. iris illiricæ quadrante: nucum pinearū totarum sextantē: pulegij ardi cōtus scilicet drachm. i. feminis urticæ drach. j. piperis vnc. s. Mellis boni sext. ij. Farinam cum melle ad densitatē coquito. Seminis lint etiam rufi, rosti & cribrati heminam unam in promptu habeto, cum ceteris adijceto.

Alia ad tussim & spiritus prolationem, ualde probè expurgans.

Hyssopi, pulegij, utriusq; sextans emiridis, sem. sinapis, nasturtij, anisi, piperis, sing. vnc. j. rufa & eribrata, melle cocto excipito. Datur cochlearis boni mensura.

Confectio ex marrubio Platonis.

Myrrhæ, styracis, opij, succi marrubij, chalbani, croci, æquales partes. Verè melle cocto exceptis. Pharmacum Harmonia dictum, ad destillationes, insuperabilemq; defluxum conducens. Stryracis, castorij, piperis, cardamomi, singulorum drachmas iij. opij, myrrhæ, feminis lyocycami albi, sing. drach. iij. passo excepto in caraporia reducito,

Melle usum fugiendum esse, ubi tenues fluxus à capite ad asperam arteriā destituit: recipiendum autē cum crasso. Dioscoridius medicinas recte de modis.

Arterica a modo canita ab Asclepiade relictā

Hypoglossis est medicamentum sub lingua tenendum, Dioscoride.

Hypoglossis Muldradina.

Hypoglotides uerū, multiq; ysm.

Hydropi recentis optimus medicamentum.

Voci intercepta arteriaca Critonina.

Vicribus aoniū potendūq; medicamentum.

Conpendia esse arteriaca lenientia in duplici vase, & quomodo. Dioscoridius Critonina.

Dioscoridius, hoc est, ex capitibus papaueris confectum medicamentum, quibus res uicribus.

Marrubio conflat medicamentum.

Harmonia dicta medicamentum destillatum ad peritus confectum.

cito, datoq; cicetis magnitudine ad somnum.

Medicamen Andromachi, Ambrosia dictum, ad phthisicos & febres repetentes per circuitus. Nardi, croci, myrrhæ, costi, casiar, cinnamomi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi, castorei, chailbani, terebinthinae, styracis, succi papaueris, seminis hyocyami, sing. drach. i. tragacanthæ drach. vi. anisi, sem. lini, sing. drach. i. mellis quod sit satis: uini Falerni hemina. Tragacantham uino sufficienti macerato, & reliqua simul cū mel le cōmituto. Datur febricitibus seiquidrachma ex aqua mullā: febre carentibus vñctā dimidia cū melle & acen co cicleario uno, & uini Falerni cyathis duobus.

Aliud ad omnem tussim.

Anisi drach. ij. costi obolos iij. myrrhæ, castorei, chailbani, piperis albi, sem. hyocyami, opii, succi glycyrrhizæ, sing. drach. i. passio excipito, redigitoq; in catapona, cicetis magnitudine.

Aliud ad omnem tussim, & fluxionem,

& abiceffus internos.

Sagapeni, gennanæ, myrrhæ, opopanax, pipe ris albi, sing. drach. ij. bacchari lauri mund. drach. iij. ruta, & aqua excepta, exhibebo ad græce magnitudinem fabi: scibz dicitur tamen paulo plus, ex uini diluti cyathis tribus.

De reiectione sanguinis.

In reiectione sanguinis primum periculum est, ne immoderata eius uacuatio fiat. Vbi uero suppressus est, curatio eius quidē, quæ ex reiectione oculi alicuius uasis conigit, per obturationē sit oculi dilatare uero quæ ex uasis ruptura, per cōgulationem eiusdem: quemadmodum eius quæ ex erofione, per eroforū renutritiōnem. Obturatur igitur autem referatur, per astringentia: cōgustatur autem ruptum, per eadem, & quæcunq; ipsis in compositione miscentur, citra mordacitatem refecantur, & glutinosum quidam habentia, uelut est Lemnia terra, & Samius asper. Renutritiunt corrola per cibos boni succi, & pharmaca carnis gignentia. Igitur iuxta primam rationem, ex talibus pharmaca componuntur congruentia ad curandam sanguinis reiectionem: iuxta secundam uero, in ijs qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut larynge reieciunt sanguinem, miscentur prædictis cōgruenti mensura calida & tenuiū partium medicamenta, quæ infusissima sunt tribus illis affectionibus dictis: miscentur inquam gratia distributionis, ut uidelicet sit: ingentibus medicamentis præparat, ac ueluti sternant uiam. At quum ex locis circa stomachū, aut aliū, aut aliquod intestinū, sanguis educatur, huiusmodi pharmacorū mixtura nō est opus. Infestissimū tamen his est id genus pharmacorum, quod in tantum refrigerat, ut affectū stupesciat: quamuis & hæc miscantur medicamenta ad sanguinis reiectionis congruentibus: quā aliorē somnum conciliant, & cōmodissima sint ijs qui tussi lancinantur, sistētia nimirum sanguinē qui ad uas astrictū deferunt atq; hoc per suam frigiditatem. Atq; hi sanē sunt compositionis scopi.

Quæ Andromacho ad sanguinis reiectionem scripta sunt.

Acaciæ drach. iij. rosarum siccarum, balauisti, singul. drach. viij. gummi drach. ij. tragacanthæ, drach. i. cum aqua pastillos facito, quorū singuli

pendeant drachmā unam. Dato ex aqua pluuia libet enim uim astringendi. Aliud sistens sanguinem. Croci Colici, myrrhæ, iiridis, nardi Indi cō, rliuris, acaciæ, sing. vnc. i. succi papaueris, costi, piperis, sing. vnc. s. rosarū siccarum trientē. Mel le excipito. Datur fabz Aegyptiæ magnitudo.

Aliud. Succo hypocistidos, balauisti, acaciæ, gal læ, cyrinorum, singul. drach. xij. succi papaueris diach. v. croci tantundem. Redigito in triobolares pastillos. Aliud egrægum. Balauisti, acaciæ, opii, myrrhæ, sing. drach. ij. tragacanthæ, succi hypocistidos, florum rosarum, seminis hyocyami, singul. drach. iij. rliuris drach. ij. excipito succo polygoni.

Aliud ad hæmorrhoides & dysentericos.

Floris rosarum, opii, acaciæ, gummi, balauisti, hypocistidos, sing. quadrantenē: galle vnc. i. seminus plantaginis, euasemij succi, utriusq; sextantē: lycij Indici, succi rosarum, utriusq; vnc. i. redigito in pastillos drachmales.

Quæ Asclepiades ad sanguinis reiectiones scripserit.

Radici polygoni manipulum: rad. symphyti tantundem: hoi rubri acenabulum: aquæ sextarios iij. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathi unum dato, cum gummi tenuissimē triti & dissoluti drachma una.

Aliud. Mororū rubrorum nondum maturorū lib. xvi. aquæ pluuiz sextarios xvi. coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. Idem licebit facere etiam de corni fructu. Aliud. Balauisti, terræ Samiæ, corticis rliuris, gummi, singulorū æquale pondus. Trita & cribrata exhibe cochlearis mensura in aquæ frigidæ cyathō uno. Aliud. Succo hypocistidos, succi acaciæ, succi rlioris Syriaci, balauisti, opii, gummi, sing. drach. iij. Vini myrticis quod satis est. Conficito, & uitro.

Pastillus ex succino, hæmorrhoidis, diuturnæ & recenti tussi, phthisicos, sanguinē reieciētes, purulentis, colicis, dysentericis, & inflatis confere. Psyllij mundi drach. xlv. iiridis Illyricæ, mastiches, ramentorū succini, croci, sing. drach. xxx. opii drach. xv. Psyllium in aquam calidam coniectum macerari sinito. Vbi uero suo glutine & mucilage ipsam aquam infecerit, liquorem exprimito, & cum eo pharmacum in pastillos cogito: ex quibus obolos tres ad somnū dato. Sint autem aquæ sextarii terni.

Pastillus ex corallio.

Coralli, terræ Samiæ, utriusq; drach. viij. Balauistorum, amyli, terræ Lemniæ, sing. drachmas iij. seminis hyocyami albi, opii, hypocistidis, singul. drach. ij. Excipe succo arnoglossæ, cogetq; in pastillos, & exhibe.

Cōficciones sedantes dolorē, tabescētes & sanguinē reieciētes, interno rumq; affectibus cōmodæ, ab Andromacho scriptæ. Radici papacis, seminis dauci, castorei, sem. hyocyami, opii, sing. drach. iij. Mellis quod sit sane. Dantur oboli quatuor, cum aquæ cyathis tribus.

Alia sedans dolorem, ualens ad tormina, & dysenterias.

Sem. apij drach. ij. anisi drach. i. piperis albi tantundem: myrrhæ, castorei, utriusq; obolos iij. opii, croci, sing. obolos iij. gentianæ drach. ij. Pastillos triobolares conficito, uarietq; uitro.

Androsia Andromachi, febribus repetentibus per circuitus cōferua.

Tussis omnis in modum optima.

Hæmorrhoides curatio.

Obturbatio vasorum a quibus fiat.

Glutinatō vasorum vasorū a quibus fiat.

Renutritio vasorum a quibus fiat.

Distributio in ratione inferiori astringentibus medicamentis cōtraria dispositio.

Stupescientia medicamentis quæ ratio plures macis congruentibus ad sanguinis reiectionem miscantur.

Hæmorrhoides media ab Andromacho scripta.

Dysenteria remedia.

Hæmorrhoides media ab Asclepiade scripta.

Pastillorum ex succino Conficito, quæ Barbari truchij de Chetach opellans.

Pastillus ex corallio.

Androsia Andromachi, ad affectus organorum inferiorum, aliaq; interna digestio.

Alia iucunda appellata.

Iridis lilyricæ, fuccini, croci, mastiches Chizæ, sing. drach. xxx. pſylli drach. xlv. fucci papaueris drach. xv. cum aqua pluuiæ paſtillos, quorum ſio guli pendent drach. ʒ. s. conficito, & exlibeto. Pſyllium tamen per diem ac noctem aqua pluuiæ macerato: dein coquit, & exprimit, cremorem cum alijs miſceto.

Alia dolorē ſedans ad omnes internos affectus & ſanguinis reſectiones, unde ſcig̃ erumpant. Facit & ad neſpſiticos & hepaticos. Hanc ne prius dederis, quā mercedem accipias. Cinnamomi, caſiz, utriuſq; drach. ʒ. myrrhæ, piperis utriuſq; chalbani, ſing. drach. ʒ. op̃i drach. ʒ. Trita cū melle pauco, iſo cataporia r̃ digito. ʒ. irrim magnitudi ne fabæ, partim quātitate araci. Dato iuxta cuiuſque uires cum aqua, aut pro iudicio tuo.

Alia ad eadē, Myſterium dicta.

Croci, coſti, caſtoris, aſari, ſem. hyoſcyami, op̃i, ſtyracis, ſing. drach. ʒ. Excipito melle, uiuorig. Anodyna ad eadē affectiones ab

Aſclepiēdi ſcripta.

Anodyna ad in-
ternos affectus
ab Aſclepiade
ſcripta.

Seminis cucumeris hortēſis decoctici drac. viij. amyli drach. iij. ſem. lini, ſem. papaueris albi, utriuſq; drach. ʒ. Tula & cribrata excipe tragacē-
in the cremore, & in drachmatis paſtillos redige. Dantur oboli iij. non febricitantibus quidem, ex uſo: febricitantibus uerō, ex ſucco rhois. Faciunt ad fluxiones thoracis.

Panchreſtis Aſ-
clepiade multi-
tus ad varios
internos affe-
ctus.

Conſectio Panchreſtis dicta, hoc eſt, multi-
ſus, ad ruſum antiquam, purulentos, orthopnoi-
cos, tabeſcentes, ad omnes inſiſtiones. Pelit ſe-
cundas & menſes, medetur uſque affectibus. Te-
rebintinæ drach. viij. ſtyracis drach. vi. myrrhæ,
drach. v. croci, iſidis, chalbani, ſing. drach. iij. Se-
minis hyoſcyami, corticis mandragoræ, irionis
torreſacti, opoponacis, ſing. drach. ʒ. piperis, ſpu-
mæ nuri, utriuſq; drach. ʒ. paſſo excipito.

Antidotus Ari-
ſtarchi admi-
nanda.

Antidotus Ariſtarchi admiranda, cōſterens ad
affectiones prædictas, reſtendit uenenis, externi
nantiſq; febres repetentes per circuitus, una hora
ante exacerbationē exhibita. Cinnamomi, coſti,
chalbani, caſtoris, fucci papaueris, piperis nigri &
longi, ſtyracis, ſing. vnc. j. mellis ſextarium unum.
Ar. dā teruntur & cribrant. Chalbani coquitur
cū melle excolatis uerō reliqua addunt, reponun-
tur iſ in uitream pyxidē, argenteā mure. Datur fa-
bz Aegyptiæ magnitudine, cum aquæ mulſæ cya-
this duobus, iuſtillatis digito uiceti nouem.

De orthopneis.

Aſthmatici cur-
ſe dicantur.

Qui citra febrē denſe reſpirant, ob ſympto-
ma id dicuntur aſthmatici, hoc eſt, anhelōſi. Eoſ-
dem etiam ob ſymptoma aliud orthopnoicos ap-
pellant, quōd thoracē recto ſpirare cogantur, me-
tu ſuffocationis. Minus eſt autem quōd hi inſpi-
rant, quā pro uſu reſpirationis, etiamſi thorax
iſtis plurimū dilateſ. Ex quo manifeſtū ſit, inter-
nam capacitātē coarctatā iſtis eſſe præter naturā
id quōd ægri etiā haud obſcuro ſenſu percipiūt.

Peripneum-
onici.

Peripneumoni-
ci, reſpirationis
organiſmum an-
guitatū quā eſſe
crede poſſunt.

Fit etenim & purulentis locorū coarctatio, ob col-
lectū inter thoracē & pulmones humorē. Fit etiā
peripneumonici, ob pulmonis inflammationē.
Reſtant autem adliuc affectiōes duæ, quæ angu-
ſtam locorū faciunt in uſis per quas aër inſpira-
tur: quā aut humorū craſſiorum & uicidiorū mul-
titudō pulmonis bronchi ſuerit impaſta, aut tu-

mor abſceſſui ſimilis in ipſo conſiſterit. Ceterum
curatio ambarum affectiōū aliquod cōmune ha-
bet, aliquid priuati, & alteri tantū proprium. Cō-
mune quidem utriuſq; eſt, ut abſumat redundantia
humoris affectiones gigantis proprii, affectio-
ni quidem uicidiorū humorum, ut per attenuan-
tia & exter gentia plasmata diſſipentur: ei uerō
quæ propter talem eundem accidit, ut per attenuantia
& exiccantia eodem conſumptio fiat: quæ cura-
tio rurius omnibus in profundo abſceſſibus cō-
munis exiſtit. Vini itaq; potus ambabus compe-
tit. Omnis autem potus modicus ſit in iſis qui
cubi abſceſſum habent: multus cōtrā, in illis qui-
bus uicidis & craſſis ſuccis ſunt obſcurata bron-
chia. Quippe pharmaca eiſmodi repurgant hu-
mores, tuſſes neceſſariō excitant: non uerō facile
per ſputum reſcitur, quod expurgatum eſt, nimi-
rum ob craſſitudinē: quapropter humectatione
multa opus habet, quod eſt uerum facile.

Quæ ſcripturæ Aſclepiades ad dyſ-
pnoicos.

Scillæ crudæ ſuccum exprimito, eiſq; parem Ar-
tici melis menſurā addito, & ad prunas admotas
coquito. Dato inde & ante & poſt cibum myſtri
meſuram. Aliud. Origani drach. viij. comæ rhy-
mi, iſidis lilyricæ, calaminthæ ſiccæ, piperis albi,
aniſi torreſacti, ſingul. tantundem. Cribrata mel-
le cocto excipio. Dato nucis ponticæ magnitu-
dinem. Aliud. Vux paſſæ Rhodiz, exaccinata,
acerabulum ſenſigri eiſi tantundem: aquæ plu-
uiæ ſextarium ʒ. Coquito donec diſſoluantur, &
liquorem excolatum reponio. Ex hoc præbeto
aſtidu, & iuxta ſingulas irritationes, cyathi men-
ſurā calſactā. Aliud. Anſi, ſulſuris uiui, utriuſq;
quadrantem: ammoniaci rhyamiatis, caſtoris,
melanthii, ſingul. drach. iij. aqua diluta in cata-
poria cogito, unūq; in acetū mulſi cyathi tribus
proportionat. Hæc omnia ſunt ab Aſclepiade ſcripta
illa, quibus pulmonis bronchia craſſis & uici-
dis humoribus ſunt reſerta. At uerō abſceſſus qui
attenuantibus & reſiccantibus opus habent, ma-
ximè gaudent aromatū ſecularibus, quæ & te-
nuum partium ſunt, & reſicatorior, prout hoc
quōd calſaciūt. Porro iſis qui propriè orthopnoi-
ci & aſthmatici nominantur, pharmaca conue-
niunt ſecantia citra calſactionem: ob idq; iuuantur
maximè ab ſcillitico aceto, nec non ab ſcilla, &
ab aceto mulſo, eodemq; ſcillitico. Quemadmo-
dem autem in hac affectiōe uellementer cauē-
dum eſt, ne calſiciamus, propterea quōd uicidū
& craſſi ſucci non modō nouo iuuantur, ſed offen-
duntur etiā uſu calſicientiū: eodem modo quæ
ualde refrigerant ſunt omnino uitanda.

Quæ plasmata ſcripſit ad eiſmodi af-
fectiones Andromachus.

Ad dyſpnoeam. Sulſuris uiui drach. ʒ. Sem. rutę
ſylueſtris tantundem: ariſtolochiæ, abſinthii, am-
moniaci rhyamiatis, abrotoni, ſing. drach. iij.
trita cum aceto in cataporia fabarum inſtar redi-
gito. Dato mane trita, & ueſperi tandem. Aliud.
Ammoniaci rhyamiatis, abrotoni, ſing. drach.
ʒ. Sulſuris uiui drach. ʒ. formato cum aqua paſtil-
los, & cum aquæ mulſæ cyathi tribus præbeto.
Aliud. Scillæ, ſulſuris uiui, buriſminis, ſing.
partem unam. Dantur oboli. iij. in
aceto mulſo.

Potum eſſe dele-
re modicum ei
quibus organa
reſpirationis
aliquo tamē
angustiati ſun-
t, quibus bron-
chia à craſſis
uicidis ſuerit ob-
ſtructa.

Dyſpnæa reme-
dia ab Aſclepiade
ſcripta.

Scillitico a-
cetū orthopnoi-
ci & aſthma-
tici maxime e-
pulis.

Dyſpnæa reme-
dia Andromachi.

GALENI PERGAMENI DE
compositione medicamentorum secundum
partes, lib. VIII.

De pharmacia cōgruente uentriculi.

Porro difficillimū est, ad ueritatem eoe reme-
dicare, qui sese alicui scēgi se uultu addaxerūt.

At qui prudentes sunt, ueritatē q̄p̄ deinde de-
siderio tenentur, q̄ (ut ipso) custodient ea quæ à
natura nobis ueluti iudicandi instrumenta con-
cessa sunt, ad æchonum uitæ cognitionem. Ex-
perientiam nempe & Rationem æquorum semper al-
terum, & ad perfectam disciplinam, altero indiget.
Etenim falsæ opinionēs auiosum hominum præoc-
cupantes, non solum furdos, sed ad eam cecos
efficiunt, ut uidere nequeant, quæ ab alijs conspi-
cui cernuntur. Proinde fit, ut complures Empiri-
ci, uel pauci etiam ex ijs qui sese Methodicos iu-
stant, per pharmaca relaxantia curantes inflama-
tiones oris uentriculi & leepatis (quæ musculi
astringentium desiderant) ægros omnes ad u-
num occidant, atque in exitum adigant. Quippe
nisi facultatem quæ firmitudine addat, in illarum
partium affectibus ad relaxantia permiscere, uita
in discrimen uocatur. Igitur astringentia omnia
quæ ad illarum partium affectus, partim empla-
stris atque ceratis mista adhibentur extrinsecus,
partim intus uorantur, impræfennarum ea ipse
inducabo, auspiciis ab ijs quæ conueniunt in-
flammationibus: quod maxime in ipso ægi pe-
riclitetur. CERATVM ergo quo alioq̄ uel
utor, ex aloë, mastiche, cera pontica, & unguenio
bardino consistit. Ceterum ad unciam unam me-
suram nardini olei, hyeme quidem octio, æsta-
te autem septem ceræ partes induntur. Liqueatis
igitur in duplici uase, refrigerantib; & deorsum, ad
des aloë & mastiche, reductorum in polinem,
utriusq̄ drachmā, & quandoq̄ plus, sic tamen ut
ad sequis drachmā non quæderiari. Quod si
plioti opus sit astringēone, nimirum tanta imbeci-
litate existente, ut uentriculus retinere cibos non
possit, addes drachmā unam omidei: q̄ id quod
primò inñci debet in cerati præparatione. Simili-
ter licetbit absinthij succum miscere, quandoq̄ e-
tiam ambo: sicuti & tertij hypocistidis, & quar-
tum crenanthes. Quin & rhois succum non raro
admiscui. Cerati tamen augenda est copia, iuxta
proportionem numeri aliorum pharmacorum.

Ad inueteratis atq̄ induratis inflammationibus,
magis uaria conueniunt pharmaca, & quæ ex a-
romatis quippiam habent, nonnullis etiam e-
mollientium atq̄ digerentium fortitiori: cuius-
modi est quod ex mellito conficitur, congruens
omnibus iuxta præcordia inflammationibus. Porro
os uentriculi, nonnulli hodie cōmuniter stomachum
nominant: quam partem olim frequenter car-
diam, hoc est, cor, appellabant: unde uox cardial-
gia est deducta, quæ minime quid cor dis, sed oris
uentriculi dolorem & mor dicationem significat.
Fiant quippe in ipso tum morbus, tum inexpli-
bilis fames, ut inter dum etiam nauisore disposi-
tionem: in quibus omnibus cōmēnis quidam adstrin-
gentium pharmacorum usus inuenitur est: admi-
sta autem sunt pleriq̄ ipsorum calfacientia simul
& reficcantia, Verū affectus in profundo sitos

ut cognoscamus, maximis utamur confecturis
est opus: ob idq̄ uniusfama Medice artis pars est,
quæ cognitionem ipsorum iudicat. Quum igitur
oio sint in singulis partibus intemperantiz cor-
poris: atq̄ hæc omnes aut secundum solas undas
qualitates gignantur, aut accedente alicuius hu-
moris complexu: certè earum singulæ per con-
trarias qualitates sunt reducendæ ad mediocri-
tatem. Quia uerò plurimæ intemperaturæ homi-
nibus ex redundantia humorum, magis quàm ex
inopia sunt, pharmaca reficcantia pleriq̄ oisq̄ magis
iuantur. Quum autem reficcantia ipsa partim qui-
dem astringant, cogendo astringendosq̄ substan-
tiam eorum quæ contringunt: partim uerò discin-
tiant, & in hoc substantiam eorum dissoluant: ob
hoc ipsam sine plures sunt qui astringentibus in-
digent. Verū si humida iuementis coactum cum
frigiditate, læduntur qui per sola astringentia cu-
rantur, quæ frigide facultatis existit. Quare me-
rius plurima pharmaca per experientiam inuenta,
ex miscellanea materia consiliuntur, astringen-
te uidelicet atq̄ calfaciente: quorum omnium dis-
crepantiam cognoscere, si simplicium pliaz macorum
facultates memoria teneris.

Confectiones stomachicæ Andromachi.

Hiera ad stomachicos. Fioris iunci odorati,
xylobalsami, mastiche, croci, nardi Indici, asa-
ri, cinnamomi, singulorum drachmas vi. aloë
loræ drach. centū. Simul trita reponē, præbep̄ ieu-
ni coholearia iij. Sunt tamen qui ad aloë drach-
mas centū, singulorū aliorū octo drachmas ad-
diciant. Non desunt qui absque flore iunci odorati
consuant. Porro ad uentris subductionem illo-
ta aloë est aprior: flora autem multum de medi-
camentosa ut amittit: quam etiam fabricatibus
dar & aliquis possit, si febris sit ualde mitis. Infes-
tissima autem est aloë, uel lora, ijs qui citra uitio-
sus succos intemperie affliguntur calida & sicca.
Proximam ab his cladem percipiunt, qui siccam
intemperiem habent, uel frigida etiam impli-
citam: & in uniuersum, qui ex sola qualitate par-
ticulam aliquam affectum a cladem possideat. E-
tenim intemperantiz tum humoribus consistentes,
pharmacia ipsas euacuantibus egent: quæ uerò
absque his infestant, penitus cōmigrant in tabem,
ob pharmaci huius ex aloë constantis exhibiti-
onem. At ubi utroq̄ humiditas perigat uentri-
culi ruicas, hiera ex aloë est utilis. Omnino au-
tem sic affectus plus aut minus adfuit nauet quæ-
dam symptomata. Iam uerò purgatio quam aloë
molitur, imbecillior est, quàm ut uniuersum cor-
pus purgare queat. Additur illi mastiche, ut uires
eius refrigat, uentriculo existens etiam grata,
& odora. Cinnamomū uerò, quod ex eadem
causa, tum etiam ut partium suarum tenuitate a-
perire uentris meatus possit, extergere atq̄ at-
tenuare, si quid uiscosum aut crassum in humo-
ribus inest. Crassos quippe succos ob purgatorie
facultatis imbecillitatem aloë trahere non potest.

Quapropter biliosarum uentris dispositionū o-
ptimum pharmacum est. Ad hæc cinnamomum
uim obuiat alteratricem utiosorum humorum,
in id quod nature modo responderet. Scire itaq̄ li-
cet, eas dispositiones quæ a prauis succis circa uen-
trem stomachumq̄ obuiant, maximè per me-
dicamenta ex aloë iuari: mirum autem in mo-

Affectus inter-
ni ut singulati
sunt, q̄p̄ est co-
noscere.
Intemperantia
particularum
sunt ois, quæ
per contrarias
qualitates redu-
cere ad mediocri-
tatem oportet.

Stomachica con-
fectionis Andro-
machi.
Hiera pura ra-
re capissimum.

Aloë lora & il-
lata sanctorum.
Aloë est infestis-
sima q̄p̄ qui citra
uitiosos suc-
cos intemperie af-
fligitur calida &
& sicca.

Aloë rjss. lora
tante intempe-
rie citra rictum
dentium humo-
rum, deduci in-
tebent.

Hiera pura
quæ uis.

Hiera ex aloë
est infestior,
quàm ut totum
corpus purgare
possit.

Mastiche ven-
triculo grata.
Cinnamomū fa-
cilius.

Aloë biliosior
diffusantia uis
ita optima est
medicamentum.

Astringentia
quædam poten-
tissima: magis
nisi ledi dispo-
sitionem uentris
calidam præu-
at obuiant: in u-
tiosis autem non quæ
a natura nisi præ-
u uolunt ar-
tem.

Infrumta duo
uicis fuisse da-
te à natura, non
uicaria ad uen-
triculi aliuem: ex
perimēti nempe
per rationem,
quorum semper
ad perfectum de-
finitionem alio-
rum indiget al-
tero.

Inflammationes
orū uentriculi ad
hepatum, cum re-
la causis me-
dicamentis astringen-
tibus pharmaca
orū desiderat.

Ceratum Galeni
ad inflama-
tiones orū uen-
triculi & hepa-
tis, maxime cau-
gram.

Os uentriculi,
quod olim uerbo
minabatur, non-
nulli hodie sto-
machum vocant.

Cardialgia si-
gnificat morbum
orū uentriculi.

dum laci, ab edulsijs, portionibus, & pharmacis astringentibus. Cōtra uerò, ubi humores nō qualitate, sed copia os uentriculi affixit erit, unguisimus astringentium est usus, nimis languida tunc cōstente ipsa particula affecta, instar laxatorum articularum, quorum etiam per astringentia affectio corrigitur. Porro polychresta, siue multi usus medicamenta appanantur, quā unum habere utingenti affectionibus congruum malum, quā tot numero alia, quā tamē ad singulas affectiones unum aliquid destinatur, eo quod ad plures paratum est, melius existat.

Ad stomachicos hiera Antipatri.

Aloē electz drach. iij. mastiches drac. ij. asari drach. iij. rosarum siccarum, iunci odorati, mei, ph. casia, sing. semunciam. Tiris uiror.

Stomachica Galli, affectionibus quē calseri & siccarī postulant, utilis.

Corticis radices fœniculi lib. s. acetū acris sextarium unum s. aloē quadrantem. Mellis Antipatri lib. j. Radices lotas ad triduum aceto macerato, deinde coquito: atq; ubi cōctz fuerint expressas projicito, & affuso ad acetum melle, simul coquo. Dein aloē inpergitur, & cochlearia tria cum aqua dato. Etenim ubi per profundum uentriculi, hoc est, alius, copiosa, sed nō praua, fuerit defixa humiditas crassa simul & uiscida, opus est mistura pharmaci attenuatorij, per os uisq; quale est rum acetum, tum oxymeli. Si uerò nec talis sit humiditas, nec alius imbibita, sola ad curandō astringentia suffecerint. Est autem sufficiens signum frigidz affectionis uentriculi, si æger se non sitire p recipiat.

Asclepiadis stomachica, ad roborandū uentriculū, exprimens aspi illius a duentia humiditates cōgredientia.

Ad stomachi subuersiones. Nucleorum mālī punici ruforū succi sextarius iij. succi menthæ sextar. j. mellis Antici tantundem. Coquito in scitill uasē, assidue agitando: & ubi densata fuerint, ab igne ablata reponito: porrigitoq; mystērū unum, aut duo, ante cibum.

Cōsecutio ex fructibus, ad stomachi subuersionem, cœliacos, & dyentericos faciens.

Māla cotonea numero x. forba numero 2. mespila totidem. Rhois rubri sextariū unum. Aquæ congios vii. fructus rufos & in aquam coniectos, diligenter coquito: & ubi dissoluti fuerint, liquorem exprimito, ac rursus coquito. Quē uerò tertia pars liquoris super fuerit, addito mellis Antici lib. iij. & ad prunas assidue agitando coquito, ac spūlatā reponito.

Carapota ad subuersionē uentriculi.

Rosarum recentium defectus unguibus, drac. viij. sem. papaueris albi drach. liij. sem. hyoscyami drach. ij. aloē obolos iij. asari tantundem. Cum aqua diluta in pilulas redigito, præbetoy ci ceris magnitudinem.

Ad ardorem stomachi carapodium restinguens sitim.

Seminis sariū cucumeris drach. viij. sem. portulacę tantundem tragacanthę drach. iij. Tragacantham ouorum crudorū recentium candido dissolutam, probe tritis reliquis addito, & ex eis missis fingito caraporia, quorum assiccatorū in umbra, sub lingua unum tenendum dato. Hæc Asclepiadis

des. In uniuersum autē sugiēda ea pharmaca sunt in uentriculi affectibus, quæ chalcantion, mazdragorūmuc, aut alia id genus recipiunt.

Ad uolulosos stomachi subuersiones passillus Amazonum ab Asclepiade scriptus. Seminis apij, & anisi, utriusq; drach. vi. abūmij drac. iij. piperis, myrrhę, opij, castori, sing. drach. j. cinnamomi drach. vi. cū aqua passillos fingito, & summum drachmā unam dato, stomachicus cum protropi diluti cyathi iij. cholericis & uomentibus cibum, cum frigida: cœliacos & dyentericos cum baccarum myrni decocto: splenetis, cum hydro melitos cyathi tribus. Ego uerò, quōd myrrhā aliquid medicamentorum cōtineat, sine illa maioris securitatis gratia hoc pharmacum preparare consueui, piperis quantitate adaugens. Porro per eiusmodi uolulosas dispositiones, aliquando stercus per uomitū redditur: ubi uidelicet particulz affectz, ad feross medicamentū humoribus assiluntur magnopere. Quōd si etiam imbecilliores sint, geminatur malum. Erit itaq; in ijs curatio nis scopus, ut ad affectas partes odorata admo uemus, cuiusmodi sunt, anisum, apium, daucus, cuminum, & fœli. Nam quemadmodum grauelentia omnia stomachū subuertere solent, sic odorata corroborare. At abstinēdū miscetur in prescripto pharmaco, quōd habeat uim exurgendi, repurgandi, & subducendi uisidos stomachi humores: quodq; cōstringat, & denset, roburq; affixz particule addat. Cinnamomū autem scetidis omnibus, putrilaginosijs humoribus aduersatur. Cæterū si cinnamomū non adsit, licetbē cassiam pro illo assumere.

Alia stomachica Asclepiadis composicio, utilis ardorem sentientibus, & ad intensos singultus, & stomachi uolulosas dispositiones. Costi, spicę nardi, chrysobalanorū, rosarum uiridum, mastiches, sing. drach. iij. aloē, asari, utriusq; drach. ij. opij drach. j. succo psylli excipito, atq; ad passilorum formam reducito, obolos iij exhibito.

Dictum mihi ramen iam est, impossibile esse ut inueniamus pharmacum, ad affectiones multas optimū: multoty præstantius esse, quod singulis earum destinatur. Porro Hippocrates fieri cōuulsionem prodidit ex repletionē simul & euacuatione: quemadmodum etiam singultum. Quāquam hic aliquando excitari citra plenitudinem aer inanitionē solet, ubi uentriculus ab acerbis, ferosis, medicamentosisq; humoribus mordicatur: quos ubi quis uomitu elecerit, singultu subitō liberatur. Multi etiam deuorato pharmaco diatrion pereperon, si uinum insuper bibant, omnino singultuunt. Similiter ex cibo in mordacem qualitatem corrupto, nōnulli singultuant, confessimq; ad uomitu liberantur: ut aliq; ex rigore oris uentriculi corripiuntur singultu. Verūm pueros maxime singultire contingit, tum ob alimentū corruptionem in uentre, tum ob partis frigiditatem. In uniuersum autem, uomitus est sufficiens medicamentum, qui ob copiam, aut mordicationē singultuant: ut caliditas, eorum qui ob frigiditatem. Ex medicamentis quæ pharmacum illud cōstituant, opium, rosę, & psylli succus, refrigerant. Spicę nardi & chrysobalanus, digerit & corroborant. Asarum per urinas deducit uti uisidos succos. Aloē prauos humores purgat. Ciocus concoquit, & partes

Ventriculi affectu superando, si ea pharmaca, quæ chalcantion, mazdragorūmuc, aut alia id genus recipiunt.

Passillus Amazonum, ad uolulosas dispositiones.

Myrrhā rufam non esse admodum tutam.

Volulosas uenter diffundit. non esse per se rata curanda.

Gravelentia subuertere stomachum. Absque uim exurgendi.

Cinnamomū scetidis.

Cassia licet in prescripto.

Pharmacum unum multos afflicto. optum. reperiri nō potest.

Conuulsio fit ob repletionem simul & euacuationem.

Singultus est qui breui fit causis.

Singultus quæ medicantur.

Polychresta, hoc est, multi usus medicamenta, reliqua ab ijs quæ ad singulas affectiones parantur.

Hiera Antipatri factū ad stomachicos.

Stomachica Galli.

Ventriculi tunc cum humoris eras si alius imbibiti, qualia medicamenta desiderant.

Ventriculi frigidam affectionem significat, prout uisibilis sit.

Stomachica ab Asclepiade scripta.

Cipellus ex fructibus Asclepiadis, subuersionem uentriculi, cœliacos & dyentericos faciens.

Carapota ad subuersionē uentriculi.

Carapota ad ardorem uentriculi confectis, si sub lingua reueantur.

Suprafaciens ibi
miseri calfaci-
entia, ut eorum
malignitate cor-
rigant, eorumque
vires deducant.

partes corroborat. Costua calfacit abunde, astrin-
gitque medicoribus. Stupesciuntque miscetur cal-
facientia, ut eorum malignitatem corrigant, eiaque
sint instar uelculi. Quippe uicinium corpora
mortificationi simile quid perpetiuntur ab eorum
medicaminum usu, quæ ex opio, hyoscyamo, &
mandragora constent, ita ut instantes causas
non sentiant. Quare multi qui talibus assidue ut-
runtur, particulas ad immedicabilem frigidita-
tem perducunt.

Descripsit etiam Asclepiades Hieræ compositionem, in hoc ab Andromacho dissidens, quod
ille quidem aloëa drach. e. ac reliquorum singul.
indiderit drach. vii. hic autem octo drachmas scri-
pserit, foremque ipsi odorati omiserit, quem alia
mifcuit Andromachus: quod non xylobal-
amo (ut Andromachus) sed pro illo sit carpopala-
samo usus. Confert autem huiusmodi pharma-
cum illa qui ob uitiosos humores, & præcipue bi-
liosofa, tardè concoquunt. Si quidem quibus bilis
altius tunica ventriculi infestat, h præstantia
pharmacum non iuuant. Cuius moderata ex-
hibitio ad quatuor usque drachmas extenditur. Si-
militer auxiliatur uiscerum iam concoctia inflam-
mationibus. Rectè autem hoc pharmacum tar-
dè concoquentibus, aut bilem uomentibus pro-
pinatur ex aquæ cyathis quaternis: ut ex aqua
mulsæ, ad uiscerum inclinatas inflammationes:
ac denique ex uino mulsæ, dum aut urinæ ciere, aut

Hieræ quibus
concoctat.

Hieræ moderata
exhibito ad
quatuor drach-
mas extenditur

Drachma & de
maris Romani
est idem.

Stomachicum
Asclepiades, do-
ctum Aster in-
expugnabile.

Stomachicum dictum Aster inexpugnabile, ab
Asclepiade proditum, sedans dolorem, inducens
sonnum, ac uarios affectus sanans. Myrrhæ,
styracis, nardi Indici, casie fistulæ, terræ Lemniæ,
corticis mandragoræ, piperis, singulorum drach.
iij. Croci, papaueris, singul. drach. vi. semi-
nia dauci Cretici, anisi, fœnicis, feminis apii, sing.
drachmas octo. Myrrhæ, styracis, & opium, uino
dissoluantur odorato, & teruntur: aditæ uero cri-
brata miscentur, subigunturque, atque in passillos co-
guntur, quorum singuli drachmam dimidiam
pendant.

Quæ scripserit Archigenes ad affectus
uentriculi.

Ventriculi affec-
tibus congruen-
tia medicamen-
ta ab Archige-
ne prodita.

Vbi ructus acidus editur, coriandrum cochlea-
rii mensura edendum ante reliquum cibum dato:
insuperque merum bibendum. Ad exolutum uen-
triculum absque febri, menthæ ramulum contri-
tutum bibendum dato. Aut cenanthen similiter
tritum cum uardo Indica bibendum dato. Aut
marrubii succum cum melle: & ubi paululè quie-
uerint, uinum cum polena exhibeto. Aut Clii
mastiches cochlearium ex aqua frigida dato.
Aut glaciem leuina quotidie porrigito. Dolo-
res oris uentriculi lenit, ac maxime illa quibus tri-
stitia aut desperatio accedunt, lac asinum, aut
melitrem, aut bubulum, silicibus incoctis, pora-
tum. Si unum cum humectatione uentriculi etiã
inflammatio adsit, cenanthen cum melilloro, aut
rosam siccam cum cerato eosiceo, parum refinæ
affræ habeat, imponito. Quibus autem ob a-
tram bilem, quam gignunt, stomachus inflatur
ne tentatur, ipongias aceto acerrimo calido im-
butas ad stomachum ipsum imponito. Quod si

tenfio adhuc perferueret, alumen liquidum cum
atramento sutorio trito, melle exceptum impo-
næ. Aut hæc & aloëm pari portione mista, &
myrteo cerato excepta. Aut armentariæ bouis
stercus aridum uino incoctum. Aut polii fasci-
culum coquito, & bibendum dato. Aut cala-
minthæ decoctum per noctem sub dio expositum,
modico melle & piperis drachma admixta, por-
rigito. Soluit autem dolores cuminum xpliiij
toita, si modica portione cum aqua bibantur.

Aut aloë obolos duos, cū uino mulsæ, aut uino,
aut aqua, bibendæ dato. Aut abrotoni & rhy-
mi, utriusque obolos duos, ex uino præbe bibe-
ndos. Ligaturæ insinæ per extremorum fortiter ad-
hibe, & circa ipsum stomachum cucurbitulis &
fomentis uariis utere. Quod si uehemens sit disten-
tio, etiam uenæ sectio efficax erit auxilium, & al-
ui solutio per glandem supposititiã. Porro eos
qui ex ingenti fame inquantur animo, reuocabi-
mus odoramentis aceti aut pulegiæ, aut melle, aut
piperis. Excitantur etiam ad carnem alunt assa-
tiam, & ad omnia que multum aliunt, præsertim
ea quæ nidorosum odorem exhibent. Instaurabilia
autem ipsos illa quæ conferunt uires reficere pos-
sunt: cuiusmodi sunt oua feribilia, bulbi, cochleæ.

At singulentiibus ratum cum uino dato, aut
nitrum in aqua mulsæ, aut opium, aut castoreum,
aut abrotonium, aut aristolochiam.

Medicamen ex cydoniorum succo, sanans
mediocres oris uentriculi
affectus.

Succus cydoniorum aceris sextarius ij. mel-
lia Antici tantundem aceti sesquiseptarium, uel se-
xtarium unū. Zingiberis quadranten, piperis al-
bi vnciam ij. Arida insperges, ubi malorum suc-
cus cum melle & aceto coctus ad mellis crassitu-
dinem fuerit.

Quæ pharmacata Asclepiades scripserit ad
affectus oris uentriculi.

Emplastrum ad subuersiones oris uentriculi,
dolorumque, atque etiam inflammationes. Cenanthes
drach. vi. croci, myrrhæ, floris rosarum, meliori,
mastiches, aloës, corticis mandragoræ, singul.
drach. iij. Carnis palmularum quadrans. Omnia
cerato ex rosaceo cocto excipito, ad mouetioque,
Aliud Nicerati, coeliaci, dysentericius
admodum generosum.

Cenanthes vnc. ij. rosarum siccarum, mastiches,
aloës, gallarum omphacitidum, alumina rotun-
da, acaciz, sing. vnc. i. ceræ lib. i. picis brutæ qua-
dranten: olei myrti lib. i. Arida committito li-
quidum. Aliud ad eadè insigne. Cenanthes, om-
phacidis, gallæ omphacitidis, aluminis scissi, acaciz,
cytinorum mali punici, balaustij, mastiches, sing.
vnc. i. Vinum myrtinum, quantum satis est huius subien-
dis. Carnia phniciobalanorum seiscum, excepta
lenissimum cerato uitior. Etenim in his, quod
fuit stomachica, merito astrictoria uis domina-
tur. At in medicamentis hepatica relaxantia mi-
seri astringentibus debent: quemadmodum fit
in his quæ iam subdè, etiam ab Asclepiade prodita.

Malagma Nalo inscriptum, faciens ad præcoe-
diorum dolores, dissoluensque omnem duritiem,
splendensque atque hepatica maxime salutare. Ce-
ræ, ammoniaci thymiamaria, olei cyprini, singul.
lib. i. croci semunciam aceti quod fit satis. Ammo

GG

Cucurbitulas
admodum ef-
ficaces, uenæ
sectio, mouet
Archigenes.
Deliquum a-
nimo patietes
ex fame uisunt,
quemadmodum
siue nocent.

Singulentiibus
quæ opitulantur.

Dysentericius
medicamen.

Oris uentriculi
affectibus phar-
mata ab Ascle-
piade scripta.

Stomachica me-
dicamenta de-
bent habere ad
strictiorem uis
proprietatem.
Hepatica medi-
camenta molia
esse debent ex a-
stringentibus at
relaxantibus.

Quæ pharmacæ ad hepaticos ab Andromacho sunt conscripsera.

Hepaticus remediis cõgnotus ab Andromacho scripta.

Antidotus cythioides, ad hepaticos & omnia thoracis uitia. Vux passæ carnis drach. xxv. croci drach. i. calami drach. ij. s. bdelij tantundem: casis sesquidracmam: cinnamomi obolos ij. spicæ nardi drach. ij. floris iunci odorati drach. ij. s. myrrhæ, terebinthinæ, sing. drach. iij. ramentorum apalati drachmas duas: mellis drachmas xvi. vini quod sit satia. Conficito. Etenim cin-

Putrefactiones que corrigant.

Vux passæ facultas.

Vitærum inter pericula: ea esse optima medicamenta, quæ non modo interperiem corrigunt, sed etiam alimentum largiuntur.

Mellis facultas.

Bdelium.

Terebinthina.

Hepaticis pharmacis nullum esse debet vehemens refrigerans. Utentis optimis medicamentis.

Anthraxia hepatica, nephritica, interitica, cõnata, capitis sudorem promouens.

namomum omnes putrilaginosas, uirulentasq; corrigit facultates, quemadmodum casia, & post hanc omne aromatum genus. Crocus astringens & cõcoctiorum pharmacum, etiam putrefactiones corrigit. Vux passæ astringit quidem quantum requirit affectum uiscus: habetq; uim aliquam concoquendi crudos humores, & coarctandi maligna, existens etiam secundum totam substantiam iccori familiaria. Quippe ad interperantias uiscerum ea pharmacæ optima sunt, quæ præterquam quoddam interperiem corrigunt, etiam alimentum largiuntur. Quo nomine uinum conuenientissimum est, citra inflammationem, aut erysipelas, aut abscessum, aut interperiem calidam, laborantibus. Nam & nutrit, & cõcoquit, & roborat, & putrefactioni aduersatur, & si interperies ab humiditate & frigidityte proficiscitur, eam citra omnem molestiam, atque tutò persanar. Eadem est & mellis facultas, præterquam quod non condensat substantiam contracti corporis: sed pro hoc uim exergendi, & aperienti, & puros reddendi meatus, urinamq; ciendi, non parua sanè auxilia, possident. Ar bdelium sufficienter emollit, concoquitq; necnon moderatè discutit. Consimilem semè uim terebinthina sortitur, supra hoc quoddam angustios meatus exergit, expurgatq; quibus auxilia uiscus curandum indiger. Si quidem obstructio meatuum solet putrefactiones efficere. Nonnulli autem huiusmodi pharmacie opium, aut hyoscyamum, aut aliud quippiam refrigerantium miscendo, ad calidas interperies utilia medicamenta efficiunt: quanquam ex hepaticis pharmacis nullum esse debet uehementet refrigerans.

Alia ad hepaticos & ictericos.

Amygdalarum amararum drach. ij. anisi, absinthij, cumini, seminis apij, sing. drach. i. cornu cerui obolos iij. Trita cum aqua in pastillos triobolares redigito, ex cisy uinum mane ac uesper, cum uino mulso dato.

Hepatica Anthraxia, ad nephriticos & ictericos, cõpiose sudorem promouens.

Croci drach. ij. nardi tantundem: cinnamomi, casis, myrrhæ, iunci odorati, sing. drach. i. Melle Attico excipito: datur fabæ Aegyptiæ magnitudinis febricitantibus ex aqua mulsa.

Potio ad hepaticos, spleneticos, nephriticos, hydropicos, stomacalicosq;. Auxiliatur etiam molestis ex partu, & cõuulsis. Prodest & conualescentibus: necnon ad humores uiriosos, ictericos, uiscientes, pleuriticos, atque ad letalia uenena, & ferarum istus. Nardi Indicæ, costi, utriusq; drach. ij. casis, croci, utriusq; drach. i. pipæris albi obol. v. seminis apij drach. i. obolos ij. iridis Illyricæ tantundem: acori drac. ij. obol. i. opobalsami drac. i.

succi ari masculi drach. tres: uinx passæ exacina: ac drach. v. Tertio cum passio, aut melle excipito, ac drachmâ unam cum uino dulci dato, aut cum aquæ mulse cyathis iij. Nullum tamen horum medicamentum calidâ temperaturâ conuenit, sed aut humidâ, aut frigida, aut ex utriusque composita.

Confectiones hepaticæ ab Aesclepiæ de prodite.

Succi cichorii cyathum unum cum aquæ calidæ cyathis tribus, & mellis Attici cochleari uno, porrigito. Aut silicis, aut feridis succi cyathum unum, cum aquæ mulse cyathis tribus dato. Porro cichorium & feris ex genere cibatorum existit. Facultas autem ipsorum subfrigida & subamarâ est, moderatèq; astringens: quare uim qualitatum ratione, calidâ leperis inemperantibus summè conueniunt. Nam ultra hoc quoddam moderatè refrigerant, uisceri firmitudine ad dunt. Sed nec frigidas interperies magnopere sedunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem absq; astrictione aut amaritudinem possident, facere solent. Iam, ob miscellam mellis, humores per urinas eliciunt. Quare si siccatæ & rufæ quis portio inispergat, itidem iuuant. Ad uiscens autem expurgationem, a pertione meatuum, citra manifestam calificationem aut refrigerationem, si lux opimum pharmacum est, amaram qualitatem habens predominantem.

Carapotion hepaticæ.

Radiciæ chamæpipyros drach. viij. rad. cichorii drach. iij. contunde, & excipe melle cõcto, præbeis nucis ponticæ magnitudinem: & aquæ calidæ cyathos ij. in super bibendos dato.

Pastillus hepaticus.

Anisi, sem. apij, asari, amygd. amar. mund. absinthij, sing. drach. iij. macerata ex aqua in pastillos redigito, exhibebisq; drachmâ unâ cum uino diluti cyathis iij. febricitantibus tamè cum hydromelice.

Eclegma hepaticum Pauli i. auxiliatur confectis.

Chamæpipyros siccat lib. i. myrrhæ vnc. i. passil protopis sextarios ij. Chamspiry & uinum dulce coquito ad tertias. Postea liquorem exprimito, eiq; mellis Attici librâ dimidiâ adiecto, ac rursus coquito. Dein uerò myrrham addito assidue agitando: quæ ubi dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante cibum mystrum propinato. Ad hæc cochlearium trium carnè probè triti, & cum tribus uini nigri cyathis calactam porrigito. Hæc enim iuxta rorâ substantiâ sunt efficacia, non secus uulsi aut alterâ qualitatis. Similiter & lupini hepatis drachma una leuigata cum uino aliquo dulci, exhibitaq; manifestè hepaticis auxiliatur.

Confectio ciens urinas. Facit ad induratas hepatis affectiones, ad spleneticos, & agrè se à morbo recuperantes: necnon ad hydropicos. In unguentum, probum colorem conciliat. Croci, nardi, casis, sing. drach. ij. costi, floris iunci odorati, cinnamomi, myrrhæ stactæ, sing. drac. i. mellis cõcti drach. xxvi. datur fabæ Aegyptiæ magnitudinis, cum uini mulsi cyathis iij.

Alia eadem commoda præstans, ad aliasq; inter nas affectiones, citra rufam, cõducens. Rad. gentianæ, chamæpipyros, marrubij, seminis petroselinij, sellis uris, sinapij, sem. cucumeris, scolopendrij, panacis, rubig. clinopij, rubig. seminis brassicæ,

Hepatica cõpistima ab Aesclepiæ de prodite.

Cichorium. feris.

Hepaticum carapotion.

Hepaticum pastillus.

Hepaticum eclegma.

Hepa lupi an: uisus hepaticus. Diuresis medicamen.

aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi, sem. erucæ, eryngii, bacaræ tui, piperi, sem. fraxini, chamædrys, dictamni Cretici, seminis cestræ, sem. dauci, sing. vnc. j. mellis Arctici quod sit faris. Confectio. Datur nuci pontice magnitudo, ex pasci Cretici cyathis duobus. Hæc Aesclepiades ad indurata viscera. Miscenda tamē in hisce affectibus sunt cum discussis etiam mollioribus pharmaca, quæ præparant indurata corpora, apta prædictis medicamentis excipienda efficiant. Si quidem citra præmollitionem diffunduntur quodammodo ea ipsa corpora, & euentigrid manifestā immutationem habent: sed quod reliquum ex affectu est, ubi exiccatū improbe fuerit, immedicabile permanet. Ceterum quidam hepatis corpus sit consistentia humidū, moderans emollioribus eger.

Quæ Archigenes scripserit ad hepaticos.

Vnguenti nardini cochlearia iij. quotidie bibenda dato, & maxime in induratis. Aut aristolochiæ obolos iij. ex aqua quidem, febrientibus: febre autem carentibus, ex uino porrigito. Aut fel urinum in uase leniter fervefacito, & in sole asiccato, atq. ex eo hepaticis cochleare unū dato.

In magna duritia abrotoni succum quamcraftisimum da bibendum. Aut acori obolū unū, panacis tantundem, propinato ex aqua. Aut spicæ nardi decoctū assidue exhibeto. Cataplasma hepaticū sit ex malis cotoneis cum farina hordeacea, & sœnogroco concoctis. Aut ex semine lini trito cum polenta uino incocta. Aut ex capparis radice in aceto mulsio percocta. Aut ex farina hordeacea cum ficibus. Aut ex palmularū carne trusa, mista pari rosæ cerati portione.

Malagma Andromachi ad hepaticos.

Ammoniaci thymiamaris drach. xliij. bdellij drach. xxiij. aceti heminas iij. Cyprini heminam unam. Confectio.

Malagma Apollonaphis.

Cere drac. lxxx. ammoniaci thymiamaris tantundem. Terebinthiæ drac. xl. manni thuris tantundem. Cum irino contundito.

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secundum loca, lib. nonus.

De Ictericis.

Sunt etiam icterici, ratione optimè iudicatio nis in febris, proeunte nimirū ad cutem bilioso humore: ac facili sanè hi curant balneis potabilium aquarum, & olei discussorij affictu, omniumq. rarefacientiu cutem: quale est anethinum oleum, chamæmelinū, atq. cicinum. Post hæc etiam unguenta faciunt, glucinum, & comagenu: dein irinum atq. amaracnū. Verū alias confectiones priuatiū ictericas appellatas, ne putet ad huiusmodi ictericos conuenire, sed ad eos, qui uisum iuxta hepar obstructione laborant, necnon ad illos qui ex inflammatione icterici fiunt. Ceterū qui in regium morbum ex obstructione inciderūt, absq. febre permanent. Qui uero ex inflammatione, omnino febricitant. Quæcumq. igit admodū medicamentosa existunt, iridēq. facultate calida, febrientes magnopere ledunt. Talia sunt gëtriana, struthion, heleniū, costi, aristolochia, polū, centaurea. Conueniūt aut ictericis ex inflama

to hepate, quæcumq. sanant inflammationes: quemadmodū etiā q. qui ex obstructione, omnia quæ strenuè extergunt, etiā si medicamentosa substantiis, calidamq. facultate formant. Si uero obstructio simul & inflammatio coeant, laxantibus simulq. extergentibus opus erit.

Ad ictericos absq. febris, medicamen

Andromachi.

In colocynthidis calicem uinum fundito, calfacitoq. & bibendū dato: subducit enim alium.

Aliud. Adianthi obolos iij. nardi obolos ij. absinthij drac. j. myrris obol. ij. Passio excipito, iustitq. auellang nucis ex aqua cyathis duobus porrigito.

Aesclepiadis remedia ad ictericos.

Cichorii succi cyathos vi. febrientib. per se dato: febre uero carentibus, cum uini cyathis tribus.

Aliud. Anchusæ tenuissimæ triæ cochlearia ij. cum aqua potabil exhibe. Aliud Nicerati, urinis cius. Cicerum siccorum sextarium, & roris marioni manipulum: aquæ sextarios vi. scniculi manipulum j. rad. asparagorū palustrium, manipulū j. Decoctum excolatum porrigito assidue, febrientibus quidem simpliciter, febre autem carentibus ex uino diluto. Aliud. Asari, absinthij, utriusque drac. viij. seminis anisi, scniculi, apij, amygdalarū amararū repurgatarū, sing. drac. iij. Aqua (subigito, atq. passillis formato, ex quibus drac. i. cū uini mullis cyathis tribus uō febrientibus exhibeto.

Eritrionem trahens bilem per uares.

Nasturtij & roris marini uiridium succum, aut elaterium cum lacte muliebri tritum, in fundito paribus, atq. attrahere iubeto.

Archigenis remedia ad ictericos.

Chelidonie herbæ succum cum uino aut aqua mulla propina. Vel adianthi, uel rubig. radice obolos tres, cum aqua mulla exhibe. Aut fellis urini cyathum bibendū dato. Aut stercoris canini albi sextantem, cum mellis quadrante ad triduum bibendū dato. Aut adianthi, & menthæ, & rubie partem mensuram in aqua fervefacito, & hemina inde bibendam exhibeto, duntius ad solem insolato, sinentiq. & anheloso, quod post acceptum potum exudet: quippe statim transmutat colore.

De splenis affectibus.

Quum autem omnes corporis partes familiarē sibi ipsas ex uenis humorem trahant, lien certē id quod uelut fœx sanguinis est, ex qua gignitur atra bilis, ad sui alimentam aspicitur: unde hoc uiscus minimo negotio cōtrahere sibi scieritum est natum, sanguine nimirum in uenis ipsius obturato, & ob crassitudinem nec excerni, nec discuti facile potente. Atenuantibus igit opus habet pharmacis, citra manifestam caliditatem, ne impactus in ipso succus impingatur uehementius. Quod uero actiones ipsas conferuntur, ex auteris aliquid eis admiscetur: quale etiam astringentiu genus existit. Porro quum uniuerse particule, propriè incolumitatis gratia, certas quasdam facultates possideant, attractricem uidelicet familiarum, ac tam alienorum expultricem, tum assimilatricem eorum quæ sibi attraxerunt: aliquibus ipsarum insuper inest, ut ex accidenti sit in uniuerso corpori ex usu. Ex horum itaq. est genere lien, qui ex hepate ad se uelut limum sanguinis trahit, quemadmodū fellis nefica bilis, atq. renes urina. Si igitur præ imbecillitate eiusmodi sanguinē ad se at-

Uterius quæ medicamenta conueniant.

Uterius remedia varia, diuersis conspiciantur.

Eritrionem trahens bilem per uares.

Partes singulas seminare sibi alimentum trahere, lienē quo sanguinem solum.

Lien cor induratur facile.

Lien affligit qualia conueniant medicamenta.

Dysenteria medicamentis quæ ad indurata viscera propinquantur, curantur emollioribus.

Hepatis corpus moderati emollioribus eger.

Hepatica medicamenta ab Archigenes scripta.

Hepatica cataplasma ex quibus consistunt.

Hepatica malagmata.

Uterius præ morborum iudicatio critica erit, curatio.

Uterius ex obstructione orta, absq. febre permanent: quod non citiusq. ubi quæ ab inflammatione docet originē.

*Linas trahente
languidi, facili-
tatis sanguis per
venerunt cor-
pus digerunt.*

*Lini cor ana-
ra, quib. afflu-
gentia sine mi-
stra, medicamen-
ta conveniunt.*

*Lini congre-
ssa pharmaca,
ab Andromacho
scripta.*

*Lini pharma-
ca ab Aesclepi-
de scripta.*

*Lini epithima-
ta cataplasma-
ta ab Aesclepi-
de scripta.*

se attrahere sit inlimē potens, per uniuersum cor-
pus uitiosus humor dispergitur. Ob id itaq; natu-
ralem ipsius firmitudine custodire oportet, quod
conueniens sibi alimentū alicui: per quam actio-
nem uniuerso corpori ad humorū bonitatē con-
ducit, & excrementa genita in ipso demittere in-
ueniri potest, ut unū cum excrementis alui excer-
nantur. Igitur hac ratione ipsi ualde amara medi-
camenta exhibemus: quibus miscemus etiam ex
austeris nonnulla: sicuti & alia quædam, ceu ma-
teriam congruentem ad unguentorū & catapla-
sma cōponuntur: cuiusmodi sunt cera, resina,
pix, & bitumen. Nam primaria ratione acetum &
o symeli, uiscerū cōmoda existunt, ut potē secare &
attenuare erosos humores ualentia, citra calisti-
ficationem. Deinceps itaq; eorum pharmacorum
mentionem faciam, quæ lieni indurato auxiliant.

Pharmaca porabilia ab Andromacho ad sple-
neticos conscripta. Posio Antipatri.

Carus myrobalani drac. iij. scolopendri drac. 10
vj. cort. rad. cap. colli. ling. drac. iij. chamædrys
drac. vj. polij drach. ij. rad. coryledonis drach. ij.
corymborum hederæ nigre grana xvj. ammo-
niaci thymiamatis drach. iij. sem. hyperici drach.
ij. chabani tantundem: sem. periclymeni drach. j.
aur rad. drach. iij. cardamomi nigri sesquidrach.
sucul scillæ drach. xvj. Dantur oboli duo in aceto
mulso. Aliud stomachicum, splenicumq; Myr-
rine, nardi Indice, cort. rad. capparis, radice pan-
acis, rad. peucedani, dictamni, cort. rad. pericly-
meni, ling. drach. iij. costi drach. v. polij drach. ij.
rubie drach. iij. s. ammoniaci thymiamatis drac.
iij. s. iridis tantundem. Escipio acetum mulso, da-
toq; obolos duos cum oxymelite.

Pharmaca porabilia ab Aesclepiade ad
splenicum conscripta.

Cynoglossi manipulum cum uini cyathis iij.
tertio, & expressum liqueoem ante cibum biben-
dum daro. Colligere tamen oportet herbam fini-
stra manu ante folijs exortum. Aliud. Trixaginis
manipulū cum uini sextario uno coquito, & ex-
pressum liquorem reponito: atq; ex eo cyathos ij.
ante cibum daro. Cataponū splenicum. Myr-
rice fructum tustum & cribratum chalbano exci-
pe, in cataportia redige, quæ exhibebis pro uiri-
bus. Pastillus splenicus. Fructus erice drach.
iij. pipere albi, nardi Syriacæ, ammoniaci thymia-
matis, ling. drach. ij. arida tunduntur & criban-
tur. Ammoniacum dissoluatur aceto scillitico, &
arida additum in pastillis cogitur, quorum ſin-
guli pendent dra chema. Daturq; drac. i. ex oxy-
melis cyathis tribus.

Epithemata & emplastra eiusdem
Aesclepiade.

Foliorum tenerimorū sabuci arboris lib. iij.
aloës lib. i. cum aceto subigito, & linteolo in-
fusa admouero. Vt: Cere, resine pinus, & frictæ,
sing. lib. ij. arsenici, aluminis scissi, calcis uiuæ, ſin-
gulorum sextantem: acetū, olei, atriusq; cyathos
viij. Confecto & admouero.

Malagma Antiochidis, ad splenicos, hydro-
picos, ischiadicos, arttrincosq; conueniens. Ce-
re lib. iij. resine terbinthinæ tantundem: reti-
mentorū bexprecia myrobalozo celiquorū, ſpu-
me nitri, florū lapidis Asij, ammoniaci thymia-
matis, singul. lib. i. olei Cyprini lib. iij. acetū quod

fit satis ad ammoniacum dissoluen dum.

Malagma aurei coloris.

Auripigmenti vnc. aluminis scissi, calcis uiuæ,
sing. sextantem. Cere, resine frictæ, & pinus, sing.
lib. ij. myrrhæ sextantem. Arida in creta, liguatarij
per assiduationem acetū cyathorum viij. liquidus ex-
cipiantur.

Pharmaca ad splenicos ab Archige-
ne scripta.

10 Potus sit aqua quæ ferrū candē extinxerit: sola
quidē, febrientibus: uino aut immista, ijs qui febre
carent. Aut corticis radicis periclym. n. & semini
eius, quantū tribus digitis apprehendi possit,
in uino albo meraco calido, seu uisū curiculo x.
dierum bibendum daro. Aut uulpis hepar siccū
ex oxymelire propinato. Aut folia capparis ari-
da & trita exhibito. Cataplasma aut eadē plene-
ticis & hepatis admouebis, ampliusq; cinerē ex
ferratis officina cum aceto. Aut nascitū & ſce-
numgræcū, & calcem uiuā, & nitrū, cum melle
emollita imposito. Aut fecem acris acetū, aut cap-
paris radicem cum aceto imposito. Perferueran-
te malo cucurbitas cum scarificatione affigito.
Aut uenam retro sinistram aurem secano, & dextra
tō sanguine conficito affectū ienem.

Remedia ad hydrophem ab Aesclepiade scripta.
Malagma aut potius, reforescent humiditates ab
alto, simulq; duritias discutiens. Cere, picis aride,
uirsq; lib. i. aluminis liquidi, sulfuris uiui, man-
næ, nitri rubri, sing. lib. i. resine frictæ lib. iij. olei
ueteris heminam i. Arida liquidus permisceto.

Malagma ex bacis lauri ad eadem.

Cere, resine pinus, picis braziæ, baccarum lau-
ri siccarum, nitri rubri, ammoniaci thymiamatis,
adipis uirulini subacti, sing. lib. i. Liqueficta li-
quentur, & frige facta miscantur acido redactis
in tenuissimum pollinem.

Emplastrū Tonforis, ad splenicos & hydropl-
cos, quo etiam ischiadico liberatur.

40 Picis aride lib. iij. cere, resine pinus, ammoniaci
thymiamatis, nitri rubri, baccarum lauri arida-
rum, singul. lib. ij. adipis taurini lib. i. aridos lib. ij.
canchyros vnc. xviij. farine fenicigræci, pollin. s.
radicis chamæleosis nigre tenuissimæ trixæ, ling.
sextarium unum: cumini tenuissimæ triti sesqui-
sextarium passij sextari. Confecto & unitor.

Cleophanti cataplasma ad hydropicos.

Cere, resine, spumæ nitri, ling. drach. c. cha/ba-
ui, propolis, ammoniaci thymiamatis, sing. drac.
xij. s. cyprini cyathos ij. acetū tantundem. Confi-
cto cataplasma.

Archigenis remedia ad hydropicos.

Stercus bonis armatū triū, coctūq; in posca,
in pericly sulphuris uini quarta portione, redigito
in cataplasma, idq; toti uentri admoueto. Aut elia-
teri, & aphidias syuectris, hyssopi, fellis taurini, &
quales omnī partes sicubus confusus excipiemus,
multaq; leuigis, similiter applicato. Aut uentrū
nigrum, fel taurinum, nitrum, pipere ex æquo ml
60 ita, melleq; excepta, per femulorū tempusculum
uentri imposito. Per omne autem curationis tem-
pus, coryledonis, scillæ aride, ling. drach. i. in uino
mulso diluo quotidie exhibe. Aut corticis
rad. ari. similiter drach. i. Aut radicem calamita-
e coctam propina. Ad hęc hydropicos diutius
ad solē, sed confecto capite, inungito ex oleo, cul-

*Lini pharma-
ca opima ab An-
dromacho scripta.*

*Lini cor eadem
cataplasma
operari. - qua
heparum.*

*Lini, si melius
sit potius, re-
forescentia affi-
gendo efficitur
scarificatio.*

*Hydropicis con-
gruentia mala
quæta ab Aescle-
piade scripta.*

*Hydropicis re-
media ab Archi-
gene scripta.*

*Hydropicis effi-
ciendi ratio
frictis oleo sol
frigidis, perfusa
deniq; melle
uicem talis il-
la scarificatio.*

multū salis admittit: sic ex multatū perfundito sal-
luginē calida. Inflatus uerō maxime locos, uelcīs
magnis probē inflatis quōdē continenter pulsa-
to. Incisus item aut scarificatis ipsoꝝ rālis, & uul-
nusculis impactis, in ferculo ipsoꝝ aut leſtica cir-
cumuehito. Summē etiam faciūt Theriacꝝ omnes
urinā cientes, in superius potiones aq̃uā ducētes.

De pharmacā dolorem ſedantibus, anodynis,
& colicis appellatis.

Huiusmodi pharmacā, ob dolores ingentes,
aut uigilias, aut ne per uolentiam tuſim lancine-
mur, ut conſueuimus. Ad quas quidē affectio-
nes, ſi modicæ ſint, confectiones ex ſemini-
bus, priuatim tuſiculares dictæ, ſufficiunt: quæ & ipſe
aliquid ex ſoporiferis ſeminibus poſſident, ue-
rdm modicum inter multa dō ſemina, quæ odo-
rata, & reuiniū partium, ac urinam mouentia
exiſtunt: cuiusmodi funt, cumini, daucum, ſeſe-
li, apiumig, & animum.

Philonis Antidotus, ad omnes grāues dolores
uiscerum, ad aliaq̃ multa conueniens.

Croci drach. v. pyrethri, euphorbi, ſpicæ nar-
di, ſing. drach. i. piperis albi & hyocyami, utriuſq̃
drach. xx. opij drach. x. Melle Attico excipito. Ete-
nim opium ualidiſſimū eſt inter ea quæ ſenſum ſu-
peſciant, atq̃ ſoporem conciliant. Operatur au-
tem hęc etiam ſolum, ſapa dilatum, tomentolꝝ ex-
ceptum, ac ſedi inditum, necnon illitum fronti &
naribus. Si uerō cum alio quopiā uim ipſius mo-
derare miſceatur, moderatius hęc facit. Verū
quæ admiſcentur ipſi, aut concoquantur, aut mi-
gent dolorificā affectionem oportet, aut humo-
res affectionem gignentes diſcutiant, aut diſce-
nt, aut attenuent, aut iuxta toram ſubſtauiſ al-
terent. Quum igitur optimis compositionis ſco-
pis, tria ſibi proponant: nimirum ut & ſenſus ſu-
peſſat, & nullum in poſterū circa particulam in-
de detrimentum remaneat, ampliusq̃ ut affectio
ipſa inde iuuetur: ad hęc omnia reſpicienti Philo-
ſopho, prædictum compoſuiſe uidetur pharmacum: ex
opij quidē, hyocyamiq̃ miſtura ſoporem, ſenſu
triciſq̃ ſaculantis ſtuporē inducere uolens. Quō
uerō hęc citius diſtribuerent, & rotam affectuꝝ
partium penetrare profunditatem, calfacientia
admiſcuit, pyrethri, euphorbi, & piper, quæ no-
centes humores diſcutere poſſunt, extergerē uisci-
dos, incidere craſſos, ac deniq̃ ſtulentos atten-
uare & diſſoluere. Eſt autem non modica concoſto-
ria uis omnium frigidarum affectionum in nar-
do ſita: quæ aut ſudica, aut Celtica iniicienda eſt.

At crocus humorum crudorum eſt concoſtorii,
atq̃ uim affectuꝝ uim uiscerum.

Colica medicamina Andromachi.

Aniſi drac. vi. ſeminiſ apij drach. xij. nardi drac.
iij. caſtorij drach. iij. petroſelini drach. iij. piperis
albi & longi, utriuſq̃ drach. v. myrrhæ drach. vi.
iunci odorati drach. tres. ſpicæ papaueris drach.
vi. croci drachmas iij. Melle excipito. Datur ad
ſummum, nuciſ regie parue magnitudō ex a-
que calidæ cyathis tribus: miniſi, nuciſ ponticæ
magnitudō.

Aliud admirabile colicum ad uoluuloſos,
& ſtercus per os reddentes.

Piperis albi, ſem. hyocyami, utriuſq̃ drach. xl.
opij drach. xx. croci drach. x. ſpicæ nardi, euphorbi,
pyrethri, ſing. drach. ij. Excipe melle cocto. Daſ ma-

gnitudine ſabꝝ in aque frigidæ cyathis iij. aut iij.

Colica Iſorhe dicta, ad ſtomachicos, oculo-
rum dolores, uteriq̃ labores, ex aqua mulſa, ubi
ruta fuerit iucoſta. Croci ſequi drachmammar-
di drach. ij. myrrhæ drach. viij. coſti, piperis albi
& longi, chalbani, ſing. drach. i. opobalſami drac.
iij. cinnamomi, ſucci mandragoræ, caſtorij, ſing.
drach. ij. ſemini� dauci drach. iij. ſ. ſagapeni drac.
iij. caſſi drach. iij. Excipe melle Attico. Alia nō
minus admirabilia. Succi centaureæ, caſtorij, ſcilq̃
ſaræ, piperis albi & longi, myrrhæ, rutæ hortē-
ſis, hyſſopi, abrotani, aridis Illyricæ, ſing. drach. ij.
croci, ammoniaci thymiamaris, rad. acori, phu
pontici, zingiberis, ueratri albi, ſing. drachmā ij.
Oxymelite excipito. Datur etiā drachma una ex
aceto mulſo.

Chariclis, ad coli inflationem remedium.

Cumini Aethiopici drach. vi. ſem. apij drac. v. ſe-
minis dauci Cretici drach. ij. piperis albi drach. j.
Tuſa & cribrata reponito. Daſ coſchlearia duo,
cum aque mulſæ cyathis tribus.

Confectio Lingonis colica, quæ data ex fri-
gidis, ſtatim ſoluit dolores.

Sem. hyocyami albi drac. xx. opij, ſemini� dau-
ci Cretici, utriuſq̃ drach. x. petroſelini drach. vi.
croci, ſpicæ nardi, pyrethri, ſing. drach. iij. euphor-
bi, opobalſami, cinnamomi, ſing. drach. ij. Exci-
pito melle cocto, ac ſabꝝ Aegyptiæ magnitudinē
exhibeto, cum aque tepidæ aut frigidæ cyathis
tribus, in irrationibus.

DE DYSENTERICIS.

Deinceps medicamina ſcribemus, quæ uerē
dyſentericis auxiliantur, quos nulla alia infeſta
affectio, præter ulcus inteſtinorū, aut uudum, aut
cum putredine obortum, quam uōmē appellant.
Quæ ab Andromacho ad dyſenteriam

Dyſenterici uerē
ſunt, quibus
q̃ aliq̃uand uul-
nus inteſtina-
tum.

Dyſenteria
remedia ſcripta
ab Andromacho.

ſcripta ſunt.

Potio ad dyſentericos & hæmopticoſ. Florū
roſarum, opij, acaciæ, gummi, ſing. drach. iij. ba-
lauſti tantūdem: ſucci hypocitiſidos tantūdem
gallarū, ſeminiſ plantaginis, ſucci eiꝝ, ſing. drach. ij.
ſ. Indici, ſucci roſarum, ſingul. drach. j. Con-
ſice paſtillos drachmiales, & uariē utere.

Ad dyſentericos & colicos conſectio
ex fructibus.

Māla puica integra xx. cydonia totidem æriui
ſextarium j. prunorum ſylueſtrium ſextarios ij.
Sorborum Ephleſiorum tantūdem. Rhois Sy-
riaci ſextar. iij. pira Terentiana xx. Cēſtina xxx.
ſiliquæ xl. balcarum myrti nigrarū ſextarios iij.
muſti aminxi ad tertias decocti ſextar. xlvij. Co-
quito ſimul ad mellis ſpiſſitudinem, & in ſigilli-
no reponito. Alia. Nardi, croci, utriuſq̃ drach.
viij. aloës, thuris, ſingulorū drach. ij. acaciæ, myr-
rhæ, ſucci hypocitiſidis, roſarum ſiccaram, lycij
Indici, tragacanthæ, opij, ſing. drach. iij. piperis
drach. ij. Aqua excipito, paſtilloſq̃ duarum dra-
chmarum facito, & cum uino myrtæ exhibeto.

Ad dyſentericos, coliacos, & hæmopti-
cos, ex Cornelio medico.

Myrrhæ, thuris, aloës, croci, opij, rhois Syriacæ
& coriariæ, lycij Indici, acaciæ, malicorij, ſucci
hypocitiſidis, gallæ, balauſtorum, ſingulorum
par pondus in paſtilloſ cogito, & ad noctem fe-
bre carentibus ex uino, ſebimentibus uerō ex frigi-
da propinato.

Hæmopticoſ
medicamēta Cor-
nelij.

Potio

Potio Apolloniæ ad fluxum muliebrem sistendum.

Harum muliebri sistende potio Apolloniæ.

Corallij, balauftij, urtuisq; obol. ij. gummi obol. ij. Excepe omni crudi candido, & dimidiū totius cum aquæ cyathis quatuor propina.

Infusa dysentericæ cōmoda. Infusum Athe neq; ad recti intestini ulcera.

Chylis dysentericæ apta.

Omphacij, aluminis scissilis, calcis uiuæ, squamarum ueris, sing. drach. vi. auripigmenti drach. viij. sandarachæ drach. ij. chartæ uitzæ drach. xv. cum uino myrteo passillos drach. iij. aut trium, formato. Infunde autem cum uini diluti cyathis iij. & aquæ tepidæ cyathis duobus.

Infusum Heræ.

Chartæ uitzæ, cadmiæ, auripigmenti, singulorum vnc. i. calcis uiuæ extinctæ succo plantaginis, vnc. s. Omnia redigunt in pollinem, & ochlearia duo, cum decocto baccarum myrti, aut uino myrteo, infundunt.

Infusum Nicotitrati.

Calcis uiuæ drach. i. gypsi drach. viij. acaciæ drach. ij. omphacij drach. i. stibij drach. ij. thuriæ drach. i. gallæ drach. i. iij. tragacanthæ drach. ij. cum uino myrteo in passillos redigito.

Asclepiadiæ ad dysentericos remedia.

Dysentericis remedia ab Asclepiade scripta.

Rhois Syriaci, farinæ potentillæ, uisæ passillæ, sing. drach. ij. malicorij tussij & cribrati drach. i. Excipit melle cocto, atq; mystrum unum ante cibum porrigito. Aliud probatur. Gallarum redactarum in pollinem cochlearie uitum: pipenis albi, rhois rubri, malicorij tenuissimæ trini, singulorum tantundem. Omnia uero luteo excipit, & in aquam mali punici testam conficito, atque obaturato cum farina oculo ipsius, ad prunas torreo: depurgata mali punici testâ, cochlearium unum edendum dato.

Passillus Philippi ad dysentericos inueteratos, dolorem sedana, qui bibitur, & infunditur. Balauftij, acaciæ, succi hypochlidis, rhois, apij, thuriæ, myrrhæ, baccarum myrti nigrarū, croci, gallarum, lycij, aloës, rhes pōnnci, malicorij, sing. drach. iij. Excipit uino Italico, cogitoq; passillos ponderæ obol. ij. ac porrigito nō febricitantibus quidē, ex uino: febricitantibus uerō, ex mulsa.

Epithema cœliaciæ dysentericiæ.

Dysentericæ epithema cœliaciæ.

Seminis hyoscyami albi, apij, urtuisq; trientem: anisi, floris rosarum, succi hypocistidis, balauftij, rhois Syriaci, sing. sextantem: succi papaueris, croci, urtuisq; vnc. i. Singula cum uino myrteo terito dein mista in passillos redigito, quos in umbra assecicito. Inde uerō quantū sufficit tundens & cribrans, palmulâ passis excipito, ac tandem limbeolo imposita, uentri admoueto.

De affectibus sedis.

Sedis uiciorum curationis recipiuntur quæ huius pharmacopœiæ sunt.

Sedis uitia, ob ipsius partis sensum exquisitissimum, & ob cerebrum ipsam excrementorum decursum, ægre curationem recipiunt. Apsiisimâ autem ipsa phar maca sunt, quæ absq; alio predicti asstringunt: qualia maximè sunt, quæ ex metallicis neq; acris, necce acerba existit. Hæc siquidem loia, circa mordacitatem (id quod requiritur) operantur.

Medicamenta sedis ab Andromache scripta.

Sedis medicamenta ab Andromache scripta.

Cerussæ, lithargyri, urtuisq; drach. v. thuris, aluminis scissilis, utriusq; drach. ij. croci obolos ij.

Vini & rosacei quod sit sana. Conficito. Aliud. Butyri, ceræ, urtuisq; seiscunciam: medullæ ceruinæ, cyprij, thuris, singul. vnc. i. aluminis scissilis quadratam: lycij sextantem: vini & rosacei quod sit sana. Miscero. Aliud. Adipis asinerum curati, ceræ, thuris, medullæ cerui, florum rosarū, pompholygis, cadmiæ, plumbi lotij, sing. drach. iij. cerussæ drach. viij. cerebri grægia drach. ij. succi papaueris seiscundrachmam: cyprij drach. v. succi seiscundrachmam: i. ro aci heminam s. Confundito.

Pinguis compositio ad achoras & ploras. Spumæ argenti, cerussæ, urtuisq; drach. xxxij. atramenti sutorij drach. xvi. fulfuris uiui drach. viij. Olei myrti & aceri quod sit sana. Miscero.

Uiciorum uiciorum remedia.

Ad prolabantem sedem.

Recremanti flori rosarum drach. iij. myrrhæ Minoræ drach. ij. Inpergessicem, ubi præleris uino austero, aut uini decocto. Aliud. Gallæ omphacidiæ, rhois corarū, sing. drach. ij. plumbi iusti drachmas iij. spumæ argenti drachmas viij. trita inpergit.

Solis prolapsis remedia.

Hamorrhoidibus extrahendis pharmacæ ab Asclepiade scriptæ.

Piperis, nitri, urtuisq; drach. i. terito admoueto. Aliud. Spumæ nitri, fellis tauri, staphidia syluestriæ, sing. drach. i. Trita, exceptæq; modico melle, adhibito. Postea uerō quæ eminentes fuerint, atq; in propatulo, accepe cerussæ vnc. i. spumæ argenti quincun: pompholygis vnc. i. olei myrti bessem: uini boni tantundem: butyri vnc. i. Confundito, & applicato. Cæterū ad ar dentes sedis dolores, qui assati uirtellum uino albo terito, & cerato myrteo exceptum illinito.

Hamorrhoidibus ab Asclepiade scripta remedia.

Ad pudendum affectu.

Exulcerati pudendi cognatio, ex manifesto circa ipsum dolore paratur: una cum hoc, quod etiam circa mictiones exernit quid ex corpore uulceri ipsi insidentibus. Discernuntur autē hæc ab alijs quæ ex uicibus feruntur, quod statim in ipso primo loci exitu appareant: quæ uerō uicibus excernuntur, deferantur enim urinis permixta. Cæterū uulcera pudendorū, & circa sedē cura infamissimam cōstituta, resiccanibus ualde indiget phar macis: qualia sunt quod ex charta combusta consistat, & anethū uisum, & cucurbita uisâ. Verum siccia & recens uulceribus, etiam aloë bonum est medicamen. Omnia autem maximè dolorem sedat, nec ullo minna efficacior est pompholyx. Si uerō liumescientia sint uulcera, pinus cortex per se, & lapia ligamini uerū si profunda, manna enī prædicta addatur. Porro quæ circa uterū aut uicibus constitunt uulcera, eisdem medicamentis indigent, sed instrumētis insuper opus habent, quæ ipsa intromittant, ut sunt metrenchytæ, & catheteres uocati. Apnora itaq; sunt arida, qualia est erocua, pompholyx, & aloë, quæ facillè plantaginaria, aut teri tali succo miscunt. Ad seroti pudendi dolores. Butyri & resine pari mēsurâ utere. Aut semen lini cum aqua coquito, & admista myrrhæ feruēdecima parte, & resine tantundem, imposito.

Pudendorum uiciorum dyssentericorum remedia.

Pudendorum uiciorum ualde resiccantibus phar macis indigent.

Pudendorum uiciorum recensibus, quæ phar macis opulentant.

Ulcera resiccantia, & siccum quibus pudendi uiciorum medicamentis indiget.

Catheteres.

Ad pudendum intumescētia.

Foliorum uitæ tenerorū drach. i. cerussæ drach. v. trita cataplasmania uice impone. Aut lennucij in aqua coquito, & cum mali punici cortice tritam imposito. Si uerō è facilibus uulcera in

Pudendo tumefacti remedia.

scroto fiant, gallam tritā cum alumi ne inpergiro.

Pudendi fissura, tubercula, quæ sanantur.

Pudendorum inflammationes, hinc quæ episcopantur.

Priapismus ut auctio colicæ permanens, in latitudine, citra rei veneræ appetentiam. Cuius affectionis est causa, flatulentus spiritus ex humoribus crassus & viscidus genitus per moderatam caliditatem. Debent igitur refrigerari leniter partes per ceratum rosaceum in aqua maceratum, item per chasmeleum ceratum, tum pudendo ipsi, tum lumbis impositum. Visus & pharmaca esse debent arenatoria, citra manifestam calfactionem. Præterea alymphæ in potu edenda, & uiridis semen: necnon ruta uiridis obsoletus misceretur, post aliorum tenuitatem usum. Quod si evacuatione uti libeat, administretur per uomitum. Ad eos qui se in fomno permungunt, uticam caprillam, aut ouillam usam, ex polca bibendam dato: & ad uesperā friculosos inire somnum iubeto. Facit & testiculus leporis in uino odora- tus feruefactus, atque ita potus. Aut calamintum & myrrham in uino ante cenam bibendam dato. Oblinunt autem pudendum cimolia terra cum perdicti sacco.

Mingentium inter digressum remedia.

Uteri suffocatio, nec quæ inquitur symptomata.

Uteri suffocatio, nec affligit, per arterias tamen fieri praesentationem.

Uteri suffocatio, nec causa.

Uteri suffocatio, nec remedia.

Ad uteri affectus. In uteri suffocatione contingit sensus ac motus priuatio, & pulsus obcurus, & paruus, & penitus interceptus. In aliquibus uero tum sensus, tum motus adeest, ratioque constat, ceterum uix respirant. Aliquibus enim uox intercipitur. Alij contrahuntur artus. Fiant igitur uiduis sensus & motus & respirationis interceptiones, ob frigiditatem: perspirantibus ipsis tunc per arterias totius corporis, neque utenibus illa quæ per os fit respiratione. Etenim quā prius probe repurgauerunt, conciperent, atque coeuerint uiris, uerisimile est, postea quā omnibus his priuauerunt, humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrigera re. Ad uulux itaque strangulatus conuenit agarici drach. i. in potu accepta cum uino: & plantaginis semen & succus cum uino: necnon acerum scillitum abforprum. Olfactu excitant strangulatas, bitumen, castoreum, chabbanum, pix liquida, cedria, pili asii, ruta, allium, cypa. Eandem in rem & cornu cerui fusiunt & ruta cum melle lana excepta in anum indantur.

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secundum loca, lib. X.

Nephriticum medicamentum differentia.

EX nephriticis antidotis, hoc est, renalibus, quædam calculosus renes iuuant: quædam uero inflammatos & ulceratos, quæ etiam ad uesicam affectam conueniunt. Maxime autem contrariæ inter se sunt prædictorum pharmaco-

rum facultates. Siquidem quæ ad inflammationes & exulceratas affectiones cōponuntur, mitigatoris medicamenti indigent. Ceterum quum impositibile sit hæc citò penetrare ad regionem renum, ob id ipsis miscemus diuretica. At quæ calculosis optulauerunt, unicam facultatem postulant, quæ fecare & extergere est nata, cum conspiciat caliditatem. Sunt autem talia ferè omnia amara.

Confectiones Andromachi ad renum & uesicæ affectiones. Pontio ad uesicam ex ulceratis, & urinx emittendis diffuciliter. Seminis lini sem. papaueris albi, sem. cucumeris, tragacanthæ, sing. drach. ij. amyli drach. iij. Cum aqua in pastillos redigito, exhibeto.

Alia ad eadem, & nefricæ dolores. Croci, seminis rutæ syluestris, seminis malux syluestris, sing. drach. vi. sem. hyoscyami drach. xij. opij drach. vi. sem. apij drach. xij. nucis auellanas xij. amygdalas xx. sem. cucumeris drach. xij. mellis Arici qd fit satis. Datur magnitudinis ponticæ nucis cum uini mulsi cyathis iij.

Alia ad profluuium sanguinis ex uesica. Aluminis drach. j. tragacanthæ drach. ij. gummi obolum j. Dato ex passo quandoque obolum j. quandoque duos.

Alia calculos frangens, ita ut nō renascantur. Casticæ, piperis albi, sem. pastinacæ, anisi, sem. papaueris albi, spicæ nardi, sem. smyrni, cypri, sing. drach. ij. seminis apij, thuris, styracis, iridis Ilyricæ, amygd. amar. asari, sing. drach. iij. myrrhæ minuz drach. iij. mellis Arici quod fit satis. Conficito, & quotidie exhibeto nucis ponticæ magnitudinis ex aquæ cyathis tribus, idque uino stomacho.

НАПРИТЦАА compositiones ab

Alextipede conscripser. Seminis fatui cucumeris rosi drach. iij. seminis malux drach. v. nucum pinearum drach. vi. sem. apij drach. vij. seminis lini drach. j. amygd. amararū mund. drach. ix. Excipe passo, & exhibe nucis ponticæ magnitudinis cum proropi cyathio j. & aquæ calidæ cyathis duobus. Alia. Malux syluestris, & rutæ syluestris, & apij montani radices in uino coquito, & expressi liquoris cyathos ij. cū pari aquæ portione exhibeto. Alia. Seminis balsami, lapidis quæ spongile inest, pulegiæ aridi, seminis malux syluestris, ocymi aridi, fag. paræ portiones tundito, incertitoque & reponito. Propinato autem coctileare unum cum uini diluti cyathis duobus.

Pastillus ciens urinas, atque expellens lapillos.

Asari, petroselin. phu, mei, sing. drach. iij. acori, sem. anisi, sem. dauci, apij montani, carpalbalsami, tragacanthæ, singulorū drach. ij. Tragacanthæ passo dissolutam aridis adjecto, & pastillos formatos, indetque obolos iij. cum passi diluti cyathis ij. exhibeto.

De ischiada, podagra, & arthritide. Ex genere arthritidis est tum ischiada, tum podagra. Quod enim in omnibus articulis est arthritidis, hoc in uno iuxta coxendicem quidem, ischiada, iuxta pedem uero, appellant podagra. Incipit igitur plerumque podagra generatio ex uno articulo, tempore in omnes progreduntur. Cōmunem habent tres affectus redundantiam humoris. Ceterum aliquando irruens humor sanguineus est, ut

Renum inflammationis, ipsa medicamina conueniant.

Calculosis magna medicamentum, omnia fieri esse amara.

Vesicæ uesicæ uicina difficultatis remedium.

Sanguinis uesicæ fluxum remedium supplicium.

Calculi seminis medicamentum.

Nephriticæ cum passum ex alexipede.

Arthritidis, ischiadæ, podagræ.

Articularium morbum cum melle canja.

est, ut plurimum autem pituitosus, aut ex pituitoso & bilioso mistus: quibus etiam interdum miscetur sanguis. Porro ubi pituitosus humor, qui propriè appellatur crudus, in articulis delinuerit diutius, crassior atque viscosior efficitur, rosisque aut callis dictis præbet generationem. Qui quidem postquam producti fuerint, non est quod speres illos posse exactè dissolui. Differentia affligentium humorum faciliè ex colore dignoscitur. Præterea biliosus sanguis multè calidioris sensum ex-
hibet agrotanti, si calorificiis remedijs exacerbatur, quemadmodum remittitur rursus à frigidis.

Curatio autè ipsa exordienda est ab euacuatio-
ne affligentis humoris: si quidem ex quo humo-
ribus redundat corpus, uenæ sectione primò om-
nium administrata: deinde purgatione: quibus acce-
dat pharmacorum dicendorum cōueniens atque op-
portunus usus, ita ut in manibus pedibusque phar-
macia repellentibus fluxionem utamur iuxta co-
xendicem uerò, ex minimè administrare. Quod
enim iunctura ea in profundo sit, sanguis ex
uicinis & ambientibus uasis à musculis ad illa tru-
ditur. Mitigatorijs igitur in principio medicamē-
tis utendum est ad dolores coxendicū, & quæ nec
refrigerant multum, nec fortiter calfaciunt. Exa-
cerbantur enim per ipsa fluxiones, caliditate nimi-
rum plus attrahente ipsas, quàm impediēte. Ra-
rò itaque sit coxendicum dolor ex sanguinis multi-
tudo: cūsumēty curatur, uenis circa popliteum
aut malleolo pertusa. Quemadmodum autem so-
la sepe sanguinis euacuatio sufficiens auxiliū exi-
sit, sic contra in omni dolore coxendicū, & præ-
sertim eo, qui ex humorū copia est exortus, si quia
ante euacuationem totius corporis acerbis phar-
macia circa affectam partem utatur, affectū aggre-
dibilem reddet, copia uidelicet indissolubiliter
ibi dem condensata. Ob idque ab euacuatio-
ne incipiendum est, non solum à cruribus, sed à cubito
etiam sanguinis detractioe facta. Auxiliantur etiam
uomitua ipsa ischiadica, magis utique quàm
euacuaciones per uentrem, ut qui reuallant humo-
rem repentem deorsum. Mouendi itaque sunt uo-
mitua in principio ab accepto cibo: postea uerò,
etiam per uomitoria medicamenta, in initio à me-
diocribus factio. In quibus autem ueluti mens hu-
morum densatio, quæ aggre dissolui possit, à medi-
ca in tempestiue utentibus acerbis pharmacia fa-
cta est, ipsa maximè cucurbita affixa auxiliatur, &
purgatio per clysmos effliciores, qualia est qui
ex colocynthide constat.

Compositiones ab Andromacho scriptæ ad
ischiadicos. Empiastrium è profundo extrahena
humores affligentes coxendicem. Seminaria ru-
tæ syluestris, filipij, spumæ niri, baccarum lauri,
abrotani, colocynthidis medullæ, cardamomi,
singul., singul. drach. iij. rutæ uiridia minæ octa-
uam partem. Quidam horum singulorum drach.
xx. accipiunt: necnon picis, adipis taurini, tere-
binthinæ, myrtæ, ceræ, sing. tantundem: chaba-
ni, ammoniaci thymiamatis, utriusque drach. vi. o-
popanacia, sulfuris uiui, sing. drach. iij. Confici-
to, & admonero.

Aliud ad coxendicum; capisijs dolores,
atque ad alioa omnes antiquos.

Ceræ drach. xxiij. ammoniaci thymiamatis
drach. vii. terebinthinæ tantundem succi thapsiæ

drach. viij. olei cyathum unum. Aliud. Ceræ
drach. c. uisci quercini drach. xvi. myrrinæ drach.
vi. terebinthinæ drach. xxv. chabani drach. vi. iri-
dis illyricæ tantundem: ceræ hemiam. s. cypri-
ni tantundem.

Afsclepiadis malagmata ad
ischiadicos.

Myrrinæ factæ, bdellij onychis, medullæ cerui-
næ, ammoniaci thymiamatis, iridis illyricæ, sing.
lib. ij. opopanacia, chabani, styracia, mastiches,
stioris lapidis Asij, succi scycomororū, cantharo-
piperis albi, sing. lib. ij. ceræ, terebinthinæ, utriusque
lib. v. Tandendum est pharmacū ita, ut qui tundi-
tur, faciem unguenti irini adhibeat, quò mollius
reddatur.

Aliud mirè iuuana ischiadicos, discutiensque
omnem duritiem.

Ceræ, uisci quercini, terebinthinæ, iridis siccæ,
myrrinæ, chabani, sing. drach. xlvij. Olei cypriui,
aut unguenti Aegyptiaci quod sit. Caphitico.

Aliud. Picis liquidæ brutæ lib. iij. facis aride
utæ lib. ij. niri rubri lib. i. s. resinæ pini, ceræ, sta-
phidis syluestris, sulfuris uiui, sing. lib. ij. pyrethri
lib. s. cardamomi sextarii unum. Picem, ceram,
arque resinam, soluto aridatundito, cribratoy,
& liquefacta cōmitrito. Porro Damocrates, Ar-
chigenesque plurimum ad ischiadicos cōmendant
malagma ex iberde herba (quam nasturtium syl-
uestre uocant) cum adipe porcino rursus cōfectum:
10 quod sanè imponi iubent ad horas tres, indeque ad
balneum accedere.

Depodagricia & arthritica affe-
ctionibus.

Scopus in hisce affectionibus est, si quidem adhuc
fluant humores, ipsos per stringentia repellere:
si uerò amplius non influant, discutere qui sunt
iam impacti.

EPITHEMA Afsclepiadis, ad arthriticam,
mirè dolorem sedana.

Succi papaueris drach. iij. croci drach. i. cum
lacte bubulo, caprilloue, & panis medulla cōtun-
dito, leuigatoy, ac denique ex rosaceo emolliens,
conficito cataplasma. Aliud. Styracia drach. ij.
opij drach. i. Conficite, uterque. Aliud rosos & du-
ritia discutiens. Farinæ sanguinæ, stioris lapi-
dis Asij, lomentii fabæ nigre, farinæ lupinorum,
singulorum sext. ij. Omnia mixta & aqua subacta
calida, imponito. Pastillus podagricus. Aloës
lib. ij. succi centaury sciscuntæ, thuris masculi trien-
tem: myrrinæ tantundem: stioris lapidis Asij, opij,
succi mandragoræ, aluminis scisij, singulorum sex-
tantæ: passio excepta in pastillo redigito. Vsu ex-
petente, lacte dissolutos cū penna illine, & supra il-
litionem linteamum passio imbutum impone. A-
liud, quod auxiliatur confestim. Visci, terebinthi-
næ, utriusque lib. ij. adipis taurini, stioris lapidis Asij,
calcia uiuæ, mannæ, singulorū quadrantem: cypri-
ni lib. i. Conficito, utitoy.

F I N I S.

Ex industria omnisuius libellum de facilibus para tu re-
medijs, quod omnia que in illo habentur, repcriam
tur in hisce cōmentarijs longè cu-
mulatiore.

Tofrenum gy-
ratu fit à pitui-
tose humore in
pelle in articu-
lo, ad id, sunt
incorabiles.

Articulari do-
lores à quib. po-
tius humores
bus, quæ nota
sunt.

Articulari mor-
bi curatio.

Repellentibus
quidem utendi
esse, si humores
fluant ad articu-
los, potè aut
manuum: mano-
ni autem, si in
extremis uten-
dum.

Ischiadi qualia
remedia in prin-
cipio committi
Ischiadi raro ori-
tur à sanguine,
sed uicinis cu-
ratur: itaque po-
pote ueni aut
malleolum aut
fieri.

Ischiadicæ rogen-
te, acerbis uicinis
camentis nō est
utendum, ante
totius corporis
macerationem.

Ischiadicæ con-
ferti ueni scilla
in cubito, ueni
impy.

Arthritici con-
gruentia quæ
mata ab ischi-
adici stirpe.

GAL. DE THERIACA LIB.
ILLVSTRI ADMODVM, ATQVE ORNATISSIMO VIRO,
D. D. ARIO GONZALO, COMITI PVGNI IN ROSTRO,
ANDREAS LACVNA SECURIENSIS, DOCTOR
Medicus, Males S. Petri, Salutem.



*Aleni cōmentarios de Theriaca & de antidotois, hoc nomine dicare tua Dignationi staturui, Vt citra controuersiam splendidiſſime, & generosum istum animū tuum, ex tam longa lite & controuersia defatigatum, Variis eorum lectione, dulcissimāq; oblectarem: contra iudicialiūq; molestias, atq; ingentes difficultates (qua optimorum ingeniorum veluti deleteria & exitialia venena exciſunt) saluari alexipharmacum cōmunem, atq; corroborarem. Quamquam hercle adeo inuicta, insuperabilisq; tua ista est animi magnitudo, vt nullis tormentis succussa possit inquam euerti, aut quoquo modo labefactari. Nam tamenſi varij fortunæ fluctus, acerbissimēq; procelle, & quæ vel fortissimum quenq; prosternere minimo negotio potuissent, tam ante multos annos in te maximū impetum fecerint, adeo tamen fortiter sustinuiſti omnes eius insultus, tam heroicē resistiſti afflictiombus vndiq; tua manū circumuallentibus, vt ob nullam tempestatem ingruentem, vultum inquam, aut colorem, mutaueris. Quam sanē tam insignem constan-
 tiam, animiq; raram serenitatem, non aliunde quā a philosophia comparasti: cuius nimirum amato-
 ri longē indulgentissimus es. Siquidē præter alias virtutes quibus te exornauit Deus Optimus Max-
 etiam inſcut tibi ardentissimū quendam omnium disciplinarum amorem: quo accensus, adeo illis per-
 petuō indulges, vt ab ipsis reuocari non possis. Id quod ipse exploratum habens, non posse me Digna-
 tionem tuā rem illam gratiorem facere exislimauī, quā si ad eam mitterem hosce cōmentariolos Ga-
 leni, vt mole exiguos, sic plenos eruditione, varijsq; naturæ mysterijs auctos. Tuum inquit fuit, vt
 clarissime, hoc nostrum quantulumcunq; munusculum, illius seruicijſſimi amoris, quo optimus pa-
 ter meus proſequabatur olim totam familiam vestram, officijsq; mei in tuam Amplitudinem, futu-
 rum veluti monumentum quoddam perenne, æqui bonisq; consulere. Vale. Venetijs, Calend. Apri-
 lis, M. D. XLVIII.*

1270

GALENI PERGAMENI DE
Theriaca ad Pisonem, lib. vnus.



*Edicamentum ex uiperis merito est apud homines inter alia omnia cele-
 bratissimum. Optime Pſo, & quod uim habeat efficacissimam, & quod neminem promissis frustraretur. Siqui-
 dem nulli a feris cōmorsum, hac statim epota an-
 tidoto, periſſe, memorie proditiū est. Nullus etiā, eadem præſumpta, uel ſi paulo poſt impeteretur,
 morſu interiit: id quod in deis experiantur præ-
 tores, in hominibus capitali ſupplicio damnatis. 10
 Cæterum ſi epota theriaca non purgetur qui hau-
 ſit medicamentum purgans, id nbi erit indicium,
 antidotum præſtantiſſimam eſſe, quæ ſæpiſſimē
 ſolet adulterari. Porro Diuus Marcus Aurelius,
 qui legimē aliquando geſiſt habenas Imperij,
 aſſanū & ueluti alimento quodam hoc utebatur
 medicamento: primuſq; fuit, qui ipſius exiſtima-
 tionem ſidemq; auxit. Verū illius quidem prin-
 cipis tempore, ad familiarium tantum noſitiū,
 theriaces perueniebat opus: ſub hiſce autem mo-
 narchiis maximis, uſus eius prodijt in publicum.
 Siquidem nobis omniſus licet eorum bonis pro-
 be uti, liberaliter alijs mederi, alio ab alio me-
 dicamentum capiente: quom non ſolum hoc no-
 mine cæteris omniſus antecellant, quod Impe-
 rium à Dñs ſint adepti, ſed quod etiam uniuerſa
 bona cunctis libenter impartiant, ac non ſecus
 quā Dñs ipſi, tantū ex æquo gaudij concipiant,
 quantum illi qui ab ipſis ſeruantur: quom ni-*

*mirum cenſeant maximam regni eſſe partem, com-
 munem omniū ſalutem. Quo ſanē regio candore
 præditi, adeo exquisitē & diligenter theriacem
 præparāt, ut ipſi quidem nihil proſius omnitranti
 antidotoſ autem, admiranda opera exhibeat. Igitur
 morbi cuiuſq; natura comperta, differentijsq;
 ſimplicium pharmacorū penes temperamentū,
 cognita, ſingulis morbis quod congruū ſit medi-
 camentum compoſitum præparabimus. At ſimpliciū
 medicaminum vires ſenſu & experientia cogno-
 ſcimus: quibus poſtea rationem iungentes, eamq;
 cetū ducem ſequentes, hallucinari non poſſumus.
 Etenim quom cernamus liquidū, ſcammonia bile-
 m ſlauā educere: epiſthymum, atram bilem
 deniq; coctum gnidium, pituitam nec credamus
 medicamenta ipſa purganti, in ſuam naturā ha-
 mores tranſmutare & conuerti (id quod A-
 ſclepiades ſomniauit) ſine perſuſum habemus,
 quemadmodum magnes trahit ferrum, ſic medi-
 camenta ſingula, ſua inſita facultate conueniente
 ſibi ſuccum attrahere: nimirum id ratione com-
 prehendentes, quod propriam eſſe facultatis na-
 turæ cuiuſq; pharmaci uerē teſtari atq; expri-
 me te poſſent. Medicamentorū itaq; alia per totas ſub-
 ſtantias agunt: alia in ſubſtantia ſua miſcellaneam
 facultatem ſortuntur, adeo ut ſæpe in corpore eſ-
 ſectis maximē contrarios producant. Siquidem
 lapathi folia comēſta ſubducunt alium, quam
 ſumptum eius ſemen astringit. Similiter & ſuc-
 cus braſicæ, & uetulorum gallorum ius, & coch-
 learum marinarum et emores, uentrem commo-
 uent: olus autem iſium, atq; uelut illarū carnes com-
 mitit,*

1271

*Regni maximū
 eſt parte, com-
 munem omniū
 ſalutem.*

*Simplicium vi-
 res cogniti ſen-
 ſu experientiaq;
 quibus admo-
 di ſu ratio.*

*Scammonium
 trahit ſlauā bi-
 lem.*

*Epiſthymum a-
 tram bilem ex-
 purgat.*

*Coctum gnidium
 ſuū ſuū ſuū.*

*De documentis
 ſingula proprijs
 ſibi ſuū attrahere.*

*Medicamenta
 plura, ſecundū
 diuerſos ſus
 ſerui partes, va-
 rios effectus pro-
 ducere.*

*Theriaca com-
 mendata.*

*Theriaca perſo-
 ſta purgatiū
 pharmacorū u-
 peratiue ſup-
 primi.*

*Marcus Aure-
 lius Imp. auſit
 ſibi Theriaca.*

*Seruum & Lo-
 cū inſeruiſſe Im-
 perij modera-
 tiori ceterisq;
 magnifice com-
 mendat Gale-
 nus.*

mentis, eundem compriment. Aloë, squamæ æris, excrecentes ulcerum carnes stringunt: assumptis uero per os, uniuersum corpus expurgat. Lac ubi à nobis diuiditur, cōtrarias facultates ostendit. Nam serum ipsius bibitum, uentrem resoluit. Cæleus ingestus, ipsum enhibet exactè. Trifolium herba decocta, imposita, ferarū moribus auxiliatur: quæ si sanæ parti affricetur, non secus quam ferarum moribus eam assiguit. Cicuta sturuos quidem alit, nos autem è medio tollit. Veratrum autem cornuicinis cibis, homines malè perimit. Nōnulla præterea partes quoddam certas corporis ulcitant. Nam lepum marinus pulmonem exulcerat. Cantharis uescimus peculiariter afficit. E cōtrario, affecto iecinori sæpe fuit herba eupatoria ex usu. Myrobalanis licet adiuuans, Saxifraga & Beticana, renes optimè afficiunt. Quom igitur ueteres illi Medici reparentur secum, inenitibiles esse noxiarum ferarum morbus: necnon deleteriarum pharmacorū symptomata esse omnino letalis: quumq; etiā perpendent, hominū naturas differre inter se plurimū, aliudq; sti medicamentū idoneum esse, merito ipsius theriaces accuratam, exquisitā, & uariam, sunt moliri præparationē: ut hoc nomine ipsa in omnibus suum finem assequeretur, & ob usus necessitatem magnū studium eam mortales omnes exeperent. Nihil siquidem inter uitæ incōmoda difficilissimū mihi uidetur deleteriū medicamentū, ac feris noxissimū. Primus autem qui antidoto contra ferarum morbus immiscuit seras, fuisse perhibetur Andromachus, ut mehercule memorabile, nec multū antea nos nstus: quippe qui Neroni (cuius affectus fuit) ipsius uires stq; compositionē dicarit. Summa autem descriptionis habet in hunc modum.

Andromachi senioris, Neronis archiatri Theriace ex uiperis, cui nomen est Galene, maximè salutaris ad serpentium atque omnium ferarum icūs, pharmaca deleteria, affectiones uentriculi, anhelationes, dolores colicos, morbum struā, hydropem, phelsum, omnimodam conuulsionē, pleuritidem, uescicæ ulcera, suppressiones urinae, cruciatibus renum, pestiferos morbos, ac deniq; canis rabidi morbus, si pondere fabæ Aegyptiæ fumatur, cum ternis squæ calidæ cyathis. Igitur captae uere inscunte uiperæ, ceruicis illis atq; caudæ præcidit, quantū arcta Pygmæi manus extenditur: nam utraq; parte uenēdū gerunt. Postea uero excoriatas euisceratasq; ab ipsiis omni ad pō amoto, in fistile uas conficit, affundens atq; quod satis esse uideatur, addensq; germen anethi, ac pauillim salis recentis, & finito coqui, donec facile à carne ipsæ spinæ amoueantur. Tunc itaq; carnes ipsæ exemptas, cum sufficienti ad pastillos fingendos medulla panis purissimi, contundit & laeuigato, sifusofy fusculi quod satis esse uidetur, manibus opobalsamo inunctis, conficitur orbiculos, eosq; in umbra reponit ad tantū antidoti compositionem. Dein fermento illine scillam recentem, non sēmodum magnam, eamq; in furio uel in psina coque, ut torreatur omnes eius partes ex aequo. Id ubi factum fuerit, partes eius interne & tennissime cum pari portione optimæ farinæ eruinæ contundantur & laeuigentur, atq; in orbiculos digerantur. Verūm Andromachus duplicem portionem eruinæ farinæ adij-

ciendam censet, quum tamen æqualis modus fingendis pastillis fit optimus. Hæc ubi facta fuerint, accipies pastillorum Theriacorū drachmas xxiii. pastillorum scellinorum drachmas xliii. piperis longi, succi papsueria, magmaria, hedychoi, singulorū drach. xxiii. rosarum siccarum, iris Illyricæ, glycyrrhizæ, seminis napi syluestria, quem bunadia appellant, scordij, opobalsami, cinamomi, agarici, singul. drach. xii. myrrhæ, costi, croci, calig. nardi, galeni, id est, iunci odorati floris, thuris, piperis albi & nigri, dictamni, prassii, rheu, scædæ, petroselini Macedonici, calaminthg, terebinthg, zingiberis, quinquefolij radicis, singulorum drachmas vi. polij, chamæpyros, sty racis, smomi uux, mecu, nardi Gallicæ, Lemniæ sphragidis, phu pantiæ, chamædryas Creticæ, soliorum malabathi, chalcididis tostæ, gentianæ, nifi, hypocistidis succi, carpopalsami, gummi, marathi seminis, cardamomi, seselis, acacjæ, zilaipis, hyperici, sagapeni, ameo, sing. drach. iiii. castorij, aristolochiæ tenuis, dauci seminis, bituminis Isidæci, opopasnatis, cētarū tenuis, manibustq; opobalsamo inunctis, in pastillos coguntur, & sificiuntur. Elegit porro Andromachus ex alijs feris solas uiperas ad huius præparationem antidoti, quod hæ minus alijs toxicum uim obtineant. Nam basiliscus, belua subfaua, & triplici frontis apice munita, ut si cernatur tantum, aut fibilis eius audiat, ætaliū hominem perimit. Quod si ex ceteris animalibus aliquod atigerit animal à basilisco extrinsum, subito etiam exanimatur. Dryinus serpens tam esse perniciosus proditor, ut si qui ipsum per imprudens calcarint, eis pedum plantæ exoriantur, totaq; crura intumescant, periclitenturq; etiam illorum manus, qui ipsi auxilium tulerint. Hemorrhus, & hemorrhiois, adeo inimici sunt homini, ut qui ab ipsi percussus fuerit, sanguine per os & nares, ac per uniuersum corpus effusus, uita fungatur. Cōmorfi à dipside, consiciuntur cautionide. Nam & inexpugnabili siri, & uita uehementi cruciani, interdū & disrupti, diem obeunt. Aconias serpens, ubi se multum extendit, seu iaculum quoddam insiliens corporibus, ita perimit. Inter aspides nominata Pyras, ceruicē exporrigens, longitudinē: mity interualli menia, uenenum corporibus insipit. Erenim harum ferarum una (tres quippe aspides sunt species, hæc uidelicet, & chersæ, necnon che lidonis) perhibent reginam Cleoparam, quum uellet latere custodes, citra suspitionē sibi mori subitū consiliuisse. Nam quem Augustus deuotio Antonio eam exere incolumem uellet, ac uiuere, studiosiusq; (sicut par erat) seruare, ut Romanis tam insignem mulierem in triumpho ostenderet, hæc, re intellecta, nprauit regina adhuc e humanis potius decedere, quā priuata Ro-

Hedychoi ro-
gum præpara-
tio.

Viperæ alij fi-
ri minus obre-
nere toxicos fa-
cultas, ab alijs
ad antidoti ab-
Andromachi e-
leuans.

Basiliscus con-
fusus audiat
se, hominem pe-
nitit.
Dryinus ser-
pens.

Hemorrhus.
Hemorrhiois.

Dipsas siri in
seri incompa-
bilem.

Aconias serpi-
tis perit.

Pyras uenit
corporibus in-
sistit.
Aspidem tres
species.

Cleopatra post
uictum Antoni-
um, pro uita de
certis Romanis
à Cesare, assi-
de sibi mercedem
augment.

Lactis subtilis-
sima densa.

Trifolium afflu-
git sanæ parti-
colat.

Cicuta sturua
ali, nec perimit
Veratrum alia
entem, ho-
mines emicat.

Lepum marinus
pulmonem exul-
cerat.

Cantharis rpi-
cam afficit.

Difficilissimū in
uita uisul repri-
ri possit deleteri-
um medicamentū
to, ferarū uires
etaculantis ab-
Andromachi
cōmmodat.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacis qui-
bus cinenat ab-
sistit.

Theriacæ Andromachi præparatio præsertim ceteris. Vipera quædam venanda.

præparent, nos compositione Andromachi, cui omnium præstantissima uisum, in tegiosis usus eam præparamus. Venari autem oportet uiperas initio ueris, cum lateribus relictis, foras in apicū prodeunt, & non adhuc uirus tam exitiale retinendū. Inrus namq; delitescentes, cum nulla ex parte dissidentur, magis sunt perniciosæ. At egressæ, exuium, crassum tegumentū solent deponere. Quare non statim ipsas capere oportet, sed permittere ut ætæ aliquid fruantur, consuetudinē

Vipera quædam sunt deliquenda.

Vipera feminea masculis distinetur.

uestiant cibo, hoc est, herbis, busprethibus, cantha ridibus, & pyrocampis. Eligendæ autē sunt colore sublaue, eximia quadā agilitate mobiles, ceruices admodum extensas habentes, oculosq; tum inflatos, tum impudētes, atque adeo intuentes feruēt. Sint etiā latiore capite, corpore autē atq; uertē crassiori, meatūq; habeat magis ad extremū caudæ locatū: quæ nō inuoluta, sed potius cōuersa esse debet: ac deniq; tranquillū in cecidit: qua sanē re à masculo distinguitur femina,

Theriacæ consuetudine ratio.

quodq; caninos dētes habeat plures duob. Iam uerō si caudis capitibusq; amputatis, exanguia protinus, immobiliaq; ac prorsus mortua, ipsa animalia cernant, ad medicaminis cōpositionē nō conferūt. At si morū, sanguinemq; cōseruare aliquiddiū possint, tunc eas, cū præstantissimas coques ad cōficiendos trochiscos, quatenus dictū est. Porro medicamenta reliqua cōstidue, cribroq; in cernere subtilissimū oportet: nā læuia insigniter admodū mihi iuuare uidentur, quod facilius apponant corporibus. Quæ conspērgenda læuigandaq; sunt, ea uino Falerno læuigent & conspērgant. Deinde omnibus in hūc modum contritis, Hymettū mellis mediocriter coctū, libras denas adijcias. At refinam chalybunūq; scorum prius eliquata, in mortario posita ipsi medicamento immiscebis: omniaq; tandem manibus modice opobalsamo intinctis, simul atq; accuratē confundes: atq; itaq; antidotū in uitreis aut argenteis uasis repones. Non autē uelociter ipsa replebis, sed relictū quoddā spacio, quod medicamentū perspiret. Quare frequenter operculū detrahes, ut & libenus exhalet, & maturior tibi ipsius usus cōtingat. Quippe haud modico tēpore ad cōcoctionē indiget, ut quādo usus postulet, antidotum probe sit coctū. Concoquit autē plurimū duodecim annorū spacio.

Theriacam repone ratio.

Cæterū qui uigilenter ipsa uti uolunt, etiā quin to anno, septimūq; eam exhibent: præsertim iis qui à uirulentis bestijs, & à cane rabido sunt cōmoriti: necnon in medicamentis leralibus. Est autem potēs medicamentū aduulgū triginta annos. Nam in alijs affectibus, ubi tanta noxæ causa nō est, sufficere uidetur, cūm usus exigit, etiam sexagenariū. Etenim uis huius antidoti facultas est ualida, si sumatur post pharmacā purgā, eius operationē supprimi: si uerō imbecilla, minimē purgationem impedit. Iuxta differentias autem affectuum, ipsius medicamēti quantitatē metimur, congruūq; mixturā modū administramus.

Theriacam duo decem annis ad presertim ceteris. Vipera quædam venanda. Vipera quædam sunt deliquenda.

Theriacæ consuetudine ratio.

Siquidē præter affectus dictos, capitis diuturnos dolores atq; uertigines sanat, auditusq; difficultatem, & oculorū hebetudinē corrigit. Comitialibus etiam opitalatur: reiciētesq; sanguinem plurimū iuuat, si quis ipsam cum symphyro de-

Theriacæ quædam sunt deliquenda.

coctā, dilutamq; ex aqua exhibuerit. Insuper Intestinarū uermes exterminat, hepaticos & lienos reseruit, dyenterias, lenterias, uolulososq; præsertim cūm intestina uacant inflammatione, persanat. Præterea cūm corpus multis & copiosis sudoribus diffuit, ipsiusq; robur est exolutū, nec morbus uini potione admittit, theriacæ epota sudore sinit, & collapsas uires corroborat. Iam uerō in mulieribus etiam menses educit, & uteri sedibus suppressas hæmorrhoidas subinde aperit. Nam cū uaria miffa facultate sit prædicta, ideo alia diffundēs extenuansq; cogit ut excernatur: alia ob uirtutis imbecillitatē præter modum fluens, solet, uires instaurans, colubere. Quineriam uniuersis articularibus morbis auxiliō est, cūm præteritis augmenti tēpus, uigorisq; status accesserit: tunc namq; fomentis dolorē leniens, antidotū propinabis: quæ sanē fluxiones infarsctas discutiet, & irruentes arcebit. Prodest Theriacæ & sanis, si crebro ipsam assument. Hoc auxilio uis sepe succurrimus elephantiacis. Nec uerō corporis tantū, sed animi quoq; affectibus auxiliat. Quippe melancholicis uitijs, si sepe exhibeat, medetur, ipsam aram bilem ex hauriens: quare pulchre ad febrem etiam quantā cōuenit, quandoquidem ab atra bile trahit ortum. Ego igitur multos laborantes quartana, hoc præsidio facili liberavi. Nam uomitu prius secundū cibum ipsos euacuant, deinde insequēti die succū absinthij exhibēs, ita horis duabus ante accessionē propino antidotum, protinusq; eger frequenter liberat ab accessione. Aque etiā pauore, omnium morborū pessimū, qui morsos à cane rabido sepe inuadere solet, tollere hoc medicamen conficit. Quo quidē morbo correpti, aqua niment, ac propter multā ariditatem, humidi desiderio tenentur, ceterū à potu abstinent, quia mente alienati, id quod auxiliari possint, non considerant. Proinde sit, ut aqua fugientes, inarescant, & conuellantur, ob febrem qua intus urunt: miserimūq; tandem mortis genere intereāt. Cane porro furētē & rabidū, ab eo qui nihil tale perpeffus sit, faciliē dignoscere licet. Siquidē si audieris gracilem corpore, siccū, oculis inflatis, caudā demissa, spumante ore, lingua exerta, eaq; bills colore infecta, obuium quēq; inhihi, citra igratiōē cucurrisses: deinde rursus subito nolentē cōstiteris, furore quodā infans percitū, momordisse nō sibi antea præuissos: hæc iniqua si in eo sic habere intellexeris, statim rabidū esse cane intelliges. Quare uulnus ab ipso illarū longē uastius efficit, carne multo intervallo orbiculatim præcisa, ne faciliē ad cicatricem perueniat: sed foramen diu, quadraginta ut minimū diebus, patefcatur, ut per ipsum canis uirus emanet. Cauterij igitur admodū candentibus locū solemus adurere, & alij nti medicamentis, quæ extrahendi uim obtinent. Ego uerō antidoti ipsam rosacea mistam aliquando in uulnūs indidit, ut cucurbitulæ iussu exurgeret, ab alioq; uirus ipsum extraheret: ut quæ nō modo eportat, sed etiā admoda extrinsecus rabidorū moribus præsentaneū remediū existeret. Sed neq; ad pestilentē lærem (quæ & ipsa ueluti fera quædam existens, ab acribus putredine exorta, per inspirata-

Theriacæ corporis ex animo affertibus auxiliatur.

Quarta si febri curatur.

Aqua pauore omnium morborum pessima de serpente.

Cane rabidi nota.

Morsus à rabido cane contrahitur curatio.

Morsus rabidi canis affert confertissimum oportet, ut morbus quadragesima die.

Theriacæ etiam admodum uulnūs, canibus canis rabidi morsus.

Theriacæ etiam admodum uulnūs, canibus canis rabidi morsus.

tiones infillens, haud unum aut alterū hominē, sed plures quoque ciuitates depascit, uastat, & populatur) reperire est aliud efficacius remedium. Nam quemadmodū cōstat diuū illum Hippocratem, per solam alterationē aëris, disculsiſſe olim ab Athenis peſtilentē eius conſtitutionē, nimirū per totam urbem ex aromaticis lignis, & ſuauiſſimis floribus, uarijs pyris extructis, ut aër purum hoc modo reddidit, inſpirantē homines in mali ſubſidium: ſimili ratione theriace, cen ipſa

Pytholemum ab Aethiis abſeget Hippocrate per totā urbem varijs pyricis materia aromaticis exstructa.

Theriaca cen ipſa purgatorius euſit.

Mithridates praemunitus antidoto, ueneno à ueneno nō potuit, ac prouidē agnoscere diſcunt perſe eu ferre.

Theriace utendum eſſe poſſit ſolū colluſio.

Theriaci propinqua quantitas.

Theriace ſiſu quibuscumq; acribus coſtitutū in cin gnat, et quibus minime.

Theriace corpora pueris diſſoluunt.

Aurum indicari per ignem. Ferrū igne molleſcere.

ciatricem inducit corporib. Lapis Phrygius crudus acerrimus eſt: ignitus & cum alijs quibulaſdā tritus, ſit oculorū præſentaneū remedium. Spongie combuſta cinis, ſanguinis fluxionem potenter inſubit. Viperæ itaq; ſimul omnes integritate combuſtae, inſtitam præſentatē deponūt, ab igne ſalutares redduntur. Peculiariter autē ſales ceterorum maximē aſſectibus per ſummam mentem oborta, leuco, dico, lepræ, atque agreſſi impetigini: abigunt pedunculorū, propriè ex corruptione enaſcentes. Præterea dentes optime abitergant, erodij ipſos nō permittunt, ac ſtaccidas gingiuas condenſant, earumq; fluorem quem putrilaginem reprimit. Preparatio autem eorum eſt talis: Viperæ præ dictæ ſimiles, & eodem tēpote captræ, numero quatuor, nō plus biſduo poſt uenationē inſunt. Præſterit tamen ſi eodem die quo ſunt capſæ, ijs utaris. Dein ſalia ammoniaci, uel cōmunis, colore albi, & leniter ſplendentis, modius Italicus. Cum quo tunduntur minutatim, gentianæ Creticæ lib. i. s. ariſtolochia rotundæ tantundē. Centaurij tenuis comæ lib. ij. cardamomi, Armeniaci præſij, ſing. vnc. vi. Scordij mōſtans, ſelini, chamædryos Greceſq; ſing. lib. i. rutæ ſatuz feminis tantundem. Melle Attico hæc uniuertur, & ſelibra iſporum in aliquo ſicile uacuum coſſiguntur. Poſtea quatuor ſerpentes uiuæ: mox ſcilicet teneræ, admodumq; recentiores, quinq; numero, conciduntur minutim: ita reliqua aliorū pars dimidia adſcitur: atq; ubi cooperueris ollam, leuolū diligenter obleueris, quatuor foraminibus ipſam pertunderis, ut per eam uapor coctiōnis menſurā indicet. Nam primum fumus copioſus, obſcurus, turbidusq; ſpirare uidebitur, notans ignem uel inuafiſſe beſtias: quæ quidem ne inſpires ipſe, tibi ſummè ca uendū eſt. Poſtea ubi uapor ceſſauerit, et tenuem quandam flammam per foramina exhibere conſpexeris, tunc ipſa exquiſite eſſe cocta cenſeto: atq; ita ollam ab igne tollito, tota eam die ac nocte refrigerans. Deinde exproptis carbonibus, diligenter eos tundito, & cum his quæ ſubdam, incernito. Rutæ agreſſis feminis, hyſſopi Cretici, ſing. vnc. ij. agreſſis ſaniculis feminis, nardi Celticæ, ſtacyos Scythicæ, ſing. vnc. vi. petroſelini Macedonici vnc. iij. amomi uſq; vnc. iij. organi heracleotici ſummiratū vnc. j. x. hormini feminis torrefacti vnc. ij. thymi Attici ſummiratū vnc. ix. Malabathri Indici ſol. vnc. iij. baccarū iuniperi Laconici carnis lib. ij. coriandri ſatui ſem. vnc. vi. piperis albi & nigri, ſing. vnc. ij. ſilphij rad. vnc. x. zingiberis lib. ij. ſaryrj ſem. uel rad, pulegij montani, ſeſelis Maſſalioti ruſi, tortili mōſtani feminis, menthæ, ſing. vnc. vi. caliz opti mæ vnc. ij. cinnamomi vnc. i. Ruſius omnia cōrundito, cōcernitoy, & reponito in uitreis uafiſ: neq; utaris ipſis niſi poſt dies ſerē donec. Porro ego ſales ipſos alij præparauit, non uiperas, ſed earum loco tantundem theriacorū paſſilorum, unā cum alijs medicamentis comburentis: qua in diſtilla ipſos longē præſtantiſſimos feci.

Viperas combuſtas ſalutares ab igne reddet. Sales Theriaci quib. auſcultantur affligunt.

Sales Theriaci præparandi ratio.

Quæ habentur in libro de theriaca ad Pamphilium, ea omnia huius quæ ad Piſonem ſcribitur, inſunt longè emulatio. Quare illi ex indiſtilla reliquunt.

G A L E.

GALENI PERGAMENI de antidotis lib. I.

Antidoti quatuor
sunt.

Antidotorum
tres differentie.

Theriace, Me-
thridation ab
vino capiat.

Antidotes dum
postulantur di-
tior, liberalius
esse exhibendas
quam si prelo
necesse sit.

Methridates co-
muniu antidoti
in a. perimere se
veniens sua pa-
tuit.

Antidoti im-
perat singulis
diebus vino a-
ntidoti, in
saccharo, in
sa.

Antidoti vici-
tiora, papaveris
lactis, yonis
longi uisum
possident.

Calceum medi-
camentorum con-
suetudinis di-
tior, variis per-
fusa, in
vino.

Medicamenta
explorandi ra-
tione.

Mal optimum
quale nam esse
debeat.

Vina que retem-
rent avari in-
necessarios.

Medicamenta que non extrinsecus
corpori imponitur, sed intra ipsum
assumpta, affectibus auxiliant, an-
tidotis Medicis appellantur. Tres autem
in uniuersum differentie ipsa-
rum existunt. Nonnullæ siquidem leralium
medicamentorum gratia offeruntur: quedam cõtra ui-
rulentas feras opulenter: alij affectibus ex praua
uictus ratione obortus succurrunt. Sunt que tres
hosce pollicantur usus, ut theriace ab Andromachio
preparata, quæ Methridation dictam ab usu
hominum relegauit. Si quidem cum theriace haud
exiguâ uiperarum carnẽ cõtineat, hoc nomine ad
uiperarum morius præstator quæ Methridation existit.
Ad alia uerò Methridation nihilominus ua-
let: imò est etiã in quibus præstans se exhibeat.

At nõ easdem vires obtinent ipsæ antidoti, & post
noxia medicamenta, & ante easdẽ assumpta. Nam
que ipsarum quantitas, quæ in presuntum, fuscitur ut
hominem illarum custodiat, ea quadruplo, aut
quincuplo aucta, cum post uenenũ datur, auxi-
lio est: id quod non semel quotidie, sed bis. Quod si
quis etiã singulis diebus, quemadmodum nostro
seculo Imperator Aurelius Antoninus, uel ut ipse
Methridates, medicamentum capiat, omnino id
deterius uenenis erit securus: ut Methridates fe-
runt, cum exitiali hausto medicamento, potius
mortẽ oppetere, quàm subijci Romano Imperio, ele-
gister, nihil reperire quod perimere ipsum potue-
rit. Porro Antoninus summò studio singulis die-
bus ex ipsa theriace, mista sabs Egyptiæ, deglu-
tiebat citra ullum liquorẽ: id qua postea, cum in
quodotidianis actionibus premeretur fopore, de-
tractus papaueris succũ. Rursus autẽ cum crucia-
retur uigiliis, coactus fuit ex theriace inueterata,
ceterum ex opio confecta, aliaque aurulũ adde-
re. Quippe eiusmodi medicamenta, si uetustiora
sint, ipsam papaueris lactrymam longẽ maiore
obtinent. Danda autẽ maxime opaci erit, ut me-
dicamenta ex quibus huiusmodi antidoti præ-
parantur, quæploratissima sint: quandoquidem
passim solent adulterari. Que quidem ut ex qui-
ntissima habet, ipse inuasi alia rum Cypri, rum
Palesinũ Syriæ: nauagath in Lemnũ. Porro id in
quo singula medicamenta alijs gustu aut odore
præstât, in illo sanẽ, id quod ualidũ est, principẽ
inter similia specie, sibi uendicat locũ. Sic enim
mel dicimus præstantissimũ esse, quod dulcissi-
mum & acerrimũ inter omnia alia fuerit: quod
color pallidum, media sit cõsistentia, destitutus
sensum, suam cõtinuitatem teneat. Danda autẽ
opera est, ut quod uinũ hĩc medicamento mi-
scetur, ualidũ atq; firmissimũ sit, ita ut nõ immu-
retur amplius. Erenim imbecillima & aquatissi-
ma uina, aut uehementer autem, maximeq; om-
nium uinorũ aciescentia (hęc sunt alba & re-
nuia) ubi præuenierint primis annis aciescere, reli-
quo tempore permant. Hęc autẽ ut caput mini-
me sentiat, sic nec corpus manifeste calciauit, nec
cõcoctioni in uentriculo & uenia quicquid perspicuo
conferat, nec alendo corpori subministrat: quia
inter omnia uina celerissime inueterent, hoc est,

prompte in ueterascentiã qualitatẽ mutantur:
que qualitas, acrimonia est cum perspicuo calo-
re: postea uerò, amaror, in quem acrimonia mu-
tatur. Ceterũ ut una ipsa uel acorem, uel amar-
tudinẽ cõterat, locus in quo assuerunt reposita
cõfert. Qui quidẽ optimus initio est frigidus: po-
stea uerò calidus: aut e contrario, calidus per uir-
tutem. Nam repidus, facili ipsa in acorẽ uertit. Nã-
nulla autem sunt quæ adeo imbecilla & aquosa, ut ne
inino quidẽ frigus tolerant. Ac talis custodiendi-
dorum grana, Pater meus stube copiosa calidatq;
in calidissimã domũ cõiecta, uasa repleta occul-
tabat: quæ industria uis, nunq; habuit acidũ ui-
num, sed celerissime omnia ueterascentia. Quò au-
tem nunq; ab scopo aberraret, uas infundebat
uinũ nõ nouis, sed ex quibus aliquod iam uetus
uacuasset: curabatq; ut furni, foculi in propin-
quũ ipsi thece uinaris essent: qua ratione etiã in
multis Italis locis uinũ calfieri intellexi. Verũ
que in hunc modũ parant uina, ut firma durabi-
liaq; sint, sic capitis dolore cõducant, propter fu-
mi qualitatẽ quam cõterantur. Itaq; eiusmodi
omnia uina in medicamentis cõponendis, que
intra corpus sumenda sunt, euitabis. Inempla-
stris uerò, & alijs que extrinsecus imponunt me-
dicamenta, etiã talibus un, si meliora desint, nihil
prohibet. Ad antidotos ergo Falernũ uinum, quod
nõdum præ uetustate amaret, optimũ est. Præ-
stat autẽ ad theriacem deligere id quod dulcissimum
sit, grana quibus gratior: cuius sollicitudo in
medicamentis quo deglutiuntur, habenda est. Iam
uerò mel omne uetustũ, redditur ex cõcoctione a-
marum: neq; id mirũ est, cum uel citra cõcoctũ,
tempore amariũ ex dulciori reddat. Quare quidẽ
fuerit in ueteratũ, fugiendũ ad antidoto est. In
uiuierum autẽ, Medicũ debere esse peritũ omni-
um stirpium, aut plurimarũ, oportet. Si quidem
cõpositiorũ medicaminũ uirtus, uires simplicium
sequitur, exigua quadam in ipsa cõposituræ ra-
tione differentia obuenerit. Differentiæ autem
stirpium sunt, arbores, frutices, herbe, spinæ, uel
gulta. Porro theriace cõposito quam delictiscript
carmine Andromachus, habet in hunc modum.

Hinc rectius Galenus carmina Andromachi, ac de in-
ceps nutritionem conficiende Theriace explicat: que om-
nia consilio reliquimus, quod sint prorsus eadem que
habentur in cõmentario ad Pisonẽ. Itaq; ea teniũ anno
tabimini in presensurum, quorum in illo non meministi.

GALENVS.

Quod pertinet ad uiperarum capturas, neq; iux-
ta marina loca, aut aquas saluginosas uenan-
dæ sunt. Quippe antidoti ex huiusmodi com-
positu uiperis, sitim conciliat. A sitis etiã est ab-
stinendũ. Iam uerò, dum coquantur, salis inijci
debet, si quidẽ conuenienti tempore uiperas ce-
peris, modicũ uinum autem uisat, nihil. Panis ad
cõficiendos artíficos soleo miscere ipse uiperis
carnibus quartam aut quintam partem. Qui ni-
si probẽ sit totius, ut erudum est ne pharmacum
ipsum acceat. Sanius autem est ut multo citius
siccentur, aridum panem cum ipsa carnibus ac-
curatissime leuigare, ac sic tenues orbiculos sin

HH 2

Venerascentium
morum quali-
tas est acrimo-
nia cum perspi-
cua calore, cui
postea succedit
amaror.

Venerascentiã
uini in acorem
uertit.

Stube tendens
re ad citri cõ-
coctionẽ uenit.

Vina que ma-
turentur præ-
dicta, ut in acorem
debeat, cito
debeat.

Vina que ma-
turentur præ-
dicta, ut in acorem
debeat, cito
debeat.

Mel uetustum
ex cõcoctione ama-
rum, ad quod
tempore uel ci-
tra cõcoctũ pro-
prietat.

Compositum
uinum, uires
plurimorum
sequitur.

Stirpium differen-
tia quatuor.

Viperas uenan-
das.

Antidoti Theria-
ce cõficiendi ra-
tio.

Vasa vitrea vel
auria vultu do-
lora admittunt.
Namque autem
adulterari plū-
bi mīstura, ac
grande obliquo
soluuntur tunc
Oro.

gere, quam si etiam brodium uiperarum affun-
das. Reponi autē debent ubi asficcari fuerint, in
uasē itanneo, uirē eōre, aut aureo. Ceterū uitreū
quidem & aureum, nullum dolum admittit: itan-
neum uerō adulterat plumbi mīstura. Tale igitur
uitare cōuenit in uniuersis antidotis: ueluti
& quod argenteo nō purgato confectū est. Celer
rimē nanq; & huic strugo oboritur. Durat uigor
ipsoꝝ orbiculorū, si curiose licet resiccat, & re-
positi, tribus & quatuor annis. At scillini tro-
chisci, ex tribus scillae optimē totae partibus, &
duab. tenuissimae farinae etui, similiter cōficiunt.

Post haec subdit Galenus descriptionem magna-
tis Hedyotri, quem habet in commentario de Theria-
ca ad Pisonem.

G A L E N U S.

Ex medicamentis quae theriacae cōstruunt,
longum piper solet adulterari. Ceterūm adolte-
ratum quidem, assuā aqua soluitur: quod nerō
adulterio caret, insolubile permanet. Contrā au-
tem, uerum sagapenum statim aqua rigatum sol-
uitur: quod nō tale est, eliquetis minimē. Scien-
dum autem est, chalbani partem in sagapenum
degenerare. Similiter etiam optima calia in cin-
namomum transit. Nec fecus in optima myrrha
opocalpasen reperitur, ab ipsa myrrha diuer-
sum. At opocalpasen est letale: multisq; ob infici-
tiam myrrhae, quae opocalpasen continebat, cō-
clusū exitum. Nam de industria nonnulli anti-
dotum preparantium, ipsam ut laudatissimam
inuerunt: quod colligunt in idram, optimū esse
medicamentum uidentur. Quemadmodū igitur
in pueris gemellis inuicē similibus, qui quidem
non eis alluuntur, alterum ab altero neque
discernere: nō autem qui unū uixerunt, facillima
est ipsorum dignotio: ita qui inter singula me-
dicamenta est uersatus, facile uel minimas eorū
differētias cognoscit: quae latent illos, qui ipsa
semel tantū aut bis cōspexerint. Rosae ad the-
riacae eligēda sunt alijs omnibus rubentiores,
atq; odoratae magis. Vnūquodq; siquidem pra-
stantissimū est, quod proprium generis sui odo-
rem ualentissimum possidet. Prastant etiam in
quolibet genere, nō rugosa, neq; exilia, sed quae
probe nutritam, solidamq; cōsistentiam fortius-
tur. Scordium optimum, ex Creta nobis adue-
hitur: quod quidem cadauera super ipsū iacen-
tia, diutissime tueri at putredine proditur. Opo-
balsamū adulteratur plurimis modis, quos pre-
mo, ne quis fortē doctrina mea abutatur. Quare
neq; eos probō, qui scripturas letalium medica-
mentorū inuulgant. Porro cinnamomū optimū
debet odoratissimū esse, gustanti calidū: colore
autē tale, ut si quis lactis colorē suisq; admiscer-
it, cum cortule paulillo. At gargicū (quod sanē
adulteratū nullū admittit) laudatissimū est, quod
leuissimū ut densum, graue, & hgnosum, deter-
rimus. Crocus optimus est, qui flauissimus, o-
doratissimusq; existens, longo tempore in uigo-
re perdurat. Lān uerō in cinnamomi penuria,
duplicata calae portio inuenienda est. Carpesio
etiam saepe loco piperi utimur: est enim similis ge-
nere cum eo facultatis, sed ualentioris, nōnihilq;
odoratum refert. Sunt enim tenues scissurae, sur-

culis cinnamomi perfimiles. Nardus Indica,
quae radix quidem est (licet ob similitudinē for-
mae quā cum spica habet, spica nardi uocet) nō
est emenda flora. Vnguentarij quippe, coquētes
prius eam, ut ad alia ipsius decoctio utantur, pos-
tea inutilēm uendūt. Rheon quoq; ipsū adul-
teratur. Quandoquidē statim in regionibus ubi
gignitur, recens nonnulli capientes ipsū, deco-
quant, donec totum cremorē reddat: quem po-
stea cremorē, ubi accuratus percoctetur, ceu pu-
rum, atq; ab aquae mīstura alienū, ad nos trans-
mittunt: sicut & rheon ipsū fīccat, tanq; neg
id prius cocturam fuerit expertū. Cognoscitur
tamē facile dolus: nam eiusmodi rheon nec den-
sam, compactissimā substantiam possidet, ut qd
integrū est, sed rarius apparet, strictiorisq; aut
obscurā, aut planē nullam gustanti exhibet: quā
tamen rheon uigens ualidissimam possidet.

Spica nardi ra-
dix est, sed ob si-
militudinē quā
cum spica habet
sic appellatur.

Rheon adul-
teratū molles.

Rheon esse uolū
mentis adstima-
gens galenus.

Deinceps Galenus modum preparandae Theriacae
tradit: qui quidem iam expōsitū est in cōmentario ad
Pisonem. Subiungit etiam compositiones eiusdem anti-
doti, à Damocrate, atque etiam Critone proditae: quas
quidem (quae descriptionem Andromachi amicē com-
mendat Galenus, rig. esse inberendum censet) studiose
breuitatis omittimus.

G A L E N I P E R G A M E N I de antidotū lib. II.

Quandoquidē de Theriacae toto priore li-
bro tractauimus, in praesenti de ceteris an-
tidotis differamus, ab ijs quae Androma-
chus descripsit, exorī.

Antidotus Mithridatica, ad letalia peculiariter
efficax, ad omnesq; internos afflatus. Dulcis
radiculae drach. viij. s. obolos iij. opij drach. iij.
obol. ij. castorei drach. vi. polij drach. v. obol. ij.
costi tantundē. Spicae nardi drach. vi. obol. ij. ca-
lix drac. v. obol. ij. thuris drac. vi. sefeleos drac.
v. obol. ij. hypocistidis succi drac. vi. acori drac.
ij. scordij drach. vi. obol. ij. foij drach. iij. calae
drach. vi. cyphoeos drach. vi. obolos ij. myrrhae
drach. vi. croci drac. vij. obol. ij. cinnamomi tan-
tundem: styracis drac. v. obol. iij. dauci feminis
drac. v. obol. iij. zingiberis drac. vi. obol. ij. plu-
Ponici drach. ij. petroselinī drach. iij. obol. iij.
nardi Gallicae, sceniculi feminis, nardi Indicae, sin-
gul. drach. iij. hyperici, acaciae, uerisq; drach. ij.
gentianae drach. iij. anisi drach. iij. Thlaspi drac.
vi. obol. iij. men. aethanici drach. iij. rosarū
ficcarum, cardamomi, singul. drach. iij. gummi
drach. ij. iunci odorati rotundi drach. vi. obol. ij.
opopanae tantundem: opobalsami drach. vi.
obol. iij. chalbani drach. vij. scinci drac. ij. obol.
ij. resinae terebinthinae drac. vi. obol. ij. uini Chij
quod sit sans mellis Attici cocti quantum sat es-
se uideatur. Confectio.

Antidotus Aetij Gaij, ad letalia & uirulenta
omnia: quae si inspergatur ubi frequentanti ser-
pentes, eos fugat. Facit ad omnē oculorū fluxū,
& reliquarū parium. Discunt omnes molestias
animi, febresq; longas & circūta repetētes per-
sunt. Ad haec, menies, fatusq; abfcoq; disculitate
educit, auxiliaturq; plethificis, auellans uacis m-
itar epo-

Antidotus Mithri-
datis descriptio

Praestantissimū
esset medicamen-
tum quod pro-
prio generi sui
odori naturae
muni possidet.
Scordium calae-
ra incorrupta
interior.

Letalium medi-
camentorum do-
lorum inuol-
gationem nō effi-
citur. Cinnamomi o-
ptimi nota.
Agarici optimi
nota.
Crocus optimus
nota.

Carpesio facili-
tas.

flar epota, cum aq̄is cyathis quaternis. Ad uiperos ramen morius, ex uino exhibetur. Myrrh drach. xij. croci, nardi, utriusq̄ drach. xij. iun ci odorati rotundi drach. xij. cinnamomi drach. ij. amomi drach. iij. chalban drach. ix. resinæ re rebinthinæ drach. v. piperis albi drach. x. longi drach. xxxij. costi, thuris drach. xij. lachrymæ papaueris rautundē: scordij drach. l. polij drach. iij. hypocistidis succi drach. xij. petroselin drach. viij. selesii drach. xij. dauci seminis drach. xvi. opobalsami drach. xij. opopanaxis rautundē: calthorei drach. viij. mellis Artico sextar. ij. Conficito.

Damocratis Antidotus ex sanguinibus, ad uenenā.

Sanguinis asinini, & marinæ testudinis, & anans, & herodini, scicori omniū, sing. drach. ij. Myrrhæ stillantiz, spicis nardi, sing. drach. x. cinnamomi drach. vi. rosę fol. sic. drach. viij. iun ci rotundi, thuris, costi, sing. drach. i. amomi, piperis albi, utriusq̄ drach. iij. piperis longi drach. l. s. croci drach. xij. caliz drach. l. viij. trifolij radicis drach. v. polij rautundē: opobalsami drach. iij. petroselin drach. iij. baccarū iuniperi, acori, rheu pontici, meui, discilini, phu, ammoniaci rhy miamatis, feniculi, sing. drach. ij. agari drach. ij. s. saxanlis rute drach. iij. dauci drach. ij. auzi, asari, ameos, cumini, sing. drach. s. s. sem. napi iylue stris drach. ij. scordij Cretensis drach. v. mellis optimi dupliū omniū. Detritis omnia, coctioij melle ex cepta, uasis indito.

Rosaceti passilli confectio ex Damocrate.

Rosę uirentis foliorum lib. iij. iun ci rotundi drach. xx. myrrhæ drach. xij. croci drach. viij. Cōtulis rosę aq̄is per fetacum transmissis, addantur reliqua cōminuta: ac postea rursus simul tuu dantur, rediganturq̄ in pragredans orbiculos.

Crococarnagmati preparatio.

Croci Calicij drach. c. myrrhæ pinguis, rosarū siccarū, amyli, gummi, sing. drach. l. Omnia uino odorato, marinæ aq̄is ex parte, excipiantur & laeuigentur, ac deniq̄ in trochiscos singantur.

Antidotus Præfagiens nomine: quā cibibā, uenenū cum cibo sumptum, prorsus reddet uominu. Lemniz terre drach. i. obol. ij. baccarum iuniperi drach. ij. laeuigentur ex aq̄e cum olei dul cis paxillio. Propinaiur ex mulla, nucis ponticæ magnitudo.

Asclepiadis, ad eos qui letalia biberunt, remedia.

Papaueris lachryma epota, cōfert mouere uomitū ex hydrelzo calente, uel ex oxycrato calido, aliumq̄ clysmi subducere. Opio epotto, me rum copiosius statim bibitū iuat: aut piper cū uino. Conducit etiam lac asininū haustum: atq̄ clysmi minores. Sumpto aconito, iuat manipulum rutæ, laeuigatū uino meraciori, ebibere. Si altercum nocuit, lac asininū, uel quoduis aliud, cū mulla calida opitulā. Si uiride coriandrum, auxiliat uini meraci potū, & pingue ius gallinarum. Lepore marino assumpto prodest lac asininū bibere sin miuus, uacuinū, aut caprilum. Si roxiu potum fit, uinum dulce adiuuat, oleum rosacū, sanguis caprilus, semetiq̄ napi contritum ex uino. Quibus fungi obfunt, dari

debet raphani crudi q̄plurimi: item uini meracum, & cineris sarmentarū lixiuū: præterea nitrum aceto dilutum, aut fax uini cōbusta, tria q̄ cum aqua: aut absinthium ex aceto, aut denique ruta ex aceto trita exhibetur. Si lixia fuerit ingesta, succurrat abluuium potum cum uino, calioreo, & ruta. Proderit & oxymeli potare, & homi tiones ciere. Buprestis assumpto, passii plurimi potus, ac dein uomitus opitulatur: necnō lac ca lidum bibitum, decoctumq̄ ficum in potu da tum. Si cantharides haustæ sint, conducit pas sum ex oleo bibere, plurimumq̄ etiā lactis hau riere, & plures nucleos pini esse aut cantharidum alas, pedesq̄ cum melle detritos lactu assumere. Pilothro lausto, prodest calēs olei potio, & uomin o excirata: necnō lac caprillū, & maluz coctæ succus, si cum oleo hauriatur. Spuma ar genti pota, auxiliatur piper, apii, myrrhā, cum uino laeuigata, biberatq̄. Gypso ingesto, dari de bet potu, cineris sarmentarū lixiuū, & rhy mus ex aqua tritus. Lactē in grumos coactū, iuat aceti potio. Item coagulum ex aqua fontana bi bium. Vel sulfuris, sulphurij æqualis portio, laeu gata ex posca, biberatq̄. Hurudinē deuorati, aliq̄ muriz, aliq̄ muis, aliq̄ aceti potu expellere restat.

Asclepiades spongiam teneram frigida umbra tam faucibus demittere iubet, ut hiru do spōge infixa extrahat. Qui cerussam hauerint, ius con fert olei calidi potus, uomitusq̄: necnon lactis asinini haustus. Cū autē ignorat spectes dele teriorū quæ aut comesta, aut bibis sunt, aquam asiam calidā cum oleo propinare conuenit, ad uomitusq̄ incitare. Vile etenim fuerit, & circum cidere somnum, subcriptisq̄ cōfectionibus uti.

Apollon pharmacum præserua tiuum uenenū.

Rutæ folia xx. nuces iuglādes ij. salis grumus unus, caricæ duæ. Offerant simul lixiuū stoma cho: noxiū quippe ad letalibus prohibet. Aliud. Baccarū iuniperi drach. ij. lemnij sigilli drach. ij. & obol. ij. trita ex ceptisq̄ oleo reposito. Porrigi tur ex hydromeli te instar auellanz eorus. Hæc an tidotus Nicomedes rex uestaf, si quando eum qui inuitassent ipsū, habebat fidem suspectā.

Antidotus Mituridatis, Athanasia dicta, ad le talia medicamēta, & cuiuslibet uirulenti ic tum. Auxiliatur etiam uentriculo, in quo cibus acce scit necnon sanguinē spuennbus, diuturna tussi infectatis, ac breuiter iecorarijs & lienosis, uesti cæq̄ & uteri affectibus. Piperis albi grana xl. costi, meui, asari, acori, dauci Cretici seminis, petroselin, uardi Indicz, lapidis Nestonis, sing. drach. iij. croci, thuris, sing. drach. viij. cinnamomi, caliz, sing. drach. xij. mellis Arici coctū quod sit satis. Datur nucis auellanz magnitudi ne, ex mullo temperato.

Antidotus Zopyria uocata, ad prædicta o mnia, ad aliosq̄ affectus efficacissima.

Opobalsami drach. iij. nardi Indicz, myrrhæ Troglodyticę, iun ci rotundi floris, cinnamomi, characij, costi recentis, piperis longi, hypocisti dis, polij, piperis Perranci, scordij, meui Cretici, cardamomi, sing. drach. iij. thuris masculi, car pobalsami, discitami, sing. drach. vi. petroselin, caliz rubentis, singul. drach. viij. croci Corycij

HH 3

Antidotus ex sanguinib. à Damocrate scriptus

Rosaceti passilli confectio ex Damocrate

Crococarnagmati preparatio

Antidotus quod præfagiens nomine

Remedia ab Asclepiade scripta ad eos qui letalia biberunt.

Antidotus Apol longi à veneno præparatus.

Athanasia Mi turidatis.

Antidotus Zopy rici.

drach. viij. mellis Attici quod sit satis. Datur nu-
ciuellanz instar, si febris abest, ex uino: febrilen-
tibus, ex hydromelate.

Mithridatis Theriaca, qua rex Mithridates ut-
tebatur perpetuo, ut se a letali ueneno affereret.
Cum itaq; a Romanis caprus esset, nec his epo-
to ueneno mori posset, gladio sibi ipsi mortē in-
tulit. Confectio ipsius secundum Andromachū

Mithridatis ro-
gu. heriaca, quod
fraxinatum, cum
passis veneno
extingui nō pos-
set. Sic gladio
percutit.

habet in hunc modum. Pastillorum scillinorū
drach. xlvij. pastillorū theriacorū, piperia nigri,
hedychroi magnani, lachrymæ papaueria ni-
grī, sing. drach. xxij. rofarum siccarum, iunci ro-
tundi odorati florib. polij, ciconiā, seminis napi,
iridia Elyricæ, agarici, cinnamomi, dulcis radicu-
læ succi, opoballami, sing. drach. xij. rotis mari-
ni drac. viij. myrrhæ, croci, zingiberis, rheu pon-
tici, quinquefolij radicia, nepiræ montanæ, mar-
rubij, petroselinī, stachados, costi, piperia albi,
thuris, sing. drach. i. obol. ij. casij nigri drac. iij.
piperis nigri drach. i. longi rautandem: meui, aīa
ri, acori, dauci seminis, aniserini sanguinis ficci, a-
nana sanguina, sing. drach. iij. Excipiuntur mel
le Attico, & coctio.

Theriaca Aetij admodum efficax.

Theriaca Aetij.

Bryoniae radicia drac. xvi. trifolij semina, opo-
panacis, sing. drac. viij. aristolochiæ tenuia drac.
xij. rotia marini radicia, iris Elyricæ, zingiberis,
opij, sing. drach. viij. rutæ syluestriae seminis drac.
xij. cumini Aethiopiici drac. xvi. myrrhæ, casij, ca-
stori, scelis, caryogij radicia, ferpylla, lachrymæ
Cyrenaicæ, sing. drach. vi. Medice drach. xij. sa-
gapeni drach. vi. croci drach. v. erui farinæ drac.
xxij. Finguntur pastilli ex aqua triobolates,
danturq; cum uino.

Theriaca Eucli-
da.

Theriaca Euclidis, ad internos dolores, aspi-
dum morbus, pleuritidesq; & quartanā febrem,
si post uomitum, instar auellanz nucia sumatur.
Castorei drach. vi. opopanax, sagapeni, scelis,
cachryos, chamedryos, chamepitys, marru-
bij, sing. drach. xvi. styracia, butamina Iudæici,
myrrhæ, singul. drach. viij. lachrymæ papaueria
drach. viij. mellis lib. i. Conficito.

Alia ad febres omnes repentes per cir-
cuitu, Harpalo auctore.

Myrrhæ drach. iij. piperia longi uel albi, opij,
sing. drach. ij. castorei obol. iij. s. cardamomi drac.
iij. sagapeni drach. ij. Trisa cum aqua io pastil-
los cogitur, qui oboloz duos pendeant. Propi-
nentur singuli cum cyathis duobus Adriani ui-
ni, & aquæ fontanæ coctæ, quaternis. Si febris
urgeat, cum hydromelate.

Potio Cratippi ad morbus rabidi canis.

Morsus rabidi
canis potio Cra-
tippi.

Cancrorum uisum drac. xx. myrrhæ drac.
ij. croci drach. i. s. gentianæ drach. i. piperia al-
bi grana x. uini quod ad excipiendā sit satis. Da-
tur drachma una, cū uini cyathis tribus reperi.

Candidum Ba-
phulli.

Album emplastrum Baphulli, quod rabido-
rum moribus commodissime extrinsecus admo-
uetur: daturq; etiam catapotia ex eo nucia au-
ellanz instar, ad dies xi. Est autem alterna diebus
amouendū a uulnere, ac rursus, ubi elueris sor-
des, imponendū. Ceræ ponitæ lib. ij. spumæ ar-
genti, cerussæ, sing. lib. olei ueteris sextarii: myr-
rhæ, medullæ ceruinæ, utriusq; drach. ij. thuris
drachma, Argenti spuma oleo coquitur, & cum

mutata fuerit, cerussa inspergitur, ac cera misce-
tur. Vbi tam spissum euaserit, ut manus non infi-
ciat, ab igne sublatō, medullam, myrrham, &
thura inq; cito.

Diophranti medicamentū, ad scorpionum
ictus, & phalangiorum morsus.

Aristolochæ drach. iij. piperis drach. ij. opij
drach. i. pyrethri drach. iij. Finguntur pastilli sa-
tis Aegyptiæ magnitudine, denturq; duo deglu-
tiendi, & uini meraci cyathū duo.

Diophranti me-
dicamentum ad
scorpionis pla-
gangium ictus.

Aliud ad periculosos scorpionū &
phalangiorum ictus.

Rutæ syluestriae seminis, erucæ semina, pyre-
thri, styracis, sulfuris uini, sing. drach. vi. castorei
drach. ij. Excipito testudinis sanguine, ac ternos
obolos ex meraco uino exhibeto.

Aliud ad eadem morbum, conferena
etiam parturientibus ægrī.

Myrrhæ, castorei, styracia, singulæ drachmæ.
Opj drach. ij. chalbani drach. iij. Aq; seminis a-
cerabulū. Anisi rautandē. Piperia grana xxx. Fingi-
tur ex uino, daturq; drach. una, ex uini hemina.

Parturientibus
ægrī, medicamē-
tum.

Epitrema ad phalangiorū ictus, & omnia ser-
pentis: quod etiā in portu auxiliatur. Sulfuris
uini, chalbani, utriusq; denarij iij. Liqoris Leby-
ci, nucū auellanarū purgararū sing. drac. ij. uino
dissoluta, & melle excepta imponitur. Ad ui-
perarum morsus optimum pharmacū ab Apo-
lodoro compositū. Cumini syluestriae seminis
acerabulū: redudinis maris sanguis drac. iij.
coaguli hinnuli, uel leporni, drach. ij. liordini
sanguinis drach. iij. Omnia mista, uinoq; opti-
mo excepta, reponito: atq; oliuæ magnitudinē,
ex uini optimi cyatho dimidio, dum usus pos-
sibilis, porrigito. Herz antidotus, qua Marcus
Cathegetes est usus. Trifolij butuminosi semina,
aristolochiæ rotundæ, rutæ syluestriae, erei in
solari, sing. drach. vi. Vini excipient, suntq; pas-
tilli drach. iij. daturq; unuz ex uino & oleo.

Uiperarum mor-
sus pharmacū

Apollodori
pharmacū.

Alia ad letalia, iccinorosa, inflationes nen-
tritis, & incipientes aquæ subter cutē suffusione
efficacissima. Myrrhæ drach. v. nardi Syriacæ
drach. v. s. iunci rotundi florib. drach. ij. s. casij
drac. iij. cinnamomi drac. iij. piperis albi sciqui-
drach. h. thuria drachma & obolus: costi drachma.
Excipiuntur Attico melle, fingunturq; nucis au-
ellanz instar, ac dantur ex mulso uel aqua.

F I N I S.

Complura alia ad eisdem affectus, ex diversis au-
toribus congerit Galenus in media. Nos uero ex omni-
bus ea in tuam gratiam, Candide Lector, elegimus, quæ
et præstantissima uidebantur, et facillime perari pos-
sunt. Habes itaq; omnes commentarios Galeni, in com-
pendium encheiridionq; redactos, excepto forte uno uel
altero, ex quibus nihil succi exprimi potuit. Nam quod
perinet ad commentaria in Hippocratem, quicquid in
eis continetur cremoris (nisi fallat decerta consiliū
istum hoc interpretari) hoc est, ueneris sententia, in-
stat iudicij atq; alphabeti digestas, breui in lucem cede-
mus. Tum igitur est, illis bene precari, qui in hoc sunt
toti, ut tuis commodis seruiant, recteq;
tuis studiis consulant.

HOZ, CANONICVM SECOCIENSEM, SCRIPTOREM APOSTOLICVM, AC
bonarum literarum cultorem maximum, Andreæ Lacunæ Secociensis, Militis S. Petri,
de ponderibus & mensuris medicinalibus commentarius.



Etus promeritum, & quamuerisimum est, mi Gaspar, Vir ornatissime, optimam esse
mensuram in rebus omnibus: cum nimirum omnia quæ in Vita & sunt & geruntur, ab
eâ suam absolutionem, suam lucem, suumq; ornamentum sortiantur: nihilq; iustum, re-
ctum, aut inculpabile sit, quod mensura (quæ sola Virtus inest omnibus rebus) destituatur.
Quamobrem si exquisitè expendamus singula, quæ cælesti illa machina ambiuntur, quæq; supra
caelos cõsistunt, omnia certè inueniemus ex ætætam quandam mensuram, commoderationemq; à suo
conditore accepisse, quam perpetuò tuerentur, dum natura leges non transgrediuntur. Quippe in-
finites illæ orbium cælestium lationes, perennes astrorum cursus, ordinata vicissitudines temporum, con-
spirationes elementorum, generationes deniq; omnium quæ supra terram & subter illam sunt, non
aliunde quàm à symmetria quadam, quæ in accurata partium mensura consistit, proficiuntur. Iam
verò, quod sanatus quidè corporum, aliud sit nihil, quàm debita & absoluta mensura eorum ex quibus
constantur: morbus autem, ab hac symmetria recessus quidam & lapsus, quis ambigit? Nemini etiam
est dubium, decreta & leges Reip. mensuras quasdam existere, quæ singulis suum ius dispensant. Vt
autem ipsius mensura summam efficaciam & vim, exemplo familiarissimo exponam, poemata op-
timis documentis & sententiis exculta, si metro claudicent, hoc est, mensura non consentient, cõfessum
stomachum mouent, naufragamq; & fastidium gignunt. Contrà verò, quæ symmetria existunt, etiam si
pudicitia offendant, moresq; inuentum corruptant, magnificè ab omnibus celebrantur: tantum au-
toritati vendicare sibi videtur emmetron. Ceterum cum in alijs omnibus humanis actionibus, si re
flecti perfi debeant, mensura quadam exquisita desideretur, tum vel maximè in arte Medica ea ipsa
requiritur: ut in qua, vel minima à pondere ac mensura aberratio, soleat semper ægri perniciofa &
piacularis existere. Nam cum generatio nostra, incolumitasq; miscella quatuor elementorum debeat
certa quadam mensura confluentiu & conspirantiu in unam eandemq; temperies, sanè si quan-
do rhythmus huius soluatur, necessum est ad recuperandum habitum pristinum, reducamur, in ista
etiam, exploratissimamq; mensuram eius, quod lapsum corrigere possit, administrata. Quæ neglecta, si
quis prius admoliatur præsidia corpori, morbi seminarium auget, aut affectum alium maligniorem
inducet: ita ut non minus cauendum à tali medico sit, quàm à morbo ipso. Cum igitur inter alia Gale-
ni opera, redressissem nuper in succentratam periochem commentarios illos de compositione medicamen-
torum 171. 172. & 173. tenens, distissimos natura humane thesauros: per sua sumamq; haberem, nentiquam
ex eorum lectiõne percepturos aliquid frugis, qui in ratione ponderum & mensurarum non essent ad-
amissum exercitati: sed potius occasione captuos, quæ sibi ignominie notam, ægri conciliarent sum-
mam intericionem: precium operæ meæ facturum existimaui, si quæ veteribus, ac præcipue Galeno,
circa pondera & mensuras medicinales conscripta sunt, agerens, ea omnia paucis expofita, sub præ-
fatione nominis tui, in publicam studiorum comoditatem ederem: ut vel ex hoc argumento, ami-
citiæ nostræ, & nunquam peritura necessitudo, omnibus innotesceret: tibi autem, si qui hinc fructus
ab aliquo hauriendus esset, prorsus acceptus ferretur. Nec verò collectanea hæc de mensuris cuiquid
aptius quàm tibi nuncupari potuissent, qui (ut ceteras ingenuissimas tui animi dotes impræsentiarum
subtraciam) diu noctuq; astronomicis studiis indulgens, in enigmæ felices tuas horulas haud officitèr col-
locans, non modò plagas has inferiores, sed caelos etiam ipsos metiris, menteq; supra illos eueheris: con-
tra quàm faciunt pleriq; alij, qui ubi semel quæ pertinent ad cutem curandam sunt nacti, adeò inge-
nuarum artium, proinde obruti, demersiq; cæno iuaru cupiditatu, corporisq; mole depressi, eam quo-
cunq; tandem irruat, sequantur: tantum abest (ut exemplo tui) cælum inquam suspicerent, aut in
meditatione reru pulcherrimarum a iuinis suis cogitationes exerceant. Esi tamen mancipia vmbilici
sunt: à quorum ingenio tam abes ipse, quàm qui longissimè. Quippe ita ut reru fortune bonis, quæ tuo
marie acquisita, tibi quamlargissimè suppetunt, ut eorū quidè quæ ex visu sunt, nihil desit corpuscu-
lo, amicisq; omnia communia hant: animus autè ipse minimè ab eis præpediatur, sed ad altiora aspi-
rans, excolatur atq; locupletetur alijs ornamentis & opibus, quæ tantò illis splendidiore & augustio-
res sunt, quantò mens nostra corpori dignitate antecellit. Quo sanè tam admirabili amore sapientia

accensus, etsi fluctibus negociorum nunquam non obruatur, quæ maxima cum dexteritate administras: semper tamen philosophia studiis incumbis, in eisq; tam feliciter promoues, ut diuinum istud ingenium tuum sepe numero admirari compellar. Ne autem huic nostro commentariolo contingat, quod patria viri q; nostrum communi Scobria accidit, cuius quidē suburbia sunt ciuitate ipsa ampliora, non agam hic tecum pluribus, cum tempestiuum iam sit, ut promissū satisficiamus.

1289



Orum quæ metiri homines solent, quædam solida, corpulenta, grauias, & sibi continua sunt, ut lapis, cera, lignum, & ferrum: quæ dā solida quidem & siccā, sed dissoluta & minuta, qualia accumulare cōsueuimus, ut hordeū, oryza, & triticum: quædam demum in liquidis fluidisq; consistunt, ē quorū numero est oleum, vinum, & mel. Quæ igitur sub prima differentia comprehenduntur, grauitate diiudicantur: cui negotio statim est inuenia. Quæ uerō humidam consistentiam possident, uasculi cavitatē expenduntur. At ea quæ cūm sint arida, aggerari in cumulum possunt, medio genere ambigūt: modō quippe ipsa librare, modō uasculis mensurare cōsueuimus: quemadmodū liquores fluentes. Quāq; hi quoq; sex numero reuocant ad statum. Liquida quippe omnia quæ corpori administrant, uniuerſi ferē iam pōderant, si Hispanos pharmacopolas excipias. Hi namq; nō pondere, quædammodū in Italia, Gallia, Germania, & Anglia mos est, sed uasculi cavitatē liquida medicamenta metiuntur: id ē quidē probare ullo modo non possum. Nam cūm ex liquoribus, hi qui dem grauiores sint, illi autē leuiiores, atq; tenuiū partium: certē necesse est, dum eos omnes ex æquo pari uasculi cavitatē dispensant, grauiſsimē interdum hallucinentur, capitaliq; errore labant. Nemini siquidē in ambiguo est, quæ crassum sunt partium, ea contracta & exigua mole plurimū continere substantiæ: ut paucillum sub rumore laxiori, quæ raram consistentiā sortiuntur. Etenim si accipias unam lieminam olei, uini aliam, ac tertiam deniq; mellis: cōpries planē oleum quidē ipsum, uncias ix. pendere, uinum autem x. mel tredecim cum dimidia: ita ut hoc ad uinū sit sesquiplum. Quod uerō aliunt, se nō una eademq; mensura, oleū, mel, atq; uinū metiri, sed eorum liquorū singulis habere suā destinatū: id illos non reddit à culpa immunes. Nam cūm in generibus singulis non paruum discrimen sit penes grauitatē & leuitatem (complacitū enim oleum, exempli gratia, quod oliuæ immaturæ fuderunt, hyoscyami uisus, tenuitate partiū & leuitate, multis numeris ab irino relinquitur) contingit sane, ut dum cuiusq; in diuidui uncia unā sefe administrare arbitrant, alterius quidē plus, alterius autem longē minus exhibeant, ac sic artis præcepta eueriant. Deberent itaq; aut liquores uniuerſos librare, aut singulis eorum speciebus, mensurā peculiārē præscribere: quam quidem inuestigare, esset nimis operoso negotiū.

Porrō mensura olei erat Galeni tēpore apud Romanos cornea, pelluciditas, & lineis quibusdam orbicularibus, quibus uncia discernentur, incisa. Sunt autē innumera ponderū ac mensurarum genera, secundū uarietates regionū ac

morū. Quamobrē ea describemus impræſentiarum duntaxat, quæ urbi Romæ, antiquissimæ totius orbis metropoli, semper fuerunt familiarissimæ: cūm præfertim Galenus uniuerſas ferē pharmacorū compositiones, ad mensuras Romanorū, ponderaq; reduxit: cum quibus, ubi exposita fuerint, facillimū cuiq; erit, quæ apud alias ciuitates in usu habentur, conferre.

De ponderibus.

1290

Nomina ponderū medicinaliū, in quæ medicipassum incidunt, sunt, mina, libra, uncia, drachma, scriptulus, obolus, siliqua, & granū. Romana igitur mina continet libras xx. Nam Ægyptia, & Artica, xvi. tantum constant. Libram autem xij. uncie constituunt, quarū singulæ ex drachmis octo cōstantur. Porro drachmā Galenus idem esse uult cum Romano denario: quis contendat aliqui, eam esse partem septimā uncie. Constat autem drachma scriptulis tribus, quæ à Græcis *γρῆμα*, scriptulū à neotericis, corrupta uoce, appellant. Quorū quicq; duos obolos continet: ut horum singuli, siliquas tres, quæ & cæritia dicunt. At uerō una quæq; siliqua, grana quaternā pendet. Reperiuntur etiā creberrimē inter nomenclaturas ponderum, faba Græca & Ægyptia: ac præterea nux iuglans, & Pontica. E quibus Græca quidē faba, duos obolos pendit: Ægyptia autem, drach. i. s. At iuglans nux, siliquas lxxij. ut Pontica xviij. Quæ omnia ordine reſolutorio explicata, faciliē ex hac tabella discernes,

Mina Ægyptia	unc. xvi.
Mina Romana	unc. xx.
Libra Romana	unc. xij.
Uncia	drach. viij.
Drachma, siue denarius, siue oka, script. iij.	
Scriptulus, siue scrupulus	obolus ij.
Obolus	siliquas ij.
Siliqua	grana iij.
Faba Græca	obol. ij.
Faba Ægyptia	drach. i. s.
Nux iuglans	siliquas lxxij.
Nux Pontica	siliquas xviij.

Si igitur ubiq; locorū & gentiū, libræ, uncie, & drachmæ, essent inter se eadem, licet et profectō nobis, iuxta Galeni dogmata, in quauis orbis plaga & regione, medicamenta citra discrimen præscribere. Cūm autem euariēt passim ea pondera, certē nisi quis omnia illa ad tabellam præscriptā reuocet, singulas adamasim expendat, priusquā alicui pharmacū catharticū portingat, fieri ullo modo nō potest, quin ab scopo aberrat, uidelicet aut plus q̄ sit ex usu, propinans, aut minus q̄ morbus postulat. Equidē experientia duodici, Hispanicæ unciam Romanā esse obolus duobus maiorē. Parisiensem, ferē integrā drachmā. Colonienſis, Bruxellens, atq; Antuerpienſis uncia, sunt similes: quarū singulæ Romanam tribus

tribus obolis superat. Ab hac, uncia Veneta (quæ experiundi gratia, nuper in officina quadam libraui) propemodum sesquidrachma relinquit. Si quid Veneta libra medicinalis, Romanæ libræ uncias x. cum dimidia, plus minus, pendet. Pro ratione itaq; harū differentiarū possem ipse iam in singulis horū locorū, numerū drachmarū intrepidè & augere, & detrachere: id quod mihi nō perinde liceret absq; fumina ægrotantiū clade, si proportionem ponderum quam habent inter se mutuò, accurate prius nō exploraissem. Quam cū habere perspēctam, cuidam adolescenti, quem in ædibus illustriſſimi D. D. Ioſonis à Mendotſa, Cæsare apud Venetos Oratoris splendidiſſi, ſuſcepi curandum, unciam unam ſolentis pharmaci exhibui: cuius in urbe Roma propina re drachi. vii. auſus non fuiſſem.

De notis ponderum quibus Medici in officiis utuntur.

Vt autem Græcorū charactères, quibus pondera exprimunt, impræſentiarū præteream, ceu nihil ad nos pertinētes: Medici recentiores pro uncia, hanc notam ꝑ usurpant: quemadmodū hanc, ꝑ pro drachma: ſimiliterq; illam ꝑ pro ſcriptulo: ſubdentes poſtea numerū quem expedire arbitrantur. Vt ſi ori ventriculi confirmando laniſcēmodi unguen inſtruerimus: Rꝛ olei abſinthij, & cydoniorū, ana ꝑ. ij. nardini vnc. s. ceræ elotæ drach. v. pul. corallij, & menthæ, ana ꝑ. i. perinde ſonant ac ſi ſcribamus: Olei abſinthij & cydoniorū, ſing. vnc. ij. Nardini vnciam dimidiam: ceræ elotæ drach. v. pulueris corallij & menthæ, ſingulorum ſcriptulum unum, &c. Quippe vox, ana, quæ aliquando etiam in Gale ni cōmentariis occurrit, cuiuſq; partes æquas ſignificat. Præſtare autem medicamēta ipla, quæ in ſe humani generis vitam, necemq; gerunt, mi nimè quidem notis aut numeris, ſed literis extenſis exprimere. Quandoquidem iota unū ſub larum aut additum, imò uerò etiam apiculus u- nus, ſæpe ſgros ipſos in exitiū atq; internicionē adegit. Porro ut flores ſolēt diſpenſari pugillis, ſic manipulis herbæ. Cōmuniter autem uolunt eſſe pugillum, quantū tribus digitis apprehendi poſſit: manipulum uerò, quantū tota manu. Ac pugillum quidem hac nota, ꝑ: manipulū autem hac, M, noſtri Medici exprimunt.

Græcæ liquidorum menſuræ (quæ maxime ſunt in uſu etiam apud Latinos Medicos) partim ex Galeno, partim ex cōmentariis

Iacobi Syluij, Medici hac noſtra ætate clariſſimi, excerptæ.

Cadus, ſive Ceraunium, capit choas, hoc eſt, Romanos cōgios xij. uel libras mēſurales cvij. Choa ſive Cōgius, ſextarius ſex capit, ſeu Attica corylas xij. ſeu libras ix.

Sextarius corylas ij. ſeu libram unam & dimidiam, ſeu cyathos xij. continet.

Coryla, quam nonnulli herminam appellant, quartarios ij. ſeu vncias mēſurales ix.

Semicoryla recipit acerbula duo, uel uncias

iiij. cum dimidia, exiſtens quarta ſextarii pars.

Acerbulū (Græci *ἡφολαγος* uocant) ſequicyathum, ſeu vncias ij. & drach. ij. pendet.

Cyathus conchas ij. ſeu myſtra iiij. ſeu chemas v. ſeu cochlearia x. ſeu ſeſcunciam.

Concha myſtra ij. ſeu chemas ij. cum dimidia, ſeu draclumas ſex.

Myſtrū chemen unam, & quartam eius partem, ſeu cochlearia ij. cum dimidio, ſeu drach. iij.

Cleme cochlearia ij. ſeu drach. ij. ſcript. i. & grana iiij. & quatuor quintas grani.

Cochlearium drach. i. ſcriptulum dimidium, grana ij. & duas quintas grani.

Porro unum nona parte pondus olei excedit. Mellis autem ad unum proportionē eſt ſequi pla: hoc eſt, tertia parte meliſpo uino eſt grauius, ut liquet ex tabella ſubdita.

Ceraunij Ita licum habet	ꝑ. lxx.	ꝑ. vnc. c.	ꝑ. mellis lib. cl.
--------------------------	---------	------------	--------------------

Congius	ꝑ. lib. vii. & ſemiſſem	ꝑ. lib. viij. & vnc. iij.	ꝑ. lib. xij. & ſemiſſem.
---------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

Sextarius	ꝑ. vnc. xv.	ꝑ. drach. v. ſcript. i.	ꝑ. lib. ij. vnciam unū.
-----------	-------------	-------------------------	-------------------------

Coryla	ꝑ. vnc. vii. & drach. iij.	ꝑ. vnc. viij. & drach. ij. ſcript. ij.	ꝑ. lib. i. & drach. iij.
--------	----------------------------	--	--------------------------

Oxybaphū	ꝑ. ſeſcunciam & drach. iij.	ꝑ. vnc. ij. & ſcript. ij.	ꝑ. vnc. iij. & drach. i.
----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Cyathus	ꝑ. drach. x.	ꝑ. vnciam i. & drach. iij. ſiliquas iij.	ꝑ. vnc. ij. & ſcript. ij.
---------	--------------	--	---------------------------

Menſuræ aridorum quibus Medici maxime utuntur.

Medinnus capit choccias xlvij.

Chœnix corylas iij. uel ſeſquifextariū, ſeu li-

bras ij. & quadrantem unum, & vnc. iij.

Sextarius corylas ij. ſeu vnc. xij.

Cotylys oxybapha iij. ſeu vnc. ix.

Oxybaphum, ſequicyathum, ſeu vnc. ij. & drach. ij.

Cyathus cochlearia x. ſeu ſeſcunciam.

Cochleariū drach. i. ſcript. s. grana ij. & duas quintas grani.

Crebro autē uſurpat Galenus hanc uocē Beſſem, quæ quotieſcūq; occurrerit, pro vncijs oſto accipiat.

Hec ſunt itaq; Vir Ornatiſſime, quæ ſub tuo nomi ne nolui ut omnibus ſerrent communis ſtudioſis: quare pro tua ſecreſ dignitate, ſi ea cōtra miſitigatorū mor ſus defenderis. Vale feliciter, plurimumq; ſaluta meo nomine cōmunis urriq; noſtram amicis, atq; integerrimos uiros, D. Berrocalem, ſcriptorē Apoſtolicum: necnon D. Falconem à Guenar, luris prudentie licentiarum abſolutiſſimum.

Venetij, iij. Idus Aprilis, M. D. XLVIII.

IOANNI AQUILARIO, MEDICO PONTIFICIO, BONARUM LITTERARUM FAVORI MAXIMO, ANDREAS LACUNA SECOBIE-
NIS, DOCTOR MEDICUS, MILES S. PETRI, S. P. D.



Vod accidere vniuersis parturientibus solet, vt dum in labore quidem versantur, se in-
rent amplius non parituros: postea vero extra discrimen posita, rursus & concipiant,
& pariant: id nunc mihi plane contigisse videtur, Vir clariss. Nam cum haud ita pridem
Epitomen omnium Galeni operum, verè laboriosissimum partum, exarandam in pu-
blicam studio fori commoditatem curarem: ac partim quidem immensis laboribus fractus, partim
preli difficultates ac molestias summas pertæsus, constituissem, ac propemodum apud me deierassem,
non futurum mihi amplius rem cum typographi: posteaquam factus iam editus est in lucem, viola-
re insurandum compellor, Galeniq. Pergameni vitam toti operi, ceu colophonem quandam, appone-
re. Renouauit siquidem me ab instituto, cum illius Viri dignitas, amplitudoq. tum mea in eum ob-
seruantia, adeoq. ipsius utilitas operis. Sciebam quippe Galenum, is qui vitam illius, mores, atq. insi-
tuta praelegerent, incredibilem quandam amorem sui excitaturu, vt multo ardentius, maioriq. cum
voluptate, in Epitome se nostra exerceret. Quocirca illum quidem ad viuam formam exprimere,
expressumq. vna cum operibus suis edere, statui. Ceterum quia verendum erat, ne Galenus nosster,
hospes & peregrinus cum sit, si in quempiam nebulonem incideret, contumelia aliqua afficeretur,
(sunt enim exteri maxime iniurijs obnoxij) haud perperam me facturum existimaui, si ductorum il-
li & protectorem aliquem iungerem, qui eum contra insultus Arabum, ac Barbaroru insidias, tue-
retur. Cui muneri subeundo, dum quoque uersus dispicerem, neminem te aptiorem inueni, Vir orna-
tissime, qui adeo illius semper fuisisti studiosus, vt vel me ipsum etiam impuleris, ad condendam illam
omnium operum eius perorchens quam provinciam, nisi victus insigatione tua (id quod ingenuè sa-
teor) neutiquam suscepissem. Nam cum de nulla re sis equè sollicitus, ac de salute publica (quæ tua sum-
ma bonitas, atq. animi integritas est) semper aliquid meditaris, quod in communem omnium vsus
redunder. Quo nomine vniuersi tibi debemus plurimum. Taceo singulares tuas istas animi dotes, pru-
dentiam, temperantiam, lenitatem morum, constantiam, multiyugamq. omnium disciplinarum pe-
ritiam, quæ nos adducunt, vt non minori admiratione, quam amore, te prosequamur. Merito igitur
ob hæc tam insignes virtutes, quibus conspicuus eras, reuerendusq. & illustriss. in Christo Pater, D.
D. Ioannes à Toletò, Cardinalis Burgenfis (iudicio cuius exquisitissimo non solent placere nisi opti-
ma) ex Salmanticensi Academia, in qua olim cum maxima laude & gloria profitebaris artem Medi-
cam, simul & Astronomiam, te allectum, nec vulgari conditione honestatum, vna secum abduxit
Romam. Qua in vrbe, quanta cum dexteritate, studio & pietate, artem Medicam exerceret, abundè
exploratum habens Paulus III. P. M. Viro accersivit te, ascriptusq. inter primarios Medicos suos,
summisq. tandem vitæ ornamentis auxit, atq. locupletauit. Qui quidem non secus tua dicta ample-
xatur, ac quiescitq. consilijs tuis, ac si illa ab Apolline acceperat. Vt igitur è vnde digressa est, nostra
renouetur oratio, En mittimus tibi ceu strenulam quandam, Galeni Pergameni vitam, per quem ip-
se tantum honoris & dignitatis es consequutus. Quam quidem vbi diligenter perlegeris, non modò
non patitebit te propensionis, qua in illum hætenus indulgentissimus fuisisti, sed etiam multò arden-
tius posthac amore illum inflammaberis. Vale Vir ornatiss. pergeq. vt capisti, de
ingenijs artibus ac disciplinis mereri optimè. Venetijs, quarto
nonas Aprilis, M. D. XLVIII.

Gemusio, alijsq; varijs autoribus, per Andream Lacunam medicum, militem S. Petri, summo studio collecta.



Non possum non excanDESCERE in viros quosdam novarum opinionum autores, qui Galenum, Pergamenum fuisse insciantur. Cuius rei non modò apud viros historicos, sed etiam apud ipsum Galenum, innumera testimonia extant. Nam ut complura alia omittam, certe libro primo de Compositione medicamentorum secundum genera, apertissime patriam suam Pergamum esse testatur, hunc in modum pronuncians: Hoc medicamentum nò ex eorum numero est, quæ à me primò composita sunt; sed iam annis multis antè, à rege nostro, Perga mensibus imperante, Attalo, viro omnigenorum medicaminù studio, &c. Similiter libro secundo de Pharmacorù compositione secundum partes, sic ait: Nam & frigidorum fontium & nivis, multa Romæ est veritas, quemadmodum apud nos in Pergamo. Eodem libro sic rursus subdit: Atq; ad hanc rem nostrum Pergamenum atramentù scriptorium præcellit, &c. Fuit autem Pergamus Asia civitas nobilissima, ingeniorumq; optimorum alitrix: quæ diu quidem sub regibus Attalica familia florebat, postea Romanorum legibus parvit. Quare Galenus meritò ab illa oriundus gloriatur, contrà quam faciunt Normani, qui declinatur ignominia notam, passim nomen patriæ cômitant. Porro patrem habuit diuitem, Nicone nomine, geometram & architectum ingenium, studijq; philosophici datum: qui ob modestiam suam & equitatem, probè omnibus erat semper admirationi. Mater eius fuit pudicissima, admodumq; circa augendam rem familiarem sollicita: adeò tamen iracunda & nîpereâ, ut vel ex levi occasione, mordicus ancillas impeteret: nec minus cômuloſe cum Nicone viro suo contenderet, quàm Xanthippe, nequissima quidem illa, cum Socrate: quemadmodum ipsemet Galenus testatur libro de Cognoscendis curandisq; animi affectibus. Fuit autem Galenus vix, ad annù decimumquintû, arithmetici, grâmatici, logicisq; disciplinæ sub Nicone patre institutus: ad quas quidem capeſendus, adeò erat natura promptus, ut vel ex primis illis auspicij, de se maximam exhiberet expectationem. Dein verò ad philosophiam, seuerioraq; promotus mathematica, amore philosophos optimos quoſq; cepit, qui haberentur Pergami: quorum omnium doctrinam & mores, ut rectè consuleretur filio, explorabat pater, assidue ad illos, nâ cum eo ventitans. At verò ubi iam annù decimumseptimû attigit, eidenti patri inſomnio admonitus, studij Medicinæ se dedidit, etiâ, adeò strenuam navavit operam, ut pauculus quidem annus, facillè cômulationes omnes, postea verò etiam præceptores suos superaverit. Quem fervorem augebat summa liberalitas patriæ, largè illi omnia suppeditans, quæ ad studia eius indabantur ex usu fore. Sæpe siquidem ob inopiam & egestatem optima quæq; ingenia clangescunt, & collabuntur. Nam, ut rectè ille monuit Poëta,

Ilud facillè emergunt, quorum virtutibus obſtat

Res anguſta domi, &c.

Præceptores habuit in philosophicis & medicis musis, primò quidem, Satyrum: dein Pelopem, apud Smyrnæ. Post quos Numesiano Corinthi sedulam operam dedit. Caterùm quamvis eorum omnium amantissimus esset, eosq; cœu parentes quosdam summa reuerentia observaret, noluit tamen eorum cuiquem addictior esse, quàm veritati ipsius studiosior. Quocirca nec seclè à vili se ad dicit: & ob id sæpe hominù rusticorum iudicium in plurimū esse sequendum monuit, quòd incorruptum esset, ac liberum, utpote ab heresi nulla occupatum. Postquam verò in Græcia neminem iam haberet, ex quo discere quicquid posset: maximèq; expedire Medico exſulmaret, varias orbis oras ac regiones lustrare, omnimodisq; hominum temperaturas, ac vires medicamentorù cognoscere, incredibilè tandem inceſſit illam peregrinandi cupiditas. Quare primò quidem ad Alexandriam se contulit. Quæ in vîbe cum aliquandū haſſiſſet, totamq; Aegyptum illi adiacentè lustrasset, ad Palaſtinam Syria, exportandi opobalsami grata, contendit. Navigavit etiam in Lemnù insulam, necnon in Cyprum, ut ex illa quidem, sphaeridem terram: ex hac autem, cadmiâ, pompholygem, diphrygem, aliâq; metallis innumera, in vîsum Pergamenisum adduceret. A quibus peragratisq; iam annos octo & vîginti natus, in patriam rediens, omnia medicamenta quæ attulerat, amicis est impertitus, ut de illis periculum facerent. Postea verò ex omni natione curabat sibi aſportari phar-maca exquisitissima, habens suspecta ea omnia, quæ ab insitioribus venderentur. Cognita igitur summa peritia illius,

atque in curandis ægri variata quadam dexteritate, pontifex Pergamenus provinciam gladiatores curandi soli ipsi credidit, quum vix annum vigesimum nonum attingeret: quod sane munus antea ipsi tantum delegabatur, qui etate, ac longo rerum usu prouecti essent. Caterum non diu illic commoratus, quod sedulo quadam esset inter Pergamenses oborta, Romam profectus est: Vbi ob incomparabilem doctrinam suam et probitatem, fuit statim notus et familiaris totius civitatis primoribus. In primis siquidem Eudemum Peripateticum, magni nominis virum, laborantem quatuor tana triplici, ob pessime administratam thernacem ab alijs Medicis, iamque ingranescentem etate, ac media hyeme, restituit, tempestivo usu eiusdem antidoti adhibito: prædixitque omnia quæ evenitura essent: id quod nomen illius, exultationemque per totam urbem plurimum auxit, sic tamen ut inusitas parietum gradu cresceret. Postea ad Iulii uxorem vocatus, quæ absque manifesta occasione consumebatur, ex pulsu eam non modo amare, sed quem deperiret etiam, miro quodam artificio deprehendit. Simili etiam industria duntis cuiusdam serum, sed metu, quod eorum quæ administraverat, pro dignitate reddere rationem non poterat, contabescere agnovit. Restituit etiam Boëthi uxorem, duntino fluore muliebri, et quem alij Medici non poterant cohibere, laborantem. Ob quam quidem sollicitudinem, aureos quadringentos, equipollentes mille coronatis solaribus, Boëthius ad illum misit, ipsumque per totam urbem summum laudibus extulit.

At vero annum iam tricesimumseptimum agens, Vbi auduit patriæ seditionem sedatam, partim quidem ut suos necessarios inuideret, partim ut Romanorum Medicorum declinaret odia et infidias, simulans se proficisci in Campaniam (ne forte ab amicis detineretur) reuersus Pergamum est. Sed non multo interiecto tempore, à Marco Aurelio et Lucio, Romanis Imperatoribus, reuocatus, eo nomine ut sequeretur expeditionem, quam instituerant aduersus Germanos, Romam inuitus rediit. Quò dum peruenit, multis tandem precibus impetravit à Marco Aurelio Antonino (qui æquus, pius, facili, et clementissimus erat) ut liceret sibi manere Romæ, expectareque, illic reditum ipsius Antonini à bello: intelligens nimirum quantopere abhorrerent Muses ab strepitu armorum. Memor autem prauitatis Medicorum atque philosophorum Roma degentium, quando diu Marcus Aurelius absfuit, apud Commodum, filium illius primogenitum, sese continuit, qui extra urbem educabatur sub Pirholao: cui etiam fuerat ab Imperatore inuinctum, Vbi quando puer ægotaret, Galenum accerferet, quò illi ferret manus auxiliatrices. Eo igitur tempore plurimum oculi nactus, Varios commentarios conscripsit, ad philosophiam Medicinamque spectantes. Quum autem interim febre corripereetur Commodus, ex pulsu agnouit sancium inflammationem causam illius extitisse: ac prouide congruis remedijs usus, à phlegmone et febre confestim cum liberauit. Quæ ex re Faustina matrimonio Imperatori coniuncta, caput Galenum ipsum laudibus usque ad sydera enechere, alijsque omnibus antepone: quæ tamen commendatio, apud præcipuos Medicos illum magis exoritur reddidit. Sexto etiam, alteri ipsius Imperatoris filio, quum similiter in febriculam incidisset, prædixit crisin, ac tum horam, tum solutionis modum, tum recidivam.

Postea autem, quum reuersus ex bello Marcus Aurelius, crederet se aliquando febrile, nec minus Medici qui peregrinationis suæ comites fuerant, initium febrilis accessions illi adesse putarent: ascitus Galenus, iussusque arteriam contingere, duxit se nihil tale percipere, sed potius à cibo assumpto eius ventriculum opprimi. Quam agnitionem quanti fecerit Imperator, significauit ter repetens. Ita est ut dicis, Profectò id ipsum, Vbi dixisti res habet. Ventriculum igitur fouens nardino, bibensque Sabinum Vinum cum pipere, quemadmodum Galenus iusserat, minimo negocio fuit restitutus, Galenumque postea magnopere commendare non desisebat, cum Medicum præstantissimum esse, ac tum virum ingenuum, tum summum philosophum prædicans. Nec vero argumentum vulgare Galenianæ doctrinæ, atque morum integritatis est, quòd à Marco Imperatore, omnium qui illum præcesserant, iustissimo simul et sapientissimo, quique ob singularem sapientiam suam est nomen Philosophi indeptus, celebratus encomijs fuerit, ascitusque in suorum Medicorum clientelam. Taceo eundem ipsum Imperatorem, quum singulis diebus vteretur thernace, quam summa fide preparabat illi Demetrius, primarius Medicus, postea Viti Demetrio functo, soli credidisse Galeno antidoti ipsius compositionem. Antonino è viuis sublato, successit ei filius Commodus, certè incommodus Romanorum reipub. Vtpote iuuenis omni pollutus libidine, omniq. flagitiorum genere obfessus atque contaminatus. Quo quidem imperante cessant

cessavit compositio atque usus theriaces, ut aliorum omnium optimorum institutorum: donec postea Imperator Severus institit Galeno (quem diligebat vnicè) ut antidotum rursus ipsam in communem omnium usum conficeret. Quod autem ad Galeni salubritatem pertinet, vix ad annum quidem viceimum octauum sapius correptus est morbus: reliquum verò ætatis, saluberrima videlicet ratione usus, sese conseruauit sanissimam, ita ut nullum morbum contraxerit, præter febrem ephemeram, in quam aliquando ob labores immodicos incidit.

Fuit autem perpetuò iam inde à pueritia sua, moribus innocentissimis præditus, adeoq; blandus & mitis, ut nunquam propria manu famulos verberaret, ne lapsos quidem: sed tum minis, tum pueris admonitionibus, peccata semper eorum correxerit: irascenti impetum nihil disferre ab insania & furore prædicans. In disputando tamen adeò graui atque senex erat, ut nunquàm non suis antagonis pudorem, sibi gloriam maximam conciliaret. Præterea admirandam illam docendi facilitatem, puritatem atque elegantiam sermonis, sententiarum pondus & altitudinem, creberrimam huiusmodi atq; exemplorum copiam, summum denique diuidenti, demonstrandiq; artificium: quibus numquam omnibus adeò accurate Naturam rerum expressit, adeò illam oratione exornauit, ut verus interpretis eius solus ipse dici mereatur. Fuit porro adeò constans atque inconcussus animo, ut ob nullam fuerit inquam rerum vicissitudinem consternatus: sed fortunam & infortunium, honorem & contumeliam, sanitatem & mortuum, pari semper alacritate exceperit. Gloriam & popularem auarum sic perpetuò neglexit, ut ne libra quidem suis præscriptum nomen sit passus. Quippe multitudinis laudem, commodum instrumentum nonnullis iuuentibus aliquando esse dicebat: mortui autem, nihil omnino prodesse: imò uerò nec iuuentium quibusdam: quum eis qui plurimum philosophia indulgerent, non paruo impedimento esset apud vulgus fama, ipsos uidelicet à rebus pulcherrimis plus iusto transuersos auferens. Quocirca, cum diuino quodam afflatus numine, vulgarem illam gloriam contempsit, veritatisq; solo studio flagrant, nullam esse nec honestiorem, nec diuiniorem possessionem existimans. Tam studiosus autem fuit humanae salutis, ut quum vel maximè optaret infirmam illam sapientiam atque doctrinam suam facere vniuersis communem, verum tamen sacrum exprime, describereq; pharmaca deleteria, ne quis forte pessimus scyphanta in perniciem nostram illis abuteretur. Quo etiam nomine varios modos adulterandi medicamentis, sibi notos suppressit, ne uidelicet ansam & occasionem circumueniendi nos inpositurus, daret flagitiosus & fraudulentus hominibus, si quis id genus artem in lucro ponerent. Extant eius pietatis amorisq; argumenta complura, in deos, in parentes, in patriam, in artem ipsam, in vniuersum denique humanum genus. Dei quippe iustitiam, vim, & providentiam agnoscit, suspicat, maximaq; cum reuerentia admittit, quum alias, tum præcipuè in commentariis de usu particularum humani corporis, quos tanquam hymnos quosdam, Deo consecrauit: hoc esse sacrificium illi acceptissimum censens, non si es hecatombas, victimasq; offerret quispiam cruentas, aut casiam & thura accenderet, sed si mysteria illius, operaq; primum quidem ipse cognosceret, expendereq; posset, verò alijs communicaret: in quorum ignorantia proficerebatur summam impietatem consistere. Iam verò parentes sui cum in alijs plerisque loci mentionem honori ficientissimam faciat, tum vel maximè in commentario de cognoscendis, curandisq; animi affectibus, illum commendat vnicè: quod sanè opus, veluti encyclicum paternarum virtutum est. Patriam autem, conciuemq; suos, tanto est prosequutus amore, ut quò eorum usui inferuaret, fauores Imperatorum, amplissimamq; stipendia neglexerit: idq; merito. Nam quum maiori ex parte nemo sit patrie acceptus (sic siquidem natura comparatum hominibus est, ut peregrina quidem & aduentitia ingenia admittant: sua verò, domesticasq; ob familiarem usum, despiciant) Galenum certe Pergamensem tam studiose colebant, & obseruabant, ut ipsum & seruatorem suum, & Patrem patrie, omnes communi ore vocarent: neq; id iniuria. Siquidem non modò curabat sedulo, ut suorum ciuium rectè valerent corpora, sed quemadmodum legislator atq; philosophus summus, etiam erat sollicitus, ut eorum animi optimis documentis insisterentur. Quocirca varios commentarios conscripsit, ad excolenda iuuentutis ingenia admodum salutare. Concluant autem sibi maximè plebs animos, quòd medicamenta simplicibus, vulgaribusq; & quæ minimo negotio parari apud quemuis possent, plurimum utens, eorum quos suscipiebat curandos, minimè facultates opprimeret: contra quam faciunt hac nostra ætate plurimi pharmacorum aggeratores eximij, qui

Ut admirandam suam illam sapientiam ostentent, adeo miscere sacra profana assolent, ut quem morbum facile depellere posset interdum radícula unica commodè administrata, cum sapen-
 ro varia indigesta, ac longè petita medicamentorum congerie, alant, foueant, aduecant. Quòd
 si exersitè bona quadam fortuna sua, vel Dei potius, quàm pharmaci, beneficio, aliquando ab
 affectu recuperetur, necessum haud dubie est, si tenuiori fortunæ uis sit, in alium rursus morbum,
 priori longè grauiore, incidat: uidelicet egestatem extremam: quum nimirum pro tot gemmis
 & margaritis, vel (quod plerumque contingit) calculi ex fluuio aliquo allatis, satisfacere phar-
 macopole argenti non possit: ac proinde si quid reliquum illi suppellectili fuit, totum id expona-
 tur sub hasta, cogaturq; tandem miser, exosam habens vitam, medicinam, & medicos, in angu-
 stiam maximam rei familiaris adactus, una cum uxore & liberis, fame acerbissima contabesceret:
 cui quidem præsistisset longè, si seruatus non fuisset. At Galenus noster, id genus aromataris, in-
 stitoribusq; non indigebat: quippe qui propria manu singula medicamenta conficeret, consecra-
 officiosissime semper egro administraret: in egenos interim non exiguum suarum facultatum por-
 tionem erogans: artēque ipsam, non auaritia ductus, aut quapiam cupiditate, sed propter solam
 virtutem, pie simul & religiose exercens. Fuit autem erga egros semper moribus placidissimus præ-
 ditus, quibus adeo illos exhalabat, ut vel solo sermone uideretur eos resituere. Quæ sanè gratia
 & uenustas maxime desideratur in Medicis. Sunt quippe nonnulli etiam in aulis Principum, adeo
 retrico aspectu, fastidendoq; ut ex quartana simplici duplicem suo accessu reddant, soloq; visu,
 basiliscorum instar, intermiant. Nec verò cuiquam pharmacum admoit aut propinquit Gale-
 nus, cuius prius in seipso non fecisset periculum. Quæ omnia reddiderunt illum semper adeo incul-
 pabilem, ut calumniam in ipsum moliri nihil inquam potuerit. Scripsit autem Attico sermone
 & purissimo per multa opera & uaria, non ad artē Medicam tantum, sed etiam ad Philosophiam,
 grammaticen, rhetoricen, mathematicen, atque geometriam pertinentia: quorum non contem-
 nenda pars, dum templum Pacis, simulq; omnes Bibliotheca Palatii, olim consueuerunt incen-
 dio (ô iacturam irreparabilem) nobis intercidere. Quæ uerò extant, atque inter eruditorum manus
 versantur, non secus suspiciuntur ab inuicis, quibus mens falsis dogmatu corrupta & de-
 prauata non est, ac si planè diuina oracula sint, ex tripode pronuntiata. Nam qui in philosophiarum
 scholis sunt alti, nugæ, & paralogismus referti, q̃s certè nec placet, nec prodesse uera Galeni do-
 ctрина potest. Siquidem quemadmodum corpora impura, quo magis quispiam solido alimento nu-
 trigit, eò magis læserit: sic animum opinionibus prauis imbutum, nisi prius ab eis expurgetur, ne
 Musæ quidem ipsæ rectè docere possint: id quod fuisse in causa uidetur, ut Galenus semper in ope-
 ribus suis, primò quidem exterminaret iniqua dogmata, postea uerò ipsam ueritatem tradiderit:
 optimi agricolæ exemplo, qui prius quàm terræ suæ semina mandet, spinas, herbas, fenees, radicesq;
 omnes euellit, omniaq; breuiter, quæ possint tritici germinationem extinguere. Fuit autem tam a-
 cruus & rehemens in refellendis aliorum tam Medicorum, quàm philosophorum erratib; tantumq;
 ualuit suadela, ut eorum quos persequutus est, inuicem scripta perierint. Hippocratem uerò ita
 semper & reueretur & colit, ut passim eum & prudentissimum, & sapientissimum senem, sum-
 mumq; Medicine parentem, autoremq; & largitorem bonorum omnium institutorum, prædicet.
 Ceterum quemadmodum Traianus olim omnes Italiae uias inaccessas, præruptasq; aut rupibus in-
 uias, refecit, instaurauitq; quò facilius peruadi possent: sic etiam fateretur se non quidem artē con-
 dere (quam laudem tamen iurè sibi uendicare potuisset) sed iam ab Hippocrate inuentam, incul-
 tam tamen & asperam, explanare, ut ab omnibus intelligi ac percipi queat. Vixit sub Marco Au-
 relio Antonino, Commodo, Lucio, & Seuero, Caesaribus. Præcipue tamen Marco Aurelio Anto-
 nino fuit summa familiaritate coniunctus. Quo extincto, tamen si postea esset Seuero Imperatori
 acceptissimus, detineri tamen diu apud urbem Romam non potuit, quò minus in dulcissimam sibi
 patriam reuertetur. In qua quidem iam factus septuagenarius, imperantēq; eodem Seuero, reque-
 uit, magnam apud homines gloriam consecutus: maiorem etiam apud Deum habiturus si CHRIS-
 TIANI institutu, cuius semel atque iterum meminui, credere atq; obsecundare uoluisset.

Sunt tamen qui Galenum tradant uixisse annos CXL. Siquidem Ludouicus Celius, lectio-
 num antiquarum lib. xi. sic ait: Galenum Philosophum & Medicum singularem, cuius scientissi-
 ma & plurima extant ingenij monumenta, quæ geminam sapiunt eruditionem, memoria præditum

à non-

à nonnullis est, C X L. Vixisse annos, tantūq, in cibo & potu abstinentia vsum, ut ad satietatem nunquam comederit, biberitue, nec crudum quicquam gustarit. Unde sit factum, ut odoriferum semper anhelitum spiraret: sed, quod longe apud me mirabilius est, citra ullam omnino affectionem, sola defecerit senectute, quod est in humani rarissimum.

Magis tamen testimonio Suidæ acquiescendum est, qui sic de Galeno pronunciat: γὰρ ὡς ἐστὶν ἀσθενέστατος τῶν ἰατρῶν πρὸς γαστρίδας γὰρ ὡς, ὡς Μαρκὸς καὶ Κομμодиὸς, οὐδὲ Περτινάκος ἦν· καὶ ὅτι οὐδὲν ἔφαγε, ὡς Νίκωνος γαστρίδας, ὁ ἀρχιτρίκλινος, πολλὰ δὲ σωτηρίας ἰατρικὰ καὶ ἐπιλόεσθαι, ὡς τὰ γαστρίδας οὐδὲν ἔφαγε, ὡς τὸ πᾶσι τὸν γαστρίδας, κατὰ τὴν γαστρίδας ἀσθενέστατος ἦν ὡς τὸ πᾶσι τὸν γαστρίδας, ὡς τὸ πᾶσι τὸν γαστρίδας. Quæ sonant: Galenus Medicus celeberrimus, Pergami natus, Marci, Commodi, & Pertinacis temporibus, vixit Roma. Patrem habuit Niconem, geometricum, architectumq, Plurima non in arte Medica tantum, sed in philosophia etiam, condidit: unò vero & in grammaticis, rhetoricisq, Quæ quidem quod omnibus obvia & notissima sunt,

non videtur mihi opere precium ut recitentur impræsentiarum. Vixit

annos LXX. Porro hæc vox Galenus, tranquillum serenūq, significat.

VITÆ GALENI FINIS.

ANNOTATIONES IN GALENI INTER-

PRETES: QUIBUS VARIIS LOCIS, IN QUOS HACTE-

nus impeerunt lectores, & explicantur, & summa fide restituantur:

Andrea Lacuna Secobiensis, Doctore Medico, meli-
te sancti Petri, autore.

ILLVSTRISSIMO ET SAPIENTISSIMO VIRO, D. D. DL-

daco Furtado ii Mendozza, apud Paulum 111. P. M. Oratori Cesareo, longè uigilantissimo,

Andreas Lacuna Secobiensis, Doctör Medicus, miles S. Petri S. P. D.



QVOD non perinde nostros lapsus cernamus, ac errata aliorū perspicimus, in causa est quia-
dem illi Philautia, Vir illustris. Nam cum unusquisq; cecidit erga eam rem quam a-
mat (ut sensisse diuinus ille Plato uidetur) cuncti autem se omnium maxime diligant:
optima ratione contingit, ut de se nemo recte iudicium ferat. Idcirco pulchre, mea qui-
dem sententia, dictum est illud, Gestare nos duplicem mantica è collo suspensam: unam quidem an-
te, alterorum: alteram uero post, nostrorum errorum plenam: ac proinde nos, peccatis propriis reli-
ctis, ad aliena, quæ obiecta semper oculis sunt, examinanda inclinari. Quanquam sanè qui studio Ve-
ritatis inuestigande, non autem ledendi quæpiam, id faciunt, adhibitaq; omni moderatione: ij certè
non uenia modò, sed summa etiam laude sunt digni. Non desunt tamen nonnulli male ferati, qui ex
alienis contumelijs gloriam sibi aucupantes, in viros eruditos & candidos, quiq; nihil inquam tam
habuerunt in uoti, quam ut reipub. literariae prodesse, ueluti in proditores patriæ, in contempto-
res diuorum, cõmunisq; humani generis hostes, acerbè simul & impudenter, uel leuissima ex occa-
sione inuehantur: cum deberent potius illis bene precari, ob egregiè in cõmunem usum nauatam ope-
rat. Inhumanū quippe, maximeq; ferinum est, eos qui ut cõmunia studia iuuarent, sese obiecerunt
scophantari calumnijs, ob multa quidem ac varia, quæ ex Græca in Latinam linguam fidelissimè
translulerunt, non cumulare suis iustis laudibus: ob pauca uero in quibus sunt lapsi humanitus, pro-
bris & conuicijs opprimere. Ut autem reliquos omnes pratercam, qui sua industria artem Apollineâ
locupletarūt, certè Ioannes Guinterius Andernacus, in quem plurimi præter meritū debacchantur,
unus ex primis fuit, qui Galenum introduxerunt nobis latine, purè, atq; ornatè loquentem. Quod si
ex ijs quæ iam pridem uerit, nonnulla offendent aures delicatiores, id cuiquā miri esse nõ debet: quan-
doquidem superioribus annis, cum Lutetia Parrhasiorū poliiores discipline inciperent iam renasci
& florescere, primumq; ipse ad transferenda Græca se acciperet, tum ut tyrannum uotis obscunda-
ret, qui sitientissimi Galeniana doctrina, quemadmodum famelici pueri, qui semicrudas carnes de-
uorant, prius quàm accuratè coquātur, mcofectos cõmentarios illi extorquebamus è manibus: tum
ut satisfaceret importunis typographorū precibus, coactus fuit tantū singulis diebus uertere (id quod
ipse testari possum) quantum premi duplici torculari poterat: atq; ita suas tralactiones, nondum integre
elaboratas, præcipitare. Quare (ut idem repetam) perperam mihi uidentur facere, qui uirū in itraq;
literatura absolutum, exquisitissimumq; Medicum & Philosophum (cuius studijs omnes debemus
plurimum) tam insolenter inestant: cum nullus extiterit hæcenus adeò fidus Galeni interpres, qui
interdum hallucinatus non fuerit: ac proinde ad ueritatem ipsam inuestigandam, præsertim in rebus
arduis & maximis, cuiusmodi ars Medica existit, necessario ingenia plurimum desiderentur: ut uide-
licet quæ hunc fugiunt, ille cernat exactius. Sunt enim difficilia semper, quæ optima. Cum igitur supe-
rioribus diebus uersueris Galeni opera in methodum longè breuiorem, ac faciliore contrahens, obiter
repperissem complura, hæcenus animaduersa à nemine, in quæ lector facili impingere poterat: rem
haud inutilem me facturum existimaui, si omnia loca præcipua, quæ iudicio mihi, aliam requirebant
expositionem, pauculis annotarem, arbitriumq; studiosis relinquere, aut sequendi uersionem no-
stram, aut consulendi Græca exemplaria. Neq; enim tantū mihi ipsi tribuo, ut uelim illis uia meâ sen-
tentiam probari, ac si Lycærgi, aut Soloni decretum esset. Nam & insitam mihi fragilitatem agno-
sco, & iudico omni ex parte difficile, ut qui homo sit, passim non decipiar: id quod Galenus secun-
do libro de Compositione pharmacorū secundum partes, non minus uerè quàm eleganter confirmat,
dicēs: χαλεπὸν γὰρ ἀρεσκῶν ὄντα καὶ διαμαρτυρεῖν οὐ νόμιμα, τὰ μὲν ὁλογοῦς ἀγνοῦντας τε, τὰ δὲ κακῶς
κεκρίτας, τὰ δὲ ἀμυλῶς τῶν γὰρ τα: quemadmodum certè aliquando mihi accidisse fateor, qui
iuuendi prorsus olim scribendi libidine, nonnulla paulò maturius edidi, quæ optarem nunquā pro-

duisse in lucem. Quamquam animus haud dubie est, ubi oculum fuerimus nacti, quaecumq; à nobis conscripta citra perfectum iudicium sunt, ea omnia recoquere, reuocareq; ad lunam accuratorem: idq; patrum gratissimorum exemplo, qui vel in sacris literis, in quibus maiori cum periculo erratur, retractare propria scripta non dubitarunt. Quod si quis interum Vir doctus iuxta & sincerus, vel in hisce nostris annotationibus, vel in alijs omnibus, quæ aliàs à nobis sunt exarata, meliora in medium produxerit, ego primus omnium illa amplexabor, etq; immortales gratias habebo, nec minus, quam si mihi laboranti grani ophthalmia, oculorum aciem restituisset: modò eo utatur candore & modestia, quæ viros philosophos decet, veritatēq; amantissimos. Semper namq; à moribus Erasistratae vñ abhorruī: qui adeo pertinaciter suā tuebatur heresim, ut censerent patriam potius prodendam esse, quam proprium dogma. Quod verò hic praesens labor mihi institutus non fuerit, ut ostentarem in eum, aut vñ alijs hominum doctissimorum detraherem, sed ut publicæ utilitati consulerē, rationemq; redderem diligentiae praestitæ in condenda Galeni Epitome, novit quidem ille, qui animum est scrutator, Dens opt. max. Porro ut id ipsum lucubrationum quod est, sub splendore nominis tui publicarem, me occasiones varia impulserunt, Vir clarissime. Vna & potissima, ut amor ille ardentissimus, qui inter Excellentiam tuam, & illustrissimū atq; reuerendū S. D. D. Franciscum à Bonadilla & Mendozzæ, Cardinalem Caurien. patronumq; meum non vulgarem, indes magisq; consuledeſcit, ex hoc argumento innotesceret cunctis simulq; observantia mea in Virum, Secunda, ut viriliorum calumnias iamnuī detestandi obſervarem, tutumq; à ravidorum me casū moribus redderem. Quippe verisimile est, quæ tibi semel sunt consecrata, tuæq; protectiohi se crediderunt, ea veluti in asylo quodam intemerato iam esse: cum nemo futurus sit adeo temerarius aut impudens, ut istam Amplitudinem tuam, auctoritatemq; summam, non revereatur. Tertia quæ me illexit causa est, qua ducti studiosi omnes, te vnicum protectorem Musarum, doctorū hominū patrem, promotoremq; ingenuarū omnium disciplinarū, nunquā desistentur: nempe multijuga ista eruditio tua, feruentissimūq; sapientia amor, claritudinis generis, prudentia, humanitatēq; coniunctus: ut interum singularem ad omnia ingenij tui promptitudinē, admirandamq; in agendis rebus dexteritatē preteream. Quas insignes virtutes (quæ raro in vñ cōspirant) in te cumulatæ sentiens CAROLVS V. Caesar, indes con credit tibi maxima molimina rerum: quæ adeo feliciter consilio & sapientia tua illi confecta & expedita reddidit, ut diuino planē ingenio predictus esse videarī: id quo etiam nunc prædicare de te illustrissimus hic Venetorum senatus non desinit: qui & laueret hodie recessum tuum, nisi illustris Vir D. D. Ioannes à Mendozzæ, aureum quoddam tuarum virtutū exemplar, dolorem ipsum foueret, leniret, ac mitigaret. Si quidem in eo praesente (cui eadem mens, idem candor, prudentia eadem, ut eo gnomentum idem) desiderium tui absentis exarant: in eo suos oculos pascunt: qui tanta cum gravitate, sapientia, fide, studio, atq; sedulitate, fungitur Oratoris munere, ut minimè iam ipse hinc abesse videarī. Ne igitur diutius quam par est, suspensam tuam Amplitudinem teneam, en offerimus tibi, Vir illustris, in Galeni interpretes hasce nostras annotationes. Quas quidem si tuo patrocinio dignatus fueris, ipsæ quidem omnes insultus atq; incursiones respicient: ego verò tuam semper Excellentiam suspiciam, quam in multis annos Christus nobis seruet incolumem. Venetijs ex adibus illustris Viri, D. D. Ioannis Furtadi à Mendozzæ, apud Venetos Caesari Oratoris splendidiſsimi. Decimo Calen. Decemb. M. D. XLVIII.

AD LECTOREM.

ADVERTAS Candidè Lector, numerum illum qui passim occurrerit tibi in nostris annotationibus, referre paginas eorum Galeni commentariorum, qui in octo classes digesti, repurgatūq; ab inuicem mendis, anno 1541. sub formula octava fuerunt Venetijs excusī: idq; industria clarissimū & eruditissimū viri, Victoris Trincaveli, Doct. Med. necnon diligentia Augustini Ricci, Medici etiam absolvissimū. Quod sanè minimè omitteudum esse censuimus, quin tibi indicaremur: et illi, quibus ita iam exemplariorum copia esset, sua commoditate fraudarentur: et illi, quibus etiam si hec non esset, aliquem tamen & in suis inquirendi occasionem sibi præbitam esse, certarent.



videntur hominis esse propria, et si non sint talia in munda, tamen similia videnti possunt. Proprius homini fermo est, tamē & illis quædam similitudo sermonis, Nam & dignoscitur invicē se vocibus: & cūm irascuntur, eundem sonum iurgio similem: & cūm se ex intervallo vident, gurrant ad officium uoce declarant. Nobis quidem uoces eorum vident inconditæ, sicuti & illis per taste nostræ. Sed ipse qui se intelligunt, uerba sunt: denique in omni affectu certas uocis notas exprimunt, quibus habitum mentis ostendunt. Et paulo post: Quid tam homini propriū quam ratio, & providentia futuri? Atqui fuit animalia quæ latibulis suis diuersos & plures exitus pandant, ut si quod periculum inciderit, fuga pateat ubifaciis. Quod non facerent, nisi intellet illius intelligentia & cogitatio. Ac postea subdit: Quòd si horum omnīū, quæ adscribi homini solent, in mutis quoqueprehendi similitudo apparet solam esse religionem, culus in mutis nec uectigium aliquod, nec ullā suspicio inueniri solet. Hæc pertinet quæ Plin. lib. x. cap. xxviii. Naturalis hist. ait de Luscinjâ: Certant inter se, palamque animosa contentio est. Victa, morte finit sæpe ut tam spiritus prius deficiente, quàm canit. Meditantur alix iuniores, uersutur quos imitent, ac capiunt. Audit discipula intentione magna, & reddit, uicibusq̃ retinent. Intelligitur emendare cor rectio, & in docente quædam reprehensio, &c. Recedere tamen hæciam ab instituto vident: cuius profusus erans oblitus, nimirū delinitus historie naturalis dulcedine, perinde ac si lora ardetur, suauissimam quidem illam gustasse. Galenus itaq̃ τὸν ἀπὸ τοῦ λόγου κέρειν ποταμόν οὐκ ὁπομένω opōnit ut γρηγορήσῃται ut illa quiddam, quæ sola inest brutis, sit ratio occulta reconditaq̃: hæc autē qua nos ipsi, veluti auctario quodam, præditi sumus, illi utretur sermone. Quod autē hæc ita habeant, nō alium testem, sed Galenum producamus in mediū, qui scriptum interpretatur, commentario primo in librū Hippocratis anti insipies, sic differens: τίνα ἐστὶν ἀνάγκη τὴν γενεὰν ἔργων λαβόντες, αὐτὰς διαλέγεσθαι καὶ ἀκούεσθαι, ἵνα δι' αὐτὰς οἱ πρῶτοι νεώτεροι εὖ κατανοήσωσι καὶ ποιήσωσι. Αὐτοὶ δὲ ὅτι ἂν αὐτὰς γενέσθωσι καὶ λαβόντες ἀδελφοὺς καὶ φίλους, αὐτοὶ μὲν ἀλλήλοις καὶ ταῖς τέχνησι μαθήσαντες, αὐτοὶ δὲ καὶ ἀλλοις, ἵνα πάντας τοὺς ἀνθρώπους αὐτῶν ἡμετέρας ἐκείνων καὶ φιλικὰς ἀκοάς, καὶ αὐτῶν ἰδίαν πολλὰν τιμήν. Quæ omnia fideliter ūmal & eleganter à Victore Trincaveuo, viro citra ceterougriam doctissimo, sic sunt in sermone Latini cõuerſa: Post omnes sensus ita tim intelligentiã collocavit, hoc est, cogitationem, seu rationẽ, quẽ homines cõmuniter mentem & intellectũ nominare consueverunt. At uero quoniam scĩt uox quædam ratio reperit, idẽ philosophi, ut hanc ab illa discerneret, interiorẽ hanc appellari, quã & consequentiã, & repugnantiã cognoscimus: quibus diuisio, cõpositio, resolutio, ac demonstratio, ceteraq̃ id genus comprehendunt. Atq̃ hæctenus circa hæc primam annotationẽ: quam petracœui, minime quidẽ ut suggillarem Erasimum, qui tam illustrauit bonas artes & disciplinas, quãm qui maxime, fed ut Galeni mætēm extollens illius studiofus exponere, id qđ uidetur abundẽ iam præstetisse.

Libro de optima secta.

Pagina 57.

Ivnus Paulus uertit: Et egrotantes non multo in conficiendis cibis labore indigere. Græcè habetur: *οἱ βέλτεροι τῶν ασθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Hoc est: Et quod ægri egent cibis, qui non admodum difficulter coquantur: uel qui longam elaborationem non postulent.

Pag. 58.

Ab huiusmodi præceptum nascitur: liquidi cibi omnes fabricandos bene faciunt. Græcè legitur: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Quod est: Ex his tale oritur theorema: Cibi humidi omnibus febrientibus conferunt.

Pagina 61.

Autem enim, antequam adhibendorum remedium uires quis didicerit, nihil aliud utile ab experientia provenire. Græcè legitur: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Quod est: Autem enim, præter hoc quod facultates exhibendorum per eam cognoscuntur, oisii aliud utile ab ipsa experientia accedere, &c. Fefellit autem interpretem uocularum uelut in uerbo, affinitas atque similitudo.

Pagina 86.

Quandoquidem non ab effectibus, sed ab efficientibus (quemadmodum & ipsi proficiunt) indicationes accipiendæ sunt. Græcè legitur: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Quæ contrario modo uertenda erant: sic scilicet: Non enim ab efficientibus, sed ab effectibus (quemadmodum & ipsi fatentur) indicationes sumendæ sunt.

Pag. 95.

ut autem semper communia uertit, non communitates: ut sanè uertendum est, si uelimus ueram Galeni phrasim atque sententiam exprimere.

Lib. de constitutione artis medicæ.

Adolecere libri.

Bartholomæus Syluianus uertit: quod labefactur. Aldinus codex habet: *ἐν ἀσθενείᾳ*. hoc est, quia corrumpitur. Basiliensis autem: *ἐν ἀσθενείᾳ*. et rectè quidem: quod uertendum est: quia digeritur & resoluatur.

Lib. I. de elementis.

Pag. 190.

Leonicens: Vel secundum substantiam quibus contigit esse elemēta. Cui uersioni suffragantur ceteri interpretes, Græcè tamen legitur: *ἐν τῇ οὐσίᾳ*. hoc est: An secundum substantias, quarum ratione cōtigit ipsis esse elementis. Ceterum loco de crediderim esse legendum: *ἐν τῇ οὐσίᾳ* forte dicat Galenū uti latinam phrasim, utpote diu in urbe Roma uersatum.

Lib. III. Pag. 185.

Linacæ: Vt si carnosus quis iuuenis in frigida lauatione corpus eius ex accidenti, nō ex propria potestate, calfacere dicat. Græcè: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Quod sonat: Vt si quis dicat frigidam lauationē calfacere corpus carnosum iu-

uenis ex accidenti, non facultate propria.

Lib. de inequali temperie.

Pag. 314.

Linacæ: Calit quidem sanguis aliquando uniuersus, quicunque non naturalem illum calorem, qui ex humoris putredine est obortus, recte pot. Græcè legitur: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Quod uertimus: Calit quidem sanguis quandoque uniuersus, recipit illum calorem præter naturam, qui ab humorum putredine proficiat, ut.

Pag. 318.

In qua alterum sit comprehensum. Græcè habetur: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. hoc est, in quo etiam non adit alterum.

Lib. de animæ morum, & corporeæ temperaturæ mutua consecutione.

Cap. 111.

Bartholomæus Syluianus: At incorporeæ substantiæ, cum per se ipsa esse possit, neque qualitas aut species corporis sit, differentiam nullam intelligo. Cui uersioni alij subscribunt interpretes. Græcè tamen codex habet in hunc modum: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Quod sic sanè uertendum est: Incorporeæ uerò substantiæ, quæ ipsa quidem per se consistere ualeat, nec corporis qualitas aut species sit, equidem ullam differentiam inuenio, &c. Quibus nimirum uerbis concuelli opinionem Platonis, qui animam cōstituebat incorpoream quandam substantiam, & quæ posset per se subsistere, conatur Galenus ostendere, illam esse aut qualitatem, aut aliquam speciem corporis: cum alioquin, si esset quid alienum & abstractum à corpore, neuiquam illam diuisionem admitteret, quæ in tres species, seu differentias, uel à Platone ipso distinguitur.

Lib. III. de naturalibus facultatibus.

Pag. 444.

Linacæ: Siquidē interna arterie tunica. Græcè legitur: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Quod est: Etenim interna uentriculi tunica.

Lib. I. de motu musculorum.

Pag. 304.

Codices latini sunt deprauati: in quibus habetur: At reliquum, & quartum, & motum transgressi, consideremus, &c. Græcè namque habetur: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Hoc est: Ad reliquum autem & quartum motum transgressi, modum ipsius expendamus.

Libro secundo. Pag. 321.

Leonicens: In quacunque autem talium constituens membrum, musculis circa ipsum tonicis agentibus commissis, figuram si seruant, adeo ut sedentes quidam dormierint, &c. Græcè legitur: *ὅτι τῶν ὑγίων τῶν ἀσθενούντων ἐν πολλῷ μὲν οὐκ ἀναγκάζονται διὰ τὴν τροφὴν*. Quod sic uertimus: In quacunque enim talium constituens membrum, si mu-

sculis circa ipsum tonicis agentibus commiseris figuræ custodiam, adeo illam tueretur, ut sedentes sepe quidam dormiuerint.

Pag. 512.

Itaq; & supinum iacere, & hiare, stertoris, aut exolutionis, aut ebrietatis, aut ignauix sunt signa. Græcè: *ἡσυχία καὶ ὑπὸν καὶ στερτορ καὶ ἰγναία*. Quod est: & hiare cum stertore.

Pag. 514.

At (dicit fortè quispiam) nō assequimur mentem ea fieri: nam nec palpebrarū motum semper, &c. Quo in loco Galenus responderet ad obiectio nem tacitam. Ac proinde ita debemus legere: At (dicit fortè quispiam) nō assequimur mentem ea fieri. Neque etiam (supple, dicemus nos) palpebrarū motui semper adhibere mentem, &c. ac sic sanè sententia illa euadit perspicua. Tu interim consule græcum exemplar.

Lib. I. de semine.

Pag. 557.

Ianus Cornarius: Attractoriam quidem familiarium, per quam attracturum, & alteraturum, alimentum sibi facturū erat: expulso riam autē alienorum & superfluorum. Sic autē habet græcus uetus codex: nam impressi sunt deprauati: *ἡ ἀtractορία τῶν τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων καὶ τῶν ὑποπληθύνοντων καὶ τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων*. Quod est uertendum. Attractricem quidem, familiarium: & qua etiam retenturum erat, qualy alteraturum, & sibi nutrimentū facturum: ac deniq; alienorum, superfluorumq; excretricem. Galenus siquidem impræfentiarū quatuor illas facultates, maximè inter se distinctas, ascribit femini: nec uult ipsum per attractricem, aut alterare, aut sibi alimentum conficere: id quod dictū esset planè ridiculum: cum nimirū singulis earum facultatum sit suum munus proprium, nullaq; alterius operationē usurpet. Attractricis quippe, est attrahere: retētricis, retinere & constringere: alteratricis, alterare & concoquere: expultricis deniq; aliena & superuacanea expellere: id quod satis superq; à Galeno demonstratum uidetur, quum in alijs locis, tum uel maximè in commentarijs de naturalibus facultatibus.

Pag. 567.

Vertit in hunc modum: cui ceteri interpretes suffragantur: Et ob id sanguini facillimū est carnem fieri: difficillimū uerò membranz, & neruū, & uenæ, & tunice. Græcè legitur: *ἡσυχία καὶ ὑπὸν καὶ στερτορ καὶ ἰγναία*. Quod est uertendum: Idcirco facillimum quidem sanguini, fieri carnem: difficilissimum autem membranā, & ueruum, & uenam, & arteriam, & tunicam. Docet quippe eo in loco Galenus, ipsas particulas solidas uix posse confici ex sanguine, carnem autem facillimè: cum nimirum illæ quidem, à semine: hæc autem à sanguine, originem nanciscantur.

Pag. 582.

Contrinetur autem in testibus seminaris humor. Et paulo post: Trahitur igitur etiam testes seminarium humorem. Vtrobique autem græca

exemplaria habent: *ἡσυχία καὶ ὑπὸν*. hoc est: humor ferofus: qualis certè genitrix ipsa existit, & præcipue quæ in sinistram descendit testem: cum uidelicet sinistram uas seminarium oritur ab emulgentē uena, quæ serofissimū sanguinem uelut ad renem sinistram, ut illic expurgetur.

Lib. II. de semine.

Pag. 590.

Corn. Possè autem Hippocrates etiam opinatus est, ex utrisq; permixtis unum perfectum semen fieri, etiā si hoc ita esse impossibile sit. Græcè legimus: *ἡ ἀtractορία τῶν τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων καὶ τῶν ὑποπληθύνοντων καὶ τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων*. Quod nos uertimus. Potest autem (quemadmodum existimauit Hippocrates) ex ambobus mixtis, etiam unum semen perfectū fieri. Et quæ obsecro possibilia essent, si hæc ita nō forent? Itaq; non refellit opinionē Hippocratis, sed illam potius (quod solet semper) seu Dei oraculum, & recipit, & amplexatur.

Pag. 602.

Non tamen impossibile est animo concipere tale temperamentū animalis corporis, ut perfectum animal generet absq; alterius cōmissione. Græcè autem legitur: *ἡ ἀtractορία τῶν τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων καὶ τῶν ὑποπληθύνοντων καὶ τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων*. Hoc est: ut imperfectum generet. Quam lectionem probandam esse indicat sequens dictio, quæ ita habet: Animal tamen perfectum in seipso concipere, uerè difficile est. Aduertat item candidus Lector, passim in cōmentarijs de semine, Cornarium et alios, quod est in Græco, quodq; semineū significat, uertere nobis muliere.

Pag. 620.

Apparet ex his quatuor uasis, quæ appellatur umbilicū, simulq; meatum iuxta uragon constitunt, &c. Græcè legimus: *ἡ ἀtractορία τῶν τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων καὶ τῶν ὑποπληθύνοντων καὶ τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων*. Quæ sonant: Appar et enim ex his quatuor uasis, quæ iuxta appellatur umbilicū, unū cum meatu, qui ad urinaculum est, coeunt.

Lib. de instrumento odoratus.

Pag. 654.

Lvdouicus Bellisarius: Ealy quæ de foraminibus dixit aperti solitis, quanq; non intelligentiū fugiunt, &c. Græcus codex habet: *ἡ ἀtractορία τῶν τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων καὶ τῶν ὑποπληθύνοντων καὶ τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων*. Quæ ita uertenda sunt: Ceterū qd ab eo dictum est de refectione meatuum, impossibile quidem non est.

SECTIONIS PRIMÆ PARTE SECUNDA.

Lib. II. de anatomicis administrationibus.

Pag. 64.

Andernacus: Quod ungues igitur ex prædictis omnibus coalescant. Græcè: *ἡ ἀtractορία τῶν τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων καὶ τῶν ὑποπληθύνοντων καὶ τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν ὑπερπληθύνοντων*. Hoc est. Quod igitur prædictis omnibus ipsi ungues accreticāt.

Lib. III. Pag. 76.

Andernacus: Amplè magnitudinis porrigi

neruos diximus. Græcè: *ἡ γὰρ τῶν νεύρων ὁρὴ ἐστὶν*. Hoc est: magni feruntur nervi.

Pagina 78.

Detectis enim plurimis iam brachij partibus, reliquos duos nervos, propter internam ipsius regionem, conspicis: in quam etiam prædicti tres paulo inferius, quam tertius nervus est, inferuntur. Græcè legitur: *ἡ γὰρ τῶν νεύρων ὁρὴ ἐστὶν ἡ ἐν τῇ ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Hoc est: Nudatis enim iam plurimis brachij partibus, reliquos duos nervos iuxta ipsius regionem internam (in quam etiam prædicti tres inferuntur) expende, paulo inferiores, quam sit tertius nervus.

Pag. 90.

Manu autem immissa, interceptenda est. Græcè: *ἀντὶ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Hoc est: Demitti autem manum, intercepti: est: subaudiendum, oportet. Vult fiquidem, ut manum liberè demittamus, ac sic pendulè excipiamus uinculo, ad hoc ut uenæ exactè promineant: id quod hodie etiam in quotidiano est usu.

Pag. 102.

Omnia latina exemplaria ob typographorū inaduerentiam sunt depravata. Habent enim: Mox alia penitus grandis: cum penitus legendum sit: quandoquidem græcè legitur, *ἀντὶ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ*.

Lib. vi. Pag. 175.

Andernacus: Quam possibile est solius peritonæi facere. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Hoc est: Quod equidem uerterem: Quam possibile est à solo peritonæo fieri. Constat namque eam futuram abdominis, à nervis illis peritonæi filamentis constari.

Pag. 185.

Gulosi uerò & timidus inest magnus secur & multitudine, aliter quidem affectus. Græcæ codex excusus habet: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Sed in quodam antiquissimo legitur: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Hoc est: Diversum autem contrarij. Atque ita legendum esse, nemo tam obtuso ingenio est ut non uideat.

Pag. 187.

Hoc autem sub tenui tunica aperiri evidenter apparet. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Quæ sic uerterem: Perspicue autem hoc sub tenui comprehensum tunica apparet.

Lib. vii. Pag. 197.

Andernacus: Non tamen ipsi cordis corpori pericardios hæc tunica connexa est, uerum in alijs omnibus & laud parua quædam regio intermedia est, motui cordis accommodata, ad basim ipsius, quæ, ut est expositum, orbicularis est, prodeunibus ex ea uasis connexa. Græcè legitur: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Id quod uertimus: Non tamen ipsi cor-

pori pericardios hæc tunica connexa est: uerum circa alias quidem omnes illius partes, haud parua quædam regio intermedia est, motui cordis accommodata: ad basim uerò suspensus, quæ sanè (ut iam exposuimus) est circulus, exortis ab illo uasis annexitur.

Lib. viii.

Pag. 232.

Andernacus: Quæmadmodum etiam si in contractione thoracis per sectiones inaniti, ære extrinsecus illapso, eas obtureris, respirabit confestim animal. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Quod sic clarius uertitur: Quæmadmodum si in contractione thoracis inaniti, ære per sectiones elapso, obtureris ipsas sectiones, respirabit, uocemque edet confestim animal.

Pagina 241.

Nam intercostalibus muscularis uehementer hoc tempore protensis. Græcè autem legitur: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Hoc est: Contractis, aut, concludentibus.

Pag. 248.

Quæ manifestam sui inspectionē efficit. Græcè legitur: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Hoc est: Manifestam per se inspectionem facies. Quibus uerbis Galenus significat, ubi per anatomen, costas succingens membrana, sola & simplex relictæ fuerit, nempe liberata à costis & muscularis: facili nos per ipsam, seu per cornu quoddam aut utrum, inspecturus interna uiscera.

Ibidem.

At manifestior adhuc speculatio fit, quum in diaphragmate nudato, peritonæi uertex auitur. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Nempe: Manifestior autem adhuc fit speculatio per diaphragma nudatum, ubi peritonæi uertex auitur fuerit.

Lib. ix.

Pag. 251.

Andernacus: Dum igitur membranz cerebri plexus ossibus quæ ambiunt detegis, subinde quippiam abrumpitur. Græcæ codex habet: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Quod est: Interim enim dum exuuntur à circumiectis ossibus, ipsius meningis plexus, speculatio quippiam abrumpitur, diuelliturque.

Pagina 255.

Atque ipsius usum simul inspicendo nudabis. Græcè legitur: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. Quod est: Nulla autem iam superest. Quam lectionem si non recipias, tota Galeni sententia abrumpitur, uixque intelligi poterit.

Pag. 414.

Ad illa. Græcè legitur: *ἡ γὰρ τῆς ἐνδοκάρδιᾳ τῇ ἐνδοκάρδιᾳ*. quod est: per illam regionem.

Pag.

Page 418.

Et paulò minus alba. Græcè habetur: *αὐτὴ μικρὸν ἁλιώτερη*. Hoc est: Et parum abest, quin alba.

Pag. 401.

Cum tamen neque intestinum quodvis co-
quendi alimentis, neque uenae sanguinis gigen-
di gratia extiterit. Graec legimus: *παρα το
ντοπος της τροφης εν τοις εντερις*. Quod
est uertendum: Neq. uero ullum in intestinorū gra-
tia concoctionis est condurum: neq. gratia san-
guificationis, ulla uenarum.

Page 614

In transversos & rotundos uillos dissoluen-
dam, Vbi græcè legitur: *αἰνὰ τοῦ πατρὸς*. Hoc est: re-
solutam.

Lib.v. Pag. 447.

Omnes Latini codices sunt mendosi, in quibus legitur: Ne quod inferiorum intestino externo aliquando indigeret auxilio. Est siquidem legendum, intestinorum.

Lib. v. l. Pag. 477.

Quod uerò deinceps est: Simul cum particulis quæ ipso thorace continentur, agemus facinus esse scribere arbitrai, in hunc librum diffusimus. Græce legimus: τὸ δὲ αὐτῶν, οὗ τοῦτο θώρακος περιέχοντες ἀνεστρέφουσιν ἐπὶ τῷ ὅλῳ σώματι. οὕτως, ἡ τὴν τοῦ σώματος ἀνάλυσιν. Quod sic sanè uertendum est: Quod uerò reliquum erat, facinus esse putamus, si id inter eas partes conscriberetur, quæ in thorace ambiuntur, ipsum in præsentem cōmencium diffusimus.

Page 479

Concentum esse respirationis. Græcè habetur:
ἡ ἀπὸ τοῦ πνεύματος ὁρμή. Hoc est. Eundem concentum.

Pag. 481.

Molles enim quum sint hi, ac tenues, longo intervallo secundum rectitudinem tendantur, maximam præterea particulam à seipsis pendente[m], uentriculum scilicet, habet, quem cibo compleri subinde oportebat: ab ipsiis tum mole, tum pondere ten[s]i asidue, facile disrumpere[n]tur. Græce habetur: *παλαιὰ γὰρ ἔστιν ταῦτα, ἡδὲ ἀσθενεῖ, ἡδὲ καὶ παλαιὰ ἔστι ἀπὸ τροφῆς, ἡδὲ ἀπὸ πολλοῦ ἀσθενεῖς αἰσθάνονται, καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἀσθενείαις ἀσθενεῖται, καὶ οὐδὲν ταῦτα ἔστιν ὅτι καὶ βαρὺ ἀπὸ τροφῆς καὶ ἀσθενείας, βαρὺ δὲ ἀπὸ τροφῆς. Quæ sic nobis transferenda videntur: Hi enim molles ac tenues quum sint, si etiam longo intervallo secundum rectitudinem tenderentur, maximam præterea particulam à seipsis pendente[m] habentes, uentriculum scilicet, quem subinde compleri cibo oportebat: certè ab ipsiis tum mole, tum pondere asidue ten[s]i, facile disrumpere[n]tur, &c. Nam quod si nervi minimè secundum rectitudinem producantur, indicat sermo superior, ubi Galenus sic ait: Adde huc, quod nervi qui à cerebro in uentriculum iuxta hominam deferuntur, obliqua viâ tutior multo erat futura, quàm recta.*

Pag. 401.

Quem sanguinem appellant. Græcè habetur:
ho ai pavialis dei pñsionis. Hoc est: quem sanguifi-
cum uocant.

Pag. 611.

Post autem idipsum, Græcè *ἐπὶ τῷ αὐτῷ*, Cate-

rdm cum nihil aliud qudm spiritum referat, nos certē (quem postea) vertimus.

Page. 111.

Per anastomofin applicuiflet. Græcè legitur:
ἀναστομῶν. Hoc est: aperuiflet.

Lib. VII. Pag. 545.

Nicolaus Reg. Si omni natura cartilago fuffet nudata, Græcè habetur: *de potius potius* *de 2. de 2. de 2.* Sed legendum est *potius*, ut uertamus: Si cartilago naturaliter effiet nudata.

Lib. 1 x.

Pag. 615.

Nicolaus Reg. Quæq; in ea est, membranæ pericranium. Græcè: *τὸ περιεγκερικὸν μεμβράνη* pericranion. Quod utiq; uertendum erat: Quæq; ex ea oritur pericranion membranæ. Nemo siquidem nescit ex crasso cerebri inuolucro, per cranij suturas clapso, pericranium ducere originem.

Pag. 617.

Atque ita rursus superiori parte diuissio unio-
nis ipsorum. Græcè: *ἐν τῇ ὑψηλῇ ἁρμονίᾳ, ὅθεν
ἐκείνη ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ. Quod nos uertimus: Atque
ita rursus diuissio post eam, ante unionem qui-
dem ipsorum, &c. Galeni quippe sententia est,
neruos illos uisifcos, priusquam crassa menin-
ge excidant, conspirare in unum: diuicari au-
tem, ubi illam fuerint elapsi: præterea, ante coitum
ipsorum, pelum quandam constituere,*

Pag. 647.

In omnibus animalibus primi hi nervorum omnium sunt aut durissimi. Græce legimus: *Αὐτοὶ τῶν νεύρων σφόδρα τὴν ἰσχυρίαν, ἀπὸ τοῦ ὅτι ἐκείνην ἔχουσιν*. Hoc est. In universum autem, ex nervis ipsi, hi existunt primi, qui aut exquiritur durus, &c. Nam dicere nervos septimæ coniugationis esse nervorum omnium durissimos, hominis planè est in anatome minimè exercitati: cum liquidè constat, nervos omnes, qui ab ipsalini oriuntur, medulla esse longè duriores exire.

Pag. 600.

Neque perforatum. Græcè: *ἀγὶ διὰ τὸ ἄσπαστον*. Sed *ἀσπαστον* est legendum, uertendumq;: Et quod comminui non possit.

Page 651.

Qui uero ad ossa maxillæ inferioris magnos dentes taliter penetrant, &c. Græcè habetur : ὁ οὐδ' ἐκ τῆς αἰσθητικῆς τοῦ πνεύματος τῶν δεινῶν τοῦ σώματος. Quæ sonant : Quantum uero ex ipsis ad ossa maxillæ inferioris magnos prætergrediuntur dentes. Quæ lectio ex lententia subdita etiam colligi poterit.

Ibidem.

Propagines recipiunt per eam quidem uiam,
quæ per genam fert, quam paulo antè indica-
uimus, male confusâs & magnas: gingi-
umy aliæ quidem maiores, aliæ uerò minores:
omnes tamen tenues ac uix cõspicuas accipit,
uelut & longi dentes. Græcus codex habet: *ἀν-
αφύκη καὶ ἀνὰ τὴν ἀκρὴν τοῦ ὄντος τοῦ ὀπίσ-
θου τοῦ ὀπίσθου τοῦ ὀπίσθου*, ὅτι πάλιν καὶ ὁ γινῶν
ἐν τῇ αὐτῇ τῇ αὐτῇ τῇ αὐτῇ, ἀνὰ τὴν ἀκρὴν τοῦ ὄντος
τοῦ ὀπίσθου τοῦ ὀπίσθου τοῦ ὀπίσθου, ἀνὰ τὴν ἀκρὴν
τοῦ ὄντος τοῦ ὀπίσθου τοῦ ὀπίσθου τοῦ ὀπίσθου.
Hoc est: Recipiunt propagines per ge-
nam regionem, quam paulo antè indicaui: ce-
terum molæ quidem, confusâs & magnas: æ-
tingidum autē, hæc quidē, minus: hæc uerò, magnæ

conspicuas: omnes tamen tenues, obscurasq,
tum gingivæ, tum cliquæ dentes.

Pag. 658.

Tres enim sunt omnino capitū figuræ. Græcè: *τρία τὰ κεφάλια τῆς σαρκὸς οὐρανίου*. Quod est: Ipsorum autem universæ figuræ sunt tres, &c. Agebat autem de capitibus fastigiatis, quorum figuras ait esse tres: nempe unam, ubi utraque eminentia, anterior uidelicet & posterior abest: secunda, ubi anterior tantum: tertia denique, ubi posterior duntaxat est exoluta. Quod si de universis capitis figuris Galenus impræsentiarum egisset, præter has tres, annumerasset etiam naturalem figuram, atque ad eò complures alias se præter naturam habentes.

Lib. x. Pag. 664.

Nicolaus Reg. Quocirca mediū sive uetū ad ipsum crystallinū. Græcè habetur: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quod nos uertimus: Ac proinde mediū in ipso uehitur crystallinus humor, &c. Ait itaque non uitreum humorem in crystallino, sed crystallinū in uitreo, ueluti semicretam spherā in aqua (hac enim uirtutem Galenus analogia) naturæ: id quod licet uide re manifestissimè. Siquidem crystallinus humor instar glaciæ est cōpactus: uitreus autem humidior est, ipsamq; aquam refert. Ob idq; in eo crystallinus uehitur, ueluti globus semicretus in aqua.

Ibidem.

Atq; etiam ophthalmia laborantes lux quidē offendit, eosq; deprehendit. Græcè: *ἀλλὰ καὶ τῶν οφθαλμῶν τῶν ἀπὸ τοῦ ὕδατος ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quod clarius uertitur: Quin & lippitudine laborantes redarguit quidem splendor, ac lædit.

Pag. 675.

Cū igitur opifex nostri providere uellet, ut qua est foramen hoc, tunica cornea humorem crystallinum aliquid non contingeret. Græcè legitur: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quod est uertendum: Vt igitur necper hoc foramen cornea tunica aliquando crystallinum humorem tangeret, cū prospexisset conditor noster, &c. Non prospexit siquidem ut aliquando non tangeret, sed ut nunquā crystallinum cornea contingeret: quemadmodum reuera non tangit, nisi dum ipsius oculi fabrica omnino labefactatur.

Pag. 679.

Aceruati sui omnes suis aponeurosis. Græcè: *ἀπὸ τῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς οὐρανίου*. Quod est: Dissoluti autem omnes in filamenta nervosa.

Lib. xi.

Pag. 711.

Nicolaus Reg. Quod si magni sint. Græcè: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Hoc est: Quoniam magni existunt.

Pag. 714.

Omnia Larina exemplaria habent, ad palatū columnam. Græcè legitur: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quod est: iuxta palatum atq; columnā.

Pag. 741.

Qui igitur hic quoque natura contraria uni-
ri inter se posse deservauit? Græcè: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quod ego sanè uerteter: Quo pacto igitur

hic quoque natura contraria inter se murō uni-
re constituit?

Pag. 746.

Tum quod ex basi capitis est, quæ dura esse oportet. Græcè: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quæ sonant: Quodq; ex ipso sit, quæ basi capitis insunt, quæq; dura esse expediebat.

Pag. 747.

Ante hos uerō tertium. Viri legendum est: ante hæc uerō tertium: cū ille articulus referat duo nasi ossa. Similiter paululō inferius, ubi uertit Nicolaus Regius: supra quos alij sunt duo: legendum est: supra quæ alia sunt duo: cū nimirum etiā illi articuli manifeste referant ad ossa.

Lib. xii.

Pag. 767.

Nicolaus Regius: Ob idq; erat necesse quosdam ei parte anteriore apponere. Græcū codex habet: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quod uertimus: Ac proinde necesse erat quosdam ipsis parte anteriori opponere musculos.

Pag. 771.

Mortis enim & sensus omnium partium infernarum læduntur læso spondylo. Græcè clarius habetur: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Hoc est: Motus enim & sensus omnium particularū, quæ sub læso spondylo constitunt, uitiantur.

Pag. 778.

Via autem omnis, quæ est inter primam productionem, & finem ultimæ. Græcè habetur: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quod nos uertimus: Via autem quæ est inter primam productionem, & infertionem ultimam, &c. Quandoquidem eo in loco Galenus summam uir secut: tatem commendat, quæ ducit nervos à prima productione ipsorum, quæ fit ab spinali medulla, usque ad particulas in quas inferuntur.

Ibidem.

Ad posteriores siquidem partes spinæ os at-
rinet: quo loco cartilago quimplurima ei circumiacet. Græcè legitur: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quod sic potius uerteter: Quatenus autem ad posteriores fines uergit os quod acantham uocāt, eatenus ei cartilago plurima circumducitur.

Pag. 782.

Nisi quod in thorace quom costæ non solum eis sint, &c. Græcè: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quod est: An quod in thorace, quom costæ non solum eis essent articulatz, &c.

Lib. xiii.

Pag. 791.

Nicolaus Regius: Apparet enim perspicuū, quod nō præstitit ab utroq; ipsius sine nervos quouis producere, ob id fuisse pertusum. Græcè habetur: *ὅτι διὰ τὴν πύξιν ὁ ὕδαρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ οὐρανίου*. Quæ sonant: Apparet enim perspicuū, quod nō præstitit per utrumq; ipsius finem aliquem necruum

neruū producere: ob id ipsū fuisse pertusū.

Pag. 797.

Quemadmodum & alijs omnibus eius loci
spondylis propagines quasdam exiguas mittit,
quomodo & reliquis coniugationibus nervorum
qui sunt in collo. Græcè: *ὅτι οἱ τοῦ ἀλλοῦ ὅλκον*
τοῦ τοῦ ἐκείνου, ἀπορροῖ τὰς ἀπὸ τοῦ ὅλκον, ὅ
μοιως τοῦ ἀλλοῦ τοῦ τοῦ τοῦ τοῦ τοῦ τοῦ τοῦ
Quod est certè: Quemadmodum & alijs omni-
bus eius loci spondylis propagines quasdam exi-
guas mittit, quo modo & reliquis coniugatio-
nibus nervorum qui sunt in collo.

Pag. 800.

Quas à spinali medulla nervos recipere præ-
stiterat, Græcè legimus: *ἐκ σπονδυλίου καὶ κατὰ σπον-
δυλίου τὰ νεύρα ἀναβαίνειν*. Hoc est: Quas à spina-
li medulla colli præstiterat nervos recipere,

Pag. 811.

Porro à scapulæ processibus superna quidē,
quæ est ad summamque humeri (quam quidem
à corui formâ forma *scapularis* nominant) in-
terna verò, &c. Codex quidam vetustus habet:
capitulum scapulæ superius dicitur à corui et dicitur
superius à corui et dicitur *superius à corui*. Quod
sonat: Porro à scapulæ processibus superio-
ribus, eo quidem, qui est ad summamque hume-
ri (quem illi coruiformem appellant) externo
verò, &c.

Pag. 814.

Qui ortus máxima ex parte costæ imz scapulae. Græcè: *ὁ ὀρτὸς τῆς πλάτης μικρῆς τῆς σπονδύλου ὑποκτύφου κατωτέρῃς*. Quod nos uertimus: Qui ortus à maxima parte inferioris, quod in scapula est, lateris.

Ibidem paulo inferius.

Qui ex inferiore sine costæ imz scapulæ proficiſcitur. Græcè: τὸ ἀπὸ κατωτέρου ἰσχυροῦς ἐκ ταπεινότητος ἢ ἡλικίας κατωτέρου καὶ ἀλλοτρίου. Quod est uertendum: Qui ex inferiori ora lateris humilioris, quod in ſcapula eſt, proficiſcitur.

Pag. 516.

Fertur ad humerum. Græcè legitur *ῥάσις*, hoc est, dorsum. Et paulò inferius, Nicolaus Regius uertit: hoc quidem maxime trahit: cùm uertendum fuisset: hunc, scilicet humerum, maxime trahit.

Lib. xccc Pag. 811.

Nicolaus Regius: Quæ propter corporis Imbecillitatem, aut uitam omnino breuissimam. Græcè legitur: *ita dicitur de rebus et de hominibus* *hæc est uita breuissima*, sed legendum nō *ita*, sed *de* uita ueritatem: Quæ ob corporis imbecillitatem uita: exquirit breuem sortitur. Quippe sententia Galeni est: quæ ob corporis imbecillitatem, admodum breuis uite futura erant, aut prædant sortioribus: ijs animalibus remedium affidui intentus excogitasse naturam, nempe fecunditatem generari ouis.

Pag. 818.

→ Verum (quod nuper diximus) femina in motu est imperfectior, mas uero perfectior. Græcè: ἀλλ' (ut apertum erit) ἐν κινήσει ἀναισθησιώτερη ἄνθρωπος, ἢ ἄνθρωπος ἐν ἀκίνησει ἀσθησιώτερος. Quod est: Ceterum (quemadmodum est nuper dictum) quod

imperfectius mouetur semen, sit femina: quod
uerò perfectius, mas.

Pag. 812.

Habet enim is dextro plures flexus urriciformes. Græcus codex antiquus: ἡ δὲ δεξιὰ ἐστὶν ὑψηλὴ καὶ ἀκριβὴς καὶ ἀκριβὴς. Quod est: Etenim sinistè dextro est frigidior.

Pag. 811.

Siquidem fieri potest, ut etiam si initium a for-
mina sit profectum. Græcè: *ἡ ἀρχὴ ἀπὸ τοῦ τέλους*
ἔστιν ἀπὸ τοῦ τέλους, id est, *ἡ ἀρχὴ ἀπὸ τοῦ τέλους*. Hoc est: Procedente
enim principio a formina, fieri aliquando po-
test. &c.

Pag. 116.

Propagines quædam ad matricem rectâ se-
runtur. Græcè: *επι το μητρικόν*. Hoc est: ad
matricem quæ directo est sita.

Pag. 818.

Fieri uon potuit quin naturæ artem admiretur. Græcè: ἀδύνατον ἄρτι πρὸς τὴν φύσιν εἶναι τὴν τέχνην ὑπερῆναι. Hoc est: Impossibile est, quin ibidem artē naturæ admiretur.

Pag. 141.

Infans autem matrici & corpora musculosæ.
Græcè: *ἡνελ αἰνὴν καὶ ποῖδα σπέρματα*. Quod est uer-
tendum: Infans autem ei uas musculosæ corpo-
ra. Quandoquidem articulus ille, non matri-
cem, sed spermaticum uas, de quo nimirum Ga-
lenus agebat, refert.

Lib. xv. Pag. 857.

Nicolaus Regius: Hæc membrana omnibus
matricis partibus, quæ sunt intra orificia, subij-
citur. Græcè: *ἡ τοῦ πύθου τοῦ πατρὸς ἑστὶν ὑπὸ
τῶν ὀφθαλμῶν ἐκτεταμένη*. Quod est. Atque om-
nibus matricis partibus, quæ inter orificia con-
sistunt, duplex subijcitur.

Eadem pagina.

Ex uero paululum progressu. Græcè: *apud
Heraclitum*. Quod est: progressa autem parum
ut sensus sit, matricis uasa (non radices arborum,
quemadmodum arbitratur interpretes) paululū
progredientia, per coniugationem coalescere.

Pag. 868.

Ac si ter aut quater non continuo excidens
non fuadificetur, eo certe modo accideret
ex quadringenis, uerbi gratia, fortibus centum
pediri. Quare legitur : *dalet de pio uero glie, de uerba
dalet uerbalet dalet dalet uerbalet, omniaque de pio
dalet uerbalet uerbalet uerbalet, de pio, uerbalet uerbalet
uerbalet* : unde esse effe corrupta. Ego uero sic illi
queritum : Cuius est ex tribus aut quatuor
non eodem excidentibus fortibus, unus impedire
tur, contineret et uirgo sic, ex quadringenis, uerbi
gratia, centum profus exingui.

Lib. XVI. Pag. 879.

Nicolaus Reg. Affusa autem ficiis corporibus ac tenuibus, ut ipsa perpetuo pinguedinaria uae humectet, quae celeriter in diuturnis indejce, ac uehementibus laboribus, et calidioribus immodicis exhalat, atque indurefcit, &c. Quo in loco interpretes id pinguitudini tribuit, qd de corporibus tenuibus & ficiis intelligendū est. Ait namque Galenus: quandoquidem talia corpora facili per labores & excitationes indurefcunt (qd uerba illa, *ἐκκαταρτίζονται καὶ στερεοποιούνται* plane uobis

declarent) naturam illis seu remediū quoddam,
pinguitudinem adiunxisse.

Pag. 904.

Quodcirca & arterie productio, quæ in dextrâ
renem prorsumpit, produciatur ab arteria (superi-
ore) ea quæ ad sinistram it. Græcè habetur: *αὐτὸ δὲ
ἀπὸ τοῦ ἀνωτέρου ἀρτηρίας δεξιᾶς αὐτὴ ἀφ' ἧς αὐτὴ
ἀπὸ τοῦ ὑποτέρου ἔχει τὴν ἐν τῇ ἀριστερῇ ἰστίαν*. Quod ver-
ti debet: Atq; arteriæ productio, quæ in dextrâ
renem fertur, superiorem libet exortum, quàm
illa quæ ad sinistram tendit.

Pag. 911.

Tum à parte posteriore in anteriore. Græcè *ἀπὸ τοῦ ὀπίσθεν εἰς τὸ πρότερον*. Hoc est, ab anteriore ad posteriora.

Lib. xvii. Pag. 918.

Nicolaus Reg. Quod si ipsam primū mouēs
(quod est princeps animæ facultas) reflexerit,
mufculi rationem in instrumentū habebūt: fin ad
os quod ab ipsis mouetur, non, sed hanc effecto-
ri habebūt rationem. *Græca diffio accuratius*
mentem Galeni exprimit: ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς πρῶτον
(ἐν τῷ 2^ῳ βιβλίῳ τῆς ἀνατομίας) ὁ πρῶτος κίνησις τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ
καρδιακοῦ ἐν τῷ 2^ῳ βιβλίῳ τῆς ἀνατομίας καὶ ἐν τῷ 2^ῳ βιβλίῳ τῆς ἀνατομίας
καὶ ἐν τῷ 2^ῳ βιβλίῳ τῆς ἀνατομίας. Hoc est: Ad primū igitur mouēs (que prin-
ceps animæ facultas existit) mufculi comparati,
instrumentū rationem obinēt: ad os autē, quod
ab ipsis mouet, et illam, et rationē etiā opificis.

Page. 919

Quoniam autem nonnulli corporū elementa esse substantiā omnino posuerunt, ut naturae artificio coniungi nequeant. Graecē habetur: *οὐκ ἔστιν ἡ φύσις τῶν στοιχείων συνθετὴ καὶ ἀσυνθετὴ ὅμοια*, ut exemplum sit diuersae vires potest. Quae sonant: Quandoquidem nonnulli elementa corporum: quia substantiā in incho. constituerunt, ut coalescere naturae artificio non possent.

Pag. 914.

1. Licet autem ipsam perspicuas naturam uel ex
ipsis hominibus. Græcè: *ἡ δὲ αὐτὴ φύσις ἀπο-
δείκνυται ἐκ τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων*. Quod est: Cernere au-
tem nunc licet quandam ratiocinatricem natu-
ram, uel in ipsis etiam hominibus.

Pag. 916.

Neg (quod dixi) contraria de ipsius uniuersi
elementis opinio, quam temere quidam posue-
runt, iniunctis. Quae oratio aurea grammaticum
offendit. Græcè autem legitur: *οτι εστιν αληθινον*
αυτων οτι ανθρωποι ειναι παντες νεκροι, &c.
&c. Hoc est: Nisi (quemadmodum dixi) refragetur
aliqua opinio, de elementis uniuersi conce-
pta, &c. *ανωριστοι* siquidem esse resisteret, refraga-
ri, relucisceret.

Eadem pagina.

Non igitur soli medico opus de Vfu partium
est utile, sed multo certè magis medico philoso-
pho, qui totius naturæ scientiæ fructus sibi com-
parare, cumq; oportet his sacris initiari. Gregé le-
gitur, *qui non eruditus non videtur esse naturæ*. Quod
nos veritatis: lucta cuius indagatio nos con-
senescere oportet. Licet etiam ad verbum redde-
re: In cuius quidem indagine oportet nos diem
ultimum claudere.

Page 918.

Omnia latina exemplaria habent, vel iaculis
infixa: forte ob inadvertentiam typographi. Le-

gendum est, infixis.

Lib. III. de placitis Hippocratis &

Platonis. Pag. 970.

ADNENACUS. Cōmuniter reliqui luciferi uidentur. Felicitas: Plerique omnes uerō in hanc sententiam propendere ac ferri mihi uidentur. Graeci codices impressi habent: *αυτοί οι πυρ άκτωρες οι άρμενοι πρὸς τοὺς σφες*. Ceterū uetus quidam habet uon *αυτοί*, sed *αὐτοί* *πυρ*. Hoc est: Cōmuniter autem mihi uidentur liomines. Atq; ita legendum esse, in primis codicē illa Galeni praecedens dicitur, *αυτοί τῶν πυρ άκτωρες οι άρμενοι πρὸς τοὺς σφες*. Hoc est: Cōmunem imprænarum incinationē appellauit Chrylippus, cōmunem hominum opinio nem.

Pag. 277

Nisi clarè Homerus in his percenset. Felicianus: Nisi his carminib. Homerus exprimit. Græcè: *ἂν μὴ εὐφροσύνην τῶν πομπῶν ἐκείνων*. Sed corruptè legitur *ἂν μὴ, ἀντὶ τῶν πομπῶν*. Itaq. uertendum est: Clarè Homerus (ut arbitror) in his percenset.

Lib. 51. Pag. 1090.

Andrenax. Sed temporis spacio animal offenditur, iecore in totius corporis rabem (quasi atrophiam vocant) & pallorem elaugescente, Feliciacis: Iecore enim debilitato, sensim animal, moriens temporis, laxionem in alimento & colore contrahit. Γενεσις δὲ τῆς νόσου διὰ τὴν ἀσθενείαν τοῦ ζώου. Quid ne uertimus: Sed reposita spacio animal laxitur, nutritiisq; usu non promouetur, ac pallidum contrahit colorem, iecore male affecto.

Page 1099

Maxima autem fides, sicut nullum humorem
in animalis particularum nutritionē cordi præ-
parare, sed ipsum universam eius speciem abso-
luere, quod una fit uena quæ ex iecore aut corde
procedat, altera uero non item contrā enascatur
ex alia ipsorum parte, quæ elaboratū humorem
in totum corpus deductat. Felicius: Iecur uero
nullum humorem in alimentū membrorum anima-
lis cordi præparare, sed ipsum totā humoris for-
mam perficere, inde argumentū maxīmū habere
possumus, quod una tantū uena cernitur à ieco-
re ceu à corde exoriri: neg alia quæpiam ex alia
parte seu iecoris (seu cordis) extat, quæ hu-
morem ipsum & succum iam concoctum in totum
corpus semel traducat. Vterq; autem ipsorum co-
ctus est cum mendoso codice hallucinari. Legi-
tur autem in uetustissimo quodam: *et placeat
quod si ubi fit iecur, et ubi nonnulla impuissimè, triquæ
pauca et inuicem nonnulla pueri, aut et itaq; dant
pauca et ubi nonnulla, &c.* Quæ nos conuertimus: Quod
cum una fit uena quæ ex iecore in cor procedit,
nulla alia enascat ab altera ipsius cordis parte,
quæ elaboratū humorem in totū corpus deductat.

Lib. VII. Pag. 1116.

Andernacus. Merito igitur generatur hic spiritus in cerebri uentriculo. Felicius: Verissimilius igitur est spiritum hunc in cerebri uentriculis oriri. Græcè legitur: *ἀνδράκων ἀνὰ γαστήρ* καὶ *ἐν τῷ ἐνδομυῖν* καὶ *ἐν τῷ ἐνδομυῖν* καὶ *ἐν τῷ ἐνδομυῖν*. Hoc est: Rationi autē est consonum, hunc spiritū gigni iuxta uentriculos cerebri, &c. Etenim animalis spiritus, non

SECTIONE
SECUNDA.

nō in ventriculis cerebri, sed in plexu retiformi, qui iuxta illos est, gignitur: unde in ventriculos eructatur, ut illinc, veluti ex quibusdā fonticulis emanans per nervos, universis animalis partibus morum atque sensum largiatur.

Pag. 1146.

Quemadmodū gustus humores, Felicianus: Sicuti succos gustatus. Græcè legitur: *αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον*. Hoc est: Quemadmodum gustus sapores. Aut enim visum colorem sentire, perinde ut gustus sapores percipit.

Ibidem.

At coloratum corpus simulcum eo cognoscit, quemadmodum gustus quod humores obtinet. Felicianus: Cū illis utroque postea coloratum corpus, sicut gustus id quod succos in se habet. Græcè: *αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Quod est: Quemadmodum gustus id quod sapores continet: *ἵππον* siquidem, non modō humorem, sed saporem etiam crebrō significat.

Pag. 1151.

Quemadmodū & tactilis sensus instrumenta sensus renuit. Felicianus: Quemadmodum nērō sensus tactus sensilia per cōcursum. Græcè: *ὁ αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Quod est: Quemadmodū tangendi sensus sensilia, per renuam.

Ibidem.

Humorū dignotio corrumpitur. Felicianus: Succorum dignotio etiam interit. Græcè: *ἀσθενεῖ τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Quod est: Corrumpitur saporum dignotio.

Pag. 1166.

Qui clarius manifestiusq; sanē quemadmodū & aliq complures, quasi non habita illius duntaxat ratione, qui à me illum accepturus erat, sed tanq aliorum quodq; imperitiorū illo manus esset peruenientur, à me esset scriptus. Cui enī suffragatur Feliciani tralatio. At græcus codex habet in hūc modū: *ὁ αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Quod est: Qui peripicue magis conuerti possunt, in hūc modū: Qui manifestus sanē mihi cōscripsit est, quemadmodum aliq plures: idip non habita eius tantū ratione, qui à me illum accepturus erat, sed aliorum etiam imperitiorū eo, quibus debebat item communicari.

Lib. ix. Pag. 1238.

Andernacus: Itaque scopi secundum quos singula hæc rectē aliquis aggrediat, omnino pauci sunt: nempe in ipsis exercitatio, quæ non parum temporis requirit. Felicianus: Fines igitur quibus singula hæc rectē aliquis tractare possit, prius pauci sunt: exercitatio scilicet, quæ tamen non paruo tempore uidetur indigere. Græcè legimus: *ὁ αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Quod est: Scopi igitur secundum quos singula horum rectē tractare quis possit, omnino sunt pauci. In ipsis autem exercitatio, haud exiguum tempus desiderat.

Lib. Num. ars tuenda sanitatis ad medicinalem artem spectet.

Pag. 4.

Ivnius Paulus: Ad neruorum tutorem, Græcè: *ὁ αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον*. Hoc est: ad illum qui neruis consuit.

Pag. 13.

Sic uertit, aut peruertit potius carmē Homeri: *Διὸς ἐστὶν αἰσθάνειν* medicus mortalibus unus. In alijs tamen exemplaribus legitur, doctior: Vtrobique autem sententia potē est corrupta, Græcè siquidem legitur:

ὁ αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον.

Cuius sententia est:

Vnicuique essentis, prius tamen omnia collent.

Pag. 44.

Duabusq; artibus præpositis lux singulæ descendit. Græcus antiquus habet: *ὁ αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Hoc est: Duabusq; artibus separatis harum singulæ inferuunt.

Lib. I. de alimentorū facultatib.

Pag. 59.

Martinus Gregorius: Deinde affigentes. Græcè: *αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Hoc est: Ac deinde circunlinentes. Monet siquidem illic Galenus, ut postea aquā cavitatem cydonij melli repleuerimus scammonio, mālum ipsum obducamus, atque circunlinamus, luto uidelicet, aut fermento: ac dein affemus. Qui modus obseruatur hodie in præparando scammonio.

Pag. 63.

Et omnium maximè per alium subsidet. Græcè: *ὁ αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Quod uerterem: Inter ceterosq; maximè per alium descendit.

Lib. xi. Cap. de fugacibus fructibus.

Pag. 102.

Martinus Gregorius: Vtuntur autem omnes ipsa (cucurbita scilicet) magis quàm alio quouis fructuum esculentorum: quod ceteris fructibus sint aridiores ac sicciore. Hoc tamen non reperitur in græco exemplari: nec uidetur etiā rationi consonum: cū cucurbitæ, nulli aut certè paucis aliorum fructuum, humidare cedant.

Pag. 128.

Læditur autem maximè ab ipsorum esu, quod aut inflammatur, aut scirrho obsideatur. Græcè: *ὁ αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Quod est: Extreme autē ab ipsarum (palmarū uidelicet) esu læditur, si obfessum phlegmone, aut scirrho fuerit. Neq; enim tam perniciosum aut esse fructum palmarū Galenus, ut ex solo ipsarum esu possit haberi aut inflammationem, aut scirrhum contrahere: at iam inflammatum, aut scirrho induratum hepar, ab usu phænici maxime obædi pronuntiat.

Lib. xii. Pag. 169.

Martinus Gregorius: Quoniam non temerè in ventriculo cuiusquā coagularur. Græcè: *ὁ αἰσθάνει τὸν ἴδιον ἵππον ἵππον*. Quod est: Ac

proinde rarò alicui fuit coagulatum in ventre.

Lib. de euehymia & cacoehymia.

Page 107.

Ferdinandus Balamius : Haud sanè exquisitis
admodum cibus uratur. Græcè: *ὁ βαλμίου τοῦ
δουλοῦ ἰσχυρὸς*. Hoc est: Nec cibus admodum exqui-
sitis indiguit.

*Lib. de cognoscendis curandisq; ani-
mi affectibus. Pag. 175.*

Bernardinus Donatus: Nec ramen illud dixerim melius esse, &c. Est ramen codex corruptus, qui sic instaurari debet: *à par de l'appel de Donatus* &c. Quod nos uermus: Nisi fortè melius esse uideatur, initio, &c.

Pag. 181.

Magnum quippe fuerit credo, si nullus eorū
moderatior in cibo & potu sumendo sit usus.
Quod si te ipsum hoc honore afficere decreueris,
&c. Græcè habetur: *αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ἡδονῶν ὁλοκλήρως ἐν αὐτῷ
ἐκτρέφεται* &c. ut magis ostendat luxuriam tuam.
Quod est: Magnum quippe non fuerit in hoc cibo
& potu illius temperantior uidearis. Sed si te hoc
honore afficere decreueris, &c. Vult namque in
loco Galeum (id quod paulo post subdit) unū
ceteros modō, sed non etiā ipsos uincamus, mo-
destius nempe, & continentius uiuentes hodie,
quā heri.

Page 891.

Pag. 191.

Ac per hoc ipsum preceptum singulis diebus
in singulis huiusce operis partibus, nos ipsos ex-
erceamus. Quod quidem cum ceteris ex pueri
disciplina contingat, alijs illis, quibus in hoc for-
tuna non fuerit, sero tandem ac ratione quam
expofui, contiger. Græce habetur: *αὐτοὶ δὲ ἐν τοῖς πα-
ρὰ τοῦτο ἡμέραις ἀναπαύσαντες ἑαυτοὺς ὑποτάσσονται τῷ
κατὰ τοῦτο ἡμέραις, ὅτι καὶ τὸ πνεῦμα τοῦτο ἐν τοῖς ὁσίοις
τοῖς τοῖς ἀνθρώποις ἀναπαύσαντες ἑαυτοὺς καὶ τὸ πνεῦμα τοῦτο ἐν τοῖς ὁσίοις
τοῖς τοῖς ἀνθρώποις ἀναπαύσαντες ἑαυτοὺς καὶ τὸ πνεῦμα τοῦτο ἐν τοῖς ὁσίοις*
Quod est utendum: Ceterum si operi-
bus particularibus circa hæc præcepta singulis
diebus se exerceant, quod quidem ex prima edu-
catione conningit ceteris, id infelibus illis po-
tiora tandem cōtinget ac, quam expofui, ratione.

Page 196.

Etenim ex ijs in quibus ipsa se exercuerit, multo existit generosior. Quo in loco reddendo, interpretis est græcam phrasim secutus, quæ habet: *ἡ δὲ ὑποχρέωσις*, id quod præstiterit uertere: Eo quod se exercuerit.

Lib. I. de Sanitate tuenda.

Page 145.

Linacrer:Nempe per nares genasq. Græcè: *narē* et *palpebra*. Aut nang. Galenus, oculum explodere quicquid in eo excrementi gignitur, non per nares, fed per foramen quoddam, quod in angulo interiori oculi, iuxta nares, intra palpebras confistit: id quod in oculorum anato me satis superq. iam demonstratur.

Lib. 11. Pag. 155.

Linacra: At procedente tempore, ubi iam adoleuit. Græcè: *ἔτιν ἡδὲ πρὸς τὴν ἡλικίαν ἤρπεν*. Quod est: Vbi iam adoleuit.

Pag. 441.

Frigidi namq; fucci marcorem. Græcè: ὄψις

Hoc est: frigidi enim, sopores ac prolixiores somnos inducunt.

Lib. v. Pag. 476.

Linacer: Hæc facies, ubi naturalem plantæ habitum crura receperunt. Græcè: *ἵστος διὰ τὴν ταύτην ἀπόφασιν, αὐτὰ περιστάσεις ἔχοντα οὕτως*. Hoc est. Hęc tibi perficienti, si exactè secundum naturam se habeant crura.

Lib. I. de simplicium med. facultatib.

Pag. 181.

Pag. 888.
 Theodoricus Gerardus : Verū ei qui eodē sen-
 su cōmunicat, licet suggerere. Græcè : *αἰνῶντος*
πρὸς τὸν ἑαυτοῦ αἰνῶντος αὐτοῦ αὐτοῦ αὐτοῦ. Hoc est: Re-
 cordari autem eum, cui talis sensus fuerit cōmū-
 nicatus, possibile est. Galenus itaq; ait, impos-
 sibile quidem esse, nisi exāctè quis interpretet diffe-
 rentias astringentis, austeri, atq; acerbī saporis:
 fieri autem posse, ut recordetur illorum, ubi ta-
 lia semel gustarit.

Lib.	et.	Pag.	est.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Theod. Quod si ad id nonnulli faciat ipſius
rariſas. Græc: *οὐκ ἔστιν ἡ ἀρετὴ ἀλλὰ ἡ ποσότης αὐτῆς*. Hoc eſt: Cōducit nam ad hoc etiā ipſius rari-
ſas. Lib. iiii. Pag. 608.

Lib.rit. Pag. 698.

Theod. Diversis ramen haftenus uiribus omphacis acetiq succus constant. Græcè habetur: *διφραζα μίγνυται τῷ ἀμύγδαλι καὶ τῷ ἀέρι δι' ὅταν πρὸς τὸν αἶμα ἵσται. Quod est. Eatenus autem faculrate differt ab aceto omphacium. Pag. 699.*

Et enim ad hypochondria ardentia, præstantior est succus omphacis, quam aceti. Græcè: *ἄμικρον*. Hoc est: Præstantior est ipso aceto. Nam aceti succus non datur præter ipsum acetum. Exprimatur autem ex uva immatura, cuius cremor appellatur omphacium.

Pag. 704.

Ac partim in hac coniugatione. Græcè: *αὐτὸν καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ*. Hoc est: Atque hæc quidem, in hac temperamenti coniugatione.

Pag. 711.

Omnia saltem cuti nostrę imposita. Gręce: *παντὶ δ' ἐπι*. Quod est: Omnia igitur, &c.

Lib.v. Pag. 718.

Theod. Tanrolis ficius, quando nuncit fici-
ras, Græce habetur: *ὁ ἄνθρωπος δι' ὑπέρβατον, ὅς' ἔσται ὁ
ἴσχυρος*, &c. Quod est: Eareus aurem humidus,
quatenus ficiaras superat.

Pag. 714.

Ex familiari animantis natura fiat alteratio.
Græcè: ὁ συνὸς ἔστι τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ ζῴου.
Quæ sonant: Ex propria animali materia ipsam
alterationem fieri.

Page · 714 ·

Alia uero ex putrescente arefcentely genera-
tionem fortita. Græcè: *ἐκ τῆς σαπνύσης ἀναγεν-
νῆται γένος*. Quod est: Hæc autem, à putredine ex-
asperante ducit originem.

Lib. VI. Pag. 791.

Theod. Idcirco mihi videntur ueteres coronis ex eo plexis uiri folere. Græcè additur: *αὐτὰρ ἐπεὶ*. Hoc est: in conuiujs.

Pag. 807.

Equidem uidi puellum, quandoq; octo rotis
mensi-

mentibus morbo comitiali liberum. In græco exemplari additur: *ἡ θερμότης ἵστος ἰσχυρῆς*. Hoc est: Ex quo tempore, uel quando diu radicem ipsam gestauit.

Pag. 819.

Cæterum licet zingiber & piper album, Græcè legitur: *ῥίζη τοῦ ἀνισονίου*. Hoc est: Et piper longum.

Pag. 820.

Cui accedit & ea quæ ex salis est farinæ natura. Græcè: *ῥίζη τοῦ ὑπερῆος ἁλὸς* & *ἁλὸς ἁλὸς*, *ῥίζη τοῦ ἁλὸς* & *ἁλὸς ἁλὸς*. Hoc est: Et ea quæ ex salis est, & ea quæ ex farinæ natura.

Pag. 814.

Sicuti sanè etiam coitus semen pudendo circumlita. Græcè legitur: *ἡ ἀνὰ τοῦ σπέρματος*. Hoc est: Coitus tempore.

Pag. 843.

Sed quæ illi amaritudinis dum potatur adsunt opera. Græcè: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν τὴν ἐν τῷ ποτῶν*. Hoc est: Sed quæcumque amarissimo pharmaco, dum bibitur, adsunt opera, &c.

Pag. 850.

Quinq; partibus succi plus erat. Græcè: *ἡ πέντε μέρη τοῦ ὑδατος ἡμῶν*. Quod magis appositè uertitur: Ad utrumq; autè succi portio erat quincupla.

Pag. 866.

In semine quidem uiuentè habens qualitatè acidam. Græcè habetur: *ἡ ἀνὰ τὴν οὐρανίαν*. Hoc est: Iuxta semen, uel circum semen. At quippe Galenus id qd res est: nempe quicquid in malo Medico, siue citrio, iuxta semen adhaeret, & unde exprimitur succus, cum acore quodā siccare. Quisquidquid semen citri minimè talem facultatè fortiri, uel ex gustu intelligi poterit.

Lib. VII. Pag. 873.

Theod. Piri quidè syluestri prorum atq; absolutè amarus est: scilicet fructus. Græcè habet: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Acerbus.

Pag. 875.

Veluti & chartæ cōbuitæ cinis, nisi quatenus infirmior est, q̃ papyri. Græcè: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Nisi quatenus cinis papyri est infirmior. Cui lectioni suffragat Paulus, cuius uerba sunt hæc: Ad singula tamen papyri cinis multò inferior est. Pag. 884.

Non tamen nec reficcare, nec refrigerare manifestò potest. Græcè: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Cui lectioni suffragat Paulus, cuius uerba sunt hæc: Ad singula tamen papyri cinis multò inferior est. Pag. 884.

Pag. 887.

Caries lignorum, & maximè quæ particeps est astrictiōnis. Græcè: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Caries lignorum, eorum maxime, quæ astrictiōne sunt prædita.

Pag. 889.

Nōnullam item amarā qualitatē obrinet. Græcè: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Nōnulla item astrictiō qualitatē.

Pag. 899.

Sion quantum gustui odoratum est. Græcè: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Sion quantum gustui utcumq; aromaticum est, &c. Nihil siquidem est odoratum gustui, sed ipsi tantū olfactui. At quæ aromatica sunt, ea simul mouent olfactum & gustum.

Pag. 905.

Et nimium habet humiditatis. Græcè habet:

tur oppositum: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Et minimum habens humiditatis.

Pag. 906.

Phorbi j semine ad leucomata cum melle applicant. Græcè legitur: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Vtuntur.

Pag. 916.

Cæterū ntrialisq; in medio est spuma liri. Græcè habetur: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: In medio autem amborum est niri sapor. Nam cum paulò superius disputasset de sapore tum aphonitri, tum salis, postea subdidit, inter illos medium niri saporem consistere.

Pag. 918.

Dictum tamen paulò antè est, aphrolitrum in medio consistentem habere facultatem aphonitri & salis. Corrigi tamen co dæ græcus mendosus debet, qui habet: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: quandoquidem esse legendum *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*, hoc est, nitrum, ex capite de sale liquido constat.

Pag. 941.

Quæ in editionibus domorum, in quibus fornaces extractæ sunt, partibus colligitur. Græcè: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Quæ in editionibus partibus parietum ipsius fornacis colligitur.

Pag. 961.

Quod patientis inguinibus. Græcè legitur: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Illis.

Pag. 1000.

Capitibus maxime sale inueteratarum, ad sedis fissuras urebatur quidam. Græcè additur: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Vitis.

Pag. 1004.

Noui autè nostratiū quosdam ossa porci exhibuisse. Græcè legimus: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Noui e quidem nostratiū quosdam, propinantes humana ossa combusta.

Pag. 1006.

Porro si laueris ea, uisceribus, ignea in aqua natura deposita, ipsam efficiunt cum tenuitate calescentem, adeo ut & putrefaciat. Sed nonnumquam reliquum terrenum est, morius expere: id quod maximè implendis, cicatriceq; claudendis ulceribus humidis est utile. Græcus codex manuscriptor habet in hūc modum: *ἡ ἀνὰ τὴν ἀμάρτυριν*. Hoc est: Porro si laueris ea, uisceribus, ignea in aqua natura deposita, ipsam efficiunt cum tenuitate calescentem, adeo ut putrefaciat interdum. Reliquum uerò terrosū, morius expere efficitur, maximè implendis, & cicatrice claudendis ulceribus humidis auxiliatur.

SECTIONE

TERTIA.

Libro de causis respirationis.

Pag. 15.

Cornarius: Sic etiam circa costas musculi, quorum in medijs ipsius regionibus duo & uiginti

KK

numerantur, duo quidem primarum costarum. Græci codices antiquissimi habent in hunc modum: *ἑνὸς ἐστὶν καὶ τὰς ὑποκείμενους, καὶ πέντε τὰς πέντε ὑποκείμενους* *ἑνὸς ἐστὶν καὶ τὰς ὑποκείμενους* *ἑνὸς ἐστὶν καὶ τὰς ὑποκείμενους*. Quod est: Ex rectis ne rō, qui iuxta collum consistunt.

Ibidem.

Ex dictis uerō circa spinam musculus. Græci: *ὁ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod est: Ex rectis ne rō, qui iuxta collum consistunt.

Ibidem.

Qui demum circa superiorem uentrem sunt musculi. Græci: *οἱ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Hoc est: Qui uerō in abdomine, siue epigastrio sunt musculi. Etenim superiorē uentrē Galenus semper uocat uentriculum: Epigastriū autē, est tota illa membrana carnosa, quæ molem intestinorum continens, ex cute, pinguitudine, quatuor obliquis, duobus transversis, rōndemq; rectis musculis consistit.

Ibidem.

Violentæ uerō, tum finis humorō, tum interna mediæ costarum pars. Græci legitur: *ἡ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quæ sonant: Violentæ uerō, tum finis scapularum, tum musculorum intercostalium interna pars.

Ibidem.

Similiter autem & expirationis, inuolentæ quidem, musculi circa superiorem uentrem: uolentæ uerō, externa mediæ costarum pars. Græci habetur: *ἡ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod est: Similiter enām & expirationis, inuolentæ quidem, musculi abdominis: uolentæ uerō, musculorum intercostalium exterior pars.

Lib. I. de difficili respiratione.

Pag. 18.

Cornarius: Iuxta quas, aut neloce, aut tardæ appellantur. Græci: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod nos uertimus: Iuxta quas, ueloces aut tardi dicuntur motus. Quippe uoces illæ, *σπῆλαι καὶ ὀρθῆαι*, referuntur *ἐπὶ τὰς λείαντες*, hoc est, ad motus de quibus Galenus paulo superius egerat.

Similiter ubi paulo inferius Cornarius uertit.

Secundum quas aut magnas, aut paruas appellantur. Verrendum erat: Aut magni, aut parui appellantur.

Pag. 33.

Uolitate multum urgente. Græci habetur: *ἡ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod est: Sufficiens urgente.

Pag. 35.

Sed si uisitas multum sit exoluta. Græci: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod est: Ceterum si quæ ad usum pertinent, exoluta sufficiēter fuerint.

Ibidem.

Eius uidelicet, quæ circa expirationem con-

sistit. Græci: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod est: Eari uidelicet, quæ circa inspirationem consistunt.

Ibidem consequenter.

Quæ immodeſtia. Græci: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quæ sonant: Quæ admodum etiam immoderatio.

Ibidem.

Arque ita sanè esse, ratio ipsa poscit: repugnat autem quippiam eorum, quæ euidenter apparent. Græci legitur: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod est: An igitur sic ratio poscit, repugnat autem quippiam eorum quæ euidenter apparent? Sic autem esse legendum, atq; uertendum, indicat oratio subdita, ubi Galenus ait: Ego quidem omnia hæc cōfentienna reperio.

Pag. 41.

Nulla est autem differentia, quod ad id quod coarctatum est attinet, ut pulmo non possit, &c. Græci: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quæ claris uertuntur sic: Perinde autē est, ad hoc ut pulmo compressus non possit, &c.

Pag. 49.

Contractiones itaq; thoracis citra horū concitationem, nonnunq; magnam inspirationē facere possunt. Græci habetur: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quæ sonant: Contractiones sanè thoracis citra horum concitationem, nunquam magnam expirationem facere possunt.

Pag. 54.

Quamquam & adhuc eximium quiddam ad inæqualitatis erat generationem respiratio habebit præter pulsuum rationem. Græci: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod est: Quinetiā abundans quædā, ac uelut auctarium, ad inæqualitatis generationē respiratio habebit, præter pulsuum rationem.

Pag. 55.

Nimirū quod & uis aliquando plus, aliquando minus, rationem ab eo quod secundum naturam est, amoueant. Ego uerō, non uisā, sed cum græco ponis phantasmata uertetere.

Lib. III. Pag. 105.

Cornarius: Propterea quod per distantia organon respiratio fit motus. Græci magis perspicua est sententia: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod uertimus: Quia per distantiam organa respiratio mouentur.

Pag. 112.

Densus & magnus sit spiritus. Græci: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Hoc est: Densus & paruus sit spiritus.

Pag. 121.

Densum autem & magnū cum, qui inflammatioem respiratoriorū organorū indicat, haud quamquam quis dixerit, nisi etiā calidum esset. Græci legimus: *καὶ ἐκ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς σπονδύλου*. Quod uertimus: Densum autem & magnū, indicare incendium organorum respiratioem, nemo rectè dicere posuit, &c.

Lib.

Lib. de usu pulsuum.

Page 141.

L-Inacez: At quomodo igitur ex pulsu maxime præfigimus. An inquit, minime quidem ut causæ id genus, quæ plurimum momenti habent: imò ut ex opportunis signis. Græce: *ut ex his quæ oportet præfigere præcedentibus*, etc. ut si quis dixerit: *si dixeris, pater tuus dicitur in exordio incedere*. Hoc est. Quomodo igitur ex pulsis maxime præcognoscimus? Minime quidem ut ex causis admodum efficacibus, aliquis dicere possit: sed veluti ex opportunis signis.

Pag. 141.

Quo minus tirum est, quam exiguum illi
comodum ex corde suggerat, si iugularibus ve-
nis uinculo exceptis, exiguum quoque sentiat in-
comodum. Græcè legitur: *vix hæc potest asperius
deponere sibi, ut distans, hoc est: Carotidibus
necatis arteriis, uinculo exceptis.*

Lib. I. de differentiis pulsuum.

Page	Ref.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Hermannus Crutius: Arque inter septendecim hos pulsus, qui ex trinis dimensionibus constant, Græcè legitur: *ἑπταδέκα πάλαι ἔστι θύραι ἐπὶ τῶν πύλων καὶ τὰς ἐν τῶν πύλων ἐν τῶν πύλων ἐν τῶν πύλων*. Quæ nos uertimus: Quam iraque hi septem & uiginti pulsus habeantur, qui secundum quantitatem in trina dimensione consistunt.

Pag. 190.

Certis bifariam, aut triplici proportionē. Græc. $\delta\ \epsilon\ \iota\ \rho\ \alpha\ \alpha\ \alpha\ \alpha\ \alpha\ \epsilon\ \iota\ \rho\ \alpha\ \rho$. Quod est: Aut multipli-
ci proportionē,

Pag. 103.

Coius delapſom a primo diſtentionis termino, nulla dirimit manifeſta quies: Græce legitur: *ἡσυχία ἀπὸ τῆς πρώτης διέκτασης*, &c. Quod eſt: Eius autem delapſum a primæ dilatationis ſine, &c.

Page 515.

Si iam moueri omnes simul coeperint, Græcè:
ἀπὸ τοῦ ἀγ. Quod est: Si igitur.

Ibidem.

Non ramen in secunda contineatur, sicut nec ipsum rhythmus. Græcè: *οὐ καὶ ἐν τῇ γ' ἀκροῦσι τῆς τριτοῦς ἔχεται, ἀλλὰ ἐν τῇ δ' ἐκδοῦνται αὐτά.* Hoc est: Non ramen in secunda consistat, sicut neque ipse rhythmus.

Ibidem.

Tempus enim pars, quæ præter ceteros prima motu deficitur minimū est. Græcè habetur: *ἡ πρῶτη τῆς ἐν πᾶσι μετέωρης ἀπορίων τῶν ἀριθμῶν μέρους ἐστὶν ἡ πρώτη ἡμέρα*. Quod est uertendū: Tempus enim pars, quæ prima omnium moueri deficit, minimū erit.

Ibidem.

Et item rhythmus in singulis cōmutatur. Græcè: *ῥυθμὸς ἑστὶν ἰσομετρία*, &c. Quod est: Atque in hunc modum rhythmus, &c.

Pag. 803.

Iam verò, ubi una omnes partes moveri ceperint, motus quo sint tempore, si altera distentionis non idem omnes initium partes ordiantur, &c. Græcè tamen magis perspicua est

sententia : vñ diciturque diciturque nō dñm pñm tñ pñm vñ pñm dñm pñm. Hoc est : Secundæ autem dilatazionis nō idem omnes initium partes ordiantur.

Page 214

Non potest esse in utroque genere inæqualitas. Græcè: *αἰδιον ἔστιν ἰσοπεπτοῦ καὶ ὅμοιοι ἀνισομετρίας*. Quod est: Necessario in utroque genere fit inæqualitas.

Ibidem.

Non sit autē prioris disputationis in omnibus æqua. Græcè: ὅτι ἐν τοῖς ἀπορίτοις διαπραγματεύοις, πρὸς τὴν ἀπορίτου, ὅτι. Quæ sonant: Finis autem prioris disputationis non sit omnibus æqua.

Lib. 1. de differentijs pulsum.

Page 111.

Herm. Siquidem quantitas unius dimensio-
nis, nō magnitudo, sed longitudo est. Græcè ha-
betur: τὸ γὰρ μέτρον μήκος καὶ οὐ πλάτος, &c. Quod
nos sane maluimus uertere: Etenim quantitas
unius extensionis, &c.

Pag. 119.

Nam longum quidem pulvis, nisi aliqua cō-
lūcta sit profunditas & latitudo, non esse pos-
set; nemo causam dicit. Clarius id græce habet-
tur: *ἡεμὴς οὐκ αἰεὶ τοὺς πόδας ἔχει βάθος ἐπὶ ἀλάνειον*
ἐν δαίμονι· πάλαι δὲ καὶ σφύραται, τὸ δὲ αἰετίζην. Nempe:
Quòd igitur absque aliqua tum altitudine,
tum latitudine, pulvis longus nequeat consistere,
contradicit nemo.

Lib. 111. de differentijs pulsuum.

Page 214

Herm. Quā in secūdo libro inuentorū. Græcè
legitur: *ἐν τῷ δευτέρῳ*. Quod est: in tertio.

Ibidem.

Etenim nō mutaras oportebat nominū significationes. Græcè libetur: *ὅτι γὰρ ἡ μεταβολὴ τῶν ὀνομαζομένων ἐστὶν ἀντιθέτως*. Hoc est: Etenim retractare oportebat significata nominum.

Lib. I. de dignotione pulcrum.

Pag. 176.

Herm. Quinetiam calorū qualitatē, occurſus arteriæ motū excitatus aperius animaduertit, Græcè: *ἐν τῇ αἰσθητῇ ἡ διαφορὰ τῶν αἰσθητῶν, ἀντιπερὶ τὸ αὐτὸ τὸν ἁπλοῦς ἀπορροῦν τὴν ἀπλοῦς ὕλην*. Quid est? Querimus qualitatē calorū, im- pulſus ille, qui in motione arteriæ contingit, apertius indicat, *ὑπερὶ* ſiquidem non modo cognoscere, ſed offendere, & indicare ſignificat. Vnde *ὑπερὶ* ſemper accipitur pro indicis & notis. Adhuc arteriæ occurſus nunq̃ animaduertit differentia aliquā pulſus, ſed intercedente ipſo, tactus noſter ſingulas deprehendit.

Lib. 11. de dignatione pulsuum.

1994

Herm. Etenim si quo uidetur arterias maiores habere homo qui comparatur, hoc maiorē etiā habeat distentionē. Græcè legitur: *ἡ γὰρ ἀρτηρία τοῦ* *ἄνθρωπου*. Hoc est: Si enim quāto uideat arterias maiores habere, tantō maiorem etiā, &c.

Ibidem

Aut sit maior, Græcè: ὁ ἑταίρος δις. Quid est:
Aut sit minor.

Lib. I. de dignotione pulsuum.

Pag. 181.

Herm. Quæ cum ita sint, optimam ratione dâ
bimus operam ut monstrum dignoscendâ
singularem dimensionum: ac de prima dicemus
longitudine. Græcè habetur: *εις τὴν ἑξῆς μέτρον*,
καὶ μετρεῖται ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἕως τοῦ ὀπίσθου
καὶ τοῦ ὀπίσθου ἕως τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς αὐτῆς
μέτρης. Hoc est: Quandoquidem igitur hæc ita
habent, danda opera est, ut monstrum mo-
dum optimè dignoscitur in dimensionibus sin-
gulis. Ac primo lani de illa dicamus, quæ versat
circa longitudinem.

Lib. I. de causis pulsuum.

Pag. 418.

Herm. Causæ quæ pulfus variant, partim generationis eorum sunt, partim tantû alterationis. Græcè habetur: *ὅτι οἱ ἀρτηρίαι μεταβάλλουσιν, καὶ οὐκ αὖτις γίνονται αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἀλλαγῆς καὶ οὐ ποτὶ*. Quæ sic multò apñus uertuntur: Causarum quæ immutant pulfus, hæc quidem generationis ipsorû sunt causæ, hæc uerò tantû alterationis.

Pag. 419.

Et quæ his succedunt externæ. Græcè: *ἐν τῇ πόλει καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ*. Hoc est: Et præterea quæ harū sunt procatartice, proximiōtēs.

Ibidem.

Ac quæ nunc commemorauimus, externæ
appellatur. Græcè: *τῶν πρὸ τοῦ τοῦ ὑποκειμένου*
παρακειμένων λέγεται. Quod est: Hæ igitur, quas
nunc recitauimus, pro cæcæ causæ appellat-
ur. Ibidem.

Ibidem.

Quæ hæc etiam præcedit, quæ quidem in hu-
moribus sunt, præcedentes, Græcè: *πρὸ* *ἰσχυρῶς*
ὑποκρίσθαι *ἢ* *ἡσυχῶς* *ὑποκρίσθαι*, in proprijs. Quod
est: Quas uerò ante hæc, illæ necesse quæ circa
humores occurrunt, antecedentes, &c. Multo
autem clarius asequetur Galeni sententiam, si
hanc orationem cum superiori coniunxeris, in
hunc modum: Hæc igitur quas nunc rectius
uocamus, præcedentes causæ appellantur. Quas uerò
ante hæc, scilicet exposuimus, antecedentes,
&c. Nam putare quod præcedentes uocare, præ-
cedentibus unquam præcedant, hominis pla-
uerit in Galeni dogmatis minimè exercitati. Si-
quidem ut præcedentes causæ uocatas coniu-
ctas gignit, sic ipse gignuntur à præcedentibus.

Ibidem.

Breuius sic habet: Quicunque extra corpus ponitur quicumque corpore alteratur, externe vocatur. Quæ hæc etiam antecedunt, præcedentes causæ corporis affectuum. Hi affectus ubi continentes moueant, eadum præcedentes illarum causæ. Græce: καὶ τὰν ὑπὸ τοῦ σώματος ἐκτὸς τοῦ σώματος αἰτίας, ἀλλοιότης τῶν κατὰ τὴν φαντασίαν λέγεται. ὡς πρὸς τὸν αἵματι, ὅταν διὰ τὸν αἵματι, ὁ δὲ τῶν συνειδητῶν τῶν ἐκτὸς τοῦ σώματος αἰτίων αἰσθάνηται.

In uniuersum autem, quæcumq; extra corpus ponit, aliquid in corpore immutat, prociacitæ causæ, siue præcipientes uocatur: utpote incipientes prius quam ipse dispositiones eorum. Quæ quidem dispositiones, si quando excitauerint continentes, ipsarum an-

recedentes causę redduntur.

Page 411

Quum ex his causis pulsus proficiantur, omnes illorum variationes, causarum necesse est comites sint alterationum. Græcè: *κατὰ τὰς αἰτίας αἰσθάνει, τὴν ἀρρυθμίαν γενεῖσθαι, αἰσθάνει τὰς αἰτίας τὰς αἰσθάνει τὴν ἀρρυθμίαν γενεῖσθαι*. Quæ clarius interpres in hunc modum potuisset reddere: Cum autem secundum has causas fiant pulsus, necessarium est ut omnes mutationes ipsorum, consequantur ad alterationes causarum.

Pag. 413.

Sed de his qui ambigunt, perinde ac Archigenes non errant, qui in Magnum dispartat de pulvis celeritate. Nam à robore non ponas quam abili becillitate proficiatque facultatis, Græcè: *διὰ τὸ ὑπὸ σπινθὲρ ἀνεκείσθαι τὸ ἄνω ἀπὸ τῆς πυρρῆς*. *ἢ τὸ ὑπὸ τὴν ἀρχὴν*. *πρὸς Μαγνὴν ἀνεκείσθαι τὸ ὑπὸ τῆς πυρρῆς*, *ἢ τὸ εἰς τὴν ῥοήν μολλὰ τὸ ἀπὸ τῆς ῥοῆς τὴν ἀνωμολίαν*. Hoc est: Ceterum qui de his dubitant, in eundem cum Archigene errorem incidunt, qui in Magnum dispartat de pulvis velocitate, quod felicitas non à robore potius, quam à languore facultatis proficiatur. Sic autē esse uertendi, colligit Candidus lector ex alia castigatioe quā subdam.

Ibidem consequenter.

Nam neutrum sequitur necessarium, utramque peculiariter celestis robori facultatis est. Vilegitur Græci, πάλαι ποτέ τὸν ὕψος τοῦ πνεύματος, ὅτι ἐστὶν ἀδυναμία, ὅτι ἐστὶν ἀδυναμία, ὅτι ἐστὶν ἀδυναμία. Quod est: Magis tamen est familiaris celestis quidem robori facultatis, atque caloris copie. Itaque Galenus Archigenem improfiteri causatur, quod contenderit pulsum velocitatem non magis a robore, quam ab imbecillitate virium procedere: quum ipsa pulsus celestis facultatis uerget, quum imbecillie, magis sit familiaris atque conueniens.

Page 419.

Celestes uicinus pulvis, itemque tardos esse,
non ægrotis modo, uermiculi ualentibus non-
nullis. Quod naturaliter quidem ipsi confirma-
mus fuppedari. Clarius tamen percipitur sen-
tentia Galieni ex græco exemplari: *υψηλὸν γὰρ δὲ
ἀλγυπὸν ἵνα τὸν σπυρίαν, ὡς καὶ τὸν ἀσπιδίον,
οὐκ ἐκτείνονται πύξι, ἀλλὰ καὶ τὸν ὑπερτακτὸν ὕψος, ἐν οὗ
τοῖς καὶ τοῖς αἰσιν ὡς καὶ πάλιν.* Hoc est: Celestes
iraque, ac similiter tardos pulvis, non ægros mo-
do, sed inter sauos etiam, naturaliter conuulsus
ad esse dicimus.

Page 410.

Semel quidem certe tardus, uel parui, si ualida facula sit, ut moltum sit usus remissus, nunquā fiat. Graecè: *εἰς αὐτὴν γὰρ ἀποδίδει, ὡς παρὰ τὴν ἀσθενήσαντα ὑψιπύρρον, τὴν αὐτὴν γὰρ πύρρον, ὡς καὶ τὴν ὑπερθεῖς ἰατρὴν*. Quod est: Absolutè enim tardus, uel parui, haud unquam existeret pulsus, facillatè uegeta existente, uel si quæ ad usum pertinent, admodum exoluta fuerint.

Pag. 414-

Paulo enim celerior pulvis est, ex molli-
tudi- ne perfectus instrumentorum. Legendum ta-
men est iuxta græcam veritatem, non perfectus,
sed profectus. Quippe ob vi aduertentiam ex-

page 2-

pographorum (quod uerisimile est) omnes latini codices eo in loco uerba deprauiant.

Lib. II. de causis pulsuum,

Pag. 448.

Herm. Crebrior nō nūc primū, sed statim à primō fiet. Græcè: *πρὸς τὴν ἀρχὴν, ὅτε τὸν πρῶτον ἀδὲν αἰσθάνῃ τὴν ἀρτηρίαν*. Quod est: Crebrior autem, non nunc primum, sed statim ab ipso initio euaserat.

Pag. 449.

Tum longioribus coguntur interuallis inæquales pulsus interpolare æquales. Quæ oratio gignit quandam ambiguitatem. Græcè legitur: *ἀπὸ μακροτέρων ὄντων ἀδύνατον γινώσκει τὰς ὁσας ἀρτηρίας παραμυθίας τὰς αἰσθάνει*. Hoc est: Ac si necesse est, per longiora interualla inæquales pulsus intercidere æqualibus.

Pag. 451.

Iam uerò intercurrentes quos uocant pulsus, alia ratione ac intermittentes dignoscuntur. Græcè legitur: *ἡ ἀλλὰ τὰ παραμυθιστῶν ἡλικιστῶν ἀρτηρίων ἀναγινώσκονται τὴν ἀλλὰ τὴν ἀναμυθιστῶν ὕλην*. Hoc est: Vocatorum autem intercurrentium pulsuum dignosco, contraria est illi, quæ debetur intermittenti.

Pag. 460.

Quod paruis interuallis tum contentio uincatur. Græcè: *ἐν μικροῖς διαστήσεσιν ἐκτρέφεται τὸ πάθος καὶ ἀναμυθίζεται ὁ πόνος*. Id quod equidem uerterem: Quod uidelicet tunc per exigua interualla ipsa facultas moueatur.

Pag. 461.

Accidit autem tale quippiam, dum distenduntur arteriæ, ut superficiem earum motarum clarius sentiamus. &c. Græcè: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Hoc est: Superficiam superficiem ipsius, dum mouetur, magis percipimus, &c.

Ibidem.

Et cōgrediatur minus interpositis corporibus. Græcè: *ἐπὶ αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Quod breuius & elegantius sic uertitur: Et tactui per pauciora corpora occurrit.

Pag. 467.

Siquidem robur facultatis diximus esse tantum debere in altis pulsibus, ut maximā distensionem possit moliri, nec loca cingentia arterias capere eam ualeant. Græcè habetur: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Quæ sonant: Si utique facultatis robur in altis pulsibus tantū dicebamus esse debere, ut posset maximam quidem dilatationē moliri: minime autē à locis arterias ambiuentibus cōtreceri.

Pag. 468.

Quid iam si hoc uerum est, num longus continuus in pulsus est? Græcè: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Quæ sic sunt reddenda. Quid igitur? An si hoc uerum est non continuus in pulsus etiam breuis existit?

Pag. 470.

Longè hic maior est contractionis tempore distentionis tempus. Græcè: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Hoc est: Mul-

tō enim hic est maius cōtractionis tempus tempore dilatationis.

Lib. III. Pag. 471.

Herm. Postq̃ de pulsū alterationibus quæ ex primis & præcipuis causis proficiuntur, satis primo in libro disputauimus. Græcè: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Quod est: Alterationes quæ à primis & principalissimis causis proficiuntur, abundè præcedens sermo exposuit.

Pag. 473.

Viri mulieribus pulsus ferè habet longè tum maiorem, &c. Græcè habetur: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Hoc est: Igitur uiri mulieribus in uniuersum pulsus habet longè tum maiorem, tum uehementiorem: paulo autem tardior, ut sufficienter rariore, &c.

Pag. 475.

Bis rursus et sic uisum uertit (ferè) eum, in uniuersum, potius uertendum fuisse.

Pag. 475.

Qui pulsus non diuturnum statim etiam uelocem arbitrantur esse. Græcè habetur: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Hoc est: Pulsus, cuius motus breui absolutur tempore. Atqui non omnis pulsus qui nō diuturnus existit, est brevis tēporis: cum in qui in mediocritate consistit, nec sit diuturnus, nec brachychronus.

Pag. 485.

Tandem ad remissionem & paruitatem redeunt. Græcè: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Hoc est: Vbi autem diuturni fuerint, uertuntur in remissionem.

Lib. III. Pag. 499.

Herm. Planū autē est hæc intelligi debere de lætitia quæ perse, & modicè pulsus mutat. Græcè: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Hoc est: Liqueat autem de lætitia modica, & quæ propria ratione pulsus immutat, hæc dicta fuisse.

Ibidem consequenter.

Nam si nimia quidem lætitia sit, ut facultatē opprimat, pulsus sæpe per accidens cōtrahi existunt. At tunc oppressæ facultatis sunt pulsus. Græcè: *ἐν αὐτῇ τῇ ἐκτρέφεται αὐτῇ τῇ μικρῇ ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι τὸν πόνον*. Quod est: Sæpenumero enim ex accidenti, contrarij pulsus oriuntur, si sit uoluptas immoderata, ac proinde facultatem exsoluat. Ceterum tunc sanè tales pulsus contingunt, quales solent uiribus resolutis accidere, &c. Plurimum autem differt resolutio facultatis ab oppressione. Opprimatur siquidem à maxima humorum colluie: resolutus autem ab exhalatione benignorum humorum, maximeq̃ spirituum uitalium, qui euanescere solent, quum ob alias causas, tum etiam ob lætitiā & uoluptatem insignem. Vnde multos legimus repente gaudio perfunctos, animam exhalasse.

Pag. 507.

Quæ difficultate nutrimenti exstinguuntur.

Græcè: *ῥαδιὰ δι' αἰσῶς ὁπότε ἀσθενήσῃ. Quod est: Penuria enim ipsæ nutrimenti extinguunt, &c. Non autem omnis difficultas nutrimenti, eiusdem penuria existit: quum alimentum uisiosum, difficultatem quidem importer, penuria uerò non item.*

Ibidem.

Quem marcorem Philippus uocat ex morbo senium: quem ferè habent senescentes, & interim iuuenes etiam. Græcè: *κατὰ δὲ τὴν νεότητά γε παρὰ τὴν ἐκείνην, καὶ ἐν τῇ γήρῃ, καὶ ἀσθενείᾳ πάλιν πάλιν καὶ ἀσθενείᾳ, καὶ ἐν τῇ γήρῃ καὶ ἀσθενείᾳ. Hoc est: Philippus hunc marasimum uocat ex morbo senili. Atque inuadit præcipue quidem, iam senescentes, interdum autem, & consistentes ætate.*

Pag. 511.

Iam uerò etiam magis inæquales eos meritis esse, ne hoc quidem eū obcurat. Græcè additur: *ἀπὸ τῆς γένεσός γε. Quod est: Ob uiciniam.*

Ibidem.

Longè enim frigidior, & ut ita dicam, letalior peripneumonia est morbus lethargicus. Græcè: *ὅτι καὶ αὐτὸς πάλιν φησὶν, καὶ ἐν τῇ γήρῃ, καὶ ἀσθενείᾳ, καὶ ἐν τῇ γήρῃ, καὶ ἀσθενείᾳ. Quæ sonant. Longè enim frigidior, atq; (ut quis dixerit) perniciosior est morbus lethargicus peripneumonia.*

Ibidem.

Si item hoc teneas, lethargum ex ipso potius cerebro, plirenium præcipue gigni ex tenui meningē, & ex septo transuerso. Græcè habetur: *ἀπὸ τῆς δὲ, καὶ ἐν τῇ γήρῃ, καὶ ἀσθενείᾳ, καὶ ἐν τῇ γήρῃ, καὶ ἀσθενείᾳ. Si item hoc teneas, lethargum ex ipso potius cerebro, plirenium præcipue gigni ex tenui meningē, & ex septo transuerso. Quod est: Si noris aut, quod lethargus quidem gignitur potius in cerebro: phrenitis uerò, præcipue in eius tenui meningē, atque etiam in diaphragmate. Lethargus itaque non ex cerebro, sed ex pituitoso humore collecto in cerebro: ut plirenitis non ex tenui meningē, sed ex bile in illa acruata, suam duricioriginem.*

Pag. 512.

Conniunt ferè oculis. Græcè: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Quod est: Vt plurimum conniunt oculis.*

Pag. 518.

Vteri suffocati pulsus. Græcè: *ὁπότε ὁ πύθωνος. Hoc est: Suffocationis in ductæ ab utero, pulsus. Vterus quippe minimè suffocatur, sed ubi ex plenitudine uel inanitione conuellitur, respiranois organis plurimum facies negotij, animalis in maximam anxietatem perducit.*

Lib. I. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 513.

Hermannus: Non esse uenientium tantum præscientiam. Græcè legitur: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Quod est: Vt plurimum præscientiam, apertius interpretabimur.*

Pag. 515.

Postea in corporibus quæ ægrotant tantum. Græcè legitur: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Hoc est: Quæ ægrotant simpliciter.*

Ibidem.

Nec aliter in ægrotantibus, si quidem ægro-

rant tantum indicabit magnus pulsus morbi calidum affectum esse. Græcè: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Hoc est: Similiter etiam in ægrotantibus, si ægrotent quidem simpliciter (hoc est, si morbo simplici sint correpti) magnus pulsus indicabit calidam ipsius morbi dispositionem.*

Ibidem consequenter.

Si recens aliqua adst alterano. Græcè additur illa particula, *ἴσως. Quod est: Adueniens extrinsecus.*

Pag. 518.

Non tamen ubi contracta præter proportionem profunditatis est. Græcè: *ὅτι πάλιν καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Quod est: Nō tamen ubi imminuta fuerit infra proportionē profunditatis.*

Pag. 519.

At cum crassior sit, si quo homo euaserit seipso crassior, hoc sit pulsus minor. Græcè habetur: *ὅτι πάλιν καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Quod est: Si quidem, quantum seipso homo crassior sit redditus, tantum etiam pulsus minor uideatur.*

Pag. 519.

Habes primas & simplicissimas pulsuum mutationes in celeritatē & tarditatem: harum causas præcedentes & externas eadem inueniuntur ratione atque illæ, &c. Græcè: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Hoc est: Si quidem, quantum seipso homo crassior sit redditus, tantum etiam pulsus minor uideatur. Quæ sic sunt tendenda: Atque hæc sanè sunt primæ & simplicissimæ mutationes pulsuum in celeritatē & tarditatem, causarū earum antecedentes & primitiue, simili methodo inueniuntur ac illæ, &c.*

Pag. 521.

Ac quo sit uehementior. Græcè: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Hoc est: Et quanto uehementior fuerit. Ibidem paulò inferius (ubi legitur: Quod sit languidior) Quanto sit languidior, legendū est.*

Ibidem.

Alterationes pulsuum, quædam in remissionem & uehementiam, & solæ sunt frequenter, & ab una causa. Græcè habetur: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Hoc est: Et quanto uehementior fuerit. Ibidem paulò inferius (ubi legitur: Quod sit languidior) Quanto sit languidior, legendū est.*

Lib. I. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 526.

Herm. Magna enim copia ex putrescentibus humoribus acruatur. Græcè habetur: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Hoc est: In humorum putrefactionibus.*

Ibidem paulò antè.

Fuliginosorum extremorum ingentē colligi numerum. Græcè legitur: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Quod relictus uertitur: multitudinem. Numerus quippe nō de cōtinua, sed dicitur de quantitate discretæ.*

Pag. 562.

Robur ualidorū, omnem excipit causam paruum. Græcè: *καὶ πάλιν καὶ πάλιν. Quod est: Validorum robur, relictur omni affectui exiguo.*

Pag.

Pag. 564.

Est autem eorum pulsuum ingens frigiditas causa generandorum, quæ occupet uel corpus cordia, uel spiritum & sanguinem, quem continent eius sinus: uel partem aliquam uicinam. Græcè legimus: *τῶν ἐκτακτικῶν*. Hoc est: Consistentium particularum, uel aliquod commercium habentium. At multa consentiunt mutui, atque in unum conspirant, quæ minimè sibi uicina existunt. Quæmadmodum cor & cerebrum, quæ nervorum & artieriarum ratione iunguntur tanta necessitudine, ut affectio unius, alteri consortij lege communicetur.

Pag. 565.

Siquidem generantur hi producta raritate: ac quum procurantur, reuertunt per raritatem ad pristinum statum. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς γένεσος αἰτίας τῆς σπανιστικῆς ἢ ἀραιωτικῆς ἐστὶν ἡ ἀραιοῦσα, καὶ ἐκείνη δὲ τῆς ἀραιώσεως ἀραιοῦσα*. Quod nos uertimus: Siquidem generatio ipsorum fit raritate producta: solutio autem est redditus quidam per raritatem ad commodationem pristinam.

Pag. 573.

Quem primò equidem unum ferre iterum putauit. Clarior tamen est in græco hæc sententia: *ἡ δὲ τῆς γένεσος αἰτία τῆς ἀραιώσεως ἐστὶν ἡ ἀραιοῦσα*. Hoc est: Quem solum primò sanè putaueram bis ferre.

Pag. 580.

Reciprocantur modò ex ultima pulsus abolitione: modò ex paruo pulsù & languido. Quorum quidem uocantur etiam reciproci utrique: sed hoc interest inter hos, quòd illi decurtati sint reciproci, hi deficientes reciproci. Græcè legitur: *ἡ ἀραιώσεως αἰτία τῆς γένεσος αἰτία τῆς ἀραιώσεως ἐστὶν ἡ ἀραιοῦσα, καὶ ἐκείνη δὲ τῆς ἀραιώσεως ἀραιοῦσα*. Quæ sic nos uertimus: Reuertitur autem motus arteriæ, interdum quidem, ab ultima pulsus abolitione ad quam peruenierat: interdum autem, à paruo pulsù & languido. Quorum sanè utrique pulsus, recurrentes dicuntur: hoc tamen interiecto discrimine, quòd illi quidem, deficientes recurrentes existunt: hi autem, imminuti recurrentes, seu decurtati.

Lib. 11. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 589.

Hermannus: Cordis calor, pulsus (ut diximus) uariæ. Verum quia duorum generum est, aut à putribus genitus humoribus, cuius acris qualitas & firmosa est: aut cum humiditatis defectu, à natura remorosa sola quæritate: ille prior constans & obfirmatus est, &c. Græcè legitur: *ἡ γὰρ τῆς ἐκτακτικῆς αἰτίας τῆς γένεσος αἰτία τῆς ἀραιώσεως ἐστὶν ἡ ἀραιοῦσα, καὶ ἐκείνη δὲ τῆς ἀραιώσεως ἀραιοῦσα*. Quæ sic nos uertimus: Reuertitur autem motus arteriæ, interdum quidem, ab ultima pulsus abolitione ad quam peruenierat: interdum autem, à paruo pulsù & languido. Quorum sanè utrique pulsus, recurrentes dicuntur: hoc tamen interiecto discrimine, quòd illi quidem, deficientes recurrentes existunt: hi autem, imminuti recurrentes, seu decurtati.

ginosa: alter autè, cum benigna humiditate constitutus, sola quantitate à nature modo recedit. Est autem constans & egre solubilis, quem primo diximus loco.

Ibidem.

Verècūdi etia atq; iri comitatur. Græcè: *αἰδὼς καὶ θυμὸς συννοεῖται*. Quod malle equidè uertere: Timorè atq; iracundiam conmiscat. Quandoquidem pudor, laud quidè tanti momèti est affectus, ut pulsus usqueadè immutare possit. *αἰδὼς* 3, cum pudorè, tum etiam metù significat.

Pag. 591.

Nec si pestilentem animà. Græcè: *ὡς ἐν τῇ πενθῇ*. Hoc est: Nec quia pestilentè respirationem, &c. Nam tametsi per translationem interdum anima fumatur pro spiritu, ac presertim apud poetas: Medica tamen ars admodum seuerà cum sit, minimè oblectatur metaphoris.

Pag. 599.

Iam os etiam attendunt. Græcè: *ἐν τῇ ἐκτακτικῇ αἰτίας τῆς γένεσος αἰτία τῆς ἀραιώσεως ἐστὶν ἡ ἀραιοῦσα*. Hoc est: Contemplantur simul etiam partes ori adiacentes.

Pag. 601.

Qui putredini humorum comitatur, etiam par est perpetuò huius magnitudo, nò tamen ut naturalium, neq; aliorum generum, uerum cum de natura parum deficiuit, &c. Græcè: *ἡ δὲ τῆς ἐκτακτικῆς αἰτίας τῆς γένεσος αἰτία τῆς ἀραιώσεως ἐστὶν ἡ ἀραιοῦσα, καὶ ἐκείνη δὲ τῆς ἀραιώσεως ἀραιοῦσα*. Quæ sic nos uertimus: Reuertitur autem motus arteriæ, interdum quidem, ab ultima pulsus abolitione ad quam peruenierat: interdum autem, à paruo pulsù & languido. Quorum sanè utrique pulsus, recurrentes dicuntur: hoc tamen interiecto discrimine, quòd illi quidem, deficientes recurrentes existunt: hi autem, imminuti recurrentes, seu decurtati.

Pag. 603.

Tardi nò perinde, sed si uicinis fuit frigiditas fit corpus cordis. Græcè: *ἡ δὲ τῆς ἐκτακτικῆς αἰτίας τῆς γένεσος αἰτία τῆς ἀραιώσεως ἐστὶν ἡ ἀραιοῦσα, καὶ ἐκείνη δὲ τῆς ἀραιώσεως ἀραιοῦσα*. Quæ sic nos uertimus: Reuertitur autem motus arteriæ, interdum quidem, ab ultima pulsus abolitione ad quam peruenierat: interdum autem, à paruo pulsù & languido. Quorum sanè utrique pulsus, recurrentes dicuntur: hoc tamen interiecto discrimine, quòd illi quidem, deficientes recurrentes existunt: hi autem, imminuti recurrentes, seu decurtati.

Pag. 604.

Neq; scilicet alijs sensui tribuunt album, nigrum, flauum, rufum, pallidum, fuscum, cyruleum, reliquæ colorum uicina, præter oculis obiecta. Græcè legimus: *ἡ δὲ τῆς ἐκτακτικῆς αἰτίας τῆς γένεσος αἰτία τῆς ἀραιώσεως ἐστὶν ἡ ἀραιοῦσα, καὶ ἐκείνη δὲ τῆς ἀραιώσεως ἀραιοῦσα*. Quæ sic nos uertimus: Reuertitur autem motus arteriæ, interdum quidem, ab ultima pulsus abolitione ad quam peruenierat: interdum autem, à paruo pulsù & languido. Quorum sanè utrique pulsus, recurrentes dicuntur: hoc tamen interiecto discrimine, quòd illi quidem, deficientes recurrentes existunt: hi autem, imminuti recurrentes, seu decurtati.

Pag. 604.

Neq; scilicet alijs sensui tribuunt album, nigrum, flauum, rufum, pallidum, fuscum, cyruleum, & quæcumq; alia colorum nomina, præterquam ad uisibilem sensum. Ibidem consequenter.

Neq; etiam alijs austerum, dulce, amarum, acerbum, astringens, salum, saluginosum, præterq; quæ gustantur. Græcè: *ἡ δὲ τῆς ἐκτακτικῆς αἰτίας τῆς γένεσος αἰτία τῆς ἀραιώσεως ἐστὶν ἡ ἀραιοῦσα, καὶ ἐκείνη δὲ τῆς ἀραιώσεως ἀραιοῦσα*. Quæ sic nos uertimus: Reuertitur autem motus arteriæ, interdum quidem, ab ultima pulsus abolitione ad quam peruenierat: interdum autem, à paruo pulsù & languido. Quorum sanè utrique pulsus, recurrentes dicuntur: hoc tamen interiecto discrimine, quòd illi quidem, deficientes recurrentes existunt: hi autem, imminuti recurrentes, seu decurtati.

Ibidem.

Neque iam ullis alijs calidum, frigidum, siccum, humidum, molle, durum, uerum his quæ

ranguntur, omnes attribuantur. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quod est: Sed uet in alijs sensib. collocant calidū, frigidū, siccū, humidū, molle & durū, præterquā in tactū sensu.

Page. 605.

A propria ad impropria. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Hoc est: Ab improprie ad propria.

Page. 610.

At febris hectica, rarissima a primo existit, Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quæ uertimus: Rarissime igitur statim ab initio oritur hectica febris.

Page. 611.

Si adiecerimus sermoni quandam diffinitionem. Græcè habetur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Huc est: Diffinitionem quandam.

Page. 614.

Cor ipsum ad intemperiem inducit uictus, si diutius sicco utatur. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quod est: In ipso autem corde siccā intemperiem producit etiam uictus ratio siccior, si diu fuerit administrata.

Page. 615.

Durior pulsus autem demonstraui mus esse paritatem, mollium magnitudinem. Græcè habetur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Nempe: Durus igitur pulsus demonstraui mus antea esse paritatem cum item, quemadmodū mollibus magnitudinem.

Lib. 1. 1. 1. de præcognitione ex pulsibus.

Page. 619.

Herm. Genus igitur respirandi, omnes fluxiones idem habent: at ne eadē omnibus suffucano, sed omnibus calidioribus cumiral ponus. Græcè habetur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quæ sic sunt uertenda: Igitur species respirationis, similis omnibus fluxionibus adeit. Suffocatio autem ipsa, nun similiter omnibus, sed magis calidas omnes fluxiones sequitur.

Ibidem.

Alia præterea uarietas erit, quid interim affecta pars thoracis sit, interim succingens costas tunica. Codex græcus uetus habet: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quæ sonant: Variabit etiam uel hac ratione, quid interdum quidem pars affecta thoracis sit musculus: interdum autem, costas succingens membrana.

Page. 620.

Ac si ab solis excrementis citra febrem intendatur. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quod est: Si igitur a solis excrementis in ipso genitis distendatur.

Page. 624.

In statu arterie sunt moderati. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quod est: In consistentia quidem arterie.

Page. 625.

Qui ex multa bile feruente ob putredinem,

hoc patitur. Græcè habetur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Hoc est: Qui cumq; autem ob atram bilem effluuientem ratione putredinis, tale quid perpetuntur.

Page. 626.

Si frigiditas morbofa cerebrum afficiat, cum illa cor consentiat, tardiores atq; rariore aequo pulsus erunt. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quæ sonant: Frigiditate autē morbofa in cerebro genita, si cor etiam cūfōrti lege afficiatur, minores, tardiores, atq; rariore ips, qui pro modū naturæ habebant, gignuntur pulsus.

Page. 627.

Subtilis meninx, quæ cerebrum amplectitur, Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Hoc est: Quæ disingit cerebrum. Etenim liquet ex confectionibus, per illam tenuem membrā, quæ multa arterijs & uenis tutum cerebrū permeat, distingui planē dextram a sinistra ipsius cerebri partem, atquæ eadē ab utraq; cerebellum, quam uocant parencephalida.

Page. 629.

Vnum etiam reliquum est, de testibus ut dicamus. Nam hæ partes erūt intra inguina sint, stram febres propter uasorum uiciuitatem accendunt. Græcus uetusissimus habet: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quod est: Quamuis enim extra inguina sint, subito febres accendunt ubi inflammati fuerint.

Ibidem.

Nam uenientium sum præfagia ex præsentibus. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quod sic rectus interpretabimur: Quod autem futurorum etiam prænotu ex præsentibus conciliatur.

Ibidem.

Hæc omnia ex affectibus præfagiuntur. Græcè habetur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Ex dispositutibus.

Page. 630.

Morbis enim cognoscitur ex loco affecto, eiusq; affectu. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Hoc est: Et eius dispositione.

Ibidem.

Cum morbum semel superata est natura. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Hoc est: Quo tempore natura superata est absolutissime morbofam dispositionem.

Ibidem.

Propter quos cibum non sentiant. Græcè legitur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quod est: Ob quos ciborum usu non promouentur.

Ibidem.

Iam uerō etiam animalis facultatis imbecillitates, cerebri ingenti intemperiei comitantur, eiusdem quasi suffocationibus impletionibus eius uentriculorum, & obstructionibus meatuū qui in eos penetrant. Græcè habetur: *αὐτὸν δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ πυλῶντος αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶντι αὐτῷ καὶ τῷ πυλῶντι αὐτῷ*. Quæ sic uis uertimus: Similiter autem animalis facultatis imbecillitates, magnas cerebri

bri intemperies sequuntur. Quæ uero ueluti suffocationes sunt, succedunt tum repletionibus uentriculorum ipsius, tum obstructionibus meatuum qui ad eos pertinent.

Page. 611.

Alterius quàm uitalis. Græcè: *ἀλλοτρίου τῆς βίτης*. Quod est: Quæ admodum alterius uitalis.

Lib. I. de diebus decretorijs.

Page. 646.

Andernacus: Cum bonis signis accidit, quæ de contemplatorio prius indicata est. Græcè: *ἀνδερνακία*. Huiusmodi dicitur huiusmodi. Quod equidem maluisse sic uertere: Insignem autem, quæ ab indice prædicta fuerit. Fieri siquidem potest, ut crisis aliqua prius indicatam fuerit ab indicatorio die, quæ tamen cum bonis signis non accidat. Crisis quippe, quæ septima die in exitum definit, omnia secum habet signa extialia, tamen si fuerit in quarto die prædicta.

Page. 651.

Fætida multa tum deiciunt. Græcè: *ἐκ τῆς ἀσθενείας πολλὰ καὶ φæκίλα*. Hoc est: Et fætida urplutium deiciuntur.

Ibidem consequenter.

Sudores rari quidem æquales toto manantes corpore, & calidi: quales in quando oboriuntur, plurimum afficiunt uentos. Græcè: *ἰσὺν ὅλην τὴν σάρκα*. Huiusmodi dicitur huiusmodi. Quod est: Sudores autem, rari quidem si, qui æquales, & per uniuersum corpus, & calidi exiunt. Quod si tales aliquando exoriantur, ut plurimum interceptiuntur.

Page. 654.

Prope hos uero tertiusdecimus. Græcè: *παρὰ τὴν τριάντην*. Hoc est: Decimusseptimus.

Page. 671.

Hæc igitur quatuor genera, quorum partes etiam sunt diuersæ, dum naturæ moribus incidunt, subinde circuituum ordinem destruant. Græcè habetur: *καὶ τὰς μετέωρας τὰς ἐν τῇ φύσει τῇ φύσει τῇ φύσει*. Hoc est: Hæc igitur quatuor genera, quæ uarias habent species particulares, si naturæ motus præcedant, sæpenumero circuituum ordinem destruant.

Ibidem.

Septimo die necessariæ satura est. Græcè: *ἐν τῇ ἑβδόμῃ*. Hoc est: Crisis.

Page. 674.

Quippe cum secundus, ex ipse gratia, & quartus, uehementissimam accessionem afferat, uel primus, tertius & quintus, ad sextum diem mors prædicatur. Cæcus antiquus habet: *ὁ πρῶτος ὁ δεύτερος ὁ τρίτος ὁ τέταρτος ὁ πέμπτος*. Hoc est: Quippe cum secundus, ex ipse gratia, & quartus, uehementissimam accessionem afferat, uel primus, tertius & quintus, ad sextum diem mors prædicatur. Cæcus antiquus habet: *ὁ πρῶτος ὁ δεύτερος ὁ τρίτος ὁ τέταρτος ὁ πέμπτος*. Hoc est: Quippe cum secundus, ex ipse gratia, & quartus, uehementissimam accessionem afferat, uel primus, tertius & quintus, ad sextum diem mors prædicatur.

Page. 677.

Er iudicia, Græcè: *ἐν τῇ κρίσει*. Hoc est: Et iudicia.

Ibidem.

Decimusoctauus autem, uigessimiprimi. Græcè: *ὁ δέκατος ὀκτώβιος*. Nempe decimusoctauus autem, solus uigessimiprimi.

Lib. V. Page. 691.

Andernacus: Hac ratione omnes acuti particulares sunt. Postquam uero omnes conuerint, diuturni. Græcè habetur: *ἀπὸ τῆς ἀκρότης εἰς τὴν χρόνιον*. Hoc est: Quæ iudicio meo sic sunt uertenda: Atque ita sanè omnes ipsius morbi partes, acuti reddunt: totus autem morbus, diuturnus, &c. Agitur quippe de morbus imperfecte solutus, & quorum residuum in diebus decretorijs tum incipit, tum indicant. Ad quorum sanè ortus, solutionem uero, si respexerimus, unaqueque ipsarum uidebitur esse nobis morbus quidam acutus, cum tamen pars unius morbi diuturni existat.

Page. 694.

Igitur accessiones ipsæ ex acutissimis morbis per quatuor in uiginti autem finiuntur. Græcè: *ἐν τῇ ἑξήκοντῃ*. Hoc est: Quæ iudicio meo sic sunt uertenda: Atque ita sanè omnes ipsius morbi partes, acuti reddunt: totus autem morbus, diuturnus, &c. Agitur quippe de morbus imperfecte solutus, & quorum residuum in diebus decretorijs tum incipit, tum indicant. Ad quorum sanè ortus, solutionem uero, si respexerimus, unaqueque ipsarum uidebitur esse nobis morbus quidam acutus, cum tamen pars unius morbi diuturni existat.

Page. 711.

Obscuratur omnino, cum Solis lumen circa eam emergit. Græcè legitur: *ἐν τῇ ἑξήκοντῃ*. Hoc est: Quæ iudicio meo sic sunt uertenda: Atque ita sanè omnes ipsius morbi partes, acuti reddunt: totus autem morbus, diuturnus, &c. Agitur quippe de morbus imperfecte solutus, & quorum residuum in diebus decretorijs tum incipit, tum indicant. Ad quorum sanè ortus, solutionem uero, si respexerimus, unaqueque ipsarum uidebitur esse nobis morbus quidam acutus, cum tamen pars unius morbi diuturni existat.

Page. 721.

Item cominali circuitus custodit, inde quod Solis plus, uel minus participat. Græcè legitur: *ἐν τῇ ἑξήκοντῃ*. Hoc est: Quæ iudicio meo sic sunt uertenda: Atque ita sanè omnes ipsius morbi partes, acuti reddunt: totus autem morbus, diuturnus, &c. Agitur quippe de morbus imperfecte solutus, & quorum residuum in diebus decretorijs tum incipit, tum indicant. Ad quorum sanè ortus, solutionem uero, si respexerimus, unaqueque ipsarum uidebitur esse nobis morbus quidam acutus, cum tamen pars unius morbi diuturni existat.

Ibidem.

Capitis dolorem conciliat. Græcè: *ἐν τῇ ἑξήκοντῃ*. Hoc est: Quæ iudicio meo sic sunt uertenda: Atque ita sanè omnes ipsius morbi partes, acuti reddunt: totus autem morbus, diuturnus, &c. Agitur quippe de morbus imperfecte solutus, & quorum residuum in diebus decretorijs tum incipit, tum indicant. Ad quorum sanè ortus, solutionem uero, si respexerimus, unaqueque ipsarum uidebitur esse nobis morbus quidam acutus, cum tamen pars unius morbi diuturni existat.

Lib. I. de crisiibus.

Page. 711.

Leonicenus: Stant in tempore accessionis hominem occidunt. Græcè: *ἐν τῇ ἑξήκοντῃ*. Hoc est: Augmenti tempore.

Page. 716.

Quæ uero extra conturbatur, debet incipere concoqui, quare & longiori tempore, & uirtute forti indiget ad coctionem. Græcè: *ἐν τῇ ἑξήκοντῃ*. Hoc est: Quæ uero extra conturbatur, nondum incipit concoqui. Quare merito hæc est deterrima. etenim ut coquatur, prolixum tempus, roburque facultatis desiderat.

Ibidem.

Hæc uenosa naturæ passionem significat. Græcè: *ἐν τῇ ἑξήκοντῃ*. Hoc est: Talis enim urina, uenosa generis affectus exiit: sicuti & exacta eruditæ, uentris.

Ibidem.

Cum uero etiam statim mingitur in nas urinam. Græcè: *ἐν τῇ ἑξήκοντῃ*. Hoc est: Quæ iudicio meo sic sunt uertenda: Atque ita sanè omnes ipsius morbi partes, acuti reddunt: totus autem morbus, diuturnus, &c. Agitur quippe de morbus imperfecte solutus, & quorum residuum in diebus decretorijs tum incipit, tum indicant. Ad quorum sanè ortus, solutionem uero, si respexerimus, unaqueque ipsarum uidebitur esse nobis morbus quidam acutus, cum tamen pars unius morbi diuturni existat.

hyderos, &c. Agit namq. impersentiariū Galenus de diabete, seu de stillicidio utinā prater uoluntatem effluuit. Qui afficitur altera tritica & renetricis facultatis, ueluti extinctio est: ut ibidem idem Galenus testatur. Quare per talem snorē, improprie sanē dicemus urinam mingi, cūm citra imperiū uoluntatis, atq. inuito homine delabatur: id quod explicat si raxius descriptum.

Pag. 760.

Color uerō simlis fit in transitu ad nigrum, & quoddam ueluti principium nigri. Græcē legitur: *οὗτος εἶναι πρὸς τὸν μαύρον*. Quod sonat: Estq. ueluti quoddam principium nigri.

Pag. 771.

Quod si ab eo quod est nihil expuere, aut expuere, uerūm liquida, & omnino cruda fiat transmutatio. Græcē dicitur: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Hoc est: Si uerō ab eo quod est nihil prorsus expuere, ad expuere quidem, sed liquida & omnino incocta fiat transmutatio, &c. Fieri tamen potest, ut in error non a Leonicensio, sed a typographo sit commissus.

Pag. 777.

Si qua uerō uniuersa fiat permutatio, & multo magis adhuc eam quæ antecedit agitationē. Græcē habetur: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Hoc est: Ac multo magis illam perturbationem, quæ permutationē ipsam præcedit: scilicet crism appellare consueui.

Pag. 786.

Tertianam itaq. febrem fieri edingit absq. rigore uehementi. Græcē: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Quod est: Igitur exquisitā tertianā laud licet fieri absq. rigore uehementi, &c. Est enim Articus familiare, ut pro una, duabus negationibus sepe utantur.

Pag. 799.

Sed nihilominus hoc, si multa quiete egrotanti adueniente, Græcē habetur: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Quod est: Nulla prorsus explicatio, siue absoluteione a febre, in egrotante facta.

Lib. II. de crissibus. Pag. 814.

Leonicensius: Si uerū tantum febricitent, siue alicuius uisceris passione, aut inflammatione hepatis, uel renum, uel uesicæ, uel splenis, maxime urinæ oportet animū adhibere. Græcē: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Que sonat: Si uerū tantū febricitent, absq. alicuius uisceris passione: aut si que etiam inflammatio adest in aliquo eorū quæ ad hepar, uel renes, uel uesicam, uel splenem pertinent, urinæ sunt spectandæ. Quod autē ita legendum sit, indicant Galeni uerba, quæ statim subdit in hunc modū: Semper enim cum febris affuerit, uel ex sola humorū putredine accensa, uel ex membro inflammationem patiente: censeo precipue esse inspiciendas urinās, atq. inde agnoscendas coctiones.

Pagina 818.

Febris enim quæ proprie synochus nominatur, longius est status. Magis autē tota hæc febris status est. Græcē: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Quod sonat: Quæ ueluti quoddam principium nigri est.

synochus. Quod nos uertimus: Eius autem febris, quæ proprie dicitur synochus, diuturnus status est. Imo uerō tota eiusmodi febris, status quidē existit.

Pag. 817.

Tres quidē hi sunt modi perturbationis morborum. Græcē legitur: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Hoc est: Perturbationis.

Pag. 831.

Tu itaq. suppones aliquam esse uitalem potentiam, itude ut agnoscas eorum ita in robore, sicuti in imbecillitate dispositionē. Græcē legitur: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Hoc est: Ipsius facultatis uidelicet.

Pag. 835.

Moriturus autē, ad declinationis tempus pertingere minimē potest: nō ramen necessariō etiā non ad statum. Græcē habetur: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Hoc est: Sed nec necessariō etiam ad tempus uigoris. Sic autē legendum esse, indicant uerba Galeni sequentia, quæ talia sunt: Contingit enim ipsum in augmenti & principii etiam tempore mori.

Pag. 843.

Si igitur prater rationem alius comprimitur, uel urinæritiam propē crisi existente, rigorem sperare oportet. Si non, distinguendum est. Græcē legitur: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Quod est: Qui si accadat, distinguendum, &c.

Ibidem.

Si enim multa, &c. Græcē: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Hoc est: Si enim plura. Quæ lectio illustratur a superiori, ubi Galenus ait: Considerare oportet nunquid alius excrementa plura quā priora, uel pauciora, ante crism exierint. Cui orationi subdit: Si enim plura.

Pagina 846.

Si uerō ad abcessus conuertantur, cōmunia quidem omnia indicia sunt, ubi de ægri salute non desperatur, quōd neq. morbus soluit, neq. urina multa & multam habens subsistentiā, sed cruda & tenuis appareat: propria uerō morbi nō futuri ualde diuturni sunt, subita difficultas anhelitus superueniens, moxq. quiescens, quā grauitas capitis, ac dolor subsequi, & grauis somnus, ac furditas, his in glandulosis carnisbus post aures, necessum est abcessus fieri. Græcē legitur: *ἡ δὲ τῆς τοῦ μαύρου τῆς τοῦ λευκοῦ μεταβολῆς*. Quæ sonat: Si uerō ad abcessus conuertantur, cōmunia quidem omnia indicia sunt, ubi ægri sales non est deplorata, quōd nec morbus soluitur, nec urina multa, & multa habens subsistentiam, sed cruda & tenuis appareat. Propria uerō nō admodum diuturnorū morborū, si æger in difficiliore respirationē repente incidit, breui quidem liberetur a tali respirandi difficultate, sed excipiat ipsam statim dolor atq. capitis grauitas: præterea inexplorabilia dormien dihecesitas, furditasq. Hinc autē, in glandulosis post aures partibus, necessum est abcessus oriri.

Ibidem.

Ibidem.

Vel inflammatio. Græcè legitur: *phlogosis*. Quod nos, uirandæ amphibologiæ studio, uertimus: Vel incendiū. Siquidem hæc uox Inflammatio, est uulgo medicorum recepta pro uulnere quodam rubro, renitente & calido, uisum orto à sanguine: *phlogosis* autem, siue effluuiscencia caloris, aliquando potest accidere citra talem affluxum sanguinis.

Lib. de praecognitione.

Pag. 160.

LEONARDUS LACHINUS: Ego enim posthac fedu-
lo cauebo, tunc ipsis cedens, tunc infamiam pate-
faciens. *Græcus uetusius habet: ὁ ἄλλος τῶν δι-
δωκότων αὐτὸν ἐν ἑσπερίᾳ ἡμέρᾳ.* Quod nos uernius:
Tunc infamiam eorum difsimulans. Cui lectioni
subscribit sequens sententia, quæ est talis: Hæc
cum facere decreuissim, infamiam eorum & co-
pulatè redarguere destini. Habetur quippe in pra-
dicae græco *ἵνα* quod non tam dèterege, ut
uenit interpres, quàm redarguere significat.

Lib. de praesagijs ex insomnijs.

Pag. 119.

Ioannes Ficardus : Phlegmatis humidi plenus est. Græcè habetur: *παῖς ὑγρὸς φlegm.* Quod est : P^luitæ frigidæ.

SECTION E

Q V A R T A.

Lib. III. de symptomatum causis.

Pag. 153.

COpus: At quoniam complures sunt intestino-
rum circulationsiones, necesse est, ut alimenta per
singulas, ex superioribus ad inferiora deferantur.
Deinde, quod grauitatis praefidio fieri non pos-
set, nempe ut propellantur ea quae per intestine-
rum circulationes fixa continentur, id poten-
tius haud difficile est. Quippe habet intestina
inframum uim, qua expellunt ea quae sibi molesta
sunt. Cui uersioni iussragal enis & Linacri transla-
tio. Graeca ramentis diu sic habet: ιενδις ημεντα
λαυ τ υψιπυρα δισπη, αινειον διση καυ ιαδελος αυτην ε
τ υψηλως ανω δε τα κατωθεντα φυσιολογικη τε αεση συντελειται
καυ τα βλεψη πορ, και το ελφη, πινωρη, καυ ο υψηλος αουτος εν
μνησθη σφαιρολη τοις σφαιροβλησι αιαντα ανακταται αουτως, λεγει
τοιοθι διανομη λυγηρη τινος αινειον φημι. Quae
ita uertenda censio: Cum autem complura sint
intestinelorum uolumina, per quae ad superioribus
ad inferiora deferri alimenta est necesse: cibi sa-
ne ipsi, ob grauitatem diu immorari non pos-
sunt. Quid si eorum quamplurima hareat in spiri-
tis ipsa impacta, id ab actione intestinolorum (qui-
bus inest facultas quaedam expellendi infesta-
tia) propellentur. Itaque feculentis Galeni est, excre-
menta alui, quae ex cibis reliqua sunt, rum so-
pondere delabi, rum facilitate expultrice ab inte-
stini exterminari.

Lib. de morborum temporibus.

Pag. 111.

ANdernacus: Et enim inflammationis affectus calidior quam prius euadit, cum tumore maiori, stem dolore simul & tensione. Græcè: *ἄνδερναξ*

Quod est: Calidior itaq; seipfa
 euadit cum tumore maiori, doloreq; & tensio-
 ne, pars obhæmone obfessa.

Page 114.

De complexis postea differam. Græcè: *ἐπὶ τῶν*
ὑποθέσεων (ἐπὶ) *ὑπὸ*. Quod est: De mixtis autem
deinceps dicam.

Lib. de totius morbi temporib.

Pag. 119.

Andernacus: Vnum quidem & princeps generationi eorum attribuitur. Græcè legitur: *επι τοις*
117. Hoc est: Et primum. Agit enim illic Galenus
de ipsius morbi temporibus. Inter quæ unum &
primū ordine, non dignitate, tribuit ipsi genera-
118. tioni. At cum princeps aliquid dicimus, de ipso
excellentiorem quandam, præcæptuam enim

Pag. 146.

Poit quod rufus augmenū tempus eſt, non
æque maniſeſtum ira in omnibus: neque illud
quod ſi uigore ſequitur tempus omnino ſenſibile.
Græcè δὲ τὸ πάρος ἔστι ἀποφωτισμὸς, ὡς φησὶν ὁ αὐτὸς περὶ
ἀποφωτισμοῦ ἐκείνου· εἰς δὲ τὴν ἀπαλήθευσιν τοῦτον μετατρέψας,
Quod eſt: Poit quod rufus augmenti tempus
eſt, ne ipſum quidem fimiliter ſenſibile in omni-
bus. Poit hæc uigoris ſequitur tempus, idem om-
nino ſenſibile.

Pag.

Vel amarum uehementer. Græcè: *δυσππῆς* *λε-
γυρῆς*. Hoc est: Aut fuluum uehementer. Dispu-
tar nange illic de sputi coloribus.

Lib. I. de locis affectis.

Pag. 171.

COPUS: Itaque quomodo contingat urinæ me-
tatum stipari. Græcè habetur: *κατὰ μέρος δὲ φέρεται*
ὡς περὶ τριχώδινον ἢ αἰσὺς ἢ φάρμακον ἀνέβηται. Hoc est:
Itaque quomodo contingat obstrui meatum
collis uellicæ.

Pag. 180.

Essentia quidem nondum laeditur. Graece: *ἡ οὐσία οὐκ ἐστὶν ἡτις ἐλαττεῖται*. Quod est: Substantia autem nondum est laesa. Aliud quippe dictum est non laedi, atque aliud non esse laesam. Siquidem quod nondum est laesum, fieri potest ut iam laedatur.

Page 181.

Quod si antequam ulcus induxerit, egredi desinat, affectus ipse nondum dysenteria dicitur. Græcè habetur: *αἰμαρὶς ἢ πύρρην ἰσχυρὰν, καὶ σπέρμα δακρυώδες, &c.* Hoc est: Si uerò priusquam exulceret, perfluere desinat, &c.

Pag. 388.

Igitur si in ventriculo cibi non suapte natura in fumum transmutantur, efficientem causam calidam uero saporem acidum referunt, cum frigidum esse necesse sit. Graecè λέγουσι ὅτι τὸ ἀσυνεργὸν καὶ οὐκ ἐκ τῆς φύσεως, καὶ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἀσυνεργίας τῆς τοῦ σπύγματος ἀκρίτου ἀπὸ τοῦ ὀπίσθενος, ἀσυνεργίας, ἀσυνεργίας. Quid est? Si igitur in ventriculo cibi non fumum nidorofum uertantur, idem non ex sua ipsorum natura, efficientem causam calidam si uero accedant, frigidam esse necesse est.

*Ibid.*em.

Quippe ubi igneo calore ventriculus infestatur, panem, aut chondrum, sine humore

deici uidebis, perquam exigua in ipsis facta trans-
mutatione. Græce legitur: ὅτι ἐκείνη τὴν αἰὶν ἀπο-
τίθηται γυμνασίον κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ κυρίου καὶ
ἐκείνη τὴν ψυχὴν ἵστα ἀπὸ τοῦ σώματος, ἀφ' οὗ καὶ δὲ ἀπὸ
τοῦ σώματος γυμνασίου. Quæ sic uertimus: Etenim ubi
igneo calore, citra humoris affluxum, uentri-
culi infestatur: uidetur tum panem, tum chon-
drium deici, perquam exigua in ipsis facta trans-
mutatione. Cui lectioni subscribit sequens in Ga-
leno sententia, quam etiam interpres peruerit.

Ait enim ibidem.

Quod si humor quoque deiciatur, qui cibum
corrumperere possit, videtur cibi in huiusmodi
humore subernari. Græce habetur: *ἡ δὲ ψυχή*
παρὰ τὴν γαστέρα τῶν ὀφθαλμῶν. &c. Quod nos ita
vertendum duximus: Quod si humor quoque in ven-
tre prauus consistit, qui nimirum cibos cor-
rumpat. &c.

Pag. 198.

Quocirca coniecturam feci, nervorū qui primi à septima uertebra procedunt, partē quam-
piam obiectum fuisse inflammatam. Græcè legi-
mus: *νευρακια πληρη τῶν πνευμάτων* & *αὐτὰ τὸ ἴδιον πνεύματι*
ἀσθενεῖσιν ἀνακαταλαμβάνουσιν, quod idem est, *quod prius erat, &c.*
Quod ita utendum est: Coniecturam feci, ner-
vi post septimam uertebra excurrentis, statim
in primo exortu partē aliquam, obiectum, fuisse
inflammatam.

Page. 100.

Ergo nervus qui à ceruice prodeunt, ulnæ mi
exigua pars, ad minores peruchit digitos. Græ-
cè: ὁ ἐλάττω δὲ τῶν ἄλλων ὁ ἀρσεν. Hoc est: Ulnæ mi
humilior pars. Ibidem.

Ibidem.

illi præcipue spinæ parti, quæ in affecta particula principalium obtinebat. Græcè: *ἡ σπονδυλικὴ ἀρχὴ* & *ἡ ἀρχὴ τοῦ σώματος*. Quod est: Quæ principium affectæ partis in se continebat.

Pag. 404.

Verū animalibus instrumentis omnibus naturale quoque munus debetur. Græcè: *ἡ φυσικὴ δόξα*. Hoc est: Naturalis quoque dispensatio adest.

Lib. 11. Pag. 401.

Copus: Quippe ut dolor tristis sensus est, ita voluptas blandus est sensus. Græcè: *ἡ γαῖνα νῆστις, διδασκαλὸς ὅτις ἀνίσταται, καθάπερ ὁ ἰσχυρὸς ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν.* Hoc est: Dolor enim est tristis sensus, quemadmodum ipsa voluptas, blandus.

Ibidem.

Quòd si rem accuratius inspexeris, handqua-
quam doloris species dicendus est stupor. Græ-
cè: *ἡ δὲ διαφορά τῆς τοῦ νοσήσαντος ἀναισθησίας ἐστίν.* Quod est:
Ne differētia quidem inter dolores est, stupidus
dolor. Pag. 408.

Pag. 408.

Morbus uero laterialis, membranz costas succingentis est morbus. Quare ubi costas quidem uicina est, necessariò comprimitur. At media ipsius pars, comprimi non potest. Græcè : *ἡ νόσος τῶν πλευρῶν τοῦ σώματος ἀπὸ τοῦ ὀπίσθενος ἀπὸ τοῦ πρόσθενος ἀπὸ τοῦ ὀπίσθενος ἀπὸ τοῦ πρόσθενος*, &c. Hoc est: Quare ubi costas quidē adhaeret, necessariò comprimitur. Quod uero ex ea later costis est litum, incompressum remanet.

Pag. 410.

Alius, qui ob reuersionem fit, non soli affectu
parti proprius, ut qui uicinas partes interdū affi-

ciat. Græcè legitur: *ἵνα διὰ τὴν τὴν εὐαγγελίαν, ἡ ἡ*
ἐκείνη ἡ ἐκείνη, ἀλλὰ ἡ ἐκείνη ἡ ἐκείνη τὰ τὰ τὰ τὰ
τὰ τὰ τὰ τὰ, &c. Quæ sic uertimus: Alius uerò
qui fit ob tensionē, non amplius soli affectu par-
ti proprius, sed ob uicinas partes etiam interdū
accidens. Pag. 411.

Pag. 415.

Neg enim ut à tenui corpore, breui temporis spacio exire poterat, sed à profundo quodā. Gr̃c: ἀπὸ τοῦ βαθύτος. Hoc est: Sed ueluti ex profundo quodam.

Pag. 411.

Quemadmodum in bene valentibus, qui libera-
untur respiratione. Græcè: *ὡς ἐν τοῖς ἀνθρώποις
οἱ ἀνθρώποις*. Hoc est: Quemadmodum in respi-
rationibus haud uolenter factis.

Page 415.

Ipsa enim omnes pelli subiacētes partes, spissitudine superat. Græcè: $\text{ἡ δὲ σαρξ ὑπὲρ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος ἐκτεταμένη ἐστίν.}$ Hoc est: Quod nimirū cutis omnes sibi subiectas partes spissitudine superet.

Page 411.

Quinetiam calidam sentiunt respirationem.
Græcè legitur; $\alpha\lambda\epsilon\iota\sigma\iota\varsigma$. Hoc est: Expirationem.

Pag. 416.

Verumtamen uero, quod principium sensus & motus ab impetu producentis, sedem in cerebro habet, &c. Circa istud in his actibus ipsius, non potest dici nisi in se autem, hoc ipso, loquendo de actu ipsius, &c. Hoc est: Quod iugiter quiescimus esse, nempe ducem sensus & motus ab imperio producentis, in cerebro collocari, &c. Differt siquidem plurimum ipsius motionis & sensus dux ab earum operationum principio. Quippe omnium functionū animalium principium est cerebrum: dux est ipsa facultas, que in illo gignit, & ab ipso emanat, hoc est, animalis spiritus.

Lib. 111. Pag. 411.

Copus: Præterea quamvis iam dictæ tempe-
ries sint cōtrariz, Græcè legitur: *Ανταρσις*. Hoc
est: Intemperies.

Pag. 458.

Si uero simul cum uniuerso corpore facies quoque conuulsa uideatur, non solum eam partem, quae ex spina procedit, uerum etiam cerebri ipsam curamus. Graece legitur: *ὁ πάθος τοῦ σώματος καὶ τοῦ εὐρέου*. Hoc est: Non modo spinalis medulla exortum.

Page 461

Igitur quemadmodum phrenitidis, febris unū quoddam accidens dispositionū cerebri censetur: sic et conuersio in ardentium febrium demencia, multis aliis et a ignis uaporibus. Græcè iuxta-batur: *ἡσυχία ἐστὶν ὁ ὀρεσμενὸς τοῦ νοσήσαντος* πρὸς τὴν ὑπερθεσθεῖαν ψυχὴν, ὅτι τὸ ἡσυχίαν παρὰ τὸν ὀρεσμενόν, ὡς ἡλίου ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἐστὶν. Quod est: Quemadmodum igitur phreniticorum febris, unum quoddam est cerebri dispositionum symptoma: sic delirium, ardentium febrium symptoma existit, ad cerebrū elatis multis uaporibus calidis.

Pag. 461.

Fitly interdum ut rufo colore homines affa-
tim in melancholicis temperiem decidunt. Grae-
ce legitur: *si $\delta\eta$ polpea rufu $\chi\alpha\iota$ ne aut pueru*. Hoc est Ad-
modum rubicundi. Ibidem.

Quippe in his uenis sanguinem cōtineri con-

[illegible]

Tamen sola spiratio, quæ musculorum pectus
 mouentium munus est, seruatur. Græcè *σπῆμα*
σπῆμα *σπῆμα*. Hoc est: Mouentiū thoracem. Ecce
 nim pectus (quod Græci uocant *σπῆμα*) thoracis
 pars anterior existit.

Pag. 477.
Quemadmodum ore stomachi accidit, Graecum est. Quod est: Quemadmodum in ore utriculi. Nam stomachi semper accipi aut pro gula, aut pro ipsius ore utriculi, apud omnes tum Graecos, tum Latinos, si tam men excipias barbaros, est in consesso.

Quemadmodum & reliquarum quoque par-
tium interdum aliquę Grę cę tantũ legitur: *ὡς τὴν*
ἑσπερίαν &c. Hoc est: Quemadmodum pars ali-
qua ipsarum.

[illegible]

Quorum alij quidem cōmunes sunt per cerebri nervorumq; consensum. Græcè: *ἀπὸ τοῦ κοινῆς τῆς ψυχῆς*. Hoc est: Ob cōmercium quod habet cum cerebro & nervis.

Pag. 491.
Proinde & tertia, & quarta coniugationis ner

ui. Græc: *οἱ δὲ αἱ σὺν τῇ ἐν τῇ δεξιᾷ, καὶ τῇ
ἐν τῇ ἀριστερᾷ.* Hoc est: Proinde secundum & pri-
mam coniugationis nervi. Arbitror tamem legen-
dum: Secundum & quartam: id quod colligo ex su-
periori sententia, ubi Galenus ait: Sanè affectio
in utraque parte, nam dextra quam sinistra, cere-
bro, in eo uidelicet spacio, unde tertia nervorum
cōiungatur prodit, omnes uicinas partes simul af-
fici consueverit. Hæc Galenus. Atqui regiones
ex, à quibus oriuntur secunda & quarta nervorum
copula, proximæ sunt origini tertiæ coniugatio-
nis. Ibidem.

Id autem per nervos non à tertia coniugatione, sed à cervicis vertebrae procedentes, efficiuntur. Nam hi per totam ferè faciem sparguntur, exiguus ipsius parte excepta, quæ à quinta coniugatione procedens nervus suscipit, in suprema uidelicet lateri musculi parte. Græcè legitimus : ἡ δὲ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἀσθενὴς νεύρον ἐκ τριτοῦ καὶ πέμπτου στήθους, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τοῦ πρὸς τὰς φάρυγγας συνδεδεμένου, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τοῦ πρὸς τὰς οὐρανίας συνδεδεμένου κινήματος, ὅθεν τὸ ἐλάττωμα τῆς βίβης τὸν κρανίου. Quæ sic nos uertimus: Cæterum ut la-
tus ille muscularis non recipiat nervus à terna coniu-
gatione: sed nervi à cervicis vertebrae proceden-
tes, in illum ferè totum disseminantur, exi-
guus ipsius parte, subtilioribz excepta, tu quam
defertur nervi à quinta coniugatione, &c. Sic
autem effe uertenda hæc, colliges ex lib. x v de
Viti parium, pag. 808.

Sed in lumbis totius nervus ex superiori excidit uertebra. Vbi si transierat eueniat uertebra-
rum luxatio, eadem secum trahens & spinam &
neruum, illud seruat ipsius secundum naturā
ortum. Græcè legitimus: ὅτι διὰ τὴν ἀποκρίσιν τοῦ νέρου
ἐκ τῆς σπονδυλικῆς ἀρθρώσεως, ἡ ἐξ ὑπερτάτης
ἀρθρώσεως τοῦ νέρου ἐκτὸς τῆς σπονδυλικῆς ἀρθρώσεως,
καὶ οὐκ ἐκ τῆς ἀρθρώσεως τοῦ νέρου ἐκτὸς τῆς σπονδυλικῆς ἀρθρώσεως.
Quod sic clarius interpre-
tabimur: In lumbis autem totius nervus ex supe-
riori excidit uertebra. Quare in eis facit, transie-
si spondylorum luxatio, unā secum abducens et
spinalem medullam & neruum, illud seruat
ipsius secundum naturam ortum.

Pag. 502.
Nam in his magna ex parte totus thorax dilata-
tari confuevit. Græcè: *ὁ αὐτοὺς πᾶς ἀντὶ τῆς ὑπερ-
διεγίγνετο ἱσπ.* Quod est: Nam si plurimum di-
stendant uniuersum thoracem.

Pag. 510.

Quinetiam uitarii uocem haud obſcure con-
tingit, cum lex acutor, vel maior redditur, ob id
quod fauces à ſuis muſculis nequaquam diftendi.
Graeci: *ἐπὶ τῇ ἀκροῦ τοῦ ἐμφανέως τοῦ ποτὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ*
τοῦ πύλου, ἐν ἀκρῷ, καὶ αὐτὸς ἐν τῇ πύλῃ, ἀνὰ
ποτέρω μούσουλιν ἀκρίβ. Hoc eſt: Contingit quoq;
haud obſcure laxi uocem in acumem & magni-
tudinem, ubi etiam fauces à ſuis muſculis con-
tendi non poſſunt.

Quod si per inspirationem cuiusdam narium
pinnæ manifestè contrahuntur, id uerò effi-
cax prostrati roboris indicium est. *Græc. ἡντιν
ἡντιν τὰς ἀρτηρίας τῶν πτερυγίων τῶν ἀρτηριῶν τῶν πτερυγίων τῶν ἀρτηριῶν*

tium & plenitudo & suspensio, Græcè legitur: *τὸ πλεῖστον ἐστὶν ἐν τῷ σπέρματι, ὅθεν καὶ τὸ σπέρμα ἐστὶν πλεῖστον*. Hoc est: Vaso est ad ipsum peruenientium, appendicibus eorum, plenitudo. Sic namque legendum esse, indicat dictio sequens, quæ est talis: Itaque multiplicatus sanguis in uenis, eas extendit, atque ueniis ipsis appendices. Nam ubi interpres conuertit uincula, codex græcus habet, *ἀπὸ τῆς αἵματος*.

Ibidem.

Igitur si æqualiter undique trahantur, recta erit, & sine inclinatione ipsorum transmutatio. Si uero inæqualiter, ad partem uehementius trahentem intenduntur. Græcè: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Quæ sonat: Si igitur æqualiter undique trahat uterus (apud Græcos enim *αἰσῆς* in plurali significant uterū) recta erit ipsius transmutatio. Si uero inæqualiter, ad partem uehementius trahentem, intenditur.

Pag. 599.

Nonnullis panus in extrema illius parte exciditur, ueluti uiris quoque eodem in loco nonnullam oriri solet. Qui ubi suppuratus aliquando fuerit, secari debet. Atque hanc partem siue membrum suppuratum dissecandum uidimus, interdum ignorantibus medicis inexpertis quid incideret: interdum uero intelligentibus quoque. Atque omnia membra ita suppurata facili curantur. Græcè legitur: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Si igitur æqualiter undique trahat uterus, recta erit ipsius transmutatio. Si uero inæqualiter, ad partem uehementius trahentem, intenditur.

Pag. 606.

Quippe eodem tempore omnes totius animalis artus, inter se se similiter producuntur. Græcè: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Dilatantur.

Lib. I. de differentiis febrium.

Pag. 611.

LEONIC. Ac nullo minus in corde ipso, ut quæ ad idem cõstat cum omnibus ipsis. Græcè: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Quod est: Ceu cõstitutæ & cõspirabile cum uniuersis artibus.

Pag. 613.

Ex quarū numero febris est una, quoniam in

corde quædam præter naturam caliditas generatur. Græcè legitur: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Vbi in corde, &c.

Pagina 614.

Ira autem est ueluti quidam seruo ac uehementis motus potentæ irascibilis in ipso cordis corpore sita. Græcè legitur: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Collocata: sic ut participium hoc referat nõ iracundiam, sed irascibilem facultatem, quæ in corde suam sedem fornicat.

Pag. 615.

Quoniam autem constringi terminū exteriorum, aut obstrui penitiorū partium meatus cõtingit. Græcè legitur: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Vbi uero, &c.

Pag. 616.

In obstructionibus quidem foraminum. Græcè legitur: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Meatuum.

Ibidem.

Quoniam nõ bene conueniunt. Græcè: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Quod est: Cùm neque amplius uiuant.

Ibidem.

Propterea autem, quicunque cibi glutinosi sunt ac crassi, sunt magis morbis obnoxii. Græcè: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Idcirco quicunque eas cibis læti & crassi sunt succi, idcirco quicunque eas cibis sunt, &c. Humana siquidem corpora dicuntur obnoxia morbis: cibi autem, uel morbosici, uel salubres.

Pag. 617.

Ex quibus omnibus simul cor affici est necessarium. Græcè: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Cum quibus omnibus simul cor affici est necessarium.

Pag. 620.

Sicuti in his qui nõ tempore frigidam bibūt. Græcè: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Intemperatæ.

Pag. 623.

Et quidem sæpius commouent, dormitantiū more. Græcè legitur: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Ac sanè sæpius conuiuent.

Pag. 625.

Omnibus siquidem hæticis febribus hoc inseparabile adest indicium, allaro cibo quidem, febrem accendi. Græcè legitur: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Caliditatem quidem accendi.

Pag. 626.

In omnibus siquidem febribus alijs, huiusce modi introitus etiam præter cibum assumptum, sunt incompressi. Græcè legitur: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Inconculsi inultus.

Pag. 627.

Si enim aquam frigidissimam miscueris. Græcè legitur: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Infuderis.

Lib. I. de differentiis febrium.

Pag. 644.

Leoniceus: At in tertianis quidem, causam à qua prouenit, rei quodammodo pungentis, ac ferientis sensum representatam quantitas autem, refrigerantis. Græcè: *ὅταν τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ, καὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς αἵματος ἐκτραχῇ*. Hoc est: Sed qui in tertianis accedit rigor, seu rei cuiusdam pungentis atque ferientis, sensum causæ

repræsentat: qui in quartanis autem, tanquam refrigerantis.

Ibidem.

Atque in pluribus circuibus continet. Græcè additur: τὰς δὲ πλείους. Hoc est: In pluribus particularibus circuibus.

Pag. 646.

Ac secundæ accessione finit in uasio. Græcè: καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ πρώτου περιόδου ἐκείνου. Hoc est: Multo magis finit in insultu: siue, anticipat.

Pag. 647.

Quicquid optimum fieri contigerit. Græcè: ὅτις ἂν ἕκαστος γρηγορώς γένηται. Hoc est: Quicquid potuerit corrigi.

Pag. 657.

Sac & hemitriticus, dimidium eius partem habet tertianam. Græcè habetur: ἡμῆς. Hoc est: Sui ipsius.

Pag. 661.

Estque tardus ac difficilis motus, frigida ac lenta existens materia. Græcè legitur: ἀργὸν καὶ ὀνείδην κίνησιν, καὶ σκληρὰ καὶ ὀνείδην φύσιν. Quod est: Quum nimirum in humor piger, ægrè mobilis, frigidus, ac naturaliter tardè permeans existat.

Pag. 663.

Nam ex his quæ de biliosa & pituitosa febre simul commissis conscripsimus, licet & hæc ad atræ bilis humorem transferentem, eius cum utraque illarum complexionem ac confusionem pariter coniecturari. Græcè legitur: ὡς καὶ τὸν ἀνθρακώδη. Hoc est: Ad melancholicam febrem.

Pag. 665.

Externa autem corrumpere, quod est putrefacere. Græcè: τὴν ἐξωτερικὴν. Hoc est: Quod est putrefacere.

Ibidem.

Calor autem extrinsecus, sanguine opprimit. Græcè: ὡς καὶ τὸν ἐξωτερικὸν θερμὸν τὸν αἷμα. Hoc est: Incalcescit autem externo calore sanguis.

Pag. 666.

Quod ex his humoribus, qui carbunculi appellantur, conringit. Græcè: ὡς καὶ τὸν ἐκ τῶν καρβυκωδῶν αἰσθημάτων. &c. Nempe: Quemadmodum in uocatis carbonibus.

Pag. 668.

Inflatur. Græcè: ὡς καὶ τὸν ἐκ τῶν.

Pag. 669.

Ita & in interioribus quæcumque non uidentur eandem proportionis similitudinē seruare, fieri concipiendum. Græcè: ὡς καὶ τὸν ἐκ τῶν ἐν τοῖς ἐντέροις. Hoc est: Sic oportet imaginari etiam in interioribus, quæcumque, cum non sint obiecta uisui, eandem tamen analogiam perpetuā seruanti.

Ibidem.

Et meatus, qui materiam inutilem excernunt: Græcè legitur: ἀπορροήματα. Hoc est: Deducetes. Si quidem non meatus, sed facultas ipsa expultrix excernit.

Pag. 673.

Quia uidelicet humor, quæ proprius calor nō obtinuit, nihil habet reliquū. Græcè: ὡς καὶ τὸν ἐκ τῶν ἀκατάστατων. Hoc est: Et quia humor qui à proprio calore non uiuitur, nihil amplius superest, nisi &c.

Pag. 677.

Neque etiā omnibus æqualiter accendi aut dissolui cōtingit. Græcè legitur: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Oportet.

Pag. 678.

Vt febris accendatur. Græcè: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Ac febris accendatur.

Pag. 679.

Sed id solum quod ita est extenuatum, & in subtilioris uaporis naturam transierit. Græcè: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Vt in tenuis uaporis naturam transierit.

Pag. 680.

Quidam feruentium humorū diffusus. Græcè additur: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Existens.

Pag. 681.

Quod qui putrefecere incipit humor, in aliquo membro consistit. Græcè legitur: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Alter, siue diuersus, existit.

Libro de arte medicinali.

Pag. 706.

Leonicenus: Et insalsubrium. Græcè: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Et morbidorum.

Pag. 709.

In uno autem tempore, quod ita est neutrum, consistere nequit. Græcè additur: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Accuratè quidem nequit consistere.

Pag. 713.

In hac enim necesse est, ut posteriores, prioresque partes. Græcè legitur: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Posteriores prioresque partes.

Pag. 715.

Medij sunt inter eos qui omnino sunt crispj, & simplices. Græcè corruptè legitur: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Lenes.

Pagina 716.

Capilli quoque in his statim in lucem editis, habent in capite ortū. Græcè habetur: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Celeriter generantur.

Pag. 718.

Implentur uerò atque aggrauantur eorum capita à calidis. At si humectentur, tunc multo magis excrementorum habent multitudinem. Græcè: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Quod si humectentur etiam, tunc multo magis, præcipue dum excrementorum copia redundat.

Pag. 720.

Parsitas uerò oculorū, adiuncta quidem con cinnitate, ac uirtutum operatione. Græcè: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Et operationum uirtute.

Pag. 723.

Ad actiones autē prompti sunt, & iracundi, & impudentes. Græcè legitur: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Celeres: nō impudentes, quod interpres uertit.

Pag. 725.

Sed de infirmitatibus, ac naturalibus non exposuisse. Legendū tamen est: sunt à nobis exposita. Alioqui non rectè fuit oratio, si illam eam deducas, ubi Galenus ait: Quod quæcumque, &c.

Pag. 727.

Dictum uerò est in tertio de causis accidentium, quod cuiusque potentie uirtus & uisū, temperatura principalis existit. Græcè habetur: ὡς καὶ τὸν. Hoc est: Quod

habetur diuersosque diuersi et agi hanc, & in propriis hanc
est. Quae iudicio meo sic sunt uertenda : Di-
ctum autem est in tertio de symptomatum cau-
sis, quod ipsius potentiae uirtus & uitium, a tem-
perie praecedente oritur.

Pag. 716.

Ad imum uentriculi locum, quem Graeci py-
loron uocant. Graece dicitur *πύλωρ*. Hoc est: Ad imū
orificium uentriculi, qui ianitor appellatur.

Pag. 746.

Horum autem singulorum, quae dicta sunt, qua-
litas in ipsa corporis constitutione est eligenda.
Graece habetur: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: In
optima constitutione.

Ibidem.

Alteram uero eam quae ad optimū transferūt.
Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Altera-
ram uero, eam quae ad optimam ducunt.

Pag. 751.

Alias quidem esse salubres causas eius tempe-
raturae. Graece legitur: *ἀλλὰ καὶ αἱ αἰσθησις*. Hoc est: In-
temperantiae.

Pag. 754.

Atque ad illas impellimus, quae nullum habent
principatum. Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Irritabimus autem illos, qui ad par-
tes minimae principes, scilicet ducunt.

Pag. 757.

Intentio tamen, quoad fieri potest, curationē
adhibere, ad cōtrarium euerfionis adducendo.
Graece habetur: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Quod est: Quaecumque igitur in pulmone atque
thorace ambiuntur, cum tuis sanē expurgant,
sed a medicaminibus extenuantibus.

Ibidem.

Aut per urinam, aut per uentriculum. Graece:
ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις. Hoc est: Aut per alium. Nam uentriculus,
siue a hanc, uentrem superiorem significat: quē-
admodum *ἡ δὲ αἰσθησις*, inferiorem.

Pag. 760.

Prius a parte repellendum: mox dispergendū.
Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Prius debet repellere a parte, quam ag-
grediari discutere.

Pag. 764.

Haec igitur omnia sanare possibile est. Graece
legitur: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Propemodum
est possibile.

Pag. 765.

Quare & duplex sanandi modus. Alter quidē
ad oppositā partē ei a qua facta est permutatio,
intēdendo atque impellendo. Alter uero, id quod
cōtinet, firmius solidiusque reddendo. Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Quare & curatio ipsa, in illa quidem (hoc est,
in luxatione) fiet ad oppositā partem ei, ad quā
facta fuit permutatio, impellendum nobis. In al-
tera uero (hoc est, in enterocolle) id quod conti-
net, firmius solidiusque reddendum.

*Lib. Quomodo simulantes morbum
sint coarguendi.* Pag. 771.

Flaccidus. Quando ex indigestione. Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Ex cruditate.

SECTIONE

QVINTA.

Lib. II. de medendi methodo.

Pag. 45.

Linacer: Nyctilopa dicitur. Graece legitur: *νύκτωρ*. Hoc est: nyctilopa. Dicitur autem nyctā-
lops, qui noctu cecus est, cum clare interdū cer-
nat. Plin. lib. 8. cap. 50. huius uoculū meminit, di-
cens: Refertur uespertinam aciem his, quos ny-
ctalopas uocant.

Pag. 67.

Quippe ipsam sequentis siue agendi insinua-
tionem. Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc
est: ipsam ueluti confectionis imaginem.

Lib. III. Pag. 115.

Linacer: Sin ficior debito particula tantū fue-
rit, quantū corporis temperamentū iusto est hu-
midius. Graece habetur: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc
est: At si particula fuerit ficior iusto, quam cor-
poris temperamentum sit iusto humidius.

Lib. IIII. Pag. 144.

Linacer: Exiguorum status mutatio. Graece:
ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις. Hoc est: Trāsmutationis meaturū.

Lib. V. Pag. 171.

Linacer: Praesertimque per angustias, uel princi-
pes particulas. Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc
est: Et praecipue per angustias quasdam.

Lib. VIII. Pag. 285.

Linacer: Itaque si iam praesens febris est, &c. Gra-
ce: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Si igitur
genitrix iam febris fuerint.

Pag. 317.

Alterā quae ex ipsorū quae indicant, dignitati
bus censetur. Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Alteram, quae ex
indicanū dignitatibus spectatur. Huic uerfio-
ni nostrae subicitur quod habetur lib. x. pag.
394. Perperensis scilicet indicantiū scoporū tum
magnitudine, tum dignitate.

Pag. 394.

Perperensis scilicet eorum quae indicent. Graece
additur: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Scoporū.

Lib. XII. Pag. 433.

Linacer: Quod ad dolores ex sensus torpore
sedandos, nullo minus est celebre. Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc
est: Quod ad dolores sedandos stupefaciendo
sensum, nullo minus est celebre.

Pag. 443.

Nam si imbecillum illi caput est, & quod facie
calentibus uinis impletur, &c. Graece legitur:
ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις. Hoc est: Et calidis uinis. At mul-
ta frigida uina facile incallescere possunt, si uide-
licet igni a demoueantur.

Lib. XIII. Pag. 490.

Linacer: Imō postea quod uniuersum corpus uac-
uaueris, ac necessarium est, eorū quae in inflāmata
parte continent, aliquid educas. Graece: *ἡ δὲ αἰσθησις καὶ αἰσθησις*. Hoc est: Sed postea quod
uniuersum corpus uacuaueris, utile sit, eorū
quae in inflāmata parte continent, aliquid etiam

L L

educere. Ibidem.

Generandis autem adhuc utriusque, Græcè: *γενεῖς* *ἑκ τῶν ἑνῶν*. Hoc est: Vbi uero affectus etiamnum in generatione consistit.

Lib. x. l. l. Pag. 529.

Linacæ: His uero etiam picari cōmodum est: idē tertio aut quarto quoque die, Græcè: *ἀπὸ τοῦ τρίτου ἢ τεταρτοῦ*. Quod est: Curriculo trium, aut quatuor dierū. Cum qua lectione in unum conspirat sententia illa, quæ paulō pōst habet in hūe modum: Ergo neq̃ a se iudē igroranti corpori admouere conueniet: nec cūm conueniet, scilicet illi nireuerim in hyeme bis, in q̃state semel id fecisse, est satis. Vnde liquet ex sententia Galeni, minimē quidem tertio, aut quarto quoque die, illos igrorantes picandos esse, sed semel quidem x̃state, bis autē hyeme: sic tamen ut singulari uice a triduum, aut quadriduum occupent.

Pag. 531.

Membranulam mollem firmamq̃ cuti gummi illius circumuoluens. Græcè additur: *χαλκῶν*. Hoc est: Ex charta membranulam.

Lib. I. de arte curatiua ad Glaucōnem.

Pag. 7.

LEONICENUS: Et oculorū motus manifestus. In excusis exemplaribus græcis legitur: *ἀδυνα*. Verū istissimus autem manu scriptus habet: *ἀδυνα*. Vt sit sensus: Oculorū etiam motus indicat, &c. Nam qui fieri potest, ut manifestus sit in eis oculorum motus, cūm uix possint (quod postea subditur) palpebras ipsas attollere?

Pag. 14.

Nam quæ uelociter fiunt, ac celeriter ad statū ueniunt, &c. Græcè legitur: *ταχὺ γὰρ γίνονται*. Hoc est: morbos acutos.

Pag. 17.

Non igitur notæ, minimēq̃ exquisitæ febres diuturnæ sunt, ut quotidianæ & quartanæ. Græcè: *οὐκ ἐστὶν ἐν ταῖς χρόνιαις καὶ ἐν ταῖς ἐξαιρετικαῖς*. Hoc est: Non igitur quemadmodū exquisitæ quotidianæ & quartanæ, sic etiam nō exquisitæ sunt longæ.

Pag. 19.

Atq̃ ideo uelociter euacuationes, quæ ex matricibus fiunt, cucurbitulæ mamillis appositæ statim sedant. Græcè: *ὅτι πρὸς τὴν ταχὺν ἀποβολὴν*. Hoc est: Iuxta mēmas applicitæ. De bē itaq̃ dum sic reuellerē est animus, nō ipsīs mamillis, sed radicē earū, cucurbitulæ ipsæ applicari, si qua fides medicorū decretis sit adhibenda.

Pag. 37.

An calidæ sint, an urentes. Græcè: *ἢ ἀκαλὰ ἢ ὀρεντα*. Hoc est: Atq̃ urentes.

Ibidem.

Ac submersæ quodammodo. Græcè: *ἐν τῷ ὕδατι*. Quod est: Veluti fumigantes.

Pag. 38.

Sed ante crīsis perturbantōē. Græcè: *πρὶν τὴν κρίσιν*. Hoc est: Sed in ipsa ante crīsim perturbantōe. Ibidem.

Nam si quod in eo membrū agitatur. Græcè: *ἐν τῷ μέμβρῳ*. Hoc est: Etenim si quæ in ipsa facie pars palpitet.

Lib. I. l. Pag. 42.

LEONIC. Nam ex duabus ipsecies, quæ qui-

dem nuper dictæ sunt, altera &c. Græcè legitur: *ἡ μία ἐκ τῶν δύο ἀδυνα*. Hoc est: Aliarum uerū specierum duarum, hæc quidem, cuius nuper mentionem fecimus.

Ibidem.

Sed minus calida & acri, q̃ sit prior. Græcè: *ἢ ἡ πρώτη*. Hoc est: Quam illæ species priores.

Pag. 46.

Sufficit autem in huiusmodi affectibus, uementiam doloris mitigare, cum aliquo ex his quod ex uino dulci, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroque sit liquata, conficitur. Græcè legitur: *ἡ δὲ μία ἐκ τῶν δύο ἀδυνα*. Hoc est: Quæ ex passio, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroque liquata sit, constat.

Pag. 48.

Herpetes autem, quantum ad totius corporis euacuationem attinet, ut erysipelata curare oportet. Quantum uerō ad ipsius particule patientis locum, &c. Græcè: *ἐν τῇ ἐκείνῃ τῇ*. Hoc est: Quantum uerō ad eam, quæ patienti debetur particula.

Pag. 51.

Aut mamillis cucurbitulæ apposuerit. Græcè: *ἐν τῇ ἐκείνῃ*. Quod est: Aut iuxta mamillas.

Ibidem.

Et cucurbitulas coxis applicueris. Græcè legitur: *ἐν τῇ ἐκείνῃ*. Quod equidē mallem uertere, inguinibus, aut feminibus.

Pag. 52.

A coniunctis euacuatio faciendā est. Græcè: *ἐν τῇ ἐκείνῃ*. Hoc est: A coniugatis.

Pag. 54.

Iam uerō, & qualitates quædam extraneæ. Græcè: *ἐν τῇ ἐκείνῃ*. Hoc est: Insolentes.

Pag. 71.

Igitur emplastica omnino medicamēta, quale est Machæronis, & Epigoni, & quod Iis cognominatur, ubi ad emmōtorū usum deducunt, cerati indigent admitione. Nempe hæc ad sinus utilia sunt. Græcè legitur: *ἡ δὲ μία ἐκ τῶν δύο ἀδυνα*. Hoc est: Quæ cumq̃ igitur exquisitæ emplastica medicamēta cūm sint, quale existit quod ad Machæronem, Epigonemq̃ refertur, quod Iis cognominatur, ubi deducuntur ad emmōtorum usum, cerati miscella indigent: ea enim ad sinus utilia sunt.

Pag. 78.

Quæ a natura purgationem nō habent. Græcè: *ἡ δὲ μία ἐκ τῶν δύο ἀδυνα*. Hoc est: Quæ naturali sua purgatione priuantur.

Pag. 80.

Passiones insequunt. Græcè: *ἐν τῇ ἐκείνῃ*. Hoc est: Per cōsensum afficiunt cōtinuæ partes.

Ibidem.

Cūm prope loca mortalia sit insignis aduultio. Græcè legitur: *ἡ δὲ μία ἐκ τῶν δύο ἀδυνα*. Hoc est: Prope principales partes.

Pag. 82.

Hæc quidem ad te missa, qui lonē peregrinaturus eras, medio critere se habere uisa sunt. Græcè:

ἐξελθὼν δὲ ἔγχε δα δακρυόεντων εἰς μακρὰν τὴν ἀλλομένην ἐν ἡμῶν
 ἀστροφῶν ἡγέρ. Hoc est. Atq; hæc quidem arbitror
 tibi esse abunde, qui ad longam profectorem
 accingeris.

Lib. de curandi ratione per venase-
ctionem. Pag. 90.

Theodoricus Gerardus: Quoniam autem calida simul, humidaq; omnia, facillime putrescere apparent, Græcè τὸ θερμὸν καὶ τὸ ὑγρὸν. Hoc est: Celerrime.

Pag. 98.

[illegible]

Pag. 99.

Geminam me uacuationis uis proponere no-
fit. Per uacuationē quidem, &c. Græcē legitur:
διὰ τὴν ἀναπαύσεως uis. Hoc est: Per uenē quidem se-
ctiōnes. Pag. 105.

multū detrahe

uolens multo fluat: aut pro puro aut rubro, liuidus. Græce habet: *ἢ καὶ καθαροῦ ἢ κοκκινίου, τοῦτο δὲ ὑπερβαίνει, ὡς ἰσχυροῦς καὶ ἰσχυρὸν ἔστιν αὐτοῦ συνειρμὸς καὶ ἰσχυρὸς αὐτοῦ.* Hoc est: Nec uerendū est multū deerrare, donec rubicundior, longēque flauior effluat: aut pro puro & rubro liuidus, &c. Siquidem constituit signū Hippocrates: (ut idem Galenus testatur) quod si sanguinis ē phlegmonē in uenā secūta assumpta sit, permixta non ē ipsius

Pag. 107.

Sic affecto liene, haud acque adiuvetur cir a
medium digitu finitric manus incisa uena. Grae
et inra talia in talia aduocant et de talia de talia pueri
aduocant talia aduocant talia aduocant talia aduocant. Quid
est: Similiter etiam laborante spli in finitric ma-

nu, contulerit. Huic lectioni subscribit quod habetur pag. 106. in hunc modum: Quemadmodum purant, qui lienem curari alunt, si uenæ ad secundum paruum digitum fixæ, lectione.

Pag. 100.

Nisi prius expurgatus foret, Græcè *μὴ πρὶν καθαρίσθαι*. Hoc est: Nisi prius uacuatus fuisset. Si-
quidem non agit illic Galenus de euacuatione
quæ fit per medicamentum, quam rectè aliqui
purgationem uocauerit: sed de illa quæ perfici-
tur per unæ sectionem, & quæ minimè purga-
tio dicenda est.

Pag. 111.

Datur autē & hoc tempore medicamentū qđ
proprie aurius appellatur, centrum habens drach-
mas, mixtur aliorum medicaminū cuiusq; sex.
Græce legitur: ἰσὺς, χαλκὸς ἑκατὸς μυστηρίους τοῦ
ἐκείνου φαρμάκου ἵσ' ἑκατὸς. Hoc est: In quo ad cen-
trum alioſ drachmas, cuiusq; aliorum medicami-
nū drachmaſe mixtur, &c. Est uero An-
dromachi compositio, cuius Galenus meminit
oſculo de compositione medicamentorum ſe-
cundum loca.

Pag. 112.

Quamobrem podagricos ex cubito purgare,
Græcè: $\chi\rho\iota\ \sigma\rho\iota\beta\alpha$. Hoc est: Vacuare oportet.

Cap. de revulfione. Pag. 119.

Vberibus admota. Græcè: *κατὰ τὰς τειλάς*. Hoc
est: iuxta mammæ.

Lib. de vena sect. aduersus Erasistratū.

Pag. 116.

Iosephus Testander: Vt interim noxas reticeat,
quæ ex inednâ necessariâ euenire solent. Græcè:
ut inopie derelin. Hoc est: Ex longis inednâ.
Ibidem.

10141114
10141114

τινα γρηγοριαν. Hoc est: Actiora effecta.

Lib. de venae sect. contra Erasistratos.

Pag. 14f.

Iosephus: Ego uero, quando antea sermonem cum medicis instituere opus habebam, quo ea considerarem, que illi pro non admittendo uenæ sectionis usu, dicturi fuissent, &c. Græcè: *ἰατροῖς ὅτι τὸ διαικιδεῖν τὸν ἀρρῶνα ὕπαιρθε τοῖς ἰατροῖς, ἀλλὰ τὸ ἐκ τῆς ἀναισθησίας τοῦ σώματος τὸν πόνο τὸν ἰατρικὸν οὐκ ἔχειν.* Hoc est: Primo igitur ueritus fuera cum medicis sermonē conferre, coniectans quæ dicturi essent de non admittenda uenæ sectione.

Lib. de marafino.

Nicolaus Lauachius: Hinc liquidò apertū est, quod si corporis totius sit affectus tabes, affici animal sine principis membri passione nequeat. Græcè habet: *in nullo si pars et sine maxime pars.* Quod nos uertimus: Minime quidem fit, nisi sit etiam principium animantis affectū. Pro quo principio intelligendum sanè est corruptio, quod unum præcipue in marasmo afficitur.

Eodem lib. iuxta finem.

Ceteris autē ex uisceribus ut plurimum ab affecto loco in uentrē redundās biliofus succus hec-
ticus citre febres potest. Græcē: *ὡς τὰ αἰσθὰς πρὸς τὰ
τὰ τὰ δυνάμει κατὰ τὰς μετέχουσας τὰς συνεισφέρουσας
καὶ τὰς ἀποδιδόνουσας τὰς ἀποδιδόνουσας τὰς ἀποδιδόνουσας*

olus. Hoc est: Vespilum autē secundum reliqua uiscera gignitur hecetica febris, infuso bilioso humore in uentrem uisceris male affecti.

SECTIONE SEXTA

LIBRO PRIMO, DE COMPOSITIONE PHARMACORUM secundum genera. Pag. 25.

Andern. Docti pariter estis primæ curationis consilium a morboſis dispositionibus suggeri. Græcē, *ἀνδρῶν ἡ γὰρ ἐστὶν πρώτη ἀναλὸς ἡ ἀρρώστιας ἡ νόσος ἀπὸ τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι*. Hoc est: Didicistis autē primum curationis scopum a morboſis proficiſci dispositionibus. Pag. 33.

Non adhuc extremū frigus aduolueretur. Græcē, *ὅτι δὲ τοῦτο ἀδύνατον ἐστὶν ἐν τῇ πρώτῃ φάσει*. Hoc est: Nō amplius egemus aduentitia frigiditate.

Lib. 11. Pag. 79.

Andern. Hæc sanē sed & prius ostendimus, in tertio Therapeutices cōmētario, diximus, quōd præcipientes cā ex demōstratione cōuenienti ad reliqua deducā. Græcē legitur: *ἐν τῇ δὲ τρίτῃ τῇ πρώτῃ φάσει τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι τὴν νόσον*. Hoc est: Hæc igitur dicta nobis iam antea sunt, exposita ē etiam in tertio lib. de medendi methōdo. Quare præcipientes ipsa cū decenti demōstratione, ad reliqua promouebo, &c. Cæterū dimittit legitur in impressis codicibus, *ὅτι αὐτὸ ἐστὶν ἡ πρώτη φάσις* interpretem.

Lib. 11. Pag. 143.

Andern. Huius generis est lixiua quæ stacte dicitur. Atq; hanc ipsam quæ ex materia sublimiſta est, cedrino oleū uirtute superat. Græcē: *ὡς τὸ ἐν τῇ τρίτῃ φάσει τῇ πρώτῃ φάσει τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι τὴν νόσον*. Hoc est: Eiusdem cum cedrino est generis lixiua stillantia uocata. Atq; inter species lixiui, illa est potentior oleo cedrino, quæ ex materia tenuiorū partium composita, confecta fuerit.

Pag. 153.

Iam alijs multis pharmacis potentia pauculis annis retinere cōtingit: atramentum euphorbiū alio nullo sanē minus post thapsiā. Sed clarius in græco exemplari: *ἐν τῇ δὲ τρίτῃ φάσει τῇ πρώτῃ φάσει τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι τὴν νόσον*. Cæterū alijs etiam compluribus pharmacis accidit, ut pauculis annis eorū uis euaneſcat: id quod post thapsiam, nullo minus euphorbiō contingit.

Pag. 173.

Tale igitur consecutus, & hanc ipsam cōmemoratam unctionē audaçter puncturis imponi to, ubi oras hiare metus est. Cuius contrariū habet priorius codices Græci: *ὡς ἐν τῇ τρίτῃ φάσει τῇ πρώτῃ φάσει τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι τὴν νόσον*. Hoc est: In quibus uentus fueris ne conuiuant atq; occidant oscula. Siquidem ut hiare Græcis est *χάσσειν*, sic *πύρρον* claudi, & orificia obstrui: id quod in punctis neruis est summū malum. Ac proinde Galenus, ut omni ratione aperiantur, duci esse magnū opus precium.

Pag. 180. Vbi agitur de sumptuosissimis pharmacis.

Vbi enim quipsi pharmacorū medicorumby

studiosus nō plura quingēſis myriadibus haberet, nullo simpliciōri dignabatur unī: multo magis uel duos aliquos uel monarcha odoratum si mul, & quod multa cōſet pecunia uolet habere pharmacū. Illa tam enſentētia prior clarius ex diſtinctione græca percipitur: *ὡς γὰρ τὸ ἐν τῇ τρίτῃ φάσει τῇ πρώτῃ φάσει τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι τὴν νόσον*. Hoc est: Quæ sonant: Quandoquidem enim quidam pharmacorū & medicorū studiosus, tamen nō habebat plures quinquaginta myriadibus, designabatur tamen ut medicamentis uulgaribus: multo certē magis, &c.

Lib. 111. Pag. 197.

Andern. Non tamen cum refrigeranti oleo liquare ipsū oportet. Græcē legitur: *ὡς γὰρ τὸ ἐν τῇ τρίτῃ φάσει τῇ πρώτῃ φάσει τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι τὴν νόσον*. Hoc est: Quæ sunt uertenda: Non tamen obuiō quouis oleo ipsū liquare oportet. Quam lectionem confirmat sequens sententia, quæ talis est: Sed si quidem rubor aut calor aliquis in circumpositis ulceri partibus præpollere uideatur, ex quo pili astringentium simul & refrigerantium: cuiusmodi myrrinum atq; melinum est.

Lib. vi. Pag. 339.

Andern. Quōd auxiliorū quædam ratio sola inuenit, quædam experientia, quæ & ipsa rationem requirit: nōnulla utriusq; opem postulant, subinde nobis est declaratum. Græcē habetur: *ὡς γὰρ τὸ ἐν τῇ τρίτῃ φάσει τῇ πρώτῃ φάσει τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι τὴν νόσον*. Hoc est: Quōd auxiliorum quædam a ratione sola inueniuntur: quædam ab experientia sola, nec desiderante rationem, &c. Multa quidenim sola experientia citra rationis opem inuenit.

Lib. vii. Pag. 380.

Andern. Porro ex ijs quæ a glutinatione *ἰχθυόσας* nominantur, nullum auferendum est prius, quam sua sponte abſcedat. Atq; si laueris, permittenda sunt. Græcē legitur: *ὡς γὰρ τὸ ἐν τῇ τρίτῃ φάσει τῇ πρώτῃ φάσει τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι τὴν νόσον*. Hoc est: Imō uerō etiam si quipsi lauaret, sinenda sunt ut adhererant. Monet itaque tenacia medicamenta, quæ applicamus corporibus, ne in balneis quidem esse amouenda, donec ultro ipsa decident.

Lib. I. de compositione pharmacorum secundum partes.

Pag. 433.

Ianus Cornarius: Alijs uerō herbis quæ iuxta humiliores regiones proueniunt, reliqui rotius corporis pili similem generationē habent. Græcē legitur: *ὡς γὰρ τὸ ἐν τῇ τρίτῃ φάσει τῇ πρώτῃ φάσει τῆς ἀσθενείας ἀναδύσασθαι τὴν νόσον*. Hoc est: Reliquis autem herbis quæ in marcidis exuiccisq; proueniunt regionibus, &c. Nempe, alij rotius corporis pili similem generationem fortiantur. Comparauerat siquidem prius ipsos capitis pilos tritico, aut hordeo crescenti in aruo aliquo præpingui & fecundo. Nunc uerū lanuginem reliqui corporis, similem ijs herbis habere generationē ait, quæ in aridis locis, sterilibusq; proueniunt. Confirmat hanc lectionē nostram Galenus lib. x. de Vſu partū humani corporis, ubi agit de pilis ciliorū. Cæterū codices qui ex cusi habentur, nō *αὐτῶν*, sed mutata *ἐν τῇ τρίτῃ φάσει*, hoc est, superiores, habent: quan-

quamquam interpres non superiores, sed inferiores uertit.

Pag. 489. De aceto.

Vt pote quod substantia sua modicè calidum est, plurimè uerò frigidum, & partium tenuium. Græcè habetur: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Quæ mallem sic reddere ad uerbū: Vt pote quod substantia quidem sua obineat pauxillum calidi: plurimum autem frigidi, atq; tenuium partium.

Lib. 11. Pag. 536.

Corn. Quæ Archigeneæ cōsequēter scripsit, in quibus est etiam Galeni censura. Græcè: *ἡ δὲ ἐν τοῖς* *ῥησιν διαφέρει*. Hoc est: In quibus etiam habetur Galeni distinctio.

Pag. 535.

Itaq; balnea temperata, & unctiones, & potus dilutus eis exhibenda sunt: omnisq; diuina liqui dior & boni succi constituenda. Græcè habetur: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Hoc est: Omnisq; uictus ratio humidior, et boni succi eligenda. Atqui non omnis uictus ratio liquida, est humida: cum plurima sint constituta fluida, quæ maximè tamen exiccandi uim possidentur, exempli gratia, tum mel, tum acētū.

Pag. 555.

Post exacerbationem uerò pharmacis hemi- cranicis est utendum: si quidem multa caliditas percipitur, his quæ refrigerans quippiam habent: citra uerò hanc, his quæ multū exalciaciūt. Vbi Græcè legitur: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Hoc est: his quæ sufficienter calificant.

Lib. 111. Pag. 56.

Cornarius: At uerò consimilis dolor est ex feris & saniosis humoribus in corpore aurium generatis, ei qui ex mordacium humorum illapsu forissecus factio contingit. Græcè tamen nō habetur, in corpore aurium generatis: sed simpliciter: In corpore genitis. Vt sensus sit, cōsimilem fieri dolore humoribus ex toto corpore in anres illapsis, ei qui ex mordacium humorū insultu forissecus factio, contingit.

Lib. v. Pag. 701.

Cornarius: Si uerò liquidi per omnē suam substantiam facti appareant dentes, nihil mirū est, ipsos inflammationi aliquid simile pati. Græcè legitur: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Quæ sonant: Cū autem huiusmodi aliquando rora substantia uideantur dentes, non est quod miremur, si perpeti etiam possint aliquid inflammationi simile.

Lib. vi. Pag. 741.

Cornarius: Quando uerò ueluti induratum quiddam de inflammatione relinquitur, penitus non conuenit, astringens ad discussorium miscere, nisi prius totum corpus sit euacuatum. Contrarius Græci codices dicunt: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Quod est: Cū uerò ex inflammatione quippiā

ueluti induratum relictum fuerit, penitus nihil astringens miscendum discutiētibz est, si uniuersum corpus sit euacuātū. Galenus itaq; præcipit, ne post totius euacuationē corporis, si phlegmone in scirrhum degenerauerit, solis digerentibus, discussorijsq; utamur: quandoquidē tunc uerendum non est, ne humores concitatus ad partes: nimirum corpore ab omni redundantia libero & immuni existente, ob præcedentem euacuationem.

Lib. de Theriaca ad Pisonem.

Pag. 1045.

Andernacus: Quoniam non solum hoc nomine ceteris omnibus præcellunt, quod imperitū dījū sint adepti, sed etiam quod uniuersa bona, uniuersis libenter impartiantur: sicuti & dījū ipsi tantū ex æquo gaudiū concipiunt, quantus eorū numerus existerit, qui ab ipsis redduntur incolūmes. Hæc tamen posterior sententia uidetur esse longe diuerſa in grecis codicibus, qui sic habēt: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Quod est: Non secus quā dījū ipsi, tantū ex æquo gaudiū concipientes, quantum illi qui ab ipsis seruant.

Pag. 1049.

Nos uerò cū hæc uideamus, sciamusq; id quod possit ratione nniuersumq; medicaminū naturæ uirtutis proprietatem uerè agnoscere. Græcè legitur: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Quem locum difficilem ego sapē sic uertit: Nos uerò cū hæc ceruamus, æsequamurq; ratione id, quod uerè possit exprimere proprietatem facultatis naturæ cuiusq; pharmaci, &c.

Pag. 1067.

Ad hunc enim peculiariter uerbapotentius habeo, quoniam manifestiores etiam in corpore cōuersiones, mutationesq; nō indicat. Græcè legitur: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Hoc est: Quoniam manifestiores in corpore cōuersiones, mutationesq; indicare potuisset.

Pag. 1074.

Porro erunt animalia colore substantia, corpore robusta. Græcè habetur: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Hoc est: Eximia quadam agilitate mobiles: uiperæ scilicet.

Lib. 11. de antidotis.

Pag. 1171.

Andernacus: Hac Nicomedes rex utebatur, si quando eos qui eum uocauerant, in suspitione haberet. Græcè legitur: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν* *ἡ δὲ ὑγρὸς ἔχει τὴν ἰσχυρὰν τὴν ὑγρὰν*. Quæ sonant: Si quando eorum, qui inuitati ipsū, habebat sibi fidem suspectam. Si quidem ueluti induratum uocare, tum inuitare, ad consuetumq; hortari significat.

EPITOMES
GALENI RERVM
MEMORABILIVM, QVAE
in illa cōtinentur omnium, Index per-
quisit copiosior: cuius prior numerus
columnarum, posterior verò eiusdem
columnae versum denotat.



SEDO MEN vulnera
rum cōsueudi ra
tio 875.3
Abdomine vulne-
raro, cur medio-
cre foramen sit salutaris as-
gusto 875.3

Abdominis descriptio 874.37

Abdominis musculi duo obli-
qui 174.51

Abdominis musculi octo, qua-
tuor coniugationibus cōpre-
henfi 94.30. 174.51. 175.
43. 230.9. 222.9. 765.3

Abdominis musculi obliqui
quatuor 230.16

Abdominis recti musculi 225.
21. 230.10

Abdominis musculi transuersi
225.30. 230.14

Abdominis musculorum usus
181.45. 230.56

Abdominis pars anterior cum
vulnere, acrius curat ipsa
que cōstitit ad latera 874.58

Abdominis uernae 146.3

Aberrationis potentiae alterati-
cis duo sunt genera 683.57

Abluta redduntur mordacitate
expertia 1024.61

Abortus quam constitutionem
sequatur 300.56

Abortus 86.21. quando ac-
cidat 227.36

Abrotoni cinis ex aliquo oleo
calido, barbā tardius nascentem
eficit 1066.8

Abrotoni dux sunt species.
1065.43

Abrotoni temperatura & essen-
tia Ibid.26

Abrotono si quis perficeret ante
inuationē, minus ā febrili ri-
gore infestabitur Ibid.30

Abrotonum inimicum ventri-
culi est Ibid.39

Abrotonum uermes perimit
Ibid.33

Abfcessibus qualia soleant ines-
se corpora 978.49

Abfcessibus qui in uiscerib. deli-
tescunt, medicamenta quae ex
aromatibus componantur, ma-
ximē sunt ex usu 949.54

Abfcessus quando secundus sit,
& qua in parte 935.42

Abfcessus quid 978.43

Abfcessus quomodo fiant 706.41

Abfcessuum curatio 978.62

Abfcessuum duplex genus 949.33

Abfcessuum modi diuersi 63.1

Abfinthij duplex facultas 922.7

Abfinthij natura, uis & species
480.35. 1065.45. & 50. & 53.
1073.37

Abfinthij potio quib. sit aduer-
sa, & quibus congruat 480.
49. 836.26

Abfinthium hepati optulatur
922.5

Abfinthium intus repurgat me-
tus, foris nequaquam 1057.32

Abfinthium Ponticum eligend-
um ad iecoris & uentris phle-
gmonas 922.11

Abfinthium remedium summū
cōtra bilis molestias 961.17

Abfinthium uentriculo gearum
1065.40

Abstergentia leuiter, producen-
da carni sunt idonea 1116.30

Abstinendum ab omnibus ma-
li succis cibis 380.19

Abstinētia omnimoda inducit
nauseam, ac prauum succum
accumulat 458.61

Abstrusa sensui, quaedam in se-
clui perspicua, quaedā osten-
sione cognoscuntur 10235

ACACIAE facultas 1067.60.
2220.30

Academicorum falsum dogma
3.45

Acalyphes siue urticae facultas
389.26

Accessio morbi naturam cōmo-
uet 620.7

Accessione febrili innadēte, cur
gei sopore corripiant 737.14

Accessionē futuram cognosce-
re in febris, maximē est uri-
le 809.9

Accessiones febriles unde orian-
tur 899.6

Accessiones longiores aut bre-
uiiores unde contingāt 800.
21. & 30. & 33

Accessionis febrilis declinatio
est humorum effluucentiū
diffusio 801.39

Accessionis febrilis tempora de-
scribuntur Ibid.26

Accessionum circuitus quan-
do desinant, & quando perse-
uerent Ibid.57

Accessionū imparitas unde cou-
tingat 800.38

Accessionū proportio quomo-
do exploranda 609.59

Accessio quāq. fortitur quatuor
tempora 659.22

Accidentia decretoria 829.19

Accidentia & symptomata quo

modo differant 844.17

Accidentia propria indicant lo-
cum affectum 727.33

Accidentia superuenientia tris-
tiam diuiduntur 619.53

Accidentium proprietates, mor-
bum declarat 727.58

Accipitris uires 1275.7

Acerba quae sint 1020.23

Acerba ualentius austeris cur a-
stringant 183.45

Acerbi & acidi discrimen 1042.
27

Acerbitatis in aliis qualitates
mutatio 1042.2

Acerbum corpus tripliciter ex-
oluitur 1042.64

Acerbum, frigidum est Ibid.22

Acerbum quid 861.47

Acerbus acido sapore magis ter-
renus 1042.17

Acessit in uentriculo cibus, ob-
causam frigidam 726.14

Acerbula 1066.23

Acerbula siue coryledones quae
109.1

Acerbulum capitis scisquicyathū
1292.2

Aceri facultas 418.35. 909.
34. 923.65. 1018.3. 1044.
49. 1099.8. 1162.10. 1180.8

1196.21. 1204.20

Aceri temperatura non longē ā
media distat 1017.33

Aceri usus quando indurans cō-
ferat 945.47

Acer quomodo urdū 909.39

Acerum ardorem ā raphia exci-
ratum, sua refectione res-
tinguit 1017.22

Acerum biliosis utilissimū, me-
lancholicis aduersissimū
1019.3

Acerum cui sit remedium sit
1018.32

Acerum quā rosaceo misceat ad
phrenitidem 1201.45

Acerum ex contrariis facultati-
bus constat 1040.63

Acerum frigidius est maiori ex
parte quā calidius 1016.55.
1017.22

Acerum magis refrigerat quā
mel calfacit 1045.4

Acerum mistas fortitur facul-
tates 946.54

Acerum quando miscendū phle-
gmonarum medicamentis
923.24

Acerum quando sit rosaceo mi-
scendum in capitis affectioni-
bus 1201.54

Acerum quā ratione dicat neu-
trum 1017.42

Acerum quā ratione sanguinē
fluentem sitat 1017.4

Acerum

- Acetum rosaceo mistum, quibus prostr inflammationibus & quibus minimè 1201.59
 Acetum scilliticum 1006.51
 Acetum scilliticum orthopnoicis & asthmaicis maxime opitatur 1147.46
 Achorem saeuorum curatio 1195.58
 Achore quid 709.2.
 1195.44
 Acida frigiditas tenui est partium 1041.15
 Acida omnia sunt frigida Ibidem 3
 Acida quæ dicantur 1030.29
 Acida tuctus à quibus edantur 685.25
 Aciditas unde oriatnr 1045.49
 Acidorum natura 1041.63
 Acinorum semina astringunt, nihil mutantur in corpore 581.2
 Acinorum substantia ex quibus consistit Ibidem 1
 Aconiti lycoctoni facultas 1068.44
 Aconitum pardalianches quam uim habeat Ibidem 410
 Aconitis serpens ut perimat 1273.52
 Acopa qualia esse debeant 1186.41
 Acopi exabierte compositio contra omnem lassitudinem ualens 463.50
 Acopon ad articulares dolores 1187.32
 Acopon ad dolores coxendicis, articulos impeditos, & paralyfim admodum efficax 1188.20
 Acopon ad omnem neruorum dolorem 1157.19
 Acopon Aplirodæ, foxidū Ibidem 15
 Acopon Casti 1188.6
 Acopon ex castorio 1187.25
 Acopon ex melle Ibidem 11
 Acopon Heræ 1188.29
 Acopon Themisonis 1187.6
 Acopon uiride Halier Ibidem 64
 Aconi facultates 1068.14
 Acre omne calidum 1057.59
 Acria amara calidiora 1046.17
 Acria cum calore incidunt, acida cum refrigeratione 385.53
 Acria & amara corpus parcius nutriunt 190.56
 Acria largius sumpta, quæ maiora inferant 414.1
 Acria necessariò habent admissam dulcedinem 1047.61
 Acria omnia mordicinia simul & calida, tenuant ac incidunt 414.43
 Acria omnia parti cuius admoda, fluxionem augent, nisi corpus purum reperiant 996.66
 Acria omnia, succos erassos tenuare possunt 413.64
 Acria quæ sunt 413.62.
 1030.27
 Acria quibus cõueniant 192.6.
 414.5
 Acria seruata, sua acrimonia exulcerant interna 57.47
 Acria tenuant admodum, dum adolefcunt 414.35
 Acria ulceri admoda, rigorem afferunt 714.59
 Acrium assiduus usus deuitandus 192.4
 Acrium facultas 414.2.
 1114.42. 1176.29
 Acrochordones 709.10
 Acrochordonū curatio 953.14
 Actio alteratrix uentriculi quæ abolita, imbecilla, & deprauata dicatur 667.5
 Actio animalis sensibilis quintuplex est 665.33
 Actio animalis triplex Ibidem 11
 Actio cur non dicatur esse abolitæ 845.56
 Actio duplex 665.39
 Actio & passio quid 664.51
 Actio ex accidenti quæ 22.9
 Actio ex comfoda oritur temperie 79.40
 Actio gubernatrix triplex est 665.40
 Actio læditur necessariò, læso ipsius instrumento 724.24.
 725.39. 735.54. 846.51
 Actio læsa partem affectam indicat 727.11
 Actio membri promptissimè à calore immodico læditur 487.60
 Actio motrix variatur pro instrumentorū diuersitate 665.38
 Actiones accidentarie qualiter iudicandæ 60.49
 Actiones corporeæ præcipue in pueris uigent, ut animales in prouectionibus 473.19
 Actiones corporis unde oriuntur, digno 124.39
 Actiones manuarie omnes sūt aut stantibus aut sedentibus nobis 210.27
 Actiones maxime necessarie & uehementissimæ, quæ figura sunt 204.53
 Actiones morales quæ dicuntur 759.7
 Actiones naturales quatuor 666.44
 Actiones partium duplices, simplicium nempe & compositarum 21.59
 Actiones partium seruant, seruata illarum temperie 880.44
 Actiones principales quæ dicuntur 739.6
 Actiones reliquæ sequunt in iam æditis, post actionē mandendi 307.60
 Actiones sequuntur corporum constitutiones 431.18
 Actiones substantiæ imitantur proprietatem 184.14
 Actiones ualide, uigentiu uiriu inseparabilis sunt nota 698.56
 Actiones uniuersæ ob defectū qui illas accidit erebrioris redduntur 557.55
 Actiones uoluntarie quarū parum sint propriæ 445.27
 Actiones affectusque duplex significatum 316.46
 Actionis appetitricis symptomatica 666.18
 Actionis cognitio multum conserit ad cognoscēdos affectus partium 320.5
 Actionis imaginatricis symptomatica quæ 666.8
 Actionis imbecillitas, uires invalidiores ostendit 699.51
 Actionis læsio est affectus parris symptoma 733.16
 Actionis motricis symptomatica triplicia 665.62
 Actionis nutritricis symptomatica 666.40
 Actiōis ratiocinatricis symptomatica Ibidem 12
 Actionis sensus læsiones quæ 665.42
 Actionis uiriu quando pronuntiandum sit morbus 411.11
 Actiōis animæ principalis singulæ quid significant 817.55
 Actionum animaliu quindecim sunt symptomatica 666.49
 Actionum duplex natura 21.6
 Actionum imbecillitas non est morbi nota, nisi sit præter naturam 430.58
 Actionum læsio duplex 665.27
 Actionum naturalium symptomatica duplex 666.18
 Actionum robur, ad uirium fortitudinem sequitur 698.49
 Actionum robur cõsequitur ad calidum & siccum temperamentum 118.48
 Actio nutritoria naturalis existit 674.12
 Actio omnis magna ex parte à propria organi substantia procedit 197.1
 Actio propria singulari inest, propter substantiæ proprietatem 341.29

Actio propria quæ 22.8
 Actio parvis quid sit 110.5
 Actio quid dicatur 71.51.
 116.35. 842.39. 845.64
 Actio ratiocinatrix quotupliciter uinetur 666.19
 Actio sentiendi triplex symptoma admittit 668.16
 Actio tonica quæ 97.49
 Actus calidorum, frigidorum, humidorum &c. inueniendorum ratio 4.4.6
 Actus calidum, frigidum, humidum &c. quor modis dicatur 55.32
 Actus & potestate calidum quotupliciter dicatur 61.10
 Actus, præfens quid & perfectum 55.46
 Actus aliquid, commune multis generibus 511.10
 Ad aliquid quæ dicantur 60.16
 Adarction quam habeat essentia & uim 1142.42. 1190.24
 Aden cerebro subiectus 358.44
 Adeps capillaris contra succos intestina erodentes cur faciat 1019.38
 Adeps & pinguedo porius sunt carniæ nos alennum cõdimenta, quam alimenta 395.7
 Adeps gallinaceus atque asinarius, quatenus inflammari auriæbus medetur 1210.6
 Adeps quibus adhæreat partibus 310.1
 Adeps qui gignatur 49.32
 Adeps quomodo à pinguedine differat 1135.31
 Adeps quo pacto gignatur, & quibus oarib. adhæreat 45.31
 Adeps tenuium partium leuium lorum 1166.31
 Admixtio quid 691.59
 Admixtio differentie 1041.49. 1055.55. 1135.51. 1182.50. 1186.57
 Admixtio uis 310.4
 Admixtio septem, ad ueritatem in rebus abstractis inquirendam 33.29
 Admixtio formis 216.17
 Adolescentes ad omnes uoluntarias actiões aptissimi 411.27
 Adrianus imperator 809.14
 Adrianus rhetor 643.32
 Adulteria medicamentorum, cur non sint docenda 1121.42
 Adurentia simul & astringentia quæ sint 865.48
 Admixtio febrientibus quales esse conueniat 908.10
 Ager quando consulendus 857.54
 Agelops quid sanet 1067.45

Agelops descriptio & curatio 122.4.51
 Agelops in hordeis 378.17
 Agri exercitatione non opus habent 363.26
 Agrotare quando caput dicatur 735.52
 Aegyptia Andromachi 1180.40
 Aegyptia Claudij Philoxeni 1168.52
 Aequalitas inæqualitatis in uno pulsa & in pluribus fit, ordo autem confusio in pluribus tantum 522.9
 Aequalitas quid 497.36
 Aequaliter mutari quæ dicitur 522.55
 Aer actus fit flamma 1040.29
 Aer actus est calidus, medicamentosa potentia 1027.61
 Aer ambiens tale inter uidentum fit instrumentum, quale natus in corpore 345.43
 Aer calidissimus quomodo refrigerandus 908.44
 Aer frigido quando utendum 908.61. 909.20
 Aerem ambiens esse ueluti cognatum corpori 430.19
 Aer impendio calidior, quid in corpora nostra moliat 783.25
 Aer impurus, omni ætati aduersatur 415.37
 Aer in curâdis morbis uel tuenda sanitate, obinet rationem causæ sine qua non 908.30
 Aeris differentie 435.14
 Aeris frigidi effectus 908.52
 Aeris inspirati quantitas, in quibus respondeat magnitudini dilatationis thoracis 756.61
 Aeris pestilens constitutio quæ fit 783.55
 Aeris portio una ad cerebrum, alia ad pulmones illabit 488.44
 Aeris putredo unde accidat 783.39
 Aeris squamæ & floris facultas 1220.8
 Aeris substantia tenuissima 781.27
 Aeris temperatura in ulceribus curandis expendenda 854.38
 Aeris tenuitas unde indicetur 1017.46
 Aeris uis 1126.2
 Aeris uis facultas 1220.7
 Aer materia est respiratio 438.41
 Aer natura frigidum elementum 70.48
 Aer purus à colore mutatur 347.47
 Aer nubilus denigrat pharmaca, syncerus confert ad eorum candorem 1155.26

Aer quale uis nobis fit in instrumentum 347.56
 Aer quando nos ledat 430.23
 Aer quatenus in morbo fit præsidium, uel causa morbifica 908.58
 Aer quatenus nos afficiat 829.59
 Aer qui optimus 435.34
 Aer redditur serenissimus spirante borea 689.13
 Aer solus efficit nocem 648.45
 Aer temperatus temperatum conuenit: intemperatus contrarius 415.40
 Aeruginis nomen 850.4. 1121.57. 1172.29
 Aeruginis species & uires 1122.38
 Aerugo per se adhibita, ratiõne & phlegmonem excitat 1155.43
 Aer unde has mutationes fortitur 914.30
 Aestatis crescit usus pulsuum, sed languescit facultas 569.17
 Aestatis temperies 630.56
 Aestuantibus uictus ratio conueniens 431.8
 Aetatis flores in medio extremo rum 46.35
 Aetas omnis post uigorem frigida est & sicca 805.24
 Aetas puerilis quantam uim habeat ad formandos mores 424.19
 Aetas quæ facili & difficulter euacuationes integras ferat 964.48
 Aetas senilis frigidissima aliarum & siccissima 46.45
 Aetas uigens omnium biliosissima 790.54
 Aetates numero annorum non circumscribuntur 473.22
 Aetatum calores qua methodo dignoscendi 47.1
 Aethiopes non siccitate cutis habent pilos paruos & incrementi nullius, caluescunt tamen ægre 278.59
 Aethiopes omnes crispi 51.1
 ATTRACTIBVS cognoscendis conducit ætatis, consuetudinis, causarum procatartica-rum, consideratio 471.2
 Affectibus, locis affectus cognoscendis, quæ sint necessaria 27.32
 Affectiõibus rheumaticis quid conferat 1150.56
 Affectiõibus similibus facilius singula corripuntur, minus tamen periclitantur 1193.62
 Affectiõis per consensum species dux 728.33
 Affectiõis quæ ex humorum assidue

- assidue fluxione oriunt, sunt
 quatuor 708.1
 Affectuū uētris acquiriturū,
 differētie octo 437.2
 Affectio partis duplex 801.5
 Affectu ulcerosa unde 699.39
 Affectu cognito facile inueni
 remedium 471.5
 Affectus in summo calido, frigi
 dum in summo paranda me
 dicamen 61.9
 Affectuū omniū maximē urgen
 ti dirigitur semper curatur
 consilium 887.1
 Affectus à crassa fluxione ori
 413.18
 Affectus aliores, medicamenta
 uel ementiora exigunt, q̄ si in
 superficie consistant 975.48
 Affectus animæ principalis fa
 cultatum, consistunt in cere
 bro 719.62
 Affectus animalis nec inanima
 to, nec irrationali animanti
 inuafici potest 318.47
 Affectus animi qui 420.9
 Affectus animi quinque 422.16
 Affectus à tenui fluxi one orti
 Affectus calidi 711.55 421.33
 Affectus conseruena non indi
 cant 32.17. 162.20
 Affectus corporis existit fun
 ctionis causa 843.34
 Affectus diaberi similis qua
 lis 773.21
 Affectus distingui à nitijs 310.5
 Affectus est motus animi, ratio
 ni inobediens 328.33
 Affectus & morbus quid differ
 rant 664.16
 Affectus & passio quid differat
 Ibid. 35
 Affectus febre qui uacēt 596.47
 Affectus frigidi 713.59
 Affectus humidus quid à molli
 differat 465.50
 Affectus hypochondriacus que
 sequantur 741.59
 Affectus hypochondriacus 683.
 Affectus immodice ficans (15
 quid indicet 465.59
 Affectus in alio siros, ne mē
 tiorem medicamenti uim re
 quirere, quam ut excoli in iti
 nere possit 835.60. 162.23
 Affectus infestantes per circui
 tus 797.42
 Affectus lethargicos & catapho
 ricos febrī adiunctos, quibus
 curesis 1118.5
 Affectus magnitudo est triplex
 887.8
 Affectus melancholici qui 392.28
 Affectus melancholici quomo
 do inhibendi 705.14
 Affectus nullus sanatur perfe
 ctē, manente ipsius causa
 887.30
 Affectus omniū partium unde co
 gnoscatur 827.37
 Affectus per consensum quādo
 firmandus 717.11. 719.53
 Affectus per se labefaciens fun
 ctionem, morbus 80.16
 Affectus pestilentes quid iuuēt
 1117.34
 Affectus præter naturam est tri
 plex 664.22. 845.39
 Affectus primarij distinguendi
 ab ijs, qui sunt per consensum
 716.18
 Affectus primarij q̄ sunt 719.50
 Affectus profundi pharmaca di
 uerfa ab ijs que in superficie
 hærent, desiderant 1208.35
 Affectus proprium 310.30
 Affectus quando primarij sit
 putandus 717.9
 Affectus quid 331.39.
 316.36
 Affectus quid indicet 914.26
 Affectus quomodo compescan
 tur 311.60
 Affectus sedari tempore, etiam
 si opio uis eorum permaneat
 311.57
 Affectus similariū partium sunt
 octo 594.47
 Affectus simplices, simplex re
 medium postulat 452.62
 Affectus soporosi omnes consi
 stunt in cerebro 745.64
 Affectus stomachicus inducit a
 nimi deliquium 587.15
 Affectus sui ipsorū sublationem
 duntaxat indicant 16.52
 Affectus tempore conuiescunt
 332.11
 Affectus thoracis ac pulmonis
 diuturni, & sine febre, à qui
 bus uimis inueniuntur 419.4
 Affectus typis carentes q̄ 810.7
 Affectus uarij si in unum conspi
 rent, quid agendum 453.34
 Affectus unde proficiant 310.
 16. 419.39
 Affectuum causa cognita pluri
 mum ad remediū inuentionē
 confert 334.62
 Affectuum causas consistere in
 anima facultatum irrationa
 lium 310.35
 Affectuum cognitio quid iuuēt
 465.36
 Affectuum cognitio remediorū
 existit materia 370.48
 Affectuū complicatorū remedi
 consilium cōmune 452.16
 Affectuum consensus in uentri
 culo & cerebro 741.51
 Affectuū corporis prouidentia
 omīs, in duob. cōsistit 470.44
 Affectuum curatio pro differen
 tia affectuum partium varia
 tur 722.15
 Affectuū duplicia genera 442.
 12
 Affectuum interiorū cognitio,
 coniecturis nititur 1249.1
 Affectuum notę unde sumantur
 727.11
 Affectuum per consensum cura
 tio 736.17
 Affectuū propria signa que sunt
 727.60
 Affectuū qui cū peruigilio & de
 lirio infestant curatio 941.59
 Affectuū qui cum sopore inua
 dunt curatio 941.66
 Affectuum ratio, curationis sco
 pum docet 1197.63
 Affectuum soporosoꝝ causa
 736.57
 Affectuū triū præter natura pro
 pria & cōmunia que 846.36
 Afficiendę rei apertio, maxi
 mi obinet uim ad excipien
 dum affectum 776.18
 Affici, idē quod pati est 664.14
 Affici per consensum quando di
 catur cerebrum 717.62
 Affici quādo dicat caput 715.50
 Affici quid Ibid. 42
 QUADRICE optimi notę 1222.
 56
 Agrici radices faculares infi
 gnes 1067.15
 Agerantoni quā uim possideat
 Ibid. 17
 Agerati uia 1119.6
 Agere in seipsum nihil potest, si
 cut nec se connerre 697.12
 Agere quid 715.41
 Agglutatio præcedit à simila
 nonem 75.60
 Agni casti, nel niticis seminis fa
 culas 11. 378.2
 Agnina continet humorem albi
 diorem 106.3
 Agnina factum contegit totum
 106.4. 121.50
 Agnina membrana que 105.14.
 105.16
 Agnina tunica quare sit genera
 ta 110.51
 Agonia quid 681.60
 Agrestia omnia hortensib. acro
 ra 1069.40
 Agrestia 127.30
 ALABASTRITES quas uires
 habet 1119.18
 Alę anseris gallinaceę 398.14
 Alę que uocentur 111.61
 Alę uolarium, alimēta qualia
 præstent 407.35
 Alauda uita colicos iuuēt 1275.
 10
 Albuginei humoris usus 167.30
 M M

Albugo oui ad ophthalmias ui-
lis 1121.23
Albumen oui quibus affectibus
conferat 1119.61
Albumen ouorum aegre conco-
quitur 910.57
Albuminis oui usus in affectib.
ocularum 1216.13
Alcyniorū facultates & differen-
tiae 1142.51. 1191.34
Alexipharmaca media sunt in-
ter obliosa corpora, & lenden-
tia medicamenta 1060.23
Alexipharmacia cōmodē misce-
tur interdum letalia 1038.10
Alge uis 1075.36. 1112.61
Alica biliosis naturis conuenit
890.36
Alica ex genere tritici 372.18
Alicae lentior corrigendus aceto
& porro 418.64
Alicae sorbitio quibus sit propi-
nanda 372.48
Alica quomodo uescendū 415.
16
Alienari mente cur rarum & ma-
ximū spiritū reddant 495.24
Alienari mente obliuiscūtur aut
malum actionū, quas postea
conferunt & magnas obeant
495.13
Alienum duplex 797.61
Alimenta ad suam naturam im-
mutantur carnem, & immutau-
tur ab illa 687.29
Alimenta & medicamenta, quae
sapore cōueniunt, conueniūt
facultate quoq; 370.17
Alimenta intemperata quomo-
do corrigenda 1047.13
Alimēta medicamētoſa 369.48
Alimenta tabidis quae cōferant
808.39
Alimenta tantūm 369.51
Alimenta tractu facilia quae
808.32
Alimenta ueneria 780.25
Alimenti distributio 141.13
Alimēti incrementi ratio 38.44
Alimenti instrumenta prima &
principalissima quae 219.58
Alimenti instrumenta secunda
quae 219.60
Alimenti instrumenta tertia ibi
dem. 62
Alimenti principium spiritus
324.56
Alimentis temperatis, tempera-
ta seruanda sunt corpora
369.57
Alimenti priuatio unde accidat
687.16
Alimentorū celer tardusue trās-
itus unde 369.19
Alimentorū corrigendotum fi-
des unde petenda 1047.6

Alimentorū facultatum indica-
tiones unde sumant 368.22
Alimentorū secundae qualitates
explorandae 370.11
Alimentum ab hepate in uen-
trem regei, quidō necessum
sit 689.60
Alimentum à medicamēto quo
differat 1029.50
Alimentū coquitur in intestino
rum transitu 225.40
Alimentū ex piscib. proueniēs,
sanguinē gignit tenuioris cō-
sistentiae, quā quod ex pede
stribus 399.45
Alimentū humidius, distribuit,
discutiturque celerius 392.50
Alimentū nostris corporibus ac-
commodatissimū quod 408.29
Alimentū omne cur crassum de-
beat esse & lentum 808.34
Alimentū omne quod supra mo-
dum calefit, praesertim dulce
& pingue, in amarā conuer-
titur bilem 626.55
Alimentū sit aequale copiae sub-
stantiae effluentis 317.21
Alimentū triplex secundū Hip-
pocratem 438.19
Alimentū ualentius uesceri ex-
hibendum 883.18
Alimentū ubi plus elaboratur,
ibi amplior superfluitas gigni-
tur 486.64
Alimi uis 1068.51
Alisma cuius sit facultatis 1076.
Alitū auxiliatur dolori co-
lico 932.32
Allium elixum, imbecillius qui-
dem, benignius tamen reddi-
tur 391.64
Allium estiar ut medicamentū
Ibid. 61
Allium status discit 932.54
Allium theriace rusticorum di-
citur Ibid. 36
Allium utraque quam habeat
uim 1107.17
Aloe bitiosarum dispositionum
uentris optimum est medica-
men 1249.60
Aloē grata est uentriculo 1068.
64
Aloē infestissima est intemperiei
calidae & siccae circa uiriosos
succos 1249.36
Aloē inſperſa, ſalutare eſt medi-
camentum ſedis & pudendo-
rum ulceribus 871.60
Aloē loca, aut nihil aut parū pur-
gat 1031.42
Aloē purgat humores in tuni-
cis uentriculi imbibitos 886.
Aloē quibus affectibus con-
ferat 1068.66
Aloēs etiae facultas 886.35.

1149.33
Aloēs facultates 68.55. 1068.
62. 1220.35. 1272.1
Aloēs nullus est usus in phleg-
mones medicamentis 942.20
Aloēs usum in ſentibus, impro-
bat Galenus 470.19
Aloēs uſus, intemperie laboran-
tium circa humorū redundan-
tiam, deducit in tabem 1249.
44
Alopeciae alius progressus reme-
dia Archigenis 1192.3
Alopeciae causa 1189.12
Alopeciae facili carabilis argu-
mentum 1191.5
Alopeciae rebellis curatio Ibi. 23
Alopecia quidō accidat 278.52
Alopeciarū curandarū ſcopus
primarius quī 1192.40
Alopecias quid iuuat 1074.34.
1091.35. 1098.25. 1121.35.
1136.23. 1142.24. 1143.5
Alopecia unde 954.8
Alopecis inueteratis medica-
mentum optimū 1190.46
Alopecis medicamenta simpli-
cia quae congruant Ibid. 20
Alphorum generatio 687.23
Cura 1098.14
Alterabile facili omne primū
calefit 61.44
Alterabiliū natura quae sit
1010.54
Alterare inualeſcentes qualita-
tes febriles q̄ uacquare, magis
conducit 961.26
Alterari corpus quorūpluriter
poſſit 418.9
Alteratio circa contactum non
fit 24.16
Alteratio humorū à quibus fiat
839.15
Alteratio in animalibus triplex
1055.59
Alterationes in genere sunt du-
plices 1029.54
Alterationi naturali, praeter na-
turam, & medicis, quae insunt
1055.65
Alterationis ciborū causa, tem-
peries uentriculi 684.17
Alterationis error, cōcoſtionis
est ſymptoma 683.45
Alterationum differentiae ubi
84.14
Alterationis quae in uentriculo
ſit, deſcriptio 84.33
Alteratio per cōſtraria molienda
Alteratio putriū humo-
rum concoſtio eſt 833.39
Alteratio quae ſit in ore 84.19
Alteratio quid 842.45. 845.65.
1255.10
Alteratio quia morus 73.34
Alterationis facultas ſingulis ineſt
animalis

animalis partibus 123.53
 Alitercū quū uim teneat 1111.50
 Alitæ radicis cum seuo, anferi-
 rino usus 945.62
 Alus deiectio, naturalis & ani-
 malis facultatis instrumento
 perficitur 775.59
 Alui facultas in cruditatibus u-
 nicum remedium est 172.57
 Alumē ordemata discit 945.9
 Alumine solo cur nō fit ad ulce-
 ra utendum 1170.10
 Aluminis differentiæ 1125.23
 Aluminis omnia genera eximie
 astringunt 1216.51
 Aluo fluui quæ cōferant 893.41
 Aluo soluendæ edulii quomodo
 ex bera & lente paretur
 370.40
 Aluo subducendæ fructus ido-
 nei 369.25
 Aluum quæ leuiter deticiant
 477.61
 Alui quæ subducant 1108.35
 Aluum differentiæ 1125.23
 Aluum quæ edere quæ cō-
 pellant 688.51
 Aluum tutō emollientia 941.27
 Aluus largius deticienda hō qui
 in lasitudine ulceroſa ſanguī-
 nem ſibi detrahi noluit 458.31
 Alyſſon iuuat morſos à cane ra-
 bido, rabientemq̃ ipſum ſa-
 nat 1069.8
 ¶ A M A R S omne, cæcum 420.1
 Amara astringentibus multo te-
 nuora, ac ribr, crasſiora 1048.5
 49
 Amara cur animalib, uniuerſis
 ſint eui incepta 1049.14
 Amara cur exulceratis condu-
 cant 1176.31
 Amara edi nequeunt 1043.18
 Amara hominib, & plantis ſunt
 aduerſa 1049.44
 Amara minimè omnium putre-
 ſcunt Ibid.10
 Amaranthi uis 1069.28
 Amara odorata nō ſunt 1050.23
 Amara omnia ſunt calida 1042.61
 Amara quæ dicantur 1020.25
 Amara quibus morbis conue-
 niant 1043.17
 Amari facultas Ibid.16.
 1176.31
 Amarū caloris ſit exceſſu 1043.19
 Amarū dulci calidius 1044.28
 Ambiguum nihil eſſet ſi omnia
 ſub ſenſus caderent 1021.12
 Ambino uult ab omnib, hono-
 rari 415.62
 Ambroſia Andromachi, febrī-
 bus repetentibus per circui-
 tus conferens 1244.4
 Ambroſiæ uis 1069.21

Ambulatio, curſus, ſtatioq̃ quo
 modo ſiant 308.24
 Ambulationi qui muſculi ſint
 neceſſarii 217.8
 Ambulatio prima eſt cruris a-
 ctio Ibid.7
 Ambulatio q̃modo fiat 210.54
 Ambuſtis ouum impoſitū me-
 detur 2140.15
 Ambuſtis quæ competant 1090.31.
 1116.41
 Ameniſſi tantū animantib, ineſt,
 quantum humoris 70.23
 Ameniſſa quid 666.13
 Ammoniæ rhyſmiamatis uires
 1123.51
 Ammoniæ uis 1070.14
 Ammoniæ aceto liquatū leni
 indurato cōducitur: de quoq̃
 muſculus induratis 945.54
 Ammoniæ inter emollientia
 principatū obtinet 1180.53
 Amomi facultas 1070.18
 Amor in procreata 297.29
 Amphibarnam quæ mulier gra-
 uida ſupergreditur, facit ab-
 orum 1275.14
 Amurcæ uires 1069.35
 Amurcæ quid 1016.52
 Amygdalæ amaræ, dulcibus po-
 tiores 385.54
 Amygdalæ, caricæ, nucis, piſta-
 ciæ, nucis ponicæ, quid ad te-
 nuem uictus rationem confe-
 rant 428.7
 Amygdalæ non multū nutriunt
 385.57
 Amygdalarum facultas 585.51.
 1070.3
 Amyli loti facultas 1217.1
 Amyli facultas 372.63. 1105.52
 Amythaonis malagma uires
 & compoſino 1184.38
 ¶ A N A C O L L E M A T A quæ di-
 cantur 1140.20
 Anagallis utriuſque facultates
 1070.31
 Anagyri facultas Ibid.29
 Analepticæ 3055. 362.23
 Analogiſmus ſit per tranſitū ad
 ſimilia 12.58
 Analogiſmus quid 13.2
 Analytica ſecunda 311.40
 Anſarcar imbui ſorum corpo-
 ris habitū humiditate 579.20
 Anaſtomofes arteriarū & uenarū
 animaduertuntur in to-
 to corpore 216.14
 Anaſtomofiſ quid 856.48
 Anaſtomofiſ uaforum unde ac-
 cidat 863.33
 Anaſtomonica quæ 1058.59
 Anaſtomen cur Galenus ab infe-
 riori uſtre ordiatur 174.46
 Anaſtomes pars præcipua circa
 quæ uerſetur, 156.48

Anarome ueteribus familiarifſi-
 ma 156.32
 Anatomia docet proprietatē eſ-
 ſentię uniuiſuique partis
 722.23
 Anatomica diſciplina chirurgi-
 cæ medicī rationi neceſſaria
 165.39
 Anatomica methodus 151.24
 Ana uox medicinalis quid ſigni-
 ficet 1291.54
 Anaxagoræ diſtū herolcū 31.40
 An huius quatuor ſpecies 1066.
 Aucon quid 202.64. (54)
 Andreæ emplaſtrum, faciens ad
 exteſcentia ulcera 1175.1
 Andromachus uixit Neronis
 tempore 272.35
 Andronis trochiliſci 973.58
 Androſaces quam habet fa-
 cultatem 1070.44
 Androſemi facultas & ſpecies
 Ibid.36
 Anemones uis Ibid.59
 Anethi facultas Ibid.64
 Anethinum unguentū cuti den-
 ſe laxandæ aptum 453.31
 Aneurifma quādo accidat 998.
 Aneurifma, qui aſſectus, (64)
 dicatur 708.24
 Anginæ genera quinq̃ 752.36
 Anginæ quid proſit 1066.21
 Angina obluxuras ueterebras ac-
 cidere poteſt 751.32
 Angina offendit uocem ſimul et
 reſpirationem 755.16
 Angina protrahente, uenæ ſub
 lingua ſecandæ ſunt 974.63
 Angina quando deſinat in peri-
 pneumoniā aut ſpāſmū 578.19
 Angina quid 728.59
 Anguillæ nunq̃ boni ſunt ſucci
 410.56
 Anguilla uiſui tenui aduerſa
 416.59
 Angulorū imminutiōes in ocu-
 lis q̃modo ſint curandæ 952.23
 Anguſtiam inſtrumentorū ſpiri-
 talium quæ portendat 753.13
 Anguſta uſio: unde exoritur
 417.18
 Anhelatio quid uocetur 505.44
 Aniceti Crionis uires & com-
 poſitio 1179.52
 Ani & ueſicæ muſculi munus eſt
 conſtringere 102.12
 Aniculi & cano capite uxorem
 habere, ſpectaculum ſaſtidiē
 dum creſcit 1193.36
 Anima à corpore, ſeruitute natura-
 lem conſtitutionē, nō ſecernit
 Anima appetitoria quæ (90.20)
 nam experat 69.3
 Anima cōſtruxit particulās 125.
 Anima dormientium non (17)
 quieſcit 100.26

Anima ea substantia quæ species dicitur 70.34
 Animæ appetitorix sedes in iecore 69.12
 Animæ appetitorix uirtus, temperantia 343.8
 Animæ constitutiones ex diversis corporum temperamentis nascuntur 333.58
 Animæ facultates exercitatione uires acquirunt: ocio languescunt & minuiuntur 428.11
 Animæ facultatib. singulis, una uirtus inest 342.62
 Animæ facultatum singulis quæ sedes tribuantur 718.20
 Animæ irascibilis sedes in corde 69.13. 342.56. 900.60
 Animæ irascibilis uirtus, fortitudo uel utilitas 343.5
 Animæ irrationalis uis cõparat corporis ponderi 339.57
 Animæ moribus corpus esse aptum 194.33
 Animæ naturalis sedes, est hepar 900.54
 Animæ natura nõ omnibus eadem 68.41
 Animæ opera 71.24
 Animæ organum existit corpus 194.30
 Animæ pars appetitoria diuersa à ratiocinatrice est 335.28
 Animæ partes sunt, rationalis, irascibilis, & appetitoria 333.6
 Animæ parui singulas quibus animalibus Plato cõparat 337.15
 Animæ primum organum est animalis spiritus 740.56
 Animæ principatus quid 348.33
 Animæ principis actio, ratiocinatio 333.49
 Animæ principis facultatis symptomata singula unde proficiunt, & quomodo curanda 941.42
 Animæ principis sedes quando per se, & quando per consensum lædatur 716.20
 Animæ ratiocinatrix uirtus, prudentia seu sciẽtia est 342.3
 Animæ rationalis sedes in cerebro 69.14. 359.23. 348.40. 900.61. 941.41
 Animæ sedem in corde esse, quibus argumentis ueteres probantur 333.6
 Animæ sedes existimetur ponas ea pars, quæ primò dum animus mouetur 321.24
 Animæ sedes in cerebro collocatur 740.53
 Animæ species mortalis, corporis temperies 70.26
 Animæ species, sedes & different

tiæ 356.14
 Animæ species tres 68.60
 Animæ substantia ad multum tempus durat 485.10
 Animæ substantiam nobis cognitam esse 484.47. 552.61. 681.50
 Animæ substantiam propriam sequuntur uires 69.31
 Animæ substantia quæ sit 347.58
 Animæ substantia quodammodo qualitatũ temperies 69.29
 Anima & ratio non idem, cum hæc in illa continetur 333.16
 Animæ uires temperiem sequuntur 69.36. 71.18
 Anima habet facultates quasdam à sua ipsius substantia ortas, non tamen agit sine organis 195.20
 Anima in somnis, corporis profundum ingressa, uidetur solas corporis dispositiones sentire 633.14
 Anima irascibilis & appetitoria cum animali intercunt 69.20
 Anima irascibilis quarũ rerum libidine flagret Ibid.1
 Animal castratum, redditur simile forminx 1130.6.
 1135.59
 Animalcula interdum reperuntur in abscessibus 706.64
 Animales facultates descendunt per neruos à cerebro usque ad propria instrumenta 346.11
 Animalia ab anima & natura gubernantur 73.26
 Animalia absque cõmercio maris, oua gignunt 399.24
 Animalia à plantis quo differant 218.56
 Animalia cætera, natura magis quam ratione aliquam artem exercent 195.39
 Animalia carniuora utuntur anterioribus pedibus ulce manuum 209.41
 Animalia dicuntur calida & humida, non simpliciter, sed colata ad demorrua 45.52
 Animalia duobus in cæditia crucibus 169.34
 Animalia exanguia cur paruis & numerosis utantur ribis 209.44
 Animalia gignuntur omnia ex sanguine menstruo & semine 115.52
 Animalia gulosa & inextplebilia quibus unicum intestinum est rectum 213.59
 Animalia lani pectoria & calidiora, iracundiora sunt 333.60
 Animalia monstra campestri-

bus omnia sunt calidiora & ficiora, atque ideo præstantiora 416.35
 Animalia naturaliter ad ea pabula accedunt, quæ illis magis sunt familiaria 427.9
 Animalia non dicuntur calida in summo, sed per excellens 39.51
 Animalia officia, partiales utuntur simulata natura sunt 177.35
 Animalia omnium imperfectissima quæ plantis simillima 298.14
 Animalia ore prona fumentia cibum, maius habent collum et maxillam inferiorem protioxiorem 272.44
 Animalia plantis præstant sensu & motu uoluntario 90.30
 Animalia pulmone carentia finisunt tantũ cordis habent uentriculum 236.56
 Animalia quæ à quibus animæ facultatibus dispensentur 335.22
 Animalia quæ similia dicantur 177.30
 Animalia quæ sint aptiora rationis administrande 169.12
 Animalia quo pacto ad nenerẽ excitentur omnia 775.33
 Animalia sectioni apta, si finime copia non detur 177.28
 Animalia ficioris temperamentis, oua pariunt absque masculi commercio 117.27
 Animalia supernis carentia dentibus, uentriculum habent geminum 178.22
 Animalia uetula, recensia cõtra, essi sunt ineptissima 890.55
 Animalibus, adeo arbitraris motus 218.65
 Animalibus, capite destitutis quales oculi insunt 252.2
 Animalibus carniuoris quæ insunt 209.34
 Animalibus herbiuoris quæ insunt Ibid.33
 Animalibus timidis quæ insunt Ibid.37
 Animalis differentie propriæ 841.19
 Animalis principia tria cur inter se sint coniuncta 222.16
 Animalis spiritus continetur quoque in toto cerebro 356.44
 Animalis spiritus gignitur ex utrali 359.22
 Animalium corpora in perpetuo fluore uersantur 419.52
 Animalium latentium calor, transpiratione seruatur 774.50
 Animalium naturæ à nullo dõctæ 195.37
 Animalium

INDEX.

Animalium propria	73.31	tiz dicitur compos	345.15	sumantur	1280.20
Animal dormiens, sensus nō fer		Anima rationalis, honestorum		Antidoti quæ medicamenta di-	
uat integros sentientes	130.46	desideratrix	63.61	cantur	1280.4
Animal non moritur, nisi prius		Anima rationalis, immortalis,		Antidoti uetustiores, papaveris	
corde affecto	759.4	Platonis sententia	69.15	lachrymam longè maiorem	
Animal omne gigni ex materia		Anima rationalis non format		possident	Ibid.40
& facultate	116.33	factum	126.15	Antidororum differentie tres	
Animal omne humidū est	104.9	Animalium cum corporibus cō		Ibid.7	
Animal quando ualeat & (16		parationes diuersæ	335.50	Antidorus Aelii fugans serpen-	
ægroret	715.49	Anima fit ne mortalis, Galenus		tæ, ad compluresq; affectus	
Animal qua ratione reddat mu-		ambigit	90.7	perutilla	1285.59
tum	128.19	Animi affectiones quibus mor-		Antidorus Apolloniæ ad ueneno	
Animal reddi mutū insigniter		tem afferant	759.36	preferuans	1285.37
lesis uerus, qui excurrit pro-		Animi affectionum quæ cor-		Antidorus Aristarchi admiran-	
pter arterias carotidas	188.	poris maior habenda cura, &		da	124.6.59
47		cur	366.3	Antidotus ex sanguinibus Da-	
Animal sibi simili alimēto nutri-		Animi affectus, corpus à natu-		modoratis	1284.6
tur	56.14	rali statu immutant	830.57	Antidotus præfagiens quæ dica-	
Animal suæ animæ facultates		Animi affectus, pellendi & con-		tur	Ibid.43
præcise citra doctore	195.	ciliandi morbos habent uim		Antidotus zopyria	1285.57
55.		365.64		Antigenes medicus	646.59
Animal tribus facultatibus gene-		Animi affectus tremulas fun-		Antiochus qua usus ratione ul-	
ribus omne gubernat	900.52	ctiones efficiunt, ac similiter		ectus, sensibus & membris o-	
Animal triplex planta	110.31	corporis	677.47	mniibus integris ad extremū	
Animal ueluti paruus mundus		Animi affectus uehementes, se-		durarit	468.3
315.32		nes præcipue ac imbecillos		Antirini uis	1071.23
Animam appetitoriam Plato in		exolunt	964.61	Antipodij uis	1124.55
hepate collocat	341.8	Animi constitutio, corporis cō		Antoninus Imperator	809.33
Animam cōsentire corpori na-		stitutioni similis	332.41	Antoninus Imperator singulis	
tur	90.11	Animi uenustas præferenda pul-		diebus utebatur theriacæ in-	
Animam delitescere in corpore		chritudini corporis	2.1	star Aegyptiæ fabæ	1280.35
Chrypsippus quibus ratiōni-		Animi uis experti rationis, du-		Antrocorum cur plus selecti posui-	
bis probet	321.3	plex est	423.3	mus, retrorsum uerò nō item	
Animam esse sanguinem qui pu-		Anisi feminis facultas	107.20	1282.19	
tarint	324.63	Annus quid	621.14. 630.27.	ÆAORTÆ cōsideratio	141.12
Animam habitare in ipso cere-		809.42		Æorta oritur à corde	109.50
bri corpore, primum autem		Annus quod tempus dicatur		Æorta truncus omnium arteria-	
alius instrumentum esse ani-		127.1		rum	147.16
malem spiritum	144.6	Annus quot diebus cōstet	126.	ÆAPARINIS uis	1071.25
Animam totam suspicatur Gale-		55		Aperientia quæ dicant	1058.19
nus corpoream	71.5	Anodyna ad internos affectus		Aphaces & Violæ facultas	378.
Anima naturalis quas qualita-		ab Asclepiade scripta	1246.23	9. 1073.33	
tes non apprehendat	90.40	Anodyna Andromachi, ad affe-		Aphonia quid	676.52
Anima nostra constat ex parti-		ctus organorum respiratio-		Aphronitri & salis discrimen	
bis omnino inter se differen-		nis, aliasq; internas disposi-		1143.20	
ribus	333.35	tiones congruentia	1245.55	Aphronitri uis	1221.4
Anima nostra triplex		Anodynus nihil debet attractio-		Aphronitrum inimicum Roma-	
Animam omne ab ipso ortu in-		nis iussit	1060.58	cho	1123.25
diæ fictici fit	435.48	Anodynus uti quibus de causis		Aphroscelini uis	1118.33
Animantibus uniuersis insitæ		soleamus	1262.10	Aphthæ moderate moderata	
sunt uires, deficientis ac defi-		Anodynus ad podagram Nico-		medicamentā desiderat	1239.55
derati appetentes	429.55	strati	1185.52	Aphthæ sunt oris ulcera, præci-	
Animantis uoce audita, iudica-		Anodynorum differentia duplex		pue infantes inuadit	1238.
ri potest de ipsius instrumen-		1060.64		Aphtharū causas ex colo-	
tis	177.43	Anodynorum opera	Ibid.53	re dignoscendū ratio	1239.11
Anima obnoxia affectibus n		Antiaera	1236.5	Aphtharum curatio per modi-	
corde cōprehenditur	124.12	Anthyllis utraq; quam uim ha-		cæ astringentia	1238.42
Anima per se mouetur in pertu-		beat	1071.31	Aphtharum in infantium in fan-	
bationibus	929.62	Antides unde	693.10	tes curatio	1239.25
Anima perspicacior temperatu-		Anticipatio accessioneis nō sem-		Aphthis fit optimū medicamen-	
re cōmoderatione redditur		per morbi incrementum ar-		ex chalcide & oleo modera-	
70.52		guit	622.18	té commissis	Ibid.61
Anima plauratitia cū sit ratio-		Antidoti Mithridatæ descrip-		Aphthis remedia uaria à uariis	
nis experta, non format factū		ptio	1283.15	descripta	1238.47
116.5		Antidoti post uenenum libera-		Apii, Hippocleitini, Sij & Smyrni	
Anima ratiocinatrix sola scien-		lius exhibende, quā si præ-		facultates	1289.21. 1105.28

Apnœx causa	757.31	tres differentie	541.33	Aqua haud nutrit, sed deducit alimentū per corpus	218.23
Apnœx quid	676.48, 757.10	Appositio agglutinationē præcedit	75.61	Aqua in febris non est propianda is, qui uti illa nō consueuerunt	891.58
Apocyni uis	1071.39	Appositionis & agglutinationis differentia	76.1	Aqua inter cutem laborantibus quid profit	1113.30
Apollodori pharmacū	1287.27	Appositio quid	691.57	Aqua inter cutē q̄modo cognoscenda & exploranda	551.43
Apomeli refrigerat	461.3	Apprehensorij organi optimē constituti primū caput quod	195.60	Aqua inter cutem quomodo generet	691.23, 768.56, 769.5
Apomelitos cōpositio	Ibid.17	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua limosa uruntur apud Aegyptum	1011.34
Apomelitis musculorum mouentium oculos	266.12	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua iudicetur gustu, uisu, & olfactu	Ibid.39
Apoplegmatismi quando fugiendi	913.3	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aquam esse summē humidam	63.8, 1014.16
Apoplegmatismi quibus affectibus conferant	738.44	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aquam humidorum esse humidissimam	1018.60
Apoplegmatismus Asclepiadis	1207.9	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aquā inter cutē necessariū succedere iecinori indurato	604.30
Apoplectici moriuntur respiratione priuati	747.46	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua modicē calfacta, per se solum mectat semp & calfa cures accidentē alia fortitū uires	44.8
In Apoplexia calor cordis extinguitur	590.16	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua neruis lætis esse inimica	1164.40
Apoplexiæ causa	683.7, 745.41, 750.13	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua omnis sincera, est naturaliter frigida	1013.35
Apoplexiæ solutæ paralyfis succedit	750.16	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua optima, omnis gustus qualitate pers 379.10, 435.34	1008.11, 1217.11
Apoplexia sicut actiones uoluntarias	676.3	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua per se frigida	58.5
Apoplexia occupante, periculi magnitudo ex respirationis nocumēto colligat	745.50	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua pluuia uim astringēdi habet	1245.5
Apoplexia omnibus actionibus animalib. noxiā infert	747.36	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua potabilis frigida existit	1013.30
Apoplexia quid	666.3, 676.61, 747.3	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua potabilis sola est	1014.1
Apoplexia quomodo fiat	991.6	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua putealis cur appareat rigentibus frigida	1030.64
Apoplexia unde interdum contrahitur	661.35	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua quæ sit leuissima	1008.23, 1016.19
Apothetrapia duplex	446.51	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua quomodo pulsū immutet	514.23
Apothetrapie duplex usus	446.6	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aquarū differentie	435.38
Apothetrapie proprius scopus	Ibid.17	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua sicca esse nequit	1040.34
Apothetrapie usus quibus conueniat	477.37	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua summē frigida in quibus calorē reuocet	1013.9
Apothetrapia post tristitiā uel uigiliā, si cruditas absit, utilis	453.59	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua tum frigida tum feruens, cutim cogit ac claudit	453.10
Apothetrapia quid	446.53	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqua uino p̄mixta q̄ sola, cur efficiat sicut sicut refrigerat	1018.8
Apothetrapia sola quid si lassitudinis ulcerose sufficiat remedium	456.24	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Aqualarū curatio	954.44, 37
Appetentia canina	771.53	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Araneæ triti potit ex uino, morsus ab ipsis asserit	1175.52
Appetentia cibi, animale est opus	Ibid.64	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Arbuti & uediuis facultas	1083.41
Appetentia canis causæ	674.32	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Archidami opinio conuulsiuit	1032.31
Appetentia potus amissa, diminuitur, aut deprauatur, causæ	Ibid.56	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Archigenē suggillat Gal.	551.31
Appetentiam qui succi gignant	Ibid.36	Apri suisbus domesticis meliores	416.42	Archil	
Appetentia quando aboletur, uel imbecilla reddatur, uel uitetur	Ibid.13	Apri suisbus domesticis meliores	416.42		
Appetentiam restituit usus medicamenti ex succo cydoniorum confecti	893.64	Apri suisbus domesticis meliores	416.42		
Appetentia quid	674.19	Apri suisbus domesticis meliores	416.42		
Applicatio manus ad carpum qualis molenda	541.5	Apri suisbus domesticis meliores	416.42		
Applicationis manus ad carpi		Apri suisbus domesticis meliores	416.42		

- Archigenis inconstantia 378.3
 Archimedis industria 57.3
 Arctii quā habeat uim 107.35
 Arefactio quæ dicatur 643.32
 Arena quas uim excitet tumen-
 tem ab aqua inter cuiem car-
 nem 218.61
 Argemoneis uis 1071.55
 Argenti uiui uis 1135.39
 Aridi Cephalici Aſclepiadis u-
 ſus & compositio 1178.48
 Arditas in rebus duris ualdeq;
 ſiccis inuenitur 411.33
 Arietum caro 417.3
 Ari facultas 1072.40
 Ariſari facultas 1071.46
 Aristolochia rotundæ admiran-
 da opera Ibid.60
 Aristolochia triplex 1071.49.
 1209.17
 Ariſtoſalem interpretatur Gale-
 nus 106.36
 Ariſtoſeles calido & frigido om-
 nem actionē tribuit 71.63
 Ariſtot. negat teſtes facultatē ha-
 bere gignendi ſemen 112.11
 Ariſtoſeles plures animæ facul-
 tates diuerſas in uno corde
 conſtituit 527.48
 Ariſtot. præſert Platoni 535.47
 Ariſtoſelis & Poſidonii ſeniētia
 de ſpeciebus animæ 117.23
 Ariſtoſelis opinio de cerebro re-
 ſoluitur 351.7
 Ariſtot. opinio improba 106.51
 Ariſtoſelis ſententia de olfacto-
 rijs meatib. coſtituitur 130.50
 Arius Peripateticus, inſcitia me-
 dicorū eſt extinctus 416.58
 Armeniacorū facultas 383.27.
 1120.55
 Atoma omne calidum 382.63
 Aromaticorū pluriū uis per co-
 ſturam exoluitur 1232.40
 Aron quam habeat uim 390.
 45. 406.58
 Arquatio quæ auxilient 1093.37
 Arquatus & cholera eadem ſer-
 me ratione curantur 16.33
 Arquatus morbus à liene or-
 tus, nigrilor 80.43
 Ars compnua uitioſa & adul-
 tera exiſtit 559.63
 Ars conſeruatrix, ſecundum au-
 xiliorū materias eſt quadru-
 plex 364.28
 Ars correctrix, medicatrix & cō-
 ſeruatrix Ibid.1
 Ars imitatur naturę opera 245.46
 Ars longa 534.42
 Ars punctoria 51.52
 Ars quęlibet à ſuis notione ſua
 habet conſtitutionem 21.3
 Ars quæ ſi paranda 2.63
 Ars ſauitatis tuendę quid præ-
 ſtat 465.15. 478.11
 Ars unica, quæ circa corpus hu-
 manum uerſatur 360.39
 Artemiliæ utriuſque facultas
 1072.45
 Artem non conſtituit ex euiden-
 tijs ſenſui 10.46
 Arteria aſpera 182.15. 321.55
 Arteria aſpera ex quibus cōſtet
 particulis 1240.16
 Arteriaca Andromachi 1241.40
 Arteriaca Aſclepiadis 1241.19
 Arteriaca ſenienna, coquenda
 ſunt in duplici uale, & quo-
 modo 1142.47
 Arteriaca media Ibid.33
 Arteria carpi tangitur ab explo-
 rantibus pulſum 165.55
 Arteria duplici conſtat tunica
 31.46. 181.19. 183.15
 Arteriæ abſq; uenis 148.61
 Arteriæ abſq; uenis in perfectis
 animalibus 149.3
 Arteriæ ad uenas ſe aperientes,
 ſubtiliorem ſanguinem hau-
 riant 88.59
 Arteriæ affectu uiciniores præ-
 ptius in mollitudinem aut du-
 ritiam tranſeunt 604.16
 Arteriæ aortæ inſunt tres mem-
 branę Inius, foras uergetes
 217.31
 Arteriæ à quibus cauſis indure-
 ſcant 598.64
 Arterię aſperę cōpoſitio 181.26
 Arteriæ aſperę ulceribus qua-
 ratione medendum 561.62.
 569.56
 Arteriæ aſperę uſus 458.46
 Arteriæ attrahunt dum dilatan-
 tur, expellunt dum cōtrahun-
 tur 537.5
 Arteriæ aut uenę uulnus nō eſt
 ſuendum 869.62
 Arteriæ carotides 262.15
 Arteriæ circa ultimū ſpinę ſpō-
 dylum ſubiaceat uena 315.42
 Arteriæ circularis figura in pul-
 ſu deprehendi poieſt 548.54
 Arteriæ cōtinent naturaluer ſan-
 guinem 224.6
 Arteriæ corpus quale 519.19
 Arteriæ cubiti motus citior
 quid indicet 341.62
 Arteriæ deducunt facultatē pul-
 ſatilem 199.19
 Arteriæ deſcendentes in intelli-
 gna 224.3
 Arteriæ dilatatę trahunt aërem,
 contractę expellunt fuliginē
 566.31
 Arteriæ dilatantur dum trahūt
 ſpirum 508.16
 Arteriæ diſenſiones ſunt tres,
 quarum nullam totam perci-
 pimus 547.57
 Arteriæ doſialis pulſum, in tabi-
 dis ad abdomē diſcerni 541.40
 Arterię dug cor inuoluūt 185.17
 Arteriæ ductiles cōſtet plurimū
 ad percipiendū ſyſtolē 540.58
 Arteriæ & neruus amputata re-
 generari uequeūt, & cur 112.3
 Arteriæ & uenę, & primæ, & ſe-
 cundæ dolore afficiunt 62.41
 Arteriæ & uenę primæ omniū
 ex ſemine oriuntur 124.22
 Arteriæ & uenę ſunt ſenſus ex-
 peries 317.3
 Arteriæ ſæpius per anatoſomofes
 recipiūt à uenis ſpiritus 240.39
 Arteriæ implentur, quia dilatan-
 tur 91.18. 240.39. 340.
 49. 508.54
 Arteriæ in crura diſtributio 168.3
 Arteriæ in quibus affectibus ſe-
 centur 998.49
 Arterię inſerunt in renes 227.17
 Arteriæ interdū nō eodem tem-
 pore omēs influentē facultatē
 à corde recipiūt 395.61
 Arteriæ inter ſe mutuū & ſimul
 cum corde ſimilē ſemper mo-
 tum ſeruant 545.28
 Arteriæ iuſta diſſenſio Ibid.7
 Arteriæ lumbi in crura diuiri-
 catio 148.15
 Arteriæ magnę alterius partis
 diſtributio 314.53
 Arteriæ magnę diuiſio 147.22.
 309.33. 314.39
 Arteriæ magnę inferior ramus,
 ſuperiori maior, & cur 323.24
 Arteriæ magnę ortus 314.26.
 323.29. 328.19
 Arteriæ magnę primæ partis di-
 ſtributio 314.35
 Arteriæ magnitudo quomodo
 cognoscenda 546.12
 Arteriæ motus principium ha-
 bent à corde 595.58
 Arterię, nerui & uenę uſus neuti-
 quā immutatur, ubicunq; ſint
 Arterię nuſquā ſpiritus 341.24
 ſolum continent 90.62
 Arteriæ nutriunt animale ſpi-
 ritum cerebri 315.28
 Arteriæ omnes à corde uim ha-
 bent, quia dilatantur & con-
 trahuntur 88.34
 Arteriæ omnes in dorſi arteriā
 confluunt 225.3
 Arteriæ omnes inter ſe & cor ſi-
 milem habent pulſum 510.14
 Arterię parū cordi ſuggerūt 508.
 Arterię perpetuū ſenſibile 349
 pulſum edentes, quæ 510.26
 Arterię quādo nō pulſent 346.8
 Arteriæ quando ſecandę in ca-
 pite 479.53
 Arterię quem ſanguinē teneant
 228.27 63
 Arterię receptaculū ſpiritus 235.
 L L 4

Arteriæ sanguinem contriuent 227.10	ofcula 242.42	fini 243.19
Arteriæ secus aures & temporū, quando incidendæ 1217.35	Arteriarum corpus annuera- tur iuter cōnentes pulsuum generationis causas 553.36	Arterijs confistentia inest & ca- uitas 519.42
Arteriæ scilpas mouent, eadem qua cor facultate 508.62	Arteriarum dilatactione cordis calor ueniat, contractio- ue purgatur 661.52	Artes distinguendæ sunt scopis 361.20
Arteriæ sefe dilatantes attrahūt 1015.14	Arteriarum diffentio & contra- ctio quando fiat 553.22	Artes effectiue ab actiuis quod differant 561.36
Arteriæ si non pulsent, malū ex- tremum 593.37	Arteriarū genus duplex 182.12	Artes iudicandæ ex fine 361.55
Arteriarū sua contractioe expel- lere splenis excrementa 223.29	Arteriarum inter ceptiones, cur uocem eripiant 661.47	Artes liberales alijs preferendæ & cur 319
Arteriæ sunt distributæ cū me- raicis uenis 225.34	Arteriarum motus, uenarū ple- nitudinem ostendit 700.50	Artes mechanice omnes, mutua indigent ope 364.62
Arteriæ superficiales ubi cernan- tur 148.26	Arteriarum motus, uenarū ple- nitudinem ostendit 700.50	Artes non distinguendæ per fin- gulas actiones 361.2
Arteriæ systole quando depre- hendatur 559.42	Arteriarum omnium & uenarū mafculi & formæ, numerus, formatio, & posio eadem 118.11	Artes non ex materijs iudican- dæ Ibid.45
Arteriæ trahunt dum dilatant, expellunt cū contrahunt 508.42	Arteriarum partes omnes dum se naturaliter habent, eodem tempore mouentur 563.39	Artes omnes in subiectæ mate- riæ bono uersantur Ibid.15
Arteria & uena quid 141.59	Arteriarum quietum digno- darum ratio 542.10	Artes parant sibi ex iudicio na- turali iudicandi organa 4.15
Arteriæ tunicæ differentie quæ 553.33	Arteriarū radicio cor 342.24	Artes uulgo ignotæ 10.57
Arteriæ tunigarum constitutio 86.2	Arteriarum sanguis qualis fir- 708.30. 722.50	Arthriticis epithemata Alcilepia dis 1269.40
Arteriæ uasæ pulsantia 182.54	Arteriarum secundæ in sœrum progressus 322.25	Arthritide & ischiade quid libe- ret 1187.54
Arteriæ uenofæ adnasci mem- branas duas foris, intrō inci- nantes 227.36	Arteriarum tunicis insuit pulsi- fica uis à corde 346.10	Arthritis causa 1267.59
Arteriæ uenofæ orificio, cur dug- tantum membranæ aduææ 228.22	Arterias effundere spiritum in uentriculos cerebri 259.28	Arthriticis malagma aureum 1185.56
Arteriæ uenofæ ortus & diuari- catio 318.25	Arterias laues insertas esse cor- dis finitro uentriculo 242.27	Arthrodia quid 121.57
Arteriæ uulnera: ægrè supple- muntur 998.58	Arteria foritur tres dimensio- nes, ut alia corpora 519.35	Articulatio quid 121.51
Arteria in malleolo difsecta diu- turnum coxæ dolorem soluit 999.10	Arterias tangendi ratio 593.44	Articuli capitis constructio & se- curitas 182.51
Arteria in omnem dimensionē extenditur 510.34	Arterias trahere à uenis, & iu il- las pellere per communia ori- ficia 508.44	Articuli omnium digitorū ma- nuū triginta numero 201.62
Arteria inter indicem & polli- cem in macilentis sensibilibus mouetur 165.58	Arteria tarsi tangenda, si carpi pulsus occultetur 168.13	Articuli primi & tertij motus unde 183.22
Arteria magna spinæ iucumbit 287.54	Arteria uenofa fertur in pulmo- nes à finitro cordis uentricu- lo, unica cōfista tunica 182.62	Articulus laxatus quid proficit 1112.47
Arteriam contrectandi modus 548.23	Arteria uenofa iungit cordi pul- mones 321.55	Articulo capitis octo incūbunt musculi 122.65
Arteriam inter indicem & polli- cem cū secuisset Galenus, li- beratus est diuturno præcor- diorum dolore 999.1	Arteria una in rotam manū pro- pagatur 164.5. 165.39	Articulorum differentie duæ 121.49
Arteriam quæ mollem reddant 587.18	Arteria uniuersa mouetur uno eodemque tempore 91.46	Articulorū musculorumque mo- tus 660.49
Arteria nulla reperitur sine ue- na coniuge, & cur 317.16	Arterijs contentio inest 519.40	Articulus capitis ne momento temporis pati possit luxatio- nem 282.15
Arteria prætergressa umbilicum in lumborum arteriam inferi- tur 105.50	Arterijs & uenis pro ratione ma- gnitudinis perpetuò uirtus inest, neruis autem uon sem- per 166.3	Articulus quid 121.47
Arteriarum caronidum diuisio & processus 316.30	Arterijs inest sanguis 186.35	Artificem reddit atonitum pul- chritudo artificij 215.20
Arteriarum contractiones per somnia cur celeriores ipsis dilatationibus 570.34	Arterijs singulis insunt fibræ à neruis deductæ 564.40 4	Artifex nemo ex libris euasit 370.55
Arteriarum cordis in pulmone	Arterijs tunicæ cur duplex 319	Artificis boni munus 277.7
	Arterijs uenofæ cur tunicæ raræ	Arti quæ tribuantur 355.6
		Artes conferatricis partes quæ 364.34. & 17. & 18
		Artificios theriacos cōficiendi ra- tio 1154.40. 1281.59
		Artis cuiusq; cōstitutio à fine su- mit inimum 361.60
		Artis cuiusq; finis, est scopi con- sequatio 360.21. 361.34
		Artis cuiusq; scientiam qua ra- tione acquiramus 900.27
		Artis curatiua pars, & ea quæ sa- nitatem

INDEX.

uitatem ruetur, qua in re differant, & qua cōueniant 901.6
 Artia siuis quis sit 360.38
 Artia medicæ finis Ibid. 13
 Artia pars comptoria & exornatoria quōmodo differat 1193.18
 Artia pars curatiua, primò omnium est constituta 365.36
 Artia principis vulgo esse ignota debent 10.56
 Artia salubris pars est gymnastica 363.11
 Artia salubris pars exercitatoria, minima est 364.45
 Artium actiuarum finis, ipsa actio est 361.36
 Artium diuisio in liberales & sedentarias 3.4
 Artium factiuarum duplex genus 21.33
 Artium fines diuersi 11.9
 Artium omnium infelicitas unde fit orta 645.15
 Artium omnium scopus 360.9
 Artium opera, frequentis exercitio absoluantur 1180.33
 Artometri 925.18
 Artus inflammatis, à cōiugatis sanguis miterendus est, nisi passio fuerit in ueterata 974.
 Artuum cognitio requiritur exacta in curandis affectibus 161.44.
 Artuum morus duplex 94.23
 Artuum natura ex quibus consistit 161.41
 Artus ymnoides cartilago 248.6
 Artus A.R.I. facultas 1072.51
 Artus curatio 950.17
 Artus 551.43. 579.6
 Artilepiadis error 76.18
 Artilepiadis opinio refellitur circa medicamenta purgantia 18.62
 Artileorum facultas 1106.40
 Artileorum mores mitiores 71.29
 Artileothos quam habeat uim 1072.56
 Artilegi diuersorum olerū 189.52
 Artilegi petri uis quæ 1072.63
 Artilegi uentriculum iuuantes quānam sint 390.2
 Artilegi arteria, uocis simul & re spirationis organū 241.64
 Artilegos quid dicatur 189.49
 Artilegi arteris quarum actionū sit instrumentum 241.21
 Artilegi arterie cartilaginum sit quæque talis 242.1
 Artilegi arterie membranæ intertæ usus Ibid. 14
 Artilegi arterie motus unde 241.15
 Artilegi arterie situs inter uenam & laeuam arteriā 243.2

Artilegi arterie siue bronchi constructio 241.2
 Artilegi arterie tunica interna, cur tenuis, densa & medio-criter sicca 243.25
 Artilegi arterie tunica exterior 241.19
 In Artilegi arteriam semper non nihil portiois illabit 248.33
 Artilegi, quibus sint lauiganda 836.23
 Artilegi quibus de causis fiat 826.32
 Artilegi leui, concretioni aptius 105.38
 Artilegi radicis facultas 390.62. 1073.16
 Artilegi uenarū refrigerat 70.8
 Artilegi tres species 1273.57
 Artilegi uis 1072.66
 Artilegi uis palpebrarum curatio 1118.3
 Artilegi fraxine, siccius quām elixant alimentū corpori 395.14
 Artilegi lapidis uires 1119.9
 Artilegi simulantur quæ qualitatē habent cognationem 75.38
 Artilegi similitudo alteratio est 687.9
 Artilegi similitudine quæ requiratur 75.37
 Artilegi similitudo quæ dicitur 75.18
 Artilegi similitudines non sunt mutandæ 471.25
 Artilegi assumptiones propriæ substantialitatis 321.29
 Artilegi medicamen 1175.7
 Artilegi similes 1116.3
 Artilegi similitudo cur dicatur 1246.52
 Artilegi similitudo quid cōferat 1083.43. 1091.40. 1101.41
 Artilegi glandulosi 120.9. 302.35
 Artilegi glandulosi, non seminale organum 120.14
 Artilegi glandulosi constructi ad leniendam humore suo peniam ariditatem 120.50
 Artilegi uaricosi 302.36
 Artilegi stragulos quam uim habeat 1073.3
 Artilegi stragulus 212.18
 Artilegi stragulus cōiungitur nauiformi osi 212.3
 Artilegi stragulus siue talus, quare magis intro uergat 211.52
 Artilegi strictionem curis, quomodo febri sequatur 782.30
 Artilegi strictio oritur à frigido 1044.29
 Artilegi strictio spe frige factionis causa 661.64
 Artilegi strictio tenuium substantiarum, maxime repellit inflammationem 1232.5
 Artilegi strictoria haud omnia congruant: nec glutinantia omnia

attingunt 1019.20
 Attingens, commune genus est acerbi & austeri 1020.18
 Attingens duplex 1035.21
 Attingens exquisitè omne, est frigidum 1042.52
 Attingens frigiditas crassarum est parium 1041.16
 Attingens genus commune est austeri & acerbi 1173.33
 Attingens non est contrarium purganti 1034.1
 Attingens omne terrestre est & frigidum 1074.6
 Attingentia haud omnia refrigerant 1019.27
 Attingentia omnia sunt amica uentriculo 1065.43
 Attingentia paratu facilia quæ sint 1214.7
 Attingentia quæ 941.15
 Attingentia quatenus ætatis dispositiones idant uel iuuent 1249.66
 Attingentia siccant 417.26
 Attingentia ualenter, siccant 884.47
 Attingentia uehementer quæ sint 1216.46
 Attingentia uehementer refrigerant, alimentū influxū reprimunt 1192.53
 Attingentibus in quarum partium affectibus non fit utendum 912.54
 Attingentibus, quando utendum 922.58
 Attingentia qualitatē opera 379.35
 Attingentia facultas 1114.37. 1173.16. 1230.60
 Attingentia natura 1041.62
 Attingentium opus 1019.44
 Attingentium simul & refrigerantium usum, quæ ad supprimendum sanguinem applicantur extrinsecus, non ubique probat Galenus 867.2
 Attingentium usus in his, qui os uentriculi habent imbecillum, ad aluum deiciendum conducit 477.29
 Attingentium usus quando utilitatus 29.4
 ATHANASIA hepaticæ facultas 1256.54
 Athanasia Mithridatis 1285.50
 Athenæ Andromachi 1181.29
 Athetoma quid 940.40
 Athetomata quæ dicant 707.4
 Athletæ omnes ære alieno obstricti 2.59
 Athletæ omni bonorū genere destituti 2.50
 Athletarum anima ueluti multo demerita cuncto Ibid. 25

Athletarū crassa plenatū uictus
ratio, non exercitibus se pe-
riculosa 371.41
Athletarū genus inutile 367.10
Athletarū gymnastica in tempe-
riem excelsūq; molit 363.41
Athletarū habitudo maximē pe-
riculosa 330. 67.59. 339.59
Athletarū lusuibus uti peran-
dus 363.14
Athletarum morbi Ibid.48
Athletarū profectio nō cōferen-
da cum artibus hominē libe-
ro dignis 2.33
Athletarum robur inutile 3.54
Athletica exercitatio pulchritu-
dini plurimum obest 2.43
Atomos haud posse esse corpo-
rum elementa 33.44
Atramentū scriptorū uis 1133.34
Atramentū fuorū facultas 1135.
Atrophia 684.55 (48)
Atrophia defectus quō referen-
dus 687.18
Atrophia sequitur necessariō ali-
menti defectum 694.30
Attalus rex Pergami, patris Ga-
leni 1153.54
Attenuans uictus ratio quā di-
catur 411.57
Attenuans uictus ratio quibus
affectibus conferat Ibid.50
Attractiones sunt substantiarū
similitudine 1038.59
Attrahent quā dicant 1039.49
Attrahentium digerentiumq;
scrimen 1181.53
Attrahentium essentia duplex
1059.58
Attractio motu uisitorum recto-
rum sit 314.7
Atropis & bliti natura & facul-
tas 388.33. 1073.33
¶ A V A R I T I A uel uoluptas fa-
cinorum causa 5.35
Auaritū, uentriculū uoracitū cō-
parat 435.8
Auctio & diminutio, ex altera-
tione & latione, cōpositi mo-
tus 71.41. 78.13
Auctio quid sit 43.59. 74.31
Auctricis facultatis, propriū 75.12
Auctrix facultas quid uigetur,
& illius famulæ quæ 75.8
Auidiorū meatu uisitas 154.12
Auditui bene uel male affecto,
quæ uoces conferant 673.31
Auditū quæ obdruant 671.43
Auditus grauitas incuratio 1211.
Auditus instrumentū aē-
reum 128.61
Auditus sensibile, sonus & uox
354.11
Auditus symptomata unde pro-
ficiscantur 670.14. 750.60
Avena admodū calida 374.53.

1067.44
Anerisio molienti in cōtrarium
947.37
Aues & pisces culus sint succi
410.33
Aues sunt bipedes 310.3
Augetur tantū uiuentia 78.16
Augere secundū trīnā dimensio-
nem, solius naturæ opus 75.35
Augmentū tempus quod 614.38
Augmentum sit quousq; ossa cō-
firmentur 67.30
Auiculae montanæ tenuanti uic-
tū accommodat 416.31
Aures cur cartilagineæ 376.49
Aures cur hominibus immobili-
les Ibid.63
Aures cur promineant Ibid.54
Aures intrinsecus caue, extrinse-
cus uerō cōueniunt cur sint 277.2
Auribus animal illapsum quo-
modo extrahendum 1212.54
Auribus pure fluentibus quid
conferat 1107.64. 1130.34.
1102.30. 1109.57. 1110.32
Auriculæ muris facultas 1069.
15. 1097.16
Aurigini ab obstructione ieco-
ris ortū quid medeat 1113.50.
1117.3
Auri inflammare quæ conferat
8.14. 938.36. 1108.51. 1209.
39. 1210.33
Auripigmenti uis 1120.63
Auris uirga cur flexuosa 277.5
Aurium dolores quæ causæ ex-
citare possint 1108.26
Aurii doloribus statuentis re-
medium Andromachi 1210.
40
Aurium doloribus phlegmono-
sis, quid conducatur 1079.17
Aurium doloribus quid medea-
tur 1142.31. 1208.35.
1209.36. 1211.60
Aurium doloris uehementis re-
mediū Andromachi 1210.17
Aurium fluxionibus uetustisq;
opiuletur 1087.59
Aurium meatu obstruētos quæ
referant 1209.33
Aurium nerui 351.34
Aurii pudendi ulceribus me-
dicamen 1141.42
Aurium sanguinem effunden-
tium remedia 1210.64
Aurium sonibus remedium
Ibid.43
Aurium uermes quid enecet
1085.39. 1084.42. 1211.8
Aurium ulceri excrescenti reme-
dium 1210.59
Aurii ulceri quid medetur 482.
38. 668.63 1209.52
Aurum iudicatur per ignem
1278.55

Aurū reperit in arenis 1116.64
Auster uehementer & pontica,
sunt renui uictus rationi ad-
uersa 418.3
Auster uisū usus siccitatis ma-
ximē aduersatur 881.19
Auster putrefacit omnia 41.24
Austem, accerbum, astringens,
qualitatem unam significat
383.41
Austerum quid 861.46
Austerus 6.11
Astinus ad siccus declinat 41.3
Astrinus quare sit morbosus
40.36
Aulio quid 856.43
Auxilia citra naturæ adminicu-
lum causantur extrinsecus 19.10
Auxilia effectis non aduersant,
sed efficientibus 16.59
Auxilia instium motus naturæ
iniciunt 19.12
Auxilia quæ uia inuocantur
1180.26
Auxiliū cur prima & ultima sa-
nitatis causa dicatur 914.16
¶ A X I L I A & concauitas ad uo-
bus sit musculis 172.33
Axillaris uena 144.5
Axillaris uenæ sectio laboranti-
bus infra clauas accōmoda-
darissima 165.21
Axillaris uena, humerali est ma-
ior 145.21. 164.14
Axio 271.9

B

B A L A V S T I I facultas 1074.8
Balneæ 401.17
Balneæ diutina cur nos exoluat
ac mori tradant 486.39
Balneæ dulcia calefaciunt nos &
humectant 427.52
Balneæ dulcia cur febri tertianæ
auxilientur 961.20
Balneæ calidæ ad solij frigidi u-
sum corpora preparat 911.63
Balneæ qualem reddant respira-
tionem 492.45
Balneæ frigidae quomodo pul-
sus immutent 572.14
Balneæ immodica facultatē dis-
solvunt 527.13
Balneæ quibus cōueniant 908.
1. 471.42
Balnei moderatē calentis usus
449.2. 910.15
Balnei partes diuersæ 910.27.
912.48
Balnei partes singulæ, quos usus
prestant 911.16
Balnei utilitas 198.19. 806.45.
807.41. 911.27. 924.41
Balneorū dulcium immodicus
usus, humiditates inducit præ-
ter naturam 663.22
Balneorū frigidiorū uis 573.22
Balneo-

INDEX.

Balneorum moderatorum com-
moda 573.3
Balneorum scopus 961.19
Balneorū usus in crudis artibus
456.35
Balneo tempus aptissimū in fe-
bribus intermittētib. quod-
nam sit 914.59
Balneum cibus in optimi habi-
tus pueri sequatur 434.54
Balneum frigidum quibus in-
trepidē, & quibus cautē admi-
nistrandum 911.46
Balneum initura corpora febrici-
tantis, quomodo sine prę-
paranda 892.56
Balneum intemperatū horro-
ris, cutisq. densitudinē gignit
910.45
Balneū quādo cōducatur 914.59
Balneum quando tabidis sit ad-
ministrandum 808.56
Balneū quomodo administran-
dum 914.53
Balneum sepe contrahit iu accen-
sionū declinationib. 910.59
Balneum somnū conciliat 1200.
55. 458.45. 738.52
Balsami & opobalsami facultates
1073.64
Barbari compositio Andromachi
1161.33
Barbarus Lucij Imperatoris an-
nunculus 646.48
Basilici uel ocymi uis 389.40
Basiliscus conspectus audis sue
hominem perimit 1271.39
Basis instrumenta 111.30
Basiliscus brachij caritates 107.
48
Basiliscus rubi fructus sunt 381.48
Basiliscus facultas 1074.40.
1181.51. 1256.33
Basiliscus dicuntur bifariam
1061.52
Bellaria abigēda a senib. 469.18
Bessens qua significatione Gale-
nus usurpet 1193.48
Betrus facultas 387.54.
1109.44
Beronicę facultas 1086.45
Bismuthum sicut a cerna qui-
bus non sit 883.33
Bilem atram nullum animal gu-
stare sustinet 703.18
Bilem cur pituitosi nōnulli asai-
duē uomant 816.49
Bilem flauam quid expurget
1203.41. 1204.48
Bilem gignentia 54.13
Bile uentriculus redundans, cor-
rumpit cibos concoctū faci-
les 380.12
Bilis aruginosa quę 701.64
Bilis atra a liene in uentriculum
mixtur 436.35

Bilis atra cur excedat corrodary
703.13
Bilis atra cur timorem cōciliet
744.7
Bilis atra differt crassitie ab ace-
to 703.12
Bilis atrę affectus 791.35
Bilis atrę differentię 741.15
Bilis atrę generatio & facultas
947.47. 683.26. 127.1. 701.
19
Bilis atrę purgatione qui affe-
ctus indigeant 1002.15
Bilis atrę quando sistatur excre-
mentum 437.28
Bilis atra est acida, terramq. fer-
mentat 703.8
Bilis atra ex flaua immodicē as-
sata orta, omnium pernicio-
sissima 703.23
Bilis atra expurgat a liene, quē
alio 981.57
Bilis atra fixa sanguinis 48.44
Bilis atra, flaua actior & mali-
gnior 80.34
Bilis atra frigida & sicca 131.32
Bilis atra in auriculo crescit 80.33
Bilis atra in quantis qua ra-
tione rigore gignat 681.40
Bilis atra iuuat uentriculicatio-
nem 127.3
Bilis atra nascitur ex sanguine
immodicē assato, estq. frigida:
non tamen caloris expert
690.6
Bilis atra perassata qualis fiat
80.63
Bilis atra, perniciosissima suc-
cus 27.39
Bilis atra post pituitam frigida
63.51
Bilis atra qualis 707.31
Bilis atra quādo in cerebri cor-
pus, & quando in animum re-
pat 742.19
Bilis atra quid uocetur a ueteri-
bus medicis 81.8
Bilis atra quos morbos pariat
686.63. 982.47
Bilis atra quos tumores gignat
616.18
Bilis atra sanguine excreto est
splendidior 690.4
Bilis atra si excernatur, semper
portendit perniciem 703.27
Bilis, crassius excrementis excer-
nendis aptissima 216.22
Bilis differentię pro animalium
diuersitate 1130.25
Bilis flaua ad ultimum assata, sit
crassa, ignea, & uiscelina 80.61
Bilis flauę & pallidę discrimen
1129.56
Bilis flauę facultas 128.39
Bilis flauę quibuscum in uentri-
culū geminas meatus 53.55

Bilis flauę species 701.53
Bilis flaua in exortum intestini
excernitur 181.9. 216.5. 436.23
Bilis flaua in fellis uescam exci-
pitur 80.56
Bilis flaua obtinet uim deficcā-
di 599.27
Bilis flaua qualis humor 961.7
Bilis flaua quibus de causis reti-
neatur 437.12
Bilis flaua quibus in uentricu-
lum influat 53.63
Bilis flaua quos tumores gi-
gnat 636.16
Bilis flaua, sanguine calidior exi-
stet 43.46. 80.22. 61.49
Bilis generatur cum sanguine in
iecinore & uenis 79.11
Bilis in uentriculo orta, quę co-
lorem habeat 702.62
Bilis in uentriculum non con-
fluit, si cibum citius exhibeat
479.64
Bilis nullā portionē demisit na-
tura in uentriculum 216.33
Bilis orta ab igneo uentriculi ca-
lore, & eius quę confluit a ie-
core, indicia 54.16
Bilis pallida per corpus fusa, quę
morbos gignat 686.60
Bilis plurima in uentriculo, cau-
sa sitis perpetuę 80.26
Bilis præsina in quorum uentre
gignatur 54.12
Bilis quibus uniuersa in ieiunū
influat 131.2
Bilis quomodo sit moliēda 474.5
Bilis quo pacto acedemur
oculis 1130.18
Bilis tum pallida tum flaua in
calidis & siccis temperamen-
tis abundat 474.2
Bilis uchemētē mota, rigorem
facit 643.42
Bilis uomitū copiosiorē quę
præcedant 216.42
Bilis uarię facultates 701.25
Biscoquendi ratio 182.12
Bituminis facultas 1176.43
Bituminis iu maij mortuo pro-
uenientis facultas 1141.61
Bilem ad genus qui sūt 215.5
Bilem succus albicans 80.30
Bili facultas 1074.55
Boletus uxorē laborantē
suffocatione uteri, qua ratio-
ne restitueri Galenus 649.18
Boethius ob restitutam uxorem
quadringentis aureis Galenū
donauit 649.57
Boleti facultas 391.33. 406.63
Boli Armeni descriptio 1127.14
Bona animi & corporis multi-
pliciter dici 360.30
Bonitatis diuinę specimen per-
fectissimum 215.3

Bonorum species tres	118	ratem parit	1075.4	Calfacere nos quæ dicantur	1017.19
Borex frigidas est tenuiū par- tium	1204.13	Bulbi sanui uis	1074.58	Calfacendi corpus nostrum to- tum, uel eius aliquam refrige- ratam partem rano	1080.47
Boreas seruat impudria uniuersa	41.18	Bulbi uis	64.391.5	Calfaciens actū & potētia unū- quodq dupliciter dicitur	1016.11
BRACHIA gracilia, & pican- da, & omni modo exercenda	467.53	Bulborum succus	406.59	Calfacientia corpus, ab eo in- itium caloris assumunt	1015.3
Brachij capita	307.54	Bulmos unde accidat	675.7	Calfacientia haud omnia neces- sario siccant	55.19
Brachij descriptio	98.45	Buphrthalmos quā habeat uis	1075.10	Calfacientia uehementer & sic- canna, digerunt subtilia, reli- qua magis impingunt	945.16
Brachij epiphytes	107.43	Buprestis cuius sit facultas	1141.58	Calfacientiu ordines quatuor, quos etiam reperire est in cæ- teris qualitantibus	1149.18
Brachij extensio & flexio à qui- bus musculis fiat	99.18	Buryri facultas	1139.9	Calfacientium uires	713.3
Brachij motus & musculi	94.17. 172.59. 294.61	Buryrum extenuat infantiū ex- tremis dentibus	Ibid.18	Calida cur uigilias efficiant	717.1
Brachij musculus interior duo habet suspensa capita	155.60	Buryrum pleuritici expuitioni bus confert.	Ibid.14	Calida & frigida facultate quæ dicantur	1012.13
Brachij ossis figura	107.64	C		Calida impense siccant	884.18
Brachio articuli duo	98.47	Calalce	365.38	Calida potestate, ut nos calfa- ciant, prius in tenuia commi- nui debent	1014.53
Brachio unicum est os, atque id magnum ac rotundum	98.49	Calalix facultas	1084.8	Calidi & frigidi iudex est ta- ctus	47.46
Brachium	102.59	Cacochyma qua ratione mor- dicationes sanent	1014.13	Calidi & frigidi qualitas in fe- bris epialis commiscetur	65.20
Brachium atollētes & circum- agentes musculi, robustissimi omnium	295.34	Cacochymix correctio	916.26	Calidi & humidi breuibz fom- nis sunt contenti	818.30
Brasice bis tēre elix succus, uentrem soluit: ipsa autē sup- primit	1033.16	Cacochymix notæ unde sumen dæ	457.1	Calidi & siccī offendunt ab im- modica uacuacionibz	964.18
Brasice facultas	387.65.	Cacochymia quæ dicatur	60	Calidi & siccī omnes gracilio- res	474.15
1089.49		Cacochymia quæ dicatur	700.68	Calidi frigidit adhibiti nostro corpori uis	1165.18
Brasice folia calida macerata, ebrietati obstitunt	1199.47	Cacochymia quid	916.10	Calidi, frigidi, & c. respectu no- stri iudicium quomodo fieri debeat exactum	60.13
Brasica & lens uisum hebetant	388.18	Cacochymia quæ dicatur	708.55	Caliditas erysipelatosi & ple- gmouosi, quando infertur	781.10
Brasica melancholicū succum sola ex oleis gignit	741.8	Cadmiz differentiz, atque eius uires	1122.19	Caliditas febrilis multum den- sumq spiritū reddit	503.30
Brasica uapores reficcat	1199.	Cadmia quomodo fiat	Ibid.3.	Caliditas humida uires habet e- uidentiores	789.16
Bregmaia ossa	181.10 (59)	Cadus capit cōgios Romanos duodecim	1219.64	Caliditas moderata uniuerso corpori maximè necessaria	487.55
Breanae uis	1075.16	Cadui intestini figura & usus	1291.53	Caliditas nostra crassè est essen- tiæ	1014.61
Breuitas dicēdi ueteribus fami- liarissima	320.38	Cæci intestini figura & usus	124.18	Caliditas salua esse nō potest si- ne respiratione	487.42.
Bromi facultas	1075.31	Cæcum foramen	161.41	Caliditas animantium mate- ria est sanguis	486.3
Bruta artium expertia	115	Cæcum intestinum in plurimis aibus duplex	124.40	Calidum attrahit, frigidum re- pellit	1059.58
Bruta cur regiones mutant	694.60	Cæcum intestini quartū	180.50	Calidum calido additum, efficit bilem	79.62
Bruta libidine & iracundia regi- 315.20		Cæcum intestini quartū	125.58	Calidum duplex	1041.9
Bruta semen excernētia post coi- tum non concipiunt	106.16	Cæpæ facultas	1090.60	Calidum ex accidenti refrigerat	60.
Bruta sibipia duce natura, me- duntur	98.69	Calami flos uisus auditū	1083.1		
Bruta inesse rationem recondi- tam	1199.15	Calaminthæ uires	8081.12.		
BRUTUM 709.18. 971.14		Calaminthæ uires	1053.16		
Buboni uis	1073.7. 1074.66	Calami odorati uis	1083.47		
Bubonis curatio	934.48.	Calcani cutis durissima	112.53		
1129.15		Calcanium maximū esse os, fir- missimèq dearticulatū	214.24. 112.47		
Bubonocle quæ dicat	709.43	Calcani subiacere ad perpen- diculum tori cruri	111.65		
Bubulam quā fixatiles pisces cur nonnulli facilius confici- ant	168.39	Calcanthion quando stomatidis miscere expedit medicamen- tis	1133.30		
Buccarum fines inferni seruūt masticationi	273.36	Calcia uires	1172.30. 1125.39		
Buccinarum & purpurarū testa usta, quā uim habeat	1118.51	Calculorum cause	397.25		
Buglosson uino iniectum hilari- tatem	1199.15	Calculorū generatio & curatio	405.45. 919.36. 945.18. 1072.47. 1074.43. 1077.11. 1079.56. 1095.3. 1106.44. 1110.65. 1186.34. 1267.5		

100.60. 976.13. 417.42
 Calidū & frigidū proximē uni-
 tatem solunt 64.31
 Calidū facultate & actū urrug
 quotuplīciter accipiat 1017.12
 Calidū frigidū magis actiūū
 197.65
 Calidū, frigidū &c. quot mo-
 di dicatur 16.17. 58.55.
 1011.49. 1019.19
 Calidū innatū, est mistum, ha-
 berē suū ortū ex frigore
 & calore 713.40
 Calidū innatū nō est aima
 lis generatiōe posterius 711.12
 Calidū innatū quomodo in-
 telligendū 1055.19
 Calidū innatū quomodo in-
 trō & foras mouet 715.37
 Calidū natura omne a calefa-
 ciente primū calefit 63.44
 Calidū partū tenuium uehe-
 mentius attrahit 1039.54
 Calidū potentia est, qd facile
 in ignem uertitur 1014.38
 Calī generatio 834.50. 878.11
 Callos in statu proprio seruan-
 tia 878.17
 Callos minuentia quē Ibid. 15.
 1058.8
 Callos quē medicamenta pro-
 moueant 878.13
 Callū glutinandis ofibus na-
 scitur ex ofiū alimēto 876.33
 Calor a corde, membris enī de-
 mititur per uenas 307.36
 Calor adiciētiū aetate maior,
 naturalis minor, hycemē cō-
 trā 53.14
 Calor aduentitiū, functiones
 reddit imbecilliores 369.61
 Calor circa humiditatem nō hu-
 mecat 1161.63
 Calore cōfante cum mollitudi-
 ne instrumentorum, quē pul-
 suum differētiā oriant 556.50
 Calore cōiuncto cum instru-
 mentorū duritie quā pulsūū
 differētiā producat 557.1
 Calore mordaci præditis quē
 aduersentur 471.63
 Calor est apud ad conciliandas
 ac recipiēdas fluxiōes 798.41
 Calor proprio lingula seruans,
 corripūnī cōtrario 1045.46
 Calore summo accedente ad ma-
 teriam, constituit ignis 16.10
 Calor extremē accensū, est cau-
 sa pulsus creberrimī 554.30
 Calor, febrī omni inimicus est
 911.3
 Calor furiosus & iracundus quē
 341.12
 Calor immodicus a quibus ac-
 cendatur occasiōib. 660.42
 Calor innatus ad quid condu-

cat 1035.60
 Calor innatus, est tēperatus: ac-
 quiritur, intēperatus 569.55
 Calor innatus, in quibus mor-
 bis materiæ frigidæ multitu-
 dine opprimatur 505.15
 Calor in quibus augeatur affe-
 ctibus 444.11
 Calor inustus constitit in pituita
 & sanguine, mistūq; tēperatē ex
 caliditate & frigiditate 551.11
 Caloris cōmota tēperies, ipsius
 actionis causa 79.46
 Caloris exuberantis signa 118.
 55. 714.54. 753.4
 Caloris innati substantia quomo-
 do augenda 1055.1
 Caloris marcescētis pulsus 554.
 43. 575.50
 Caloris natiui differētiæ quē
 551.52
 Caloris naturalia custodiēdi ra-
 tio 433.38. 917.13
 Caloris nostri & flammæ ignis
 dissimilitudo 804.10
 Caloris omniū partium præter
 cor custodia est duplex 507.53
 Caloris opera 517.18 459.14.
 804.16
 Caloris opus in uenas 42.62
 Caloris peculiare pulsus qui
 594.58. 595.4
 Calor, motus causa 716.65
 Calor natiui coquit, alienus
 corrumpit 796.51
 Calor natiui est natura 804.
 13. 976.5
 Calor naturalia augeat atq; con-
 seruat omnia, illūq; uitam lar-
 gitur 917.10
 Calor non facit ad iudicandas
 medicaminū uires 1011.60
 Calor noster quomodo augeat
 & minuat in corpore 801.56
 Calor omīs eger uetulo 456.56
 Calor omīs sublime fert 151.50
 Calor per somnū ad interna cō-
 uertitur 509.57
 Calor puerorū luuenumq; dif-
 fert tantū qualitate 47.13.
 691.16
 Calor quibus signis deprehen-
 datur 559.15
 Calor qui genuit corpora, peri-
 mit nos 804.16
 Calor uicinæ res omnium ma-
 ximē alterare potest 691.40
 Caluarie forandæ ratio 879.15
 Caluariā posthala ossa omnia cō-
 plingi 114.6
 Calua rota ossa est 51.55
 Caluefcitibus maturius reme-
 dium 1193.12
 Caluitiei causa 51.62. 954.7.
 1189.11 (51.12)
 Caluities cur in fyncipite magis

Caluities ex siccitate 54.40
 Calx cineria est species 1110.1
 Calx, os pedis maximum 112.61
 Camelī, item mustelæ cerebrum
 cominabibus medetur ex ace-
 to 1274.59
 Cancanra dicis facultas 1084.2
 Cancer exulceratus oritur ex a-
 tra bile 705.50. 704.12.
 707.15. 981.11
 Cancer, qui affectus dicatur
 708.58
 Canceri carent capite 350.65
 Canceri curatio 943.4.
 981.56. 981.10
 Canceri fluuiantis uires 1174.66
 Canceri generatio 948.2
 Canceri medicatio periculosa
 981.60
 Canceri uictus ratio cōueniens
 981.18
 Canceri uisti uires 1140.56
 Cancros & polypodas quid eli-
 quet 1077.43
 Cancro sanando incipienti quē
 medicamenta sint idonea
 948.10
 Candidi ex pipere compositio
 1151.51
 Canis piscis 401.12
 Candidū Andromachi 1153.19
 Candidum Damocratis 1155.7
 Candidum Galeni 1151.10
 Candidum Heræ 1153.36
 Candidum Mnæi 1154.6
 Canē ex lupo & uulpe concepi-
 re, necnon ē conuersio 109.11
 Canes præ festinatione cæcos
 carulos edunt 119.16
 Cani qui fiant 51.3
 Canirubi fructū facultas 381.
 Canis humidior formicis 56
 & apibus 41.43
 Caniarabidi note 1277.43
 Canis siccior hominē 41.41
 Canis solus rabie corripit, eiusq;
 spiritum rabiem excitare po-
 tens est 776.13
 Canines cur in temporibus po-
 tius 51.13
 Cannabis semen calidū, feritq;
 caput 577.61. 1084.7
 Canna quā uim habeat 1081.57
 Cantharidū uires 1141.49.
 1275.2
 Cantharides cōmōdo miscentur
 diureticis 1038.5. 1049.4.
 1175.40.
 Citharides eligēdi ratio 1141.55
 Cantharides & chapsia, trolosione
 & putrefactione enecant
 1048.4
 Cantharis uesicæ exulcerat 58.
 12. 1038.11. 1171.14
 Capilli denigrantur cedri liquo-
 re 1193.43

- Capilli veneris facultas 106.7.11
Capillorum defluuij causæ 119.2.35. & 55
Capillorū defluuij curatio 119.2.40. & 59
Capillos crispōs reddendi ratio 119.4.18
Capillos rīgentia ab Archigēne prodita Ibid. 9
Capiti dolenti ex consortij lege totius corporis q̄modo p̄spiciendum 110.4.53
Capiti laboranti intemperie calida, frequentī balneo dulcis aquæ medendum 479.37
Capiti repleto succurrendū ambulatōib. ante cibū 477.49
Capitis affectiōib. frigidis inueteratis, quæ medicamenta conferant 1106.63
Capitis dispositio totius ex quibus cognoscenda 816.63
Capitis dolentis per consensum curatio 968.3
Capitis doloris remedia 110.4.33
Capitis dolor à bile quibus p̄cipue oboriat̄ Ibid. 42
Capitis dolor ex ictu obortus, cur sæpe se extendat per uniuersum caput 1100.52
Capitis dolor ex plaga quando sit periculosus Ibid. 60
Capitis dolor intra caluariū situs, cur extendatur ad oculorum usq̄ radices 1105.64
Capitis doloris ab ardore contracti indicia & curatio 1198.9
Capitis doloris à bile orti indicia & curatio 110.4.30
Capitis doloris ex magnitudine febris orti, curatio 968.52
Capitis doloris ob imbecillitatem cōtracti, curatio Ibid. 23
Capitis dolor ob plagam ortus, quos medēdi scopos p̄æbeat 1100.43
Capitis dolor ob totius corporis plenitudinē obortus, q̄modo curandus sit 1106.4
Capitis doloris ob utrīculi cōfortiū oborti & indicia, & curatio 1102.24. 110.4.58. & 64
Capitis doloris orti à frigore indicia & curatio 1199.9
Capitis dolor quarum excrementum sit signum inseparabile 968.59
Capitis dolorū ab ebrietate curatio 1199.38
Capitis dolorū cum febrī ab initio affligentū curatio 1105.6
Capitis dolorum inueteratorū curatio 1199.25
Capitis dolorum species uariæ 968.6. 1197.23
Capitis figura cōcinna, semp̄ bene dispositiōis indicium 817.11
Capitis figura naturalis, qualis esse debeat 111.17. 817.16
Capitis fracturarum curatio 878.36
Capitis in omni dolore quæ sint uitanda 1105.20
Capitis motuū securitas 171.
Capitis motus 170.4.7 (16)
Capitis motus ad anteriora quibus stat musculi 171.30
Capitis motus duplex 114.55. 283.3
Capitis motus sursum deorsum quæ & in obliquum unde proficiuntur 283.30
Capitis musculorū actiones uariæ 284.10
Capitis ossa sexdecim p̄ter inferiorē maxillam 285.30
Capitis ossis fracti simul & contusi curatio 878.61
Capitis priorem motū quæ uertebre p̄æstent 114.57
Capitis refrigerandi ratio 891.10
Capitis repletio somnum conciliat 675.56
Capitis secundum motum quæ uertebre efficiant 114.59
Capitis suturæ tres 112.21
Capitis uehementissimi dolores & moderari qui 1197.36
Capitum acutorum figuræ tres 116.30
Capitiū excrementa in quas partes decumbant 479.2
Capitiū uel fumarie facultas 1084.10
Capparis epilepticis congruit 1006.50
Cappari ex oxymelite cōfert ob frustioni iecinoris 951.56
Capparis ex oxymelite facti ad cruditates 461.24
Capparis facultas 116.30. 1084.16
Caprī temperamentum 192.40
Caprificus quid, & quæ eius facultas 1108.43
Caput fortis in ipso partu primū ad matricē debet: huius parienti figuræ contrariæ omnes periculosissimæ 107.46
Caput fastigiatū damnat 112.28
Caput leporis quibus affectib. confert 1136.53
Caput manidum quibus confert affectibus Ibid. 46
Caput magnum quando sit bene dispositiōis indicium 817.3
Caput quadrupliciter affici potest 739.22
Caput quibus oppleatur facili 746.49
Caput refrigerandum ubi sanguis fluit per nares 965.6
Caput sanarum quibus confert 1136.56
Caput uacuandum est post totius corporis uacuationem 1106.20
Caput uehementer aestuans, rosaceo recreandum 479.50
Carbo est terra succisa 1015.48
Carbonibus qualia medicamenta conueniant 973.53
Carbunculi curatio 948.52
Carbunculi scarificandi post sanguinis missionem 949.10
Carbunculus quæ competant 1091.60. 1179.24
Carbunculi unde exscent 707.8. 783.20. 971.21
Carbunculo cataplasmata idonea 948.62
Carbunculorū descriptio 707.13. 948.43
Carbunculos & phlegmonas igneas quæ foueant 1092.10
Carbunculus à bile atra oritur 703.44. 704.22
Carbunculus absque febre non reperitur 948.51
Carbunculus semper cum ulcere innadit 660.5
Cardialgie causa 114.15. 675.4
Cardialgia propriè qd sit 1148.60
Cardamines nia 1106.56
Cardamomi facultas 1084.54
Cardamomi lumbricos interficit Ibid. 57
Caricæ cum ruta nucibus p̄æsumptæ aduersantur uenenis 410.6
Caricæ & ficus aduersantur inflammationi iecoris, & lieni communi omnī dulcium ratione 110.48
Caricæ largius sumptæ, pedicularum gignit multitudinem 108.44. 409.64
Caricarū decocti facultas 1180.
Caries illignorū cuius sit fa. (6) culatus 1105.17
Caries quid 11.59
Caries unde gignatur 663.61
Cari feminis facultas 1084.60
Carnem ex sanguine, neruū ex semine generari 11.19
Carnem habet omne animal 1133.64
Carnes animalū cum cibis mutantur 8134.54
Carnes animalium duræ simul & excrementitiæ, sunt cōdituræ ap̄e, contrariō autem modo se habentes, inep̄e 403.55
Carnes aseritine sunt duræ & excrementosæ 409.17
Carnes

Cataplasmatibus ē triticea farina
uires 1051.44
Cataplasmatibus quādo utendum
927.55
Catapota ad subuersionē uen-
triculi 1250.54
Catapota descripta à Galeno
871.18
Catapotiorum ex aloē compo-
sicio 1189.45
Catapotii ad ardore uentricu-
li, sitim refingens 1250.61
Cathari uel desillationis cau-
sa quæ 693.2
Catarrhos & corizæ qd defic-
cet 1076.38.1108.21.1095.18
Carochorū lethargicorumq; di-
scrimen 577.50
Caulalis facultatem quam ha-
beat 1055.33
Caudæ equinæ facultas 1082.32
Causa affectus quæ dicat 725.2
Causa conseruati uersatur cir-
ca ea, quæ corpus necessariū
alterant 829.48
Causa cōtinens alterationis pul-
sū, est usus eiusdem 552.40
Cau. doloris hemicranii 1207.
Causæ accidentariæ, (30
sine quibus non 695.42
Causæ antecedentes 455.2
552.26.599.24.661.24
Causæ antecedentes facultatis
robur adaugentes, sunt du-
plexes 587.5
Causæ continentis 552.13
Causæ conseruatrices quot sint
829.38
Causæ dictionē citates 688.33
Causæ diuersæ, diuersam curam
di rationē desiderant 16.37
Causæ dum agunt, potissimum
dicuntur 26.13
Causæ eadem, eandem curatio-
nem postulant 16.38
Causa emota longē est molesti-
or quiescente 680.34
Causæ externæ uel procatartici-
cæ quæ dicuntur 599.17
Causa effectrix 68.49
Causæ, humidæ intemperiei quæ
Causæ inæqualitatis in (600.9
uno pulsu 561.44
Causæ intemperamentorū in-
quirendæ 80.33
Causæ medelam indicant 16.38
Causæ morbificæ quæ & quo-
ruplices 844.6
Causæ naturales & non natura-
les, quantitatē excessu cedit
in causas præter naturā 514.
30.658.16
Causæ primæ & maximæ princi-
pales quæ sint 695.2
Causæ procatarticiæ inualida-
rantium corpora immutant

694.31
Causæ procatarticiæ morborū
dicuntur occasiones 694.36
Causæ procatarticiæ quæ dicant
661.16.552.24.455.4.781.59
Causæ pulsū mutantes ut inue-
niantur, considerare oportet
instrumentum, usum & facul-
tatem 598.54
Causæ pulsuum præcipuæ, sunt
continentes 552.47
Causæ refrigerantes tot nume-
ro sunt quot calfacientes 582.9
Causæ uitæ concoctionis uen-
triculi quæ 684.5
Causa externa nō ledit nisi in-
terna præsentē 17.39
Causa genus auxiliij indicat 15.
Causa inæqualitatem ef-
(33
ficiens, semper in pul. ib. ordi-
natis firma & fixa est 566.21
Causæ indurantes arterias quæ
sint 599.63
Causa morbi quæ sit dicenda
658.59
Causa mordax mortalē omnis
siue frigida siue calida fuerit,
horrorem rigoremq; inducere
potest 680.40
Causa non potest agere, sine pa-
tientis aptitudine 782.42
Causa quid dicat 73.54.664.50
695.35
Causa quatuorplex 664.51
Causæ cōtinentiū uarietū pul-
sus, octo cōiugatiōes 557.37
Causarū differentia triplex 566.
Causarū dignoscendarum (54
modi extra medicā artem po-
siti 581.15
Causarum dignoscendarū qui
sint artificiales modi 581.2
Causarum efficientium differen-
tia duplex 17.35
Causarum genera præter natu-
ram quæ sint 920.14
Causarū genera quinque 236.61
Causarum genera tria in cun-
ctis 552.11
Causarū genus duplex 599.22
Causarum medicinalium qua-
tuor genera 438.6
Causarum morionis differentiæ
quatuor sunt 28.5
Causarum præcedentiū febrem
putridam, quid singulæ indi-
cent 920.13
Causarum præternaturaliū diffe-
rentia triplex 839.7
Causarum præter naturam diffe-
rentiæ 514.34
Causarum procatarticarum u-
sus 588.24
Causarū pulsus gignentiū tria
genera 579.62
Causarū pulsus mutatiū, genera

lis uno exēplo traditio 552.33
Causarum salubrium differen-
tia duplex 829.25
Causarum salubriū materiæ quæ
sint 830.6
Causa salubris 559.47
Causa sine qua nō, quæ 664.54
Cauticis in quibus utendū me-
dicamenta 816.7
Cauteria sanguinem supprimūt
qd relinquunt escharā 1017.2
Cauterij, causticiq; in quibus
utendum 865.18
Cauterio in oris putrilagiosis
ulceribus quando utendum
223.14
Cæcis quas possideat uires
1086.53
Cæcilia, laud omnia sunt mol-
lia 1055.64
Cedrex facultas 1085.49
Cedrea quid 1085.42
Cedri baccarum facultas 183.6
Cedrix uires 1295.46
Cedri utriusq; facultas 1085.40
1085.63
Cele, qui morbus 1275.4
Celeritati pulsuum diiudican-
dæ quid expendere oportet
at 543.2
Centaurij maioris facultas
1086.2
Centaurij minoris facultas
1086.23
Centaurus nō recipit Galenus
unquam fuisse 2092.7
Centrodix uis 1102.23
Centrum quid 271.2
Cepari, aliorū, porrorū ampe-
loprasorū facultates 391.55
Cephalææ symptomata diuer-
sa à causis uarijs producta
1205.51
Cephalga magis facultatem de-
ijcit cephalalgia 1205.48
Cephalga quid 746.25.1205.32
Cephalalgæ & cephalææ disci-
men 746.35
Cephalica catagmatica genero-
siora sunt 1260.40
Cephalica medicamēta 878.45
Cephalicis ad quæ medici utan-
tur 1260.35
Cephalicum Heræ Ibid.45
Cephalicum ossa corrupta edu-
cens 1275.30
Cere ablundæ ratio 1152.25
Cera elora est emplastica 1045.
Cera elora mordicationis (38
est expers 1023.57
Cere qualitas 1087.2
Cere usus ulcri cauō est pericu-
losus 850.2.1123.16
Cera per se non congruit ulcri-
bus sordidis 1155.42
Cerafi gummi facultas 1086.37
Cera-

Cerasiorum species & facultas	que sequuntur	603.28	Cerebrum ex solo semine oritur
382.40. 1086.33	Cerebri lacuna	258.43	Cerebrum facile ab ac-
Ceraria siue filiquæ	Cerebri mestuum ad palatū de-	351.23	re re rigeratur
386.20	scensus	258.35	351.23
Cerati plurimum acrisus medi-	Cerebri meatu declinuium usua	357.56	Cerebrum frigidum a quibus fa-
camentia quando miscendi,	Cerebri morbi quomodo	817.4	cile la datur
& quando minua	diagnoscendi	318.9	818.37
1179.43	Cerebri motus	194.5	Cerebrū habentes frigidū, som-
Ceratoides tunica gignitur a	Cerebri nates	750.25	nolentiores sunt
crassa meningē tenuiore red-	Cerebri naturā quinq; indicio-	109.41	815.43
ditā	rum genera o'v'ant	109.41	Cerebrū in alioqi sede locatur
366.32. 669.57	rum genera o'v'ant	816.16	
Cerato Galeni frigidū, quomo-	Cerebri pars anterior, mollior		Cerebrū in apoplexia magis af-
do utendum	mollior: posterior durior,		ficitur ventriculi, in sopore et
909.55	durū gignēda nerua	353.62	epilepsia
Ceratonia facultatē	Cerebri partes quō posteriora,	268.32	750.25
1086.40	ed duriores		Cerebrum inspirare expirareq;
Ceratum ex rispsia	Cerebri p'ductiones maximæ, q;		131.15
870.61	ad nates pertinent	260.30	
Cerati Galeni ad inflammatio-	Cerebri productionis in oculos	165.19	Cerebrū inēperie affectū, qualia
nis oria ventriculi & hepatis	usua	353.19	symptomata inducat
maximē conuenientia	Cerebri refrigeratio, cranio fra-	351.20	601.58
1248.32	cto, ultimum malum	818.45	Cerebrum leporis confert pue-
Ceratum humidum ablutum fri-	Cerebri siccā indicia	34.36	ris den ientibus
gida, calidos affectus refrige-	Cerebri temperies quibus nois	34.36	116.60
rat omnia	coniectanda		Cerebrū nausē excitat
1013.55	Cerebri utriculi quatuor sunt		394.58
Ceratum roborando ventricu-	Cerebri utriculua me-	344.1	Cerebrum nerua & muscula fa-
lo commodum	diua & principalissimus in	325.22	culi stem sup'pediat
891.46	uertice habetuc		888.40
Ceratum simplex aceto ablutū,	Cerebri uiriosa per quæ regio-		Cerebrum nerua similissimū, mol-
contra rumores calidos opti-	nes excernantur	715.41	luisa ramen
mum est p'fidium	Cerebro calido & humido præ-		353.57
1019.9	dicta ut uisus aduersatur, sic	819.12	Cerebrū neruorū & spinalis me-
Cera Tyrrhenica	confert aquilo		dulla origo
1154.41	Cerebro defecto osibus, aut cō-		149.26. 282.41.
Cerchnoa p'cedit tussim	presia eius uentriculis quæ-	322.57	309.36. 696.61
679.	nam accidant		Cerebrum neruorū, quæ uolunt
Cerealis quæ dicant	Cerebro exciso, animata nō pri-		arij motus sunt instrumenta,
415.20 (3)	uatur sensu nec motu, prius-		origo
Cerebellum est principium spi-	quā ad aliquem uentriculū		327.35
nalis medullæ	perueniunt sit	341.60	Cerebrū nō eget corde, ut sensus
817.31	Cerebro nudato a membranis, ni-		& moueatur animal
Cerebri affectu symptomata	hil offendi animal	344.47	324.4
357.	Cerebro qua uis sanguis in ducit		Cerebrum per neruos, partibus
Cerebri altero uentriculo	Cerebro uacui	326.60 (192.6)	um sentiendi largitur
457	Cerebrum acre calidius	351.17	677.11
uulnerato quandam fuisse fer-	Cerebrum autem cerebro præ-		Cerebrum propter oculos in ca-
urum	storum præstantius tantū,		pitie collocatur, propter cere-
355.59	quærat durius	398.42	brum sensoria reliqua
Cerebri anatome	Cerebrum calidum a quibus fa-	818.14	353.48
192.40	cile impleatur		Cerebrum pulsare
Cerebri anterior a posteriorib;	Cerebrū cū sona arbitarij mo-	72.15.	391.14
dirimitur intercedente dura	rus nō eget musculis		Cerebrum quæ suo motore im-
meninge	Cerebrū contento spi-	149.27	pleant
357.2	ritu incalcescit	129.58	675.58
Cerebri anteriore uentriculo in	Cerebrū corde posterius gigni	123.63	Cerebrum qualis cibus
spirationē expirationē atq; ef-	Cerebrū cordi exiguum, sensuū		394.58
fationē efficere	uero organis immensam ner-	351.32	Cerebrum quando afficiatur ut
355.50. 149.30	uorū mixta apophysi		instrumentum, & quando ut
Cerebri sur meningum inflam-	Cerebrū demitit morricem fa-	124.40	pare similis
mandēs necessariū febria atq;	Cerebrū, dum inspiramus, aliqd		742.4
delirium sequitur	acria attrahit	129.40. 507.1	Cerebrum quorū sit cōdictū
603.44	Cerebrum est neruorū mollium		675
Cerebri calidi & humidū indicia	omnium origo	263.21	Cerebrū q' rēpore formet
888.65			124.3.
Cerebri calidi & siccā indicia			Cerebrum, rationalis: nimis do-
Ibid. 57			micilium
Cerebri calidi indicia			437.44
Ibid. 10			Cerebrum recipit sensu, imagi-
Cerebri & membranarū eius in-			natione q; & intellectu cō-
flammarionibus quando cu-			plectitur
curbitæ conueniant			352.59
921.56			Cerebrū, sensu, neruon moraliq;
Cerebri excrementa crassiora per			uoluntarij principij
furatā expelluntur			315.45.
258.26			351.50. 345.6
Cerebri excrementa uermicula			Cerebrū, spinalis medulla, & glā
ria			dulla quæ succū p'beant
194.10			407.33
Cerebri exornus, uersus nasi ra-			Ceria uel faui quomodo occidunt
dicem			709.5. 1195.50
115.32			Ceruicornu uis facultatē
Cerebri frigidi & humidū indi-			1220.
cia			Cervia totius substantiæ ex-
819.42			cremēta ad gignēda cornua
Cerebri frigidi & siccā indicia			transmittuntur
Ibid. 21			390.29
Cerebri frigidi indicia			Cerussa loræ facultas
918.33			121.7
Cerebri functiones propriæ que			Cerussa usua
dicantur			1152.14
736.28			Cessationū circa respirationē est
Cerebri humidū indicia			NN 3
818.52			
Cerebri intemperiem humidam			

oppositio unica, penes raritatem & densitatem 498.48	Chrysippi sectatorum discursus 332.27	Cibus refrigerato hepate in sanguine uerti uo potest 766.18
Cessationes inter respiranda breues & longæ, à quibus causis proficiantur 499.17	Chrysocollæ faciendæ ratio 1131.	Cibus suauior, facilius his qui ex æquo sunt salubres, cõcoquitur 383.27
Cessationum quilitati propria, raritas, densitas 499.36	Chrysocomes uis 1134.5	Cibus uerior eo dandus, quod lógus abserit status, & morbus clementior 615.4
Cenacorum caro 401.52	Q̃CIBARIA animalium naturis similia, cõgruunt seruandib. & periem naturalem: nõ seruandibus, contraria 404.22	Cadacrum usus in medicina 1143.16
Chelbani pars transit in sagapenum 1282.24	Cibaris epilepticis apta, qualia esse debeant 1006.40	Cicatricem inducentia medicamenta quæ 1059.14. 1159.5
Chelboni uires 1176.40	Ciberia pinguis & lenta, appetentiam euertunt 399.60	Cicatrici inducendæ siccantis desiderari 835.25
Chelbanum neruis punctis cõducit 1166.24	Cibi ad gignendos bonos humores, præstantiores qui 405.51	Cicet ad uenerem incitat 176.3
Chalcanthi facultas 1170.10	Cibi ætate qui sint admittendi 412.59	Cicera nigra calculos renum cõminuunt 376.8
Chalcinis crustas excitat 1170.2	Cibi austeri, acerbis, aut siccis natura, supprimunt alui excrementa 416.53	Cicerulæ uis Ibid.57
Chalcitis omniũ celeritatem fundit 1151.17	Cibi boni succi citra calorem, qui sint 1199.53	Ciceris agrestis facultas 1079.65
Chalcitis quas habeat uires 1115.59	Cibi cupiditas nunq̃ comital calidus intemperis 767.18	Ciceris facultas 409.50.416.8.
Chalcitis uita cuius sit 1115.59	Cibi cupiditatis causis 766.30	Cichori uis 1105.35
Chalcitatis 1220.10	Cibi cupiditatis causis 766.30	Cichorium ex genere cibariorũ 1257.18
Chamæcisios quam facultatem tenet 1115.35	Cibi cupiditatis causis 766.30	Cicuta cum modico uino & minime generoso sumpta ocyus perimit 1037.13
Chamædaphnes facultas 1077.	Cibi cur crassiores in cena dandi 881.29	Cicuta cur homines enecer, aut non sũt alar 1056.42.1172.9
Chamæx uis 1115.18	Cibi dulcis & crassi succi, quæ mala inducant 408.15	Cicure uis 1091.39
Chamæleou quas uires habeat Ibid.24	Cibi friabiles Ibid.24	Cicuta multitudine inducit 69.59
Chamæleuces facultas Ibid.12	Cibi in mediocritate cõsistetes omniũ cõmẽdantissimi 405.55	Cicuta sturno nutrimentũ existit 60.20. 1030.32
Chamædi facultates insignes 1031.41. 1071.16	Cibi instrumenta triplicia 177.	Ciliorũ productio & usus 369.21. 163.44
Chamæpytis quam uim tenet 1115.33	Cibi insuuias magna ex parte in causis, quominus nulli ipsũ conficiant 389.12	Cimices quã uim habeant 1141.
Chamæfyces uis Ibid.42	Cibi melancholicum succum gignentes qui 742.56	Cineris facultas 1109.53
Chamædrys quam uim habeat Ibid.8	Cibi omnes immodicè sumpti, morbos gignũt frigidos 661.31. 587.26	Cinnabari uires 1122.30
Chartæ cineris facultas 1100.11	Cibis admodum exquisitis non egent, qui ante cibum exerceri possunt 405.6	Cinnamomi facultas 1251.50.
Chetropa quæ dicant 415.21	Cibi tardè permeantes, posteriora sumendi, celeriter priores 382.22	1087.35. 1249.54
Chelidonij uis 1115.49	Cibo ingesto cur proni ad somnum reddamur 675.48	Cinnamomi optime uoræ 1282.
Cheme caput cochlearia duo 1292.10	Cibo tenuissimo quando uti cõuenit 916.43	Cinnara uel caccopha præ ui est fucci 383.62
Choa siue congius, sextarius sex capit 1291.54	Cibus diarrhæa diuturna cõstitibus accõmodus 370.47	Circæ facultas 1087.20
Cherades qd digerat 1070.16	Cibus durior, crassiorè gignit succum 401.40	Circuitibus quartanis tribus, unus idẽ homo potest simul corripì 614.3
Chenix caput coryli tres 1292.	Cibus exercitatio & inexercitatio accommodus 416.50	Circuitus minores qui dicuntur 115.57
Cholera morbus 686.1	Cibus multus quorupliciter dicatur 688.37	Circuitus perfectissimi q 615.61
Chondrillæ uis 1115.59	Cibus omnis immodicè excelsus, putrefit 685.18	Circuitus æquidans, tertianus, & quartanus quid 717.11
Chondri siue alicæ usus quibus debeat esse suspectus 372.40	Cibus omnia in sanguinem uersus, naturale auget calorem 60.2	Circuitus, uel periodus, typus uel ordo quid 809.8
Chondrus, nutrimentum optimum 1115.62	Cibus quibus est putrefactus, si ti cruciantur 685.19	Circuitum differentie 619.12
Chorion 306.13		Circuitum ordinem quæ peruerant 802.15
Choroidis tunicæ origo & colores 267.22		Circuli ad irim foci septẽ, quẽ seruent ordinem, & à quibus oriuntur 266.28
Choroidis tunicæ usus triplex 267.26. 258.23		Circulum ad irim primum quæ humor faciat Ibid.25
Christianorũ constantiũ summũ Galenus exprimit 314.56		Circulum secundum facit retiformis membrana Ibid.26
Christi doctrinam impiẽ iubens non Galenus 551.8		Circulum tertium efficit tunica choroides Ibid.27
Chironium ulcus & telephium quodnam sit 552.61		Circulus
Chrysippi de partibus animi opinio 327.51		
Chrysippi error duplex 555.11		

Circulus coniungens humores
oculi 265.57
Circulus quartus 266.28
Circulus quid 271.1
Circulus quintus unde 266.39
Circulus leptimus unde Ibi.31
Circulus sextus sponerosus
Cistula facultas 1087.25 (Ibi.30
Citragini uis 1095.44
Citræ cortex, concoctioni auxi-
liatur 286.26
Citræ facultas 1096.43
Citræ pars acida in aceto imbe-
cillum coniectum, reddit id
acrius 286.56
Citræ uel mûlum Mellei cõstat
tribus ex partibus Ibi.50
Citæ causæ: & quos maxime in-
festet 674.49
Citæ qui fiant 764.44
Citæ quid 479.27
C L A V I C L A R colligatio
294.21
Clauicula quæ dicant 286.49
Clauiculæ usus 291.58
Clematis quæ habet facultates
1088.2
Cleopatra post uictu Anioni
ne uisus duceret Romæ à Cæ-
sare, apide sibi mortem con-
suevit 1293.59
Climopodii facultas 1087.64
Clysmi dysenterici apti 1264.8
Clysmi euacuant quos, quæ in
hepatis finis hærent 1204.33
Clysmi fortes ualide reuellunt à
capite Ibi.30
Clysmos ex solo oleo aluo desi-
ciat cõmodissimos esse 470.
Clysmos non possit ad inte- (42
stina uentriculo proxima per-
uenire 869.34. 940.19
C N I C I agrestis uis 1073.10
Cnici facultas 1088.11
Cnicus pinitæ similis 1088.48
C N O A G V L I facultas 1129.32
Coaguli leporini facultates in-
signes Ibi.34
Coagulum omne dissoluit lac,
& sanguinem in uentre con-
cretum Ibi.40
Cocci cniidii facultas 1088.18
Coccum gnidum soluit pituita
1271.35
Coccygis ossis cõsideratio 135.
Coccyx, os qd sit 135.41 (49
Cochleæ crassi succi sunt 406.33
Cochleæ uisionis expertes, ad-
motæ uetri aqua inter cuiem
laborant, aut alius tumoribus,
eos deficiant 1140.46
Cochleariû caput drachmâ triâ,
scirpuli dimidiâ, grana duo,
& duas grani quintas 1291.
Cochlearum caro & suc- (12
cus ualutissimè defecit 1135.15

Cochlearum cineris facultas
Cochleariû uel lima- (1140.44
cum uires Ibi.37
Cochleoni permutatioes quæ
inducunt 639.14
Cõstum accuratè, propriè suc-
cum non feruat 388.6
Cõliacos quid iuuat 1068.23.
1089.19. 1136.66
Cõliacos qd conferat 1104.10
Ceruleus lapis quæ habeat uim
1222.54
Ceruleus, oculis optatissimus
est color 672.49
Cognitiouum sensibilibus omnes
differentiæ, in natura, exerci-
tatione & applicationis mo-
do consistunt 548.24
Cognitiouum similiû & dissimiliû
sufficit ad cuiusq; partem metho-
dicam constitutionè 154.58
Cohibito spiritus quatenus capi-
tis affectibus proficiat 1206.60
In coitu firmiter mancorum orga-
norum consuetudo 303.64
Coitus immodicus cur reddat
imbecilliores 114.22
Colatoria ossa ubi sedè habeant
118.26
Colem à spiritu attolli cõtingit
Coles 228.30 (779.25
Colicæ extremè qualis 770.10
Colicæ præsidia mitigant, est &
enatiuû & prognosticû Ibi.17
Colicæ remediû 732.10. 1132.19
Colicæ symptomata præceden-
tia quæ 732.43
Colica medicamina Androma-
cli 1162.54
Colici affectus ex cruditate re-
frigerationeq; gignunt 653.
64. 712.3
Colici à nepliriciis quomodo
distinguantur 769.59
Colici doloris, & eius qui ab im-
pacto lapide oritur, sunt com-
munia præsidia cõsuetudinis
732.26
Colicæ doloris, & orti à lapide,
signa diuersa Ibi.32
Colicia malagras Antipatri
Colis ulcus unde de- (1185.45
prehendi possit 778.35
Colla uel gluinis facultas 1088.5
Colli longitudo in uariis (32
animalibus uaria 250.48
Colligantia quæ sint 1058.55
Colligationes partium quibus
modis soluantur 691.4
Collisionis causæ 663.63
Colli spondylorum productiones
undecim 288.55
Colli spondyli primus, postero-
re productione caret, forami-
nibus obliquis 289.47
Colli uetere præmixta dux sunt

membrana, quæ reliquæ con-
stringuntur 114.44
Colli uetere quibus partibus
neruosi largiantur 250.55
Colli uetere præmixta cõstruuntur 114.4
Colli uetere musculi per (43
omnia similis est sedis muscu-
lo 181.63. 416.29
Colli uetere sitis 231.21. 305.2
Colli uetere spondyli quæ pors-
tionem ad uia nerui præbet 290.
Collum asperæ arteriæ gra- (18
tia factum 250.18
Collum cum pulmone semper &
nascitur & perit Ibi.20
Collum matricis 301.42
Collum non habentia animalia,
sunt muta 250.33
Collum quæ animalia habeant,
& quæ non Ibi.22
Collum septem constat spondy-
lis 286.17. 292.6
Collum uetere semine breuius
& laxius uisum 103.19
Collusio Asclepiadis ad mola-
rium dolores 1129.17
Collusio Critonis ad dentes mo-
tos & crotos 1230.8
Collusiones moderatè ex quib-
sunt 1236.34
Collusiones ualde astringentes
Ibi.38
Collyria leuigandi modus 181.7.
Collyria Libyana & cygni (40
quæ dicuntur Ibi.35
Collyriorum ex opio confectio-
rum facultas 991.2
Collyrium ad oculorum dolo-
res acerbissimos 1222.18
Collyrii diarrhodon Ibi.57
Collyrii ex malorum succis 1215.
Collyrii ex uino asperitudo- (18
nibus accedens 1217.58
Collyrium Paccianum 1229.12
Collyrii sicci ex phrygio lapi-
de, oculis addit robur 482.16
Collyrii tryphera dicti 1222.35
Colociniis facultatè quam ha-
beant 1088.39
Colon, insectum quintum 180.51
Colon suppuratur interdum in
tra bubones 777.46
Colophoniam duplex 1183.35
Color corporis quando exquisi-
tis sit humoris nota, qui sub-
sunt 458.4
Color corporis quot modis uti-
tari possit 766.46
Color cutis qualitatem humo-
rum subius puritatem indi-
cat 1189.16
Colores ad medicaminum uires di-
gnoscendas parè cõferunt 1091.
Colores medij uisum 673.9
Colores qui alijs sunt calidiores
1051.12

- Colores uisui q̄ conferat 673.3
Color flauus rubicundusq̄ 626.
Color in plenitudine hu- (60
mores indicat 991.41
Coloris rufi flauitq̄ discrimen
616.57
Color plūbens qd̄ indicet 458.
Colorū uicissitudines un- (10
de oriuntur 691.47
Color uiridis quō fiat 617.16
Columbz̄ carent fellis uesica
705.40
Columbz̄ turricolz̄, domesticis
sunt præstantiores 416.41
Columellæ inflammatz̄ curatio
1136.16
Columellæ laxare remedium
1134.51, 1138.5
Columella quando fit exciden-
da 950.16
Columella qd̄ 141.18, 1136.19
Columnarū processus 113.8
Comari fructus, *apocynus* 87.10
Combustorum nullum est frigi-
dum 1114.15
Comitiali morbo obnoxios qd̄
arguat 1117.16
Cominali obnoxios quid sanet
1067.19, 1105.50, 1138.17,
1141.30
Commentarios de usu partium
eū quosdam hymnos cōscrip-
sit Galenus 114.60
Commiscentur arteriæ, uenæ, &
nerui inter se toto in corpore
116.61
Commodi morbus 651.11
Cōmodum sequebatur in Italia
Galenus, dū M. Aurelius bel-
lum inferbat Germanis 650.
Cōmorbus quæ medicamen- (21
ta conueniant 1153.4
Cōmunitates euidentēs uisunt
17.15
Cōmunitatum magnitudo, re-
mediorum magnitudinē nō
indicat Ibid.15
Composita cognosci non pos-
sunt simplicibz̄, ignorantis 1018.
19, 513.12, 1153.16
Cōpositio auricularis, ex Apol-
lonij libra 1110.11
Cōpositio Menecratis squamas
decidere faciens, & corpora
attenuans 1126.64
Compositiones hepaticæ Ascle-
piadis 1157.10
Cōpositiōnes nephriticæ Ascle-
piadis 1167.16
Cōpositiōnis præuæ causæ 661.
Cōpositio uisum exacuens (46
Phloxeni 1111.40
Compositū semper simplicibus
posterius 490.11, 1181.17
Comprehensio integra quomo-
do fiat 196.13
Conceptionis ratio 81.40,
105.11, & 111, 107.18
Concertatio pulcherrima quæ
dicatur 413.54
Cōcha capit mystra duo 1192.6
Concidenntæ thoracis & eiusdē
demissionis discrimen 499.3
Concipi aliquid perfectū sine al-
terius miscella nequit 117.14
Concipiendi instrumēta 196.13
Cōcocta immodicē primō falsa,
deinde amara reddunt 79.55
Concoctio & cruditas ex pro-
prijs cognoscuntur excretio-
nibus 19.45, 618.5
Cōctionem nō sustinet myrrha,
nec thūs, nec aloē 1158.12
Cōcoctiones quid indicet 19.53
Cōcoctiones sunt expendeendæ
in cognoscendis præsentibz̄, &
futuris crisiibus 638.1
Concoctioni ciborum magno-
pere propiciendum in singu-
lis febribus 912.1
Concoctioni quæ cōferant 10,
41, 81.11, 451.11
Concoctionis absolute imbecil-
itatis signa 499.12, 61.84
Cōcoctionis bonæ & malæ cau-
sa 119.43
Cōcoctionis indicia, quocūq̄ tē-
pore apparēt, salutaria 614.17
Concoctionum organa & succel-
siones 408.64
Concoctionis signa 617.40
Cōcoctiōis tarditas uis 684.17
Concoctionis uisiorū causa cō-
munis quæ 681.55
Concoctionis uisiosæ causæ ex-
tra uentriculum lesum, quæ
Concoctionis uitium (694.8
contingit bifariam 683.11
Cōcoctiōis uitii quid ibi.48
Concoctio quæ fit ab iunato ca-
lore, ab externo calido iuuat
1014.3
Concoctio quid sit 83.11, 640.
49, 683.41, 691.16
Cōcoctio requirit temporis diu-
turnitatem 116.48
Concoctio triplex 408.15
Concoctio uentriculi uisat fe-
bribus 79.16
Concoctū facilia, faciliē corrum-
puntur 168.15
Concoquendū aliquid quomo-
do in nobis sit 1055.11
Cōcrescentia in glaciē facilis,
tēperamenti sunt frigidioris,
si utrobiz̄ eadem cōsistentia
infit 1016.19
Concussio quomodo corpori
accidat 680.60
Condensantia quæ 1058.15
Condensare, frigidū est propriū
1040.16
Cōdimentā coquorū plus inter-
dum obfunt q̄ profunt 189.17
Condimentorum genera uaria
191.19
Condimentorū usus 1046.56
Condimentum simplex ex qui-
bus conficit 1007.9
Condita sale, quam habent fa-
cultatem 404.11
Cōditoria magnifica cōmenda-
tio 116.14
Cōditoris artē splendescere etiam
in utilitate materiæ 115.14
Cōdylus in osibus quid 96.15
Confectio ad omnes sanguinis
resectiones 1146.9
Confectio dicta iucunda Ibid.3
Cōfectio ex fructibus Aldephi-
dis, uentriculi subuersioni, cœ-
liacis & dysentericis conue-
niens 1150.45
Confectiones Romachicæ An-
dromachi 1149.16
Confectio sedans dolorē & ual-
ens ad tormina & dysente-
rias 1145.61
Confluxio in toto corpore est
una 564.32
Coniectura artis medicæ in affe-
ctui cognitione cōsistit 1203.
Coniuncturas 1091.21 (46
Cōnexio ad maximū circulum
runissima omnium quæ circa ro-
tunda corpora fiunt 165.48
Cōnexiones in exquisitē rotam
dis fallaces, quam in pla-
nioribus 1168.18
Cōlectio animarū mortui præ-
cedat eam, quæ administratur
in uiuo 191.30
Consensus & discrepantiæ qua-
litarum in suis rebus uniuersis
1010.15
Cōsequentiæ quæ dicant 11.33
Conseruatrix medicinz paratri-
plex 161.16
Consiliū in ulceribus planis du-
cendis ad cicatricem quod
1059.11
Consistentiæ humidioris omnia
corpori dant exigui alimēti
duræ uerō & terrestris, copio-
sum, & qd̄ ægrē absumat 176.
Consistentia quid 111.41 (19
Consistentia quæ sunt humida,
a quibus utiliter fumantrur
179.17
Constipationes meatuum a qui-
bus humoribus fiunt 801.7
Constipationis causa 613
Constipatio qua ratione febri-
gignat 616.6, 889.64
Cōstitutio corporis optima quæ
fit 66.16, 67.16
Constitutio membri in quo con-
sistat 487.61
Constitu-

Cōstitutio animalium ex dispari elementorū miscella 39.40
 Confuetudine mollescit animæ irritabilitas 332.11
 Confuetudini esse aliquid condonandum 616.14
 Confuetudinis exercitiorū habenda est ratio 466.61
 Confuetudo ad dyspathiā haud exigua nīm habet 427.59
 Confuetudo ad inuentionē remediōrū, & ad sanitatē tuendam plurimū potest 903.30
 Confuetudo est signū naturalis cuiusdam proprietatis, atque etiam causa interdū 427.22
 Confuetudo non secus ac proprium temperamentum seruanda 896.13
 Confuetudo plurimū potest ad nauatūdis indicationē 964.27
 Cōfuetudo quātrū ad morū bonitatē uel prauitatē posuit 72.
 Cōfuetudo quomodo cui- (64
 raous rationē indicet 903.37
 Confuetudo reddit iucundum optimū uitæ genus 423.57
 Confuetudo uelut acquisita natura 49.31, 1036.63
 Contemplatio rationalis ad inuentionem necessaria 359.12
 Contenus sua sorte omni caret tristitia 426.8
 Continens qui dicatur 329.43
 Continentia ad modestiam una est uia 424.3
 Continentius uiuendam hodie quā heri 423.43
 Continuare q̄ soluant 1203.33
 Contractio arteriæ habet quatuor pulsuum genera 587.37
 Contractio arteriæ qualiter discernenda 541.23
 Contractio arteriarū in quibus conspicua sit pulsus, & in quibus obscura 540.14
 Contractio arteriarum excernitur fuligo 606.13
 Cōtractionis arteriæ usus 351.
 Contractiois & distentionis usus 591.41
 Contractiois in arteriis celeritas, magnam nīm excrementi fuliginosū indicat 587.50
 Contractio tanquā actio instrumētū animæ 95.57 (20.7
 Contraria à foliis cōtrarijs tolli
 Contraria cōtrarijs remedia 25.16, 350.46, 471.7, 504.52, 919.34, 961.4, 986.53
 Contraria maximē sub eodem genere continentur 843.21
 Cōtraria quorū dicantur esse 919.53, 2254.58
 Contrarietas qualiter indicanda 58.51

Cōtrariorū exhibitio quā rerū cognitionē requirat 903.20
 Contrariorum persæpe una est demig causa 427.45
 Cōtrario una est scititia 359.42
 Cōtrouersia undenaſcat 534.30
 Contumeliæ ac calumniæ æquo animo ferendæ 421.11
 Contusio quid 22.58, 856.44
 Contusio unde accidat 931.39
 Conualescentes atq; senes reficiendi ratio 839.60
 Conualescentibus modicus ci-
 bus præbetur 19.44
 Conualescentium & senum dispositio qualis 839.55
 Conualescentium uictus ratio 883.45
 Conueniens cuiq; dupliciter dicitur: secundū qualitates, aut secundū substantiā 474.54
 Conus 271.7
 Conuulsio 22.54
 Conuulsio à siccitate orta, incurabilis est 716.19
 Conuulsio & tremor in folijs cōtingit neruis 517.40
 Conuulsio fit ob repletionem si mul & inanitionem 1251.44
 Cōuulsio in neruis cōsistit 661.
 Cōuulsiones epileptiæ quib; obremſiant in affectibus per consensum 745.25
 Conuulsiones quæ curari possint & quæ minus 933.42
 Conuulsio nis ab humorum copia ant inflammatione orta, curatio 716.21
 Cōuulsiones epilepticorum causa 745.32
 Cōuulsiones omnis causæ 776.47, 740.31, 733.28
 Conuulsio organorum spermaticorum ad ieminis excretionem conducit 301.62
 Conuulsio quid 715.61, 856.42
 Conuulsio quo differat à naturali motu 740.18
 Conuulsio tensiones quādo comitemur 792.21
 Conyze utriusq; facultas 1088.
 Cor ad pulsū motū cerebro non eget 324.3
 Cor agere haud cessat citra maximam temperiem 1016.41
 Cor a animalibus inditū uelut focus ignis 223.55
 Cor animosæ facultatis initium 184.45, 239.50
 Cor à qua uena alatur 239.25
 Cor arteriarū omnīū origo 141.10, 148.53, 309.47, 327.58, 506.22, 696.60, 45.23, 199.16, 805.54
 Cor arterijs nīm pulsantem supeditat 240.56, 888.42

Cor calidissīma corporis particula 251.15
 Cor caloris naturalis fons 234.20, 251.51
 Cor cerebro cōnectitur per tria uasorum genera 323.53
 Cor cōnectit hepatis, uinculo calix uenæ 601.54
 Cor cōnectit septo transuerso ibi.
 Cor cum arterijs perpetuū (58
 pulsū 52.57, 74.54, 321.46
 Corde affectio necessariū afficitur arteriæ 594.54
 Cordi & hepatis ex sexta coniugatione nerni synceri tributi sunt 322.50
 Cordi inest os cartilagineū 185.18, 239.51
 Cordi insunt quatuor tantū ora uasorum 339.51
 Cordi interdū insunt uaria temperamenta 596.21
 Cor diatarum trahit, contractū inanitur 321.59
 Cordi nō insunt tres sinus 185.5
 Corde nudato & contuso, (19
 nulla uolūtaria actio animal impeditur 322.46
 Cordi nunq; oboriunt tumores pulsū durū efficiētes 600.21
 Cordis affectū symptomata 327.46
 Cordis aures q̄ uocentur 184.4
 Cordis auricularum numerus
 Cordis auriculis incō- (ibi.55
 bentium membranarū numerus & figura Ibid.59
 Cordis aurium substantia 328.2
 Cordis aurij utilitas 184.48.
 Cordis calidi & humidi (327.55
 di indicia 821.46
 Cordis calidi & siccī indicia 821.35
 Cordis calidi indicia 820.43
 Cordis calor duplex 595.35
 Cordis calor unde minor atque maior reddatur 990.18
 Cordis caro calidior uniuersis corporis partibus 48.21
 Cordis caro qualis 324.38 (3
 Cordis cōtractionē q̄ uiuēt 325.
 Cordis cōtractio q̄ fit 214.60
 Cordis corpore inuaso à frigido tate, mors declinari nō potest
 Cordis cum pulmone (590.30
 cōmētum 235.34
 Cordis dilatatio q̄ fit 214.56
 Cordis & arteriarū motus non est uolūtarius 348.35, 184.10
 Cordis & hepatis generatio 109.12
 Cordis & musculi discernē 93.
 Cordis facultas quæ 591.39 (40
 Cordis figura 24.1 (cia 821.63
 Cordis frigidi & humidi indicia
 Cordis frigidi & siccī indicia 821.3

Cordis frigidi indicia 821.12	Cordis uterq; sinus pulsat 186.	Cornuum matricis situs & usus 302.42
Cordis fuliginem expelli in fystole per laeues & magnam arteriam 243.10	Cordis vultus quando ita- (18) tim perimat 759.64	Coronae 207.42
Cordi generando unde materia 122.36. & 59	Cor eger et alio tempore alimēto q̄ sit spiritus 239.18	Coronalis futura quae 132.25
Cordis humidi indicia 821.30	Cor est principii compositi articularum morus 508.28	Coronalis vena 141.12
Cordis intemperiei comes est facultatis imbecillitas 589.36	Cor est siccus atq; calidius hepate 541.47	Coronopodis facultas 1089.19
Cordis interperies protinus ceteris partibus comunicatur 589.36	Cor excicare quae possint 600.1	Cor ortu primo, multū seminis magnitudinis 78.14
Cordis interperies est 590.44	Cor frigidissimū calidius cerebro calidissimo 820.39	Corpora ab initio pessime constituta, non penesunt ad senectutē, aut aliquo tempore morbo tenentur 477.43
Cordis morbi unde cognoscantur 817.11	Cor laurit spiritū a pulmone per arteriam venosam 318.28	Corpora agrotitia a ceteris distinguuntur sensibilibus operationum lationibus 816.16
Cordis motus a natura 243.59	Cor humidus, hepatis siccitate non potest ad habitū contrarium perducere 822.44	Corpora calida humidaque scelerissime alimentū sibi assimilant 691.42
Cordis motus duplex 328.7	Coriandri facultas 1089.8	Corpora causis morbis faciliē corrumpuntur 781.
Cordis officia quatuor 236.50	Coria vetera usita quibus affectibus conferant 1138.44	Corpora dissipata facilia & difficilia quae 903.40
Cordis osis inveniendi ratio 185.35	Cor incalecens refrigeraturum qualem edat spiritum 760.18	Corpora ex quacūq; occasione calida, dulcia in bile mutantur 80.
Cordis partes 234.4. 239.53	Cor in diafole spiritum trahit, in fystole pellit 243.55	Corpora frigida & sicca cetera leuiter senescunt 472.4
Cordis osis usus 185.27	Cor innati caloris origo 758.65	Corpora humana quatuor elementorum cōmixtione cōstant 66.20
Cordis primarij affectus 759.43	Cor in utero accipit spiritum a magna arteria 240.10	Corpora humida & calida fluxionū vitio obnoxia sunt 472.
Cordis quies qñ fiat 234.64	Cor in utero accipit spiritum a magna arteria 240.10	Corpora imbecilla cur ubi incidere in morbos, faciliē restituantur 589.60
Cordis siccit indicia 811.23	Cor laborans inaequali temperie, pulsus uniuersos variē inaequales efficit 596.56	Corpora impura, quō magis trita, eō magis laedunt 439.26
Cordis sinist' sinus perpetuō mouetur 64.3	Cor mouet perpetuō citra voluntatis imperium 93.42	Corpora imbecilla cur, quib; alimentis reducuntur ad mediocritatem 369.60
Cordis sinist' uentriculus 234.	Cor mouet eatenus, quatenus a particulis suis excitat ad motum 591.50	Corpora magna aut parua quae dicantur 531.60
Cordis sinist' uentriculus (25) longē maiorem habet calorē ceteris partibus 507.44	Cor mouetur perpetuō, & quare 109.15	Corpora molliora imbecillioribus indigent medicamentis 1155.58. 1161.17. 1186.63. 1189.9
Cordis sinist' uentriculus, recte praeulum spiritus est 64.1. 183.46	Corneae tunicae etiae, quae medicamenta cōgruant 1217.14	Corpora quae sint duriter (18) aut mollior fricilla 440.44
Cordis sinistra pars cur sit transversior ac durior dextra 238.42	Corneae tunicae usus 268.30	Corpora secundū naturā se habentia, seruanda: alterāda autē quae morbo premant 432.30
Cordis sinist' uentriculi officia duo 234.26	Cornea tunica 254.6	Corpora sicca & frigida cur nutriantur infelicissimē 691.50
Cordis situs & positiō 321.48	Cor nec musculus est, nec eger nervis ad obeundas functiones 184.26	Corpora sicca salia, coriis sunt similia 404.1
Cordis structura inspirantibus aërem omnib; eadem 185.44	Cor neq; respirationis neq; uocis principium 323.3	Corpora similia a se mutuo nullā mutationē accipiūt 1027.57
Cordis substantia ac cibus qualis 395.24. 407.8	Cor nō protinus per fauces, sed ex pulmone trahit spiritum 232.17	Corpora solida dum arefcūt, ci-bus sanant 808.24
Cordis substantia permixtū differt musculo 184.8	Corneae deusta dentes reddunt splendidos 1122.41 (35)	Corpora uisiosis succis redundantia, faciliē succumbūt causis morbis 66.42
Cordis temperies & interperies ex quatuor consistatur elementis 584.10	Corneae siue uteri apices qd 103	Corpora uisiosa cōstant cōmixtione quatuor elementorum 89.
Cordis temperies necessaria est cerebro & hepati 759.6	Cor nullam fortitur actionē animalem 239.48	Corpora uisiosa cōstant materia & temperie 69.12
Cordis duo uentriculi 232.44.	Cornus cuius sit facultatis 1089.42	Corpori lassato cui sanguis bonus quidem exiguus sit, erudi autem
Cordis uasa oriūtur ab illius basi aliarum partium principalissima 234.2	Cornu cuius sit facultatis 1089.42	
Cordis uasa quae maiora minorāq; 239.7	Cornu taurini uis 1274.44	
Cordis uentriculus dexter, pulmonis gratia cōditus 235.20.	Cornu ceruinorum et caprinorum uis 1136.64. 1274.47	
Cordis uentriculus dexter (236.54) xer pulsat, cui uena a iecore inserta est 340.43		
Cordis uentriculus tertius nullam est 147.21		
Cordis uentriculus uterq; pulsare uidetur 238.33		

autem humores plurimi, quæ
medicis ratio adhibenda 459.18
Corporis constitutio optima
quæ dicitur 432.1
Corporis constitutio salubris a-
ctiua ex natura habet illu-
Corporis cõstitutio (sæ 24.55
triplex 478.53
Corporis humani diuisio 61.11
Corporis nostri compositio tri-
plex 617.15
Corporis quilibet species nõ in-
tellectricis animæ capax 69.19
Corporis salubris status habet
latitudinem 476.33
Corporis status inæquales trifi-
riam sunt 478.51
Corporis structura, quæ deside-
ret 882.1
Corporum differentie 410.64
Corporum dispositiones disti-
miles 785.63
Corporũ humidũ natura 157.
Corporũ status uisioũ, sunt (60
duplices genere 472.55
Corporum cõtium septem op-
positiones 516.1
Corporũ uicinorũ qualitates in
se mutuo agunt 1172.11
Cor posterioris hepate formatur
122.56, 123.59
Cor primũ moueri incipit, & ul-
timũ cessat 314.15
Cor, principium motus arteriæ
Corpulenta ex sangui (114.45
nis fit copia 49.11
Corpulenti qui 49.27
Cor pulmonalis alimentũ præpa-
rat 219.21
Cor pulmonalis cõsistens quales
efficit pulsus 600.51
Cor pulmonis per læues arterias
colligatum 242.36
Cor, pulsans uiscus 182.52
Corpus alteratũ uicissariũ quæ
sunt 829.42
Corpus bono habitu quodnam
sit dicendum 364.19
Corpus cõtra pestilentem auri
qua ratione præseruari de-
beat 784.4
Corpus dnrũ simpliciter 536.5
Corpus exquisitè mediũ, deter-
minus excedentib. mediocrita-
tem, sed secundũ aliqd 67.18
Corpus ex se duplici ratione cõ-
sumitur 430.16
Corpus frigidũ & humidũ nul-
lum in ætate reperitur natu-
raliter 692.32
Corpus habetia compellũ, mul-
ti sunt nutrimenti 379.1
Corpus humanum ex accidenti
medicæ & philosophicæ di-
citur subiectum 32.50
Corpus magnũ uideat 67.25

Corpus moderato durius, firmi-
us aduersus externas causas
66.64, 67.1, 427.58
Corpus moderato mollius, fir-
mius aduersus causas internas
Corpus nõ rarefacien- (66.64
dum inteq̃ uacuetur 917.53
Corpus nostrũ constituunt, cõ-
tinentia, contenta, & quæ im-
petu feruntur 711.46
Corpus nullum missione caret
Corpus optimæ cou- (1116.47
stitutionis, quare minus mor-
bis succumbat 66.33
Corpus optimè constitutum ad
custodiam sui desiderat om-
nium excessũ mediũ 465.26
Corpus optimè temperatum in
regionibus intemperatis nõ
gignitur 441.56
Corpus optimũ quando auge-
scit nõ frigida laudũ 449.12
Corpus parũ unde 67.26
Corpus qui dicat quiescere, &
qui moueri 71.31
Corpus rarũ ac molle faciliẽ ob
extrinsecis iniurijs afficitur
427.57, 67.7
Corpus salubre 66.5, 359.48
Corpus sanũ qñ dicitur 350.10
Corpus sanum secundum habi-
tum quodnam dicat 364.16
Corpus sanũ sibi suapte natura
omnia congruenta inuenit
441.43
Corpus secundũ affectionẽ sanũ
quodnam dicatur 364.12
Corpus senile frigidũ & siccũ so-
lidis partibus, colligere tamẽ
in se piruiosa & serosa excre-
menta, quæ purganda sunt
Corpus simile nullũ (469.55
est uacuum aut plenu 535.24
Corpus totũ transpirabile 487.
43, 840.57, 1015.14
Corpus uirilẽ optimè ad perspi-
randum comparatũ 567.30
Corpus uniuersum esse sibi tran-
spirabile & fluxile 507.26
Corpus uniuersum non ex una
particula iudicandum 52.26
Cor quando pulset 113.48
Cor quo formel tẽpore 123.38
Correctionis differentia in quo
uerferet 360.60
Cor respirandi instrumẽtũ 332.13
Corrupta uacuanda, cruda co-
quenda 456.40
Corruptelæ ac interitus duplex
nobis inest necessitas 429.42
Corruptelæ fumosæ acidæ, &
quibus cibis gignant 684.19
Corruptelam ciborum quæ se-
quantur 667.18
Corruptionis ciborum tres dif-
ferentie 725.57

Corruptionis modi diuersi
1099.11
Corruptionis necessitas unde
nobis accidat 475.48
Corruptio quis motus 77.45
Corruptum omne, alienũ & na-
tura est 901.51
Cor fortitur fibrarũ omnia ge-
nera 214.42
Cor inspiratione priuatum, moue-
ri cessat 115.9
Cor uiuendi principii 113.24
Cor unde nutrit 89.9 (195.45
Corydalis herbe uires 1141.22
Coryzæ uel grauedinis causa
quæ 693.1
Coryzæ laborantibus nigella o-
leo intrita sternutamenta mo-
uet 119.56
Costæ omnes uertebreis dorũ al-
ligantur duplici nodo 187.2
Costæ primæ minimæ 291.42
Costæ ueræ septem 136.1
Costæ utring duodecim 115.62
Costarum latro 183.50
Costarum omnium sedes duplex
186.32
Costarum septem priores cum
pectoris ossẽ coarctari 186.60
Costarũ singulũ in propinquo
est arteria, uena, & neruus
187.47
Costarũ spirariũ, omni pectoris
nõ cõmitti, sed desinere in car-
tilaginem 174.20, 249.13
Costarũ uerarũ sunt septẽ, men-
dosarũ quinque 249.20, 136.1,
186.43
Costas reuellẽtes musculi 173.12
Costi faciles 1089.12
Costis Naxiæ ramentũ quæ uim
babet 1118.17
Coruines uiscunt helleboro
Corys siue hemina ca- (380.11
pit quartarios duos 1191.59
Coryle continet oxybapha qua-
tuor 1292.42
Coryledones siue acerabula fe-
cidũ ad utrũ uinculũ 105.47
Coryle quid 131.60
Coxæ articulum qui musculis
flectat 158.10
Coxarum articularis duplex inest
ligamentum 160.51
Coxendicæ laborantibus quid
subueniat 1115.16
C R A N I I fracturæ admodũ ex-
porrectæ & longæ, nõ sunt pfe-
quendæ ad finẽ usq̃ 879.36
Cranij productio 109.32
Cranio forato, dura mēbrana ce-
rebrũ quibus medicamentis gau-
deat 879.53
Cranio fracto cõmodè instillat
rosacẽ tepens in meningem
crassam 1201.52

Cranio fracto, quid præcipue curandum 251.18	Cruris imperfecta quæ 657.38.	ter pedestria omnia 307.63
Cranio inesse carnes sensiles p quos fuliginosa excernantur 258.3	641.18	Crura gracilia picanda & curis extarcenda 467.39
Cranium crassum, rarum & canernofum Ibid.32	Cruris in idem tempus debet eol re cum accessione 640.9	Crura in folis hominibus ad rectam lineam subtendunt spi-ne 210.7
Cranii cur ex pluribus ossibus constat 264.20	Cruris in primis quatuor diebus accessuræ exemplum 628.32	Crura phlegmone obfesa quomodo curentur 936.14
Cranium immobile, seu murus cerebri 249.29	Cruris mala quæ 657.37.642.19	Cure altero affecto, reliquæ est scarificandum 915.4
Craisi intestini usus 224.32	Cruris non bona quæ uocetur 641.29	Curuli anatomica administratio 156.60
Crasiora in utero hærent 402.21	Cruris per abusum quæ Ibid.20	Cruris flexio extensio quando accidunt 308.27
Craisis cur pulsus exiguus addit 541.46	Cruris per excellentiam quæ dicitur 617.34	Cruris uenæ 146.44
Crassum omne, alteratur difficultus 61.56. 797.35	Cruris perfecta quid 641.27	Crurum actiones quæ 308.33
Cranioconi facultas 1090.7	Cruris quidam futura sit septimo die 611.5	Crurum, manuum, & temporum musculi & motus 94.14
Craia quid 118.16	Cruris quando rura contingat 618.14	Crus, organum ambulationis 210.40
Crescentia plurimū habet innati calidi 569.51	Cruris quid 607.36. 610.39. 614.38	Crustarum uis 402.28
Cretini facultas 1090.10	Cruris quo morbi tempore fiat 641.31	Crustis non conueniunt astrigentia 2357.39
Crimini facultas Ibid.21	Cruris salutaris ne fit an perniciofa unde cognoscat 619.44	CrySTALLINUS à uitreo nutritur 267.7
Crises morborum à natura fieri 120.26	Cruris simpliciter quæ sit sola uocanda 617.43	CrySTALLINUS humor cur non factus sit omnino sphericus 268.14
Crises optimæ quando fiant, & quæ 620.1. 640.33. 642.63. 642.2	Cruris ut moriatur quispiā, non necessaria 641.54	CrySTALLINUS humor cur rotundus simul & oblongus 172.7
Crises quādo accidunt 1003.59	Cruris ut rit prælagiri possit quæ consideranda 613.14	CrySTALLINUS humor, principalissimū uisus instrumentum 252.43. 265.3. 842.62. 847.9
Crises repentine uolentæ & calidarum febrium sunt 615.62	Croci facultas 1090.55. 1219.47. 1251.52. 1262.51	CrySTALLINUS qualis 265.9
Crises singulis diebus accidere 607.39	Croci odor ferit caput 2203.15. 1205.26	CrySTALLINUS uelut in uitreo, ueluti sphaera semiesecta in aqua 265.52
Crissi futuræ præcognoscendæ quæ requiruntur 619.1	Croci optimi notæ 2282.59	CVBIFORMA OS 216.55
Crissim cito & rardius futuram quæ indicent 619.7	Crocodilij feminis facultas 1090.47	Cubiti consideratio 156.60
Crissim habentes post præcedentes concoctiones nō intereunt 618.5	Crocomagmaris præparatio 1284.39	Cubiti externorum musculorū dissectio 153.18
Crissim morbi cū excretionē qui pulsus indicent 605.52	Cruda cōcoqui à somno & quiete 456.43	Cubiti musculus 94.20
Crissim omnem præcedit difficultas tolerantia 969.9	Cruditas acida non cōstringit in biliofa, nisi admodū rarōneque accendit diarsia 894.41	Cubiti processus duo 157.3
Crissim præuenientia symptomata 617.47	Cruditas acida non excitat halitum humidum Ibid.48	Cubiti uenarum consideratio 243.63
Crissim quando rentabit natura 642.57	Cruditas causa est morborū ex quibus humoribus ortorum 413.29	Cubio inest colūaris processus 157.14
Crissim triplicis quantitatē quæ ratione prædixerit Galenus Eudemo 647.4	Cruditas quæ sit alijs deterior 413.29	Cubitus quid 156.60. 202.62
Crissim absolutæ quæ dicatur 610.31. 610.23	Cruditas quid 681.46 (415.32)	Cubitus siue ulna 202.60
Crissim absque certamine non fir 641.58	Cruditas quid significet 628.29	Cucumeres, pepones, melopepones, si non celeriter perficiantur ac digerentur, in saccum letalibus uentris similes conuertuntur 410.14
Crissim bonæ & instantis indicia quæ 618.19	Cruditatē patientium, quinam facili in febres incidunt, & qui ægrè 782.39	Cucumerum facultas 380.4. 1106.7
Crissim celeritatem concoctio indicat 618.28	Cruditates nullū necessariū symptomata sequitur 694.18	Cucurbitæ semen quomodo resonatur in hyemem 179.2
Crissim dies ex ipso motu inueniuntur 640.2	Cruditates quid indicent 29.55	Cucurbitæ uel colocynthis facultas 208.35
Crissim, dum irritatur, præuenit decretorium diem 650.40	Cruditatib. qui potus cibique congruant 419.9	Cucurbitæ uis & facultas 179.20. 410.16. 1000.27
Crissim futuræ per abscessus quæ signa sint 644.55 (42)	Cruditati quæ sorbitio commoda 418.56	Cucurbita summe ceruici affixa, reuellit à naribus sanguinem 167.22
Crissim hora potest dignosci 612.	Cruditatis causæ 764.50	
	Cruditatum differentie 895.6	
	Crudum simpliciter quodnam sit 623.36	
	Crura duo soli homini data in-	

INDEX.

Cucurbita uſta, præparatæ ulceribus congruit 1066.63
Cucurbitula admota, dolorẽ à ſolo ſtarna exciratum ſoluit 933.12
Cucurbitula ceruici admota, capiti ſedat dolores 997.63
Cucurbitula cur inuenta 940.43
Cucurbitulæ cur ad mîſas affigantur Ibid.62
Cucurbitulæ diuerſis parribus admotæ, quas fluxiones reuelant 941.6
Cucurbitulæ quando affigendæ occipiti 1105.13
Cucurbitulæ ſanguinem à parte reuellat, atq; ad ipſam, ſi fit opus, attrahunt 941.2
Cucurbitulæ ſiue ſcarificatione adhibiti, excitant calorem 738.15
Cucurbitula ſtatui diſcutiendo eſt idonea 946.26
Cucurbitula hypochondrijs affixa, ſanguinis ad nares impetu reuocatur, immodicũq; ex utero effluſum 1000.1
Cucurbitula quando utendum 940.51. 941.8. 1000.14. & 24
Cucurbitulas ad mouendas eſſe dolenti uentriculo monent Archigenes 1133.15
Cucurbitula umbilico admota, uentris dolores ſedat 978.19
Cucurbitulis ſiue capitis affectibus, quando utendum 1106.56
Cucurbitulis utendũ in affectibus alie ſitis 118.62
Cumini facultas 1091.44
Cupiditas inexhauſta, unica omnino meroris atque triſtitiæ cauſa 435.12
Cupreſi facultas 1091.53
Curando ruto tria ſunt animaduertenda 950.33
Curatio corporis uniuerſi redundancia melancholico ſanguine 742.35.
743.18
Curatio epilepiæ tertiz ſpeciei 745.20
Curationem quæ indicent 1188.41
Curationes 5.60
Curationi quæ ſufficiant 16.47
Curationis adoleſcentis ualido morbo correpti exemplum 616.1
Curationis ſcopus 833.11.
914.35
Curationis totius ſumma in quibus fit ſita 1005.41

Curatio partium leſarum à uenenatis beſtijs 745.15
Curatio per cõtraria molienda eſt 736.50
Curatio pro partium diſcrimine uariatur 946.2
Curatio morbos neceſſaria eſt corporis naturæ cognitio 840.51
Currentium per acclina, declina & plana, conſideratio 318.64
Curſus nimius, extenuat corporis habitum 167.19
Cuſtodia ſit per ſimilia 915.14
Curem quæ deſent 957.2
Cuius circa oculos motus, conſert aperiendis ac claudendis oculis 277.52
Cutis denſa quomodo relaxanda 414.12
Cutis frigida & humida quibus ſit 53.6
Cutis gignendæ ratio 853.17
Cutis hominis temperatiſſimi eſt regula, ſecundum quã omnia diiudicantur 1032.43
Cutis in regione temperata, ſimilium partũ ſubiectionis naturam prodit 52.64
Cutis laceræ in abſceſſibus medicario 981.16
Cutis laxa qua ratione ſananda 434.19
Cutis media, qualis nam eſſe debeat 44.57
Cutis omniũ imbecillima pars 662.52
Cutis operimentum commune omnibus 150.47
Cutis pedi qualis ſubdita 114.55
Cutis quare producta 121.53
Cutis quatenus denſanda 415.2
Cutis ſicca, ſimilis terræ ſtatui ineunte æſtate 50.35
Cutis ſiccitas ad generandos pilos idonea Ibid.50
Cutis ſimilis ei quæ perijt, reſtitui non poteſt 853.14
Cutis ſuilla quem ſuccum præſtat 407.29
Cutis ſummus affectus, qualia re media poſtulent 28.37
Cutis ſuperat ſpiciſitudine omnia ſubditas partes 734.10
Cutis, tactus eſt inſtrumentum 44.37
Curiſtorius animalis 279.9
Cutis uolæ manus in homine temperato eſt extremorũ media 44.33.
45.57
CYATHVS capit cochlearia decem 1195.45

Cyathus capit conchas duas Ibid.4
Cyboceides os 159.7
Cycliſcorũ uſum in magnis fracturis capitis quidò probet Galenus 879.5
Cydonia & punica mæla edenda ſunt in alnibus 684.14
Cydoniæ mæli cũ ſcimonio præparatio ad ſolendam aluum 370.26
Cydoniorũ & ſtruthorũ ſuccũ aſſeruandi ratio 1096.19
Cydoniorũ ſtruthomelorumq; ſuccus diu aſſeruat cum melle coctus, firmiſſimè exoluti uſu tricul robur 384.29
Cyprĩ facultas 1092.7
Cyriũ facultas 1092.16
D
DAMON muſicus 134.64
Daphnes herbe uires 1077.15
Dauci ſemen quam habeat facultatem Ibid.2
DECIDENTIÆ tres motus 95.50
Declinatio ſit præter uoluntatem 95.44
Decimiſeptimi ordo, altero qui à decimo octauo ſit, lougè ſentior exiſtit 614.27
Decimusſeptimus index eſt uigeſimi & uigeſimiprimi, magis tamen uigeſimi 613.11
Declinatio in pleuride quidò adſit 619.39
Declinationis morbi argumenta 612.34
Declinationis optimæ, qui pulſus 642.6
Declinationis tempus quod 614.43
Declinatio quid 612.26.
717.10
Decocta omnia propriam qualitatẽ in aquã tranſmutant 401.53
Decoctionum omniũ, quando equiquit, ſemper ſalius euadit Ibid.46
Decretoria tempora tria 610.5
Decretoriorum proportio ſemper eſt ſeruanda 615.45
Decubitus in alterum latus commendatur 100.15
Decubitus ſupinus damna, & cur 100.12
Deſicere ab optima conſtitutione, tribus de cauſis contingit 466.9
Deſicere omnia uelle, ad ſophiſticam pertinet diſciplinam 538.11
Deſinitio duplex, ſubſtantialis & notionalis 813.23
OO

Definitio essentialis quid 517.	Deliqui animi ob sudores, cu- ratio 966.3	Dentes incisori plures duplo sunt canina 274.60
7. 336.40	Deliquium animi patientes ex fame insigni, quomodo reuo- centur 1253.18	Dentes inferiores superiori- bus per omnia aequabiles 274.41
Definitiones ex fine constitutae, nō exiguae pariunt ambigui- tates 359.34	Deliquium animi quae induce- re possint 965.13	Dentes interdum inflammatio- ni simile quiddam perpetuan- tur 1227.32
Definitiones sunt rerum nō nō minum 530.64	Delirantium spiritus magnus simul & rarus 497.4	Dentes in utraque maxilla fede- cim 334.4.
Definitiones tot sint, quot res 331.2	Deliria ex sepro transuersio orta, qualia 763.9	274.12
Definitionibus non opus est in rebus notis 536.12.	Delirij causa 69.55. 762.7.	Dentes maxillae superiori iusti- xi, ternis: in. or. binis ra- dicibus adhaerescunt 334.
Definitionis optimae usus 813.	736.56	10
21	Delirium ardentium febrium quomodo fiat 741.47	Dentes maxillae res quini 114.9
Definitio nominis quae dicatur 316.39	Delirium a sepro transuersio or- tum, quomodo a phrenitide distinguitur 762.46	Dentes molares 334.14.
Definitio prima genera duo, nononale uidelicet atque es- sentialis Ibid.29	Delirium in aestuosis febribus cur accidat 487.53	274.22
Definitio rerum quae in genera- tione constituit, quae libet oprima 517.64	Delirium quid 666.15.	Dentes molium nervorum ce- rebrj participes tantum 334.13
Defluxus unde in uentriculum accidat 689.38	683.13	Dentes praeseruantia contra ero- sionem 1229.65
De glugendi difficultas unde 752.54	Delirium quodnam sit perpe- tuum 762.43	635.62
De glugine cur facilius quam uo- mere 85.15	Delirium quous cerebri affectus sequatur 603.19	Dentes prominentes extendi ratio 1229.37
Deiectionem ciborum ceteram quae sequantur 667.15	Delphius 401.27	Dentes quoque sapores quodli- cant 311.39
Deiectione quando utendum 456.54	Dementia affert humiditas 70.15	Dentibus cur inter ossa ceteris, folia sit uerua molis tribu- tus 310.37
Deiectiones intempestivae fiunt praeter uoluntatis imperium 689.3	Demetrius 648.34	Dentibus exumen dis. citra dolo- rem remedia 1228.60
Delatio manus ac delapsus dis- serunt 95.45	Demonstrationum duo princi- pia 368.13	Dentiformis processus 283.
Delectatio & dolor quibus sen- sibus maior, minorue addit 672.19	Dena caninus homini utrinque unicus inest 274.	33
Deleteria genere quae sint 58.	54	Dentifricium ad omnia gingi- uarum & oria ulcera faciens 1230.17
49. 1061.14	Densitas unde oritur 453.7.	Dentifricium optimum 1229.9.
Deleteria humanae naturae quae sint 1037.56	Densitas actionum una cau- sa, prioris actionis defectus 491.11	1230.37
Deleteriae quae putrefaciendo e- necant, quomodo ab his dis- ferant, quae sua frigidityte ex- tinguunt 1036.35	Densitudo inia meatuum exigu- rum cause 905.47	Dentitioni puerorū congruen- tia medicamentis 1229.
Deleteriae, tota substantia 1061.	Densum quid 442.5	56
11	Dente exempto quous rema- neat adhuc aliquid doloris 1227.22	Dentium affectio ex redundan- tia, iuuenibus est familiarior 1227.55
Deleteriorum genera primum 38.61	Dentes a quibus foretur humo- ribus Ibid.61	Dentium affectio sensibus fami- liarior, quibus medicamen- tis curetur Ibid.36
Deleteriorum genera secundum Ibid.64	Dentes augentur & nutriendur, quod liquet ex his qui sunt ex- emptis oppositi 1217.34	Dentium affectus ex inopia sen- sibus accidit citius 1227.
Delicta grauissima quous anti- quisimi legumatores impu- nita reliquerint 1000.61	Dentes canini 334.7.	54
Deligatio exulceratis particu- la qualis sit molienda 1172.	274.17	Dentium dolori eadem hora au- xiliana medicamen Andro- mach 1230.34
53	Dentes confirmata remedium 1229.14	Dentium erosorū dolores quous perferant 1100.20
Deligatura ulceribus qualis sit adhibenda, & quando soluen- da 1171.1	Dentes dolentes quid frangas 1074.36	Dentium fectori remedium 1229.5
Deliqui animi a uacuatione im- modica, cura. 13 965.30	Dentes dolent & pulsant 1227.7	Dentium foratorum curatio 1233.1
	Dentes duabus affectionibus sunt obnoxij 1227.	Dentium dolor alius in ipsa substantia, alius in gingiuis 1227.17
	40	Dentium
	Dentes firmantia ex Archigene 1229.49	
	Dentes incisori 334.5.	
	274.20	

INDEX.

Dentium dolores foratorū, quę mirigent 1101.19	minis usus Ibid. 38	Diatrion pepereon simplicis cō posino 460.3
Dentium dolores lenientia quę sunt 932.60. 1072.8. 1072.16	Diacydon medicamine uten- di modus 1243.12	Diatrios quę 905.39
Dentium dolores qđ sanet 1072. 63. 1068.25. 1084.33. 1097. 22. 1099.5. 1112.29	Diacydon quibus conueniat 1242.63	Diet noni decernendi facultas quę 620.35
Dentium doloribus medicami- na Archigenis 1218.22	Diacydon quid Ibid. 52	Diet quarto quę adfint 615.26
Dentium dolori eadem hora sa- xilians medicamē Androma- chi 1230.3	Diacyronite 384.15	Diet septimi natura 969.14
Dentium eroforū dolores quid perfinet 1100.30	Diaera renascente utentes abiti- nantiā simlagine 413.35	Diet sexti natura Ibid. 15
Dentium & gingiuarum nerui 169.49. 261.39	Diamoron ori gratum 383.16	Diet septimū, qui imitem 609.16
Dentium foratori remediū 1229.5	Diamoron quale fir medicamē- rum 869.22. 1231.38	Diet sextum qui referat 600.20
Dentium foratorū curatio 1228.1	Diapedesis causę 863.37	Diet primo si multa letalia depre- hendantur signa, æger intra quartum moritur 612.39
Dentium liuidorum causę & cu- ratio Ibid. 10	Diapedesis quid 856.50	Diet accessiorū decretorio- rum ipeus caudē est, dum inferna purgamus 1003.20
Dentium molarium magnitudi- nes 274.29	Diapedesis quomodo fit curan- da 867.27	Diet decretoriorū cognitiō ad curaciones morborum nō le- ue momentū affert 608.18
Dentium molarū numerus defini- tus nō est, ut plurimū tamē ha- bentur utringū quinq; 274.63	Diaphragma inflammatum cur- deliria sequantur 602.17	Dietum decretoriorū differen- tia duplex 614.45
Dentium radices Ibid. 14	Diaphragma solam partē, quę sunt sub clauibus, neruos a spi- nali medulla accipit 190.20.	Dietū ordo post uigesimū 610.
Dentium redundantia quā ra- tione curanda 1227.47	Diaphragmatis motus (191.57 quomodo intercat 190.20	Dietū paritatem impariā. (16 tēg expēdit oportet 611.22
Dentium stridor 677.2	Diaphragmatis neruorum ori- go clauis thorace 188.68	Dies coincidentes 615.34
Dentium stupor portulacę au- xiliatur 1229.53	Diaphragmatis usus 249.11	Dies decimusquartus ut finis se- cundę, ita initium tertię septi- mane existit 614.9
Dentium tenuitas obalimenti in- opis est incurabilis 1227.49	Diarie in biliosis ex cruditate sepe fiunt 895.2	Dies decimus tertius omnium de- cretoriorū imbecillimum non aut decernētū, fortissimū qđ in medio utrorumq; 615.38
Deo quę attribuit Gal. 278.21	Diarie in putridas ac hēcticas facile transeat, nisi probē tra- sientur 897.7	Dies decretoriorū qui sunt 608.13
Deriuandi modi uarij 864.35	Diarie unde producant 905.35	Dies sexto qualia excernant 608.
Deriuatio fit ad uicina 819.44. 860.58. 951.60	Diarie accessio est unica, die unico circumscribit 897.4	Dies facultatis decernendi (33 omnino expertes qđ sunt 610.49
Deriuatio p uicinas partes mol- lienda in quibus fit 482.10	Diarie affectus multiplex 905 19	Dies intercalares qui 613.60
Desidia neminem unquā iuuat 471.35	Diarie affectus simplex 904.	Dies maximi & minimi quot sint horarū Romę, & in ma- gna Alexandria 476.38
Desipientes cur obliuiofi red- dantur 499.51	Diarie causę quādo recedat er- gā persistant in corpore 905.5	Dies non primarij, sed ex acci- denti decernunt 620.15
Desipientie proprium sympto- ma est respirationē magna simul & rara Ibid. 42	Diarie solutiōni quę (905.43 accidant 916.35	Dies omnes post quadragesimū cōcoctio potius morbos, & abscissib. qđ crisi bus termināt
Destillatione pituitę remediū	Diarie stipatio inseparabilis quę sit 905.23	Dies primi in breuib; (610.38 morbis ualentiores sunt ulti- mis, contrā in longis 629.52
Destillatio quid 691.5 (1108.22	Diarrhę causę, ciborum con- coctionis defectus 78.59	Dies primus atq; secundus appella- ri cricis quomodo possint 610.24
Detergenna quę sunt 892.58	Diarrhę quādo excinet 83.48	Dies quartus ut septi- mi, ita & sexti index 609.15
Deum Galenus quomodo defini- at 841.26	Diarrhę quid cōueniat 1078.5	Dies qđ 126.33. 610.21. 809.40
Dei Hippocrates uocat naturā, illius aut ministrū medicū 356.	Diarrhœis triplex species 121. 30	Dies qui subitō morbos non sol- uant 609.27
Deus & natura prænorunt (4 partes corporis, earū officia pro exemplarij usū 21.50	Diaspermaton medicamentum	Dies septimus absoluit, quod quartus non potuit 613.53
Deus non genitus, ab æterno & non ex se, bonus 72.39	Diaspermaton medica (870.39 minis usus 871.3	Dies septimus, optimus decreto- rius 607.51. 608.23. 615.24
Dextra sinistris in omni anima- li genere fortiora 300.11	Diaspale arteriarū quoq; actio est 509.9	Dies septimus regi assumitur Dies sextus pelsimus (609.4 decretorios 607.32. 615.17
Diabes causa quę 771.49	Diaspale arteriarum, substantiā spiritus attrahit, systole eius- dem fuliginē expellit 508.11	Dies sextus quāto malignior sit septimo 608.39 (609.6
Diacalaminthes cōfectio 462.	Diatrion pepereon quartanis utile 962.33	Dies sextus tyrāno assumitur
Diacalaminthes medica- (14	Diatrion pepereon quis offeren- di modus 460.31	
	Diatrion pepereon simplex, cru- dianbus medicamē est appo- situm 460.1. 894.5	

Dies tertius & quintus qua ratione decernant	620.29	prius inest musculus	103.7	Dissonantium motuum respirationis causa	498.18
Dies tertius, principii est decernentium acutè	619.54	Digiton redones uniuersi	200.3	Distentio princeps pulsus paræ, plurimumq; ad præagendû conducit	542.43
Dies uigessimus cur uigesimo primo magis decernat	621.10	Dignitate actionis esse primam; secundam securitatis	283.55	Distentio ad cuiusq; corporis cæuitatem æstimanda	545.46
Dies uigessimus est finis trium sepiamanarum	611.63	Dilarari facili possunt mollia omnia	678.1	Distentio magna quæ fit	548.60
Dies uigessimus quos morbos iudicat	611.24	Dilatarione arteriarum atrahitur spiritus	606.15	Distentionis arteriæ initium & contractionis finem impercepribilem esse	549.22
Dies undecimus, decimi quartii est index	619.43	Dilatarionis arteriæ quantitas, uiginti & septem pulsû distrentias complectitur	586.27	Distentionis arteriæ quatuor generales sunt differentie	548.12
Die uigesimo plures absolute fuisset factas morborum iudicationes	614.15	Dilatarionis arteriarum triplex usus	331.31	Distentionis à sanguinis copia, curatio	931.16
Differentiæ interdû accipiunt, generibus & speciebus	533.32	Dimensiones corporû sunt tres		Distentionis contractionisq; arteriarum usus	587.44
Differentiæ in unum pulsû incidentes, quæ sint	519.30	Dimidiû facti, qui bene corpus, habet	879.35	Distentio spontanea undecim diebus	931.44
Differentiæ nomen quibus possit accomodari	533.57	Diminutio quis motus	73.42	Distinguenta quæ per se, ac ex accidenti dicantur	58.18
Differentiæ nomen unde fit dictum	514.15	Diocles ait alimentorû facultates sola experientia notas esse		Distributio alimenti quomodo fiat	78.37. 143.22
Differentia nullius alterius esse potest, quod per se & seorsum constituit	855.52	Diogenes Cynicus libidini dedit operam	775.23	Distributio humoris uelox, aut per corpus fiat	89.34
Diffiantur corpora duplici modo	781.21	Dionysij tyranni inclementia	126.	Distributionis ratione miscens astringentibus medicamenta contraria dispositioni hæmoptice	1244.46
Digerens Alexandri	1182.7	Diophantus medicamentû ad scorpionum & phalangiorum ictus	1287.7	Distributio uirtutis quod	345.24
Digerentia medicocriter quæ sint	2234.11	Dioforidem suggillat Galenus	1019.33. 1109.57	Diuisio quid	336.42
Digerentia quæ	1182.40. 1206.29	Dioscorides exactissime tradidit historiarum plantarû	1065.12	Diuitiarum primus finis quis sit	424.63
Digerentia ualenter quæ	1234.17	Diospolitici medicamentû cõpositio duplex, quarû utraq; cruditarib. apta	459.49. 481.4	Diutius ac præpotentiû mollior causa omnium malorû	645.50
Digerentibus quidò utendum	941.5. 1182.49	Diphryges quas uires habeat	1221.33	Diuretica medicamenta quæ	1057.60
Digerentibus folio quatenus utendum ad oris inflammationem	1231.23	Diphasia qualitas	1077.25	Diuretica præualentia, cruditaribus non utilia	459.24
Digerentibus Alclepladis uires & compositio	1182.22	Diphasistim infert in expugnabilem	1271.49	Diuretica qualia esse debeant	836.2
Digerentibus Alexandri uires et compositiones	1182.7	Disciplina omnes unde caperint negligi	645.16	Diuisio	32.63
Digestio minuitur assidua acutis deiectione	478.39	Disciplinârû studia plurimû ad adipiscendâs uirtutes possunt	424.21	DOCTRINA à finis ratione quidò primû exposta	813.11
Digestio ciborû symptomata, symptomatib. causæ	686.28	Disciplinârû studia plurimû ad adipiscendâs uirtutes possunt	424.21	Doctrina definitiua utitur Galenus in arte medicinali	813.24
Digiti mediû articulû in pede, quæ musculi stectant	260.41	Discussoria qualia in principio adhibenda	1224.34	Doctrinæ genus optimû quod	327
Digiti singuli constant tribus ossibus	137.47. 297.50	Discussorijs mitioribus cur sit in principio utendum ubi digerere conuenit	1234.18	Doctrinæ ordinatæ tres	813.5
Digitis quadrifariam mouendis, quadrifariam applicant tendones	199.53	Discutienda efficaciter quæ	1217.38	Doctrina quæ per rerû elementa instituitur, alijs omnibus utilior	441.50
Digitorum actiones omnes per tria ossa complentur	198.25	Discutienda quæ sint	1217.38	Doctrina, uia uoce explicata optima	370.57
Digitorum flexio unde	95.36	Discutiendâ quæ uehementissimè calida sint, in quibus sit usus cauendus	184.52	Dodecadactylon siue leianum secundum interitum	180.45
Digitorum inæqualitas ad quid conducatur	202.14	Dispositiones conuulsivæ quæ sint	584.52	Dogmatici & Rationales utuntur ratione	6.9
Digitorum musculi	155.15	Dispositiones rheumaticæ plures inualescunt Romæ	1150.24	Dogmaticorû obiectiones contra methodicos	8.22
Digitorû ossa cur conuexa quidem extrinsecus, intus uerò nequaquæ sicuti nec in laterib.	198.36. 199.10	Dispositiones simplices per se sunt nascenda	630.37	Dolichus manditur simul cum filiquis	378.52
Digitorû quatuor pedis motû obliquû musculi efficiunt	160.	Dissecandi ratio	152.11	Dolichus siue smilax hortenensis uidet esse species phaseli	377.
Digitorum singulis propriis	166	Disimilia, inimica & inuicem noxia	64.47	Doliturû corpus idempabile & sensibile	14.3

I N D E X.

- Doliturū fit sensus & alteratio-
nis capax, necesse est 33.48
Dolor ab inflāmato hepate, qua-
lis 734.5
Dolor arteriæ & uenæ, qualis
734.12
Dolor capitis nullus ad humidi-
tatem consequitur 1197.39
Dolor colicus nephriticusq; cir-
ca principia, eandem ferè me-
delam desiderant 769.36
Dolor, dum partium mutatur
temperies, fit 65.17
Dolore affligente præstat omni-
no auditorium meatum non
tangere 1209.3
Dolore extensiuo quæ partes af-
ficiantur 731.53
Dolorē nec ficitas, nec humidi-
tas, ppria ratione iufert 672.31
Dolorem quæ mitigent 926.18
Dolorē qui humores maiorē, et
qui minorem inferat 732.17
Dolor eos quib; à pulmone san-
guis erūpit, nō infestat 754.11
Dolores articulares à quibus gi-
gantur humoribus, quæ no-
tæ indicent 1268.9
Dolores instrumentorum red-
dunt respiratiōē inquam
atq; inordinatam 497.10
Dolores intestinorum à crasis
succie producti, qua ratione
curandi sint 932.26
Dolores oculorū & auris, qua
ratione leniendi Ibid.57
Dolores uentris mediocres, uel
calificatione tantū extrin-
ca fedantur 978.16
Dolores singuli, partem affectā
ostendunt 717.28
Dolor hepatis, uicina corpora
in cōsensum adducit 734.43
Dolori à pharmacis metallicis
aut aceto excitato, quid me-
deatur 1166.28
Dolorificū & iucundū qd 714.2
Dolori mingando cataplasma
opimum 932.63
Dolor inflāmata exasperat, flu-
xionibusq; occasionem præ-
bet 1151.4. 837.17
Dolor inflāmatis musculis un-
de accidat 731.15
Dolores à flatulento spiritu or-
ti, curatio 932.1
Doloris à mordente humore or-
ti, curatio Ibid.4
Doloris à spiritu crasso in uen-
tre oborti, curatio 977.64
Doloris à tenui acriq; humore
excitati, curatio 931.18
Doloris causa inæqualis intem-
perantia 65.10. 672.33.
931.27
Doloris colici cui iuncta sit fe-
bris, curatio 932.41
Doloris expugnandi ratio du-
plex 916.4
Doloris ficti unde possit iudi-
cium sumi 614.30
Doloris species primæ, sunt dug
731.56
Dolor lateris exoluit respiratio-
nis operam 26.45
Dolor maximè profluuium irri-
tat, tum phlegmonas alget
865.27
Dolor membranarum ambien-
tium ossa, qualis 734.9
Dolor pulsatilis neque in peri-
pneumonia, neq; in pleuriti-
de oritur 731.26
Dolor pulsatilis quas inflama-
tiones sequatur Ibid.42
Dolor pulsatilis quas partes pri-
marie affectu molestat, &
quas per consensum Ibid.42
Dolor punctorius pertinet ad
membranas 734.31
Dolor punctorius ubi consistat
732.62
Dolor qualia inducat sympto-
mata 682.29
Dolor quādo fiat 679.56. 350.13
Dolor quid 730.42
Dolor quid indicet 817.42
Dolor sanguinē trahit 992.40
Dolor tensiuus quando accidat
734.36
Dolor turgidus quid 732.14
Dolor ubi ueltemius iufert
733.51
Dolor uehemens uires exoluit
965.10
Dolor ulcerosus & pruriginos-
us 734.15
Dolor unde exoritur 1203.31
Domus exercendo puero qua-
lis nam esse debeat 443.8
Dormientes nō omnino sensus
expertes 100.39
Dormire nō posse à balneo, nec
causa nec signum cōmodum
458.51
Dorsi spondylis singulis, septem
iufunt productiones 288.57
Dorsi uertebiarum cōsideratio
125.17
Dorsum duodecim cōstat spon-
dylis 286.18
Dorycnidion quam facultatem
habeat 1077.28
D R A C M A E uota quæ sit
1291.23
Drachma constat scrupulis tri-
bus 1290.39
Drachma & denarius Roma-
nus est idem 1252.30. 1290.16
Draconis marini, triglae, & alio-
rum id genus animantium fa-
cultates 814.2

Dracontij usus 890.32
Dracūculi uis 406.57. 1077.32
Dryini serpentis uirus 1273.42
D V C I S & imperatoris opera
quæ 167.1
Dulce calidiū austerio 1044.27
Dulcedo à moderato calore p-
uenit 1219.50
Dulcedo est communis omniū
quæ nutriunt 1046.26
Dulcedo omnis à temperato ca-
lore uenit, ut atringens à fri-
gore 1219.50
Dulcedo sola nutrit 1046.47
Dulcia ad calidiū uergētia, me-
dia sunt nature 383.39
Dulcia proximè accedunt ad na-
turam eorum, quibus talia ui-
deniur 1044.4
Dulcia quæ dicantur 1020.30
Dulcia ualde, ualde calida sunt
1043.60
Dulcibus intumescit tum ie-
cur tum lien 918.47
Dura ad agendū aptiora 252.22
Dulcium nullum est frigidum
1043.60
Dura egre consolidescunt om-
nia 867.32
Dura & mollia quæ 555.27
Dura, nostram repellunt cutem
Ibid.42
Dura quæ dicantur 551.1
Durities artieriarum tunicis un-
de accidat 786.50
Durities est qualitas tactilis
555.60
Durius quibus modis aliquid
fiat 1052.57
Durum & molle quot modis di-
citur 1052.36
Durum quid Ibid.50
D Y P H E R I C E S quibus ulceri-
bus conueniat 1170.75
Dysenteria ab atra bile incipit,
mortifera 803.6. 228.65
Ex dysenteria à flaua orta bile
plentiq; seruatur 80.38
Dysenteria causa 704.22.
725.8. 769.10
Dysenteric & sanguinis eruptio
ni quæ conueniant 1206.2
Dysenteria qui uisus conue-
niat 931.52
Dysenteria symptomata quæ
precedant 712.54
Dysenteria ulcus in quibus in-
testinis fit, quomodo discer-
natur 769.16
Dysenteria grauissima, curatur
maximè medicamentis mor-
dentibus 926.2
Dysenteria hepatica 732.56
Dysenteria oritur ex intestino
ulcere 690.19
Dysenteria qd 725.33. 769.9
OO 3

Dysenterias qd perſanet 1068.
 23. 1074.10. 1077.14-1078.
 9. 1087.18. 1088.6. 1104.10.
 1128.30. 1135.48. 1136.60.
 1140.57. 1245.16
 Dysentericis epithema commo-
 dum 1264.46
 Dysentericis remedia Androma-
 chi 1263.18. Aſclepiadis
 1264.35
 Dysenterici ueri qui 1263.32
 Dyspnoſtica ulcera quæ dican-
 tur 1154.15
 Dyſpnoſticis medicamenta cõ-
 gruentia, cur ſint inuenta dif-
 ficillima 1169.35
 Dyſpnoſitorũ differentiæ ſibi.5
 Dyſpnœ cauſarũ inueſtigatio
 Dyſpnœ remedia An- (755.60
 dromachi 1247.56
 Dyſpnœ remedia Aſclepiadis
 Ibid. 22
 Dyſpnœ eſt reſpirationis læſio
 459.42
 Dyſpnœ ob perfrigeratũ calo-
 rem naturalẽ, quales 493.16
 Dyſpnœ ob ſolum ardorẽ pro-
 ducta, qualis Ibid.18
 Dyſpnœ ſimplex quæ ſir dicen-
 da, & quæ compoſita 490-7
 E
 Eſſent uis 1078.7
 ECCHYMOſATA 708.20
 Ecchymoſis curatio 562.29
 Ecchymofis quid 856.47
 Echini herbæ uis 1080.13
 Echini marini caro 402.55
 Echini marini uis 416.22
 Eclogma hepaticum 1217.41
 EDOſNDVM eſt ſobriet & ſalu-
 briter 423.18
 Educatio optima quib. paretur
 415.54
 EFFECTVS nullus abſoluitur
 in artibus humanis, niſi can-
 ſe conſpirent omnes 695.8
 Effluſio, arterij aſpectu 350.35
 Effluſio, inſpiratio uiolenta 322.
 Effluſione q̃ faciãt 755.49 (30
 Effluſionem ſtrepentem quæ eſſi-
 ciant 751.10
 Effluſionis contraria nehemens
 inſpiratio 102.46
 Effluſio quid 102.42. 130.58.
 454.59. 648.44
 Effluſio quomodo fiat 755.31.
 447.51. 499.8
 Effluſus puris ſectio faciẽda eſt
 apra 980.18
 Effluſus quæ corpora maiore,
 & quæ minore patiãt 317.22
 Effluſus auerſi a partib. prin-
 cipalioribus ad ignobiliores
 Effluſus molendus in (834.15
 ne ulceribus, quæ apte expur-
 gari non poſſunt 856.10

Elementis 445.6
 GLAPHOROSCOſ quĩ uim
 habeat 1079.4
 Elarẽ uis 1106.17
 Elarines uis 1079.2
 Elementa animalũ propria ſunt
 quatuor humores 17.47. 18.21
 Elementa cõſtituunt duntaxat ex
 materia & qualitatib. 17.17
 Elementa corporis uoſtri mutuo
 inter ſe paſiuntur, ac tota per
 tota miſcentur 17.27.
 617.19. 990.4
 Elementa corporũ quæ 781.51.
 1115.6
 Elementa in ſunt corporibus fa-
 cultate, non actu 149.62
 Elementa nec nutriunt, nec ul-
 lam puſtui qualitatẽ offerunt
 1046.48
 Elementa omnium generabiliũ
 & corruptibiliũ quæ 148.63
 Elementa omnium ſunt, terra,
 aqua, aer, & ignis 24.29. 35.
 62. 38.19. 617.41
 Elementa prout carent meatib.
 Elementa quæ 41.35 (442.8
 Elementa ſenſibilis ſunt ſimila-
 res partes 74.47
 Elementa ſiccantia ſunt ignis &
 terra 429.22
 Elementa ſola abſolute dicũtur
 calida, frigida &c. 41.61
 Elementa unum ſunt qua-
 tuor 802.64
 Elementa omnia plura, tum altera
 tioni obnoxia 24.15. 14.63
 Elementi & principij diſcrimen
 Elementis ſolis ſummæ (36.22
 in ſunt qualitates 36.2
 Elementorũ in ſe inuicẽ tranſitus
 Elementorũ propriorũ (58.13
 Index nõ poreſt eſſe ſenſus 31.12
 Elementorũ qualitates intereũr,
 animali pereunte 73.22
 Elementorũ ſingularũ quiddam
 ſimile in animantium corpo-
 ribus reperitur 53.44
 Elementorũ ſubſtantie, ad pro-
 pria reuertuntur elementa, a-
 nimali pereunte 17.20
 Elementorũ uſus immoderatus
 ad interitum ducit 36.63
 Elementum corporum, non eſt
 unum 33.26
 Elementum non poteſt eſſe im-
 patibile 34.41
 Elementum purum nullibi repe-
 ritur 35.30. 1008.18. 1013.7
 Elementũ quid 33.9. 348.58
 Elementũ, qd corpus dicat 16.12
 Elementũ ſemper aut eximiũ cor-
 pori aut apponitur 36.60
 Elementum ſi uel unum percat,
 perit & animal 16.54
 Elephantiſi conducit uiperarũ

eſia 984.4
 Elephantiſi incipienti medica-
 men egregium 1215.55
 Elephantiſim in Germania ra-
 ram eſſe 981.6
 Elephantiſi quæ purgatione
 conſeruit 981.8
 Elephantiſis 663.18
 Elephantiſis ab atra oritur bile
 703.46
 Elephantiſia curatio 1134.16
 Elephantiſis in Alexandria plu-
 rimum inualeſcit 981.4
 Elephantis urĩ proboscide tan-
 quĩ manibus, ac per eam re-
 ſpirat 118.28
 Elephas, qui ſi affectus 667.22,
 708.59
 Elixa non nihil propriæ ſubſtan-
 tiæ deponunt in aqua, & ui-
 ciſim ab illa ſibi aliquid aſſu-
 munt 158.49
 Elora acrimoniũ deponit 1136.
 EMOLLIENTIA debent (36
 eſſe emplaſtica 1056.42
 Emollientia & pus mouentia qd
 modo differant 1054.46
 Emollientia q̃ 1054.60. 1056.15
 Emollientia quibus cõueniant
 1053.26
 Emollientia recentia, præſtanti-
 ra 1056.39
 Emollientibus cunctis ineſt pu-
 triſticum quid 1166.23
 Empedoclis opinio reſellit 116.
 Empetron bilem & priu- (64
 tam ducẽdũ habet uim 1079.13
 Empirici cur ſimilia tanũ medi-
 camenta cõmiſceant 1164.34
 Empirici dogmaticorũ diſcrimẽ
 6.51
 Empirici methodici quib. in-
 ter ſe ſint concordẽs 122.
 Empirici quomodo urant tran-
 ſitu ad ſimile 14.39
 Empirici ſola ducunt experien-
 tiam ſuæ inſpectio (124.67
 nis cõſtituit tres ſpecies 6.19
 Empiricorum argumenta con-
 tra methodicos 8.21
 Empiricorũ ars quid 848.8
 Empiricorũ artẽ imitatrix inſpe-
 ctio maxime cõſtituit 6.28
 Empiricorũ hiſtoris inanitas 14.5
 Empiricorũ methodicorũ 124.
 rationalis obiectũ 12.4
 Empiricorũ propria 13.6
 Empiricus q̃ ſit uocidus 848.59
 Emplaſtica quæ 1216.55
 Emplaſtico oppoſitum quale
 1057.10
 Emplaſticorum eſſentia qualia
 Ibid.5
 Emplaſticorum natura duplex
 104.42
 Emplaſtra ruſa ſiũt per longam
 con-

I N D E X.

coctionem 1158.49
 Emplastri Alcimionis composi-
 tio & usus 1177.51
 Emplastri Azanizæ compositio
 & uires Ibid.28
 Emplastri candidi Galeni fascu-
 ras 1151.34
 Emplastri ex champeleone Ascle-
 piadis uires & compositio 1175.
 Emplastri ex champeleone (21
 compositio 1158.43
 Emplastri ex salicibus compositio
 & usus 1177.43
 Emplastri Maclurionis fascu-
 ras & compositio Ibid.35
 Emplastri Moschionis compositio
 & uires 1159.48
 Emplastri phoenicini facultas
 1150.56
 Emplastri pyracauti compositio
 Emplastri Serapionis (1159.32
 compositio & usus 1180.12
 Emplastri Scribonij largi uires
 & compositio 1175.16
 Emplastri Thelamonis uires &
 compositio 1159.44
 Emplastri uiridis Andromachi
 uires & compositio 1177.63
 Emplastrium melinorū & uiridum
 discrimen 1158.25
 Emplastrium ex caricis 979.22
 Emplastrium ex dictamno ad mul-
 ta utile 1177.5
 Emplastrium ex Ladano 1159.28
 Emplastrium Haliei ex sinopide
 1177.32
 Emplastrium Hygieni, multi usus
 1155.35
 Emplastrium melinū Andromachi
 Ibid.10
 Emplastrium melinū Heraclidis
 Ibid.37
 Emplastrium melinū Menpti Ibi.23
 Emplastrium melinum Serapio-
 nis Ibid.28
 Emplastrium rufum Galeni Ibi.54
 Emprosthenos quid 716.15
 Emulgentes uenæ amplissime
 145.53
 ENARMON Iuliani 1161.30
 Enammon nigrum Heræ 1161.38
 Enarthrosis quid 111.56
 Encenithis 709.58
 Eneroceles generatio 663.51
 Eneroceles quid iuuat 1091.53
 Enule campanæ uis 1079.7
 ENYMERA cū bubone in-
 fectans ab ulcere originē duxit
 Ephemeræ cui aqua sit (97.65
 intrepidè propinanda 807.2
 Ephemeræ cum quibus excreto-
 ribus desinant 905.33
 Ephemeræ sunt nulla putredine
 intercedente 784.35
 Ephemeræ interdum à sanguine
 calfacto oriuntur 796.44

Ephemeræ omnes à procatarcti-
 ca causâ oriuntur 785.15
 Ephemeræ superuenientes rumo-
 ribus inguinum, quomodo à
 putridis differant 784.28
 Ephemerarum calor est perpe-
 tuus 785.30
 Ephemerarū causæ 781.14. 955.
 Ephemerarū causis, cōtra- (54
 rix sunt admodum 957.59
 Ephemerarum curatio 955.61.
 Ephemerarū inclinatio (957.22
 accidit cū sudore uel rose 785.38
 Ephemerarum pulsus & urina
 qualis 785.31
 Ephemeræ à densata cute discer-
 nendi ratio 957.1
 Ephemeræ ex tristitia & solici-
 tudine indicat extremum cor-
 poris 956.47
 Ephemeræ si mutet in putridam
 quib. dignoscit indicis 786.1
 Ephemeræ ex inflammatione in-
 guinū, quæ accidunt 957.14
 Ephemeræ uictus ratio conue-
 niens 957.32
 Epieris quid 901.39
 Epididymedes in feminis uter-
 iculis maxime obcuræ 104.2
 Epididymis quæ uocet 112.20
 Epididymis radix se principij
 uasorum feminalium 114.45
 Epigastrij musculorum opus 102.
 Epiglottidis corpus 146.22 (22
 Epiglottidis fissuræ & utricu-
 li 146.7
 Epiglotidis substantia, magni-
 do & situs 147.64
 Epiglottidis usus Ibid.54
 Epiglottis siue ligula, ad uocem
 & spiritushibitionem nec-
 cessaria 146.3
 Epilepsia aliquando oritur à uen-
 triculo 741.59
 Epilepsia cōsistit in cerebro 740
 Epilepsia causa 740.41. (40
 741.28. 683.9. 661.25
 Epilepsie obnoxij, uiculi sunt
 ex cruribus 998.16
 Epilepsie tres differentie 744.32
 Epilepsia quid 666.1. 676.7.
 677.10. 740.34. 750.21
 Epileptici inier ueris mitia sunt
 purgandi 1005.32
 Epileptici plerūq. melancholici
 suauit. & cōueniunt 742.9
 Epileptici abstinendum est à la-
 uacris 1006.1
 Epileptici quæ carnes conue-
 niant 1007.1
 Epileptici qui fructus conue-
 niant 1006.19
 Epileptico puero quod prandij
 sit conueniens Ibid.6
 Epileptico puero uictus ratio
 conueniens 1005.14

Epimerij facultas 1079.45
 Epinyctides 709.11
 Epiphyseos 280.43
 Epiphyseos radij & ulnæ, quæ cō-
 mittuntur carpo 206.24
 Epiphyseos uermisimilis 256.65
 Epiplocele 709.27
 Epiploon quid 179.44. 221.15
 Epithymus 1079.42
 Epithymum aërem bilem pur-
 gat 1171.14
 Epoche 3.12
 Epomidis muscoli 313.32
 Epulides 709.50
 Epulorica quæ dicantur prima-
 riæ, & quæ secundariæ 1059.36
 Epuloticorum finis quæ 1161.10
 Epuloticorū opus 1121.61. 1161.6
 Epulorici Andromachi 1159.54
 Epulorici candidi Telephanis
 Epuloticum Critonis (Ibid.62
 ex Ladano 1173.57
 Epuloticum ex cadmia 1159.34
 Q. V. A. non recipit semen hu-
 manum 209.22
 Equi natura 194.15
 Equitatione concutunt uiscera
 Equorū Icthenes qui (445.64
 bus medeant morbis 1128.37
 Equus uelocior leone 194.54
 Q. R. A. S. I. T. A. T. V. S. ne mi-
 num ferromen fecit de san-
 guinis detractione 985.10
 Erektioni depreSSIONis puden-
 di uirilis, necessaria sunt illius
 nervosi corporis generatio,
 qd à pubis osibus nascit 104.31
 Erigeri qualitas 1081.12
 Erinnæi cōbusti facultas 1140.
 Erodentia, putrefaciencia (33
 & liquida corpora nostrū, po-
 testate dicunt calida 59.3
 Erodentia quædam cutem qua-
 se iuto comedantur 57.38
 Erodentia uarij species 1048.58
 Erofionis causæ 836.34. 931.49
 Errhina 1206.16
 Errhina quibus liquoribus le-
 niantur 1207.16
 Errhina trahens bilem p nares
 Errores circa agrū ad- (1259.30
 missi, producant morbum, uel
 accerfunt mortem 29.24
 Errores in formatione & simplici-
 ter consistere possunt 831.11
 Errores sunt prauis iudiciis 328.
 Error externus tripliciter (50
 accidit 683.62
 Error hominū cōmunis 419.32
 Erroribus circa agrum cōmis-
 sis, uirtutē decretorij diei ob-
 scurari 611.47
 Erucæ facultas creditur sperma-
 tica 389.21
 Eruca picarum quas habet ui-
 res 1141.60

Eruuæ, dolichi & phaseoli facul-
tates 116.3
Eruum, boum non hominū est
alimentum Ibid.10
Eruū siue orobus prauū est fucci
cū melle tamen crassius thora-
cichumores expurgat 177.16
Eruū soluit articulos 1105.14
Eryces facultas 1080.2
Erynghi facultas 1081.14
Erysimi facultas 1080.8
Erysimū selesmo deterius 177.
Erysipelas ex flaua oritur (14
bile 704.19. 708.4. 793.37.
943.51. 970.56. 1201.41)
Erysipelas oedematosum unde
accidit 944.51
Erysipelas phlegmonodes qui-
do accidit 971.1
Erysipelas phlegmonosum qd
dicatur 707.63
Erysipelas quid 941.66
Erysipelas quid à phlegmone
differat 941.54
Erysipelas quod dicat 707.47
Erysipelas scirrhosum unde ac-
cidit 944.56
Erysipelas so- (cidat 944.56
lius curis est passio 971.7
Erysipelas uerum, in aliquo ui-
scere consistens, frigida potu
sanatur 899.50
Erysipelati refrigerando medi-
camenta idonea 944.39
Erysipelatis generatio 991.14
Erysipelatis curatio 917.85.
944.15. 1101.61. 1150.40
Erysipelatis liuentis curatio
Erysipelatis refrigerā- (1150.50
dis terminus quis 944.30
§§§§§ H A R E Ingenitū narib. ex
cutiendū sternutatorib. sunt
1115.4
Escharam quæ detrahāt 981.12
Essentia cuiusq. particulæ quæ
dicatur 111.35
Essentia cuiusq. rei est principū,
à quo ordiendū est ad exa-
ctū omnē inquisitionem 841.44
Essentia proprietatis, affectus par-
tis indicium est 774.7. 752.31
Essentia rei prius qualitate re-
quiritur 149.54
Essentia singulis accedit ex tēpe-
rie quantum qualitatis primariū
Esule facultas 1091.36 (196.19
§§§§§ V A C V A T I O Inequalis quæ
fit 1004.44
Euacuatio in tumoribus præter
naturam duplex 944.18
Euacuationem quando partiri
expedit 994.39
Euacuationes pprie p loca sūt,
in quibus coacuantur 819.33
Euacuationes subite ac multæ,
quando cauendæ sūt 964.11
Euacuationis modus multiplex

819.30
Euacuationum species 813.41
Euacuatur corpus quæ sūt
prius consideranda 971.57
Euasurus morbū necessariū per-
transit illius tempora unius
salia 641.49
Euacraton qd dicendū sit 1031.13
Euæctice quid 361.20
Euæscerati qui dicantur 126.61
Euphorbiæ qualitas 1080.15
Eupatoriū um Ibid.10. 1189.63
Euphorbiæ uis citò euanciscit
1163.46. 1107.59
Euphorbium ad punctos tendi
nes facit 1163.43
Euphorbiū rectū cū diu, palli-
dus autē inueteratū 1107.61
Euphorbiū uetus recentiori est
inferius 1166.39
Euripides in Medea ait tres fu-
isse animæ facultates uehēmē-
Eufarci qui ne- (nseimas 127.3
cessarij sūt 49.14. 431.56
§§§§§ X A C S R B A T I O N I B. quarta
nis, quod medicamen conse-
rat 715.47
Exanguia omnia, sanguine præ-
dina frigidiora 48.13. 113.53
Exanthemata medicamentis re-
siccantibus indigent 1215.31
Exasperare quid 104.1.23
Exasperatio & laxigatio quib.
de causis contingat 661.27
Exandescencia innatū calorem
reuocat, & densiorem reddit
respirationem 504.62
Excessus corrigendus per cōtra-
rij excessus usurpationē 465.
31. 466.1. 889.37
Excessus dissoluūt ures 428.10
Excessus immoderatus omnis, cō-
sistit in habitudine ad aliqd 64
Ex corda meticulosi 126.60 (16
Excretionibus pectoris qd cō-
ferat 1081.60. 1091.10
Excrementa alui qualia esse de-
beant 613.55. 615.13
Excrementa alui quibus de cau-
sis supprimantur 436.48
Excrementa à quibus causis mo-
ueantur 680.19
Excrementa cerebri crassiora, p
quæ instrumenta excolantur
in nasi meatus 128.29
Excrementa corporis duob. mo-
dis uacuantur 778.51
Excrementa cur interdū citius,
interdum tardius q oporteat
à natura expellantur 619.57
Excrementa cur nūc plura nunc
paciore, q pro ratione cibi
assumpti, excernantur 638.59
Excrementa cur nequeat pars u-
na ad aliam mittere 801.4
Excrementa diutius in corpore

morantia, cōputrescūt 86.16
Excrementa excernēdi ratio 310.
Excrementa sount calorē (24
præter naturam, quemadmo-
dum ligna ignem 799.13
Excrementa hepatica quæ dicant
767.3
Excrementa in singulis membris
animalis natura, nō habet certū
prescriptum meatum 416.14
Excrementa in thorace & pulmo-
nib. delitescētia, expedit trans
ferre deorsum 447.27
Excrementa nigra quomodo ab
atra bile differant 701.8
Excrementa non trahit ab organ-
is abq. qualitatibus cōmanua-
te 119.7
Excrementa pilis similia in urinis,
gignuntur in uenis 773.11
Excrementa pituitosa conuenit
diuidere, incidere, comminue-
re & abstergere 126.20
Excrementa putrescentia quos
asserant morbos 157.43
Excrementa quādo à ceruari cō-
tingat 797.63
Excrementa quibus de causis no-
bis inuitis excidant 100.32
Excrementa qd indident 819.7
Excrementa sanon cur flaua 116.
Excrementa semper expel- (62
luntur à fortioribus ad imbe-
ciliores partes 119.49
481.14. 663.50. 798.10
Excrementi à sincera substantia
secretio, qmōdo fiat 436.11
Excrementi fuliginosi qñ plus, &
qñ minus accrescat 387.55
Excrementi multitudinis immo-
dicæ duplex causa 686.57
Excrementis pellendis uaria or-
gana diuersis facultatibus præ-
dita, natura instruit 410.3
Excrementorū alui præter natu-
ram plures species 615.50
Excrementorū color nō magnū
habet uim ad inferioriū uisus
indicandā dispositionē 615.50
Excrementorū copia unde de-
prehendatur 606.69
Excrementorū cruentorū qua-
tuor sunt differentie 690.11
Excrementon duo genera 157.50
Excrementorum expulsio à ce-
rebro expirante iuuat 155.5
Excrementon, pprietas in regio
morbo consideranda 762.12
Excrementon, quæritur respōdet
quæritur cōfessionem succo 566.
Excrementorū species par- (39
tem affectam indicat 717.46
Excrementorū suppressio, ultio
nentris, aut intestinorū 416.60
Excrementorū uacuatio, omni
febri est utilisima 911.1
Excre-

INDEX.

Excrementorum uenas perua-
gantium cum sanguine, tria
genera 636.47
Excrementorum uis duplices Ibi.51
Excrementorum alui incoctū qua-
le nām fit 615.44
Excrementum cerebri non pi-
tuita, sed mucus 811.40
Excrementū hepaticū à dysente-
ria quō distinguentū 769.41
Excrementum infestat aut qua-
litate aut quantitate 661.48
Excrementū in primæ carnis ge-
neratione duplex 850.56
Excrementū singulariū partium
quib. de causis supprimatur
Excrementū sola quā- 437.35
titate alienū, quod sit 689.48
Excrementū uarium, uariū cor-
pus affectibus esse obnoxium
ostendit 616.4
Excrementum uehementer facti-
dum, uehementē putrefactio-
nem significat 635.60
Excrementa carnis in ulcere à
uehementer siccantibus ex-
cedit 853.39
Excrementa carnis qualia requi-
rit medicamenta 862.52
Excreta à cole & uesica quomo-
do discernenda 778.39
Excretio naturalis semper sequi-
tur concoctionem 606.53
Excretiones ceticas graula præ-
cedunt symptomata, ægritū
maxima perturbatio 607.31
Excretiones inuoluntarie quō
sint referendæ 676.58
Excretiones prænosceret, qui fa-
cile possit 969.43
Excretiōes quæ in quib. morbis
præcipue expendendæ 638.8
Excretiones quæ pessimæ 607.3
Excretiones uaporoas sensum
effugiant 356.59
Excretionis & retentionis præ-
ter naturam, causæ 779.1
Excretionis instrumenta dupli-
cia 101.16
Excretio quib. modis fiat 931.
689.42. 778.38
Excretorum differentia 817.50
Excreti q̄ superiorib. & quin-
fernis partib. debet 467.14
Excretari nō conuenit, si adit
cruditas uel humor plenitu-
do, & cur 439.10. 453.61
Exercitata oculos sicciora sunt
Excretari cor profus- 1133.16
dus dormiant 675.39
Exercitatio æquidua usum & sci-

entificam cognitionē cōsiliat
Exercitatio cur ante ci- 538.55
bum administranda 439.14
Exercitatio excedens modū, col-
liquat corpora 1005.18
Exercitatio in artium liberaliū
studijs 428.1
Exercitatio in particularib. cōsi-
derationes cor 811.900.13
pus exercētis animūq̄ oble-
tantes utilissimæ 367.55
Exercitationes sunt mediocres
Exercitationes thoracis 428.17
sunt respiratiōes & uoces 445.
Exercitationes uehemen- 34
tes caput replent 1005.40
Exercitationis circa affectum lo-
corū notitiā tres modi 730.21
Exercitationis cōmodissimum
tempus 439.19 493.6
Exercitationis duplicia cōmoda
Exercitationis formæ senib. uti-
les, nude sint cōiectiōes 466.45
Exercitationis intempestius in-
commoda 439.33
Exercitationis terminus sit alte-
ratio respiratiōis Ibi.5.
Exercitationis omniū auxilio,
institi calorū augmentum ex-
citat 444.19
Exercitationis omniū pericu-
la & mala 367.50
Exercitationis qualitas 444.5
Exercitationum usus 912.3
Exercitatio parat sp̄ritū om̄es
corporis partes exercet 366.36
Exercitatio per totam uitam re-
quiritur, ut quas uir perfectus
reddatur 421.11
Exercitatio præparat corpus ad
balneum frigidum 912.3
Exercitatio q̄ inhiēda 446.34
Exercitatio q̄ motus uocet 428.
Exercitatio robur augeat, 64
ignauia soluit 780.42
Exercitatio uehemens ex robu-
ra celerit̄ composita 445.10
Exercitatio quam rarissimē frigi-
do potu egent 413.17
Exercitatio lauatrum quale de-
beat esse 446.41
Exercitatio 359.35
Exercitatio corpus quale ab apo-
therapia exspectat fr̄ctionem
Exercitatio corpus 447.7
quando lauandum 446.37
Exercitatio crurum 445.19
Exercitatio manū, laborū Ibi.30
Exercitatio moderata quomodo
immutent pulsū 544.37
Exercitatio musculorum maxime
propria, quæ 444.41
Exercitatio post crapulā quæ ma-
la producant 477.46
Exercitatio quæ celeritate ab̄que
robore peraguntur 445.1

Exercitatio quæstō præstat cibis &
medicamentis tenuit̄. 437.60
Exercitatio robusta sine celeritate
Exercitatio ualida, & sol, 444.11
calida & robusta corpora ua-
lidiora efficiunt 1045.36
Exercitijs improbis augeat quid-
dem caliditas, spiritus autem
animalis absumitur 491.40
Exercitijs utēdi rationes 444.8
Exercitiorum genera 445.38
Exercitiorū prima genera tria
412.39. 444.31
Exercitiorum quænam citra pul-
uerem, & quæ minimē possint
administrari 444.57
Exercitiorū utilitas 30.62. 445.1
Exercitium adendum ali- 69
quo & uesica prius soluit, &
solidis partibus molli fr̄ctio-
ne cassificat 439.45
Exercitium ante cibum medio-
cre, cōseruat corporis tempe-
raturam constitutionē 405.46
Exercitium ante prandium me-
diocre, cōfert ad sanitate
tuendam 406.1
Exercitiū uellū alio t̄pore, q̄ an-
te cibū administrat 445.62
Exhalatio quō augeat 478.40
Exhalatio corpus quod sit 831.37
Exiccantia quarto gradu etiam
urunt 1064.37
Exiccantium uis intendit mel-
lis miscella, remittitur autem
oleo aut cerato 1156.50
Exiccato maxime reficit bal-
neum 806.39
Exoliti à plenitudine quomo-
do curandi 966.12
Exoliti ob prauos succos uen-
tris os infestantes, quomodo
curandi Ibi.48
Exolutiō à calore curatio 967
Exolutiōis à uisū imbeci- 3
litate ortæ, curatio Ibi.53
Exolutiōis ex immodica puris
aut aque inter cutem euacua-
tione, curatio Ibi.39
Exolutiōis ob animi affectum
ortæ, curatio Ibi.44
Exolutiōis ob febrem aut phle-
gmone magnitudine, curatio
Exolutiōis ob intesti- (Ibi.8
norum dolores, curatio Ibi.51
Exolutiōis ob mēbris præcipit
obstructionē, curatio Ibi.17
Exolutiōis ob refrigerationē
curatio 966.61
Exolutiōis ob siccitatem futu-
ræ præcautio 967.14
Exolutiōis ob uentriculi imbe-
cilitatem, curatio 966.18
Exolutiōis præter expectatio-
nem abortus, curatio 967.24
Exolutiōis qui dicantur 709.43

Exortus primū intestinū spiris
caret 323.31
Exortus processus ibid. 61
Experientia rationes diuerſe
1016.33
Experientia amethodos niritur
fortuæ solius ſauore, uō ar-
te aut ordine 841.60
Experientia fidem inuentorum
comprobat 471.43
Experientia medicamentorū fa-
cultates iudicat 1030.47
Experientia quid 12.64
Experiri quæ & quomodo me-
dicamenta debemus 1013.12
Experrecti à ſomno cur ſe diſſe-
dant 680.1
Expiratio conſert ad ſanguinis
expellendam fuliginē 486.14
Expiratio cur in ſomno maior
509.41
Expiratio eſt actionis remiſſio
ibid. 14
Expiratio & ſyſtole in pueris ex-
cellunt ibid. 44
Expiratio febricitibus qualis
494.46
Expiratio frigida, cur mortis
nuncia 504.6
Expiratio in dormientibus cur
magnitudine & uelocitate in-
ſpirationem excedat 493.47
Expiratio magna ſimul & tarda
in delirantibus accidit 498.8
Expiratio maxima ſit internis
muſculis intercoſtalib. 101.51
Expirationē quæ faciliſ 735.47
Expirationis aer cur ſit par in ſpi-
rato 488.18
Expirationis magnæ & uelociſ
cauſa 498.3
Expirationis nullus muſculus
opiſſex 101.39
Expirationis ſpecies pro cauſa-
rum diſſerētē uariæ 495.14
Expirationis uſus 351.57.491.14
Expiratio parua ſimul & tarda
quibus ſit 498.10
Expiratio parua ſimul & uelox
Expiratio qd 312.40 (498.18
Expiratio rara ſimul & magna
conſtinuatur ofſiranōnū ſignū
atq; medela exiſtit 304.44
Expiratio racia, ſonoraq; quo-
modo fiat 645.41
Expulſiones ex pectore qd pro-
moueat 1080.9
Expulſiones quæ cruditatem ſi-
gnificent 623.17
Expulſiones quæ perniciem ſi-
gnificent 613.18
Expulſionibus quæ ſint idoneæ
1053.1
Expulſionis facilitas bona 613.
Expulſionis excrementorū 134
impeditur, cauſa triplex 686.37

Expulſionis actio per tuſſes qua-
lis 678.58
Expulſrix & reſerrix utri facul-
tas ſibi mutuō ſuccedit 81.37
Expulſrix uis quando immodi-
cē moueat 687.39
Exquiritur à non exquiſitis quo-
modo diſtinguantur 960.49
Extendentes manū, mouentur
711.16
Extenſio articuli ſit ab externo
tendone 199.43
Extenſio ſit præualete muſcu-
lo externo 96.51
Extenſio tanq̃ motus inſtrumē-
ti animæ 93.59
Extenuatio corporibus, uitiſq;
articularibus cōmoda medi-
camenta quæ ſint 970.61
Extenuatorū affectio eſt duplex
806.11
Extenuator reſtitiendi ratio 931.
Extergentia ad uocis puri-
tatē faciētia, quæ ſint 1240.60
Extergentia cutim quidem de-
bent eſſe exacte nitroſa uiſce-
ra antē, uel ſi aliquid aſtriſſio-
nis fortiatur, nihil nocuerit
1037.48
Extergentia leuiter quæ ſint 1233.
Extinctio quid 632.10 (44
Extrema plurimū diſſat utrinq;
à medijs in quorū genere 123.4.
Exuberans omne eſt na- (40
cundum 30.7
Exulceratio omnis ex atra bile
orta, inſanabilis 704.16
Exuſta omnia reddunt ſubſtan-
tiæ tenuioris 1122.35
Exuum ſerpentis medetur do-
loribus denium 1128.30
F
Faba Aegyptia drachmā con-
tinet cum dimidia 1290.27
Faba Aegyptia, noſtra eſt humi-
dior & excrementoſior 373.57
Fabæ inflationes pariūt 375.40.
409.43
Faba græca cōſtinet obolos duos
1290.16
Fabarum ſubſtantia 375.44
Fabarum uis 416.1. 1091.6
Fabis piſa præſtant 416.3
Facies muſculi omnes, neruos à
tertia coniugatione recipiūt
274.6
Facies ægri inſpicienda 333.30
Facies unde ſuos neruos reci-
piat 749.62
Facultas à cerebro descendens
per neruos, ſit ne corporea
an incorporea, Galenus am-
bigit 344.50
Facultas alimētī genus iudicat
19.51
Facultas alteratrix hepatis eſt

inter alias principaliffima
1255.4
Facultas animalis in ſomno ge-
ſcit: naturalis fortius agit
673.18
Facultas arteriæ extremæ imbe-
cilla, uel aliqua mole humo-
rum oppreſſa, quos edat pul-
ſus 560.14
Facultas attractrix familiarium
ſingulis ineſt 39.20. 76.31
Facultas auſtrix & nutritrix adeſt
his, qui geſtatur in utero 75.3
Facultas biſariam iudeſt 683.60
Facultas cōcoctrix in ſomno ſe-
inrō recipit magis 570.18
Facultas dilatatrix arteriæ à cor-
de ſortem habet 91.27
Facultas duplex, actū ſcilicet &
potentia 1011.19
Facultas eſt cauſa effectrix 697.
Facultas excretrix quan- (4
do moueat 799.55
Facultas expulſrix facit crifes
606.31. 619.64
Facultas extenuandi, quibus be-
clinis inſita 1061.36
Facultas formatrix 74.64
Facultas in craſſandi, quibus be-
chicis ſit inſita 1061.58
Facultas menſuram præſidiū im-
dicat 13.35
Facultas non indicat remedium
19.17
Facultas omnis conſiſtit in rela-
tione 74.5
Facultas prohibet ut accipiat
id quod requiritur 19.34
Facultas pulſifica à corde in-
ſuit arterijs per ipſarum tuni-
carum ſubſtantias 508.30
Facultas quantitaris ciborū ſco-
pus 19.16
Facultas quid 1012.18
Facultas ratiocinatrix conſiſtit
in cerebro 337.37
Facultas retentrix in quibus cer-
nitur 81.10
Facultas retentrix, attractrix et
expulſtricem media intercede-
re debet 83.45
Facultas ſenſitrix quadruplex
333.16
Facultas taſtilis per corpus di-
ſperſa 128.32
Facultas uidendi quando offen-
datur 668.11
Facultas uitalis eſt libera 496.63
Facultas uitalis & naturales, a-
nimaliſt unde proſtituitur,
& ex quibus dignoſci earum
imbecillitas poſſit 967.59
Facultas uitalis quibus negata,
& quibus uehementiſſima da-
ta 606.7
Facultas unde cognoscat 604.
60. 605.19
Facul-

INDEX.

- Facultate aliquid ex aduerso di-
uiditur ei quod actus 101.4.43
Facultate expultrice existit im-
becilla, quid accidat 687.46
Facultatem discernendi rerum
similitudines, plurimi fecerit
neteres 351.13
Facultatem inuenire, qua natu-
ra quæq; efficiat, humani in-
genii non est 307.36
Facultatem irascibilem consiste-
re in corde 337.47
Facultatē quæ deprimat 387.12
Facultatem uitalem soluientia
314.37
Facultate robusta existente, dila-
tatio thoracis non multo mi-
nor fit 491.46
Facultates alteratrices tot in a-
nimali, quot elementares par-
tes 74.57
Facultates animal gubernantes
sunt plures 990.2
Facultates austeræ & acerbæ ut
differant 113.6.32
Facultates elementares ac primæ
quæ 74.42
Facultates fortes, corpus in suis
naturam mutant 113.50
Facultates naturales necessariæ
ad uitam 77.14
Facultates naturales semper su-
is actionibus uacant 495.8
Facultates naturales sunt qua-
tuor 36.10. 662.45. 676.
96. 1155.3. 445.16
Facultates per uarietia solidiora
corpora permeant 700.10
Facultates quæ proprietatis ra-
tione insunt, à methodo sunt
alienæ 1117.50
Facultates quas, quæ ætates ha-
beant fortiores & imbecillio-
res 692.4
Facultates quot naturæ sunt, qua
ratione innuendum 74.15
Facultates tres diuersæ insunt
hominibus 351.7
Facultates ualidæ tantum à ma-
ximis deiciuntur occasio-
nibus 189.35
Facultate ualente nunq; pulsus
esse parus ad summum po-
terest 585.44
Facultatibus ualidis magni pul-
sus peculiaries existunt 567.39
Facultatis animosæ, quæ cordi
inest, quid proprium 327.30
Facultatis anodyne natura
1060.45
Facultatis appetitorie affectus
421.54
Facultatis attractricis sympto-
mata 686.1
Facultatis differentie sunt ro-
bur & imbecillitas 551.32
Facultatis essentia cuiusque par-
tis, in commodo eiusdem par-
tis temperamento consistit
583.51. 592.32. 697.2. 766.
51. 1012.36
Facultates essentiales lesiones pro-
prij, sunt interperies 683.64
Facultatis est animalia, motus
uoluntarius 728.52
Facultatis imbecillitates, quos
morbos sequantur 684.61
Facultatis irascibilis immodera-
tio 423.14
Facultatis iudiciæ experimen-
tum sumendum est ab ea re,
ad quam dicitur 1012.32
Facultatis moricis instrumen-
ta, sunt nerui & musculi 712.
48
Facultatis nutriticis opus assimi-
lano 75.16. 606.2
Facultatis nutritorie sympto-
mata 687.12
Facultatis obliuiones diuersæ,
uarias pulsuum inæqualitates
produncunt 561.8
Facultatis uitalis opus 606.1
Facultatū alexipharmacarū na-
tura duplex 1060.16
Facultatum corpus nostrum re-
gentiū tria principia 731.48
Facultatum medicamentorum ex-
cessus & gradus descendunt
1018.7
Facultatū naturalium ordo 81.62
Facultatum nos dispensantium
robur imbecillitasq; ex pro-
prijs indicantur functionib;
991.53
Facultatum principia distincta
sunt, ipse tamen miscetur in
singulis instrumentis 606.18
Facultatum singularum lesio-
nes in hepate, quæ signa indi-
cent 767.32
Fæcis sanguineæ duplex species
708.9
Fæx quid 1016.50
Fæx uita nrit, atque corrumpit
carnem 81.12
Fagi & ilicis facultates 1077.56
Falerum ex uinis probatissimi
succu 411.46
Falsi nulla comprehensio 9.54
Fames aduersatur his qui mor-
daces humores collegerit in
ore uentriculi 1203.61
Fames canina 578.58.
1053.43
Fames cur à calore impediatur
674.46
Fames quid Ibid.33
Familiaris cuius est unicuique, alie-
na autem, plura 1046.30
Familiaritates rerum unde ori-
antur 1050.39
Famæ causæ 674.48
Famæ sensus in orificio uentri-
culi 228.48
Famæ tolerandæ causa 87.13
Farcinialis, siccus suscipit lo-
num 109.6
Farcinialis membrana 105.15.
305.10
Farcinialis membrana conti-
net humorem stauum 106.2
Farcinialis oritur ab urago
121.47
Farcinialis principium ubi
105.61
Farinæ uis 415.52
Farina sabacea tollit faciei len-
tes 375.47
Farina triticea quidem maximè
ad suppuraciones promouet
hordeacea neru discuit
979.28
Fasciarū circumactus quorsum
& quotupliciter fiant 448.7
Fatuus quid 666.14
Fatuus causa, refrigeratio
602.58
Faucibus inflammatis remedia
Asclepiadis 1235.14
Fauorinus dalemate peritri-
gitur 4.2
Faustina Galeni manu prehensum
ducebat 651.47
Fæx 221 diaria detentis nimum
est propinandum aquosum
891.49
Febre diaria nel putrida quædo
homo febriat 597.68
Febre laborantibus quotidiana,
lien induratur 810.53
Febrem hepticam, hepar & uen-
triculus qua ratione inferat
807.17
Febrem tertianam quæ arguant
958.14
Febre putrida detentis, nec lau-
uandos, nec relaxandos esse
anteq; corpus nactuū fuerit
923.33
Febres acmæficæ 791.41
Febres à putredine sanguinis or-
te, simpliciores sunt q; ab alijs
humoribus 796.64
Febres ardentes à tertianis quo
differant 715.14
Febres ardentes à uentriculo &
hepate orre, in marasim ex-
pe degenerant 765.48
Febres ardentes consueuerūt in
dicari per excretiones 968.62
Febres ardētēs & tertianas quæ
gignant 631.2
Febres cacothætes 572.58
Febres continuæ cur tertio uel
quinto die soluantur 640.12
Febres continuæ nec horrorem
nec rigorem faciunt 795.61

Febres cum bubone, si absque ulcere oriuntur, sunt suspectae 955.57
Febres cunctae à principio nulla egere uenae sectione 988.57
Febres cur succedant inflammationis particulis 783.6
Febres decurrentes quae 633.34
Febres diariae quoniam & sint & dicantur 897.18, 905.16
Febres diariae dum impetuerint astantur sunt diurniores 905.1
Febres diariae, qualiter pulsus mutant 598.34
Febres diariae quando soluitur 610.35
Febres diariae unde proficiantur 540.51
Febres diurnae quae 633.44
Febres epacmaesticae 791.41
Febres ephemericae ex densata cute 617.17
Febres ephemericae spiritus sunt passionis 636.43
Febres ephemericae ex bubone ortas quae arguant 637.11
Febres epitiae 66.15
Febres ex hepate accessae 798.17
Febres ex inflammatione, sunt symptomata partium inflammationum 958.4
Febres ex pituita, cur inaequalitatem caloris tactui obijciant 797.18
Febres hecticae ne leuissimam quidem errorem tolerant 913.47
Febres hecticae occupant solidas corporis partes 785.44
Febres hecticae quae dicantur 889.30
Febres hecticae quoniam ab initio fiant 597.17
Febres hecticae rarissimae à principio oriuntur 599.2
Febres hecticae nulla accendit causa 896.56
Febres hecticae post sumptum cibum ex canescere, exacerbari aequaliter 788.37
Febres liomotoriae 791.41
Febres Lypiriae 65.17
Febres Lypiriae & hepaticae 105.4
Febres marasmodos ob quae uiscera maiori ex parte accidunt 909.4
Febres omnes ardentissimae, pulsum sortuntur cerebri 590.51
Febres oriuntur ob obstructiones meatuum 783.6
Febres oriuntur ex sanguinis permutatione in alios humores, mitiores ceteris putridis sunt 790.11
Febres paracmaesticae 791.41

Febres per circuitus moueri unde contingat 799.36
Febres pestilenter à putredine oriuntur 784.12
Febres pestilentes uou paucae ab initio sunt hecticae 597.14
Febres pestilentes uou uehementer sunt calidae 1117.40
Febres, praeter hecticas, omnes duplici inaequali constant in temperie 65.44
Febres putridae 64.16
Febres putridae & hecticae quae dicantur 897.10
Febres putridae quales pulsus fortiantur 598.41
Febres putridae causa procatarae nulla praecedit 785.49
Febres putridae ex tactu iudicandi ratio 797.23
Febres, quae accendant 781.46
Febres quae saluberrimae & pessimae iudicandae ex decretorio die 614.63
Febres quae typis careant 810.11
Febres quartanas dissolutae atrabiles excretio 638.56
Febres quomodo inter se miscantur 633.62
Febres quotidianae à pituitoso oriuntur humore 350.58
Febres quotidianae cur aliusduos pueros corripiant 632.59
Febres quotidianae non cum rigore, sed cum refrigeratione quadam inuadunt 631.45
Febres quodidianae praecipue giugunt hybernorum tempore 631.1
Febres quodidianae quibus naturis sunt familiares 790.62
Febres schitticae quae dicantur 889.30
Febres semiterrianas, quae excretionibus soluantur 638.57
Febres sunt affectus uenosi generis 624.16
Febres synochicae diuersae sunt à continuis 640.1
Febres synochicae nullum habent circuitum 639.7
Febres synochicae quae dicantur 897.41
Febres tabidae quae sunt 787.3
Febres tertianae à flaua producuntur bile 350.60
Febres tertianae quibus naturis sunt familiares 790.51
Febres synocha detentus quando absque cibo seruari debet 925.3
Febres tabida quando animal laborat 789.46
Febribus hecticis naturae calidae & siccae à principio corripiuntur 906.62
Febribus hecticis nulla adest

accessio 788.46
Febribus hecticis, quibus aliae uou copulantur, balnea quouis tempore conferunt 806.57
Febribus putridis adest uelox systole 786.18
Febribus putridis post concoctionem humorum, balneum opitulatur 806.54
Febribus quae cum alio fluore insistant, uou opus est alia curatione 964.2
Febribus quartanis quae originem praesentant 791.10
Febribus synochicis nullus adest circuitus, ac proinde neque accessio 718.43
Febri continente detritis, nec balneo uel uino, nec unctioui, rarefaciendi utendum 917.60
Febri cuiusque pulsus post cibum alteratur in magnitudine & uelocitatem 789.1
Febrens nec in accessione initio, nec in ipsius incremento laudans 910.53
Febrentibus quales res digerere, praeparare debeamus 903.1
Febrientes à coëstipata cute qualiter sint fricandi & abluendi 890.64
Febrentium ex lassitudine signa 637.15
Febrentium pulsibus uniuersis semper adest celeritas 596.20
Febrentium respiratio qualis 492.52
Febri gignendae quae requirantur 661.3
Febrius calor in synochis quando minuitur, aut augeatur 898.1
Febre cur uou ex aequo continetur omnibus 661.4
Febri ab animi affectibus 891.6
Febri ab exercitatione immo dica 781.11
Febri ab uestione productae, curatio 891.11
Febri ab iracundia quando gignatur 781.9
Febri à constipatione productae, curatio 889.49
Febri acuta quibus, gigni ex occasione possint 634.50
Febri à cute densata 781.18
Febri à diarrhoea ortae, curatio 891.17
Febri à frigore ortae, curatio 891.14
Febri amphimerina 794.41
Febri amphimerina, diurna 619.7
Febri ardens, si superueniat rigor, soluitur 631.12
Febri ardentis solutio cum quibus

bus excretionibus fiat 638.86
 Febris continens in quibus gl-
 gni non possit 893.20
 Febris continens aliqua species
 excitari potest absq. humorū
 putredine 893.4
 Febris continuæ quotidianæ de-
 scriptio 633.11
 Febris continuæ quartanæ de-
 scriptio Ibid. 17
 Febris continua quæ dicatur
 616.43. 633.31
 Febris continua quartana raro
 reperitur 791.58
 Febris diaræ propria signa 598.3
 Febris ephemeræ generatio
 64.38
 Febris epiala quæ 65.41
 Febris ex cute astricta 790.20
 Febris ex astrictione quomodo
 oritur 660.63
 Febris ex defurgendi frequentia
 893.14
 Febris ex frigiditate 790.27
 Febris ex insolatione 790.14
 Febris exquisita ardens quando
 uocetur 633.22
 Febris hæctica doloris experta
 Febris hæctica inuesti- (64.22
 gario 788.16
 Febris hæctica species 913.52
 Febris hæctica occupat solidas
 corporis partes 64.17
 Febris hæctica quādo excitetur
 595.12
 Febris hæctica quando sit expe-
 ctanda 907.44
 Febris hæctica qua ratione secun-
 dum reliqua uiscera oritur
 807.15
 Febris hæmitritæ descriptio
 634.19
 Febris hæmitritæ non exquisi-
 ta quæ dicatur 795.43
 Febris hepaticæ causa 791.60
 Febris indicationes 889.11
 Febris intermittens quæ dicatur
 639.33
 Febris orta à tristitia 781.11
 Febris pestilentis ac letalis cau-
 sa 596.7. 783.33
 Febris putridæ indicatio duplex
 Febris putridæ pro- (833.14
 pria signa 598.9
 Febris putridæ propria est cele-
 ritas 599.9
 Febris putrida quando epheme-
 ra succedat 785.60
 Febris quādo accendat 455.43
 Febris quando gignatur 889.13
 Febris quartana ab atra bile fit
 631.38
 Febris quartanæ curatio 1177.
 Febris quartana exquisita (27
 gignitur ab atra bile 793.10
 Febris quartana maximè oritur

in autumno 632.32
 Febris quartana quæ dicenda
 633.26
 Febris, quatenus febris, aqua fri-
 gida est perpetuò remedium
 948.10
 Febris quid 574.16. 716.61.
 781.51. 902.47. 991.1
 Febris quotidiana cur singulis
 diebus accendatur 792.68
 Febris quotidianæ descriptio
 Ibid. 30
 Febris quotidianæ & tertianæ
 discrimen 632.45
 Febris quotidianæ solutionē af-
 fert pituitæ excretio 638.12
 Febris quotidiana fit à pituita
 631.39
 Febris quotidiana quæ dicenda
 633.29
 Febris remedia sunt humectatio
 & refrigeratio 902.43
 Febris requirit uictus rationem
 frigidam atq. humidā 895.50
 Febris semitertianæ accessio nū-
 quam integrè definit 719.8
 Febris semitertiana ex quibus
 consistet 718.51
 Febris semitertiana maximè in-
 ualefcit Romæ 719.22
 Febris synocha requirit uictus
 rationem tenuissimā 921.6
 Febris synocha tota unus status
 est 639.34
 Febris synochos quæ dicatur
 788.46. 915.47
 Febris tabida à tabe quomodo
 differat 787.29
 Febris tabidæ indicia q̃ 787.32
 Febris tertiana duplex quando
 adesse dicatur 634.17
 Febris tertianæ accessionis tem-
 pora sex describuntur, qualia
 reperiuntur & in aliarum in-
 termittentium circuitib. 717.61
 Febris tertianæ accessio quo tē-
 poris intervallo finiat 792.5
 Febris tertianæ accessio ultra
 duodecim non protrahit ho-
 ras 631.16
 Febris tertianæ breuem solutio-
 nem quæ uring indicit Ibid. 20
 Febris tertianæ descriptio 717.
 Febris tertianæ & quartanæ (21
 mistarum, quatuor coniuga-
 tiones 794.10
 Febris tertianæ & quidianæ dis-
 crimen penes sensum caloris
 702.47
 Febris tertianæ exquisitæ descri-
 ptio 631.19
 Febris tertianæ solutionem, ex-
 cretio bilis testatur 638.30
 Febris tertianæ symptomata
 792.1
 Febris tertiana ex genere arden-

tium est 350.62
 Febris tertiana oritur à flaua bi-
 le per corpus mora 631.30
 Febris tertiana pura intra septi-
 mum ex cuius absolutione 631.43
 Febris tertiana quando dicatur
 633.86
 ¶ 11815 utrorumq. musculorū
 intercostalium dissecit, perit
 uox & effusio 187.60
 Febris tertiana correptis quo ac-
 cessionis tēpore est pono dan-
 da 632.6
 Februm ab humorum putredi-
 ne ortarū tempora quatuor
 quæ 720.7
 Febrū accessiones quæ faciunt
 lōgiōres & breuiōres 792.10
 Febrū accessionis emissio unde
 897.49
 Februm caloris differentia tri-
 plex 781.55
 Februm causa, nonnunq̃ sunt
 aliqui affectus 433.32
 Februm colliquistium cū. 213
 Februm complexio & (914.11
 confusio quid 796.17
 Februm cōtinentium remedia
 maxima duo quæ, & quate-
 nus his utendum 899.19
 Februm continuarū circa acci-
 dentia infantium, curatio
 963.30
 Februm continuarū duplex spe-
 cies 791.29
 Febrū continuarū indicia 919.
 Febrū cū accidentibus in- (66
 festannum, curatio 963.58
 Februm diaræ in bilioso tem-
 peramento, cum cōmunis o-
 mnium, cum cuiusq. propria
 uictus ratio 891.37
 Februm differentie ab acciden-
 te desumptæ 780.60
 Febrū differentie à materia cui
 hæret calor præter naturam
 sumptæ, sunt tres 781.5
 Februm differentie tres gene-
 ralissimæ 806.50
 Februm diuisio 615.40
 Februm ephemerarū causæ &
 indicia 656.52
 Februm exquisitè ardentium et
 tertiarum discrimen 631.7
 Februm genus complicatū, con-
 stituit dupliciter Ibid. 51
 Februm hæcticarum duo pro-
 pria signa 596.15
 Febrū hæcticarū notitia ex uri-
 na inuestigari nequit 597.32
 Februm hæcticarū nulla fit sta-
 tum in primis diebus, sed in
 progressu 637.28
 Februm intermittentium disfe-
 rentiæ tres 791.25
 Februm intermittentiū & con-

tinuarum discrimen 791.19
 Febrium intermittentiū typi sin-
 guli, quorū horis expleantur
 809.60
 Febriū longitudo & breuitas un-
 de deprehendatur 615.48
 Febriū maxime principales dif-
 ferentiae, sumuntur ab ipsarū
 substantia 780.55
 Febrium mistio ab earum com-
 plicatione differt 718.50
 Febrium missionem nō ignora-
 bit, qui singulas simplicium co-
 gnoit 616.46
 Febriū nō intermittentiū tempora
 reperiuntur quinq; 718.11
 Febriū primae differentiae 889.16
 Febriū putridarū differen-
 tiae 917.1. 958.10
 Febrium putridarū indicii ca-
 lor est mordax & acris 786.19
 Febrium putridarū pulsus qua-
 lis Ibid.31
 Febrium putridarū tria genera
 614.43
 Febrium putridarum uniuersae
 differentiae simplices sunt sex
 796.17
 Febrium putridarū urinae qua-
 les 786.40
 Febrium quarantarum signa &
 symptomata 611.15
 Febrium, quae ex locis patienti-
 bus accidunt, formam esse co-
 positam 615.1
 Febrium quotidianarū indicia
 611.46
 Febrium simplicium tria genera
 611.46. 616.14
 Febriū synocharū curatio & ul-
 ctus ratio 898.48
 Febrium synocharum differen-
 tia tres 897.61
 Febrium synocharū genus du-
 plex Ibid.46
 Febrium synochiarum maximū
 praesidium quod 898.18
 Febrium tabidarum proprium
 est siccitas 788.59
 Febrium tertianarum & adaren-
 tium discrimen 611.8
 Febrium tertianarū quartana-
 rumq; secundum pulsus disci-
 men 611.51
 Febriū tertianarū signa & sym-
 ptomata 611.63
 Feliciores qua ratione simus ue-
 teribus 351.51
 Felle qualitas 319.47
 Felle uiscera sanguinem repur-
 gat & bile 218.3
 Femoris consideratio 118.5
 Femoris forma 118.16
 Femoris morū ad interiora, qui
 musculi minime 118.11
 Femoris musculi 166.48. 116.39

Femoris musculi descendunt ad
 caput mouende tibie, articu-
 latione praeterita 817.18
 Femoris os omnium maximū
 118.5. 111.61
 Femoris pars superna pro sede
 ischii corylem sortitur 111.3
 Femoris structura ad sessiones
 idonea est Ibid.8
 Femoris uulnera glutinandi ra-
 tio 116.4.46
 Femur circumagentes musculi
 109.31
 Femur extrorsum agentes mu-
 sculi Ibid.11
 Femur intro abducētes musculi
 109.5
 Fermenti facultas 1080.66.
 1101.55. 116.4.18
 Ferri facultas 1118.15
 Ferrum igne mollescit 1178.58
 Ferulæ uis 1098.8
 Ferulis quādo utendum ad ossa
 fracta firmanda 877.55
 Feruor uel fermentatio quid
 947.50
 FIBRAE circulares in intesti-
 nis tantum & cur 84.54
 Fibrae musculorū thoracis iuter-
 nae, lationē habent contrariam
 externarum lationi 174.18
 Fibrae oblique opiculantur re-
 tentrici potentiae 85.61
 Fibrae quae quibus actionib; ser-
 uiant 111.6
 Fibrae rectae trahendi gratia sunt
 uentriculo 84.49
 Fibrae thoracis musculorū exter-
 nae, quam lationē quemq; finū
 sortiantur 171.60
 Fibrae transuersae, contrahendi
 gratia conditae 84.51
 Fibrarū actiones uariae 114.50
 Fibrarū differentiae & usus 119.15
 Fibrarum tertium genus est ob-
 liquarum 85.54
 Fibula 111.61
 Fibulae utilitas 115.61
 Fibula extrinsecus tibi est aten-
 sa Ibid.57
 Ficos maturos congruere seni-
 bus 470.5
 Ficus arbor quam habeat facul-
 tatem 1108.18
 Ficus arida & uiridis facultas
 Ibid.16
 Ficus & uix ceteris autumnali-
 bus fructibus praestantiores
 409.61
 Ficus exacte maturae 418.49
 Ficuum facultas 180.14
 Fieri per se, & ex accidenti quid
 664.57
 Figura artuum extrema dolori-
 fica 97.6
 Figura circularis difficillima ad
 patiendum 116.11
 Figuræ angularis propriū 98.14
 Figuræ artuum mediae, quae re-
 quirantur 97.45
 Figuræ doloris expertes 100.48
 Figuræ extremæ manus qua-
 tuor 98.3
 Figura exacte media, caret do-
 lore 97.8. 99.44
 Figuræ extremæ, sunt dolorificae
 101.46
 Figuræ omium maxime quae
 sunt 110.19
 Figuræ rotundae quae infant
 119.18
 Figura manus simpliciter me-
 dia quae fit 98.7
 Figura media cum utriusq; mu-
 sculi intentione, adest dolorē
 97.57
 Figura media dolore carē, quo-
 modo inuenienda 101.43
 Figura media, dupliciter dicit
 97.59
 Figura media in artuum motio-
 ne quando seruetur 96.49
 Figura media in singulis articu-
 lis est indolens 101.43
 Figura media qui fiat 101.51
 Figuram mediam diuissimē ser-
 uamus 97.11
 Figura non simpliciter me-
 diaduplex 98.11
 Figura omnia constat aut linea
 curva, aut recta 196.10
 Figura omnis molesta, summe
 imbecillis 97.11
 Figura pars quid indicet 118.9
 Figura partium 2 quibus causis
 nitetur 691.58
 Figurari animal tripliciter po-
 test, si recta lineam efficiat spi-
 na cum cruribus 110.19
 Figura rotunda ad patiendū dif-
 ficillima 118.7.41
 Figurarū cuiusq; digiti sex uni-
 uersales circa apprehensionē
 differentiae 197.60
 Figurarum excessus dolorē af-
 fert, & cur 97.15
 Figurarū extremarū celestem o-
 ptimum mutationem, mediae
 uerō tardam Ibid.19
 In Figurarū non simpliciter me-
 diarum differentia, unū genus
 semper musculorū agit 99.10
 Figurarum rotunda sola panitur
 agere 197.17
 Figurarū uarietas confert ad pa-
 tiendi difficultatem 105.59
 Flicis uis 1101.19
 Fliculae uis 1077.45
 Fimus omnis attrahit 1059.61
 Firmitudinem articulorū, liga-
 mentorum forritudo & ex-
 acta compositio efficit 109.1
 Fistula

Fistula urea ad qd utilis 733.57
 Fistula quid 707.1
 Fistulosa omnia sunt leuia 1015.53
 F L A M M A, aer est accensus
 Ibid. 4.4
 Flammæ à quibus augeantur
 485.59
 Flammæ quot modis extingui
 possint 485.51
 Flamma extinguit illico sub cu-
 curbitis medicinalib. 507.59
 Flamma ignis, nō omnino com-
 paranda cum calore anima-
 lium 804.6
 Flamma omnis, opus habet aere
 moderate frigido 485.58
 Flammæ motus duplex lb. 42
 Flammulas extingui à feruido
 sole 1045.35
 Flammæ discutiunt calefacientia
 & tenuantia 375.43, 894.25.
 978.5
 Flatum in uetriculo genitū quæ
 sequant symptomata 689.19
 Flatus in ventre causa lbi. 53
 Flatus Boëtii 648.11
 Flectendis digitis cur magni du-
 plices tendones sint dari
 100.13
 Flexio articuli fit ab interno ten-
 done 199.46
 Flexio fit prævalente musculo
 interno 96.53
 Florentius calor acris 47.16
 Floris æris vires 1126.6
 Flos salis quam habeat faculta-
 tem 1143.44
 Fluor corporis nostri quomo-
 do rorciatur 419.58
 Fluūt humores ad dolentes par-
 ticulas 758.46
 Fluxibilitas meatuum quibus me-
 dicamentis pareretur 914.19
 Fluxio calida in uetriculum qd
 moliat 479.17
 Fluxio frigida in uetriculum
 quid faciat lbi. 19
 Fluxionē tenuem oculorū, cras-
 siorem esse reddendam 9.35
 Fluxionibus aurium & oculorum
 quid auxilietur 1080.34
 Fluxioni discutiendæ quæ medi-
 camenta conueniant 972.26
 Fluxionis aliudque cause 688.63
 Fluxionū omnium in pulmonem
 immittendum, cōmunis est inæ-
 qualitas pulsuum 601.12
 Fluxionum causa 87.21, 798.
 48, 935.14, 1150.59
 Fluxui mulieris sistendo potio
 Apolloni 1264.3
 Q U O D MINAS cur uiris pingui-
 res 45.22
 Femine non emittunt semen fo-
 ras, sed in utero 114.58.
 301.49

Fœminę uiris imbecilliores 159.
 Femina exsecta, castrato ma-
 sculo assimilatur 114.8
 Femina lactante, menses nō pro-
 bē fluere 300.42
 Femina mare imperfectior, qd
 frigidior 297.62
 Femina masculo humilior &
 frigidior 117.21, 350.12
 Fœniculi vires 1094.64
 Fœniculum olim etiam in totū
 annum reponebatur 189.44
 Fœnigræci decocti facultas 1216.
 18, 1217.48
 Fœnigræci elixi succus sumptus
 cum melle, subducit intestino-
 rum prauos humores 376.30
 Fœnigræci succus auxilia diu-
 rurnis thoracis affectibus
 376.37
 Fœnigræci uis 376.34, 416.14.
 1110.13, 1183.43
 Fœnigræci decoctum, oculorū
 tensioni confert 943.4
 Fœnigræcum nō boni succi est
 409.37
 Fœnumgræcum inter calefacien-
 tia legumina recenset 376.26
 Fœtor alarum quid auxilietur
 1107.3
 Fœtus comparatio ad plantas
 110.10, 123.2
 Fœtus, dum à solanatura regit,
 nec arteriarū nec cordis fun-
 ctione indiget 121.63
 Fœtus formationis ratio 78.1,
 115.23
 Fœtus in fœmine uteris ubi cō-
 rineantur 103.37
 Fœtus in utero dispensatio 239.
 Fœtus nō indiget cerebro, (57
 & quare 123.65
 Fœtus nouem mensibus perfici-
 tur 82.20, 779.52
 Fœtus per quæ uasa alligetur
 121.31
 Fœtus per quæ uasa trahat spiri-
 tum & sanguinem 106.9
 Folium malabathri 1113.2
 Fomenta calida quibus noceant
 885.19
 Fomento ex oleo & absinthio
 quando utendum 893.24
 Forma corporis omnibus simi-
 lis 151.19
 Formam naturalem quæ uident
 662.56
 Formatio animalis prima, con-
 stat ex semine & sanguine
 menstruo 46.11
 Formatrix natura effringit par-
 ticulas secundum animæ mo-
 res 54.47
 Formidabilis inducūt rigorem
 714.64
 Fortibus in sunt dentes fortes &
 muli, timidis contrā 174.47
 Fortius unum altero, bisarūm
 dicitur 300.7
 Fortuna improbitas inconstan-
 tiat 128
 Fortuna munus, nō uirtutis est,
 diuitijs præfere 413.32
 Fortuna quæ tribuantur 355.18
 Fortuna & ars per auxilia mor-
 bos profigant 914.40
 Fortuna raro quicquid recte opera-
 tar 318.43
 FRACTURA 22.58
 Fracturæ curatio 876.43
 Fracturæ quæ uictus ratio con-
 ueniat 814.63
 Fracturæ sanitas fit callo adue-
 niente lbi. 59
 Fracturæ scopos, unio 876.18
 Fractura quid 856.43
 Fractura, quod pertinet ad in-
 tentionem primam, est incurabi-
 lis 814.45
 Fracturas longas curandi ratio
 878.29
 Friabilitas in mollibus inuenit
 411.14
 Fricandi epilepticos ratio 1005.
 Fricandi uiscera ratio 446.1 (49
 Fricatio apothepauticæ quem
 usum præstet 442.32
 Fricatio dura, constringit molles
 soluit: multa minus: medio-
 cris augeat 441.58, 442.20
 Fricatio est exercitatio, imbecil-
 lioribus præsertim corpori-
 bus 1005.46
 Fricatio ex oleo æqualis est, sicca
 autem inæqualis 1026.12
 Fricatio ex hydreiro quæ sicca
 corporibus auxilietur 1028.34
 Fricatio media inter mollē & du-
 ram adhibenda 447.19
 Fricatio mollis qd efficiat 443.22
 Fricationes exercitationibus sub-
 seruientes 442.26
 Fricationes mediæ 440.48
 Fricationibus uarijs utendum
 lbi. 10
 Fricationis ex oleo usus 1026.6
 Fricationis maturatæ post somnū
 adhibere utilitas 446.34
 Fricationis mediæ indicia sunt ru-
 bor & rumor 443.14
 Fricationis preparatorie finis
 443.17
 Fricationis terminus, quæ carnis
 augendæ gratia præstatur, sit
 ingens tumor lbi. 20
 Fricationis terminus quis 951.40
 Fricationū cōtrarietas alia in fri-
 ctionū genere, alia in affectuū
 quibz ea proueniūt, consistit
 440.56
 Fricationum differentie in uni-
 uersum sex lbi. 40
 P P 2

Frictionū diuersarū uarij usus

440.15

Frictionū genera omnis dicunt

respectu collationeꝝ 441.18

Frictionum mensura iuxta quæ

fit uarianda 441.49

Frictionum particulares conu-

ersiones nouem 441.10

Frictionū utiles differentias

quæ distinxerit Hippocrates secū-

dum affectuum contrarieta-

tem 441.2

Frictio preparatoria quomodo

administranda 442.35

Frictio prohibet dolores per cir-

cuitum uenientes, si duas vel

tres horas ante accessioneꝝ ad

hibira fit 446.39

Frictio qualis esse debeat 439.

Frictio uberior silicet som-

niū 917.28

Frictio uepertina a quibus utilis

454.16

Frigerextrema per accessiones

unde contingat 715.18

Frigida applicata, acq̃uiritur

calorem s̃mittunt 59.6

Frigida cur sopore gignit 77.1

Frigide potu quando utendum

899.15

Frigide potus cur macilentos ex-

anguiesq̃, atq̃ ob id hecticos

lædat Ibid.53

Frigide potus intempestiuꝝ &

immodicus, quæ male concu-

liet 899.38

Frigide potus quibus periculo-

sus 885.42

Frigida naratione quādo posui-

mus uti in synochis 918.11

Frigida non a corpore nostro

uiuuntur, sed ipsū uincūt

58.1

Frigida opportunē exhibita, q̃s

a febre liberet 696.17

Frigida quando fit propinenda

q̃s qui laborant synocho 916.

61. 918.8

Frigida quæ uehementius mor-

dident 1040.23

Frigida quibus offerenda & qui-

bis non 899.42

Frigiditas omnibus actionibus

officit 71.1

Frigiditati mollities organorū

coniuncta, quæ pulsuum diffe-

rentias producat 557.12

Frigiditas fœminæ utilitas

298.40

Frigiditas immodicæ, causæ

661.18

Frigiditatis opa 517.20 1042.21

Frigidū, neruis inimicū 1161.56

Frigidum nihil promptē com-

buritur 220.23

Frigidum partium crassarū, ue-

hementius repellit 1059.56

Frigidum potestate 61.18

Frigidum qua ratione sit mor-

dax 1059.57

Frigidum ubiq̃ est debilius, tor-

pidumq̃ 692.35

Frigoris causæ triplex 1053.23

Frigus cui corpori febrem adser-

re possit 695.58

Frigus efficit corpus ad motum

idoneū 717.1

Frons pilis nudata 277.48

Frontis cuna 279.6

Frontis cuius, uoluntarij morus

particeps 261.58

Frontis musculus, fibras habet

deorsum uersus iedētes 168.42

Frontis ossa cur dura simul &

densa 281.9

Fructus ad reponendum aprisui

mi 408.41

Fructus arborei omnes mali sunt

succi præter castaneas 409.54

Fructus fugaces corrūpi, si diu

in uentriculo hęcant 379.41

Fructus horæ si corruptan-

tur in uentre, similes letis libus

ueneris sunt 409.58

Fructus horarij ægrè seruantur

378.64

Fructus horarij qui dicantur

Ibid.60

Fructus omnes coquunt & ma-

turefunt calido 1041.8

Fructus omnes in primo sui or-

tu sunt acerbi 1045.7

Fructus, quibus ut medicamen-

tis utimur 410.10

Fructus qui ficcati nō possunt

408.46

Fructus tenuis uictus rationi sa-

pi 417.54

Fructus uniuersi ex terra & s-

qua gignuntur 35.52

Fructuum arboreorū facultas

380.24

Fructuum differentie 1042.5

Fructuum qui sint uisci, & qui

minimè 1043.16

Fructuum sapores 1041.65

Fructuum semina, ab ipsis maxi-

mè discedunt 378.18

Frumenta quæ dicantur 415.22

¶ FV LIG 1112 immoderatio,

quæ respirandi difficultates in-

ducit 491.55

Fuliginis uis 1095.39

Fuligo ex immodicè utis gigni-

tur 894.

Fumarie succus, oculorū sciē-

acuit 1084.13

Fumus ex semiustis nascitur

894.55

Functiones redire a corporibus

similibus 847.2

Functionibus actiuisq̃ instru-

menta sint cōmodiora 692.17

Functionis causa effectrix 846.

Functionis læsio, sympto-

ma non morbus est 658.56

Functionis læsio, terminus mu-

ta tionis cuiusq̃ partis 64.12

Functioni nullius partis impedi-

llata essentia 691.39

Functionum omnium causa, ani-

ma 895.2. 431.20

Functionum requisitū ad uisū

tres differentie 605.9

Fungi 591.32

Fungi facultas 1097.8

Fungi ficcati nō possunt, proin-

de uisū in se habere indicant

408.44

Fungorū eius periculosus 391.

Fungorum uox, quæ opo-

lulentur Ibid.39

Fungorum qualitas 406.64

Fursur aliquid deterforis facul-

tatis fortitur 371.3. 1055.49

Furfures capitis a serosis fucis

oriuntur 1195.7

Furfurū capitis curatio Ibid.12

Furibundi, quibus cubiti arte-

ris uehementer pulsati 71.36

Furunculorū descriptio, curatio

& species 1225.14

Furunculus 709.12

Fuscū Andromachi contra pun-

cturas 1168.58

Futurs nō licet in principio co-

gnoscere, nisi ad multum per-

specta morbi specie 612.53

Futurorum non historia, sed di-

uinatio potius 14.6

G

GACATES quas uires habet

1119.21

Gelastris uires Ibid.45

Gelbani uis 1113.4

Geleni consistentia 424.54

Geleni genus clarum 425.35

Geleni instantia 646.57

Geleni in patriam reditus 650.2

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Geleni in seruos benignitas 421.56

Galenus Eudemo Peripatetico prædixit febrem quartanam 646.16
 Galenus Eudemū liberauit à tribus quartanis Ibid.52
 Galenus ex omni regione curabat sibi adferri omniugena medicamenta 1163.57
 Galenus exgrissimo tactu fuit prædictus 651.2
 Galenus infomnijs patris adfectus, studium medicinæ 646.31. 898.36
 Galenus medicamentorū conquirendam gratia, uarias perlustrauit regiones 1180.45
 Galenus Mosæicæ sententiæ de omnipotenti Dei reuincitur 278.6
 Galenus nulli librorū suorū propriū nomē præscripsit 880.27
 Galenus paternas laudes longis tibis decantat 424.34
 Galenus quandiu ab omni uitæ perie immunis pſtiterit 404.
 Galenus qua ratione præ- (58) dixerit cuidam affuturū sanguinis fluxū per nāres 652.1
 Galenus qua ratione quandam maronū Romæ ex libidine amoris egrotare cognorit 648.57
 Galenus sanguinis fluxū uelocitē ēnāre dextra quomodo compescuerit 652.21
 Galenus Sexto Antonini filio prædixit modū, horam, & reciduum morbi 650.44
 Galenus uixit Romæ imperante Marco Aurelio Antonino 649.61
 Galen, uixit sanissimus 465.17
 Galenizæ uis 1141.20
 Galenizæ 401.19
 Gallæ facultas 1086.57. 1120.15
 Gallij nomen unde & facultas 1075.44
 Gallinarum ius quam nim habet 1141.25
 Gallis parum sanguinis detrahendum 995.74
 Gallorum iuris uires 1141.25
 Gallorū testes præsertim signatorum præstantissimi 394.46
 Gallorum ueterum ius uentrem subducit, carō aurem cohibet 1053.23
 Gangrænæ curatio 931.52
 Gangrænā quid 707.31.
 708.43. 985.43
 Gangrænā unde fiat 707.8
 Gangræmatē ex mullā, in qua rosæ decoctæ fuerant, Cōmodi Imp. fauces Galen. leniuit
 Gari nis 1144.15 (651.38
 Garum 895.19

Gaudet, qui in eare promouent
 cuius amore flagrant 421.48
 Gaudio nonnullis fuisse exanimatos 682.15
 GOMINOXVM instrumentorum usus 255.56
 Genarum processus 274.16
 Generare qui nequeant 304.58
 Generatio absoluit, quid dicat 846.9
 Generatio, actio cōposita 74.27
 Generatio masculi & femine tribuitur temperamento qualitatum actiuarum 118.19
 Generationē primam negliger tractari ab uniuersis hominibus 275.60
 Generationes omnium corporum ex quatuor elementis constant 1046.1
 Generationis fecunditatē quibus natura cōcesserit 297.14
 Generationis progressus 74.16
 Generationis ratio 296.60
 Generatio nostri prima unde 149.55
 Generatio quibus prius, & quibus posterius cōtingit 124.61
 Generatio quid dicatur 78.10
 Generatio, quis motus 71.45
 Genera ultima dicuntur species
 Genitij facultas 1107.50 (41.18
 Genita ex femine regenerari uis possunt 111.39
 Genitales omnium femine partium debilitatæ 119.51
 Genitales partes quæ feminis non emergant 119.13
 Genitalia feminea infus forma ta sunt, sed in utero calorem imbecillitate propulsari haud potuerunt 298.26
 Genitalia mascula à femineis quare differant 119.6
 Genitalia masculi & femine proportionē sibi correspondent 118.57
 Genitalia sensibilia cute 301.
 Genitalium nerui, uenæ (20) arteriæque quales 305.16
 Genituræ corruptelæ quatuor qualitates sunt causæ 851.53
 Genituræ principij naturalis obgetorū intemperantiæ 275.50
 Genituræ profusuium quid cohibeat 1082.7
 Genituræ recens concretæ descriptio 111.9
 Genituræ ulcositas quibus generandis sit idonea 110.59
 Genitura quæ uocetur 109.61
 Genitiana liberat ab obstructiōne 1075.49
 Genu articulus tria habet ligamenta 160.55
 Genu inflammati curatio 971.

65. 975.8
 Genu inflammati dolorem magnum lenitiā, hyeme calida, æstate frigida sunt admodum da 972.12
 Genu quatuor regiones quibus prædictis fulciantur 216.38
 Genu tumores statulentos quid dicatur 1119.22
 Germanorū agrestes mores Galenus damnat 434.8
 Germina arborum & fruticum 390.7
 Gerocomice quæ 805.35
 Gestatione in quibus utendum 467.57
 GIBBA VS unde accidat 751.49
 Gigartæ uis 1075.55
 Gilymus quid 131.63
 Gignit & scandit facultas 389.32. 1075.58
 Gignitæ unde nernorum propaginem accipiunt 163.43
 Gignitæ inflammatas oleū lenitum perſanat 1228.15
 Gignitæ laxas quid curet 1118.4
 GLABRA sunt, quæ summè frigida & humida 303.6
 Gladioli uis 1098.36
 Gladius ceram secando hebetat 1056.18
 Glandem penis semper eandem magnitudinē seruare 779.14
 Glandes ilignæ uitantur 408.2
 Glandes quercinæ 186.55
 Glandes querne crasi facies 407.59
 Glandium magnum, 319.185.6
 Glandulæ adiacentes laryngi laxiores & fungosiores 248.18
 Glandulæ cur sint maximè fluxionibus obnoxie 954.57.
 993.51
 Glandulæ humectant partes 120.39
 Glandulæ lingue adiacentes 170.50
 Glandulæ mammarū quæm suocum præbeant 407.48
 Glandulæ, mediæ diuidit sublimibus semper inserte 235.9
 Glandulæ mesenterij 825.13
 Glandulæ neruis prædictæ 310.25
 Glandulæ omnes in cibo sunt suasas 394.21
 Glandulæ stabiliunt diuisiones uasorum 310.7
 Glandulæ uasorum diuisiones replent 250.43
 Glandulæ, uasorum sublimium fulcra 120.27
 Glandularum densarum & siccarum, item humectarum & rararum usus Ibid.38
 Glandularum duplex genus Ibid.16

Glandularum duplex utilitas
110.35. 116.28
Glandularum lingue, & mamarum
ufus 119.4. 175.31
Glandularum natura duplex est
109.62. 149.18
Glandularum oculorum ufus 170.
Glans unguentaria quam (46
habeat uim 1073.47
Glaucedines oculorum caufe 120.
Glaucii uis 1075.63. 1120.10 (15
Glaucium & diagraucium oede-
mata, eryfipelata & phlegmo-
nas sanat 945.17
F. *Glaucium* morbus cecitate maxi-
me affert 128.15
Glaux herba quam uim habeat
1076.2
Glene uel coryle qd 96.24. 131.
Glucini coffectio 1188.11 62
Glorie cupiditas immota ab om-
nibus uultu cognofci 415.60
F. *Gloria* duce cerebri eminentie
156.64
Glutuantis nigri Herx uires
1161.43
Glutinantium finis quis Ibid. 8
Glutinatio ruptorum uisorum a
quibus fiat 1244.36
Glycyrrhizae facultas 1076.13
Glycyrrhiza stomatis addita,
ipfa reddit meliora 1335.26
Gnaphalium 1076.50
COMPOSITIS quid 131.5
Gonorrhoeae species 693.43
Gonorrhoea, quaedam est coeul-
lo 677.8
Gonorrhoea quarum partium fit
affectio 779.18
Gonorrhoea quid 778.44
GORACILES, liberaliter refici
poffunt 782.8
Gracilitas deficiens nutritio
684.56
Gracilitas unde obtrahat 48.59
Gracilitatem corporis qui pul-
fus fignificet 583.6
Gracilitatis caufe 478.15
Gracilitatis remedia Ibid. 19
Gratus excessuum quatuor qui
1064.28
Graminis facultas 1066.17
Grauedo quid 693.6
Graueolentia subuertunt stoma-
chum 1251.24
Grauitas ab altero in altero gi-
gnitur 698.27
Grauitas unde 699.30
Grossorum uis 1098.47
Grumi generatio 107.2.
141.56
Grumus in corpore praeter na-
turam contentus, qui fequan-
tur fymptomata 771.53
Q. *Grum* ciborum ad uentricu-
lum uia 85.11

Gulae affectus, qua parte catapla-
fma adhibeatur 940.10
Gulae affectuum duo genera 763.2
Gulae cur runcius duplices sint da-
re 763.63
Gulae externa tunica inferuit uo-
mitui & deglutioni 85.12
Gulae exulcerare medicamenta
effe paulatim afiducius lingen-
da 861.10
Gulae inflammare indicia 763.14
Gulae paralyfis quae 686.3
Gulae fitus 85.18. 763.51. 940.24
Gula inter deglutiendum fpiritu
impletur 85.17
Gula, uentriculi pars praelonga
119.19
Gummi facultas 1088.46
Gumi & tragacithae ufus in ocu-
lariis medicamentis 1219.30
Gurgulioni inflammatio quae con-
ferant 8.17
Gurgulioni inflammatio remedia
fecundum Archigenem 1137.23
Gurgulionis affecti curatio fe-
cundum Hippocratem Ibid. 31
Gurgulionis fuae columellae u-
fus 176.10
Gurgulio praecius perturbatione
cem, peccatus & pulmonem re-
frigerat 659.14
Gustandi actio ob quarum par-
tium affectus corruptae aut
nititur 670.46
Gustandi fenforii a quibus affi-
ciatur 672.35
Gustui bene maleuae affectio qui
fucci conferant 673.28
Gustui quae fubijciantur 1019.50
Gustui quid proprium 890.24
Gustus discretus, discretus efcu-
lentorum fubftantias arguit
184.23
Gustus qualitates quae 1063.58
Gustus fapores percipit 146.59
Q. *Gymnastica* ars quae
do fuerit exorta 163.12
Gymnastica duabus artibus in-
feruit diuerfis 165.21
Gymnastice Ibid. 9
Gymnastice legitime autores
163.55
Gypfi facultas 1111.18
Gypfi uires Ibid. 29
H
HABITU affectum quid dica-
tur 846.5
Habitudines corporis afcitur,
pulfus ut naturales immutat
571.24
Habitudines corporum quoniam fa-
cile fanguinis miffione ferat,
& quae difficulter 964.35
Habitus bonus quid dicatur
66.13
Habitus bonus quid 160.6

Habitus bonus qui laudandus
163.17
Habitus bonus faluberrima co-
ftitutio 66.15
Habitus bonus familiaris & di-
familiaris in quo confiftat
154.51
Habitus bonus fimpliciter 67.49
Habitus de quibus dicat 67.44
Habitus non fimpliciter bonus
Ibid. 51
Habitus quae uirtutes uocentur
143.12
Habitus fimpliciter boni & ma-
li coeufentia difcrepantia
67.65
Habitus fimpliciter bonus ad
fumum perueniens, rufifim-
mus ad affectibus 67.63
Hadrianus Romanus confilium
audiret facilius, manus cauas
a pofterioribus, ad anteriora fpe-
ctantes obtederat auribus. 176.
Hae di biliofi apti 890.54 (37
Hemorrhoides lapide comode ocula-
ribus medicamentis mifcetur
1117.55. 1219.62
Hemorrhoides uires 1119.45
Hemorrhoidis cuius fit facultas
1081.29
Haemoida quid & unde 671.8.
712.65
Haemorrhoidis arteriaca 1241.63
Haemorrhoidis & celiaci quid
conueniat 1098.3
Haemorrhoidis medicamen Cor-
neum 1263.61
Haemorrhoidis remedia ab An-
dromacho fcripta 1244.64
Haemorrhoidis remedia ab Afcle-
piade fcripta 1245.23
Haemorrhoidis curatio 1244.28
Haemorrhagia quibus modis fiat
667.56
Haemorrhoides aperientia quae
1058.32
Haemorrhoides capta aperit
1090.41
Haemorrhoides fuffetes fuppreffis,
quorum bonorum atque ma-
lorum fuit caufa 986.44
Haemorrhoides fupprimunt fe-
ctis cubiti uenis: prouocantur
autem ifis quae in cruribus funt
percutis 992.18
Haemorrhoidibus, aut melftruis
fuppreffis, fanguis effe detra-
hendus 993.58
Haemorrhoidibus remedia Al-
clepiadis 1265.35
Haemorrhoides quae dicat 703.62
Haemorrhoides & haemorrhoides ho-
minibus inimiciffimi 1273.46
Halicaubi facultas 1112.17
Halitus poft fpiritu tenuiffimus
88.46
Harmo-

- Harmonia quid 138.4
 HÆMECTICA cognita, refrigerantia extrinsecus admoventur cordi 807.33
 Hæcticæ ardentibus solent superuenire 786.63
 Hæcticæ cui erysipelas affertur sit coniunctas, curatio 807.47
 Hæcticæ cum diarriæ in quo conueniant, & in quo discrepent 806.59
 Hæcticæ exquisitæ uocæ 808.8
 Hæcticæ interdum ab initio inuadunt similem habentes cum ephemeris generatione 787.
 Hæctica sæpe absque sicca (7 te consistit 788.60
 Hæctica ex septo transuerso ortâ dyspnoea & delirium excipit 909.12
 Hæctica miscetur interdum cum putrida 790.8
 Hæctica qui ab initio prehendantur 789.33
 Hæcticarum quædam ægræ, quædam facili curantur 787.13
 Hæctica, dum ad balneum accedunt nihil iuuantur, nisi in frigida sint demissa 912.12
 Hæctici ex septo transuerso quomodo dignoscantur 909.19
 Hæctici quomodo sunt per quatuor partes balnei tractandi 913.49
 Hæctici statim sunt refrigerandi omni ratione 913.35
 Hæctici humidi & frigidi conuenire nutrimentum 913.7
 Hæctici omnibus quodnam sit commune 788.57
 Hæcticorum uicibus ratio 919.9
 Hæctice facultas 1087.49
 Hedyari uires 1081.20
 Helenij succo infectæ sagittæ letales sunt 1215.24
 Hellis uis 1122.61
 Helleponticæ Andromachi compositio & uires 1181.39
 Hemerocallæ quæ habeat uim 1081.25
 Hemierianæ causa 1207.38
 Hemierianæ curatio Ibid.41
 Hemierianæ descriptio Ibid.46
 Hemierianæ frigida quæ opulentur 1208.18
 Hemierianæ inueteratæ remedium 1207.55
 Hemierianici qui dicantur 746.43
 Hemina fuit æqualis nouem uncie libræ Romanæ 1153.30.
 Hemina pro uinctis (1180.64 nouem accepta 1200.64
 Hemirritæ duplex generationis modus 794.57. 796.3
 Hemirritæ adiuuat quæcumque mirantur tertianam 811.10
 Hemirritæ aliquando intermittit Ibid.37
 Hemirritæ constat ex biliosa pituitosaque febre per se rotas confusa, uel ex hisdem inter se complicatis, quod fieri quadrupliciter potest 634.39
 Hemirritæ est continua 795.52
 Hemirritæ exquisita quomodo constituitur 795.17
 Hemirritæ inuadit cum horrore 794.48
 Hemirritæ qualis Ibid.46
 Hemirritus quibus magis sit familiaris 811.33
 Hepar est agreste pecus 1212.10
 Hepar à liene purgatur 704.45
 Hepar amplectitur uentriculū 120.
 Hepar anierinum uicis cōmendatur 198.31
 Hepar à quatuor instrumentis purgatur 129.3
 Hepar benigno & crasso nutritur sanguine 123.22
 Hepar calidū & humidum facili corripitur morbis à putredine & uinosis humoribus ortis 822.62
 Hepar celerrimè ex sanguine gigni 121.64
 Hepar cuius facultatis principium & sedes 122.5. 129.48
 Hepar cur paruis arterijs induguerit 123.35
 Hepar & lien scirrhus quare opportunissimum 939.24
 Hepar & lien similia nutrimenta & medicamenta requirunt 940.3
 Hepar inducit sanguini extremum ornatum 127.55
 Hepar in prima generatione, inter tria animalis membra, apparet maximum 122.43
 Hepar lupinum cōfert hepatici 1235.61. 1257.51
 Hepar quare multo magis dicendum sit initium uenarum, quàm cor arteriarum 140.36
 Hepar quibus inflammatis, atrophia laborant 516.3
 Hepar, renes & testes, crassi sunt succi 407.3
 Hepar uenarū, sanguinis, & nutritiæ facultatis initium 129.17. 109.47. 118.63. 106.52
 819.40. 696.61. 766.3. 805.55. 817.64
 Hepar uenis facultatem suppeditat 888.41
 Hepate affecto alteratur totius corporis color 716.15
 Hepate affecto qualia excerni soleant 766.64
 Hepate inflammato, quæ uenæ secundæ ueniant 974.54
 Hepati ac uenis non usquequod fuisse opus arterijs aut uenis in prima generatione 106.61
 Hepatica sunt mixta ex astringentibus & relaxantibus 1253.59
 Hepatici qui dicantur 1255.61. 689.54
 Hepaticæ malagma cōueniens 1185.31
 Hepatici medicamentis ex astringentibus, quædam admiscenda, & quæ aromaticis uim obtineant
 Hepaticæ remedia Andromachi 818.6
 Hepaticum catapotium 1257.30
 Hepaticus passillus Ibid.55
 Hepati neruus cur exiguus 121.
 Hepati obfesso phlegmone quales clysmi cōueniunt 199.16
 Hepatis actio, sanguinis est generatio 766.47
 Hepatis affectus quomodo à pleuritide discernatur 716.6
 Hepatis, aliterarici laborante exculatæ, qualia excreuitur incrementa 1255.39
 Hepatis arteria 121.40
 Hepatis calidi & humidii indicia 822.57
 Hepatis calidi & sicci indicia Ibid.37
 Hepatis calidi indicia Ibid.18
 Hepatis caro, sanguificationis primum organum uenarum principium 121.18
 Hepatis cataplasmas miscenda sunt astringentia 923.40
 Hepatis causa & gibba, quæ parte sunt uacuanda 817.60
 Hepatis cauo phlegmone obfesso, uenæ meseraicæ similiter inflammantur 819.56
 Hepatis corpus emollientibus moderatis eget 1258.15
 Hepatis cum cæteris colligatio 121.20
 Hepatis erysipelate affectu accidentia 765.37
 Hepatis & lienis obstructions quæ potissimum tollant 1057.46
 Hepatis & uentriculi imbecillitatis quid subueniat 1112.48
 Hepatis facultates 1255.2
 Hepatis frigidi & sicci indicia 823.8
 Hepatis frigidi signa 822.24
 Hepatis gibba pars sensus excipit 698.8
 Hepatis gibba uenas habet sine arterijs 121.16
 Hepatis gibbis inflammatis quæ adfuit symptomata 765.52
 Hepatis humidi & frigidi indicia 823.2
 Hepatis humidi indicia 823.39

Hepatis imbecillitas, in tempe-
ries est causa 154.48
Hepatis indurati curatio 977.
Hepatis inflammari cura- (47
tio 917.19. 919.43
Hepatis inflammationi necessa-
riū adeſt febris 714.51
Hepatis intemperantiū singu-
lis q̄ effectus tribuant 766.55
Hepatis intemperiei frigida ſi-
gna & ſymptomata 1255.40
Hepatis intemperiei calidæ quæ
ſymptomata ſequant 1255.15
Hepatis intemperies per cōtra-
rias ſunt ſananda Ibid.54
Hepatis languidū ab inteſtiniſ
tralienn, ſymptomata Ibi.13
Hepatis morbi unde cognosca-
tur 817.18
Hepatis nervus 221.38
Hepatis obſtructi curatio 817.
Hepatis obſtructiōes (44
ſiūt, qua parte eius ſima cum
gibbis cōiunt 1254.57
Hepatis partes affectæ quæ re-
gioneſint uacuandæ 1005.7
Hepatis partes conuexæ, quibus
excretionibus ſoluant 618.50
Hepatis partes, per quas uis, &
quibus purgandæ remedijs
919.1. 940.6
Hepatis recrementa expurgan-
na organa 319.3
Hepatis ſcicrhus in ueteratus eſt
inſanabilis, cū ei ſuccedat ne-
ceſſariū hydrops 765.65.977
Hepatis ſiccioris indicia (43
821.29
Hepatis ſimis inflammariis quæ
ad ſint ſymptomata 765.48
Hepatis ſirus 227.10
Hepatis tunica 221.37
Hepatis uenæ Ibid.41
Hepatidis uenæ conſideratio
124.53
Hepiala ſit quoq; a pituita aci-
da 794.13
Hepiala quæ ſit febris 793.5
Heraciti ſentētia de animo 70.
Heradius lapis 775.56. (57
ex Herbis, quædam cibi & medi-
camenta calida ſimul 559.50
Herophilus 115.10. 589.10
Herpes ab eryſipelate quid diſſe-
rat 952.46
Herpes depaſcens 708.52
Herpes duplex eſt 842.18
Herpes euſdem eſt generis cum
exulceratio eryſipelate 952.40
Herpes exedens, quidnam dicaſ
970.44
Herpes miliaris unde exoritur
Ibid.51
Herpes exedē & miliaris a quo
humore gignatur 707.50
Herpetis cauſa 707.48. 793.17.

860.50. 951.41
Herpetis curatio 952.63. 973.
12. 1089.53. 1099.55. 1103.
61. 1102.18
Herpetis exedentis curatio 973.
Herpetis generatio 970.43 (16
Herpetis miliaris deſcriptio 953.
HIERA Ann. patri ad ſto. (12
machicos faciens 1250.14
Hicracles cuius ſit facultatis
1118.18
Hiera cum melle conſectæ ſacul-
tas 886.53
Hiera moderata exhibitio ad
quatuor drachmas extendit
1252.22
Hiera picræ compoſitio 886.
38. 1249.26
Hiera picræ optimi medicami-
nis ad expurgandos humores
tunicis uentriculi infixos, de-
ſcriptio 1203.5
Hiera ex aloē eſt infirmior, quæ
totum corpus purgare poſſit
1249.50
Hiera ex colocynthide 1189.29
Hiera picra duplex 886.16
Hiera picra expurgat humores
acces tunicis inteſtinorū im-
bibitos 931.50
Hiera picra menſes promouet
997.33
Hiera picra quibus cōſecrat aſſe-
ctibus 726.50. 749.19.
1203.20. 124.7. 1252.18
Hiera quo pacto fiat 270.12
Hippocampi uis 1141.30
Hippocrates 343.3
Hippocrates culior & admira-
tor naturæ 76.35
Hippocrates quandam fecit mu-
lierem abortare 107.44
Hippocratus de diebus decretio-
nis ſententia 614.61
Hippocratis de ſeptimeſtri ſu-
tu ſententia 127.3
Hippocratis documēta inculta
explanauit Galenus 900.46
Hippocratis grauitas 502.40
Hippocratis patria temperantiſ-
ſima 443.5
Hippocratis Platonieſty enco-
mia 327.13
Hiſtria ſunt, quæ calida & ſicca
50.19
Hirti cruribus, ſalaces 52.30
Hirti peſtore, ualde audaces 52.
Hirudine de lapſa, cucurbi- (18
tula eſt ad mouenda 999.41
Hirudines aſſeruandi, alendi, &
applicandi ratio Ibid.23
Hirudines auſiliorū, ſale aut cin-
neriſ cipiā; ore reſperſo Ib.39
Hirudines natura ſunt frigida
Ibid.54
Hirudines ſanguinē carnis tan-

rum exugunt Ibid.48
Hirudines ut depaſcantur inex-
plebiunt, præſidendæ in cau-
da ſunt 999.37
Hirudinis cerebri uis 1274.42
Hirudinū cineris uites 1141.10
Hiſtoriam iudicari ab Empiri-
cis experientiā, & a rationali-
bus cauſa 14.26
Hiſtoriam non ſuppeditare iu-
uantiſ noticiam 14.32.
Hiſtoria omnia aut præſentiam
aut præteritorum 14.5
HOMERVS 543.42
Homineſ ab initio quo pacto ſe-
cundū uirtutem formare atq;
inſtituere oportet 314.14
Homine� terreſ ſtatuz 215.28
Homineſ onofis, qui piſces
ſint accommodari 401.10
Homineſ conſtitutio 37.32
Homineſ fortiſſimo non in den-
tibus, ſed ratione & manibus
372.30
Homini ſoli inter animalia ter-
reſtria cur diuiniſ corpus tribu-
tum 194.12. 194.4
Homineſ prærogatiua 194.56
Homineſ ſeperatiſſimi notæ 45.
Homini uires cōparant ex (62
ſapientia 274.57
Hominiſ genus haud fuit ab æ-
terno, inuit Galen. 72.43
Homineſ imperitorū inſellici-
tas tantū illuſtrior, quāto ge-
nus eorum clariſ 156
Hominiſ in eruditorū inſelicitas
140
Homineſ naturæ diuerſe 465.10
Homineſ propriæ ſunt ſimila-
res particulæ 58.23
Homo eſt omnium corporum
reperatiſſimus 44.39. 42.10
Homo in multis hallucinatur
1202.16
Homo uō abſolute, ſed per exa-
perantiſ calidus diciſ 1021.53
Homo quæcunq; cognoscit, aut
ſenſu aut ratione deprehēdit
91.1
Homo qui futurus ſit animalū
omnium regula, qualis ſit o-
portet 44.44
Homo ſolus ad amuſum rectus
incedit 168.102. 109.10. 210.3
Homo ſolus rationalis, quōd ra-
tione ceteris antecellit 123
Homo ſolus ſcientiæ capax 118
Homo ſolus ſedere poteſt 209.
28. 210.26
Homo ut corpus nudū, ſic ani-
mū artib. liber deſtituit 195.42
Hora, quod anni tempus noce-
tur 578.57
Hordei tritici diſcrimen 373.5
Hordei facultas 1090.13
Hordel

- Hordei farina dolorem mitigat 859.63
 Hordeum decorticandi ratio 1008.42
 Hordeum ex frumentaceis cibis foldm tenuans uisum est innoxium 416.17
 Hordeum haud decorticatum, prifanam magis abftergētem efficit 1008.48
 Hordeum laudaniffimum quale 371.36
 Hordeum prifanæ conficiendæ aprum, qualenam effe debeat 1008.18
 Hordeum refrigerat, exiccacit 373.4. 1008.19
 Horror auget & gignit febrem 924.36
 Horrorem inuadentem quæ inhibeat 906.33
 Horror intempetiuus cum febre, fuppuracionē inflammacionis indicat 727.54
 Horroris caufa 681.47. 906.28. 910.43
 Horror qualis affectus 711.10
 Horror tranfit in rigorem fi motus adfit 680.18
 Horror unde 455.38
 ¶ HVMECTANTIA præcifoſos nervos facile putrefaciunt 1181.16
 Humectare quæ poſſunt omnium efficaciffimæ 1035.36
 Humeralis mufculus 155.33
 Humeralis uenæ ſectio conducit particulis fupra clauiculas laborantibus 165.14
 Humeralis uena 145.11. 164.6
 Humeri articulus cur in homine longiffimè à thorace abductus 394.1
 Humeri articulatio cur luxacioni obnoxia Ibid.18
 Humeri confideratio 136.16
 Humeri ligamenta tria 194.33
 Humeri mufculi 171.20
 Humerus caret exacta ligamentorum compoſitione & fortitudine 109.4
 Humerus omnium maximè articulorū luxacioni cur fit obnoxius 183.14
 Humida in ſyncero frigore morata, ficca uidentur 58.23
 Humidi & ficci iudex effraſtus cum ratione 474.7
 Humiditatis Immodicæ, caufæ 662.18
 Humiditatu curaciones uariæ ſecundū cauſam uarietate 45.4
 Humidū apparentia differt (10 ab eo, qd uisib. tale eſt 80.24
 Humor ad uentriculum aliunde tranſmiſſus, unde dignoſcendus 886.7
 Humor attenuatus omniū primus expirat 797.33
 Humor craſſus & uifcidus in aurium meatibus unde colligat 1209.21
 Humor crudus qua ratione uacuandus 992.2
 Humor cryſtallinus 146.39
 Humor cryſtallinus octo offendi ſolet interperantibus 668.29
 Humor cryſtallinus primū ſentendi organum Ibid.12
 Humores acres admoti partib. exulceratis, horrore rigoreq. efficiunt 699.18
 Humores acres ſub cute deliteſcentes, maximum perurum inferunt 301.17
 Humores craſſiores gigni p labores, qui cū ſudore obcuſi: tenuiores autē in illis, qui abſque ſudore ſiunt 457.7
 Humores crudi & craſſi aut debent cōcoqui, aut computeſcunt 405.34
 Humores in aſperis pulmonis arteriis deliteſcentes, unde illuc conſiunt, & qua de cauſa putrefcant 588.12
 Humores omnes cum ſanguine in uenis & arteriis continentur 704.7
 Humores omniū ſanguine prædiutorum cōmunes ſunt quatuor 1119.49
 Humores pellēna intro 461.46
 Humores qui alijs celerius uacuuntur 1039.7
 Humores quādo uacuandi ſunt 1003.53
 Humores quatuor 149.65
 Humores quatuor, ſunt materię humane generationis 38.33
 Humores qui facilis & qui ægrius uacuuntur 953.28
 Humores qui in quibus temporibus redundant 350.35
 Humores qui per quas regiones ſunt uacuandi 1002.49
 Humores reuocantia ab alio 461.44
 Humores ſalſi, ſunt 701.50
 morbiſici
 Humores ſinguli quales ſunt, & quib. elemētis reſpōdeat 350.8
 Humores ſinguli quos humores gignant 660.7
 Humores, tenues reddendi ſunt ad purgacionem 1003.40
 Humores tenues ſtatim ſunt uacuandi, craſſorū & uifcidorū expectanda cōctio Ibid.12
 Humores turgere quādo dicantur Ibid.48
 Humoribus exactè coquendis procurat uatura morę diuturnitatem in uafiſ 159.8
 Humor in exulceratis partes cōfluens, quādo fit auertendus, & reprimendus: & qua ratio ne 857.58
 Humoris albuginei uſus 669.1
 Humoris bilioſi diſcrimina 369.8
 Humoris cōtenti in agnina mēbrana, uſus 306.17
 Humoris geniti iu glanduloſis corporibus utriuſq. adherentibus collo ueſicę, uſus 302.12
 Humoris pitulroſi quadruplex diſcrentia 369.4
 Humor melancholicus qui dicatur 947.58
 Humor putris quomodo fit uacuandus 917.29
 Humor uitreus 146.38
 Humorū afluxus gignit quatuor diſcrentias morborum compoſitorum 659.54
 Humorū craſſitudinem quid incidat 1113.10
 Humorū crudorum indicia 993.50
 Humorū generationes ac tranſmutationes 616.37
 Humorū mordicantiū quatuor habentur diſcrentiæ 699.15
 Humorū quatuor tēperies quæ 660.12. 662.39. 1062.1
 Humorū qui in corpore ſunt ſapores 1047.12
 ¶ HYACINTHI uis 1111.36
 Hydrocele 709.16
 Hydrocelis curatio 950.2
 in Hydrope fit humoris appoſitio, nō aut agglutinatio 76.3
 Hydropertis cuius fit facultatis 1111.46
 Hydropicis malagma conueniens 1185.42
 Hydropicis malagmara Aſclepiadis 1261.35
 Hydropicis quarum aquarum uſus conferat 1014.9
 Hydropicis remedia Archigenis 1261.53
 Hydropicos euacuandi ratio 1002.61
 Hydropicos fricādi ratio 1161.
 Hydropi recentis optimum (62 medicamen 1242.12
 Hydropis aqua non poteſt rota ſimul uacuari citra animi deliquium 965.7
 Hydropis cauſæ 604.35. 766.21. 768.62
 Hydropis cauſa prima, ſanguificacionis defectus 78.7
 Hydropis curacionis ſcopi tres 984.17
 Hydropis tres ſpecies 518.38.
 Hydrops 551.42 (709.46
 Hydrops gigni non poteſt, niſi afficiatur hepār 766.1

Hydrops quibus occasionibus
fiat 78.46
Hydroman singule species quæ
sunt aut pulsum 579.3
Hyeme augeat facultas, sed pul-
sum uis minuitur 569.43
Hyemis temperies 550.54
Hyoidei os, propugnaculi car-
tilagini cuneiformi 248.43
Hyoidei osis ligamenta dupli-
cia 248.52
Hypeconis uia 1111.63
Hyperici facultas Ibid. 57
Hypochyma, oculi totius cœu in-
strumenti est morbus 847.21
Hypochyma semel discussum
punctione, reuertit 954.57
Hypochymaria transpositio 970.
Hypocisthis 1220.27 (7
Hypoglossis ad talem faciem
1241.55
Hypoglossis Dioscoridæ Ib. 33
Hypoglossi facultas 1111.65
Hypoglossides, ad aspreddines
gutturis, interceptæ uocem et
sanguinem reiectantes 1241.4
Hypoglossides ex quibus consen-
tur 1240.50
Hypoglossides uariæ, multæ u-
læ 1241.46
Hypoglossidibus quomodo sit
utendum 1240.56
Hypoglossis Mithridatis 1241.
Hypopios, capitis cõfusiõ- (39
ne lusus sanabat 954.52
Hypophagmaris quæ conue-
niunt 1127.19
Hypopii uia 1111.2

I

IACENS si in pedes delapsus, si-
gnus est facularis extremæ la-
borantis 711.10
Iaspis uiridis quas uires habeat
Iatrice 363.1 (1118.25
ICTERICIS uidentur omnia
obscure pallere 669.65
Ictericus ex obstructione lepta-
tis quid conferat 1067.15
Ictericorum excrementa cur ci-
borum referant colore 216.59
Ictericorum remedia & curatio
1053.44. 1059.31. 1106.22.
1256.46. 1259.1
Ictericos purgandi ratio 1003.2
Ictericus ex obstructione citra fe-
brim, ex inflammatione cum
febre fit 1258.60
Ictericus per morborum iudicatio-
nem oritur, curatio 1258.48
Ictus qualitas, feritatis naturam
sequitur 556.12
Ictus quæ cominet pulsum 550.7
IDAEA radix quam uim ha-
beat 1082.18
Idem & unum quot modis di-
catur 848.28

Idioram reddit attonitum pul-
chritudo materię 215.19
Idiotarum cognitio quoniam pro-
grediatur 1052.4
Idiotarum iudicium cur incor-
ruptum 1017.10
IDIONORI ex inspirato aere
nulla accedit utilitas 908.65
Iecorini, phlegmone si infestet,
nihil actus frigidum applican-
dum est 958.31
Iecori duplex genus morborum
accidit 764.57
Iecori uia inest appetitoria ani-
mæ 126.64. 327.55
Iecoris inflammationibus quid
conferat 1109.21
Iecoris partes, per quas regio-
nes sint purgandæ 28.38
Iecoris situs 765.23
Iecur affectu quales pulsus pro-
ducit 601.46
Iecur assidue obstructionibus cor-
ripitur 28.30
Iecur canis rabidi medetur mor-
tui canis rabidi 1137.9
Iecur caprinum & hircinum qui-
bus affectibus conferat Ib. 12
Iecur in flammam quæ inducit
765.28
Iecur in nonnullis hominibus in
sinistra locorum parte 280.38
Iecur lacertis dentibus erosum me-
detur 1137.20
Iecur magnū multifidum inest
gulosi 280.32
Iecur nullius partis alterius gra-
tia alimentum permutat 341.10
Iecur nutritur sanguine crasso
& limoso 335.64
Iecur obstructum quid purget
1076.10. 1080.21. 1086.29.
1113.15
Iecur phlegmone obfessum, cur
mediocriter astringendum sit p
cataplasma mistæ materię 928.
Iecur quale nutrimentum (61
exhibeat 395.15
Iecur negetatris uirtutis & ue-
narum origo 348.45. 337.56
Iecur uelut sanguis est cõcretus
341.54
Ieiunantibus diutius consuetu-
dine, quæ contingant 79.51
Ieiuni inanitio unde 225.64
Ieiunum, secundum intestinum
semper reperiri inane 225.54
Ieiunum uulneratum, cur insa-
nabile 876.10
IGNIS genera sunt flamma &
pruna 1040.32
Ignis laud omnis est tenuis 1017
Ignis maior copia cõfluxit (52
ad utrumque nostræ generatio-
nis principium 429.22
Ignis omnia dissoluit 697.22

Ignis omnium tenuissimus & cal-
dissimus est, ob idque facili pe-
netrat 1014.64
ILLO morbo infestata sterua
euomitur 87.38
Ileon siue tenuis, tertium intesti-
num 235.57
IMMOTATITATEM nim re-
cordat 1006.65
Immoderati ad temperiem redi-
tus, per immoderationem con-
trariam fit 25.9
Immoderatum euidens non est
17.17
Immoderatum omne duplex 489.
Immodica omnia sunt præ (66
ter naturam 514.29. 831.28
Immodico nullum animal de-
stat 435.62
Immodicum omne subito truens
permutat animum, consuetudi-
nem non item 331.29
Immines ab affectibus esse, qui
non presentibus tanquam præ-
sentibus urantur 331.23
Immutatio duplex 842.43
Impecta sunt coquenda, arte-
nanda, & discutienda 1204.8
Impellere tactum solium magni-
tudinis cum uehementia con-
iunctæ 550.35
Imperigini aggregati aut ceros cõ-
gruit 1180.3
Imperigini cõgruentia remedia
1226.28
Imperius posse & d ratione, &
iracundia moueri 329.24
Impietas summa quæ 215.2
Implantationes tendonum ad di-
gitos centum & duodeuiginti
301.2
Imponere imparatis est facile
647.49
Impotentes ad mortem, quare ta-
men alia brachia aliis iaciunt
97.33
INAEQUALITAS collectina
quæ 528.54. 559.49. 589.13
Inæqualitas corporis arterię el-
se in una parte non potest, in di-
uersis potest, modia duobus
527.6
Inæqualitas creberrima, rarior
& rhythmi in uno pulsu con-
tingens, examinatur 529.3
Inæqualitas in creberrima, rara
tertiæ, secundum diuersos pulsus
Inæqualitas intermixta (528.59
in uno pulsu, mortem prælen-
tem annunciat 591.19
Inæqualitas in uno pulsu quan-
do accidit 511.40
Inæqualitas pulsus ab infusa ma-
teria 527.10
Inæqualitas pulsuum iuxta ac-
cessiones quid indices 599.30
Inæ-

Inæqualitas quantitaris dilata-
tionis, duæ sã arteriæ partes
occupant 556.48
Inæqualitas ferratilis pleurinci-
pum maximè propria 516.15
Inæqualitas unius pulsus cur la-
teat interdum 594.3
Inæqualitas unius pulsus, lon-
gè est quàm collectina deter-
rior 591.16
Inæqualitatis ex situ arteriæ cau-
sa 564.19
Inæqualitatis motus in nno pul-
su 325.33
Inæqualitatis vitalis contentio-
nis differentia 326.60
Inæqualiter inæqualia quæ no-
minantur 322.39
Inæquium inæqualitatis differe-
rentia 523.14
Inanito duplex 418.13
Incidendi facultatè quæ habet
414.48
Incidentia qualia esse debent
304.3.34
Inclinatio corpora in anterio-
ra, celeritatis motum iuvat
329.10
Inclinatio omnibus inest homi-
nibus, ad appetenda bona, ma-
la propulanda 72.23
Incôinena qui uocetur 329.43
Incrementi terminus unde pos-
sit dignosci 635.9
Incrementum morbi 717.8
Incrementum morbi unde cõ-
scere oportet 622.17
Inculpari sim in omni genere
ceteris cœ regula præponat
418.46
Indicatio ab ætate, natura, regio-
ne, anni tempore, & statu cœ-
li, quando similium & dissimi-
lium habetur 896.18
Indicatio à facultate sumpta, cu-
rationem immutat 775.46
Indicatio à febre sumpta, reliqua
superior existit 896.37
Indicatio à particula sumpta ne-
cessario 941.29
Indicatio à nris, sumpta in plu-
rium dierum febris, maxi-
mè est momenti 905.14
Indicatio à virtute omnium pri-
ma sumitur, non tamen cura-
tionem nos docet 902.21
Indicatio curatio à causa præ-
sente sumitur 888.32
Indicatio curatio generalis si-
ma est unica, videlicet contra-
rietas 905.19
Indicatio internarum partium
omnium cõmunis 881.32
Indicationem consentientem non
fieri ab affectibus 12.26
Indicationes agendorum in pu-

tridis febribus, unde petendæ 904.51
Indicationes à laborantis tem-
perie sumptæ, diuersam habet
rationem ab illis, quæ ab ulceri
differentia sumuntur 861.7
Indicationes febrii diuersarum, &
earum quæ pluribus diebus as-
surgunt, unde sumuntur 896.53
Indicationes in putrida unde
sumendæ 918.45
Indicationes medicatrices unde
sumantur 902.28
Indicationes morborum corpori
simplicium sunt octo, particu-
lares 904.1
Indicationes quatuor sumuntur
ab affectu partibus 974.5
Indicationes remedium unde
sumantur 914.64
In indicationibus contrariæ expen-
denda magnitudo eorundem, q̃ ad
indicationem consertit 896.25
Indicationibus contrariæ una
cõsistentibus, compositum sit
medicamentum 939.32
Indicationibus inter se pugnan-
tibus, qd̃ in scopia indicantur,
sunt perpendendum 915.18
Indicationum dignitates sunt tres
mandæ 902.5
Indicationum primarum sunt duæ
differentiæ 831.14
Indicatio quando à febre, & q̃si
à febrili causa sumenda sit
904.17
Indicatio quid 12.62. 848.3
Indicatio remedium à natura
partis laborantis desumpta, est
multiplex 887.47
Indicatio uera ab efficientibus
causis inuestiganda 17.14
Indicatio utilis nulla, sumitur à
causa non permanente 818.22
Indoles & natura cuiusq̃ explo-
randa in puerili ætate, dein
unumquemq̃ artem nature
sue aptam docendum 335.21
Inductio ex p̃lia ualidior 1022.
Indurantia sunt frigida &
humida 1036.47
Indurantia qualia medicamenta
conueniant 977.2
Indurantium uariæ modendi ra-
tiones 1033.5
Inedia aduersatur calidia & sic-
ca natura 906.51
Inedia post uenæ sectionem cum
magno dano adhibet 988.30
Inedia, quæ symptoma indu-
cant 988.3
Inedia ut euacuent phlegmo-
nem, longum tempus deside-
rat, ex quoq̃ uniuersum cor-
pus inanitur 988.23
Inediam & uenæ sectionem si-
mul circa unum cundemq̃ æ-

grum non esse usurpandam
989.13
Inediam longissimam ferunt, qui-
bus corpora crassis succia re-
dunt 927.60
Inedia non esse utendum in cau-
sa biliosa 1204.27
Inedia non, sed curia raritas eu-
cuar 987.46
Inedia, priuatio cum sit, nec nu-
trire, nec iuuare potest 987.
55
Inedia tridiana, ex ephemeria fe-
bres reddit aciores 931.65
Inedia uacuat, sed longo tempo-
re, & cum periculo 985.42
Inedia longia quæ incommoda
superueniant Ibid.55
Infans solo lacte nutritus, do-
nec primos emittat dentes
414.14
Infantes cur glabri 51.32
Infantes mulcendi ratio triplex
412.46
Infantes natura prop̃si ad mu-
scent, ac exercitia Ibid.32
Infantes ne incidant in nehem-
tes motus, cauendum 411.50
Infantes quatuor artibus qua-
drupedum instar gradiuntur
108.2
Infantes quibus de causis plo-
rent 411.57
Infantiactiones naturales ro-
bustissimæ: animales admo-
dum esse imbecilles 124.15
Infantibus morionem triplicem
excogitantur nutrices 412.55
Infanti priusquàm inuoluatur sa-
lem esse inspergendum 412.17
Infantia alimentis, lac & balnea
432.21
Infantis corpus frigidum oleo
dulci, idit post longissimū so-
mnum 414.17
Infantium ætas habet naturales
functiones multo uelimen-
tiores, q̃ reliquæ ætates 431.50
Infantuli educandi ratio 431.15
Infantuli olim apud Germa-
nos, primum ædii in lucem,
demergebantur in frigidam
414.61
Inferiora hinc omnia recipiunt
ornamentum à superioribus
617.8
Infirmatate attrahentia expel-
lentis facultatis causa 417.14
Inflammata ab acris causis exaspe-
rantur 1217.19
Inflammatio calidus est affectus
733.20
Inflammatio erysipelatosæ quæ
dicatur 707.64
Inflammatione incipiente, repe-
lentibus est utendum 1000.26

Inflammationes diuersarū partium, uaria symptomata inducunt	574.4
Inflammationes in alio corpore, cur medicamenta acriora possint, quam pro phlegmones natura	940.44
Inflammationes nō statim in principio soluendæ	635.4
Inflammationes omnes euacuandas censet Erasistratus	987.64
Inflammationes oris quid sanent	1129.15
Inflammationes quæ excretionibus soluant	638.41
Inflammationes quæ febres faciunt, ut plurimum ex plenitudine fiunt	988.41
Inflammationes quando scari candæ	971.16
Inflammationibus cunctis commune est immoderata caliditas	970.1
Inflammationibus decrefcentibus cura duritiem quæ pharmaca conueniant	1202.4
Inflammationi cur adhibeant cataplasmata calida & humida	859.57
Inflammationi incipienti, uigenti & inclinanti, quæ conueniant pharmaca	1214.3
Inflammationis causa & curatio	636.14. 715.25. 970.30. 971.50. 988.39. 1031.57. 1035.34. 1186.1. 1230.47
Inflammationis causa una est fluxio	971.39
Inflammationis humidæ multiplex differentia	970.35
Inflammationis ortus à sanguine indicia	Ibid.12
Inflammationis prima differentia	Ibid.6
Inflammationis tempora quatuor quæ	719.54
Inflammationi suppurandæ cōgruere cataplasma ex farina triticea, quæ in oleo & aqua ebullierit	972.55
Inflammationū circa uulnus aut contusionē cōtingentiū causæ	798.59
Inflammationum incipientium curatio	1212.62
Inflammatio quid	659.63
Inflammatio seu phlegmone quod inflammatio quomodo se habet superueniat	798.62
Inflatio ab ordemate quomodo differat	946.15
Inflationes inueterate quomodo curandæ	Ibid.58
Inflationes uiscerum quomodo discutiantur	Ibid.12
Inflationibus quæ competant	1101.34
Inflationum scopi	946.19
Influxus repellentia	1216.35
Inguinis suppurati sectionis forma	935.54
Inguinum glandulæ quorū productæ fuerint	315.63
Inguinum inflammatio, ex optimo sanguine fit	636.30
Inguinatorū cibo diastole & systole qualis	309.34
Initum à natura constitutum, cogit disciplinam à seipso fieri	339.47
Initum dilatationis arteriæ, & cōtraktionis finis, cur nostrū sensum effugiat	541.53
Initum inuicutionis opimum quod sit	359.9
Initū morbi quod sit	609.37.
717.5	
Iniugem arteriam mitti singulis uisceribus unam	147.62
Insalubre corpus simpliciter quod sit	814.22
Insalubre corpus ut nunc, quod sit	Ibid.15
Insalubria quæ dicantur	813.57
Insalubria signa quæ	815.17
Insalubria simpliciter facile à morbificis causis superantur	816.6
Insanientes cōmuniter collocantur in tenebris	16.8
Insatiabilitas fundamentū est omnium cupiditatum	426.5
Inseparabilia sunt ab omni latuone tempus & spacium per quod mobile corpus mouet	490.31
Insomnes qui degant	701.17
Insomnia quæ, quos humores referant	652.49
In insomnia cōsiderandis, quorum ratio sit habenda	652.56
ex insomnia quorū corporis dispositione cōiecturis deprehenditur	652.47
Inspirandi compositione difficultates sunt numero quatuor, totidē similiter expirandi	495.48
Inspiratio expirationi contraria	102.45
Inspiratio expiratio quomodo contingat	123.18
Inspiratio fit thorace dilatato: expiratio, eodem depresso	648.38
Inspiratio in cerebrū ad uitam necessaria	354.50
Inspiratio libera	322.28
Inspiratio maxima fit externis intercostalibus musculis	102.50
Inspirationē quod efficiat	102.47
Inspirationes ab exhausto spiritu quales	492.3
Inspirationes augescentiū & decrefcentium quales	492.18
Inspirationes ob calorem excessum quales	Ibid.2
Inspirationes ob immodicū frigus, quales	Ibid.1
Inspirationis cū expiratione colano	495.55
Inspirationis duplex refractione	677.7
Inspirationis magnæ & uelocitatis causa	497.49
Inspirationis modus	129.36
Inspirationis paruitatem densitas & uelocitas sequitur, si facultas robusta fuerit	494.20
Inspirationis usus	251.56
491.22	
Inspiratio quid	522.38
Inspiratio parua simul & uelox	497.57
Inspiratio subtilis quæ fit dicenda	757.5
Inspiratio refrigerat innatū calorem, expiratio eundem purgat	508.6
Inspiratio, uoluntaria est actio	351.38
Instrumenta inuentionis sunt duo, ratio & experientia	841.49. 842.19
Instrumenta inueniendorū remedium sunt duo	849.19
Instrumenta iudicandi ultra actiones duo sunt à natura data, ratio & experientia: quorum alterum aliterius semper indiget ope	1248.10
Instrumenta nutritioni seruientia, uaria	75.50
Instrumenta prima quæ dicantur	657.65
Instrumenta quibus omnia inueniuntur dogmata sunt duo, ratio & experientia	33.62
Instrumenta quomodo fiant cōtumentia	562.46
Instrumenta secunda quæ dicantur	658.18
Instrumenta singula geminā habent facultatem	85.49
Instrumenti functione quomodo ueniat	658.28
Instrumentorū excrenentia excrementa destinatorum duplex ratio	229.65
Instrumentorum morbi	684.1
Instrumentorum naturalū & animalium discrimen	710.2
Instrumentorum naturalū singulorum duodecim attribuunt symptomata	666.47
Instrumentorum singulæ inest unica particula, cui tota actio tribuitur	66.23
Instrumentorū uicia quomodo inæqua-	

inequales pulsus efficiant
560.14
Instrumentorum uitium uel integritas in magnitudine, numero, figura & situ consistit
22.40
Instrumentū molle facile dilatarī, contrā ſi durum 556.13
Instrumentū primū unius functionis gratia conditū 37.52
Instrumentum quid 341.46
Instrumentū uicium pluribus actionibus ſufficit 255.12
Intellectus & memoria ad omnes artes necessaria 428.7
Intellectus intelligibilis iudex eſt 352.17
Intellectus temperiem ſequitur 256.51
Intelligētī partū ariditas 70.16
Intemperantiæ frigide capitis & uentriculi quomodo ſuccurrendum 450.33
Intemperantiæ partiū ſunt oſio, quæ per contrarias qualitates reducendæ ſunt ad mediocritatem 1249.3
Intemperantiæ quando ad melius ſint traducendæ, & quando ſic conſeruandæ 831.62
Intemperantiarū genus eſt duplex 889.18
Intemperantiarū quæ magis ſint febribus obnoxie 895.25
Intemperantibus cur nō ſit mendum 992.25
Intemperantiæ calidis frigidis uē, cur ſemper contraria exhibenda 475.2
Intemperatū quoduis facilis ad propriā naturā redit, ſi ad temperamentū optimū 471.20
Intemperaturæ ſola alteratione ſauantur 814.19
Intemperiei æqualis & inæqualis diſcrimen 62.5
Intemperiei calidæ ſymptomata 767.18
Intemperiei differentie 904.9
Intemperiei inæqualis differentie, naturam affectuorum corporum ſequuntur 62.25
Intemperiei ſanitatis nota quæ 40.56
Intemperies calida & humida maxime putredinis morbis eſt obnoxia 894.62
Intemperies calida & ſicca ad febres excipiedas opportuniſſima 895.23
Intemperies collatæ ad cutim oſio ſunt 45.5
Intemperies dolorē inſert 731.61
Intemperies dum ſunt in ocio, contrariis corrigendæ: ut ſeruandæ ſimilibus, dum ſibi uacare

non poſſunt 472.6
Intemperies æqualis cur nullo afficiat dolore 679.53
Intemperies eſt oſtiſplex 1254.47
Intemperies eſt ſanitatis & morbi 49.52
Intemperies frigida & humida, quā ab inedia iuuetur 895.16
Intemperies humida omniū facillimè curatur 885.49
Intemperies inæquales, dolores pariunt 679.59
Intemperies inæqualis quæ ſit dicenda 662.35
Intemperies inæqualis quotuplīter contingat 61.60
Intemperies morbi quæ 49.53
Intemperies omnis maximè afficiat facultati 677.51
Intemperies omnis, morbus eſt 667.46
Intemperies per contraria curandæ 832.21. 915.1
Intemperies primorū morborū cauſa, & quare 79.42
Intemperies quæ intra ſanitatis fines conſiſtunt, per oſia quidē contraria poſtulant: per labores autem ſimilia 471.9
Intemperies ſanitatis quæ 49.54
Intemperies ſiccæ ſolidā aliquā ſolam partē occupantes, nunquā integrè ſanabuntur 883.60
Intemperies ſicca in ægriis eſt, quod ſenium in ſanis 881.7
Intemperies ſimplices per contrarias qualitates curantur 976.16
Intemperies uehemēs omnis uires deſicit 685.10
Intemperies uentris à quibus gignantur 437.5
Intemperies uitioſa quando ſeruanda, & quā alterāda 915.28
Intemperies una per ſe durare diu non poteſt 473.14
Intentiones circa ſalubre & iuſalubre, ſunt qualitas & quantitas exigendorum 830.24
Intentiones animalium concoſtu difficiliora ſunt, quā caro 409.3
Interiſſe ob ciborum inopiam neminem 987.18
Interrere nullum animal poteſt, niſi cor à munere agendi ceſſet 1016.40
Interritus modi ſunt quatuor 802.62
Intermiſio arteriæ periculofior eſt alijs inæqualitātibus cunctis 589.20
Intermiſio in pulſibus ſit ne naturalis, an non, quomodo diſgnoſcenda 652.36
Intermiſio quid uoceſt 622.24

Intermittentium ſingula, quarum partium leſiones committuntur 958.27
Internodium ſecundū unde mouetur 153.20
Intertrigines ſemorum quid ſauiet 1123.12
Intertrigines quid ſanet 1101.64
Inteſtina ad diſtributionē condita 219.62
Inteſtina craſſa ſanata ſunt facilia: tenuia, difficilia 876.8
Inteſtina quorū uariè inuoluta 233.55
Inteſtina, naturæ Inſtrumenta ſunt 102.21
Inteſtina nec attrahere nec retinere neceſſum eſt 229.28
Inteſtina non indigent tractatione ſaculare 219.50
Inteſtina non trahunt à uentriculo 771.45
Inteſtina ſola duabus conſiſtant runicis, quarum ſingule ex fibris trāuerſis conſiſtunt 86.4
Inteſtina ſuprema, cibo & potu: in ſima clyſtis curant 726.53
Inteſtina terræ, ſiue lūbrici quū uim habent 1141.43
Inteſtini craſſi dolor ut dignoſcendus 732.20
Inteſtiniſis cur duplex ſit tuuica 180.18.224.15.103.44.932.15
Inteſtiniſis dolentibus quæ opitulentur 1032.47
Inteſtiniſis exidentibus per abdomen uulnus, quid agendum 875.5
Inteſtiniſis exulceratis quomodo ſuccurrendum 861.28
Inteſtiniſis ineſt uis expellēdi inteſtantia 688.50
Inteſtiniſis ſuperioribus uel inferioribus exulceratis, quomodo ſuccurrendum 769.33
Inteſtino aliquo uulnerto quid agendum 876.5
Inteſtinorū curatio facilior aliarum internarū partium, & cur 704.34
Inteſtinorum dolores ubicunq; ſint, iuuant à bibitis erper ſedem inteſtis medicamentis 978.12
Inteſtinorum doloris cauſa 770.38
Inteſtinorum fibre plerūq; circulares 180.22
Inteſtinorum morbus lenientia 894.21
Inteſtinorum natura & ordo 180.41. 225.50. 770.24
Inteſtinorum obuolūno diſtributionis gratia facta 125.27
Inteſtinorum ſubſtantia nō multum à uentriculo diſfert 223.49

Intestinorum ulceribus quara-
tione medendum 869.33
Intestinorum utraq; tunica ul-
los habet transuersos 219.46
Intestinum rectum 178.4
Intestinum rectum quibus inni-
tatur 103.31
Intero quæ propinanda non sunt
861.38
Intybi uel seris facultas 387.43
Inuentionis organa sunt duo, ra-
tio & experientia 989.48
Inuidia dolet ex alicuius bonis
424.13
Inuidia omnium uitiorum fœdissi-
mum 424.11
Inuidia, caloris iuxta cor est fer-
uor 660.53
Iracundæ nationes quæ 55.10
Iracundia dum illi timor est ad-
iunctus, pulsus inæquales ef-
ficat 560.6
Iracundie comites pulsus qui
554.64
Iracundie quæ superueniant
335.35
Iracundia est ueluti iunati calo-
ris feruor 560.3
Iracundie uis 475.30
Iracundia ignem reddit calore
insum 73.13
Iracundiam à natura esse tribu-
tam rationi contra cupidita-
tem 335.61
Iracundiam, caloris abundantia
excitat 71.40
Iracundiam esse actionē & affec-
tum, secundum uarias animæ
partes 336.40
Iracundia quibus fit excitanda
341.35
Iracundia quid Ibid. 39.
781.65
Iracundia se naturaliter habens,
opinionem rationis sequitur
336.14
Iracundia si non uinci potest, at
certè reprimat à nobis 431.49
Ira cur nemo perierit 681.13
Ira cur partes extremas calfa-
ciat 681.58
Ira furore refrigerato, pruden-
tius uindicta sumitur 411.4
Ira sentiens impetus nihil ab insi-
nia differt 422.15
Ira sentium deformitas Ibid. 37
Ira ueluti feruor calor in corde
444.24
Iris agrestis cuius fit facultatis
1080.17
Iris uel corona quid 266.19
Irrationalium animæ partium ir-
rationales uirtutes esse: ratio-
nalem autem, solius rationis
uirtutis 334.40
Irrigationis capitis dolori quæ

conueniant 1204.33
Q18 A T18 utraq; quæ uim possi-
deat 1082.45
Ischemon Andromachi 1215.54
Ischiade urgente, acribus non est
utendum ante euacuatū cor-
pus 1268.33
Ischiadibus quid prodest 1082.1.
1088.40
Ischiadicæ cataplasma 1185.18
Ischiadicis confert uena scēta in
cubero, & uomitus 1268.37
Ischiadi quæ medicamentā in prin-
cipio conueniant Ibid. 33
Ischias à sanguine orta, scēta in
poplite uena curatur 997.18
Ischias raro oritur à sanguine: si
autem oritur, quomodo cu-
retur 1268.27
Ischuria naturalem functionem
colubet 676.54
Ischuria quid & quando acci-
dat 773.27
Ischuria quorum fit symptoma
690.37. 773.27
Isis Epigoni, ad multa medica-
men utile 1176.53
Isis emplastri uires & compositio
1175.12
Istius ossa 254.58
Istriorum compositiones, & no-
mē 371.6
Q1 V C V M D V M, genere est du-
plex 1043.47
Iudasci lapidis uis 1118.45
Iudicatio imperfecta, infida uel
incerta, periculosa, obscura,
malæ absolutæ, firma, tuta, ma-
nifesta & bona dicitur 607.59
Iudicationis morborum diutur-
norum tempus constitutum,
est annus 619.17
Iudicationum differentie uarie
607.59
Iudicatio quæ in morbis attri-
ctis, fluentibus, & complica-
tis 7.33
Iudicia fieri per sensum instru-
menta, & facultates instrumen-
tis utentes 351.44
Iudicia maiori ex parte in acci-
sionibus sunt 609.63
Iudicia morborum acutorum ex nu-
mero dierum impari, longorū
ex pari sunt 617.1
Iudicia quæ in accipiti sunt, qui-
bus diebus sine tribuenda 610.10
Iudicij iam facti & faciendi co-
gnitio ad quid prosit 614.54
Iudicia rerum sensui euidentium
atq; occultarum differre 10.14
Iudicij naturalia instrumenta,
quæ cunctis cōmunia adiunt
352.26
Iudicium naturale singula iudi-
cat 4.15

Iudiciorum tractus differre, quod
dierum decretoriorum 607.49
Iudicia rerum intellectui periculosa
uide famulari 10.13
Iudicium rerum quæ ostensio-
ne cognoscuntur, unde 10.10
Iugalis omnia consideratio 131.16
Iugulares uenæ 143.28
Iugularium uenarum confide-
ratio 145.4
Iugulorum consideratio 136.24
Iulus 109.47
Iunci læuis facultas 1109.27
Iunci quadrati facultas 1091.64
Iuniperi fructus facultas 382.
59. 1073.2
Iuris albi compositio 464.34.
1200.11
Iuris albi condimentum 400.60
Ius album 599.25
Iuscula omnium concharum, atq;
annosorum gallinaceorum, al-
uum subducunt 416.23
Iustitie diuini proprium 272.53
Iustitia nascitur ex symmetria
mutuæ trium animæ partium
343.8
Iuuans quo pacto percipiat ex
analogismo 122.51
Iuuans per indicationem pate-
fiunt 12.44
Iuuenibus ætate florētib; iu-
las, utulinas, atque herodinas
carnes congruere 392.35
K
K1 adaperi siue K1 adaperi 356.18
K1 adaperi 355.2
K1 adaperi 351.6
K1 adaperi, tam ex uaricosus 709.
K1 adaperi articulus inferioris (32
maxillæ 281.33
K1 adaperi, canis rubi fructus 382.
56
K1 adaperi, intestinum quintum 225.59
K1 adaperi corpus 856.59
L
LABDOCIDES 191.36
Labdoceides sura quæ 122.35
Labia osium in digitis 199.7
Labij inferorum musculorum
principia quatuor 279.28
Laborum cutis 279.13
Laborum motus octo 169.40.
279.32
Laborum motus rectus fit à duo-
bus obliquis 279.40
Laborum munus 93.45
Laborum musculi unde 168.12
Laborum uerui 169.45.
263.30
Laborum substantia 169.36.
279.18
Labor cibum præcedat 438.54
Labor in quibus debeat cibum
præcedere 471.50
Lac autantium boni habitus,
boni

INDEX.

- boni est succi 407.55
 Lac afininū cum melle sumptū non cogitur 913.11
 Lac afininū multum habet substantie serosae 396.10
 Lac afininum plenum feri est 1118.12
 Lac afininum quale 469.44
 Lac afininū raro alicui in uētre cogi, & cur 396.6. 469.49
 Lac afininū sicci affectibus maxime congruum 881.18
 Lac afininū solum utile renibus calculosis cum totius corporis siccitate 481.60
 Lac auxiliat hī, qui uenena erodentia uorauerunt 1118.55
 Lac caprillum moderate se habet inter cetera 406.15
 Lac caprillū sine melle sumptū, periculofum Ibid.31
 Lac caprinum quale 469.45
 Lac caseosum quibus plurimum nocet 396.13
 Lac collutum anginā lenit 1118.
 Lac cur genuerit naturā 297.12
 Lac denibus aduersissimum 469.10
 Lac & semen ex sanguine exacte coctio gignuntur 315.18. 349.9. 349.47. 412.43
 Lac ex quibus substantijs coctet 396.7. 1047.10
 Lac germanū est sanguini menstruo 300.50
 Lac homini recens nato propriū alimentum 307.55. 412.43
 Lacryma Cyrenaeica per se nō tuiō sumitur 57.60
 Lac hī non adeit, quē non gerūt utero 986.35
 Lac hī nō gignitur, quibus mens cessatur Ibid.19
 Lac incens in utriculi ingentem calorem, tantam dulcedinem contrahit, quantam mel amittit 1047.39
 Lac lapillos ignitos, uel ferreos orbiculos quod extinxit, aluum fistit 395.60
 Lac muliebre nobis familiarissimum 407.49. 1127.65
 Lac muliebretibus maxime congruum 870.4. 881.14
 Lac non simulare est 1016.46
 Lac nunquam amarū efficitur 1047.17
 Lac omne thoracis ac pulmonia partibus prodest 396.17
 Lac omnium facillimē alteratur 1117.61
 Lac optimum quale 396.36. 881.56
 Lac optimum optimi est succi 396.17
 Lac quibus animalib. colligi in pectore uequeat 149.43
 Lac quib. modis scindat 397.3
 Lac quibus noceat 396.19
 Lac quib. fit exhibendū 469.50
 Lac quomodo in alienas qualitates mutetur 1047.46
 Lac saue pulmonis ulcera 396.11
 Lac feri plurimū habet 407.46
 Lac si in aere aliquādiu immoretur, mutatur promptē 881.11
 Lac statim ubi est multum hauriendum 406.16
 Lac tabiarum 869.63
 Lac tantes non purgant 986.11
 Lac tannus a uenere abstinent, & quare 414.14
 Lac ubi fit 179.16
 Lac mensibus gignētis eadē & uictus & medicinae ratio desideratur 1061.16
 Lac quando mel & sal inhiçient dum 870.9
 Lac comoda 469.33
 Lac crassioris facultas 406.
 Lac differētie 395.47. (19 406.15
 Lac elaborationi quae conferant 249.65
 Lac & menstruorum una est substantia 986.17
 Lac & feminis effectrices facultates 1061.63
 Lac generationem quae prohibent 1061.18
 Lac gignendi ratio 1061.6
 Lac in uentre corrupti nota 913.19
 Lac muliebris usus commodissimus ulcerosis cornu exstet 1117.43
 Lac noxū quae corrigit 396.43
 Lac optimi notae 414.14. 1117.53
 Lac partes quae magis, & quae minus alant 397.11
 Lac serosi facultas 406.18
 Lac sero usi sunt ueteres ad deiciendam aluum 396.12
 Lac seruū aluū mouet 406.19
 Lac serum quam uim habeat 1128.11
 Lac substantiae caseosae facultas Ibid.18
 Lac substantiae diuersae 1273.4
 Lac substantia triplex 406. 11. 1118.15
 Lac temperies 1061.3
 Lac uiriosi notae 414.17
 Lac usus 1127.57. 1128.36
 Lac usus assiduus nocet denibus ac gingiuis 396.40
 Lac usus maximum & commodum praecipuum 870.6
 Lac utque facultates 59.12. 1081.4
 Lac utque semē soporiferū 415.6. 738.40
 Lac utque succus liberaliter sumptus similem cum papaueris succo facultatē fornī 59.45. 1036.51
 Lac utque succus si integer ad cor peruenierit, perimet non secus ac cicuta 1036.18
 Lac refrigerat & est somnifera 387.38
 Lac uaccinū dyentericos sanat 1174.59
 Lac uel in nidore uel in acorem uertit, caloris ratione 396.57
 Lac unius alimentū recementum 149.43
 Lac ex uino triti uires 1174.
 Lac ex facillimis 1087.19 (8
 Lac ex esse sordes ab hircorū barbis desumptas 1191.31
 Lac ex & corruptentia corpus, genere sunt duplicia 419.
 Lac ex diffundit calor per totum corpus 573.8
 Lac, medium inter conuexum & concuum 271.13
 Lac, quibus sunt exasperanda 816.15
 Lac ex aceto sunt subtiliora ex uino magis cicatricem obducunt 1174.30
 Lac opus cuius fit facultas 1091.33
 Lac pilula lumbis haerens, facit contra nocturnas ueneris imaginationes 483.31
 Lac lampantes facultas 1091.40
 Lac ueniendi ratio 1139.45
 Lac succida quam uim habeat Ibid.57
 Lac uita quam uim habeat Ibid.41
 Lac & oxylapathi uires 1091.43
 Lac uel betae agrestis facultas 388.37
 Lac lapides atrii si mēdūt 57.6
 Lac lapides omnes siccant 1110.10
 Lac quid frangat 1066.47. 1067.33. 1073.1. 1074.18. 1099.4
 Lac in uesica curatio 815.57
 Lac lapida abluendi ratio 1024.54
 Lac diaphanes quam facultatem habeat 1170.37
 Lac lapida omnia quae aluius, sub ardētī sole sunt ex humore aliquo leuiganda 1151.3
 Lac laryngem aliosque partibus colligant masculi oculo 245.38
 Lac laryngis cartilagineis musculi connectentes 244.49
 Lac laryngis cartilaginibus inesse duplices articulationes & motus 245.10

Laryngis cartilaginis scutiformis positus	244.5	neu conueniant	450.56	admora, fluxum ad affectus partes conciliat	1152.46
Laryngis munus & compositio	311.15	Lasitudini triplex potest oriri sensus	680.3	Laxentiu species uariæ	1056.66
Laryngis musculi	250.54	Lasitudini ulcerose qui conueniant motus ac frictions	450.44	Laxatio ubi fiat, & quomodo	1056.59
Laryngis musculi decem	245.50	Lasitudinû cõiugationes quindecim	453.50	Laxitas comitatur nacua	9.13
Laryngis musculi unde sonores recipiunt	247.2	Lasitudinû differentie in uniuersum octo	449.62	Laxitatis crassa	663.24
Laryngis musculorû situs & positiones	311.20	Lasitudo concussoria qualis et quando sentitur	450.14	Clauicina epilepticis quæ conueniunt	1007.15
Laryngis nerui omnes sex	150.60	Lasitudo consensuaria	680.12	Legumina omnia friza, concocta sunt difficilis	375.50
Laryngis neruorû recurrentiu consideratio	247.18	Lasitudo, in quibus sit quiete soluenda	451.43	Lenitie differentie tres	1115.42
Laryngis secunda cartilago	244.8	Lasitudo interdum lasitudine soluitur	Ibid.40	Lenmia rubrica	1115.37
Laryngis tertia cartilago styrenoides	Ibid.24	Lasitudo phlegmonosa unde contrahitur	455.24	Lentes quid perimat	1087.61
Laryngis tribus cartilaginibus decem musculi communes	245.9	Lasitudo quæ phlegmones sensum infert, curat per sanguinis emissionem usq; ad animi deliquium	464.1	Lenientis interdum à cacochymia uicta, morbus efficiuntur	1024.40
Larynx	182.19	Lasitudo quassans quæ corpora plurimû infestet	451.1	Lenientis per se, ab his, quæ ex accidenti id faciunt, quatuor indicia distinguunt	1024.24
Larynx cur non ex simplici cartilagine consistat	244.44	Lasitudo quid	1005.34	Lenon	191.44
Larynx ex tribus constat cartilaginibus, moueturq; à proprijs duodecim musculis	244.1, 322.18	Lasitudo spontanea quæ	455.12	Lenis aduersus qui reducant crasso ac melsu cholico succo	375.30
Larynx instrumentum uocis, quoniam recipit fluxionem, illam potest adimere	479.5	Lasitudo iqualida	450.21	Lenis bis cocta supprimit uentrem fluentem, corroborariq;	375.14
Larynx sursum trahitur tantu, quantum gula deorsum	84.62	Lasitudo tenuis quando accidat	450.9	Lenis largius sumpta elephantia sim & caneros inducit	375.19
Larynx transglutinentibus nobis recurrit ad fauces	248.26	Lasitudo tenuis spontanea quæ	680.7	Lenis priusq; immittit, oprium edulum eundit	Ibid.15
Larynx uocis principalissimû instrumentum	250.27, 241.56, 292.8	Lasitudo tertia superuenit plethoricis	455.23	Lenis quibus possit usui esse	Ibid.21
Larynx facilius	1106.29	Lasitudo ulcerosa in quæ corpora maxime cadat	450.28	Lenis usum integrum habet	Ibid.22
Lasitudine grauati omnes boni fucci cibû possunt	451.33	Lasitudo ulcerosa magis accidit moris, quæ scilicet	680.11	Lentes quam uim habeant	409, 456.165, 1112.5
Lasitudines sponte nasci, morbos denunciant	454.62	Lasitudo ulcerosa non ex abundantia nascitur	455.29	Lenticule palustres qualitas	1112.11
Lasitudini discutiendæ quæla requirant remedia	1028.18	Lasitudo ulcerosa quæ	680.10	Lenticula uentrem solvere & si flere potest, sed diuersa ratione	388.9
Lasitudini doloris tollendo appropriatû medicamentu quod	1188.26	Lasitudo ab ipso cibo durare	987.1	Lenticuli facultas	1109.6
Lasitudini phlegmonosæ uictio ratio conueniens	464.25	Lasitudo doloris inueterat	451.11	Lentis & brusice decoctum aluum subducere, ipsa autem corpora flere	368.46
Lasitudinis quassantis remedium	451.4	Lasitudo obscuratur	582.40	Lenis substantia & succus qualitate inter se contrariam habent	375.10
Lasitudinis iqualidæ remediû	Ibid.12	Lasitudo motus	73.17.842.44	Leonis natura	194.17
Lasitudinis tenuis remedium	450.54, 465.58	Lasitudinis morus quando in pulsu obscuretur	582.40	Leontopetalis facultas	1092.55
Lasitudinis tres alie differentie oriuntur ex tribus primis, dum binæ inter se copulantur, & tertia, dum in unû simul omnes tres coeunt	453.14	Lasitudo motus	73.17.842.44	Leonu ossis omnia medulla expertia	280.21
Lasitudinis ulcerose causæ	451.450.2	Lasitudo motus	73.17.842.44	Lepidocides futura	132.45
Lasitudinis ulcerose cõiugentia cruditati curatio	450.34, 456.27	Lasitudo motus	73.17.842.44	Lepre piosorum causa	682.46
Lasitudini tenuis quæ frictio		Lasitudo motus	73.17.842.44	Lepas quid sit	1103.22
		Lasitudo motus	73.17.842.44	Lepus marinus pulmoneum exulcerat	1272.13
		Lasitudo motus	73.17.842.44	Lethargi causa	69.57, 576.50, 577.11, 663.30
		Lasitudo motus	73.17.842.44	Lethargicos febres sunt tepide	1137.52
		Lasitudo motus	73.17.842.44	Lethargus est affectus contrarius phrenitidis	941.39
		Lasitudo motus	73.17.842.44	Lethargus, letaliior morbus peripneumonia	576.56
		Lasitudo motus	73.17.842.44	Lethargus	

- Lethargus quid 942.5
 Lenta liuid omnia sunt delecta 1131.45
 Leucanthi uis 1092.65
 Leucodis facultas 1164.61
 Leucodis facultas 1092.5
 Leuora expeditius obsequitur trahentibus 258.61
 Libanotis sunt tres 1092.31
 Libanotidum facultas 1164.31
 Libidinosorum pudenda qualia 780.37
 Libido qua ratione castigari queat 422.62
 Libido reddit hominem belluis aggressibus similem 422.57
 Libra cōstat drachmis decem pondera sex 1154.12
 Libra constituant uncie duo decim 1290.14
 Libram mensuralem olei, continere uncias decem ponderales, Galen. expertus est 1181.3
 Libratur solida, mensurant humida 1152.60
 Libri, monumenta eruditorum quædam 370.52
 Librum de naturæ afortis, dubitatur fuisse Hippocratis 121.5
 Libythici facultas 1092.56
 Lichenas excoriatos medicamentis sanantur 1226.57
 Lichenas medicamen excoriatis 1226.36
 Lichenas à quibus humorib. gignant, & qualia medicamenta desideret 1225.20
 Lichenis uis 1092.51
 Lichenum remedia Critonis 1226.14
 Lien 178.4. 220.14
 Lien afflictus inuatur secta uena in sinistra manu iuxta annularem digitum 996.18
 Lien aliquando melancholicum succum mittit in uentriculum 88.21
 Lien crescens, corpus minuit, & contrā 80.47
 Lien crassiori utitur alimento q̃ hepar 940.6
 Lien crasso nutritur sanguine 704.59. 763.41. 919.30
 Lien cur facili induret 1229.50
 Lien imbecillo, quæ accidunt 80.43
 Lien in infirmato, quæ uenæ sint secunde 974.53
 Lien elaborat melancholicos succos 122.50. 395.17
 Lienem ac icteru obstructa quid liberet 1103.2
 Lienas induratas quid discutiat 977.28. 1068.36. 1069.61. 1084.22. 1097.21. 1101.21
 Lien trahere languidæ, sanguis feculentus per corpus digeritur 1260.1
 Lien affecto quæ medicamenta conueniant 923.31. 1259.52
 Lien arterias multas atque magnas esse tributas 125.24
 Lien cur amara astringentibus mista conueniant 1260.8
 Lien epithemata cataplasmatibus Asclepiadis 1260.55
 Lien in finistris locatus repurgat sanguinem à melancholico succo 179.22. 180.54. 218.5. 219.22
 Lien opitulari sectionem uenæ inter annularem & medium digiti finistræ manus 164.52
 Lien pharmaca Andromachi 1260.20
 Lien pharmaca Asclepiadis 1260.37
 Lien pharmaca optima Archigenis 1261.10
 Lienis malo pertinaci quomodo occurrendum 1164.22
 Lienis munus 125.25
 Lienis ob statum distenti curatio 977.33
 Lienis obstructi medicamenta 939.65
 Lienis quàm hepatis uitia, nigriorem reddunt colorem 766.47
 Lienis substantia 122.60
 Lienis usus 1164.45
 Lien malè affectus, uiridis tonus corporis colorem 704.38
 Lien, melancholici est succi 407.7
 Lien mittit, quod elaborari nequit, ad uicinum uentriculum 122.58
 Lienosis cataplasma 1185.27
 Lienosis eadem quæ & hepaticæ cataplasmata opitulantur 1261.17
 Lienosis quid opitulet 1087.57
 Lien receptaculum atræ bilis 80.39
 Lien tenuiori sanguinis portione nutritur quàm hepar 123.4
 Lienteria carbacea quæ 770.50
 Lienterix causa 685.64
 Lienterix quid supprimeat 1982.19
 Lien uacuat tantum per intestina 940.8
 Lien uehementissimas potiones tolerat 977.26
 Ligamenta 111.16. 252.21
 Ligamenta articularum in digitis 199.3
 Ligamenta quum uulnerantur quæ sint periculo obnoxia 874.10
 Ligamenta femori tibiæ nec ctenia 216.21
 Ligamenta gignit circa musculorum membranas 92.51
 Ligamenta, membranz, nerui, unde nutrantur 89.31
 Ligamenta oriuntur ab oñibus 874.25
 Ligamenta sunt sensus expertia 874.18. 946.12. 1164.57
 Ligamentorum affectus cur periculo uacent 1164.55
 Ligamentorum in corpore triplex usus 155.41
 Ligamentorum usus ac cōsistentia 281.57
 Ligamentum ab osse transit ius, insensibile est, nec potest quicquam mouere 199.40
 Ligamentū nec sensum nec motum libet cum oriatur ex osse 281.9
 Ligamentum quid 92.9
 Ligula 250.30
 Ligule consideratio 244.38
 Lili facultas 1090.25. 1197.9
 Limacum succus alium subducit, caro autem bus coctis sistit 319.19
 Limoni facultas 1092.47
 Limnitis medicamen 1190.23
 Lingua ab innumis iugularibus accipit uenas 145.33
 Lingua à quibusneruis accipiat tactum & gustum 749.46
 Lingua conducit plurimū massæ carioni 273.24
 Lingua cur sensum habeat exquisitum 1035.3
 Lingua diuisis serpentibus cur coheret hominibus 275.4
 Linguz duo uerborum genera ad sunt 310.52
 Lingua duplex 260.17. 275.10
 Linguz effectus primariis quibus sint 750.52
 Linguz arteriæ, uenæ, & nerui 128.40. 251.40. 252.33. 254.20. 275.13
 Linguz carnis substantia 393.65
 Linguz constructio 228.63
 Linguz cur plures nerui tributi 1046.19
 Linguz duplex inest facultas 670.39. 1046.16
 Linguz ligamenti inferni usus 275.17
 Linguz motus qualis 94.7
 Linguz munus 93.17
 Linguz musculi motorij à septima coniugatione 262.50
 Linguz nerui sensibili 262.47
 Linguz paralyti 676.52
 Linguz uoluntatis motus à quibus neruis fiat 750.2
 Linguz usus 252.53

- Lingua, gustus sensorii 128.41
Lingua in omnem partem mouetur liberè 275.8
Lingua græcam unicè cõmenat Galenus 531.15
Lingua tumefacta Galenus quomodo curat 94.7.10
Lingua secundum diuersas partes à diuersis saporum qualitatibus afficitur 1014.41
Lingua uehementer siccata, perit gustus 34.7.2.6
Lingua uocis & loquelæ instrumentum 322.15
Lingua utraq; à posteriore basi ipsius cerebri neruum possidet 260.43
Lini semen in aqua coctum, refrigerat utem cremorem efficit 483.30
Lini feminis facultas 377.51.
Lini & cannabis seminib; quauo præcipue utendum 415.17
Linospermon 1031.50
Lippitudinẽ accedentem per circuitum, quomodo Galenus curat 799.58
Lippitudini cõueniunt, quæ me diocriter astringunt 1216.39
Lippitudo quid 660.31, 1218.18
Liquida medicamenta in duplici uase, ratio 1167.9
Liquare proprium est calidi 1040.17
Liquores lenientes qui dicuntur 1218.37
Lithargyri præparatio ratio 1151.54, 1158.40
Lithargyri qualitas 1180.46
Lithargyros quam uim habeat 1123.0, 1151.11
Lithargyros redditur expers rofionis, si ex uino uel aceto abluatur 1151.64
Lixiuq; facultas 1088.50
Lixiu ex cinere quam uim habeat 1122.49
Lixiuum ex spongia applicitũ, extremarũ partium status dissecut 946.28
Lixiuum quid 1040.66
Lobis hortensib; 416.26
Loca patientia quomodo affectus suos implicent 614.8
Loca affectu uorria, qua ratione Galenus curationem inuenierit 728.64
Loca offendunt affectũ 727.41
Locis affectis inueniendis quæ sint necessaria 714.55
Locorum affectorum uorũ unde sumantur 727.8
Locũ affectũ offendit certius, locus per quẽ fit excretio 27.57
Locus affectus quid indicet 151.34, 716.43
Locus affectus unde cognoscendus 722.51, 715.41, 717.46
Locus omnium in corpore tutissimus 258.49
Locus tepidus uiua in acorem uertit 1281.8
Logicus uel methodicus qui sit dicendus 848.61
Lolij temperatura 1067.47
Lollum in tritico maxime reperitur 378.16
Lomentum fabaceum 1224.24
Louchitis cuius sit facultatis 1094.2
Longæui maxime, sunt humidi 475.52
Loræ compositio 381.43
Loræ facultas Ibid.48
Lora qua ratione uinofior reddatur Ibid.50
Lora euadit imbecilliora 1220.
Loræ expurgandi ratio 77.2 (11
Lotos arbor cuius sit facultatis 1094.35
L V C S M augere insaniam 16.10
Lucij interitus 650.16
Lucius, Seuerus est dictus 809.
Luctaria omne robur ul- re prostermit 365.33
Lumbi quinq; constant spondylis 286.18, 292.46
Lumbi scincorum 1138.11
Lumbis incalcescentibus, arteriæ penis calidiores redduntur 780.9
Lumbi spondylorũ productiones nouem 288.53
Lumborũ musculi duo 176.34
Lumborum masculus solus triplex 158.21
Lumborum uertebrae crassissimæ 135.24
Lumborum uertebrae confideratio Ibid.24
Lumbricos latos quid perimat 1067.7, 1089.30
Lumbricos quid enecet 1081.14, & 48. 1089.55, 1107.29
Luna à solis recessu, suas omnes mutationes recipit 617.25
Lunæ apparitionis tẽpus quantum 621.29
Lunæ circuitus quot dieb; peragatur 618.27
Lunæ formæ 617.26
Luna eis qui sub ipsius lumine immorati diutius fuerint pallorem & capitis grauitatem conciliat 617.49
Lunæ motus, causa est omnium permutationum, quæ in corporibus accidunt 618.53
Lunæ occurrantionis tempus quod longum 618.8
Lunæ opera quando inualefcit & quando languida fiunt 617.35
Lunæ opera, solis effectibus inferiora 617.16
Lunæ plenitudo celerissima, uoluntium autem mutationes inaequales & diurnas efficit 618.5
Lunæ uarij effectus, pro uarijs eum sole positionib; 617.53
Luna ueluti aut infelicem progressum & exitum, tum sanis, tum ægris indicat 619.2
Luna in septimanis præcipue magnas mutationes inducit 620.26
Luna menses atque eius dies disponit 617.18
Lunam qñ deficit lumen 617.23
Luna solis auxilio eger 617.42
Luna ueluti priniceps inter soles, atq; nos medius Ibid.50
Lupa ex cane concipere potest 209.20
Lupi & canes eodem modo & meunt, & cacant 1132.16
Lupini agrestis facultas 1081.69
Lupini uis 416.71
Lupini 1081.45
Lupinorum farina quibus morbis medeatur Ibid.56
Lupinus cõcoctus difficilis, succũ pducit crassum 376.14
Lupinus crassus succi est 409.59
Lupus seu laurax 399.42
Luxatio cum ulcere incurabilis 320.20, 855.46
Luxatio uisum spinæ quæ pessima 286.22
Luxationes angulosæ sunt nocentiores, & quæ in orbẽ atq; paulatim fiunt 752.2
Luxationes spinæ obliquæ, quæ partes ledunt 752.7
Luxationum causa & curatio 818.64
Luxatio uertebrae unde se firri possit 752.29
Lux maior minorẽ semper dissipat 267.19
LYCHNIS quas uires possideat 1094.24
Lycij facultas Ibid.7, 1219.16
Lycopos quas habeat uires 1066.65
Lysimachidis 1094.20
M
Macer cuius sit facultatis 1094.41
Macilent quali uictus ratione pinguescere soleant 474.20
Macilentissimi sunt cibandi parces, sed crebro 881.20
Magnes ferro est specie similis, illo tamen fortior 1038.46
Magnetus

INDEX.

Magnetis uis 76.30. 1119.33
Magni & maioris discrimen
541.16
Magni & parui comparatio fa-
ceda est ad ipsius generis me-
dium 543.46
Magnitudo nihil confert ad o-
ptimam corporis constitutio-
nem 67.29
Magnitudo nulla sine dimensio-
nibus tribus 531.55
Magnitudo partium quibus de
causa augeatur 663.41
Magnitudo subtilitatis excrevit fa-
cit ad cognitionem loci affe-
cti 712.31
Maiora minorum semper sunt
principia 318.33
Maiorant uis 1205.14.
1069.19
Malabathri uis 1094.50
Mala Cestiana 1199.64
Malactica primi ordinis quæ
sunt 1184.10
Malactica secundi ordinis quæ
sunt Ibid.22
Male 1268.22
Mala & pyra astringentia quibus
& quid uentrem laxent aut
constringant 384.14
Malagma Andromachi 1185.3
Malagus Andromachi ex meli-
loro 1254.27. 1185.6
Malagus Dioscoridis 1184.45
Malagma ex bacis lauri Andro-
machi 1185.13
Malagma Hieraricon ex melio-
ro, uiscerum doloribus acco-
modatur 1254.7
Malagma Nil 1253.62
Malagma Polyarchion, quibus
affectibus conferat 1254.16
Malagmata hepatica 1258.35
Malagmata quæ dicunt 1182.41
Malagmatis Lucij uires & com-
positio 1184.50
Malagmatis Neapolitæ uires &
compositio Ibid.58
Malagmatum temperamentum
est calidum 1182.43
Mala optime non ante maturi-
tatem colligantur 384.2
Mala præterea acerba, quando
& quibus offerri debeant
384.10
Malarum ossa crassissima 120.63
Mala punica 418.24
Mali Armenice uis 1096.40
Mali granati uis punici facul-
tas 1104.46
Mali persice qualitas 1096.34
Malia acerbis quando utendum
183.48
Malis acidis quando utendum
384.49
Malis austeris quid utendum

183.46
Malleoli quid 138.36
Malleolorum incisio quando mo-
lienda 456.61
Mälorum astringentium atq; aci-
dorum discrimen 383.55
Mälorum differentiarum atq; facul-
tates Ibid.37
Mälum facultas diuersa 1096.18
Mälorum puniceorum species tres,
austeriorum, dulcium & acido-
rum 1232.61
Maluarum species & facultas
387.43. 1077.63. 1094.53
Mälum citrium ex quibus con-
fiter partibus 418.29
Mälum punicum, uentriculum
roborat 906.10
Malus nemo ultero 71.14
Mamillaris exortus 133.11
Mammæ duæ quibus in pecto-
re 249.53
Mammæ impregnatarum & la-
ctantium quales 730.44
Mammæ numeroz quibus in-
sunt 249.48
Mammæ quid hæcant ad pe-
ctus masculis 250.7
Mammæ tegumento sunt cordi
249.55
Mammarum munus 297.47
Mammarum uasa unde exoriantur
249.60
Mammis quo tempore lac acce-
dat 297.11
Mandragoræ uis 1094.59
Maniz cusa 741.33
Mania quid 683.17
Manibus assidue appositi periti
citur suppuratio celerime
1054.57
Manipuli nota est 1291.46
Maupulus quid cõtineat lb.45
Mannæ ortus 402.61
Manna quid 1177.23
Manna thuris buboni secto iu-
spergenda 915.59
Manna thuris magis thure a-
striugit 865.29
Manticam duplicem e collo su-
spensam gerimus 419.63
Mauu laborare, scarificida sunt
crura 935.3
Manus actio, est apprehensio
197.6
Maus, animalium solus homo
habet 168.25. 809.3
Manus apprehensionis graua cõ-
structæ 196.43
Manus, artium organa 195.15
Manus conuexa caret arterijs
165.62
Manus cur binæ 196.15
Manus cur diuise 195.64
Manus diuisio in tres magnas
partes 202.58

Manus extrema 162.2. 202.61
Manus extremitas musculi 155.18
Manus homini tribuæ a natu-
ra pro omnibus defensorijs
armis simul 194.44
Manus molles tactui: duræ, ca-
ptui accommodatiores 44.55
Manus musculi septem 201.19
Manus omnem comprehendit
figuram 196.9
Manus est organum ante organa
195.51
Manus sunt organa sapienti ani-
malis conuenientissima Ibid.8
Manus tangendo aptis qualis
uam esse debet 541.37
Manus tota 161.64
Menus tonus uenæ duræ 144.4
Manuum duplex usus 44.52
Manuum motus non omnis a-
ctiue musculorum fit 95.7
Merismodes illos quibus
febris quomodo differant
915.65
Marasmus duplex est 802.52
Marasmus incurabilis 912.35
Marasmus quid 802.47. 883.65
Marasmus quomodo incipiat
787.53
Marci Aurelij clementiam Gale-
nus testatur 650.18
Marci Aurelij dispositionem uis-
fuisse febrem, contra quæ cate-
ri medici, deprehendit Gale-
nus 651.2
Marcoris nomen unde transla-
tum 575.43
Marcor quorum partium incen-
dium ut plurimum comitetur
772.16
Marcus Aurelius Imp. auxilium si-
dem Theriacem 1270.17
Mare mortuum cur nec plantæ,
nec ullum animal alar 1049.39
Mares dextris, feminæ sinistris,
ut plurimum continentur 118.
39. 297.39. 778.24
Mars mortui aqua cuiusmodi
sit 1049.19
Marrubij facultas 1103.3
Martianus calumniatur Galeni
prædictiones 646.65
Marylli puer curatus, cui cor de-
tectum fuerat 186.1
Masculorum generationis prin-
cipium duplex 300.22
Masculum digni in calidiori &
sicciori temperamento, femi-
nem in humidiori & frigido-
ri 119.57
Masculus breuiori tempore for-
matur quam femina, & qua-
re 112.25
Masculus formius siccior & ca-
lidior 117.22
Massetes musculi 169.64

Mafliches facultas 1095.7.	Maxillam homo fortius est bre uisimam 169.16	Medicamen distributioni confereus non statim a cibo dandi 462.28
Mafliche uetriculo grata 124.9.	Maxillam inferiorem circūagentes musculi 273.9	Medicamen diureticū 1257.54
Materie alterantes cor- 52	Maxillam inferiorem musculi qui aperiat 172.1	Medicamen ex caricis & cnico, alio soluende aprum 470.9
Materie remedium quadruplex genus 470.53	Maxillarum futuræ 281.2	Medicamē ex chara cōbusta, no mas cōpescens 980.9.1179.5
Materie impetus cōtrarios edit affectus 448.31	Maxilla superior cur fit destituta medulla 280.56	Medicamen ex columbino hercore 1167.40
Materie species, temperamenti 70.41	Maza ægrius coquiritur panibus liordeaces, statim magis uenitriculum implet 374.10	Medicamē ex euphorbio ad neruorū punctiones cōmodum 1166.47
Materia ingenerabilia, in corruptibilis 16.18	Maxilla superior a peritrongo descendens uisus 301.1	Medicamen ex herbis confectū 1167.47
Materia prima unica quatuor elementis subiecta est 35.18	Mearus corporis uniuersi, secundum ipsum medium, sphaerici 256.31	Medicamen ex picæ, utile ad canis rabidi morfus Ibid.11
Matrice laborante, uena secanda est in malleolo aut poplite 712.40	Meatus patentes quibus partibus sint tributi ad excernenda excrementa 437.39	Medicamen ex populo ad articulares dolores 1187.17
Matricibus & partibus quæ ad matrum testiculos pertinent, paucis opus fuit neruis 303.32	Meatus permeantes ad mediū uentriculū cerebri 193.62	Medicamen ex silla confectum epilepsia confert 1007.30
Matrix collum cur neruolum ac mediocriter durū 296.43	Meatus feminales in feminis aperiuntur circa cornua, intra uterum, inibi semen suū effundunt 115.14	Medicamen Heraclidia Tarfitini aduersus ulcera uetera 1174.10
Matrix connexiones ad uicina corpora 303.55	Meatū expientū a testiculis semen, implantationes 301.51	Medicamen Magne dictū 1159.
Matrix munus 297.45	Meconium a animalis calore perfrigerat 58.10	Medicamen meralicū uis- 37
Matrix plures sinus sunt numerosos adentib. partus 297.9	Medex facinus 326.19	Medicamen podagricum Flauii Clementis 1187.55
Matrix receptaculorum numerus, mamillas numero æqualis Ibid.19	Medex medicamentum 57.11	Medicamen purgans, multiplex habet significarum 1061.31
Matrix sinus in homine est geminus Ibid.11	Medex iracundia rationem superauit 326.18	Medicamē quale applicandum 61.22
Matrix tunica cur in sit omne fibrarum genus 303.50	Medendi methodi principium unde 35.2	Medicamen scilicet optimum epilepsia 8007.51
Matrix uisus 315.47	Medendi ratio conuertenda ad affectus originem 729.51	Medicamētrastringētia 866.44
Matrix uisus opportunissimum 296.31. 301.11	Medendi rationes uariæ 360.64. 737.16	Medicamenta astringētia cur sugienda in producenda carne 891.49
Matrix cur unica tunica confert 303.41	Medendi tot sunt rationes quot morborū idē 846.61.880.50	Medicamenta calida & frigida a nobis sumit actionis sine initium, ac proinde potestate dicuntur talia 55.58. 1057.8
Maturation fructibus prouenit a solari calore 1044.44	Medendum tutū est 916.15	Medicamenta cicatricem ducentia Andromachi nra 1174.
Maxillæ figura media morientibus accidit 100.15	Medicæ uenæ cōsideratio 144.11	Medicamenta cicatricē in- 34
Maxillæ inferioris figuræ extremæ a quibus musculi fiant 100.17	Media in quo genere, uel specie quæ dicantur 42.17	ducentia qualia esse debeant 893.26. 861.49
Maxillæ inferioris musculi 273.1	Medicarsa factrix simul & conseruatix 11.17	Medicamenta educentia uenena 1155.32
Maxillæ inferioris osium confideratio 134.23	Medicamen ad inflammationes uigentes a cōmodanissimum Sorani 1138.31	Medicamētra digerentia adstringentibus mista, longē sunt tutiora, sed minus efficacia tantum digerentibus 1181.11
Maxillæ inferioris tres motus 168.56	Medicamen castorium quale 1137.17	Medicamētra duo, eiusdē generis sed facultatib. differētia, ad uulneratos neruos cur in pręput habere semper porteat 1165.36
Maxillæ ossa terna 131.44	Medicamen constans marrubio 1141.60	Medicamētra educentia uenena 1155.32
Maxillæ superioris nerui, qua parte in eam inferant 260.61	Medicamen contra uiciofos succos in uentriculi tunica præstantissimum 886.43	Medicamētra empla- 764.8
Maxillæ superioris ossa nouem 281.17	Medicamen Critonis ex chaboe leonte 1174.12	Medicamētra enema 878.35
Maxillæ superioris futuræ 133.25	Medicamen diacydonion 1153.	Medicamētra et odia ferro igni ro sunt similia 1048.56
Maxilla inferior ex duobus ossibus constat 170.13	Medicamen dialocis 478.5 (12)	Medica-
Maxilla inferior nullū processū formatur, quāquam medullam continet 280.45	Medicamē diatessaron 1178.61	
Maxilla inferior, superior & immota, in animalib. cūctis præter cōmodū, mouet 168.53	Medicamen dictum harmonia defluxi ad pectus conferens 1243.62	

Medicamenta & nutrimenta quo
modo aboluntissime indican-
da 60.32
Medicamenta & nutrimenta te-
pida admoenda, & corporis
simplicissimo affectui 60.39
Medicamenta excitanda tēnigi-
ni sunt calida & flatulenta
780.20
Medicamenta exedentia carni,
minus redduntur acris si cō-
burantur, adhuc minus si ab-
luta fuerint 853.56
Medicamenta exiccantia lūmo-
rem discutunt 1155.33
Medicamenta explorandi ratio
1012.51. 1018.63. 1026.39.
1064.63. 1180.50
Medicamenta exiergentia quæ
sunt 1216.27
Medicamenta facultate calida,
& modo nos calfaciant 1027.2
Medicamēta fermē omnia sunt
composita, contrariisq; in se
facultates fortuntur 1032.
58. 1040.56
Medicamenta frigida & delecte-
ria, cur citius magis in cali-
dis natura uim suam exerant
1025.62
Medicamenta glutuantia qua-
lia esse debeant 862.46
Medicamenta hepatica Archige-
nis 1258.18
Medicamenta lūmoribus cras-
sis uiscidissq; expectorandis
cōmoda quæ sint 1057.39
Medicamenta metallica debent
esse elota, si sint citra morum
siccatūra 873.46
Medicamenta metallica omnia
maiores uim exiccandi for-
tuntur, ubi plusculum ebulli-
erint 980.29
Medicamenta minuentia carnē,
quæ sint 853.45
Medicamēta mitia quæ 1173.5
Medicamēta nōnulla statim ab
inirio sanguinē ducūt 1001.58
Medicamēta nostrum calorem
nō nisi ab ipso murata augent
56.2
Medicamenta ocularia 1065.39.
1216.50. 1219.35. 1221.11
Medicamēta omnia ei sunt opti-
ma, qui affectus quibus exhibe-
ntur, cognorit 1155.66
Medicamenta omnia quo pacto
in corpore suas uires exer-
cant 1015.20
Medicamēta omnia respectu ad
aliquid tum utilia tum noxia
dicuntur 1236.64
Medicamenta plura, secundū di-
uersā sui ipsorum partes, uar-
ios effectus pducūt 1271.24

Medicamēta purgātia, propriū
tralunt humorē, & quonam
ordine 39.3. 76.41. 704.
53. 705.31. 1001.51. 1058.41.
1271.20
Medicamenta putrefactantia
1216.31
Medicameora quæ 58.44
Medicamenta quæ sint lauanda,
& quomodo 1024.44
Medicamēta quando in nos can-
dem naturam, quam prius in
ignem, ostendant 1015.54
Medicamēta quomodo nos cal-
faciant 1027.62
Medicamenta, quorū uim ad ce-
rebrum descendere cupimus,
quō sint applicanda 942.19
Medicamenta reponendi ratio
1162.51
Medicamēta farcotica quæ sunt
851.22
Medicamēta simplicia, cum sint
natura cōposita, affectus con-
trarios gignunt 1015.13
Medicamēta singula talia dicun-
tur, qualia sunt respectu no-
stri corporis 1020.40
Medicamenta si non prosint, cu-
randum ne lædant 1189.1
Medicamēta sinui circumlinen-
da, sint uehementer siccantia
951.17
Medicamēta stupefacientia cur
nec recentia nimis, nec uetera
impēse exhibēda sint 926.46
Medicamēta stupefacientia ob-
tundunt quidem dolorē, affe-
ctum tamen reddunt maiorē
922.20
Medicamēta stupefacientia, post
annum 2 composinone sunt
tutiora 926.38
Medicamēta stupefacientia qua
ratione pharmacia congruen-
tibus ad sanguinis reiectio-
nes misceantur 1244.56
Medicamenta substituta quæ di-
cantur 1144.29
Medicamenta tenacia non sunt
amouēda antē, quā sua spō-
te excident 1183.62
Medicamenta tenuantia 414.8
Medicamenta tenuium partium
efficaciora sunt crassarū par-
tium 1127.36
Medicamenta uim tenuandi ha-
bentia, ab obstructionibus li-
berant 405.37. 835.51
Medicamenta uiridia conficien-
di ratio 1157.28
Medicamenta uniuersa unde pe-
tuntur 1065.2
Medicamenta uisā & lota acri-
moniam amittūt, & ob id ip-
sis utendum est in molliori-

bus & cacochymis corpori-
bus 1169.58
Medicamen temperatū quod di-
ci debeat 1022.42
Medicamēti genus unde sūmen-
dum 869.26
Medicamentis cōpositis cur uta-
mur 1149.42
Medicamentis delecteris nihil in
uita difficilius reperit, ferisq;
uirus et aculantibus 1272.37
Medicamentis discutientib; quæ
ad indurata uiscera propinā-
tur, cur miscenda emollientia
1258.7
Medicamentis leuioribus in pri-
mis est utendum in curandis
alopecijis 1190.62
Medicamentis multæ diuersi ge-
neris substantiæ sunt immixtæ
1028.20
Medicamentis omnibus loris, 2-
criis mordensib; sanies abster-
gitur 873.22
Medicamentis quæ ad uescam
& renes faciunt exulceratos,
diureticorum aliquod & mel
miscendum 862.12
Medicamentis quorūm uirantur
homines 1021.49
Medicamentis singulis propria
quædā inest facultas 1022.22
Medicamentis stupefacientibus
Galenus in quibus sit usus
926.31
Medicamentis stupefacientibus
quando utendum 1210.15
Medicamentis thoracis & pul-
monis ulcerib; destinatis mel
permiscendum 862.7
Medicamentis utendi modus un-
de petendus 869.28
Medicamentorum facultates in
quem modum examinentur
2 medicis 1021.22
Medicamentorum familiarium
natura duplex 56.55
Medicamentorū forūm ex ace-
to tritorum morbus obiu-
ditur, uires autem augentur
1256.20
Medicamentorum incidentium
& tenuantium usus frequen-
ter, reddit sanguinem uel se-
rosū, uel biliosū, uel mel-
ancholicū 405.39
Medicamentorum letalium do-
ctrina non uulganda 1282.52
Medicamentorum materiz unde
deprosciscantur 1149.28
Medicamentorum pernicioso-
rum natura duplex 56.46
Medicamentorum purgantium
differentiæ 1028.59
Medicamentorum purgantium
effectus diuersi 1028.26

Medicamentorū sanguini sup- primēdo optimū cataplasma 865.7	1048.3	Medicaminū glutinantium usus 1161.3	Medicinam cōstituratur, corpo- ris humani particulas exqui- sitē debet cognoscere 21.43
Medicamentorū simplicia cog- nitio ad quid conferat 1012.7	Medicaminū miscella aliquan- do utiliores simplicium usu sunt 1236.46	Medicina p̄fēdit uniuersa me- chanicis artibus 365.2	Medicina quid 5.63. 32.5.
Medicamentorum simplicia ple- ragis dissimilariū sunt par- tium 1051.43	Medicaminū nephriticorū disce- rentia 1266.63	Medici optimi munus 504.28	359.20. 813.28. 920.5.
Medicamentorū tanta in agen- do diuersitas unde oriantur 1051.55	Medicaminum ocularium uires 1219.35	Medicis olim Romae, q̄ hac no- stra tempestate infelici, multo maior merces atq̄ splēdidior proponebatur 647.32	Medici quē cognoscenda seculum dum Rationaliū h̄eresim 6.40
Medicamentorū uigor unde ex- pendatur 1190.16	Medicaminū uacuantū maior pars febres ipsas adauget 917.44	Medici ueteres imperabit agros uēluti duces militib. 840.19	Medico actionū partium cogni- tio necessaria 22.5
Medicamentorū uires numera- ri particulares non possunt 1052.9	Medicaminū uarias cōsistētiās parandi ratio 1166.55	Medico actionū partium cogni- tio necessaria 22.5	Medico ars rationalis necessaria 5.17
Medicamentorum uires sub qui- bus contineantur alterationi- bus 1029.59	Medicano particularis ex mate- riæ copia, & huius cōuenien- te usu conficitur 880.57	Medico actionū partium cogni- tio necessaria 22.5	Medico in medendo quæ sint cu- randa 950.32
Medicamentorum uirium gra- dus quomodo inueniēdi fiat 1032.38	Medicatrix siue curatrix medi- cine pars 362.13	Medico qd scire sufficiat 349.26	Medico qd scire sufficiat 349.26
Medicamentum digerens Crito- nis 1218.23	Medici munus 846.40	Medicorum Romanorū infideli- tas 645.35	Medicorum Romanorū infideli- tas 645.35
Medicamentū glutinatoriū plus siccat oportet, quā qd car- nem producit 852.40	Medicina ancillatur naturæ 31. 9. 361.9. & 35. & 44. 832.54	Medicum oportet esse & philoso- phum 5.24	Medicum oportet esse & philoso- phum 5.24
Medicamentum malabathrimū uehementibus oculorum do- loribus 1222.26	Medicina, articularas uētes sar- cēti, similis 361.31	Medicum oportet uarias orbis regiones lustrasse Ibid.6	Medicum oportet uarias orbis regiones lustrasse Ibid.6
Medicamentum præstantissimū quod sit 1222.43	Medicina correctrix bipartito diuiditur 362.47	Medicus accuratus quis 5.16	Medicus accuratus quis 5.16
Medicamentum quid 1012.21	Medicina curatrix Ibid.10	Medicus avarus potius uenefi- cus Ibid.40	Medicus avarus potius uenefi- cus Ibid.40
Medicamentū refrigeris hūme- tansq̄ optimum 909.46	Medicing correctrici opitulatur ars humana Ibid.46	Medicus cuiusq̄ morbi optimus quis sit dicendus 844.4	Medicus cuiusq̄ morbi optimus quis sit dicendus 844.4
Medicamentū sarcoticū cauo ul- ceri ap̄issimū, ex quibus con- fici possit 850.15	Medicing diuisio ordiēda à ma- ximē propria ipsius artis ma- teria 53.3	Medicus minimē errare q̄ possit 955.31	Medicus minimē errare q̄ possit 955.31
Medicamentū simplex qd 1012.25	Medicing finis est saluare 555. 360.41. 361.44	Medicus quibus intendere de- bet 29.29	Medicus quibus intendere de- bet 29.29
Medicamentum uincit alteratq̄ corpus 1051.14	Medicing nomen unde arti sit inditum 365.40	Medicus quisham existimandus solus sit 848.56	Medicus quisham existimandus solus sit 848.56
Medicamentū uiride Epigoni 115.7.	Medicing partis maximē pro- priae quæ sint, & quot 32.38. 362.44. 363.9. 365.47. 428.45	Medicus quis tutō experiri pos- sit 354.6	Medicus quis tutō experiri pos- sit 354.6
Medicamentū uiride Gal- (7 li 1156.2	Medicing partes mutuam opem desiderant 1164.59	Medicus sit pecunie cōtemptor 5.21	Medicus sit pecunie cōtemptor 5.21
Medicamentū uiride Hecarodra- climon dictum 1156.63	Medicing partes, secundum cor- poris affectiones, quæ 31.24	Medimus capit chemicas qua- draginta octo 1291.38	Medimus capit chemicas qua- draginta octo 1291.38
Medicamentū uiride Lite dictum 1157.20	Medicing partes secundum ope- rationes dictæ 32.30	Mediocritas efficit pulsus natu- rales: eiusdem excessus, præter naturam 553.35	Mediocritas efficit pulsus natu- rales: eiusdem excessus, præter naturam 553.35
Medicamentū uiride Pabōia Ib.14	Medicing partitio duplex 32.44	Mediocritas eligenda in omnib. ad cōseruandum optimum corporis habitum 446.23	Mediocritas eligenda in omnib. ad cōseruandum optimum corporis habitum 446.23
Medicamina sumptuosa uulne- ratis neruis cōgruētia 1167.64	Medicing partium officia con- traria 428.49	Mediocritatis termini rerum nō naturalium qui 850.39	Mediocritatis termini rerum nō naturalium qui 850.39
Medicamina ulceribus sedis & pudendorum apta 871.62	Medicing propositum atq̄ finis unicus 11.31	Medium in uniuersa substantia constatur ex missione extre- morum 44.9	Medium in uniuersa substantia constatur ex missione extre- morum 44.9
Medicaminis Crepholionis ui- res & compositio 1181.64	Medicing salubris pars 365.6	Medium natura quid sit 355.23	Medium natura quid sit 355.23
Medicaminis ex cydoniorū suc- co usus & compositio 484.9	Medicing subieciuntur infinitæ materie 361.50	Medium omne ex contrariis est mixtum 1035.41	Medium omne ex contrariis est mixtum 1035.41
Medicaminis ex lauri bacco cō- positio 1182.2	Medicing unius uariæ species, omnes ad sanitatē tendentes Ibid.16	Mediū semp̄ expetitur, cōsistit in relatione ad aliud 413.61	Mediū semp̄ expetitur, cōsistit in relatione ad aliud 413.61
Medicaminis humidi Androma- chi uires & cōpositio 1180.21	Medicing usus 466.6	Mediū sit, quod utriusq̄ extremi est futurum materia 1029.2	Mediū sit, quod utriusq̄ extremi est futurum materia 1029.2
Medicaminis qd ex populi flori- bus sit, compositio 463.5	Medicina ex effectuarū artium genere existit 21.17	Medullæ	Medullæ
Medicaminis uiridis optima tē- peratura 1156.56	Medicina ex his artibus quæ labe factata instaurant 21.36		
Medicaminum acrium differenti-	Medicina ingenuarū artium om- nū præstantissima 3.20. 31.23		
	Medicina inter factiuas nume- randa artes 562.5		

INDEX.

Medullæ ac adipem sunt medica-
menta scitibus idonea 977.7
Medullæ omnes infensiles 698.4
Medullæ spinalis membranz
148.13
Medullæ spinalis processui inest
porus sensibilis 145.22
Medullæ spinalis tertia tunica
291.23
Medullæ vires 1136.27
Medulla familiare osibus utri-
mentum 89.25. 208.50.
394.59
In Medullâ à caua lumbos per-
reptante, per singula spinæ fo-
ramenta ungulæ inferunt ue-
næ 146.8
Medulla osium humidior ac ma-
gis fluxilis 91.18
Medullarū utulina est optima
1181.12
Medulla spinali incisa transuer-
sim, quid accidat 189.38.
348.25
Medulla spinalis distribuitur in
nervos quinquaginta octo
127.11. 1198.16
Medulla spinali secta inter ter-
tiam & quartam vertebra, spi-
ratione animal destituitur
confestim 190.42
Medulla spinalis non pulsatur
291.27
Medulla spinalis omnium ner-
uorum durorum principium
265.19
Medulla spinalis oritur à cere-
bro 143.11
Medulla spinalis quale præbeat
corpori alimentum 394.63
Medulla spinalis velut truncus
arboris 182.44. 309.38
Medullas reponendi ratio quæ
1136.17
Melendi officiū, non uestiæ, pen-
der à uoluntate: quemadmo-
do desiciendi munus, nō in
testinorum 772.61
Mel 402.60
Melampyrum in tritico 378.11
Melancholiæ causa 741.31
Melancholiæ hypochondriacæ
à uentriculo oritur, signa 741.
Melancholiæ hypochon- (32
driacæ causa 741.46
Melancholiæ hypochondriacæ
symptomata & signa 764.18
Melancholia hypochondriaca
quæ 741.27
Melancholiam recentem quæ ra-
tisæ Galenus curari 744.26
Melancholia unde 69.56
Melancholiæ alienationes unde
orianantur 681.17
Melancholici qui ciborum au-
diuissimi sint 768.52

Melancholici cori mores 744.2
Melancholicum excrementum
in uentriculū excernit 226.64
Melancholicus sanguis in qui-
bus habetur, in quibus mini-
mè 742.44
Melancholicus succus qui dica-
tur 701.31
Melantheriæ vires 1123.31
Melasmaria 708.21
Mel cui marcori sit utile 808.4.7
Mel cum lacte confert uentri-
culo sicco, impenitē refrigerato
884.58
Mel cur in calidis corporibus ci-
to uertatur in bilem, frigidis
autem accommodatissimū sit
408.7
Mel hæcticus inimicus 913.12
Meliceris quid 707.5
Melicerati uis 403.15
Meliceratum esse aptum sinui cō-
glutinando 980.46
Meliceratum quando excretionē
exciter 369.39
Meliloti decoctum 1219.39
Melilotum quam habeat uim
1095.17
Mel in florentibus uertitur in bi-
lem 79.6
Mel in senib. uertitur in sangui-
nem 79.9
Melinum Lucii præceptoris Ga-
leni 1223.8
Melitidis vires 1119.43
Mel largius sumptum, uomitū
prouocat 403.24
Melle corrigitur placentarū pra-
uitas 469.19
Mellis acrimonia quomodo re-
rundetur 403.12
Mellis cocti uis mouendi urinā
Ibid.20
Mellis crudi facultas Ibid.17
Mellis facultas 1095.31.
1236.19
Mellis materiam rori esse conge-
nerem 403.1
Mellis optimi notæ 760.28
Mellis uis quatenus fugiendus
aut recipiendus in fluxibus à
capite in asperam arteriam
1243.6
Mel longa coctura amarum ef-
ficatur 79.53
Mel maximè extergit 1215.41
Mel nihil in se extra corpus con-
tinet bilis 78.65
Mel non putrefcit, putrescenti-
bus quā maximè congruit
1176.45
Mel omne calfacit, atq; in corpo-
ribus calidis bilem 411.43
Meloepozon natura & facul-
tas 379.60
Mel optimum quod sit 881.4.4.

1280.50
Mel optimū ut breuissimo tem-
pore coquitur, ita minimum
spumæ euomit 460.60
Mel plusculum igni admodum,
amaricat 1047.19
Mel prisanæ adiectum, in cōmo-
dum hepatis & lienis affecti-
bus 415.46
Mel quādo prisanæ miscendum
413.44
Mel quibus conferat, & quibus
non 80.1. 370.6. 403.28.
1047.16
Mel roscidum & ætērū 401.64
Mel saccum gignit consuetudine
tenuissimum 418.44
Mel temporis spacio amarefcit
1047.16
Mel ubi laudatissimū 403.4
Mel uertendum in sanguinē, po-
stulat naturam & ætatem frigida
79.64
Mel uertutum ex coctione ama-
ricat, quod tempore citra co-
cturam patitur 1281.31
Mel uno est grauius tercia par-
te 1291.15
Membra corporis extrema mi-
nus alunt, sed promptius detri-
ciuntur 391.54
Membra infelicitate ab iniurio pra-
uita, sunt exercitando imbe-
cillia 466.16
Membrana costas cingens du-
plex 182.32
Membranz quare uasorum oscu-
lus cordis applicatæ 88.10
Membranz thoracem subinen-
tes 176.1
Membrana ex qua seminis parte
gignatur 108.23
Membrana in utero semini ob-
uoluitur 107.42
Membranz cerebri conside-
ratio 191.32
Membranz dolores sunt la-
tiæ &uales 713.51
Membranosæ omnia ex semine
oriuntur 111.35
Membris mutilatæ arte concilian-
dus decor 818.42
Membrorū naturalū ortus 121.
Membrorū principalū ne- (13
cessitudo 364.16
Membrū mortificatū quatenus
sui abscindendum 981.45
Memoriæ obliuiscæ, causæ 718.10.
719.18
Memoriam exoletam restitutu-
ro, quæ sint consideranda
717.53
Menelai imbecillitas, animi
mollities 810.57
Meningem cerebri uulneratam,
quæ conglutinetur 1201.16

Meningis crassæ partes omnes
adhaerescunt caluarie in ani-
mali uiuente 193.45
Meningis crassæ usus 155.19.
259.46
Meningis curandæ scopi unde
proficiantur 1201.23
Meningis tenuioris usus 155.13
Meningis crassæ cerebrū secat tri-
bus locis 192.22
Meninx crassa cranio connexa
264.8
Meninx dura affecta, quos pul-
sus gignat 603.55
Meninx dura perforata 254.62
Meninx tenuior siue pia mater
cum uenis penetrat ad cerebrū
uentriculos 192.32
Meninx tenuis affici sine cere-
bro non potest, sicuti neque
hoc ab ipsa illa 603.51
Meninx tenuis inter cerebrū &
crassam consistit: crassa inter
tenuem & cranium 255.24
Mens habitat in syderibus tan-
to melior & perfectior q̃ in
corporibus terrestribus, quā-
to substantia illorum purior
118.56
Mens quibus ægrotet 347.40
Mens siue uoluntas ubicunque
sita sit, quolibet instrumenta
uel longissime sita subito mo-
uet 123.26
Menses ducti quomodo à diu-
reticis differant 1062.60
Menses & urinas quæ eliciant
Ibid. 55
Menses euocant uenæ sectæ in-
fra popliteum, iuxtaq̃ talum
988.18
Menses in utero demittuntur
non attrahuntur 1062.46
Menses quæ prouocent 997.27.
1137.56
Menses quibus ex causis plus mi-
nimusue æquo fluant 693.27
Menses reuelli sursum quomo-
do possint 864.12
Menses unde detineant 693.21
Mensis à luna immutatur per se
ptimanas, ut alia omnia 618.50
Mensis lunaris 127.39
Mensis non omnino constat tri-
ginta diebus 618.33
Mensis quid 690.24
Mensis quot dieb. cōstet 621.17
Menstrua cur mulieribus pro-
fluant singulis mensib. 986.20
Menstrua quando mulieri dese-
cerunt 777.19
Menstrua quibus suppressa ob-
nisiu portionem sunt, uenæ se-
ctione occurrunt 988.32
Menstrua suppressa, quibus no-
tis deprehendant 777.21. & 32

Menstrua supprimuntur, secta in
cubito uena 997.15
Menstrua sunt euocanda per cru-
ra, reuellenda per uenā in cu-
bito sectam 993.60
Menstruis suppressis quo pacto
discamus mulierem esse graui-
dam 777.28
Menstruorū euacuatio 100.44
Menstruorū immodicè fluentū
symptomata 777.64
Menstruorū retentio nō est attri-
ctio, sicuti neq̃ eorū fluor na-
turalis excretio 17.5
Menstruum tempus qd 126.57
Menstruæ ratio in exhibitione a-
limenti per ephemeras febres
ex quibus sumenda 957.39
Menstrua optima est 420.12
Mensura olei erat olim apud Ro-
manos cornea 1165.63
Mentem diuinam esse per ærem
extensam arbitrat̃ur Galenus
119.9
Mentis facultas 1081.7
Mentis nomen daturæ 123.50
Mentis transcursus est uelocissim-
us 547.24
Mercurialis uis 1093.64
Mercurius ceu dominus ac au-
tor omniū artū cōmendatur
1.34
Mēstræi situs 179.56
Mēstræi origo & usus 225.8
Mēstræi situs 179.56
Mēstræi substantia ex quibus
constit 174.48
Mēstræium triplex 148.3
Mēstræicæ uenæ 180.10
Mēstræicæ uenæ omnes ad hepa-
tis portas porrigunt 178.35.
224.64
Mēstræicarum uenarum confi-
deratio 148.14
Mēstræi facultas 1095.48
Mēstræiorum & sorborum facul-
tas 184.58
Metacarpū consideratio 137.42
Metacarpū ossa quaterna 205.26
Metacarpium quatuor constat
ossibus 137.32
Metallica abluendi modi diuer-
si 1154.49
Metallica diutius cocta magis
siccat, & minus odore 1174.5
Metallica omnia dolorem exci-
tant 1166.26
Metallica omnia siccant 1120.32
Metallica plenius sunt coquen-
da, ut adhaereant 1153.63
Metallica quæ dicant 1120.28
Metallicis plurimū igne sub-
stantig est immixtum Ibid. 40
Metallicorum crassitudo quo-
modo auferatur 1165.16
Metaphora ab artificiosa doctri-

na obleganda 515.25
Metaphoræ quæ recipiendæ, &
quæ respuendæ 536.11
Methodice diuisuris quæ sint cō-
sideranda 50.10
Methodici à solis affectibus in-
dicationes sumunt 7.24
Methodici constituit duas cō-
munitates morborū, astrictio-
nem atq̃ fluorē, ac tertiam ex
his constam 7.28
Methodici & Rationales quæ cō-
ueniūt differētijs inter se 11.58
Methodici multa artis immutit
opera 7.19
Methodici pollicentur se totam
artē doctrinæ curriculo men-
sum 7.47
Methodici quibus distinguuntur
ab Empiricis & Rationalib.
7.40
Methodicorū dogmata 15.56
Methodicorū secta quid 7.37
Methodicia capita 356.24
Methodo ingreere qd sit 841.57
Methodus cognoscendi mores
alienos 420.33
Methodus consistit in uniuersa-
libus 900.22
Methodus quæ alias artes, ipsam
quoq̃ medicinā cōstituit 21.6
Methodus quid 885.54
Methodus ueritatis inueniende
352.18
Metenchyte pudendorum in-
strumenta 1265.55
Meum cuius sit facultatis 1096.6
Mēstræia x alpera, cuius sit (53)
facultas Ibid. 57
Milax lauis cuius sit facultas
Ibid. 60
Milx & panici facultas 416.24
Milx uel cēchri facultas 1085.31
Milū ad omnia est panico præ-
stantius 374.63
Milui capitis uis 1274.57
Mina Aegyptia & Artica cōstat
libris sedecim 1290.13
Mina continet uncias uiginti
1160.30
Mina Romana continet libras
uiginti 1290.12
Minera ex louis cerebro fingit
à poetis orta 327.63
Mingentibus inter dormiendū
remedia 1266.27
Minimū quid dicatur 148.65
Mistio exquisita, solius Dei & na-
ture est opus 44.14
Mistioni corporum excludisimæ
quæ plurimū conducit 38.7
Mistorum qualitates & facultates,
sunt totæ per totas mistas
840.64
Misy, xrugeo, fortissima pharma-
ca 1220.13

INDEX.

Mithridates prœmunis antidoro, uinci à ueneno haud potuit 1178.29. 1280.29. 1286.9
Mingatoria quæ 1168.42
MODERATA similibus conseruanda, immoderata contrariis corrigenda 421.52
Modestus quia in re cōtinentem superet 424.1
Modus aquæ propinandæ in ardentibus febribus, unde perendus 963.53
Mola 138.49
Mollam absq̃ uiro concipi à muliere non posse 299.29
Molle cum mediocri calore, est humidum 47.54
Molle est quod in seipsum cedit, nec migrat aliò 535.52
Mollia ad parientem aptiora 252.21
Mollia cedunt tactui 335.40
Mollia quæ dicantur 402.34. 552.2. 1052.50
Mollidi rariònes plures 1052.60
Molliora facilius alterant 401.
Mollities instrumentorū, (39 ad pulsū magnitudinē facit 567.35
Mollities instrumentorū quādo ad pulsū magnitudinē conferat, & quādo secus 568.48
Mollitio quid 1052.52
Molybdæne facultas 1152.8
Montana ualentiora campetribus 414.17
Mora debere alios cibos præcedere 382.18
Moræ materiæ diuiniæ naturæ mollia est transitum difficilem 221.48
Mora immatura refecit alui profluuiū congrunt 382.30
Morbi acuti & uelocissimi tenuissimū uictus rationē possulant: uberiorē, lēgiore 960.25
Morbi acuti omnes, sunt exigui temporis, nō tamē omnes breues morbi sunt acuti 621.61
Morbi acuti per excretiones, ut diuturni per abscessus magis soluantur 643.15
Morbi acuti qui 504.36
Morbi acuti raro per initia indigent purgatione 1009.42
Morbi acuti simulatq̃ inuaserūt ad extremam ascendunt magnitudinem 20.22
Morbi articularis curatio 1268.
Morbi calidi à bile oriuntur 79.28
Morbi circuitus faciētes, ex morborum dispositionibus uniuersi oriuntur 802.28

Morbi cognitio, ipſus medellæ est principium 848.12
Morbi cōpositi partiū dissimilium qui sunt dicendi 660.17
Morbi contrarij tollunt 64.50
Morbi crescentes ad magnitudinem notæ 622.28
Morbi cuiusq̃ generationi propriū q̃ddam est tēpus 720.40
Morbi differentię 902.39
Morbi dispositio, eius causā antecedens est 832.14
Morbi dispositio in purgationibus quid indicet 1005.5
Morbi diuturni qui 616.52
Morbi essentia in primis cognoscenda 716.49
Morbi ex decidētia acuti 616.49
Morbi exigui subito à natura uincuntur 725.29
Morbi frigidi oriuntur à pituita 79.26
Morbi hæmorrhici curatio 863.
Morbi inuenire principium, laborioſum 609.33
Morbi magnitudo cognoscitur ex symptomatibus 29.42
Morbi magnitudo est scopus sanguinis mittendi, purgationisq̃ adhibendæ 860.62
Morbi nomen est unum in uniuersis morbis 848.41
Morbi non fortitunt omnes quatuor tempora 20.18
Morbi ob humorū affluxū 350.
Morbi partiū dissimilium (15 uel instrumentaliū quatuor generibus continentur 657.54
Morbi per interualla redeuntes vere præcipue mouent 1005.10
Morbi primi quatuor 79.34
Morbi primò lædunt functionē 664.65
Morbi principū ad præsidia ferenda utiles præbet indicatio nes 719.44
Morbi, quorum symptomatum sint causæ 667.20
Morbi regij absq̃ febre inuadēne curatio 768.14
Morbi regij causa 768.1
Eius curatio 1005.41. 1111.38
Morbi regij productio 970.40
Morbi à fluxu capitis orti quomodo occurrendum 749.32
Morbi articularibus auxiliator oleum uulpium 1142.22
Morbi extremis, extrema adhibenda remedia 871.38
Morbi sicci qui dicuntur 1009.20
Morbi similiarium partium consistunt in intemperie 349.50
Morbi similiarium partium singuli sunt duplices 658.20
Morbi simplices similiarium partium quot 657.46

Morbi species, curationem tantum iudicat 25.31
Morbi similibus maiori ex parte tetentur 471.19
Morbi status docet, qualis & quāta uictus ratio esse debeat 622.52
Morbi totius principij est eius cruditas 719.53
Morbi totius tempora sunt quatuor 719.34
Morbi totius sunt, quot intemperaturæ salubres 24.63
Morbi uigentis indicia 622.40
Morbo comitali cōueniens medicamen 1109.1
Morbo declinante, opportū auxiliator esse usum 18.25
Morbo naturæ suæ cognato laborantes minus periculantur 887.65
Morborū acutorum iudicia in diebus imparibus sunt, quia & accessiones 620.9
Morborum ad quadragesimum usq̃ diem peruenientium duplex natura 616.38
Morborum articularium cōmunes causæ 1267.64
Morborum causæ, quæ sunt dicendi 664.61
Morborum compositorū, compositæ sunt causæ 662.35
Morborum compositorū partiū similiarium quatuor differentię 659.48
Morborum ex uinioso succo cōmune præceptum 947.26
Morborū ex succorum uino ortorum cōmune auxilium, alui decictio 477.24
Morborum generationi non est certum tempus præscriptum 716.41
Morborū genus duplex 847.35
Morborū in uniuersum sex genera 847.44
Morborū nomina partim à læsa particula indita 844.43
Morborum peracutorū duplex differentia 620.52
Morborum permutationis cum æger est interiturus, tres modi 641.24
Morborum permutationis tres differentię Ibid.14
Morborum qui non solunt duplex natura 720.49
Morborum simplicium generā quot 657.25
Morborum solutioni fixæ quæ adesse debent 607.14
Morborum species diuersæ 654.56
Morborū tempora cognoscuntur ex cruditate & concoctionis indicijis 720.24

- Morborum tempora omnia latitudinem momentaneam habent 720.34
- Morborū tēpota quatuor 18.28
- Morbosa quæ 61
- Morbos cōtrarios duos cōmunes curandi ratio 964.53
- Morbos futuros prænuntiant quæ à naturæ ordine recesserunt 828.38
- Morbos peracutos (quorum ultimus decretorius est septimus) in omnibus sex diebus iudicari contingit 620.43
- Morbo uigente importunū auxiliorum tempus 18.14
- Morbū nemo subito euasit absque crisi 642.60
- Morbum posse in initio discuti 20.28
- Morbus acutus exacte qui dicatur 616.32
- Morbus animi 333.3
- Morbus cognoscitur ex symptomatibus 26.19
- Morbus est uel operationis uel structuræ oblatio 657.7
- Morbus & passio quid differant 664.42
- Morbus exacte peracutus qui 616.32
- Morbus hypochondriacus qui fit dicendus 744.55
- Morbus in deprauata compositione 659.21
- Morbus in formatione 658.50
- Morbus in magnitudine qui fit 659.16
- Morbus in numero duplex, cuius utraq; differentia bifariam scinditur 658.61
- Morbus instrumentalis dupliciter accidit Ibid.39
- Morbus instrumentalis quadruplex 847.39
- Morbus nunquam soluitur nisi concoctionis signa in excrementis præefferint 29.52
- Morbus omnis eandem sibi perpetuam naturam & essentiam sortitur 725.1
- Morbus omnis nictus 642.28
- Morbus peracutus edummiur qui dicatur 616.36
- Morbus quid 430.62. 630.19. 638.32. 664.14. 735.45. 843.26. 844.1. 848.29
- Morbus qui distinguendus sit à similium partium uicio 24.54
- Morbus, quorum sit immoderatio 657.17
- Morbus simpliciter acutus qui dicatur 616.29
- Morbus, symptomatum causa est 26.18
- Morbus unde cognoscatur 604.59
- Mordacia haud omnia sunt calida 1017.58
- Mordacia minus sunt tenulora, si parem facultatem obtineant 1123.6
- Mordentia & abstergentia, biliosa & eacochyma 226.35
- Mordicantiū alia sunt facultate calida, alia frigida 1039.66
- Mordicare quæ ualeant 1040.51
- Mordicationibus cibi apti qui sint 1024.19
- Mordicatio quibus saporibus fit communis 1047.51
- Mores ægri quando expendendi 496.32
- Mores animi quæ corrumpant 433.26
- Mores cognoscuntur ex partium figura 71.22
- Mores plerumque sequuntur regionis naturam Ibid.33
- Mores redduntur probi à recta uictus ratione 432.12
- Mores sunt duplices, ciuiles & naturales 822.11
- Mori absque crisi in accessionum principibus, quibus contingat 641.61
- Mori cur nemo possit in totius morbi declinatione, nisi ob errorem commissum 641.50. 642.2
- Mori repente quibus contingat 759.57
- Mori facultas 1096.62
- Mori utendum, dum uentriculus æstuat 382.26
- Moriuntur homines in pessimo accessionis tempore 612.40
- Mororum facultas 410.19. 382.12. 1199.4
- Morosi uires 1120.24
- Morsis à uisera stercus caprillū auxilio est 1132.42
- Mortuos à rabido cane curandi ratio 665. 114.12. 1153.54. 1277.51
- Mors quid 46.52. 640.54. 804.3
- Mors quo morbi tempore fiat 642.12
- Morui rabidi canis potio Crætippi 1286.53
- Mortuus rabidi canis conseruandus est apertus ut minimum quadraginta dies 1277.54
- Mortuus stomachi quid sanetur 1097.56
- Mortarium plumbeum confert ad conficienda medicamenta refrigerantia 1124.13
- Mortem absque crisi acceleratam quæ indicent 642.38
- Mortis dies qua uia cognoscatur Ibid.45
- Mortis effectus modos, his quæ fine crisi moriuntur 642.9
- Mortis periculum quid prænuuntiat 599.40
- Mortū generatio prima ex temperamento 116.5
- Mortū puerilū diuersitates 68.
- Mortuus cunctis quid sit (37 commune 73.46
- Motioni articulorum in digitis duplex auxilium 198.60
- Mononis post cibum incōmoda 406.4
- Mononis quartū genus 95.60
- Motus propria, uelocitas & tarditas 490.34
- Motui quæ infini 542.48
- Motui quæ requirantur 281.56
- Motus contrarium natura non molitur ante, quam priorem sedauerit 519.29
- Motum non sensu, sed ratione coligimus 547.22
- Motum uoluntariū illius sensu, quæ partes amittant 671.59
- Motus actiuis quid 73.55
- Motus alius ab alio sit musculi 94.39
- Motus animales unde procedit 93.3
- Motus arteriarum & cordis est naturalis 100.58
- Motus actiui mox desinunt 580.52
- Motus celeritas facultatibus attestatur, materis aduersatur 91.33
- in Motus celeritate iudicanda, quomodo si habenda ratio 542.60
- Motus celeritatem aut tarditatem ex locis ubi mouentur corpora, iudicari 547.6
- Motus celeritatem tarditatemque adiuanntia 640.14
- Motus compositi qui 73.4
- Motus cordis ac arteriarum nunquam intermitte 445.37
- Motus truris ad latera ex abundantia est 217.17
- Motus cuius articulo digitorum pedis molia est natura quatuor 211.40
- Motus cur plurima facultate animalis indigeat 672.17
- Motus deprauati species 666.1
- Motus est duplex 725.43. 842.40. 845.61
- Motus ex substatia est animalium 280.29
- Motus in actione consistit 310.48. 346.24
- Motus in pulsu interrupti differentiarum quatuor 526.29
- Motus languidi, corpus reddunt frigidū & priuatum 431.42
- Motus naturæ cōtrarij sequuntur potentias

- potentias contrarias 87.37
 Motus naturales unde procedit 93.1
 Motus nimij, corpus reddunt biliosum 433.40
 Motus passivus quid 73.55.
 318.10
 Motus propria sunt velocitas & tarditas 501.46
 Motus sensibilis duplex existit 710.5
 Motus simplices qui sunt 73.39
 Motus vehementior, est exercitatio 439.10
 Motus velocitas distinguit affectus dolorificos organorum respirantionis, ab ijs qui citra dolorem insistant 494.35
 Motus violenti, viribus superiores, sunt tremuli 710.35
 Motus voluntarii omnes à musculis sunt 197.10-715.57
 Motus voluntarii origo cerebrum 314.29
 Motus voluntarii symptomata 676.46
 Motus voluntarius qui 100.43
 Motuum diversorum effectus diversi 446.8
 Motuum in musculis quatuor differentie 96.1
 Motuum naturalium species diversae 445.31
 Motuum qui actiones non sunt triplex differentia Ibid.58
 Motuum qui sibi ininvicem succedunt, necessum est uno perenniter, perire & alterum 94.59
 Motuumque ininvicem consequentium alteri sine altero servari est impossibile 485.55
 Motuum varietas pugnat cum constructionis securitate 108.
 Mouens primū, princeps 2. (60 nimis facultas 318.13
 Moveri, est veluti quiddam agere 729.21
M VOI¹ sale cōditus asseruat 399.39
 Mulier cui menses probè fluunt, quibus caret morbis 986.38
 Muliere pręgnante, quę prius gignantur 105.7
 Mulieres cur careant pilis mentis 277.33
 Mulieres glabre, & cur Ibid.30
 Mulieres steriles quę sunt 955.50
 Mulier omnium studiorū naturalis compos 353.14
 Mulierum similitudo & dissimilitudo ad viros Ibid.26
 Mulier hepar 399.62
 Mulier mandat cancellis 400.27
 Mulier siue trigle caro 399.51
 Mulier exhibitio 927.40
 Mulier facultates 399.33
 Mulsæ ex pluviâ aqua conficitur 461.11
 Mulsæ in uariis biliosis bifecit facile 890.11
 Mulsæ quibus non sit cōueniens 924.22
 Mundus rerū omnium maximus & pulcherrimus 215.31
 Murena Romę omnib; ferę marinorū piscium minimo uenditur 400.43
 Muris facultas 418.35
 Muris aranei pulvis sanat ab ipso emoriso 1275.32
 Muri capita uita alopecij medentur 1274.35
 Murexæ uis Ibid.55
 Musculi ab dominis octo 488.60. 489.10
 Musculi ab ossē hyoide producti 248.30
 Musculi ad collum nescię locarii, usus duplex 230.62
 Musculi ad eam partem trahuntur diuisi, ad quam uerunt ipsorum fibrę 246.47
 Musculi, caput ad obliqua inclinantēs, minimi 285.7
 Musculi caput mouētes sunt octo & uiginti 283.58
 Musculi carentes tendone, uulsum mouent os 93.52
 Musculi carpi flexentes 152.26
 Musculi cōstituti 111.14. 731.2
 Musculi cōuerentes radium ad pronum & supinum 204.30
 Musculi crur extendentes & flexitēs multi & maximi 308.24
 Musculi cubiti articuli flexitēs, duo sunt anteriores 156.6
 Musculi digitorum 152.5
 Musculi dissecati eorum capitibus, non obeunt functiones 190.27
 Musculi equis similes 489.34
 Musculi & tendones interni flexionem edunt, extrinseci extensionem 95.10
 Musculi excrementorum retentioni dicari 100.28
 Musculi excretioni seruientes inter cibi instrumēta numerati 178.7
 Musculi expulsiōni excrementorum seruientes 416.14
 Musculi extendentes articulum genu 157.45
 Musculi in abdomine in reddenda urina nobis sunt auxilio 82.63
 Musculi in brachio binis obliquis motibus rectū cōficiūt 208.20
 Musculi in celsu pręsunt 22.21
 Musculi in scirrhaliter se habēt quā in uulneribus 95.18
 Musculi intercostales duo & uiginti 488.34
 Musculi intercostales duplices Ibid.67
 Musculi intercostales quā ratio neruoluantur 188.54
 Musculi irrigantur sanguine ex uenis & arterijs profluente 92.58
 Musculi lati fibrę à quibus initiantur 169.4
 Musculi lati inueniendi ratio 168.63
 Musculi lati origo 279.50
 Musculi lingue carent tendonibus 91.35
 Musculi masticatores 168.47. 273.27
 Musculi motum capitis præstant obliquum 284.17
 Musculi obliqui in brachio 208.
 Musculi obliqui obliquos (16 præstant motum 214.37
 Musculi octo à ueteribus ignorati 151.57
 Musculi oculum mouentes, sunt sex 748.26
 Musculi omnes in extremam se sinant contractionē 97.26
 Musculi palpebras detrahentes sunt duo 748.58
 Musculi pars quę in se habet motum cognatum, uidelicet coitionem 95.16
 Musculi pedem eleuantes qui 160.18
 Musculi quā ratione priuentur motu 189.11
 Musculi recti, exactam flexionē aut extensionem mouuntur 214.39
 Musculi, retentioni excrementorum dicari 224.44
 Musculi retrō ad dorsum contrahentes totam scapulam, unde recipiant neruos 313.22
 Musculi abdominis unā cum septo trāsuerio intensi, quid accidat 447.34
 Musculis ac tendonibus, tota trāsuerfim abscessis, motus subiectarū partium tollitur 94.54
 Musculi capulas thoraci admoventes 172.57
 Musculi semper trahunt uersus proprium principium 270.7
 Musculis inest unum tantum fibrarum genus 234.40
 Musculi singuli, singulos habēt motus simplices 234.47
 Musculus magna ex parte iniuncta secundum longitudinē exporrecit 284.55
 Musculi soli uoluntario motu præditi 310.7
 Musculus omnibus inferitur neruus, aut in ipsum caput, aut

partē capiti proximā 146.41	origines 154.49	Musculus proprium instrumen- tum motus 91.4
Musculi parui imbecilliores cōmittuntur actiones 105.19	Musculorū manus usus 102.35	Musculus rectus, rectum mini- strat motum, obliquus obli- quum 157.28
Musculi sedis & vesicæ volun- tarijs resolutis, extremēta re- tineri non possunt 773.3	Musculorum masticatorum ac- tio 173.32	Musculus temporalis, debilis & minimus hominē 173.33
Musculi temporalibus nihil ce- rebro propinquius 172.51	Musculorum mouentium singu- lis, alijs oppositi sunt contrarij motus auctores 184.3	Musculus tendens insigniter se- ctus nocet eius particulae mo- tibus 92.3
Musculi temporales conferunt quog masticationi 173.28	Musculorum numerus in fini- stris partibus, equalis ad de- xtri partes 125.53	Musculus transuerfimus sectus, in quam partem feratur 95.12
Musculi temporales, inferioris maxillæ granae sunt conditi 172.16	Musculorum omnium actio fit pro fibrarum positione mo- do 184.53	Musculus velut planta quidam 92.62
Musculi temporales in quibus sint maximi Ibid.13	Musculorum qui genu articulū mouent, validissimā func- tiōē obeūt q̄ extendunt 157.60	Musculus unusquisq̄ fibrarū dif- ferentia cognoscitur 157.5
Musculi tēporales laesi quæ sym- ptomata inducant Ibid.46	Musculorum respiratori inſer- uentiū d̄ innumeratio 488.60	Musculus caro epileptici auxilia- tur 1135.10
Musculi temporales quales net uos fortiantur 160.55	Musculorū sectio molenda pro fibrarum ductu 151.47	Musculus cinis podagricos iuuat 1141.29
Musculi tres in magnū trochan- tera inferri 159.3	Musculorum singulis ut una ac- tio, sic & motus unicus na- tura inest 94.44	Musculus quando & qualiter præ- parato utendi in oris inflam- mationibus 1233.38
Musculi valde parui in pede ab anatomicis ignorati 114.1	Musculorum substantia ex quib- us constet 823.57	Mustum deſicit aluū 411.61
Musculi ulnam ſecientes unde oriuntur 108.23	Musculorum temporalium ſi- rus securitasq̄ 172.55	Mustum dulciſi imū, aluum ſub- ducit 381.40
Musculi uniuerſi trahunt uter- ius propriū principij 175.26	Musculorum & tendonū nutri- mentum quale 407.11	Mustum nonnihil ventrem ſarti- bus implet Ibid.10
Musculi voluntarij monones sunt instrumenta 91.58	Musculorum thoracis actiones particulares 488.61	Mustum quatenus dulce 1044.8
124.51. 322.20. 310.14. 873. 34	Musculorum toram manum ex- tendentiū duo principia ſunt 156.8	Mutato in contrarium nihil po- teſt niſi per medium 121.22
Musculi uſus 182.12	Musculorū tranſuerſæ ſectiōes actionē eorū diſſoluūt 151.48	Mutato ciborū per cruditates in peregrinū qualitatē, eſt ali- um deterriſſima 1255.23
Musculo interiore abſciſſo, ex- tenſa pars manebit 95.5	Musculo torali utrique trēs nerui inſiguntur 162.36	Mutato ſitui in qualitate, aut in quantitate 418.18
Musculorum affectiones & ab- errantes motus 496.52	Musculus coſtus uniuerſis incū- bens 152.3	Mutationes exiſtūt ualidiſſimæ quæ cuique per ſepthimanos dies proprie contingunt 619.47
Musculorum actionis cognitiō maximē ex uſu 151.38	Musculi deltoidei 162.19	Mutum animal quo neruo in- tercepto reddatur 150.64
Musculorum caro qualis 92.54	Musculus dum tendit, trahit ad ſe partē in quā inſerit 95.30	MYA GROS cuius ſit facultas 1097.5
Musculorū conſuſioni quæ me- dicamenta conferant 946.33	Musculus extremēta ad inferio- ra propellens qui ſit 130.39	Myxæ facultas Ibid.13
Musculorū cubiti uſus Ibid.16	Musculus instrumentum anima- le & naturale 92.62	Myriophylli facultas 1097.28
Musculorum deneruationes du- plices 100.49	Musculus latus 150.32	Myrmecij 709.10
Musculo exteriore abſciſſo, pars flexa nō amplius extenditur 95.7	Musculus latus ad ſermonem et masticationem multū cōfert 179.53	Myrmeciarum curatio 953.34
Musculorum ſecientium atque extendentiū ulnam, quæ ſitus 108.6	Musculus latus ſibras omnes re- cipit à colli ſpondylis 113.6	Myrmecias & thymos quæ ej- ciant 1098.48
Musculorū funcſiō arbitrio ani- malis ſubſeruit 184.13	Musculus latus unde neruos re- cipiat 751.26	Myrrha circa aſtriſſionē diſcu- nit reſiccatq̄ 1219.49
Musculorū in exteriori brachij nodo tria capita 154.13	Musculus non exquisitē contra- hiunt circa animale ſacula- tem 96.14	Myrrhæ Beroñæ uia 1107.35
Musculorum inſectionis ratio 96.32	Musculus nullus caret arteria et uena 116.25	Myrrhæ facultas 1107.27.
Musculorum intercoſtaliū ſi- bræ 187.34	Musculus nullus in ſummæ ma- nus exteriore regione 164.1	1180.59. 1231.32
Musculorum intercoſtaliū ſi- bræ quam habeant poſitionē inter ſe 149.1	Musculus omniſcarnioſus, ideot humidior carne 52.18	Myrrhæ odor, capitis dolorem prouocat 1202.8
Musculorum intercoſtaliū uſus 110.50	Musculus omnium in corpore maximus qui 308.50	Myrrhæ uſus nō admodum tu- rus 1251.13
Musculorum interiorum cubiti		Myrrhi thoracem & pulmones purgat 1097.30

Myrtinū oleum craſſiorū eſt par-
tium quā ut alie deſcendere
poſſint 922.45
Myſtrum caput chemen unam et
eiꝯ quartam partem 1292.8

NATVOS in facie, quæ deter-
gant 1102.41

Napy cuius ſit facultas 1098.6

Narciſi facultas Ibid.8

Nardi celticæ uis 1097.60

Nardi montanæ facultas Ibi.64

Nardi facultas 1262.48

Nares ſunt reſpirationis me-
tus 679.3

Nar ſuiuius piſces producit Ty-
berinis logē meliores 420.48

Naribus demitti portionem ce-
rebrī 251.16

Narium foramina cur in ore ob-
lique deorſum eant 276.20

Narium meatus utilitas 254.40

Narium muſculi quales 169.5

Narium obſtructis meatibus pe-
rit olfactus 147.27

Narium pingui dilatantur ob ſpi-
ritualium organorum imbecil-
litatem 753.32. 756.31

Narium ulcera quibus medica-
mentis curentur 1215.28

Nafi alæ quando ſpiritus ductū
adiuuent 498.63

Nafi alarum muſculi & nerui
279.60

Nafi alarum utilitas Ibid.55

Nafi meatus uterqꝫ bipartit 18.

Nafi oſſa tenuiſſima 180.64 (18)

Nafi oſium cōſideratio 133.58

Nafi tunica exanguis 128.33

Nafi tunica interna cur conſtru-
cta 280.2

Nafi ulcera quæ medicamēta de-
ſiderent 869.9

Nafi uſus 670.57

Naſturtij uel cardami ſeminis fa-
cultas 1084.45

Nafus 168.53

Nafus uia olfactūlium 128.13

Narium carnes 277.44

Narium ſimile muſculi ſunt ridi-
culi 108.7

Narij trique poſſunt ſimiles eſſe
parenti ſecūdm partes di-
uerſas 118.1

Natura ægri in primis medico
conſideranda 851.62

Natura animalia ædita in lucē
actiones omnium partiū doc-
et 307.50

Natura ſtatuaria quā differat
77.44

Natura calida, frigide potione
iuuatur 891.56

Natura cuique animanti cor-
pus affectibus idoneum fecit
277.13

Natura cuiuſque ex primarum
qualitatum temperie conſtat
850.40

Natura cuiuſque quando altere-
tur 63.22

Natura eadem æquē in paruis
ac in magnis corporibus eſſe
poſſet 145.32

Naturæ animalū uariæ 298.13

Naturæ artiſcium poſſumus ad-
mirari, nō autē imitari 166.45

Naturæ bilioſæ ex longiori in-
dia febribus acutiſſimis cor-
ripiuntur 889.61

Naturæ calidæ & humidæ, ma-
gis quā calidæ & ſiccæ, fa-
mem & ſitim perferūt 895.16

Naturæ commendatio 355.30

Naturæ diuerſe, diuerſa uictus
ratione alende 411.3

Naturæ facultates primæ, ipſarū
inter ſe & aliarum deſiderant
miniſterium 75.32

Natura eſſingit corporis for-
mam, auim moribus cōgru-
entem 277.35

Naturæ gaudent cōſuetis 895.61

Naturæ haud omnia poſſibilia
278.10

Naturæ imperus quando mini-
mē ſit iuuandus 1215.14

Naturæ in diſtribuendis neruis
tres ſcopi 128.38

Naturæ induſtria circa forman-
das uertebras 290.16

Naturæ in puerili ætate calido-
res & humidiores, putredinis
fluxionumqꝫ morbis tentant
475.16

Naturæ in ſingulis prouidentia
613.20

Naturæ ipſus inclinatio tantū
in criſis modo inueſtigando,
conſideranda uenit 643.13

Naturæ morus quādo determi-
nati ordinatij ſint, & quan-
do item contrarij 642.24

Naturæ noſtræ cum exercitijs
habetur magna neceſſitudo
413.7

Naturæ opera, inelutabilia 803.

Naturæ opera longe hym-
nis maiora 147.36

Naturæ opera prima, ac uelut ca-
pita 75.39

Naturæ opera quæ 73.15.

803.34. 851.41. 953.63. 950.54

Naturæ opificum perpetuum
296.18

Naturæ prouidentia in colloca-
dis instrumentis 200.46

Naturæ robur unde cognoscat
Naturæ ſcopi, circa cor- 29.40

pus ſingendum 125.62

Naturæ ſcopus in procreandis
animantibus 804.42

Naturæ ſolicitudo circa partiū
larum ſecuritatem 209.10

Natura & anima, niſi aliquid
calidum ſunt 713.25

Natura ex quib. conſtat 914.44

Natura infirma, ualidum neque
motum neqꝫ calorem ſuſtinet
1045.29

Natura in morbi uehementia la-
boris, adhibitis remedijs ma-
gis opprimitur 19.18

Natura hec inferior & cœleſtis ma-
gnopere ſuperat, ab ealy quic
quid haber boni, recipit 613.

Naturale omne ex cōmo- 27

da temperie naſcitur 667.42

Naturaliter ſe habentia corpo-
ra, ſimilia ſibi præter naturam
autē, cōtraria poſtulant 854.

45. 895.45

Naturam adiuuandam eſſe me-
dicamentis 1003.62

Naturam bonam quā corrup-
tam, & uitioſam in meliorem
mutent 443.46

Naturæ cuiuſqꝫ cognoscere me-
dicum oportet 955.13

Naturam, errores & uina cōſi-
qui nos procreant, ſarcu-
e ſua induſtria 275.46

Naturæ laborantiū cognitu-
ro, quæ ſint neceſſaria 955.39

Naturæ, neruorū ſecuritatis, quo
modo conſulat 313.39

Natura niſi fruſtra moſi 107.

64. 120.16. 202.12. 240.47

Natura non eſt impedienda, ſed
iuuanda 955.55

Natura non iſdem utitur uſiſ
ad ſemel laboratas materias,
& ad omnino cōſectas 339.22

Natura non miſcet corpora plu-
rimum differentia 209.13

Natura nullius materie ueterē
ſeruat formam 77.51

Natura optima omniū exhiben-
dorū meſuras indicat 443.16

Natura optima tantū appetit,
quantum concoquit 810.46

Natura optime cōſtituta, omnia
requirit mediocriter 831.8

Natura partis affectæ quid indi-
cet 974.9

Natura partium patientium, au-
xiliorum materias indicat
977.19

Natura per rotas corporis par-
tes extenſa 77.42

Natura plurimos morbos ſolu-
it per ſanguinis excretionē
981.47

Natura præparat corpus anime
moribus aptum 116.3

Natura prior & ſapientior arte
245.51

Natura quid 613.35

Natura reficere ea quæ ex semine sunt orta non potest 15.50
 Natura rerum quo pacto inueniendi 352.39
 Natura semper nervos, uenas et arterias à propinquis partibus immittit 314.22
 Natura (super late morbum, æger seruat 730.17
 Natura temperata à ueteribus est prætermissa 40.4
 Natura temperata, regula est cõstituendæ uisitationi 40.11
 Naturis calidis & ficcis quæ uisus ratio conueniat 890.12
 Naturis calidis quiescendum 471.55
 Naturis humidis & frigidis quæ conueniant 473.1
 Nauſea, expultricis facultatis est morus deprauatus 685.59
 Nauſea inanis quid indicet 736.40
 Nauſea præcedit uomitû 679.32
 NESCIENTIA frigore, sola quæritate letalia sunt, contrâ quæ, quæ putrefaciendo aut erodendo interimunt 1016.63
 Nephriticorû urines quales 770.
 Nephriticos quæ inueniunt 1090.51 (7
 Nervi à cerebro, musculis suas deferunt facultates 92.45
 Nervi ad percipiendâ infestantia nutritoris organis tributi 228.52
 Nervi affectus aufert musculo omnem motû & sensum 92.27
 Nervi coniugati semper eadem magnitudine 150.4
 Nervi contusi curatio 874.2
 Nervi deducunt facultatem animalem 199.18
 Nervi duri & fortes præsumunt motû, cõferuntque ad ea quæ crassum sunt partium tactu diiudicanda 253.36
 Nervi duri quibus tribuantur partibus à spinali medulla 310.27. 311.3
 Nervi ex cerebri substantia propagant 92.23. 161.24. 874.19
 Nervi ex cerebro producti musculis fouent largiuntur motû 322.21
 Nervi exiles quibus sunt 228.34
 Nervi habent sunt similes 489.
 Nervi in macilentis euiden- (31
 tibus apparent 162.7
 Nervi in quibus laxent affectibus, & in quibus tendant 733.20
 Nervi largiuntur corpori motû & sensum 282.49
 Nervi manuum & crurum quo differant 313.53
 Nervi molles ad sensum, duri ad motum apti 184.36. 263.15

Nervi molles recti ad senſoria tendunt 252.32
 Nervi motores omnes sensu tactus sunt præditi 346.27
 Nervi, motus uoluntarij opifices 149.22
 Nervi mouentes laryngis musculos, àbscindantur, aut excipiuntur uinculo, animal redidit murum 648.49
 Nervi mouentes thoracem, à colli spina exoriuntur 747.13
 Nervi musculis principium motus largiuntur 745.16
 Nervi musculorum inspiratori inſeruiuntur 489.27
 Nervi ois à dura meninge, sed à medulla illius exoriuntur 343.49
 Nervi nudati quam medendi rationem postulent 1161.63
 Nervi omnes produciuntur coniugati 150.2
 Nervi optici, uelut oculorû radices 149.40
 Nervi per directum cõgi curatio 873.8
 Nervi puncti oleo calido fouendi 872.41
 Nervi puncti qualia medicamentis postulent 872.44. 873.5
 Nervi puncti quibus acriora phar- maca postulant 1163.22
 Nervi quibus sensus gratia sunt maximi tributi 228.43
 Nervi quo magis digrediuntur à cerebro, eò magis dureſcunt 247.53
 Nervi recurrentes refrigerati, uocem impediunt 755.4
 In Nervis caræ nudatis quæ uenda ſint 1165.20
 Nervis dolor affixus non accidit 733.47
 Nervi ſenſorij qui ſint 346.20
 Nervi ſeptimæ copulæ, ſunt primi exquisitè duri 262.30
 Nervi ſeptimæ copulæ unde oriuntur, & in quas partes diſſeminantur 262.23
 Nervis ſunt interceptis, partes, in quas ſerebant, deſtituuntur & ſenſu & motu 506.8
 Nervis inſiſtit uis à ſupero principio 92.37
 Nervi ſunt ne foraminibus præditi, Galenus hæret 671.23
 Nervis non ineſt cavitatis cõſpicua 304.27
 Nervis omnibus ſenſiendi & mouendi facultas inſita 184.14
 Nervis optici ſolis, ſenſibilibus in eſt meatus 149.45. 310.61. 145.18. 668.25. 748.25
 Nervis punctis emplaſtrû optimum 873.63
 Nervis punctis qualia medica-

menta conueniant 1161.60
 Nervi ſubduntur arterijs & uenis 733.42
 Nervi uulnere in brachio & crure, quod medicamentum adhibendum 873.64
 Nervi uulnere nihil frigidi admoveatur Ibid.28
 Nervi tertie, ſextæ, & ſeptimæ coniugationis cõmiſcentur, ſendentes ad inferiora capitis 150.49
 Nervi thoracem mouentes, à ſpinali medulla oriuntur 123.14
 Nervi tranſuerſim uulnere curatio 873.59
 Nervi uulnere curatio 873.51. 1163.13. 1164.26. 1165.12
 Nervo aut medulla ſpinali inciſis tranſuerſim, quæ infra ſectionem ſunt partes, & motu & ſenſu priuantur 92.40
 Nervo puncto, uulnus eſt dilatandum 872.28
 Nervorum affectus duplex 190.24
 Nervorû à ſpinali medulla ori- rum coniugatio quarta, quinta, ſexta, ſeptima, & octava & nona 291.4
 Nervorum à ſpinali medulla or- torum coniugatio ſecunda et tertia 290.60
 Nervorû à ſpinali medulla ori- rum prima cõiugatio Ibid.48
 Nervorum brachij extenſorum origines 162.16
 Nervorum in cutim ſcemoris diſperſion, radices quatuor 166.
 Nervorum magnorû in cu- bitum deſcendenſium fines quing. numero 163.40
 Nervorum mollitiæ ac duritiæ eſtimandæ methodus 263.8
 Nervorû mollis durorumque or- tus ac progreſſus 253.30
 Nervorum mollium prima, ſecunda, tertia & quarta copulaſio 149.47. 261.15
 Nervorum mollium quinta copulatio 130.21. 261.35
 Nervorum mollium ſeptima cõiugatio 150.43
 Nervorum mollium ſexta cõiugatio 130.36. 261.44
 Nervorum optico- rum conſideratio 149.34
 Nervorû opticorû ortus 311.2
 Nervorû ortus à cerebro 740.2
 Nervorum par diſſeminatur in uentriculum 219.9
 Nervorû p oſis ſacri foramina prodeuntia tria paria 153.47
 Nervorum principia, cerebrû et ſpinalis medulla 199.14
 Nervorum punctiones anguſtæ non ſiſcunt medicamentis curantur,

rantur, quibus nerui uadati
316.4.63
Nerui recurrentiū ortus, pro
gressus & reditus 311.62
Nerui resolutionē uariū uaria
sequi symptomata 671.34
Nerui sextæ coniugationis
in uentriculum obliqua im
plantatione 262.17
Nerui tertie coniugationis pro
cessus diffusus in facie, den
tes, & gingiuas 350.12.752.2
Nerui tertia coniugationis gu
statoria uocatur 350.18
Nerui rotius corporis or
tus 356.4
Nerui tres differentie 332.12
Nerui molles natura quibus
tribuit 310.35
Nerui recurrentes inuenit Ga
lenus 718.47
Nerui septimæ copule cum al
tis qui à sexta oriuntur, copu
laui natura 362.6
Nerui sexaginta oriri à spinali
medulla 348.12
Nerui aut ligamentū scissa, re
fici rursus non possunt 23.15
Nerui molles semper in uulne
ria, duri in musculis illa
mouentes inseritur 310.32
Nerui nulli in cor distribuit
339.35
Nerui nulli sine musculo mo
tum præstat 739.28
Nerui omnis exangui & frigi
di 44.63
Nerui omni sensu præditus 93.
Nerui omnis uel à cere
bro uel à spinali medulla ori
tur 246.58
Nerui quando reddatur in sen
silia 346.4
Nerui quando transuersem se
candus 855.40
Nerui quantum molliciei, tan
tum sensus sortitur 282.6.
346.35
Nerui quibus inflammatio
spasmo corripitur, ac si uent
mente alienari 92.30
Nerui quid Ibid. 13
Nerui uia est mortis facultas
tis à cerebro descendens 93.19
Nerui dicuntur tripliciter 813.
60. 1017.30
Nerui quæ dicantur 813.40.
1017.63
Nerui signa quæ sint 815.19
Nerui corpus quod sit, iuxta pri
mum significatum 814.44
Nerui iuxta secundū signifi
catum quid sit Ibid. 53
Nerui iuxta tertium signifi
catum quid 815.7
NIGELLAS facultas 1099.17

Nigella oleo intrita & inspirata,
medetur grauedini 329.56
Nigredini oculorum causæ 820.11
Nigredo quæ ratione uisui ad
uerfetur 672.35
Nihil à familiari infestat 329.9
Nihil ex nihilo fit 804.18
Nihil ex proprijs actionibus con
stat 333.21
Nihil in contrariam qualitate
torum simul migrat 84.45
Nihil intus forisq; parē agendi
facultatem sortitur 57.57
Nihil fit sine causa 89.55. 330.
Nili crocerū 325.4.5 (23.843.9
Nimium omne uitiosum 367.16
Nirri spuma, & aphronitū quæ
habent facultatem 403.61
Nitri uires 3121.11. 1123.20.
1143.41
Niuus usus quæ incōmoda affe
rat 412.21
N M O A2 qualia ulcera sint
1179.1
Noræ discernentes eos, quibus bi
lis inhiit in uentriculum atq;
in ieiunum 54.5
Notio cōmunis 66.4. 842.12
Notiones medicinalis experien
tiæ quæ 654.4.9
Notitia apothērapēutice 32.6
Notitia præparatoria Ibid. 5
Notandū nihil in sauis corpo
ribus 360.54
Nouiluniū quando fiat 617.21
Noxa à uino illata quomodo
deprehendenda 584.43
N V C A 2 regis non nihil adiri
gunt 385.35
Nucis pinæ uel strobili facul
tas 383.14
Nucis ponticæ & auellane sub
stantia & facultas 385.10.1088.
Nucū uiridiū succo adeft (18
adstrictio penetrans 3231.63
Numeri deprauati causæ 669.30
Nutricis uisus rationis quid dige
ritissime consulendum 434.6
Nutriendi consiliū unde peten
dum in ægris 907.17
Nutriendi in prima accessione
inuatione qui sint 906.4
Nutriendi modus unde colligi
possit 613.4
Nutriendi qui nō sint in ipsa ac
cessionis declinatione 907.14
Nutriendi tempus in synochis
quale sit aptum 916.55
Nutriendi tempus unde fit con
iectandum 924.62
Nutriendi uia quæ ratione fir
metur 478.31
Nutriendū omne, familiari sibi
succū ex sanguine trahit 111.42
Nutrimēta immo dicē aut intem
pestiue sumpta infrigidat 57.35

Nutrimēta simul & medica
menta 59.38
Nutrimēta sunt mediocriter ca
lida 1043.36
Nutrimēta uentrem soluentia,
biliosos uentriculū ante alios
cibos ingerenda 477.23
Nutrimēti principia quatuor
324.37
Nutrimēti qualitas ab affectu
& temperie est sumenda 916.48
Nutrimēti quæ minuenda quan
titas, aut mutanda qualitas,
aut utrunq; facienda 477.4
Nutrimēti quantitas à uirtute,
qualitas à temperie sumenda
est 916.31
Nutrimētorum duplex genus.
1043.17
Nutrimēti æquocē dictū 76.9
Nutrimētum à medicamento
quomodo differat 84.9
Nutrimēti animalis quod non
sit conueniens 84.10
Nutrimētum attrahitur uia na
ture 783.4
Nutrimēti omne dulce 1043.18
Nutrimēti appriet quod sit 57.25.
56.44. 58.41. 76.6. 1012.13
Nutrimēti tripliciter dici 57.22
Nutrimētum uinci ab eo quod
nutritur 1051.12
Nutrimētum ut alteratur, sic
etiam quoquomodo alterat id
quod nutritur 427.27
Nutrimēti, quæ nature non offe
sunt familiaria 404.43
Nutrire corpus quæ parcius &
quæ uberius possint 390.57
Nutriti interim dum horret qui
possint 906.39
Nutritio assimilatio pfecta 56.
Nutritio augetcentibus ne
cessaria 75.18
Nutritio naturalium actionum
est prima 687.6
Nutritio necessaria quæ 82.2
Nutritio actio uitiosa, est ele
phantiasis & leuce 684.56
Nutritio organa 600.40
Nutritio quidō fiat, & eius cau
sa 75.20. 81.58. 474.46
Nutritio quid 74.31. 114.31.
691.56. 1043.33. 1255.12
Nutritio quō fiat 408.39.464.
Nutrix grauida, lactando (49
infantulo est inepta 434.18
Nux iugians continet filiquas
sepiuaginta duas 1290.28
Nux pinea 407.3
Nux Pontica continet filiquas
decem & octo 1290.29
Nux regia sumpta cum carica et
ruta, fit alexipharmacū 385.42
Nux regia uiridis, apta est soluē
do uentri 385.46

NYMPHAEAE facultas 1098.
Nympha matricis propu- (19)
 gnaculum 305.14
O
OBSIS cibidigētio minuenda, augenda autem exhalatio est 478.37
Obstitatus curatio 950.55
Obiecta planē distantia quib. cōtingat uidere 669.41
Obiecta quando fenestra uidēantur Ibid.54
Obiecta quando uideantur duplica 668.40
Obliuio d frigidit gignit 683.1
Obliuisci quid 101.4
Obolus constat siliqua tribus 1290.11
Obseruatio absq. ratione nō fit 13.2.7
Obseruatio & experientia idē 13.1
Obseruatio fieri debet in pluribus 13.41
Obseruatio haud in similitū accidenū cōcurib. colligit 13.18
Obseruatio qui fieri debeat integra ac absoluta Ibid.54
Obstetricandi ratio 81.56
Obstructa non aperienda prius quā plenitudo uacuet 919.1
Obstructio affectus est paruum dissimilium 18.15
Obstructioni dē dēstriti cutis ex aure flatu ortis, quod conueniat remedium 453.15
Obstructionis d duro stercore curatio 835.53
Obstructionis remedia etiā ad cōcoctionem facere 477.54
Obstructionis differentie & cūse & remedia accommoda 30.46. 453.6. 474.31. 477.56. 835.49. 892.16. 905.49. 919.3. 1070.6. 1081.21. 1101.56. 1102.48. 1106.61. 1144.34
Obstructio quid 918.40
Occasio temporis continet in hīs quae corpus necessariū efficiunt 830.39
Occipitis foramen maximū 131.
Occipit nec facile exurit. (64)
 rur, nec citra uoxā refrigerat, principium spinalis medullae culm fit 1198.12
Oculi sententia qualia esse debeant 1058.27
Oculi sola ratione cōprehenduntur 13.13
Occupari ueroq. cis, non mutant temperamentum 474.42
Ocimi uis 1114.17
Ocimoides culus fit facilius Ibid.12
Oculi cū lachrymē 644.18
Oculi fabrica 346.57
Oculi glauci & nigri unde fiant 820.9

Oculi humoribus quae productiones incumbant 166.3
Oculi musculi magni 109.47
Oculi offenduntur a uehementi splendore 166.56
Oculi qua parte expurgant 417.
Oculi quare gemini 169.31 (50)
Oculi quare posterioribus capitis partibus nō insint 164.61
Oculi quotupliciter possint perueri 748.38
Oculi aceti pncipiosissimū 8.16
Oculis caligantibus quae sint cōsideranda 724.40
Oculi fortiti maiores & molliores nervos, quā alia pars 110.
Oculis perniciosisissimā me (44)
 dicamenta quae 850.17
Oculis sursum uel deorsum perueris obiecta uidentur duplicia 748.51
Oculi tunicae 843.50
Oculi ulcera qualia medicamentā possunt 869.8
Oculo inflammato succus corniculi, & lac muliebri auxiliat
Oculorum affectibus re- (12.33)
 media Archigenis 1223.14
Oculorum affectus per consensum orti 748.63
Oculorū d statulenta substantia extensorū, curatio 942.64
Oculorum augulis erosio quae conferant 1102.5
Oculorum cavitās quid indicet 956.58
Oculorum distentionis d plenitudine curatio 942.58
Oculorum dolores compesci festā humerali, aut media 996.
Oculorū dolores quā ratione Galenus sanarit 850.33
Oculorum dolores uehementes cataplasmata soluent 1211.60
Oculorū dolor unde exoritur 942.43
Oculorū excrementa quā parte expurgentur in nares 170.25
Oculorum ex signis, in sanis etiā animi affectus cognoscuntur 637.7
Oculorum fluxionibus cur non sint admouenda obstructiua pharmaceutica ante capitis uacuationem 1216.8
Oculorū fluxionib. repellendis agglutinatoriū pharmaceutum 1212.3
Oculorū hebetudini d crasso humore orti, quae auxiliēt 1091.2
Oculorum inflammationē cum fluxione, quā rāde Galenus curarit 996.56
Oculorū inflammationi quando balneum, & cur conducat 942.52

Oculorum magnitudo quid significet 819.60
Oculorū morbus curatio 942.48
Oculorū motus qualis 93.46.
Oculorum motus quā- (94.18)
 tuor uoluntarij, totidemq. illis praefecti musculi 169.32
Oculorum motus unde pereat 748.10
Oculorum musculi facillimē cōcoquantur 409.14
Oculorū musculi obliqui 169.42
Oculorum nerui 351.38. 351.40
Oculorum nerui, crassiores neruis linguae 128.42
Oculorum nerui motores unde oriuntur 351.8
Oculorum paruitas quid significet 820.3
Oculorū phlegmonas iuuat oculi albumen 943.39
Oculorum plagia quae opituletur 1223.16
Oculorum pus, collyria ex myrrha discunt 954.59
Oculorū pus quomodo uacuet dum Ibid.64
Oculorum pus quomodo curet 954.49
Oculorum sensus aliorū omniū certissimus 310.46
Oculorum sensus unde pereat 748.17
Oculorū situs longē ratissimū 253.12
Oculorum temperamenta quomodo dignoscantur 819.49
Oculorū rancis induratis quae conferant 1220.50
Oculorū uasa quando sint praecidenda 943.20
Oculorum uisita quid expurgat 1077.43
Oculorum ulcera, qualia medicamentā possunt 1218.57
Oculorū ulcerū scopus 1219.4
Oculos cerneretaniū quae pupillae ē directio opposita suū, ob idq. uolubiles esse 169.16
Oculos pharmaceutum roborant 1220.64
Oculo uno clauso, amplificatur alterius pupilla 167.61.
 345.1. 668.58
Oculus factus propter opticos nervos 160.65
Oculus, organū lucidissimū & q̄similimum soli 115.37
Oculus uterque quatuor habet motus rectos & duos circulares 94.40
ODORABILIVM substantia est uaporosa 1050.33
Odorandi sensoriū, principium est anteriorum cerebri uentri culum 670.55
 Odora-

INDEX.

Odorara omnia conciliant capi-
tis dolorem 746.60
Odoratorum sensus ubi perficia-
tur 747.61
Odoratus sensorii naporosum
existere 129.9
Odorati nō omne suave 1070.
Odores nō indicant facul-
tates medicamentorum 1011.17
Odores pleriq̃ similiter saporib.
nos afficiunt 1050.9
Odores uchemēiores caput cō-
tinuū lēdunt 131.3
Odoris sensus in quibus cerebri
uentriculis collocet 1050.17
Odor nō perinde ut sapor sensi-
biliū tēperies indicat 1050.46
Odor refrigerantiū confert capi-
ti ex calfacto 129.63
Odorū dignotio inuat plurimū
toram respirationem 135.9
Odorū dignotio promouet ab-
inspiratione cerebro 135.3
¶ O D I D M A ex cuius humoris
affluxu uascatur 708.5.991.13
Ordema in quibus symptoma
sit 976.34
Ordema quid 944.56. 976.31
Oedemate pituitoso, i thorax &
iecur nunq̃ infestatur 601.51
Oedematis & aneurismatis dis-
crimen 708.35
Oedematis ex influxu orti cura-
tio 976.38
Oedematum curatio 944.64.
1099.54
Oenopia radix macrotem discu-
tit 69.61
Oesophagi in uentriculum in-
sertio 133.46
Oesophagi situs & usus 133.16.
762.60
Oesophagus seu gula 117.37
Oespyos 1159.40
Oespyon quā uim habeat 1153.
¶ O L I A calida & relaxan-
tia 453.23
Olex uis 1078.12
Olei cum uestimentis collatio
1027.47
Olei differentiq̃ cōplices 922.33.
927.14. 1023.1. 1116.31. 1078.
Olei dulcis natura & ui-
res 1026.1
Olei effectus uarij 1022.10
Olei facultas 1176.38
Olei ex oliuū facultas 1078.17
Olei inunctio prohibet succorū
exhalationem 478.32
Olei leotiscini facultas 1174.14
Olei partes 1025.50. 1041.45
Olei calidi perfluo, quibus con-
ueniat 1022.57
Olei refrigerandi ratio 1022.49
Olei uires qualiter expendant
Ibid. 44

Oleo chamæmelino in quibus sit
utendū corporibus 1198.39
Oleo in cocta redduntur sicca
1022.12
Oleo post frictionem membra
subigenda 439.54
Oleo in flammā uertunt 55.63
Oleo ungendi qui sint, & qui mi-
nimē 1028.7
Oleracea omnia caco-chyma 410.
Olera omnia gignunt pau-
cisimum sanguinem 187.17
Olera quæ ob lentorē facile de-
scendunt 369.11
Olerum omnium radices excre-
mentitæ sunt 417.43
Olerū plerorūq̃ caulis tēperatu-
ra sicciior, q̃ folia 389.53
Olerū uarij speciei succus 410.33
Oleum ablutum candidius red-
ditur 1014.63
Oleum aluum subducit 1022.19
Oleum anethinum 463.27
Oleum calfacit, at uō euideoter
1026.50
Oleū calorem parem eis, quibus
applicatur, accendit Ibid. 63
Oleum chamæmeliū 463.24
Oleum corpori alitum, caloris
& sudoris effluxum prohibet
1028.3
Oleū cur obscurē nos calfaciat
1016.1
Oleum est aliorum medicamen-
torum materia 1028.37
Oleum & uestes nō propriē nos
calfaciunt, sed obliuientia fri-
gori 1027.52
Oleum expeririundum est in ho-
minibus 1026.28
Oleū expers salis & salsum, q̃mo-
do aluum subducit 1025.29
Oleum frictionibus accommoda-
tissimum 1026.26
Oleum insecta perimit 1022.22
Oleum laisitudinem leuit 102.
27. 1023.20
Oleum lotum est minimē mor-
dicans 1078.31
Oleum lucernarum est tenuius
communi 1191.37
Oleum mediū inter humectan-
tia & siccantia 1028.15
Oleum multifariam dicitur nos
calfacere 1027.38
Oleū oculos mordicat 1022.18
Oleū omphaciū astringit 1025.
Oleū pingue reuocet quā ra-
tione & timetur 1078.62
Oleum quid conferat ad frictio-
nem 447.13
Oleū quibus fluxionibus sit no-
xium 1026.57
Oleum repurgandi ratio 1025.58
Oleū ruta cū auxiliat doloribus
colicis à frigido succo ortis
933.23

Oleum Sabinum 450.38
Oleum samphylinū 463.30
Oleū simpliciter & per abutū
dici 1022.68
Oleum talem feruat nostrā tem-
periem, qualē accepit 1018.19
Oleū temperie est mediū 1031.28
Oleum tepidum neruis cæsis nō
congruit 1163.35
Oleum ueluti materia reliquorū
medicaminum 1027.10
Oleū ulcera reddit fordida 875.
38
Oleū ulceri cauo aduersissimū
medicamentum est 849.60
Oleum uulpiū & hyænarum
quib. affectib. profit 1142.17
Olfaciendi ratio 130.6
Olfaciendi sensorii neq̃ esse uasi
pelliculam, neq̃ eius os 129.12
Olfaciendi sensus in anteriorib.
cerebri uentriculis situs 129.
50. 354.26
Olfaciendi uis à quibus labefa-
ctetur 760.38
Olfactitium substantia 129.3
Olfactorij instrumentū seden 147
Olfactui qui uapores uolu-
ptatē uel dolorē afferat 673.
Olfactū acres uapores in-
festant 671.40
Olfactus de quib. dicitur 128.5
Olfactus & gustus cibum discer-
nendorū instrumenta 413.60
Olfactus sensilis 129.2
Olfactus sensibile crassiorē est
partium, quā sensibile aud
Oliux 470.18 (Ita 253.32
Oliux & uux quid tenui uictū
conferat 418.16
Oliux halmadæ & colymbadæ
eduntur aurealios cibos, uen-
tris subducendi grana 185.22
Oliux muria condux discutit
& uehemētē astringit 1239.4.
Oliux parū uutimenti largiū
tur 185.19
Olostrij uis 1098.50
Olyra 174.27
Olyra uis 415.56. 1098.53
¶ O M A N T I constitutio & usus
120.24
Omenti figura 179.40
Omenti natura 120.19
Omenti origo Ibid. 64
Omenti pinguitudinis utilitas
Omenti uenæ à mese-
raicis oriuntur 142.18
Omentō excidente per uulnus qd
agendum 876.19
Omento georando unde prin-
cipium 179.30
Omentum fouendi caloris gra-
tia condum 178.39
Omentum quid 179.14
Omnia egeot materia ex qua, &

efficiente à quo fiant 693.31
 Omnia sint mediocritas 438.35
 Omphacij facultas 1041.7.11.50
 Omphacium 1220.27 157
 Omphacini facultas 1156.32
 Omphax & acetū in quibus differant 1044.56
 ONNAGRI facultas 1093.56
 Onobrychis cuius sit facultatis Ibid.62
 Onocilli vis 1067.7
 Onoclea quibus morbis conueniat 1066.59
 Ononis cuius sit facultatis 1099
 Onofima cuius sit efficacia 1098.59
 OPERATIO ligitur tripliciter 827.48
 Opera uoluntaria duplicia 101.
 Opera uoluntatis quidā plura sunt libera, quaedam corporis affectibus inueniunt 101.15
 Operis de usu partium cōmoda 130.1
 Ophiasis unde 954.8. 1189.12
 Ophites cuius sit facultatis 1118
 Ophthalmia siue lippitudo 111
 ni medicamenta congruentia qualia esse debent 1218.32
 Ophthalmia laborantes offendit lux 167.4
 Ophthalmia quid 32.21. 971.30
 Opificis artem, manifeste quid indicet 125.18
 Opil vires 1262.24
 Opio recens mali praesentis, cur tristitia inferat: inuenerat autem, nequaquam aut uenit perinde 131.24
 Opio cōfectis utendum est post tempus compositionis ad minus semestris 978.31
 Opio constantium medicamentorum compositionis scopus tria proponit 1262.35
 Opio qualia medicamenta miscenda Ibid.30
 Opio quando in capitis dolore utendum 1202.21
 Opisthoronosis quid 716.17
 Opitū quibus misceri debeat ad aures inflammatas 1208.58
 Opium recipientia medicamenta dolore tollunt, ipsum tamen dispositionē relinquunt 978.22
 Opobalsamū ad affectiones Indigentes calore non magnopere opitulari 1199.19
 Opocalpasion est letale, reperitur in myrrha 1282.28
 Opopanax facultas 1100.15. 1183.54
 Optici nerui pductio, affectuū crystallini humoris ad cerebrū uerax est nuucius 165.42

Optici nerui cur intra cranium iungantur, postea autem diuariantur 271.56
 Optici nerui situs, cōsistentia, & constructio 346.29
 Optici nerui soli cerebro uō apparent duriores 253.15
 Optici nerui soli, sensibiles forantur meatu 253.18. 270.53
 Opticorū neruorū cōspiratio in unū ductio 170.52. 345.8
 Opticorum neruorum exortus 344.62
 Opticorum neruorum progressus 253.62. 264.61
 Opticum inferi in crystallinum humorem 265.39
 Optimū in omni genere unum existit 472.64
 Opus de usu partium cōmendatur, tanq̃ theologiae uerū principium 319.16
 Opus de usu partium philosophis longē utilissimum Ibid.10
 Opus quid dicatur 73.51
 OPERARIUS serapias quā habet uim 1099.53
 Ordo & aequalitas, naturae familiaris est 566.24. 594.16
 Ordo quid 497.37
 Organa ad alterationem quare plura sint instituta 75.46
 Organa omnia in animalibus, instas habēt à natura facultates 320.28
 Organis respiratoris prouidentia inest, qua cauent, ne graui dolore animal affligat 495.1
 Organorum elementa quare 74.53
 Ore uentriculi nauseabundo existente cum alui astrictione, quid agendum 481.17
 Origanī facultas 1099.27
 Ori mouendo tria musculorum genera destinata, aperitiū, clauditiū & circūagentiū 275.61
 Oriri & coherere differūt 161.20
 Oris affectionibus cur medicamenta fortia & uenenoſa nō exhibenda 1231.7
 Oris crustis delēdis remedia uaria 1235.50
 Oris functiones musculorū quino genere ambiuntur 168.57
 Oris inflammati curationis cōmunis scopus quis 1230.65
 Oris inflammationes uigentes quibus medicamentis sint cōquendae 1232.52
 Oris inflammationibus induratis, quare medicamenta conueniant 1232.43
 Oris inflammationibus medicamentis opitulentur 1231.11
 Oris inflammationi concoctae quare congruant Ibid.47

Oris musculi 170.5
 Oris paries unde neruus ad sapores discernendos recipiant 260.44
 Oris pustulis extripandis pharmacae quare cōueniant 1235.37
 Oris tunica durior est omnifer faciei partibus 261.28
 Oris tunica quoq̃ diiudicat sapores 276.4
 Oris uentriculi affectibus pharmacae Asclepiadis 1235.40
 Oris uentriculi affectus, cur maxime animal infestent 675.9
 Oris uentriculi affectus primarius 764.6
 Oris uentriculi dolores quare leniant 1252.56
 Oris uentriculi & hepatis inflammationes qualia pharmaca desiderant 1248.21
 Oris uentriculi nerui, insigni praediti sensu 602.24
 Oris uentriculi partes cur sensu acutissimo praeditae 261.61. 741.53
 Oris uentriculi situs 235.52
 Oris ulcera quare medicamenta requirant 869.11. 1235.32
 Ori uentriculi ob atriū bile in flatione tenrato, quare conseruant Ori uentriculi opus 1252.63
 est sensu plurimum 125.46
 Orminū siue gallitricū 377.58
 Orobi duplices Ibid.20
 Orthopnea laborantes cur uiuent spiratio recta 505.50
 Orthopneam qualis comitetur spiritus 501.45
 Orthopneae quare uiuent 1095.22. 1104.7
 Orthopnea quid sit, & unde signatur 494.2. 735.1. 1246.57
 Orthopnoici cur sic dicantur 1246.52
 Orthopnoici & asthmatici quare pharmacae cōueniant 1247.44
 Orta ab aliquo, similis speciei esse oportet cū origine sua 161.22
 Oryzae facultas 1099.42
 Oryza utuntur ad sistendam aluum 375.6
 OS animalis qua ratione aperitur 275.8
 OS animalis qua ratione claudatur 272.62
 OS aqua replendum est, dum erithinis quis uinitur 1207.23
 OS à quibus organis apertū 281.40
 Oscitationis cōtinuū causa 504.
 OS colatorum 258.47 447
 OS cubiforme quid dicatur 111.33
 OS hyoideus 171.55
 OS iugale 170.10. 268.54
 OSiris facultas 1099.60
 OS lapideum 265.7
 OS

Os larum cuorum spinæ of-
fium maximum 286.61
Os larū spinæ extremitas 261.51
Os nausiforme 211.28. 212.36
Os postlocorum prælocorum mi-
nus sit 198.32
Ossa ad aures posita, petrosa
337.6
Ossa capitis sex 132.58
Ossa corporis plura ducentis
125.58. 335.31
Os sacrum ex tribus constat par-
ticulis 135.39
Os sacrum quatuor constat ossi-
bus 286.19
Ossa cur cuterarius exulceren-
tur 1227.64
Ossa cur tam exiguas fortita sint
venas 317.41
Ossa fracta deligendi ratio 777.5
Ossa fracta, tertio die soluenda
sunt Ibid.43
Ossa gestata minora sunt gestan-
tibus 286.60
Ossa humana epilepsiam curant
1138.28
Ossa humana qualia 280.37
Ossa imbecilliorū animantium
magis concaua & laxiora, for-
norum densiora magisq; cō-
pacta 280.28
Ossa interdū fluxio in uideri 706.
Ossa maiora cur semper ca- (25)
uerosiora minorib. 208.46
Ossa parua carēt medulla 280.12
Ossa pectoris septem 135.65
Ossa pubis 292.12
Ossa puerilia coalescere possunt
834.33. 876.38
Ossa sunt dispersa iuxta muscu-
lorum imbecillitatē & robur
280.23
Ossa ut coalescant, quæ sunt apta
876.30
Os scapulæ magna ex parte car-
tillagine regitur 116.13
Osse fractio simul afficiuntur mu-
sculi 814.35
Ossibus componendis quæ re-
quirantur 281.33
Ossibus medullis in sunt utrin-
que capita 280.10
Ossi fractio quæ figura sit eligen-
da 877.40
Ossis colatorij usus 254.53
Ossis sacri consideratio 135.35
Ossis sacri usus 292.28
Ossium animalis similitudinis usus 281.
Ossium capitis considera- (17)
tio 132.16
Ossium capitis differentia 132.1
Ossium cognitio, medico est ne-
cessaria 131.23
Ossium combustorū uis 1138.24
Ossium differentie 131.33
Ossium generatio 110.61

Ossium genus in digitis, factū gra-
tia eius quod melius 197.38
Ossium motu ratio 96.18
Ossium natura & munus 131.29
Ossium nutrimentū medulla 280.
Ossium structura cuius gra- (40)
tia sit 280.5
Ossium structura in digitis 198.52
Ossium substantia cur non facili-
ter soluitur 317.37
Ossium substantie usus 131.41
Ossium thoracis speculatio 183.38
Ostægræ usus 879.28
Ostægræ quid 450.20
Ostracites quam uim teneat
1118.13
Ostrea alium ualentius subdu-
cant, corpus autem imbecil-
lius alunt 402.7
Ostrea carnem habet mollissimam
Ibid.3
Ostrea edī etiam cruda Ibid.11
Ostrea quā uim habeat 1138.63
Ostrearū corpus humidum, cu-
tis sicca 55.3
Ostreia quæ dicantur 1138.48
Os uentriculi cur à cerebro reci-
piat neruum synergeticum
312.22
Os uentriculi euerit omne quod
cū fastidio accipitur 1212.21
Os uentriculi exquisitissimum est
sensu prædictum 673.64
Os uentriculi, instrumentū ap-
petitus ciborum 312.23
Os uentriculi quæ symptomata
inferat 764.1
Os uentriculi quibus inflammatis,
syncopeprehenduntur 316.1
Os uentriculi quibus præcipue
irritetur 314.15
Os uentriculi quorum affectuum
sit causā, lege consorij & pro-
pria ratione 674.3
Os uentriculi ueteres cor uomi-
nabant 324.14. 1248.55
Oua assa in cineribus 398.55
Oua fixa pessima Ibid.57
Oua subuentanea animalis exclu-
dendo inepta 299.19
Oua subuentanea citra gallina-
cei operam sunt 116.36
Oua suffocata, elixir ac assa sunt
meliora 398.59
Oua suffocata parandi modus
Ibid.60
Oua tremula præstantissima ad
nutriendū Ibid.49. 406.37
Oua tremula quæ sint 406.37
Qui candidū mingat aurū dolo-
res à frigore ortos 1208.47
Qui temperies 1139.61
Quorū coelorum facultas 398.55
Quorum differentie Ibid.47
Quorum omnium differentiarum
facultates 406.34. 1139.53

Quorum prauitas unica est uer-
tutis 113.9
Quorū sorbilibus facultas 398.55
Quo roto & crudo ad quæ utra-
mur 1140.8
Quum in aceto percoctum ac e-
sum, dysenterie auxiliatur
Ibid.11
Quum sorbilibus quibus cōueniat
Ibid.27
QXYACANTHOS cuius sit
facultas 1099.12
Oxybaphum cōtinet sciquicya-
thum 1092.45
Oxycratum ex quibus conficit
1018.58
Oxycrati uires Ibid.32
Oxycratum uulnera glutinat
1019.17
Oxygalactis usus quibus couue-
niat, ac quibus non 396.48
Oxylapathi siue rumicis uel la-
pathi acida facultas 388.43
Oxymel ætaribus & naturis o-
mnibus utile 412.48
Oxymeli aperendis obstru-
tionibus aptissimum 892.40
Oxymeli confectio, qui crudia
succis redundant 928.2
Oxymeli epileptici dādi 1006.
Oxymelitos aequi facien- (49)
di modus 460.46
Oxymelitos compositio Ibid.43
Oxymelitos differētiæ 1007.39
Oxymelitos noxæ 919.31
Oxymelitos uis 481.14
Oxyrhodinum quibus conue-
niat affectibus 942.54
Oxyricheni species duæ 1109.30
Oxysericis piscis perpetua alpi-
cis cæcum 210.33
Oxyseris 306.5
OXYSTENAS à quibus gignantur
humores 1214.25
Oxæni & polypi cōmunis cu-
ratio Ibid.39
Oxænarū remedia Archigenis
Ibid.43

P

PACETI sphragis 1222.13
Pacis delubri olim conflagrasse
& cum eo bibliothecæ pala-
tium, & nonnullos Galeni com-
mentarios 1148.59
Pædorriba 165.10
Pædorriba differt à gymnastice,
ut medicus à coquo 444.62
Pædorribam esse ministrū gym-
nasticæ 365.18. 446.35
Pæonia appensa communē mor-
bum per sanat 1076.33
Pæonia uis Ibid.36
Palati foraminū usus 254.44
Palati os cur durum & densum
Palatum 241.57 (281.14)
Palati uis 1100.2

Palmarum germinis facultas	414.	res purulentas	1221.34	Papaueris succus aurium dolo-	
Palmarum uis	1112.34 (60)	Pancrati uis	1099.63	res mingit, non autem perfa-	
Palmarum uertex est uescus	387.19	Papaueris corpus	221.15	nat nisi ex accidenti	1210.1
Palmarum fructus	407.61	Papaueris substantia & usus	221.15	Papaueris succus humano cor-	
Palmarum Aegyptiae	385.1	Pancricon	141.20 (40)	pori planè contrarius	58.59
Palmarum ex proprietate excitant		Panici facultas	1079.34	Papaueris succus non immutatur	
capitis dolorem	1200.3	à Panico abstinendum	409.49	à nostro corpore	58.2
Palmarum non maturefcunt, nisi		Panicum & milium	374.59	Papulis in mèro erumpentibus	
in regionibus admodum cal-		Panicum azyimi, quibus aliquid ca-		medicamenta congruentia	
idie	385.15	sei ac cesit, promptè omes lae-			
Palmarum esu uiscerum he-		duunt	371.31	Papyri facultas	1100.8
par obstruit	385.8	Panes calfaciunt	371.2	Paralyti à torpore quid disse-	
Palos & tela infixa quid euocet		Panes concoctu facillimi qui-		rat	671.36
	1101.40		371.23	Paralyticus morbus est frigidus	
Palpebrarum iuuant ad capefcendū		Panes furfuracei parū alūt, uen-			
lōmum	130.36	trem excrementis replent, ac			
Palpebrarum quod opticitur peruer-		facile descendunt	371.1	Parentecephalidis figura concin-	
tantur	742.53	Panes hordeacei	415.48	na, signum optimè dispositio-	
Palpebra inferior cur minor supe-		Panes hordeacei minus nutrit		nis capitis	817.28
riori, motusq; expert	270.	trinites, magisq; subducitur		Parentecephalia siue cerebellum	
21. 269.59		per alium	371.31	192.2. 256.15	
Palpebrarum cōstitutio	168.57	Panes miscellanei	371.11	Parentyma quid	700.35
Palpebrarum cutis cur dura car-		Panes qui tardissime denūciatur			
tilagineisq;	278.65	Ibid. 6		Paricidi tempus siue obseruatio-	
Palpebrarum defluuiis quae con-		Panes subeineritū, pessimi: &		ne conceptionis, non ritè in-	
ueniant	1223.35	cut	Ibid. 57	uenitur	126.35
Palpebrarum motus	270.2	Panis athletis cōmodus	Ibid. 26	Paritatis corruptio, cuius fit	
Palpebrarum supernarū musculi	169.60	Panis azyimus nemini commo-		causa	427.34
Palpebrarū usus	130.34. 168.47	duus	Ibid. 20	Paristhymia	709.54
Palpebras quae claudamus ubi		Panis coquendi formae quae pra-		Paristhymia unde	699.11
splendor nos laetit	167.30	stantiores habeantur	Ibid. 52	Paronychiae facultas	1100.31
Palpebris scabris quae medica-		Panis ex panico milioe confe-		Parotidis quid curet	1119.15.
menta medeantur	1220.41	ctus, cinerem sapit	408.26	1213.3	
Palpitiatio alius motus est à pul-		Panis ex typha & aena confe-		Paronides quid	1212.59
su	678.4	ctu facultas	415.54	Pars coniuge carens mediam re-	
Palpitiatio à tremore quo disse-		Panis homini mediocri quis fit		quirit positionem	304.43
rat	678.18. 710.50	optimus	371.18	Pars dextra sola, uel sinistra, cur	
Palpitiatio cordis	719.59	Panis lon substantia	Ibid. 29	resoluitur	729.42
Palpitiatio fit quoq; in cute	517.	Panis lotus nutrit minus, om-		Pars inflammata omnis dolet a-	
Palpitationem quae submo-	(42)	nibus minime obstruit	Ibi. 26	gendo	769.30
ueant	711.2	Panis optimi cōpositio	415.27	Pars nulla in fetu generatur cū-	
Palpitationis causae	678.3.	Panis optimus quis	405.16	tra sanguinis subtilis	121.60
711.41. 712.20		Panis puri substantia in cuius		Pars nulla propter se habetur	
Palpitationis cordis curatio	760.	meatib; hærere est apta	949.1	318.19	
Palpitationū medicamen-	(10)	Panis qualis sensibus exhiben-		Pars omnis quae mouetur, uarijs	
ta	712.10	duus	469.14	utitur musculis	94.50
Palpitiatio quibus partibus acci-		Panis quod purior fuerit, eò ma-		Pars quaeq; corporis, quod fuerit	
dat	711.22	gis sensu aduersatur	Ibid. 22	magis temperata, tanto prò-	
Palpitiatio quibus fit familiarior		Panis seni aptus	371.28	ptius munus suū obit	583.53
711.61		Panis filigineus plurimum ali-		Pars quaeq; propter qualitatem	
Palpitiatio quid	677.63. 678.	menti praestat	Ibid. 17	temperiem habet functionē	
16. 711.35. 712.52		Panis uinofus	406.6	729.29	
Palumbes carne habent duram		Panum quatuor genera cum uu-		Pars quaeq; simulata sunt a-	
417.21		tritionis modo	Ibid. 17	uimalia, suū habet usum	125.19
Panaces Asclepiū quam habeat		Papaueris capitibus quando fit		Pars quid dicat	194.23. 842.19
uim	1100.25	utendum	1206.41	Pars similis quae dicat	842.57
Panacae Heracii compositio & uir-		Papaueris cornuti uis	1096.9	Pars superuacua recipiens, qua-	
res	1176.4	Papaueris facultas & species		lis esse debeat	970.24
Panacis Chironij facultas	1100.	177.40. 1095.58		Partes ægrotantes dignoscendi	
Panax Heracium cuius fit (19)		Papaueris herculei facultas		ratio	826.59
potestas	1100.14	1096.16		Partes affectu quando audacter	
Panchrestos Asclepiadis ad uir-		Papaueris sanuifemen eodem		& quando trepidè uacuari de-	
rios inter notū affectus	1246.	panibus permiscetur	377.59	beant	888.4
Panchrestos Erasistrati ad	(30)	Papaueris feminis facultas	415.	Partes animalū extremæ, quod-	
lippitudines omnes, & ad au-		Papaueris succi facultas	(2)	nam corpori alimentum præ-	
		1275.44		stent	407.21
				Partes à feminē ortæ	122.3
				Partes	

INDEX.

- Partes à similibus temperaturæ
sue causis læduntur facili: mo-
dico uero contrariorū ulu iu-
uantur 819.66
- Partes à uicis a uulsi, lamis: à re-
nibus, sunt carunculis simi-
les 774.8
- Partes carnosæ, natura calidio-
res 49.17
- Partes corporis omnes neruo-
rum sunt compotes 348.43
- Partes corporis feruntur aut uic-
tus ratione, aut medicamen-
tis, aut manuū opera 32.35
- Partes corporis uniuersæ, ope-
ra sunt naturæ 74.19
- Partes dextræ, sinistræ sunt pa-
res 355.33
- Partes dextras masculorum: fini-
stras, femininarum esse gene-
trices 300.2
- Partes diductæ, in unum quibus
modis adducantur 83.19
- Partes eas plecti solere, quibus
quis peccat 342.47
- Partes ex defectu nutrimenti ce-
lerimè refrigerantur 884.17
- Partes exercitæ redduntur per-
tiores & solidiores 427.61
- Partes familiari alimento defi-
tunt, expleuntur succis uiriosis
357.42
- Partes fortiores ad imbecillio-
res excrementa propellant
87.12
- Partes imbecilliores à fortiori-
bus humores recipiunt 992.42
- Partes imbecilliores cur omniū
primæ corripiant excremen-
tibus morbis Ibid.49
- Partes infirmæ dum laborant nō
sunt fricandæ 467.26
- Partes instrumentaræ 341.20.
349.60
- Partes matricis dextræ cur cali-
diores sinistræ 299.62
- Partes maximè caue quæ 82.12
- Partes neruis carentes 309.60
- Partes neruossæ iusto pituitoso-
res sunt 392.20
- Partes nō impellunt animam ad
agendum 195.33
- Partes omnes alimento indigēt
317.9
- Partes omnes alimentū sibiipsis
assimilant 301.45
- Partes omnes ratione tempera-
menti agunt 73.58
- Partes, per quas fit fluxus, corro-
borandæ 965.39
- Partes phlegmone oppressæ, du-
plici afficiuntur affectu 61.1
- Partes primariæ quæ 349.57
- Partes principes sunt cerebrum,
cor, hepar & testiculi 816.43
- Partes quæ alio promptius flu-
xiones excipiant 992.56
- Partes quæ citius, quæ posterius
in utero formentur 46.13
- Partes quæ conferunt ad uitam
principes 314.15
- Partes quæ corrigi, & quæ mini-
mè possunt 832.48
- Partes quædiū interdum per he-
par purgantur 767.55
- Partes quæ uacuantur facili, &
quæ acriora medicamenta de-
siderent 817.38
- Partes quæ unā cum effectū am-
potentur 950.18
- Partes redundantes refecantur
tripliciter 838.23
- Partes resiccate, pigre ad mo-
tum sunt 120.32
- Partes seniles admodum sicce,
licet medicis capacitates super-
flua humiditate redundant,
475.13
- Partes sensu uacue nullius sym-
ptomatis sensum possunt per-
cipere 698.1
- Partes sicce quæ sint 814.64
- Partes singulæ trahunt alimen-
tum familiare: item alia sangui-
nis sedimenta 329.45
- Partes solidæ ex semine generan-
tur & nutriuntur 114.28.
914.45
- Partes solidæ nullo modo humi-
diores efficiuntur 825.17
- Partes tardi sensus continent
omne medicamentū 885.64
- Partes uoluntario moru prædi-
tæ, ad minimū duobus egent
musculis sibi oppositis 269.
52
- Partheniū uis 1079.22
- Partibus cunctis inest facultas
propriam trahendi materiam
259.36
- Partibus inflammatis accidit ne-
cessario immodicus calor &
tensio 574.12
- Partibus similibus primū ani-
mantis functiones seruntur
acceptæ 880.36
- Partibus singulis quatuor insūt
facultates 767.21
- Partibus supernis inflammatis
externas uenas directas illis
secandas esse 974.55
- Parti cuius actio & usus 74.
60
- Particulæ corporis à uatura sunt
constructæ congruentes ani-
mi moribus 217.23
- Particulæ uniuersæ sibi inuicem
consentiunt 196.40
- Particulæ uulneratæ sitis 864.
45
- Particula nulla ex se habet sen-
sum 219.6
- Particula omnis agit secundum
propriam temperamenti
767.64
- Particularum ornamenta obsecu-
rari à splendore ipsius utilita-
tis 277.17
- Particularum tria genera 296.4
- Partis cuiuslibet functionis pen-
sio aino temperci 79.21
- Partis cuiuslibet usus ad cogni-
tionem affectuum locorum
conducit 734.6
- Partis infirmatæ curatio, si uni-
uersum corpus sit plenum
816.55
- Partis imbecillitas ab intempe-
rie nascitur 828.6
- Partis inflammatæ dolor quan-
do soluitur 63.16
- Partis putrescentis radix aduren-
da est 982.7
- Partis solutæ substantiæ conser-
uant mediocriter exsiccatia
834.17
- Partis utilitas exactione cogno-
scitur 199.12 222.6
- Partium actioni semper usus est
coniunctus 318.22
- Partium constructionis primus
scopus utilitas 277.55
- Partium corporis humani tem-
peraturæ 45.6 48.4
- Partium differentie 975.48.
816.6
- Partium formationes quomodo
curationes uariant 974.27
- Partium inflammatarum quæ-
nam magis & quæ minus sine
exsiccatæ 974.11
- Partium naturæ pro aris disse-
rentia 407.36
- Partium neruofarum doloribus
quid medetur 1163.1
- Partium officia quænam sint ne-
cessaria uitæ, & quæ duntaxat
utilia 888.13
- Partium profundarū affectus,
qualia remedia postulat 28.60
- Partium similiarum natura ex
quibus consistit 889.9
- Partium similiarium morbi im-
pura intemperie consistunt
1197.48
- Partium similiarium morborum
duo genera 889.13
- Partium similiarium proprium
alimentum quod 825.22
- Partium similiarū singulas quæ
nutrimentum suscipiunt, sym-
ptomata sunt duodecim 666.
- Partium singulæ per quæ (55
custodiendæ sunt 915.18
- Partium singulæ per quæ regio-
nem purgantur 774.13
- Partium singularum meatus in
phlegmonis sunt reddendæ flu-
25

Xiles 924.10
Partiū temperies quomodo conseruetur 880.45
Partium ulceratarum, quas non infestat succus uinifus, curatio 1169.22
Partiū utilitas triplex 214.12
Parturientes quando in sella collocandæ 82.57
Parturiētibz ægrè medicamen conueniens 1287.19
Partus & abortus differentia
Parulides 709.50 (86.13)
Parygron Heræ quomodo cōponatur 1183.12
Pascua animalium plurimū conseruāt ad lactis bonitatem uel malitiam 469.34
Pasio fit ab altero 34.18
Pastrili Amazonum, ad uoluolo fas uentriculi dispositiones 1251.4
Pastrili diuersi contra profusua sanguinis ex erosione oborta 866.59
Pastrili ex glaucio ad inflammationes aureas 1209.44
Pastrili nigri, Galeni compositio 1178.27
Pastrilorum Aristarchi compositio & usus Ibid.4
Pastrilorum diu rōp pōlūp usus Ibid.4
Pastrilorum ex succino cōfectio, quos barbari trochiscos de charabacpellant 1245.38
Pastrilorum rosaceorum cōfectio ex Damocrate 1284.33
Pastrilorum scillinorum præparatio 1272.59
Pastrilorum Threpti usus & cōpositio 1178.16
Pastrilus Andronis 1209.60
Pastrilus ex charta cōbusta Ibidem 64
Pastrilus ex Corallio 1245.50
Pastrilus sanguinem cōprimens 1178.43
Pa sinacei, dauci, & cari facultates 191.17. 1107.53
Patellæ consideratio 118.45
Patellæ usus 216.24
Pathe quæ dicantur 846.21
Pathognomonica quæ 26.15
Pati contingit aliquid ob alterationem & solutionem continui 21.62
Pati modicè singula, ex finitimis genere 147.41
Pauonum caro 198.1
PECCATA qui plus aut minus dicantur 988.60
Peccata à falsa opinione nascuntur 419.28
Peccata aliena quam nostra clarius perspicimus 419.64

Peccata infra modum non adferunt detrimentum 1190.10
Pectus ossa 117.64
Pectore affecto parcius miscenda sunt cataplasmaria astringentia 923.40
Pectori phlegmone obfeso, quæ medicamēta cōueniūt 940.32
Pectoris excretionibus quæ cōducant 1090.51
Pectoris excrementa educi cum tuisi à medicamentis tenuantibus 855.63
Pectoris ossa tot, quot costæ cū eo cōmittunt 186.55. 249.17
Pectus per quam regionem purgeretur 940.28
Pedes homini præstitit esse tum erectos, tum molles 110.51
Pedi cōueniunt motus quatuor 214.8
Pedicularis morbi remedia 1191.37
Pediculi in capite à quibus causis oriuntur Ibid.24
Pedioli, siue planta, metacarpi similitudinem refert 211.23
Pedis anteriores partes adamussim per similes comprehenduntur 212.26
Pedis cavitatis trium cōmodorū gratia efformata Ibid.55
Pedis cutis inferior media inter mollem & duram 215.56
Pedis digitorum motiones quatuor 213.22
Pedis digitus magnus ex duobus tantū articulis constat 212.10
Pedis inferior regio unde alimētum accipiat 167.60
Pedis motus à quibus dearticulationibz proficiant 212.42
Pedis musculorum genera quatuor 160.30
Pedis uerul 167.8
Pedis ossiū cōsideratio 128.52
Pedum cōstructio ualde opportuna 210.44. 211.50
Pedum partes internæ, curaliores & magis caue externæ 211.43
Pedum uicæ quatuor 147.4
Pelis ouillæ uis 1138.33
Pelops Galeni præceptor 744.4
Pelus iuxta congressum ouipricorum neruorum 160.57
Penis essentia tota in neruo sistuloso consistit 780.14
Penis quid eo extendatur 304.35
Pentaphylli uis 2100.35
Peplii facultas 1100.43
Peplis cuius sit facultatis 1100.40
Pepones, melopepones, uim habent mouēdi urinam 369.30
377.49

Peponum natura & facultas 379.47
Peponum semen, renum calculos cōmituit 179.52
Peponum semen uomitum prouocat 179.16
Periculi animo, quæ ratione uēdit actiones tremulas 710.17
Pericussio arterie multis imponitur 517.61
Perdices & turtures non mandendæ recentes, priusquam unum diem suspensæ fuerint 417.27. & 34
Perfectio corporis humani una est 160.19
Perfectus esse, quid sit 804.43
Perfrigoratorum pulsus 492.16
Perisio frigida calfacit ex accidenti 976.22
Pergamus Galeni patria 1198.49. 1208.4
Pericardij situs 182.44
Pericardij substantia 238.55
Pericardium inuoluit cor 176.10. 182.32
Pericardij quid 238.49
Pericardij recipit propagines tenuium neruorum 239.37
Periclitari in morbis minus quibus contingat 1194.4
Pericranij à crassa meningē ortū, cranio illi annexit 255.45
Periodus accessiōis quid 810.5
Periodus tertiana & quartana quæ dicatur 809.48
Periostrij infectio 166.15
Periostrij quæ membrana 168.61. 279.14
Peripneumoniz symptomata et causæ 756.37
Peripneumonia quid 322.22. 971.33
Peripneumonici omnes tenentur febre acuta, ac ubi nihil habent comatis 576.40. 516.58
Peripneumonici maxillæ rubet 727.38
Peripneumonici unde grauius spirent 1246.61
Peripneumonicos spiritus qualis 503.42
Peripneumonij quid auxiliatur 1114.7
Peripneumoniz 630
Peristereon quam habeat uim 1101.5
Peritonæi constitutio & usus 210.31
Peritonæi perforatio 112.19
Peritonæi uerx 176.19
Peritonæum araneorum telis simillimum 175.37
Peritonæū prætenditur omnibz nutritionis organis 178.42
Peritonæū quod dicat 874.46
Perito-

INDEX.

- Peritonæum, tunicarum omniū
ulcerum sub sepio tranſuerſo
origo 114.13
Perniones quid ſanct 113.20
Perſæ fructus in Perſis letalis
eſt, in Aegyptio innocuus 136.
45. 1100.55. 1106.51
Perſica cur non poſt alios cibos
mandanda 183.21
Perſpiratu carentia, celerrimè pe
treſcunt 63.56
Perturbatiōes maxime facile de
prehendūtur ab omnibus, le
ues autem nequaquā 419.54
Peruerſi membri curatio 835.40
Peruerſio angularis 126.26.28
Pes cerebri nebulum 215.43
Pes hominis, quāmaximè manum
imitatur 111.15
Pes quoque organum apprehen
ſorium Ibid. 16
Peſſarij cōficiendi modus ad le
niendos dolores colicos 932.
Peſſilens lues eſt deluſiſſe (49
ra quædam, ab aëris putredine
orta, cui nihil efficacius
theriaci medetur 1277.63
Peſſilentiā ab Athenis qua ra
tione Hippocrates abegerit
1278.4
Peſſilenti febre quæ corpora fa
cile & diſticultur corripian
783.45
Peſſilenti morbo correpti fugien
di 781.39
Peſſilens quam habet facultatē
1101.4
Petroſelinū nis 1101.6
Peucedani uis 1101.14
PHAGEDENAE & cūlci ex
ulcerati curatio 952.51
Phagedæna quid 708.50.
845.27. 1179.34
Phalangij ictus aſſicit totū cor
pus 775.43
Phalangij morſus 744.61
Phalangitis quam uim habeat
1111.18
Phaleris cuius ſit facultatis Ibi
dem 14
Pharmaca arteria quæ dican
tur 1140.13
Pharmaca cephalica unde di
cta, & qua facilitate ſint præ
dita 1160.5
Pharmaca diſcipientia quæ ſint
1133.49
Pharmaca fortia quæ intelligant
1239.58
Pharmaca liqidiōra minus ſunt
moleſta 1164.38
Pharmaca polychreſta ex con
trarijs conſtant 1173.62
Pharmaca purgantia ſemel ſum
pta, uō reuocari poſſunt 994.32
Pharmaca quæ alij ſubſtituan
tur 1144.43
Pharmaca ſola nihil ſunt 1237.1
Pharmaca ſunt deorum manus
1117.3
Pharmaca uetuſta ſuas faculta
tes amittunt 1190.15
Pharmacopœnicini compoſi
tio & niſus 1149.60
Pharmacis hemicranicis quan
do in hemicrania utendum
1107.49
Pharmaco alius cur interdum
non cedat 1004.16
Pharmaco aſſumpto, priuſque cre
mor eſt ſorbendus Ibid. 9
Pharmacum Aſerianum affectio
nibus oculorū accōmodum
1232.46
Pharmacum anodynum conſi
ciendi ratio 1131.38
Pharmacum Aſclepiadis ulceri
bus diſſicilibus 1172.9
Pharmacum baſilicon quod di
catur 1108.53
Pharmacū hepaticū nullum ue
hementer refrigeret 1256.42
Pharmacū Nicerati colicijs dy
ſentericis cōueniens 1253.48
Pharmacū unum multis affecti
bus optimum haud reperitur
1251.4
Pharynx 150.19
Pharynx eſt cauſa eſtationis, ſpi
ritus cohibiti, tum ipſius uo
ciferationis 447.59
Pharynx principalisſimū uocis
inſtrumentum 245.48
Phaſeiorum & erualæ facultas
376.45
Phaſianorum caro 397.63
Phaſiolon quam teneat uim
1082.58
Phidias 77.47
Philautia omnium eſt 420.2
Philonium ſtupefaciens 926.40
Philophiæ partes, naturalis, ra
tionalis, moralis 5.30
Philophia immunes reddit à
peccatis 143.27
Philophia omnium diſciplinarū
domina 646.1
Phlegmonæ incipientes reuul
ſu, inueteratæ ex ipſius affectis
partibus uacuandæ 997.41
Phlegmonæ quando augentur
911.8
Phlegmonæ quādo in ſcirrhum
degenerent 1186.11
Phlegmonæ quarum tumor ſu
perat calorē, qua ratione cu
randæ 913.20
Phlegmonæ nacuuntur facili
mè per ſanguinis detraho
nem 985.20
Phlegmonem curaturo quæ ſint
conſideranda 914.15
Phlegmonarum curatio 63.33.
60.63. 706.4. 933.61. 1117.
59. 1149.65. 1150.25. 1183.1
Phlegmonas cur febres ſequan
tur 908.3
Phlegmonas eryſipelatodes quæ
perſanct 1089.37. 1150.34
Phlegmonas naſcentes quid ſu
net 1102.15
Phlegmonas quāru calor tumo
rem ſuperat, quib. medicamē
tis curare debeamus 921.12
Phlegmonas teſtium & nberum
quid ſanct 1118.15
Phlegmone affectis partem lam,
nec rariorem, nec denſiorem,
nec duriorem efficit 9.6
Phlegmone aſſigente uentricu
lum hepātis, perniciōſiſſimū
eſt ante acceſſionem cibare
915.10
Phlegmone eryſipelatoſa, nel
eryſipelas phlegmoniformis quæ
dicatur 944.10. 971.3
Phlegmone eſt muſculi inæqua
lis intemperantia 62.46
Phlegmone in ore quomodo cu
retur 918.3
Phlegmone partes affectæ quan
do ſcarificandæ 935.9
Phlegmone partium ſuperarū
qua ratione curanda 916.38
Phlegmone quando digerenda
935.20
Phlegmone quid 500.48.
705.64
Phlegmones accidentia quæ
716.51. 941.59
Phlegmones à punctū morſus
animalis excutitur, curatio
937.3
Phlegmones cauſa 1013.16. 1203
Phlegmones curatio, cauſa (41
curatio eſt humorum 9.10
Phlegmones diſcuſio, quæ eſt al
tera curatio, maxime optida
62.38
Phlegmones generatio 61.30.
706.32. 931.55. 945.59. 991.9
Phlegmones ſcirrhij eadē quo
dammodo generatio & cura
tio 1185.62
Phlegmones ſedis remedium
1114.21
Phlegmones ſuppurantis cura
tio 935.31
Phlegmones cōcoſtionem quæ
neceſſariō ſequantur 61.39
Phlegmonia hepatis cōmodiſſi
mum cataplaſma 921.46
Phlegmonis incipientibus com
modè adhibentur aſtringētia
10.43. 916.60. 991.37. 1150.8
Phlegmonis in colicella aut cō
ſiſtentibus tonſillis, quid au
xilietur 1088.26

Phoca	401.13	dis autem perpauci gignunt	fabæ	375.62	
Phoenices facili lecur obstruant		tue	378.46	Pisces apti conditura	404.6
408.12		Pili nigri generatio	50.56	Pisces biliosus naturis congruen	
Phoenix, dactylus, palmula		Pili orn à loci natura	278.39	tes	890.43
384.65		Pili palpebrarum ac supercilio-		Pisces cetacei	406.44
Phorini facultas	1112.52	rum cur eandem semper ma-		Pisces cur non magna indigeat	
Phrenes & musculi epigastrici, a-		gnitudinem tuetur	277.57	respiratione	235.28
nimæ instrumenta	102.19	Pili rufi generatio	50.61	Pisces dinandi quisint	890.45
Phrenes quæ	761.60	Pili usti quas uires habeant		Pisces duræ carnis qui existant	
Phreniscorum infania quomodo		1139.49		401.13	
ab ardentium febrium de-		Piloru affectus qui sint.	1188.60	Pisces ex duplici aqua uiuentes.	
lirio differat	741.39	Pilorum corruptela unde acci-		410.46	
Plurimicorum pulsuum immo-		dat	954.3.1189.8	Pisces inspirantes aërem qui sint	
dica crebritas, proximam de-		Pilorum corruptionis curatio		235.30	
nunciat syncope	577.7	1189.19. 954.32		Pisces macini omnes gaudent	
Plurimam solut multus & ca-		Pilorum generatio 50.50. 51.40.		890.19	
pitate iudor & calidus	618.34	277.37. 278.56. 954.1		Pisces omnes muti, quia carent	
Phrenitis gignendæ quæ requi-		Piloru generatio eadem est quæ		pulmone	231.46. 241.61
rantur	683.19	plantarum	1188.49	Pisces pelagici & saxatiles cete-	
Phrenitidis causa materialis		Pilorum materia	416.40	ris præstantiores	410.43
577.10		Pilorum menti usus	277.36	Pisces pessimi ubi locorum gi-	
Phrenitidis differentie	741.37	Pilorum uarietas secundum ua-		gnantur	400.18
Phrenitidis instantis symptoma		rias ætatum, regionum ac cor-		Pisces puro ex mari uisum ca-	
ta	762.28	porum temperaturæ	51.15	pientes	410.48
Phrenitidis nota præcipua quæ		Pilos attenuantia	1194.52	Pisces redduntur uertiginosi, ca-	
Plurimicorum uaria sym-	762.11	Pilos corruptentia pharmaca		pianiturque facili, solus fructi-	
ptomata	749.27. 762.22	1194.21		bustis tithymali gustatis.	1110
Phrenitis gignitur in tenui me-		Pilos disperdentia	Ibid.41	Pisces respirant per bran-	
ninge, & in septo transverso		Pingendi fingendi artes cur li-		chias	235.26
Phrenitis quid. 683.16	577.13	berales	3.16	Pisces saxatiles accõmodari pos-	
Phrygi lapidis uis	1118.57	Pingua & mordacia qua ratio-		sunt ad uisum tenuent. 416.30	
Plurimici habet ut febrim, ita &		ne uisum excitent	1025.38	Pisces saxatiles præbent alimen-	
pulsuum læticum	576.15	Pingua omnia stomachum sub-		tum corpori saluberrimũ	400.7
Plurimici oculi	1268.8	uertunt	377.39	Pisces saxatiles unde dicantur lb.2	
Plurimicorum	1112.57	Pingua quæ dicantur	1020.33	Piscium carnis differentie pro di-	
Phygerion quod 709.18.	971.57	Pinguitudo à calore liquefit, à		uersitate locorum in quibus	
Phyllitis dysenteria & diar-		frigore conseruatur	180.6	degunt, & alimentorum quib-	
rhoea uiuat	1112.64	Pinguitudo cur oculis circumfu-		us uiscuntur	399.20
Phyma quid	971.26	sa	270.51	Piscium mollium succus	406.42
Phyma & furunculos quæ di-		Pinguitudo ut contrahat	48.57	Piscium qui multis tenuibusq; spi-	
fferunt	1103.39. 108.63	Piperatorum calorem circa pri-		nis abundant, & qui minime	
Phyma unde	935.6	mas uenas extinguit	460.38	399.30	
Phyma tione quando attendi		Piper calfacit	1014.55	Pisic facultas	409.43
451.2. & in quibus	885.3	Piper cum aqua singulis diebus		Pissellon quam habet facultat-	
Picatonis uis	951.35	bibitum, ad quartanas facit.		tem	1101.51
Picearum fructus uis	1101.59	962.54		Pistacia uel fistici, qualiter ob-	
Picis aridæ facultates	1179.62	Piper cum cibo exhibendum per		tinent aromaticam	385.62
Picis facultas	1101.39	cruditates	459.45	Pistaciæ uis	1101.54
Picis usus, & compositiones di-		Piperis & uirtus & differentia.		Pituita acida cruditate designat	
uerse	480.58	1100.48		81.46	
Picra ex aloë expurgathumores		Piperis nigri, albiq; electio	460.	Pituita cur non per peculiare in-	
alios imbibitos in ipsius uen-		23		strumenti expurgetur	81.35
triculi rancida	480.13. 764.31	Piper longum a dulcerarum, assu-		Pituita dulcis anananti salutaris	
Picra quid	480.12	sa aqua soluitur	1182.19	Ibid.44	
Pictores fuscis & ceruleis colo-		Piper longum quale sit eligen-		Pituita dulcis concoctum est faci-	
ribus reficiunt uisum	267.2	dum	460.20	lior	90.40
Pietas uera quæ	214.64	Piper quando singulorum exci-		Pituitæ cruditas quomodo intel-	
Pili albi generatio ex pituita.		tet	685.52	ligenda	81.48
50.60		Pira quomodo excicari debeat.		Pituitæ differentia	741.4
Pili ad quid conferant	1193.24	384.54		Pituitæ in ore nentriculi collectæ	
Pili, conditoris prouidentia sin-		Pira syluestria quæ habeant uim		facultates	701.23
gulis insunt natura	378.49	1071.14		Pituitæ purgandæ, cur nullũ da-	
Pili crispi qui fiant	50.64	Piri foliorum uis	1071.27	rum sit instrumentũ peculiare	
Pili flui generatio ex flaua bile.		Pirorum cum melle idem usus.		ut reliquis excrementis	705.19
50.58		384.43		Pituitæ species diuerse, earumq;	
Pili naturis calidis plurimi, frigi-		Pisæ agris deiciuntur quam		usus & facultas	701.9. 793.64

INDEX.

Pituita frigida & humida 80.19
 Pituita frigidissima 63.50
 Pituita gignit ordemata 616.20
 Pituita in leucophlegmatia dun-
 taxat per uniuersum corpus
 exuberat 701.8
 Pituita non desiderat euacuari,
 sed magis alterari 81.38
 Pituita oritur ex cibo, nec
 coarcescat 703.53
 Pituita omnium que in corpore
 habent, frigidissima 48.47
 Pituita oris necat corporis 84.
 Pituita oritur ex cibis, non
 ex nostro corpore 55.17
 Pituita qm morbo pariat 686.65
 Pituita salis computruit 81.47
 Pituitosi excrementi copiosius
 collecti morbi qui 236.10
Pyruis 445.7
 Pyruis facultas 1102.8
 Pyruis a centrâ facultas 406.31
 Plantæ agrestes quæ 186.65
 Plantæ ossa 212.7
 Plantaginis radices faciunt ad
 dentium dolores 1073.14
 Plantaginis succus, sanguinis ef-
 fusionibus optimû remediû
 est 866.30
 Plantaginis uis 1072.17. 1213.55
 Planta metacarpio omnino pro-
 portionem respondet 212.15
 Planta pedis cur glabra 52.1
 Planta pedis quinq; constat ossi-
 bus 140.6
 Planta pedis unde sentiat 315.50
 Plantarum spinosarû uis 188.53
 Plantis cõmunia cum animanti-
 bus 73.23
 Plantis non inest sensus eorum
 quæ sibi defunt 218.60
 Plarani facultas 1102.11
 Plato de utero 776.26
 Platonis circa febrium subitan-
 tias duplex error 350.51
 Platonis de elementis sententia
 149.10
 Platonis de uirtute sententia 343.
 Platonis de uisione senten-
 tia 347.10
 Platonis opinio de Deo 356.6
 Platonis opinio de inspiratione
 & respiracione cõuelli 351.35
 Platonis sententia de corde 342.
 Platonis sententia de fla-
 ua bile 350.65
 Plato tres animi facultates, trib.
 reipub. partib. cõparat 352.61
 Plentium cõiunctiones breues
 sunt, diuturnæ cõiunctiones
 les 618.12
 Plenitudini ad uires non requi-
 ritur necessariô magna humo-
 rum colluctas 698.18
 Plenitudinis perpetuû adest tu-
 mor & pondus 701.8

Plenitudinis ad sensutricem uim
 spectantis iudicium, est graui-
 tas 698.13
 Plenitudinis species quibus no-
 tis sint distinguendæ 700.53
 Plenitudinis utriusq; quantitas
 qualitasq; quibus signis defi-
 nienda sit 991.35
 Plenitudo ad uires, facilè in pu-
 tredinem abiit 991.16
 Plenitudo distendens, dicitur iux-
 ta uasâ 697.25
 Plenitudo est duplex, quarû u-
 traq; eget uacuatione 696.
 46. 990.10
 Plenitudo granata etiam si non
 distendat, ad uires sensutrices
 refertur, non autem ad natu-
 rales 697.29
 Plenitudo iuxta uasâ reperit in
 rebus quog; inanimatis lb.32
 Plenitudo maior colligitur hye-
 me & vere 703.16
 Plenitudo secundum uasâ quæ
 dicitur 700.44. 899.17.
 990.13
 Plenitudo secundum uires quæ
 dicitur 700.43. 782.61.
 899.15. 990.10
 Plethora cõmodissimè uacuat
 uenæ sectione 30.23
 Plethoræ curatio 916.23
 Plethora quando fiat 1195.3
 Plethora quid 482.41. 700.63.
 936.18
 Plethorici haud omnes egent ue-
 næ sectione 989.16
 Plethorici cur acutè febricitent
 574.48
 Plethorici quomodo sint uacu-
 di iuxta Hippocratem 986.5
 Plethorici & peripneumonici
 cur caput perpetuô afficiatur
 574.61
 Plethorici secunda uena in cubi-
 to partis affectæ 996.25
 Plethorici unde semper duriorè
 habeant pulsû peripneumo-
 nia 601.43
 Plethorici pulsus quales 635.13
 Plethoride infestante respiracio à
 solo septo transuerso perficit
 733.63
 Plethoridem exitialem qui pul-
 sus significet 601.11
 Plethorides incoctæ quæ 761.46
 Plethoridi quid cõserat 1089.28.
 1185.60
 Plethoriditis crudæ signum, nihil
 spueret 623.5
 Plethoriditis exquisitæ symptoma-
 ta 760.44
 Plethoriditis generatio, signa &
 symptomata 26.32. 623.11.
 635.4. 735.12
 Plethoriditis inseparabilia sympto-

mata 761.14
 Pleuritidis propriû signû est ter-
 rans uocatus pulsus 574.33
 Pleuritidis symptomata quatuor
 semper ostendenda 500.57
 Pleuritidis spatorum differentia
 pro uarietate humorum eam
 gignentium 760.14
 Pleuritidis uaria accidentia pro
 differentia humorum à qui-
 bus gignitur 574.58
 Pleuritidum differentia 516.10
 Pleuritum necessariô sequit tussis
 27.13
 Pleuritis exquisita quando fiat
 760.42
 Pleuritis iudicari potest die tri-
 gesimo quarto 629.50
 Pleuritis quid 32.23. 574.47.
 731.29. 971.31
 Plexus reniformis 315.28
 Plexus reniformis elaborat ani-
 malem spiritum 344.21
 Plexus reniformis ex plurimis
 arterijs contextus 258.56
 Plexus reniformis recipit produ-
 ctionè quandam à crassa me-
 ninge 264.17
 Plexus reniformis ubi locatus
 258.52. 316.51. 328.16
 Plexus reniformis uenis caret
 149.9
 Plexus uasorû circa testes & mil-
 mas cuius gratia sit factus
 315.21
 Plumbaginis uires 1123.58
 Plumbi facultas 1124.2
 Plumbi lamina ad morbum lumbis,
 nocturnas pollutiones coarcescit
 1124.33
 Plumbum unicum mole & pon-
 dere augetur Ibid. 9
 Plumbumustum quibus condu-
 cat affectibus Ibid. 39
 Pluuiam aquam Galenus non
 probat 461.14
 Quidam cõtici uacuatû sunt ex
 cubito 998.15
 Polemonij uis 1102.44
 Polenta 415.50
 Polenta epota cum uino auster-
 o, uentrem deficiet 373.60
 Polenta laudatissima unde fiat
 Ibid. 55
 Potens quibus plurimû & qui-
 bus minus alimenti præstet
 Ibid. 61
 Poliij uis 1102.48
 Poliij minoris facultas 1102.51
 Pollex quæ oppositus quatuor
 digitis reliquis 196.19
 Pollicis motus unde 135.16
 Pollicis tendones cur tales 200.
 Pollicis tendones & musculi-
 li 199.62
 Pollutiones sæuius contingunt

abſq̃mare	115.14	ſectum	55.47	Priapiſmi cauſa	780.15
Polychreſta relinqui ab iſe, quæ		Poteſtare calida quæ dicant	58.	Priapiſmi curatio	947.6.
ad ſingulas affectiones par-		Poteſtare talia quæ dicant	(17	1266-18	
tur	1250.7	tur	55.41. 58.16. 61.41	Priapiſmo qui ſoleat uerari plu-	780.27
Polydcti regula	66.47	Potio frigida quibus conueniat	minimè, & quibus ſit propi-	Priapiſmus colicæ eſt accidentis	779.22
Polyclerus in canone ſuo cele-		nanda	965.51	Priapiſmus quid	693.40.
bri uaturæ eſt imitatus	318.36	Potio hydropi aliaq̃ interaneor-		778.46. 946.65. 1266.14	
Polycnemon quamlibet uim		um affectibus ſummè utilis	1256.58	Priapiſmo reſecti debet ad ner-	780.4
1102.58				uum	
Polygonum quæ habeat nim ſb-ſs		Potius ſemper aliqua pars in		Præcipia animalis tria	249.22.
Polygonum uis	Ibid.19	pulmonè per aſperâ arteriam		343.28	
Polyxenam facultas	2204.18	deſiit	551.55. 862.2. 1025.30	Præcipia, & ea quæ ab illis ori-	
Polypi deſcriptio, cauſæ & reme-		Porus ſit modicus, quib. organa		tur, ſele inuicem attestantur	817.45
dia	1114.45	reſpirationis tumore anguſtan-		& indicant	
Polypodes	709.56	tur: cõtrâ multas, quib. bron-		Præcipia facultatum uniuerso	
Polypodii qualitas	1102.63	chia craſſa & uiciſſis ſuccis		corpori ſunt, hepar, cor, cere-	
Polyxenam dediſſe operam, ut		obſtruantur	1247.12	brum, atq̃ teſtes	977.61
eum decoriam moribunda		Q̃ P R A E C E P T O R I S officium		Præcipia moruū tria, regunt ui-	
caderet	1274.12	4-14		tam noſtram	126.12
Poma præcocia quæ	417.64	Præceptum in omnibus morbis		Præcipia non gubernantia quæ	
Pomi ſineſtris facultas	1079.	obſeruandum quod	717.56	759.1	
Pompholyx optimū oculo- (49		Præceptum Pythium	419.42	Præcipiū appetitorij opera quæ	
rum fluxionibus medicamen-		Præcocium facultas	381.31	341.43	
1215.62		Præcocia melius tranſmutantur		Præcipiū ſuæ quæ indicent	
Pompholyx quib. utilis	1114.60	quim cruda	408.61	629.22	
Pouderum medicinalium nomi-		Præcognitio futurorū ex affectuū		Præcipiū in morbis acuris co-	
na quæ ſint	1290.10	cognitione paratur	651.57	gnofcendi ratio	628.64.
Populus flexura ab uno admini-		Præcognoscere ille nō poieſt, qui		Præcipiū irafcibilis opera	341.35
ſtrat ur	157.64	morbis & uiriū magnitudinē		Præcipiū rationalis opera lb. 30	
Populus muſculus ſcēſit genu		non expendit	960.61	Præcipium cuiuſq̃ morbi pro-	
217.6		Præcognoscere quæ unicè opte-		rium, coctionis ſignis deter-	
Populi albæ uis	2093.16	mus	604.52	minat ur	624.35
Populi albæ tēperatura	1067.52	Præcordiorum dolor tenſius		Præcipium generationis parti-	
Porcelli quale nuiſimentū exhi-		quid ſignificet	644.25	cularum, cur neceſſariò ſit hu-	
beant	391.47	Præcordiorū perſuſiones quan-		midum	804.47
Porcellorū pedes conieſti in pi-		do ſint pericioſe	921.22	Præcipium plantatiū, quæ ex	
ſanam, meliorē reddūt	193.57	Prædicturo ſalutem uel mortē,		ſemine gignat	210.42
Porcelli heſternū q̃ recens nece-		quæ ſint inueſtiganda	640.60	Præcipium, potentia dicitur to-	
rum, ſacilius cõcoqui	883.24	Prægnanti ſe extenuentur mam-		tum	108.2
Porci q̃modo generent	1186.21	mæ, ſequitur abortus	778.19	Præcipium ſecundum latitudi-	
Porci ueſicæ ſellæ, cuius gratia cõ-		Prænoſcēdis futuris qui ſit peri-		nem conſinetur in prima ac-	
ſtruſti	221.34	tiſſimus medicus	605.26	ceſſione	623.42
Pororū bilem excipientiū ſuus		Præputij inſtaurandi duplex ra-		Præcipium totius operis maxi-	
Ibid.54		tio chirurgica	952.6	mum	352.28
Porri agreſtis facultas	1069.39	Præſagia quando eueniſt	29.27	Probatio propria	61.45
Portæ quid	180.58. 217.48	Præſagia futurorū ex præſentib.		Proceſſus columnares	277.4
Porta uena cur dicatur	28.24	ſumuntur	604.51	Proceſſus cubiti	205.6
Portulacæ uis	188.32. 1070.	Præſagendi ratio unde ſit peten-		Prodiſtas in morbos unde de-	
48. 1204.17		da	27.48	prehendatur	30.2
Portulacæ ſtuporem dentiū ſu-		Præſagiorum utilitas	27.50	Productio choroidis tunice in	
nar	11.61. 188.32. 1070.53	Præſagium ex pulſibus ſumitur		oculis	265.24
Poſca diſſoluit gr̃mos	868.16	506.18		Productiões mamillares	281.37
Poſidonij ſenectia illuſtris	72.55	Præſcientia habetur futurorum,		Productionum à cerebro ad ſen-	
Poſſius indicat partem affectam		præſentium ac præteritorum		ſoria diſcrimina	253.28
727.18		579.55		Profluuiæ muliebris ſedant cu-	
Potamogeton quæ habeat uim		Præſeruiſſimum ad dentes croſos		cui biluæ iuxta mammas ap-	
1102.61		1219.20		poſitæ	965.27
Potentillæ naturales alix, in quib-		Præſidia optima, cur ſerpe in prin-		Profluuiū muliebris cauſa	778.2
buſ robuſtiores aut imbecil-		cipiis nihil iuuare uideantur		Proflu-	
lores alijs ſint	692.37	1203.55			
Potentillæ naturales ſunt quatuor		Præſidia refrigeratoria uaria			
797.56		909.58			
Potentillæ retentrix triplex ſym-		Præſidium quando eſſe debet mi-			
proma tribuitur	685.34	nus	454.18		
Poterij facultas	1098.12	Præuitas indicis creſcit	1001.2		
Potentia, futurum quid & imper					

INDEX.

SS 4

- Pulmo agninus, porcineus & uulpinus, quibus affectibus conlerant 317.6
 Pulmo à thorace ulderur distare in animalibus quomodo cūq; exinfcis 191.10
 Pulmo cur hefticam febrem nō gignat 807.31
 Pulmo quor in ijs qui geruntur utero admodū ruber 306.63
 Pulmo & dexter cordis uentriculus quibus addit 235.14
 Pulmo ex fe motus expers, mouetur ad motū thoracis 235.49. 243.34
 Pulmo ferē fenfus expers 495.2
 Pulmo frigida fluxione infectus qualem edat refpirationē 609.20
 Pulmo medicæ cucurbitulæ fimilis 486.13
 Pulmone & dextro cordis uentriculo carent animalia ex ære non refpirantia 339.39
 Pulmoni cur maxima uena fit à corde implantata 317.41. 236.6
 Pulmone inflammato abftinendum ab astringētib; 923.46
 Pulmoni inflammato applicanda cucurbitula, si prius corpus fit uacuatum Ibid. 51
 Pulmone inter eunte, interire uocem & cordis dextrū uentriculum 235.18
 Pulmoni omnia infunt, quæ faciunt ad celerem euacuationē 317.14
 Pulmonis calida intemperie affecti noīz 600.59
 Pulmonis caro, alteratiois æris primum organum 242.58
 Pulmonis caro laxissima nutritur ex puriffimo sanguine 223.1
 Pulmonis caro qualis, & quem uſum præſtet 242.49
 Pulmonis dolores cur remiſſiores ſint, q̃ thoracis 754.10
 Pulmonis eryſipelas qđ 753.17
 Pulmonis exulcerati curatio 871.13. Indicia 868.6
 Pulmonis fibrarum numerus 185.43
 Pulmonis frigidi indicia 826.5
 Pulmonis inflammatio quæ fit 758.14
 Pulmonis inflammati ſymptomata 714.61
 Pulmonis intemperie æqualis & inæqualis indicia 758.21
 Pulmonis quintus lobus cuius gratia conditus 232.61
 Pulmonis quintus lobus uelut ſubſtericulum uenæ cauæ 240.59
 Pulmonis ficci indicia 826.11
 Pulmonis ſirus 600.43
 Pulmonis ſtructurā inſpirantib; ærē omnibus eadem 185.47
 Pulmonis ſubſtantia laxa molliſq; cūm ſit, à pituitioſiore inflammatur ſanguine 576.39
 Pulmonis tuberculo orto, qualis fit refpiratio 756.54
 Pulmonis tuberculū quæ offendant 757.43
 Pulmonis tunica 240.64
 Pulmonis uafa à quibus occaſionibus rumpantur 758.17
 Pulmonis uafa cur natura alterant 235.52
 Pulmonis uafa quā ordine proprijs impleant materijs 242.42
 Pulmonis uafa tria, & unde oriuntur 240.35
 Pulmonis uafe diſrupto, ſi inflammatio ſuccederit, cur affectus nequeat consolidari 868.38
 Pulmonis uas ruptum, quando inſanabile ſit 869.33
 Pulmonis ulcera ægrè curantur 754.31
 Pulmonis ulcera cur difficiliora ſanatu ſint 867.61
 Pulmonis ulcera ex mali ſucci eroſione contracta, inſanabilia prorfus ſunt 871.10
 Pulmonis ulcera ſi in deploratis curantur per tria 871.35
 Pulmonis uomica aliquādo per urinam purgatur 774.20
 Pulmonis uſus 231.61. 488.48
 Pulmo nunq̃ uehementi dolore cruciatur 757.35
 Pulmo nutritur ſanguine uaporoſo & tenui 235.62
 Pulmo omniū celeritiam cordi dat noxam 600.42
 Pulmo per quas uias purgatus 28.41
 Pulmo per ſe nō mouet 761.14
 Pulmo quale præbeat nutrimentum 395.20
 Pulmo ſenſu caret 711.28
 Pulmo ſolus inier omnia uiſcera ex corde nutritur 77.23
 Pulmo ſpiritus promptuarium 231.64
 Pulmo uocis & refpirationis inſtrumentum 231.50
 Pulmo uocis gratia & refpirationis conditus 235.21
 Pulſus infantuli 512.59
 Pulſationes dicrotæ q̃modo ſiāt in una dilataſione inæquales 525.52
 Pulſibus duris crebritates, molliſbus raritates annexas eſſe 556.36
 Pulſibus phreniticorum quidnam adire perpetuū 577.27
 Pulſus celeri modō magnitudo, modō adiungitur crebritas 585.45
 Pulſus cui manus firmius uel leuius ſit inſcienda 528.62
 Pulſus ineſt gemina quies 519.15
 Pulſus gignendo inæquali quæ requirantur 589.42
 Pulſus magno gignēdo quid requiratur 565.18
 Pulſus uermicanti ſuccedit fornicans 528.13
 Pulſus undofus & uermicanti quæ cōmunia & quæ propria 527.56
 Pulſus undofus ſuccedit uermicans 528.10
 Pulſum aboleri biſariam 593.35
 Pulſum cuiuſq; proprium experientia cognofci 512.40
 Pulſum dici durum aut mollem ex accidenti 516.16
 Pulſum duriffimū ſimul & maximū non reperiiri unq̃ 540.2
 Pulſum eſſe miſtum morū aut Zenō 537.57
 Pulſum moderatum & immodicum inueniēdi ratio 594.61
 Pulſum uermicantē ab undofono qualitas, ſed quantitas ſola diſtinguit 527.54
 Pulſus partes priuatas, nō magno pere leduntur 505.64
 Pulſus abſolutæ æqualis 522.17
 Pulſus abſolutæ æqualis non admittit ſectionem 522.36
 Pulſus abſolutæ inæqualis 522.18
 Pulſus abſolutæ magnus & paruus qui dicatur 581.46
 Pulſus abſolutæ ordinatus, pares ſortitur circuitus omnes 522.41
 Pulſus abſq; uehementia tactum protrudere non poſſet 550.58
 Pulſus à cordis calore uariatur 595.34
 Pulſus æqualitas quomodo iudicanda ueniat 511.16
 Pulſus alti latij ubi cernantur 564.64
 Pulſus alti qui ſint dicendi 565.2
 Pulſus altus quando excretionē ſignificet 606.53
 Pulſus angine 578.17
 Pulſus angina laborantiſ 518.18
 Pulſus annuentes & circueuntes unde gignantur 564.9
 Pulſus ante alia omnia, indicat coniunctæ cauſæ conſtitutionem 587.25
 Pulſus à quibus mutari poſſit 509.49. 522.4
 Pulſus arhythmus triplex 521.
 Pulſus bis ſeruens, intempeſtici cordis corporis propriū ſymptoma eſt 597.4
 Pulſus breues qui dicant 582.32
 Pulſus

- Pulsus calidiorum 511.53
 Pulsus calidus inest corporibus
 Pulsus calori copioso 513.52
 qui sint familiares 554.2
 Pulsus capritans 591.63
 Pulsus capritans quando gignatur 528.50
 Pulsus capritans dicroitis dicritum 561.13
 Pulsus catochon 517.35.577.47
 Pulsus celer & tardus quis sit 542.54. 546.42
 Pulsus celerior, calidius temperamentum: tardior, frigidus declarat 585.33
 Pulsus celeritas & tarditas quid Pulsus celerissimi quando gignantur 554.10
 Pulsus celer, tardos & moderatos qui 519.59
 Pulsus circulationis inordinatus 522.8
 Pulsus comitialium, pulsibus apoplecticorum sunt similes 578.6
 Pulsus cōtensus quis 555.1
 Pulsus contractionem sentiri 539.10
 Pulsus consensui causae 564.28
 Pulsus consensui & uibrati 528.21. 559.5
 Pulsus consensum 517.45.577.56
 Pulsus cuius gratia instituti sint 551.11
 Pulsus cur sit inaequales, partibus arteriosis inaequalis 574.23
 Pulsus decretoriam excretionem indicantes 561.39
 Pulsus decurtati deficientes 523.21
 Pulsus decurtati reciproci 561.25
 Pulsus decurtati signifi- cāt facultatis imbecillitatem 594.5
 Pulsus decurtati unde proueniunt 561.61 (41)
 Pulsus deficientes reciproci 593.
 Pulsus deficientes myuri 523.1
 Pulsus definitio essentialis 517.22
 Pulsus dicitur frequens, rarus & moderatus, prout quietis in tercedentis systolem & diastolem 511.6
 Pulsus dicroiti (q̄ necessario etiam uibratus est) generatio 561.51
 Pulsus dicrotus 592.1
 Pulsus dicrotus q̄ dicitur 562.61
 Pulsus dicrotus, siue iterum feriens, nō duo, sed uox tantū pulsus est 525.42
 Pulsus dicrotus uibratus unde Pulsus differentia in di- (562.62) larationis quantitate 510.41
 Pulsus differentia una in parte inaequaliter inaequalis 523.49
 Pulsus differentia quatuor interpellatū differentia tres 562.1
 Pulsus dolorificus quando sentiat 571.8
 Pulsus dormientium 513.38
 Pulsus duriores, partes nervosiores edunt 573.64
 Pulsus durus & mollis ab arteriarum tunicis: mollis uel duritia fit 586.16
 Pulsus duri proprium est premere 551.23
 Pulsus duri simul parui, omnes ferē sicut obrati 584.58
 Pulsus durissimus unde accidat 591.5
 Pulsus durities & mollities ad rubeas arteriarum referē 510.59
 Pulsus duros, partes spissae & durae efficiunt 604.22
 Pulsus durus citra uibrationem quid significet 595.21
 Pulsus elephantiasis 579.24
 Pulsus elephantiorum 518.59
 Pulsus eorum qui sumptus elleborationum 518.63
 Pulsus epilepticorum 518.10
 Pulsus epilepticorum apoplecticorum sunt similes 518.5
 Pulsus est datus caloris seruandigratia 507.64
 Pulsus est naturale opus 491.1
 Pulsus & respirations oī idem usus: & quibus rationibus persuaderi possit 505.59
 Pulsus eurythmus indiuisus & unus 521.47
 Pulsus eurythmus qui dicitur. Ibid.51
 Pulsus expectoratorum a somno 513.45. 571.4
 Pulsus facultatis oppressae 514.45
 Pulsus facultatis solutae Ibid.44
 Pulsus facultatis uitalis solone obalimenti inopiam Ibid.51
 Pulsus febriom petilentium parū a naturali recedit 596.12
 Pulsus sit a corde & arteriis 551.
 Pulsus florentium 513.1 (58)
 Pulsus fluctuosos 511.64
 Pulsus formicis est omnium minimus, oī tamen celer 528.16
 Pulsus formicans non est celer 512.3. 542.58
 Pulsus formicans qui dicitur 512.1. 514.59. 591.3
 Pulsus formicantes quando gignantur 572.51
 Pulsus frigidam cordis temperiem comitantes 596.28
 Pulsus gerentium utero 513.55
 Pulsus graciliorum 512.56. 567.60
 Pulsus gracilium similes &OLIDORUM omni dimensione conspicuus 541.50
 Pulsus hecticus oīomni marcescentium communis 516.42.576.4
 Pulsus hecticus qui 512.4.
 Pulsus hydropom 518.53
 Pulsus ictericorum 559.52.599.25
 Pulsus inaequales inest ipsi, qui magnū aliquod facinus sunt aggressuri 648.64
 Pulsus inaequales quādo per celsi fiant 644.8
 Pulsus inaequalis qui sit ordinatus, raro reperitur 517.5
 Pulsus in aeterno quales 569.2
 Pulsus inflammationum omnium ferratilis 515.34
 Pulsus in hyeme quales 569.8
 Pulsus in nullius febris intermissione ad stomacum naturalem reuertitur, praeterquam in ephemeris 596.28
 Pulsus in omni genere moderatus immoderatus inueniendi ratio 546.27
 Pulsus inordinatus in absoluta consistit circuitus imparitate Pulsus inordinatus similiter Ibid.44
 Pulsus in quibus partibus clarior percipitur 510.19
 Pulsus inter aequalem & inaequalem ouis est medius, sicut neque inter ordinatum & inordinatum 512.28
 Pulsus intercedentes 561.52
 Pulsus intercurrentes 523.23
 Pulsus iotercurrentes, intermittenti aduersatur 590.40
 Pulsus iotermissio quid 511.5
 Pulsus intermittens 523.25.561.27
 Pulsus intermittentes cur perniciosiores sint raris 590.15
 Pulsus intermittentes minus obtinēt perniciosos senes & poetri, quā iuuenes Ibid.2.
 Pulsus intermittens a quibus causis oritur 561.40. 589.24. 590.45
 Pulsus in vere quales 568.64
 Pulsus in utroque parte mutatio, accessus inuicem ouiciat 599.18
 Pulsus irarorum alius 515.14. 565.35. 572.64
 Pulsus iuuenū est maximus 568.
 Pulsus languidi leniter cō- (16) trechandi 519.52
 Pulsus languidos & uehemētes quid Pulsus lenis 571.6 (510.58)
 Pulsus latus quā accidat 565.43
 Pulsus longus, breuis, latus, angustus, altus & humilis, quis 510.1. 511.52. 565.57. 566.7. 582.30

Pulsus lethargicorum 516.45.	Pulsus mortuorum 515.17	Pulsus pueri quæ sit parvus 544.44
576.45	Pulsus molliissimi causæ 591.10.	Pulsus puerorum celerissimi, magni, & crebri 568.10
Pulsus magnitudine copii contenti humoris cognoscimus 550.37. 551.54	Pulsus molliissimi sunt, qui ex affectu cerebri & pulmonis oriuntur 604.6	Pulsus purulentorum naper ordienum 516.39
Pulsus magni uel celeris causæ quæ 554.12	Pulsus mulierum quàm uirorum celerior est 567.43	Pulsus quando & quibus de causis mutantur 445.41. 594.55
Pulsus magnus & parvus sub prædicamento ad aliquid est, & quæritur significat 531.48	Pulsus mutatur ab acquisitis habitibus & temperamentis perinde ac à naturalibus 513.54	Pulsus quid 519.14. 516.45
Pulsus magnus & uehemens hecicis nunquam adeft 559.4	Pulsus myuri qui 516.42.	Pulsus qui excretionis ceticas significet 643.60
Pulsus magnus, longus, latus, altus, uehemens, mollis, celer, frequens, æqualis, ordiatus, & his cõtrarius, qui dicat 513.11	522.63	Pulsus qui inter se colire possint & non 540.4
Pulsus magnus, parvus, gracilis, turgidus qui 512.3	Pulsus naturæ calidorum 567.51	Pulsus qui naturæ modum egrediuntur, quomodo cognoscendi 510.40
Pulsus magnus præostendit fluxum sanguinis è narib. 643.62	Pulsus naturæ optimæ, aliorum omnium regula est & mensura 545.11. 564.56	Pulsus quomodo dignoscatur 514.61
Pulsus magnus uel parvus quædo dicendus 546.22. 554.51	Pulsus naturalis cur altior semper uideatur 564.53	Pulsus rarus & creber qui dicat 537.49
Pulsus maioris dicti, constitui quinque aut sex differentiis 531.39	Pulsus uaturalis memoria tendens 510.37	Pulsus rarus unde gignat 590.
Pulsus marcescentium undequaque est æqualis, cum cõstitat in solidis partibus 516.36. 575.54	Pulsus nec celeres, nec magni esse possunt, nisi usus possulet 559.24	Pulsus reciprocos decurtat (32) tus 593.43
Pulsus maridorum simul cum inflammatione quales 576.1	Pulsus uunq̃ sunt perfectè tardi uel parui, facultate ualida existente 555.34	Pulsus reddunt uehementes per bonas iudicationes 573.3
Pulsus maximus, celerissimus simul & creberrimus qd significet 595.10	Pulsus omnino intermissus, mortem refert 590.7	Pulsus senis 511.60
Pulsus maximus & uehementissimus, ualidam fert compressionem 574.40	Pulsus omniū pessimi qui 591.13	Pulsus sensibile exhibiturus contractionem, qualis esse debeat 540.34
Pulsus maximus qui dicat 511.41	Pulsus optimæ constitutioni peculiare quales 569.29	Pulsus senis, parui, tardi, & rari 568.14
Pulsus mediq̃ omnes sunt naturales, præter eum qui habet inter uehementem & languidum 554.55	Pulsus ordinati inordinati uel causæ 566.18	Pulsus simpliciter breuis qui sit 566.15
Pulsus medius inter languidum & uehementem quomodo dignoscatur 586.48	Pulsus ordinatus in circuituum paritate consistit 522.27	Pulsus simpliciter magnus qui sit 551.43
Pulsus medius, qui naturalis sit, nullus inter languidum & uehementem datur 586.43	Pulsus ordinatus inordinatus quomodo discernendus 511.35	Pulsus siue quibus mutari non possit 580.6
Pulsus metæmum 515.18	Pulsus orthopnæ acutæ 518.29. 578.31	Pulsus suffocationis pductæ ab utero 518.31. 578.39
Pulsus minimos efficit facultas extremæ dietæ 558.9	Pulsus paralyticorum 518.2.	Pulsus suppuratorum 575.27
Pulsus moderati nō omnes continentur naturales 557.18	578.1	Pulsus timoris 573.39
Pulsus moderati soli singulis generib. indiuisibiles sunt 533.16	Pulsus partes, per accidens arteriæ quiete discurtur 542.5	Pulsus torius corporis, antequam cor consentiat parti prius affectæ, petrahi in cõmunē alterationem uō potest 600.33
Pulsus moderatus est inueniendus 544.49	Pulsus percussio quid 511.4	Pulsus tremulus quid indicet 594.23
Pulsus moderatus ex sola motus qualitate explorandus 547.46	Pulsus per ignes arterias fit 496.	Pulsus tristitiæ 571.15
Pulsus moderatus in quibus nō reperitur 580.46	Pulsus peripneumonicorum 516.54. 576.17	Pulsus uacuus quomodo intelligendus 555.8
Pulsus moderatus qui dicatur 564.60. 582.33	Pulsus phreniticorum 517.8.	Pulsus uariari in animi perturbationibus 649.4
Pulsus moderatus quomodo iudicandus 546.6	576.12	Pulsus uariari pro ratione diuersarum causarum 543.60
Pulsus moderatus quot modis dicatur 585.29	Pulsus pleuriticorum 516.8.	Pulsus uehemens, languidus, durus, mollis, plenus, uacuus 521.15
	574.27	Pulsus uehemens magnus qui bus adfit 540.37
	Pulsus pleuriticorum celer, durus, minor q̃ febris expedit, nec non creber est 574.51	Pulsus uehemens, semper à facultatis robore fit 586.31
	Pulsus pleuriticorum si in maiorem crebriatē mutantur, nūciant peripneumoniā, aut syncope 575.6	Pulsus uehementis sunt ualide contrahendi 539.55
	Pulsus prægnantū maiores, crebriores & celeriores 570.7	Pulsus uehementis est proprium euertere 551.24.
	Pulsus priuatio quid 582.27	Pulsus uehementissimus optimus
	Pulsus proficitur à robore facultatis uitalis 534.50	

INDEX.

tnus	591.18	ris actionis defectus	554.41	Pulsuum duorum mora intermis-	fo, Galenus dubitauit quispiam
Pulsus ueloces tardis sunt secu-		Pulsuum decurratorum digno-		uicere possit	589.50
riores	590.63	scendorum ratio	593.4	Pulsuum durities à quibus au-	
Pulsus uelox unde oriat	491.2	Pulsuum decurratorum discrimen	561.13	geatur	575.14
Pulsus uermicans	514.60	Pulsuum decurratorum duplex		Pulsu essentialis definitio, quæ	
Pulsus uermicans & formicans		genus	593.1	brenis sit, nulla constari potest	
sibi mutuo succedunt	543.21	Pulsuum dicrororum differentia			
Pulsus uermicans infirmam fa-		in quibus consistant generi-			
cultatem denunciat	595.46	bis	525.63		
Pulsus uermicans quando acci-		Pulsuum differentia diuersa, pro			
dat	511.60	uariis oris uentriculi affecti-			
Pulsus uermicans solet sine febr-		bis	518.16. 578.47		
bus accidere	592.63	Pulsuum differentia in distentio-			
Pulsus uermicans & undosi unde		ne, secundum singulas dimen-			
di dicti	565.49	siones, sunt nouem	519.61		
Pulsus uermicantes quibus ab-		Pulsuum differentia in trinis si-			
sibus accidunt	572.47	mul dimensionibus accepto-			
Pulsus uibratio quando accidat		rum, sunt septem & uiginti			
585.1		520.8			
Pulsus uibratus	539.6	Pulsuum differentia pro balneo			
Pulsus uibratus dicrorus quan-		rum diuersitate	514.1		
do gignatur	597.8	Pulsuum differentia pro diuer-			
Pulsus uibratus si adsit, nonni-		sitate regionum	513.30		
hil roboris facultatem posside-		Pulsuum differentia pro exerci-			
re declarat	585.7	tiorum diuersitate	Ibid.56		
Pulsus uibratus unde fiat	562.33	Pulsuum differentia pro inflama-			
Pulsus uirorum ac mulierum qua-		tionum & partium inflamarum			
les	512.50	naturis diuersis	515.55		
Pulsus, uitalis facultatis est opus		Pulsuum differentia pro miscellæ			
39.41		modis, quibus facultas & in-			
Pulsus undosi & uermicantes		strumenta miscentur	557.20		
sola differunt qualitate	565.26	Pulsuum differentia pro modo			
Pulsus undosus ex humida mol-		cibi assumpti	514.13		
lity arteria nascitur	592.60	Pulsuum differentia pro molliu-			
Pulsus undosus nunciat sudore		dine uel duritie organorum	556.10		
643.58		Pulsuum differentia pro uarie-			
Pulsus undosus quando sudore		rate dolorum	515.24		
decretorii promittat	592.53	Pulsuum differentia quatuor dum			
Pulsus undosus quomodo fiat		facultas simul & usus muta-			
527.43		tur	555.47. 568.8		
Pulsus undosus semper in altis		Pulsuum differentia secundum			
soporibus est	576.49	ætates	544.40		
Pulsus unius inæqualitas à sede		Pulsuum differentia secundum di-			
arterie profecta	523.7	uersas syncopas	515.4		
Pulsus unius morionis, propor-		Pulsuum differentia secundum di-			
tio est ad alteram	519.46	uersa tempora	513.5 568.64		
Pulsus uoluptatis	515.11	Pulsuum differentia secundum			
Pulsuum abolitio à deficiente pul-		motum sunt tres	519.56		
su differt	561.20	Pulsuum differentia secundum			
Pulsuum æqualitas & inæqualitas		quietem arterie sunt tres, ra-			
quomodo cognoscenda	547.51	rus, creber, & medius	521.42		
Pulsuum alterationes quæ à qui-		Pulsuum differentia secundum			
bus causis magis proficiuntur		tempora, referunt ad usum, fa-			
553.47		cultas & instrumenta	569.20		
Pulsuum bis sentientium genera-		Pulsuum differentia uiginti se-			
tionem tres	592.24	ptem	532.4		
Pulsuum celeritas à quibus cau-		Pulsuum differentia pro uarietate			
sa oriri possit	555.16	humorum exuperantia	701.34		
Pulsuum celeritatem uel tardita-		Pulsuum differentiarum genera,			
tem ut cognoscamus, neque		Archigenes perperam qualita-			
temporis neq. intervalli qua-		tes uocauit	534.20		
ritas spectanda	546.55	Pulsuum dignotioni, admodum			
Pulsuum cognitiua permutatio-		tempus desiderat	518.18		
nes, tria sunt specieda	544.39	Pulsuum dimensiones deprehen-			
Pulsuum crebritatis causa, est prio-		dendi ratio	548.5		

Pulsum pro dolorum uarieta-
te mutatio 573.37
Pulsum pro exercitationū uari-
etate mutatio 573.39
Pulsum pro inflammationū ra-
tione mutatio 573.44
Pulsum pro uarietate calidiorū
balneorum mutatio 573.63
Pulsum quies superna, quantā
sit, tactu discernitur: inferna
non item planē 523.4
Pulsum tot differentie primæ
quot causarum 531.29
Pulsum uariationes, pro causa-
rum alterationibus sūt 13.37
Pulsum uehemēter ferientū, duo
tantū genera habent 550.64
Pulsum uelementia est utilis
590.57
Pulsum uni semper cause qui ad-
hærescant, eamq̃ fideliter indi-
cent, & qui rursus familiares
tantū ipsi causis dicant 555.5
Pulsum usum esse mutarū qua ra-
tione deprehendamus 580.17
Pulsum usus 510.3
Pulsum usus augetur ob exhalā-
tionem spiritus, & incrementum
caloris 571.53
Pulsum usus est tutela innati ca-
loris 537.3
Pulsem ex lacte & farina, hepatis
obstructiones, & calculos re-
num gignere 573.31
Pumica & smiris facultas 1118.
Punctio 32.57 (31.112.33)
Punctiōnem oræ angustæ quo-
modo dilatandæ 1165.7
Puncturæ curatio 835.7.573.31
Punctura nerui, cur ad excitandā
consuētudinem sit prom-
pta 835.3
Pungi debet nemo ex suffusis, an-
te uacuatiōnem humorū pec-
cantium 32.12
Punicorum succum ad osænas
polyposis magnificè comen-
dat Galenus 1215.10
Punicorū succus cardialgiæ uti-
lis 384.47
Pupilla alterius oculorum com-
pressa, apparere duplicia quæ
antea simpliciæ erant 1271.40
Pupillæ coarctatio quando facili-
le & quando ægræ curationē
fiscipari 669.10
Pupillæ foraminis affectus quæ-
dō usui incommodet 668.48
Pupilla mortuo animali cur sit
laxa 1267.64
Purgantia cuncta uim trahendi
habent 1061.40
Purgantia a medicamentis debent
crasiora relinquī 463.22
Purgantia omnia, facultate sunt
calida 1003.38

Purgantia omnia uentriculū ui-
nant 1004.17
Purgantia cū mutū miscēt,
congenera esse oportet 131.37
Purgantia ubi à natura uincun-
tur, talem gignunt humorem
qualem erāt ductura 1058.14
Purgantium alia duoa trahunt
humores 1061.40
Purgatio humorum nō caloris
gratia administratur 1003.30
Purgationes menstruas crenicas
quæ signa præcedant 644.48
Purgationes sub cane & ante pe-
riculosæ 8.5
Purgationib. inepti qui 1003.15
Purgatio superueniētia disci-
mina 987.15
Purgatio purificat sanguinem
1001.32
Purgatio q̃si adhibenda 860.16
Purgatio quibus debeat humo-
ribus, & qualis 30.27
Purimouendo quæ congruant
1054.15. & 17. 1055.14
Puris à crudo humore discrimē
571.50
Puris hypostasis discriminē
696.22
Puris in thorace cōtenti indicia
quæ 757.54
Purpurarū opercula quibus asse-
ctibus proficit 1119.33
Purulentū cur celerrimē suffocen-
tur 756.48
Purulentū undergrounde spirent
1246.60
Pus in thoracis capacitate con-
tentum, expirationis tempore
in pulmonis asperas arterias
transmittitur 761.12
Pus laudabile quale esse debeat
784.60
Pus mouentia ab emollientibus
quomodo differant 1053.24
Pus mouentia, calida & humida
quatenus dicantur 1054.24
Pus mouentia humorē qui pre-
sunt in partibus induratis con-
seruant 131.32
Pus mouentia modicē excalfa-
ciant, humectantq̃ 1056.4.
1176.35
Pus mouentia nō immutare par-
tis substantiam, sed tueri sunt
nata 1053.53
Pus parotidum suppuratarū qui-
bus modis uacuandū 1213.14
Pus per sectiones abscissū si to-
tum simul uacuetur, uires de-
hicit 965.4
Pus quæ moueant 859.50
Pus si cum urina excernatur, mi-
stionem ipsius esse consideran-
dam 771.60
Pustularum capitis medicatio

1196.64
Putredini quæ requirant 898.18
Putredini quæ sit apra 1176.49
Putredinis calor mordax ac a-
crius existit 990.61
Putredinis occasio, transpiratio-
nis est prolihibitio 918.16
Putredo ab aliena caliditate pro-
ducitur 796.43
Putredo, febris causa est antecē-
dens 918.43
Putredo, febrim est causa, quæ
plures infestant dies, ac proin-
de prius est tollenda 904.30
Putredo humorum quæ in uasis
sit, duplex in genere 784.52
Putredo humorum quorūplici-
ter accidit 908.6
Putredo oritur à calido & humi-
do 706.15. 859.48. 990.50.
1037.63. 1161.51. 1235.29
Putredo quid 917.8
Putredo quomodo sit sananda
917.35
Putrefactiō abigimorū 1178.42
Putrefactiō quæ carnem abig-
dolore liquat 1059.16
Putrefactiō uel si sumat por-
tione minima, corripuit ani-
mal 1037.61
Putrefactiō uerē, qualia sint
Putrefactiones quæ cot (1059.9)
rigant 1256.10
Putrefactioni sapor necessarius
accidit 1059.14
Putrefactio sequitur ad ictero-
ris obstrukiones 1254.62
Putrefactiō omnia à calido & hu-
mido, seruantur incorrupta à
frigido & sicco 41.30
Putrefactiō facile calida & humi-
da quando 782.38
Putrefactiō adicitur calore ca-
lent, naturali frigenti 55.19
Putrefactiō reddantur calidio-
ra quā antea 990.55
Putrefactibus apta medicamen-
ta quæ 981.62
Putrefactiō circa articulos cu-
ratio 1163.3
Putrefactum curatio per quæ
fieri debeat medicamentis 1161.
Putrefactum substantia 62
qualia 1143.28
Putrefcere quæ nullo modo pos-
sint 131.30
Putrefcūt calida & humida, quæ
in simili loco conclusa perila-
ri non possunt 915.55
Pyelitis 1203.37
Pyelitis 141.21
Pyelitis uentriculi officium in-
ferius 83.32
Pyrethri uis 1103.44
Pyrites cuius sit facultas 1118.
Pyrrhion 5.41 (31)
Qua-

Q UADRVEDA cur nequeit sedere nec stare 210.9	piunt 812.3	quatuor 154.59
Quadrupedibus quæ cōmodi- tas adit ex illa corporeis fabri- ca 209.54	Quartana longissima minimèq; periculosa 960.22	Radix polio obliqua 207.10
Quæstiones actionibus huma- nis inutiles quæ sint 354.63	Quartanarum curatio 962.33	Radix quæ ulug incubat 207.22
Quæritio omnis sub definitionē cadit 362.51	Quartanarū indicia 958.67	Radix ulnæ os 98.53
Qualitas acerba refrigerat & sic- cat 884.51	Quartanis cōfert uomit9. 963.5	Radix althææ & betæ discuti pi- tuitosos humores, quod non datur ipsarum folijs 390.24
Qualitas amara uiam astringen- ti facit 922.21	Quartanis uictus ratio conue- niens 962.44	Radix rhodiæ quam habeat uim 110.4.18
Qualitas astringēdi, est in austē- re emissā, in acerbis intensā 408.5	Quartus septimi est index. 609. 47. 611.29	Ramentum, ulceris est signum 774.6
Qualitas & qnātitas per homo- nymiam affectu dicit 333.34	Quaternionis circuitus sufficit ad cognitionem futuræ cri- sis 614.50	Ramex carnosus 709.24
Qualitas gignitur in materia & perit 362.30	Quaternionū q; separant & qnī inuicē coniungantur 621.52	Ramex, quis sit morbus 175.4
Qualitas peopria ab aliena ob- scenatur 1022.45	Quercus quam uim habeat 1077.49	Ranæ uix uires 1141.13
Qualitas sine substantiā, nulla esse potest 36.65	Quies arteriæ duplex 588.29	Ranunculī species & facultates 1074.30 337
Qualitates actiue, caliditas, fri- giditas, humiditas, & siccitas 34.22. 118.22	Quietū arteriarū utriusq; quid sit propriū 588.37	Rapē uel lunadiis facultas. 390.
Qualitates efficacissimæ calidū & frigidū 63.26	Quæritū arteriarū quid sit commune 588.32	Rapiuis 1076.53. 1091.22
Qualitates omnes quadritenus in se mutuo agunt 1036.20	Quies internæ tempus in pul- su non exactē dignosci potest 543.33	Raresfactiā quæ dicant. 1058.18
Qualitates primæ & secundæ quæ dicantur 1175.66. 1051.25	Quintanas dnas copulatas ter- tio quoq; die a cecisionem fa- cere 610.47	Raresfactio qua ratione cefrige- tet 662.2
Qualitates specificæ quæ sint, & cur sic dicantur 1030.3	Quintus medicus ob inuidiam olim Roma est pulsus. 645.38	Rara quæ sint 1015.38
Qualitates sunt organa opificia 54.53	Quisq; non alios modō, sed sep- sum quoq; debet uereri 422.46	Rara quæm spissā cur accendat tur facilius 1015.39
Qualitates tactiles quæ sint. 355. 61. 1019.48	Quodq; pro suo affectu admo- ta consuevit sentire 1034.38	Raritas ab intermitteute pulsu quomodo distinguat. 590.18
Qualitates tactiles totam proxi- mæ rei substantiā alterant. 24.19	Quodq; ex quoq; trahere, & in quodq; mittere potest 88.24	Raritas corporis quibus salu- brior, quib. insalubrior 67.4
Qualitatis cuiusq; uirtus uel ui- tium consequatur tempericem 826.40	Quotidianæ causa 791.8	Raritas pulsuum nunquam ua- cat periculo, sicut nec cecifio- ne nec pārnitas 590.56
Qualitatis expertia inclinant ad frigidū 383.41	Quotidianæ curatio 963.20	Rarum quid 442.3
Qualitatis falsæ facultas 114.3.	Quotidianæ quos præcipuē coe- ripiant 959.46	Ratio aræ ante alias artes 195.53
Qualitarum quæ in quibus fun- ctionibus existit efficaciores 92.56	Quotidiana proluxa est & peri- culosa 960.24	Ratio cinamidi uis interit, & qua- ce 69.34
Qualitarū summities frangun- tur contrariarum mixtura, 1034.27	Quotidianarū declinationes nō terminantur sudoribus. 959.56	Ratio communis 654.6
Quantitas distentionis & con- tractionis 519.19. 532.38	Quotidianarum inditia. 101.28	Ratio cur interponēda sensibus 1021.13
Quantitas unius extēsiōnis nō est magnitudo 531.56	R	Ratio dñplex 989.59
Quartana detēsis uengenda sunt uiscera uengentia cataplasma timp emollientibus 962.65	R ABIDORVM moribus qd auxilietur 1153.46	Ratio inest hominibus 519.8
Quartana detentos sepius pur- gan dos esse, apparētibus iam coctionis signis 963.3	Radices acriores et potentiores caule & folijs quæ sint. 380.18	Ratio inest homini cum dñs cō- munis 1.26
Quartanæ causa 791.9	Radices olerū acrimoniam ha- bentium, succum gignūt ma- lum 410.29	Ratio inuenit 471.45
Quartanæ eadē ab initio incli-	Radices quæ gustu nullam refe- rent acrimoniam, morsum aut calorem, tenui uictui sunt ad- uersæ 417.46	Rationale s posse curatōne- /m tare, quod Empieicis nō licet 15.44
	Radiculæ crūdæ perperam cū- rantur post cœnam 391.50	Rationales quo pacto insurgent ad simile transiunt 14.51
	Radiculæ utriusq; facultas. 1103. 61. 191.46	Rationalium assertio contra me- thodicos 12.18. 16.6
	Radix dearticulationes 207.14	Rationalium cōtra Empieicos responso 12.7
	Radix & ulnæ quod pertinet ad figuram & constitutionē di- scrimina 207.23	Rationaliū obiectiones aduer- sus Empiricos 13.8
	Radix musculi peculiares sunt	Rationalium progressus 6.36
		Ratione deduc sequitur aut uer- tus aut uirtum, affectus num- quam 330.15
		Ratione lesa, sepe memoriā le- di cōtingit, & ē cōuersio 738.26
		Rationi reluctari quæ dicantur 128.44
		Rationi semper iracundia obse- cūdet in summis philofophis 126.36

Rationis, quæ cerebro inest, opera 327.37
 Ratio per experientiam induci redditur generosior 426.43
 Ratio, postrema omnium sit & absolutur 324.14
 Ratio potestate calidam iudicat 466.64
 Ratio præfert irascibili animi, ut equus equo 326.1
 Ratio (quod homo est) in cerebro collocatur 322.13
 Ratio quando concurrat affectui 329.13
 Ratio quando felicitati suo fungatur munere 324.26
 Ratio quando reluctetur affectui 329.38
 Ratio sensui est coniuncta 547.nerf.13
 Raucedini quid auxilietur 1108.11
 Raucedo quando gignatur 1240.nerf.15
 Raucedo quid 693.7
 Rationis et sensus à naturali temperie exigui, exigua opus est mutatione ut corrigantur 887.16
 Recidiva morbi quando timenda 607.18
 Reclinatio qui fiat 95.42
 Recordatio præteritorum quid conferat 463.37
 Recti qui spirare soleant 756.41
 Rectum, intestinum sextum 320.51, 325.59
 Reducenda ad temperiem, non mediocriter præstidia postulat, sed contraria, & quæ aquæ à medio recedant 1021.14
 Redundantiæ morbi quædo oriuntur 476.58
 Refrigerandi medicamenta ratio 1198.45
 Refrigerantia extrinsecus, in febribus, qualia esse debent 909.39
 Refrigerantia immodice, natium calorem exingunt 976.3
 Refrigerantia quando scirrhus producant 1186.27
 Refrigerantia, sensum auferentia & inducunt torporem, potestate sunt frigida 59.4
 Refrigerantia simul & astringentia quibus morbis cõueniant 1072.19
 Refrigerantibus quando circa partes uentis sit sanguis utendum 867.13
 Refrigerantium facultas 712.5
 Refrigerantia sylvia, quibus tutò uti in capitis doloribus, possumus 1198.61
 Refrigerari quid 1016.30
 Refrigerati cur sint exaltati ad iram 504.61

Refrigerari dolent maxime circa unguum radices 65.7
 Refrigeratio completa, sensum & motum tollit 730.50
 Refrigeratio in febribus, quare brevis sit temporis atque periculosa 908.24
 Refrigerandi usus in phlegmone 93.7.18
 Refrigeratio respirationis finis 91.16
 Refrigeratio totius corporis & particulæ affectu, supprimit sanguinem profluentem 866.1
 Refrigeratio ueliciens 65.4
 Refrigeratorii ex palmulis 910.
 Regni maxima pars cõmuni 327.13
 Regiones intemperatæ qualia producant corpora 442.59
 Regionum cum temporibus comparatio 350.43
 Regionum uarietas, discrimen in moribus facit 331.63
 Regius morbus pmissus 763.58
 Rei de qua disputatur, in primis oportet habere substantiam 354.44
 Relaxantibus quando sit utendum 922.54
 Remedia ad eos qui letalia bibunt 1284.51
 Remedia Apollonii ad achoras 1196.29
 Remedia Archigenis ad achoras Ibid.35
 Remedia Archigenis ad ulcera conrumacia 1174.48
 Remedia auribus auxiliantia 482.20
 Remedia haud impune administrantur, cùm omnia sint præter naturam 19.4
 Remedia podagrica à nephriticis differunt 482.2
 Remedia repellentia idonea sunt phlegmonis incipientibus 921.48
 Remedia Sorani contra achoras 1196.57
 Remedia uacuantes omnia uirtutem exolunt 901.15
 Remediorum inuentio ex uera demonstratione parata, in raro cõngentibus longe præstat experientia 737.27
 Remediorum inuentio rationis præstat illi, quæ experientia innititur 1220.41
 Remediorum quantitas præcipue reddit artem medicam coniecturalem 994.22
 Remediorum refrigerantium alia per se, alia ex accidenti refrigerant 910.18
 Remediorum refrigerantium hu-

mentantibus, duplex est materia 908.13
 Remediorum uniuersum genus in quibus consistat 25.60
 Remediorum usus commodus, quæ sint necessaria 28.1
 Remediorum usus aptus, in arte medica est præcipuus 27.53
 Remedium Cleopatæ ad achoras 1196.51
 Remedium Cleopatæ capillos augens & dignitatem 1191.14
 Remedium contra desuuios capillos Archigenis Ibid.8
 Remedium Cironis ad achoras 1196.39
 Remedium furfurum Archigenis 1195.18
 Remedium sanguinem sistens 1245.2
 Remissionis tempus dici quod debeat 718.14
 Ren dexter sinistro elatior 182.20, 227.38, 899.37
 Renes cum lotio attrahunt bilem & sanguinem 227.52
 Renes & uesicæ dug, hepatis gratia condite 125.21
 Renes expurgant serui à sanguine 218.26
 Renes facile sciunt huius contrahunt 939.32
 Renes quibus inflammantur, uirum supprimuntur 516.4
 Renes si gignant calculos, totum autem corpus sit gracile, quare utendū uicibus rando 481.36
 Renes sunt pauli succi & concoloris difficiles 394.31
 Renibus inest usus trahendi lotij 76.60
 Renibus male affectis, quæ neng sint secunde 997.7
 Renibus si gignant calculos, totum autem corpus sit obesum, quare uicibus ratio conueniat 481.63
 Reus exulcerati indicia quæ sint 771.10
 Renitentia quæ 1053.4
 Renum actio & situs 227.7
 Renum calculos quid frangat 1086.46
 Renum facultas 691.7
 Renum inflammationibus quæ medicamenta conueniant 1267.1
 Reni positi inæqualis 315.10
 Renum spissitudinis causæ duæ 227.45
 Reni subauribus, sanguis aspergitur instat facies 227.58
 Renum uentres 181.28
 Renum ulceratorum certissimum nomen quæ 771.36
 Renutritio erosorum à quibus fiat

fiat 1144.40
 Repellentia quæ sint 1106.12.
 1114.16
 Repellentia sunt applicanda regi-
 onibus suprapositis ulceri
 1171.15
 Repellentibus quauo utendū
 1168.18
 Repellere humores in capite, quæ
 commodè possint 968.13
 Repercussio fit per astringentia
 & refrigerantia 816.61
 Repercutientia quæ dicantur
 1059.50
 Repercutientia sunt applicanda
 paulo supra partes patientes
 972.20
 Repletiones immoderatas quæ
 sequantur 68.18
 Repletiones immodicæ reddūt
 pulsus quidem maiores, respi-
 rationes autem minores atque
 crebriores 506.40
 Repulsoria quādo miscenda me-
 dicamentis parotidū 1219.59
 Rerum differentie 10.4
 Rerum præter naturam duplex
 est differentia 919.46
 Rerum præter naturam tria sunt
 genera 26.10. 594.43
 Rerū quæ in nostro corpore lia-
 bent, quatuor genera 844.10
 Rerum sensui euentiū, at per
 se non cognitarum, obserua-
 tio index 10.11
 Res adhaerentes reddunt cogni-
 tum locum affectum 711.52
 Res ad sui nutritionē nō egent
 alijs uasis præterquam emul-
 gentibus 228.1
 Res contentæ in partibus præ-
 ter naturam, faciūt ad cogni-
 tionem locorum affectorum
 722.60
 Referatio natis quæ re i ruptio-
 ne & erosione differat 761.54
 Res expēdēdæ a medico 560.49
 Resinæ omnes calciaūt 1149.16
 Resinæ terebinthinæ facultas
 2104.18
 Resinatum differentie 461.41.
 8104.12. 1163.63. 1166.12.
 1183.25. 1186.48
 Res naturaliter in partibus con-
 tentæ, faciunt ad cognoscen-
 dum locum affectum 722.41
 Res nō naturales quatenus cor-
 pora nostra afficiant 829.60
 Resolutio præcipue dicitur, ubi
 motus perit 747.49
 Resolutio quid Ibid.5
 Resolutio musculi alicuius par-
 tis, pars ipsa in contrarium con-
 trahitur 751.17
 Respirandi difficultatū cōpo-
 sitarum, quæ sint utilissimæ

coningationes 498.41
 Respirandi simplices difficulta-
 tes nil certi indicant: coniuga-
 tæ autem, ad iudiciū minime
 fallax perducunt 498.23
 Respiratio a cerebro quæ de cau-
 sa fiat 131.9
 Respiratio anhelosa unde fiat
 505.33
 Respiratio constat ex contrarijs
 motibus 490.41
 Respiratio cōtinua uentilare si-
 mul potest & exalfacere re-
 frigerata 504.56
 Respiratio cordis gratia fit 231.
 Respiratio delirantium si-
 mul & dolentiū qualis 500.34
 Respiratio duplex 248.63
 Respiratio est arbitrio subdita
 496.61
 Respiratio est noluntarius mo-
 tus, & opus animæ 100.44.
 243.60. 491.61
 Respiratio & deglutitio nunq̃
 simul fiunt 24.16
 Respiratio & pulsus iisdem ex
 causis mutationes similes reci-
 piunt 506.28
 Respiratio & pulsus una re dis-
 serunt 510.10
 Respiratio facilis ad salutem ma-
 gnā uim obtinet 504.11
 Respiratio serē omnis, pulsui pro-
 portione respondet 491.18
 Respiratio fit per asperas arte-
 rias & musculos 496.40
 Respiratio fituendi caloris infi-
 ti gratia 486.30
 Respiratio inflammati thoracis
 493.10
 Respiratio magna & parua quā-
 do accidat 486.48
 Respiratio cohibita, quidam
 seruis sibi mortem consciauit
 101.10
 Respirationem dari inæqualem
 491.61
 Respirationē solum suppeditat
 septum transversum 187.30
 Respiratione priuati, ne momē-
 tum uiuere possimus 484.18
 Respirationi efficiendæ quæ cō-
 serant 759.17
 Respirationi facili uiolētē quæ
 organa seruiant 489.18
 Respirationis actiones inter se
 cōueniētes sunt quinq̃ 755.40
 Respirationis causæ in genere
 sunt tres 488.18
 Respirationis differentie omnes
 in tribus oppositionibus cō-
 prehenduntur 501.57
 Respirationis difficultas quatuor
 coningationes Ibid.17
 Respirationis dolentia organa,
 qualis consequatur spiritus

497.44
 Respirationis duplex usus 506.63
 Respirationis & pulsus idem u-
 sus 490.64. 507.61
 Respirationis & pulsus nō idem
 seruiant concensus 211.8
 Respirationis pulsus & quies
 quæ fit post dilationē, bre-
 uior, post compressionē lon-
 gior 491.27
 Respirationis inæqualitatis cau-
 sæ 496.55
 Respirationis instrumentorum
 species multiplices 488.37
 Respirationis magnitudo eun-
 dem causarum cōcursum quæ
 uelocitas postulat 491.30
 Respirationis motuum offensio
 duplex 499.13
 Respirationis opifices, tres sub-
 limium thoracis musculorū
 coningationes 171.16
 Respirationis organa 487.44.
 600.18
 Respirationis organis malè affe-
 ctis, remedia unde petenda
 1140.18
 Respirationis organorū aliquo
 dolente, cur parum, sed cre-
 brum agamus spiritum 503.8
 Respirationis organorū angus-
 tia laborantium curandorū
 scopi cōmunes & proprii qui
 1147.3
 Respirationis organorū angus-
 tiam quæ efficiant 1146.63
 Respirationis partes quatuor
 489.15
 Respirationis species eadem est
 omnibus fluxionibus pulmo-
 nis 601.27
 Respirationis totius quænam
 sint differentie 502.12
 Respirationis uteruli motus ab
 usu impulsus præcedētē cessā-
 tionem contrahit 499.14
 Respiratiōis uelocis possunt ex-
 dem causæ esse, quæ pulsus ue-
 locis 491.8
 Respirationis usus 774.48.
 915.63
 Respiratiōis usus primus & ma-
 ximus 241.12
 Respiratiōis utilitas, inter illius
 causas obtinet primas 488.12
 Respiratiōis utilitas prima, se-
 cundā Ibid.8
 Respiratiōis utilitas principa-
 lissima est cōseruatio calo-
 ris inisti, a animalis spiritus
 nutritio 490.56
 Respirationē nō omnino peris-
 se p spiritui interceptiōnes, qua
 ratione cognoscitur 505.25
 Respirationum duplex cessatio
 499.9

- Respiratio opus est animalis po-
tentia: pulsus, vitalis 509.2
Respiratio, opus non planè uo-
luntatis liberum 101.35
Respiratio ordinata & inordi-
nata 496.1
Respiratio parua frequensq; in
quib; dispositio. adit 487.2
Respiratio parua & rara, ontue
ab organa respirationis refri-
geratis 503.62
Respiratio quando legal 751.56
Respiratio quibus de causa ces-
set 125.11
Respiratio quomodo fiat 351.23
Respiratio, refrigerationis cau-
sa fit 485.19
Respiratio, septi transversæ & tho-
racis musculorū est actio 100.
Respiratio sola, cordis tue (44
tur calorem 507.52
Respiratio stertorosa unde 503.
Respiratoris animalisq; fa-
cultas extremæ refrigeratæ
propria signa quæ sint 498.58
Res sensui euidentes, sensui dnu-
dantur 10.16
Reticoemis plexus sit & caroti-
dibus ad basim cerebri cõuo-
lutis 507.2
Retentionis excrementorū cau-
sis, contrariæ admoendæ
417.52
Retentio quomodo fiat 778.61
Reuellendi à capite modi diuer-
si 1206.9
Reuellendi ratio 864.32
Reuulsio est fluxum humorū
medela, ut deriuatio eorū qui
iam obfiderūt partē 974.16
Reuulsio & deriuatio à matrice
quibus fit modis Ibi.40
Reuulsio sit ad quæmaximè distan-
tia loca 819.41. 937.54
Reuulsio humorum fluxum, in
contrarium molenda est
860.54. 931.60. 936.45. 973.
5. 100.5
Reuulsiones cum euacuationib;
incipientibus fluere hu-
morib; adhibendæ sunt 998.1
Reuulsiones modi diuersi 968.
16. 999.59
Reuulsio per festam uenā quæ-
nam sit efficacior 994.62
Reuulsio sanguinis sit ad cõtra-
ria, deriuatio ad uicina 864.3
RHODAPES papaueris species
1095.61
Rhiagoidis solutio quando ui-
sum exoluit 669.13
Rhiagoidis tunica usus Ibi.16
Rhamni facultas 1103.59
Rhei uis 1104.2
Rheon adulterandi modus 1283.
uerf.6
Rheon esse uehementer astrin-
gens gustui 1185.17
Rheumatisms uentriculi & in-
testinorum malagma conue-
niens 1185.17
Rhododaphnes uis 1098.35.
1104.43
Rhus est duplex 1233.34
Rhus quam possideat facultatē
1104.55
Rhythmi inæqualitas quomo-
do fiat 519.32
Rhythmo dignoscendo quid ex-
plorandum 549.17
Rhythmorū differentie multi-
plices 521.59
Rhythmorum mutatio. causæ 566
Rhythmū inæquale efficit (19
portionis cõmutatio 529.64
Rhythmus in q; cõsistat 549.17
Rhythmus in solis pulsib; uehe-
mentissimis dignoscit Ibi.61
Rhythmus quando æqualis &
quando inæqualis 528.61
RHICINI uel cici facultas 1087.
uerf.10
Rigente homine solæ partes ex-
tremae refrigerant, recurrente
sanguine ad interiora 691.45
681.24
Rigentium ex humore frigido
curatio 715.44
Rigor absque febrī quibus acci-
dat 65.30
Rigor accide. inflammationi con-
uerf. in abscessum 714.62
Rigor à tremore quo differat
712.55
A Rigore cur corpus uehemen-
tius q; antea incalcat 714.35
Rigores citra febrim quando gi-
gnantur 681.25
Rigores per circuitus redeūtes,
qd exterminet 1067.11. 1088.
Rigor est referendus ad uim (58
expultricem 678.26
Rigor febrē ardentē illi superue-
niēs cur soluit 680.46. 714.58
Rigor sit à frigida & calida cau-
sa 631.13
Rigor sit, flaua bile lata per mē-
bra sensibilia 715.12
Rigori adeft motus multus, ci-
tus & frequens 678.21
Rigori febris cur superueniat
682.30
Rigor interdum à pituita uitrea
oritur 715.18
Rigori quid requiratur 713.4
Rigoris causæ 455.38. 681.18.
715.1. 881.48. 906.24
Rigoris medela 681.22
Rigoris motus est cõpositus ex
causa præter naturam, & fa-
cultate animali 678.29
Rigor morbosus quid 713.14
Rigor qñ expectandus 643.33
Rigor quando oboriat 714.13
Rigor quando fit letalis 681.34
Rigor quartanus qualis 715.50
Rigor quid 713.64 (793.21
Rigor sæpe citra febrim accide-
65.37
Rigor sine febre ex pituita in-
terdum oritur 793.52
Rigor tertianus & quartanus
modo differant 631.32
Rigor tertianus & quartanus
qualis adit 791.14
Rigor tertianus qualis 715.53
Rigor uehemens non adeft fe-
bris miscellaneis 719.2
RHODAPA imminuit omib; post
uigentem ætatem 473.28
Robur ipsius arteriarū lēctus, in
quoniam positum sit 514.52
Robur qua ratione concilian-
dum corporibus 10.58
Rolis qui affectus 170.40
Roma: regio admodū humi-
da 53.47
Rosæci cõpositio 479.52
Rosæci facultas 1035.38.
1204.24
Rosæci optimi preparatio 1156
41. 1209.14
Rosæci temperies est, qualis fue-
co rosarum inest 1029.10
Rosacum cõmode infunditur
per cranii fracturas 1127.24
Rosacum ex oleo & rosæ con-
ficitur 1029.9
Rosacum exustis cõmodū qua-
lier confici debeat 1158.34
Rosacum in primo gradu refri-
gerat 1029.16. 1031.29
Rosacum quando cõueniat in-
flammationibus 1035.30
Rosacum qua ratione dicatur
neutrum 1017.48
Rosacum refrigerandi modus
891.16
Rosacum refrigerat & calfacit
diuersa corpora 1021.2
Rosæ facultas 1104.38
Rosæ infans excrementa tria
1050.53
Rosæ partes quatuor 1054.3
Rosæ partium eximen 1050.59
Rosæ rosarumq; succus euiden-
ter refrigerant 1031.23
Rosa est frigida in secundo ex-
cessu 1052.46
Rosarum puluis in quibus cura-
re polypos solat 1215.24
Rosarum succum asseruandi ra-
tio 1034.16
Rosarum succus tepidam quan-
dam caliditatē possidet, odo-
resq; aliorum uigentiorum
exoluit 910.7. 1031.36
Rosas, quod tribuaciunt, calidas
esse

esse dicētes, quod tripliciter pec-
cent 1011.26
Rostrorū alimētū quale 407.23
R. V. 31 A 2 passivum uis 1080.14
Rubi cremoris usus 1321.16
Rubi facultas 1074.14
Rubi fructuum uires & facultas
tes 182.48
Rubi mororum succus os uetri-
culi roborat, id qd succo mo-
rorum non inest 1233.11
Rubor infusus nō extrinsecus ac-
ceritus, sanguinis plenitudi-
nem significat 700.44
Ructus acidi medela 726.45
Ructus acidi uentriculi monstren-
dum imbecillum 51.18
Ructus acidi unde oriant 104.5
Ructus fumosi uel acidi cau (31
sani inuestigandi ratio 716.15
Ructus fumolus, significat ignem
uentriculi calorē Ibi. 1. 51. 37
Ruptio in carne consistit 664.3
Raptiones pulmonis uisum
unde deprehendamus 718.32
Ruptio quid 856.44
Ruptio unde contingat 991.18
Rurē semen copiosē sumptum
medetur priapismo 947.25
Rurē facultas 1066.15, 1101.19
Rurē feminis facultas est tenu-
andi 415.16
Rurē syluestri effiacia 1097.43
S
SABINAE uis 1075.14
Sabuli ebullit uis 1068.47
Sacchari facultas eadem est cum
nostro melle 1095.16
Sagapeni facultas 1105.6
Sagapenum aqua rigatum solui-
tur 1282.31
Salamandra diutius igni admo-
ta, uritur 59.11
Salamandra est frigida ad homi-
nem 1030.30
Salamandra cinis quibus medea-
tur affectibus 1141.62
Sal capitis fomenta nō est aptū
1106.46
Sal emollientib. non inieciendus
est, quia exsiccet ualde 1056.19
Sal iheriacus extenuat corpora
991.1
Salēs theriaci quibus auxiliatur
affectibus 1179.7
Salēs theriacos preparandi ratio
Ibid. 15
Salicis foliorum uis 1082.64
Salis flos in uesica appositus, he-
nes induratos sanat 977.40
Salis genet 1049.60
Salis uires & differentie 401.59,
1049.46, 1120.45, 1143.10,
& 25. 1157.67
Salis uis facultas 1143.17
Salis usus in quibus probetur

Ibid. 33
Salua hominis ac uiperæ, utra-
que alteri perniciosa 64.42
Salua hominis ieiunij scorpium
enecat 64.43
Salua humana aduersatur be-
stie hominem perimentibus
1131.61
Salua ieiunij uentriculi ad que
conferat 1131.50
Salua amarescunt, amplius exal-
facta 1049.15
Salua que dicantur 1010.28
Salamenta Sardica, optima
404.17
Salis Andromachi uires & com-
positio 1181.59
Saluginem eam esse ad salendi
optimam, cui ouum innare
uideatur 1049.31
Saluginis facultas 1144.19
Saluginosa ex accidenti non-
nunquam mordicationes fa-
niant 1033.15
Saluarella si dissecetur, creditur
curare lienem 996.1
Salubre corpus simpliciter quod
sit 814.8
Salubre corpus ut uis, quod sit
Ibid. 11
Salubria que 565. 362.35.
813.33
Salubria signa que 815.14.
359.45
Saluberum corporum digno-
tia unde perent 815.34
Salubre facultas 1079.13
Salus spes quādo adit & quan-
do sit deplorata 604.62
Sanādi scopus cōmunis 816.12
Sana similibus seruanda 471.8
Sanationis intentio, est ablatio
uel transpositio 816.12
Sanatio quid 903.15, 919.51
Sandaraches facultas 1125.4
Sandyx quā uim habeat 1126.13
Sanguificationis ad feruorē mu-
si collatio 80.49, 217.59
Sanguine in utero alimur 412.40
Sanguinem detracturo, quē sit
consideranda 961.61, 989.
31, 991.24, 998.31
Sanguinem detracturo in syno-
chia que consideranda 900.1
Sanguinem ē uesica fluētem re-
medium supprimens 1267.23
Sanguinē ex dextra uel sinistra
nare profluētem supprimen-
di ratio 864.15
Sanguinem expuentibus, repe-
tenda est misio sanguinis
868.16
Sanguinem fluētem ab hepate
& splene, curbiturā admo-
te illis uisceribus, retrahunt
969.53

Sanguinem mittere in omnibus
putridis febribus quando sit
saluberrimum 921.18
Sanguinem per nares quid tra-
hat 1090.52
Sanguinem reticentis ob refri-
gerata spiritus organa, cura-
tio 570.52
Sanguineorum partes omnes ex
menstruo sanguine gignunt
38.28
Sanguine per nares fluente quā-
do & qualis secūda uena 864.
Sanguine præditis que in- (28
sint 180.24
Sanguini ex profundo profuen-
ti quomodo occurrendum
866.17
Sanguinis ad pulmonem reiecti in-
dicia 714.5
Sanguinis causa calor tempera-
tus & modice humidus 80.19
Sanguinis cretici excrementum
per nares quānam indicent
969.18
Sanguinis detrahendi mensura,
quā aliorum auxiliorum fa-
cilis multo deprehenditur
987.3
Sanguinis detractio iterāda est,
& cur 465.2, 996.32
Sanguinis detractio aut pur-
gatio, quibus prospiciē-
dum sit incūte uere 472.16,
992.9
Sanguinis detractio humores
uniuersi in uenia ex quo ua-
cuanur 1001.30
Sanguinis detractio nem quē po-
stulerit 900.19
Sanguinis detractioē que pro-
hibeat Ibid. 7. 903.18
Sanguinis detractio quando
sit plenitudo uacilla 991.62
Sanguinis detractio primæ &
secundæ cur interponendum
sit tempus 464.59
Sanguinis detractio quæ com-
moditas iust 994.27
Sanguinis eruptionem uenæ se-
ctio compescit 994.9
Sanguinis eruptionis uiles la-
borantibus que sint 996.8
Sanguinis eruptioni quid profici-
t 1082.18
Sanguinis eruptio per nares qua-
ratione curanda 994.11,
1215.18
Sanguinis enacuationis sistēda,
medicus habet liber8 potesta-
tem, aliarum aut uequaquam
987.10
Sanguinis excretio omnes præ-
ter naturā sunt, menstrua ex-
cepta 657.52
Sanguinis expuritioni quid con-

- ducatur 1119.60
Sanguinis flauis, subtilis, spirituo-
si & calidissimi origo, finis
cordis sinus est 141.53
Sanguinis fluentis per nates re-
uulso duplex 867.23
Sanguinis humorum causa triplex
687.57
Sanguinis fluxum & naribus cu-
rbiturula præcordijs admota
compescit 965.40. 996.11
Sanguinis fluxus q boni uel ma-
lam faciat crifim 644.18
Sanguinis humidi & rnbri gene-
ratio fit in iecore 141.51
Sanguinis in semen degeneratio
111.53
Sanguinis mifio in quartanis
quatenus celebranda 961.14
Sanguinis mifio, in quibus ad-
est crudorum humoru copia,
quomodo celebranda 994.42
Sanguinis mifionem prohibet
aëre constituto impendit cali-
da aut frigida 964.17
Sanguinis mifio quidam ad ani-
mi defectionem ufq celebran-
da 898.56
Sanguinis mifio quando fit eo-
dem die repetenda 464.6
Sanguinis mittēde principis fo-
pi qui fuit 993.9. 995.1
Sanguinis mutatio post ueniam
fecit, quando expectanda
non fit 995.17
Sanguinis partes diuerfe 18.49
Sanguinis profluuij per nates,
quæ fūt figna 644.13
Sanguinis redundantis nō indi-
cat uenæ defectionem 860.16
Sanguinis reiectionis à catarrho
prodeuntia curatio 870.11
Sanguinis fex libras tuto detra-
ctas fuisse 995.59
Sanguinis fupra modum affati
para pinguior, in flauū, craff-
ior in atram bilem conuer-
tur 797.51
Sanguinis temperies quibus de
caufis uarietur 701.42
Sanguinis uacuatio iterata quā-
do fieri debeat 998.44
Sanguinis uertitionis facul-
tas 1127.13
Sanguini fupprimendo empla-
stica cur fūt cruffiffici aptio-
ra 865.1
Sanguis abfque plenitudinis no-
tis quādo detrahendus 898.10
Sanguis à corde calorem habet
45.12
Sanguis ad inteftina & uentricu-
lū per mēftracæ uenas in lō-
giori inedia retrahit 114.59
Sanguis, affecto thorace, per pul-
monem educitur 714.27
Sanguis à iecinore & liene ua-
cuatur per uentriculū 764.53
Sanguis arteriarum subtilior &
uaporofior 223.9
Sanguis attenuatus & abfolutus
omniū poft hilitum tenuiffi-
mus efi in corpore 88.47
Sanguis à uafis effluere potefi
quatuor modis 863.19
Sanguis cœ naturæ familiariffi-
mus uacuatur omniū poftre-
mō 1059.18
Sanguis ciborū inopia arefcit ac
denfior fēpio reddit 988.14
Sanguis columbinus hypophi-
gmatis confert 1127.14
Sanguis colūbinus infunditur
per cranij fracturas Ibid.5
Sanguis columbinus neq fuaui-
tate, neq cōcoctionis facilitate,
fui fanguine inferior 199.1
Sanguis cōmunis materia efi la-
ctis & mēftris 1062.15
Sanguis coquitur in uenis 111.
uerf.42
Sanguis dupliciter inutilis red-
ditur 901.44
Sanguis dum fluit, pulfus fūt
explorandi 994.58
Sanguis ex quatuor confiat hu-
moribus 149.41
Sanguis extra fua uafa, fubito in
grumum concrefcit 702.19
Sanguis facile fit caro 111.39
Sanguis fit à propria leparis ca-
nis fubftantia 140.61
Sanguis fit ex mediocti calore
79.15
Sanguis fluens immodicè, quo-
modo fupprimendus 855.16
Sanguis gallinaceus 199.1
Sanguis in arterijs inflammatur
ex phlegmone primū 61.18
Sanguis in cerebro cōtentus, al-
teratur bifariam 742.30
Sanguis in febris & phlegmo-
nis fine febre ortis, quando
mitigendus 998.12
Sanguis in generatione, materis
rationem obtinet: semen, opi-
ficis 429.9
Sanguis in grumos coactus, grā-
uiffima fymptomata inducit
406.13
Sanguis in inflammationib. p-
trictis, quas febres gignat
588.4
Sanguis in inflammationibus,
quantus detrahendus 995.31
Sanguis in inflammationis particu-
lis duplici de caufa corrumpi-
tur 796.61
Sanguis in lafitudine quando
fit mitigendus 458.19
Sanguis in principio ftatim mi-
tendus, fi putrida febre labo-
rans ualidis fit uiribus, nec
creditas fubit 910.17
Sanguis in pulmone, aut inter
pulmonem & coftas putre-
fcens, tabem efficit 150.18
Sanguis in reliquo corpore quan-
do ex phlegmone accendatur
61.31
Sanguis in fynochis cur nō im-
modicè detrahendus 921.13
Sanguis in uenæ fectione fuppi-
mendus, cūm alterentur pul-
sus 995.14
Sanguis in uentriculo continet
præter naturam 688.28
Sanguis leporinus & caprinus
fauiffimus 197.50
Sanguis malè affectus qui ducit
688.1
Sanguis materiale principij par-
tium noftri corporis 77.61
Sanguis, medius inter chylum
& leparis carnem 111.25
Sanguis melancholicus an uni-
uerfum corpus occupet, uel
cerebrū folum, quomodo dif-
cernendus 742.40
Sanguis menftruis, fertibus al-
menrum efi idoneum 119.55
Sanguis menftruis non efi pri-
ma materij, gignēdis anima-
lis propria 196.58
Sanguis menftruis qualitate &
qualitate efi idoneum 705.9
Sanguis menftruis utero nō fa-
miliaris 108.20
Sanguis nec puero nec feni de-
trahendus 891.8
Sanguis niger quibus uacuatur
fecula uena 701.38
Sanguis non efi fimplex 18.52
Sanguis non folum alit animal,
fed calorem eius naturalem
conferuat 990.36
Sanguis nullus efi frigidus 1126
55. 1127.41
Sanguis ob plenitudinem uafor-
um, tunica difrumpit 68.14
Sanguis omnis cōcoctū diffi-
cilius 197.48
Sanguis omnis excrementitius
199.6
Sanguis omnis in cibo uirtus,
ficut & uiscera 417.13
Sanguis optimus à quibus fiat
414.11
Sanguis per quē inftrumenta ab
utraq bile purgetur 81.19
Sanguis poft bilem calidiffimus
61.50
Sanguis, potentia semen efi 116.
uerf.11
Sanguis probus, naturæ poſſeſ-
ſio efi 901.41
Sanguis productus ex modera-
ta quatuor elementorū tem-
perie

perie 350.8
Sanguis profluens ex nasis alius
demissis, quomodo suppri-
mendus 864.47
Sanguis purus excrementoso ca-
lidior 299.61
Sanguis putrefactus, proprie di-
ctum producit inflammatio-
nem 616.35
Sanguis putrefcens ad amaræ bi-
li natura m transit 616.32.
766.39. 802.10
Sanguis putrefcens in uetere, aut
in grumum coactus, extrema
pericula inducit 350.21
Sanguis quando externi calore
incalcescit 796.33
Sanguis quido mittendus 436.
32. 860.14
Sanguis quando mittendus sit
ad animi usque deiquum
994.51
Sanguis quando necessario pu-
trefacit 799.7
Sanguis qua parte excerni solet
753.60
Sanguis quare ultimo omnium
uacuetur 39.13
Sanguis qui ad splenem attrahi-
tur, crassior est illo qui con-
stitit in hepate 223.22
Sanguis quibus euacuetur per
inestina certis quibuldam pe-
riodis 86.26
Sanguis quibus, quo tempore,
ubi, & qua constitutione, par-
cius detrahendus 899.8.
993.38. 995.51
Sanguis in arterijs quoque conti-
nuer 508.53
Sanguis quouis die minendus,
si id morbus atque uires sua-
deant 899.30
Sanguis si fluat secundum uice-
ris rectitudinē, bonū 644.16
Sanguis, si nihil urget, aut pro-
hibeat aliud, quando sit mit-
tendus 998.40
Sanguis subtilissimus à dextro
cordis sinu transiit in fini-
strum per mediū septū 38.64
Sanguis succos optimus 48.43
Sanguis subtilis temperie est hu-
mano persimilis 1126.58
Sanguis uiridum ranarū 1127.
uerf.48
Sani quor purgationes graui-
terant 1001.5
Sani exquirere, quæ necessaria
363.28
Sani non est opus ad respiran-
dum ore 276.39
Sanitas animi 331.1
Sanitas corporis quæ 332.63
Sanitas elementorum est cōmo-
deratio 333.27

Sanitas est duplex, una tempera-
tissima, altera ueluti niro ex-
posita 431.43
Sanitas & morbus unde oriant
657.44
Sanitas inculpabilis conferuan-
da: quæ uitio exposita est, re-
ducenda per cōtraria ad mo-
deratius tēperamentū 431.46
Sanitas in quibus inuestiganda
657.11
Sanitas instrumentaliū partiū
in quibus consistat 418.61.
430.30
Sanitas latitudinē habet 67.54
Sanitas morbo, dignitate, & tē-
pore prior 418.52
Sanitas operationis aptitudine,
non actū, definienda 657.14
Sanitas primorum corporū in
bona consistit tēperie 349.17
Sanitas quando dicatur 66.11
Sanitas quid 360.5. 363.40.
430.38. & 61. 664.45. 843.
uerf.14
Sanitas similariū partium quæ
sit 65.60. 418.60. 430.27.
850.43
Sanitas, scopus cōmunis omniū
medientium 361.6
Sanitas senum nō est sanitas ab-
soluē 473.36
Sanitas tripliciter dicit 364.22
Sanitatem actio naturalis, pul-
chritudolū consequi 360.17
Sanitatem quæ uiuente 30.65
Sanitatem tuendam esse simili-
bus 64.49
Sanitate quando membra fruan-
tur 798.1
Sanitates hominū diuersæ 430.
uerf.53
Sanitatis habitus discernitur ex
functionibus secundum na-
turam obitus 430.32
Sanitatis latitudo ampla 49.59.
66.44. 473.32
Sanitatis tuendæ studium, me-
dendiij methodus, cōsistit in
corporibus, causis, & signis
438.1
Sapa est mustum plurimum co-
ctum 418.48
Sapa ex musto dolorem sedat
1208.63
Sapiens deo similis 421.3
Sapiens omnino à peccato im-
munis 421.3
Sapientia quid 840.16
Sapientissimus solus seipsum per-
fecit cognoscit 419.44
Sapor acer est calidus 1047.58
Sapor acidus sincerus reperi-
tur in oxalyde & oxylapatho
1045.61
Sapores acidi sunt essentij simul

tenuis & frigide Ibid.59
Sapores acres quomodo ab a-
maris differant 1048.42
Sapores exacte exponere est im-
possibile 1020.10
Sapores ex miscella quatuor pri-
marum qualitatū nascuntur
Ibid.36
Sapores qui nutriant 1046.45
Saporis dulcis natura 1043.20
Saporis salū & amari discrimen
1049.57
Saporū acriti facultas 1048.30
Saporū differentie in uarijs fru-
ctibus 1043.8
Saporum diuisiones ex doctrina
Platonis 1019.60
Saporum facultates & opera
1064.4
Saporum qualitates afficiunt re-
liquas eius partes, ut linguā,
licet non perinde ab his perci-
pianur 1054.62
Saporum singulorū qualis sit fi-
nis aut terminus 1048.10
Saporū temperatū 1063.63
Sapphyri uis 1118.32
Sarcocoe 709.14
Sarcocollæ facultas 1105.21.
1219.46
Sarcoticonum facultas 1161.4
Sarcoticonū finis quis Ibid.13
Sarcoticonum optimum cōfici ex
strugine cerato simplici admi-
sta 1149.7. 1140.2
Sardæ, Myli, Pelamides, Graull
401.35
Saryrafimus uel priapissimus qui
sit 708.65
Saxifragon & betonica renes o-
ptime afficiunt 1272.16
Saxifragon & lepra quō spectet
708.56
Scammonium trahit fluxum bi-
lem 1189.26. 1271.18
Scandicis uis 1106.59
Scaphoides os 138.58. 139.8
Scapulæ processus recurrit sunt
294.36
Scapulæ processus superiores
Ibid.34
Scapularum cōsideratio 116.10
Scapularū lazi musculi 312.43
Scapularū motus à quibus pro-
ficiantur musculis 170.25.
171.48. 295.39
Scapularum usus 293.40
Scarabæ ex oleo usus 1275.9
Scarificanda crura, prius sunt fo-
uenda per spongiam calente
aqua 1000.46
Scarificare quas partes, & in
quem usum soleamus Ibi.36
Scarificatione quauo sit uen-
dum 975.1
Scarificationes profundiores

quando conueniant 979.17	Scordium cadanera incorrupta 1264.55	Semen calidum copiosum gi- gnitibus, adeo ut ipsos ad ex- pulsionem prorit, qualis ul- cus ac mendendi ratio conue- niat 481.14
Scarificatio quibus morbo con- ueniat 1000.49	Scoria quale medicamen- tum 1122.47	Semen colubentia 481.12
Scarificatio quibus mulieribus fit adhibenda, & quibus sectio nem 994.1	Scorodoprasi natura 1107.20	Semen cor candidum 101.47
Scarus inter saxatiles pisces pri- mas obtinet 400.21	Scorpi aculeus 745.1	Semen efficiens principium ani- malia 77.63
Sceleros uocal osseum humani corporis compactio 111.46	Scorpiodes quæ uim possideat 1107.31	Semen excernitur inuito per co- uulsiones 779.7
Schimi floris facultas 1109.18	Scorpionis ictus granissima in- dici symptomata 775.45	Semen ex semine gigni 111.59
Schistos quas uires habeat 1120. 2, 1220.2	Scorpionis nenum refrigerat 745.8	Semen ex cernitur inuito per co- uulsiones 779.7
Scientiam habet, nulla in re ha- lucinarur 110.50	Scorpius, hominis ieiuni spuro necatur 404.51	Semen ex semine gigni 111.59
Scientiam non innasci irrationa- libus animæ facultatibus 314. uerf. 16	Screatus qui sit saluberrimus 27.43	Semen ex materia & materia me- struum, materia & facultas 116.15
Scientia ordinandi nictus ex qui- bus consistit 921.19	Scripturi nota quæ 1291.24	Semen faciem quo pacto gi- gnatur 101.29
Scilla aceto incocta, netuia non innocua 1007.58	Scrupulus continet obolos duos 1290.35	Semen faciem tenuis frigi- dum masculo 108.61
Scillæ succum excipiendi ratio ibid. 55	Scitæ de elementis differen- tes sunt quatuor 14.21	Semen genitalis extra propria ma- teria corrumpi 881.31
Scillæ uia 1106.61	Scitæ medicorum tres 11.38	Semen gignit uenam, arteriam, netuum, & prima animalium organa 107.55
Scillinorum confectio 1282.10	Scitæ principes inter medica- dum 6.11	Semen maris, principium anima- lis effectuum: itemque motus 1298.60, 1299.31
Scirrh curatio 945.22, 1054. 40, 1186.4	Scitæ trium communia 11.45	Semen muliebre confert anima- lis generationi, & uoluptati excitat 101.8
Scirrh generatio & causa 976. 57, 991.11, 1054. 10, 1056. 9, & 11	Sectionia forma in parte suppu- rante 935.51	Semen muliebre soli potest far- cinnalem gignere 115.26
Scirrh incurabiles ab alijs quo- modo discernantur 1186.6	Sectio quomodo administranda 162.10	Semen muliebre uirili in uero miscetur 108.36
Scirrhi a pituita uiscida orti, qualia medicamenta conue- niant 1056.21	Secunda 110.45	Semen non esse permittit quæ sic cant 1063.17
Scirrhorum species duæ 708.6	Secundæ adiumento est farcimi- nalis membrana 110.49	Semen non gignitur in alibibus glandulosis 110.60
Scirrhos cancriferos ab usu emol- lientium exasperari 1056.19	Secundæ connectio cum uero 105.17	Semen opificia habet rationem 124.61
Scirrhua exquisita quid 976.51	Secundæ constitutio & descriptio 105.9, 109.1, 121.22, & 27	Semè prolificum quale esse debeat 117.35
Scirrhi familiaria est rariu du- ria & spissis corporibus 604.11	Secundæ nati in duas uenas & toride arterias coeunt 121.38	Semen prouocantia supprime- ntia 1063.13
Scirrhus insensibilis, minimè cura- tionem recipit 976.54	Secunda iuxta uasorum oscula tantum accrescit 105.39	Semen quæ gignant exingultu 1061.7, 1158.12
Scirrhus quid 946.7, 1056.9	Secunda qua parie cōstringat ute- rum 121.33	Semen quæa materia trahit ab uero, & per quæa uia 108.19
Scirrhi quomodo ob ineptiam curacionem gignatur 976.60	Secundarum arteriarum mouentur à corde fetus delutescentia in uero 1240.28	Semen quid sit 116.19
Scissura quid 22.31	Secundarum arteriarum sunt propagines arteriarum à corde or- te 140.19	Semen quod imperfectum mo- uentur fit femina: quod perfe- ctum, masculina 1299.9
Scolopendra 109.49	Secundarum siue chorii nua 105.22	Semen quo tempore præcipue concipitur 106.14
Scolymi uis 1107.3	Secundarum uenæ omnes, pro- pagines sunt maximæ uenæ 1240.10	Semen retentum quam mēstrua suppressa, quibus grauiora sym- ptomata inferat 775.6, & 10
Scopi in neruis distributa tres 101.29	Seda infusum procidentis cap- itaplasma conueniens 1056.60	Semen sanguine siccia 419. uerf. 6
Scopi secundum quos singula re- cte qua aggrediantur 156.23	Sedi inflat quid conferat 1068. uerf. 32	Semen scissuratum est partium 117.50
Scoporum indicantium digni- tas unde fit iudicanda 915.42	Sedia & musculina & motua qua- lia 94.26, 230.2	Semen succia est matrici conue- nientissimum 102.38
Scopus ad bonis, prima agendo- rum causa 126.60	Sedia medicamenta Androma- chi 1264.65	Semen
Scopus curatio prima & mor- bifica dispositionibus nasci- tur 1149.34	Sedia musculorum usua 181.48	
Scopus in curandis ulceribus præ- cipuus quis 1156.11	Sedia musculi resoluunt immo- dico frigore 729.58	
Scopus in ossibus curandis quia 1214.34	Sedia prolapsi remediū 1265.16	
Scordii facultas 1107.8	Sedis ulcera curantur currentur, & qualia pharmaca possunt	

Semen supprimunt omnia refrigerantia 1063.21
Semen & menstruum qualia habeant principia 116.25
Semen ubiq; prepollet, ex pars dominantis sit similis 117.61
Semen uirile a muliebri nutritur 101.9
Semen uirile est membrarum & uasorū omnium origo 101.6
Semen uirale quale 109.4
Semen uirile spiritui plenum 108.15
Semen unum perfectum ex uirili & muliebri conficitur 115.19
Semen utriusq; necessario miscendum ad factus generationem 109.16
Semicotyla recipit acetabula duo 1191.61
Semina diutissime reposita, cur uires habeant imbecilliores 173.50
Semina facultate suis plantis similia 414.61
Seminalia uasa feminea profecta a testibus, inserui in cornu matris 108.50
Seminalis meatus 111.15
Semina parua mole multa substantia reddentia, oprimi sunt fucci & mulis alimēti 174.40
Semina præstantiora quæ sint 408.31
Semina præui fucci quæ 174.43
Semina renuana quæ 415.11
Semina quibus uiscum diligenter purganda 178.14
Seminarium in feminis uasa continent semen 105.1
Seminarium meatus positio 104.57
Seminarium uasis insertio in pendendum 111.40
Semina rugosa deteriora 173.18
Seminibus quando utendum Ibid.41
Seminis insunt quatuor facultates naturales 108.15
Seminis & lactis elaboratio 144.11
Seminis excretionē & compressionem comitarur ingens uoluptas & cupiditas 671.60
Seminis femineus usus quis 108. uerf.59
Seminis muliebri proprium 116.51
Seminis substantia 101.13
Seminis substantia quibus aptissima 108.10
Semper uiui facultas 1067.38
Senectus ab inclinante ætate, non genere, sed magnitudine differt 805.19
Senectus intemperies quædam est 677.51
Senectus, morbus naturalis est

471.14
Senectuti quæ ratione possit obfisti 805.42. & 49
Senectus quid 804.1
Senes confectis laboribus sunt exercendi 467.1
Senes crebrius & parcius cibandi 468.1
Senescunt corpora ob innatum calorem 804.19
Senes cur ferē ad uniuersas functiones corpus male affectū fortiantur 691.19
Senes cur tremuli 710.43
Senes cur uigiles 718.56
Senes desipiunt frigiditatis ratione 70.65
Senes exercendi consuetudo opere, uel si modicē noxium sit 470.59
Senes naturali temperie sunt fidei, humidi excrementorū copia 463.6
Senes omnes carēt robore 993.17
Senes quibus prædixi uis debeant, ne in obstructions incidant 469.4
Senes solidis partibus sunt fidei, excrementorum autem copia humidi 1014.18
Sensibus a quibus cibus abstinent dum 468.51
Sensibus deligenda quæ humectent & califaciant 470.55
Sensibus eadem quæ consulescentibus expedit uictus ratio 467.61
Sensibus qualis esse debeat exercitatio 466.19
Sensibus respiratio est perexigua & rara 436.63
Sensibus saluta meliora recētib; 469.1
Sensibus systole tardior 509.46
Sensibus uictus humectans congruit 470.1
Sensibus urina & alnus quibus medicamentis atq; cibus mouenda 470.8
Sensu accurata descriptio 429.
Sensio omnia animalia sunt (40 obnoxia 801.19
Sensum ab inclinante quibus notis distinguatur 801.19
Sensu ad interitum est uia 46.50
Sensum corrigendum per caliditatem & humectantia 466.
Sensum ex morbo absoluitur, est in curabilem non absolutum, cibo instaurandū 808.19
Sensum ex morbo quid dicatur 575.64. 854.1. 911.15
Sensum ex morbo quomodo introducatur 806.5
Sensu nec uitari, nec sanari potest 805.13

Senium quid 470.47
Sensibilia multa sensum fugiunt 91.1
Sensibilium cognitio inspectio, ne sedula confirmatur 1161.40
Sensoria instrumenta in capite quatuor 155.10
Sensoria postulant neruū mollem 151.18
Sensoria quæ quibus sint crassiora aut tenuiora 749.51
Sensoria uoluntariē agentia duplex habent neruorum genus 151.13
Sensorij alteratio, ut fiat sensus, percipi debet ab imaginario, ne, ratiocinatione, & memoria 155.55
Sensoriorū instrumentorum singula, qualia esse dicantur 147.11
Sensorium dum sentit, parius 151.10
Sensoriū non immutatur a quouis sensibili 153.44
Sensorium omne geminū 151.55
Sensu acutissimo prædita, medicamenta acris non tolerant 976.10
Sensu amisso, quibus contingat motum perdere 719.14
Sensu iudicanda eucrasia & dylocrasia 711.7
Sensu ulceroso si fit coniuncta cruditas ram in primis uenis, quom in externo corporis habitus consistens, quid agendum 463.46
Sensus communis symptomata quæ sint 665.60
Sensus deprauati symptomata quæ 676.11
Sensus est alterationis dignotio 147.15
Sensus & motus non ex iisdem neruis, singulis dignis dispensari 161.56
Sensus & motus origo consistit in cerebro 716.14
Sensus & motus quæ uia suppeditur 144.41
Sensus inest particulis neruæ prædita 95.7
Sensus in iudicandis medicamentis non sunt cōtemendi 1018.19
Sensus in passione consistit 110.47
Sensus instrumentū alterat dum sensimus 148.1
Sensus intra se nullū affectū uehementem patiuntur 673.49
Sensus non est sine alteratione 64.15
Sensus non sit absq; nerui affectu 146.13
Sensus nullus, quantum & qualis sit sanguis in arterijs contentus, potest cōmonstrare 551.35

Sensus partis affectu quas exhibeat indicationes 888.61
Sensua quomodo fiant 675.14
Sensua quo pacto exercendi 1041.20
Sensus sensibilis iudex 552.36
Sensus ulcerosus, acrem sequi humorum qualitate 698.64
Sensua ulcerosa nullius plenitudinis est propria nota 699.57
Sensua ulcerosa triplex 455.12
Sensus ulcerosa unde proveniat 455.18. 906.31
Sensu ulceroso praesente, crudiusque humoribus ab alio in corpora habitum distributa, quam medendi ratione sit utendum 461.61
Sensuum instrumenta quae 128.47
Sensuum qui maiore minorque uoluptate afficiuntur, & crassiora obiecta possideant 675.19
Sensire, ueluti quiddam est pati 729.20
Sensit canis facultas 1091.47
Sensum corpora plurimum uiuant pingui frictione, post somnum matutinum adhibita 466.33
Sensum nemo querit ex toto potest, sed neque exercitium uelutemena Ibid.27
Sepix testa quam uim habeat 2139.24
Septem uenae in uentrem descendunt 141.16
Septentrionales agrestissimis moribus 71.25
Septi cordia foramina 218.65
Septi foramina duo 176.24
Septimana decretoria est morborum acutorum 619.29
Septimanus tres uiginti diebus semper describantur 619.49
Septimana, perfecta est periodus 619.47
Septimana quot diebus consistit 621.28
Septimester factua, citius censu octogintaquinque diebus uidi non potest 127.25
Septimeltris partua uendi primus terminus 126.45
Septimi quartua est iudex 601.29
Septi transuersi affectua, ut pulsus uariant 602.3
Septi transuersi conexiones 176.
Septi transuersi & morua 664
& musculus qualis 94.28
Septi transuersi figura, situs, & nervi 291.50. 489.24
Septi transuersi origo 287.8
Septi transuersi partes 176.60
Septi transuersi substantia & centrum 174.37

Septi transuersi substantia & tunicae 249.7
Septi transuersi substantia, & actua musculi figura, circulae est 278.54
Septi transuersi usus 174.34-222.42. 488.52
Septo transuerso animal uti solo in paruis respirationibus 189.4
Septio transuerso inflammato liceterrime consilio ues oriri, quae admodum suffocantes pulmone phlegmone obfessio 516.1
Septuagenarius quando mitendua sanguis sit 995.17
Septum transuersum intersacet cordi & hepatis 222.27
Septum transuersum nascit a costis spuris 275.60
Septum transuersum, phrenem, diaphragma, idem 186.51
Septum transuersum respirationis organum, distinguit spiritalia a naturalibus membris 230.29. 500.65
Septum transuersum separat irascibilem animae facultatem ab appetitoria 761.62
Septum transuersum soli perficit lenem respirationem 751.43
Septum transuersum substantia & usu musculus 187.22
Septum transuersum thoracis tensionem uiuat 499.4
Sermo a mente, non ex mente, sed ex summo gutturi proficiscitur 323.17
Sermo mentis nunciua Ibid.13
Sermonem quae efficiant 755.52
Sermonem quis optime utatur 530.60
Sermonis organa quae 754.47
Serica fructus 186.19
Seri genera omnia, excrementa 81.25
Seri pluri facultas 1105.43
Seri ex genere cibiorum 1257. uer.13
Serosa humiditas quae in matricem consistit, ubi incaluerit, partes excitat ad agendum, uoluptatemque maximam conciliat 301.11
Serpilli facultas 1080.5
Seriari quidque ipsam generibus a quibus corrumpitur 435.25
Serum alium laxat 2035.9
Serum, est sanguinis uehiculum 218.20
Serum sanguinis quoa affectua producat 687.3
Sesami uis 1105.53
Sesamoidia magni & albi facultas 1105.58
Sesamum cum melle in placenta

raa cogitur 177.18
Sesamum & erysimum calcat Ibid.15
Sesamum subuertit stomachum Ibid.
Sesamum succi crassi Ibid.10
Seseli quid habeat uim 1105.49
Seuerus mutato nomine uocatus fuit Antoninus 809.34
Sextus neruorum coniugationis parua nulla in aliquo thoracis musculum propagatur 190.54
Sextaria caput corylae duas 1295.57. 1292.41
Sextarius Romanus continet unciis uiginti 1151.60
Siccitas a largo calore liquata specie humiditatis referuntur 58.10
Siccantia cura ratione quae fiat 1170.27
Siccantia corpus uostrum citra congelationem 1093.13
Siccantia simul & astringentia 1170.40
Sicca omnia dura sunt 47.48
Sicca quam madida melius sonant 242.18
Sicca uiridibus alacriora 414.14
Siccescere necessario corpus potest consistendi uigorem cur contingat 805.13
Siccitas causa est omnia mortalitatis corporum 477.48
Siccitas consummata, insauabilis est 881.8
Siccitas In quibus morbis articulari inuadat 584.23
Siccitas partium solidarum summa, insauabilis 912.25
Siccitas quae sit sanata facillima 884.11
Siccitates a uigiliis & animi affectibus oriri, quomodo corrigendae 414.1
Siccitates particulares quibus notis deprehendantur 1010.1
Siccitati medetur humidum nutrimentum 481.54
Siccitatis immodice causae 662.
Siccitati solidorum corporum (10rum si periret, succedit necessarium frigiditas 884.25
Siccitatis species uariae 881.10.
Siccitascitius accipit for. 884.7 mam 118.26
Siccum omne & rarum prompte succenditur 57.4
Sideritia quam uim possideat 1105.65
Sigua cruditas, & coctionis, & mortis colligenda 623.21
Signa decretoria ante coctionem ueniunt, nunquam per crism finierunt morbos 624.47
Signa decretoria a signis concoctionis quomodo differant Ibid.11
Signa in aegrotantibus, quae dicant salubria aut perniciofa 829.2
Signa

INDEX.

Signa letalia coire nunq̃ cum cō
coctionis signis 611.16
Signa letalia cōsideranda 611.17
Signa letalia in synochis 913.10
Signa maxima in febrilibus
unde petenda 916.6
Signa morbum futurū indicantia
ex neutrorum genere sunt
827.56
Signa mortis & salutis 618.7
Signa optimæ cōstitutionis cor
porum quæ 815.38
Signa quæ aliis utiliora Ibid.39
Signorū crībus adiacentiū ge
nus habetur propriū 618.10
Signorū differētia triplex 618.1
Signorū futurū ægritudinē indi
cantū natura duplex 818.11
Signū alicuius qd dicat 767.37
Signum pro puncto 127.1
Siliqua, grana quatuor pendit
1190.13
Simia cur & quatenus homini si
millima 151.15. 177.13
Simix gressus qualis 108.7
Simia hominis imitatio ridicula
171.18. 194.9
Simiarum ridiculæ animæ, ridi
culum corpus tributū 101.3.
194.1
Similaginis facultas 415.33
Similares partes quot intempe
rarur cruciari possint sine
humorum affluxu, & cum af
fluxu 847.30
Similiarū corporum differentie
simplices tot, quot elementa,
tondemq̃ compositæ 14.40
Similiarum inter se ac dissimila
rium differentie unde nascan
tur 1014.30
Similiarū partū integritas & ui
tium in elementorū modera
tione immoderationeq̃ con
sistit 14.49
Simile simili familiare & notum
153.48
Similia quæ dicantur 553.36
Similia sibi murus cōgrua & a
mica 64.46
Similia similibus adhibenda qua
tenus sint 831.44
Similibus quæ seruantur, cōtra
rijs alterantur 412.14
Similibus unūquodq̃ nutritur
139.12
Similis quæ sunt substantiæ, in
ter se mutantur 89.16
Similitudo differt ab identitate
1018.56
Similitudo est inter ea quæ alūr,
& illa quæ aluntur 417.30
Similitudo liberorum ad paren
tes, cōtingit ex semine 115.61.
119.65
Similitudo unde fiat 815.49

Similitudinis liberorum ad pa
rentes ratio Ibid.18
Similitudinum trium, tria prin
cipia quæ 110.1
Similium transitus in se inuicē
facilior 1046.14
Simplex ac inculpatū in corpori
bus quodnam sit 418.48
Simpliciter dicitur duobus mo
dis 815.57
Simplicium vires quibus cogno
scantur 1171.9
Simulantes dolore qua ratione
deprehendi possint 614.46
Sincipitis regio spissima est ad
transmittēdas vires applican
dorum medicaminū 1193.32
Singultu expelli illa, quæ imbue
runt utriculi corpus 685.51
Singultui quæ medeantur 1251.
58. 1153.16
Singultus 677.6
Singultus causa 635.46.
745.30. 1251.46
Singultus causa ubi cōsistat 631.
55
Sinibus deligatura qualis sit ad
hibenda 1159.1
Sinum glutinarū iri, ex quibus
signis colligi possint 981.10
Sinus curatio 980.5. & 18
Sinus implendi ratio 1157.45
Sinus liquidiora pharmaca po
tulant Ibid.57
Senus quando abluendus ex ui
no 980.51
Sinus, qui affectus dicatur 706.
43. 734.14. 980.3
Sinus quō deligandus 980.58
Sion quā uim habeat 1106.42
Siraxon quid uocetur 1143.2
Siraxomidq̃ ossa 106.64
Sisari uis 1106.47
Sisōn quā uim habeat 1106.38
Sisymbrij uis Ibid.51
Sitientes uehementer, quatuor
accidentium discrimina po
tione subeunt 771.4
Siti in quid leniat 1076.10
Siti in qui succi gignant 674.41
Sitis à thoracis uisceribus obor
ta quomodo distinguatur à uen
triculi siti 825.59
Sitis ingentis causa 771.12.
1018.49
Situs patris affectus quas indica
tiones exhibeat 888.51.
974.35
Situs simplicis cuiusq̃ partis dif
ferentie sunt quatuor 832.14
Situs uariat auxiliorum particu
larium usum 18.55
S M I L A X cuius sit facultas
1107.15
Smritis dentes purificat 1119.39
Smyrniq̃ maxima Romæ habe

tur copia 189.5
Smyrniq̃ uis 1107.17
S O L A N I facultas 1111.11.
1204.18
Solani natura 1056.49
Sol animum integrum absoluit
615.38
Solanium hypnoticum 1111.15
Solanium manicum Ibid.17
Solanium iussu faciendo sensum,
dentium doloribus medetur
1113.31
Solani, uel solatri, uel morella,
astringit refrigerari 388.48
Sol aurore temporum, animalia
etiam gignit 617.12
Sol cur usum dissipet 671.61
Solicitude exercitationi & glo
rie cupiditati cōiuncta in uo
luptatibus abit 366.57
Sol medius inter errantia sidera
115.18
Sol nullius astri opem desiderat
617.44
Sol pulcherrimus omnium quæ
sunt in mundo 215.15
Sol ueluti rex quisq̃ p̃ maximus
est 617.49
Solui unitas quot modis possit
817.45. 849.6. 875.9. 931.36
Solutæ unitatis causa 665.56
Solutio contrinuitatis est cōmu
nis morbus tam similibus, q̃
dissimilibus partibus 658.
6. 659.19. 663.36. 847.42
Solutio morbi fit ne futura per
crisim, an secus, unde cognos
cendum 659.46
Solutio cōtinui indicatio est
unitio 904.6
Solutio unitatis species uarię
sunt, pro differentia particu
larum 659.38
Solutiuorum omnium cōmune
præceptum 186.15
Somnifera sunt humectantia
675.59
Somni profundius causa humidi
tas 601.57
Somni profundiores plurimum
conferunt ad concoctionem
371.39
Somnū in quibus partium figu
ris capiamus 99.61
Somnum quid conciliet 1109.
19. 1111.10
Somnus à balneo concoquit ua
lidē, & malos succos discutit
458.44
Somnus ad interitū est uia 571.4
Somnus concoquit 927.34
Somnus diuturnus crudos suc
cos digerit prohibet, & uiscera
reddit grauiora 917.39
Somnus mortis fater 570.64
Somnus naturalis qui 571.18

Somnus post confectos succos perdurans, immoderatus exi-
sit 570.58
Somnus præter naturā 571.18
Sonus profundus, sentiendi fun-
ctioes lædūt 676.4
Somnus quomodo fiat 571.15
Somnus quæ pulsus faciat 570.13
Sonchi facultas 1107.43
Sonitu aurū remedia uaria Ar-
chigenia 1211.27
Sonitus aurium non sunt cōpe-
scendi in febribus Ibid.12
Sonituū auris ob exquisitū sen-
tiendi facilitatem, orrorū cu-
ratio per stupescientia, lb.20
Sonituū in auribus causæ Ib.6
Sophismata à quib. possunt dis-
cerni 355.18
Sophismata constitui ex simili-
tudinē quam cum ueris habent
Ibid.16
Sophistæ exterminandi sunt
1145.66
Sophistæ res ipsas negligunt, de
nominibus solliciti 530.53
Sophistæ uerū in inductionibus
& exemplis 1011.64
Sopor consueuit sequi uehemen-
tes dolores 750.38
Sopor quid 750.11
Soporifera quare uitanda 926.
21. & 30
Soporifera sunt, quæ extremē re-
frigerant 675.61
Soporiferis quando utendum
926.14
Soporis causā 737.20. 738.62.
750.29. 701.14
Sorbi facultas 1098.39
Sordes ab acri medicamento ex-
citatz, quomodo discernen-
dæ ab his, quæ ulcus propria
ratione produxerūt 1171.43
Sordes exercitatorum 1130.57
Sordes hominū quibus affecti-
bus conferant 1133.53
Sordes quæ uim habent 1104.60
SORDIDA A C I A partibus inlata 62.15
Spadones inter cōsundū qua ra-
tione uoluptate fruant 302.21
Spadonibus omnis perit uiril-
tatis 112.49
Sparagmē facultas 1107.48
Species animalis ad subiectas ge-
nerationi materias consequi-
tur 116.9. 119.60
Speciē animalis à matre potius
suscipit foetus 116.40
Species indiuidua reperit in sin-
gulis rerū generibus 349.6
Species omnis uocari potest para,
non autem contrā 337.33
Speculatio circa medicorū disci-
plinā, quid prosit 333.54
Speculatio diuisoria & composi-

toria maximē necessaria ad ar-
tis constitutionem 353.40
Speculaturæ artis ratio confir-
manda experientia 4.51
Specula urentia 57.3
Spletx facultas 1080.37
Spermatocorum uasorū situs &
progressus in masculis 303.53
Spletx, siue zeta 374.24
Sphacelos quid 708.41. 877.17
Sphæræ paruæ exercitationis cō-
moditas 366.10. & 52. & 61.
367.55. & 39
Sphæræ paruæ exercitatio ua-
cat omni periculo 367.46
Splenoeides os 112.50
Sphenoeides sortitur apophy-
sea pterygoeides 132.52
Sphragis Lemnia 1115.35
Spice nardi facultas 1097.52
Spica nardi radix, quare sic di-
cta 1283.1
Spina 210.15
Spina ceu corporis quædam ca-
rina 210.4
Spina constat ex quatuor & ui-
ginti ossibus 286.13
Spina cur ex pluribus cōpacta
sit ossibus 285.50
Spinæ Aegyptiæ facultas 1068.
29
Spinæ albx facultas Ibid.22
Spinæ extremum, os latū 286.14
Spinæ figura media non rectā,
sed aliquantū curua 101.55
Spinæ imbecillitas unde 753.16
Spinæ musculi 174.1
Spinæ partes aliores, præstan-
tiores sunt 751.38
Spinæ partes à quibus musculi
fleantur 176.43
Spinæ paries maximæ quatuor,
collum, dorsum, lumbi, os sac-
rum 286.15
Spinæ proprio affectu laboran-
tis symptomata 751.54
Spinæ, quæ corporis uelut quæ-
dam carina est, constructio
285.44
Spinæ recentes 387.23
Spinæ uasa qua uia inferantur
293.26
Spinx uerterbra quinta affecta re-
soluitur manus 671.53
Spinæ usus, consistentia & con-
structio 286.5
Spinæ uulgaris facultas 1068.15
Spinalis medulla 92.15
Spinalis medulla ex posteriori
cerebri uentriculo orit 109.
49. 356.2
Spinalis medulla origo durorū
neruorum 261.47
Spinalium musculorū fibræ ob-
liquæ 176.62
Spinalium musculorum procef-

sus 176.51
Spinalium musculorū quatuor
capita Ibid.60
Spina supra diaphragma unde
gignatur 123.35
Spina tota per decimū spoudy-
lum diuisa in partes omnino
æquales 289.13
Spina uiginti quatuor uerterbris
constat 134.33
Spiratio & uita separari nō pos-
sunt 774.41
Spiratio & nox quando pereant
188.14
Spiratio exigna simul & rara fri-
giditatem significat 757.10
Spiratio facilis in quibus acutis
morbis ad salutem magnū ha-
beat momentum 616.45
Spiratio frequens quid indicet
757.12
Spiratio magna simul & rara nō
est inseparabilis à delirio 499
Spirationis resolutio un-
de contingat 759.17
Spiratio peisima quæ 747.43
Spiritus à corde uelut corpus
attrahit 91.8
Spiritus animalis partem à ne-
ris, partem & præcipue ab ar-
teris gignit 318.15
Spiritus huiusmodi quæ gignit
947.4
Spiritus alterationis causæ quæ
929.50
Spiritus animalis à cerebro de-
mittitur ad oculos 669.8
Spiritus animalis à cerebro na-
scitur 929.35
Spiritus animalis, animæ, propria
materia 70.40
Spiritus animalis cōtinet in cere-
bri uentriculis 243.65. 328.10
344.23. 507.11. 740.60
Spiritus animalis est aut animæ
substantia, aut primum ipsius
instrumentū 427.15. 750.40
Spiritus animalis exhausti per
uolentes motiones 507.18
Spiritus animalis in quibus ab-
sumatur 559.41
Spiritus animalis non est animæ
substantia 344.10
Spiritus animalis nutritionem,
esse minus cōmune respira-
tionis & pulsus 508.2
Spiritus animalis præcipue nutri-
tur ex inspiratione quæ fit
per nares 427.28
Spiritus animalis quid 239.1
580.21
Spiritus animalis, unde nutrit
427.17
Spiritus aut animæ est substantia,
aut primum illius instrumen-
tum 1055.21
Spiri-

Spiritus cohibitio ad apothera-
piam conferens, quo fiat mo-
do 448.1
Spiritus cohibitio cui operi cō-
ferat 447.31. 448.14
Spiritus cohibitio, est musculor-
um thoracis & abdominis
exercitatio 446.5
Spiritus cohibitio interponen-
da exercitio uehementi 448.17
Spiritus cohibitio, calor in re
spiratiois organo augetur
679.44
Spiritus cohibitio quæ proban-
da & quæ improbanda 447.
Spiritus cohibitio quomodo (40
do fiat Ibid.54
Spiritus constrictus coactusque
plurimum cōducit ad sensuum
facilitatem, ad dissolutum con-
trā 669.6
Spiritus densus quid significet
502.48
Spiritus densus simul & magnus
quando reddatur 503.1
Spiritus diu cohibitus sanat sin-
gultus 504.53
Spiritus essentiam quæ corrum-
pant 529.53
Spiritus est in ipsa generatione
motus principium 296.51
Spiritus flatulentus in auribus me-
ribus unde colligatur 1209.20
Spiritus frigidus ore & naribus
effluens, in acutis tantum mor-
bis perniciosus 502.55. 505.6
Spiritus inæqualitas quarum affec-
tionum sit nota 495.51
Spiritus magnus & per multum
repus, quid significet 502.14
Spiritus magnus & rarus deli-
rium indicat 757.8
Spiritus naturalis 324.54. In
hepate continetur 929.40
Spiritus nihil aut parum in cor
transmigrat 91.11
Spiritus obscuro qui dicant 505.
53. Quibus sint mali Ibi.47
Spiritus oculi confert ad oculor-
um actionem 269.11
Spiritus parvus & densus dolo-
ris est signum 495.4 Quib-
us superueniat affectibus. Ibi.
49. 500.49. 502.55. 505.41
Spiritus principaliora instrumē-
ta quæ 122.10
Spiritus qualitas, nō substantia,
cordi est ex usu 91.14
Spiritus qualitas distinctionis or-
ganorum spiritualium semper
proportione respondet, quid diu
naturaliter se habent 495.28
Spiritus subtilis quid 505.46
Spiritus ubi conficitur 241.59
Spiritus uralis quis 324.21.
A corde uasculi 324.52. 344.

26. 929.38
Splanchni uel musculi facultas
1075.40
Splendor oculi internus cum ex-
terno miscetur 267.46
Splen uiscus est minimè obno-
xium dolori 500.36
Splenis fractis oñibus cōfirmā-
dis requiri 877.36
Splenis caro rarior & leuior car-
ne hepatis 223.18
Spodij uis 1124.50
Spondyli partes quæ fortiores
290.44
Spondyli qua parte inarticulen-
tur muruō 1285.30
Spondyli singuli fibras habent
obliquas 1286.43
Spondyli singuli, neruorū emitt-
unt unā cōiugationē 193.31
Spondyli uis 1108.65
Spondylo primo duæ insunt ca-
uitates 1283.14
Spondylorū constructionis sco-
pus primus duplex 290.20
Spondyliorū productiones quot
habentur 1288.38
Spondyliorū productiones trifur-
cæ 1287.61
Spondylius medius in tota spina
cur productionē posticam in
neurā inclinā partē 1287.44
Spongia ardēs auxiliat eruptio-
nibus sanguinis 1144.5
Spongix uitæ facultas Ibid.1
Spongiarū lapidum uis 1112.8
Spumæ salis facultas 1143.48
Sputa in pleuride quæ sint mi-
tiora, & quæ magis exitialia
615.32. Urinarum subfiden-
tibus sunt per similia 629.14
Sputa inspicienda in pleuritide
624.30
Sputi pelsimi signa 721.21
Sputi colorum uariorū in pleu-
ritide ratio 27.19
Sputorum colores quid ostē-
dant 635.20
Sputum concoctum morbi fa-
cit breuiorem 623.12
Sputū crudum morbi ostendit
longitudinem Ibid.14
Sputū nō bonum duplex Ibid.8
Sputi pleuriticoꝝ species diuer-
sæ 735.16
Sputi prauū malignumque, peri-
culum atque perniciem indicat
623.15
Squamæ aris & ferri uitæ 1122.
Squamæ omnes sunt mor-
daces 1123.4
Squamolq̃ appositiones 1264.45
Q̃ST A C H Y S quam uim habeat
1107.57
Staphis agria colliquit carnem
1048.25

Staphyle quid 1136.21
Staphylini facultas 1076.60
Staphylomata 709.63
Stare homines possunt duobus
modis pedibus, at moueri nō
possunt 210.63
Stationi firmæ, amplos & oblo-
quos pedes esse appositos 211.10
Statio motus est 711.5
Status morbi 717.9
Status morbi cognoscendus atque
præcognoscendus 624.62.
640.41
Status morbi, omnium criscōn est
regula 640.39
Status tempore elapso, paulatim
morbi soluantur, omneque ab-
est periculum Ibid.43
Status tēpus in pleuride quan-
do iam adesse significabitur
Status uehementissimus (629.37
ma totius morbi pars 624.40
Stomatoma quid 707.6. 949.40
Stellæ in magnis solis defectibus
uidentur ex profundissimis pu-
teis 267.8
Stellio uisus à scorpionibus, eos
perimit 1275.13
Stereoris asinerini & ciconiarū
nullus uisus 1133.37
Stereoris bubuli uis 1132.61.
1174.53. Caprilli 1152.27.
Gallinæ 1133.22. Ouidii
Ibid.5. Canini 1132.3. Co-
lumbini 1133.11
Stercus columbinum in inflamma-
ri potest 56.64. Crocodylorū
& sturnorū quibus affec-
tibus conferat 1133.45
Stercus humanū sanat gutturis
phlegmonas 1132.11. Lupi-
num quibus conferat Ibi.14
Stercus muris alopecias curat
1133.42
Stercus nullū nec refrigerat, nec
humectat 1132.52
Steriles ac uiduq̃ frequentissimè
spiritus interceptione laborant
505.49
Sterilitatē quid inducat 1100.65
Ster nutramenta auxiliant graue-
dini 130.55. Quando fiant
130.56
Ster nutramenti causa ubi consi-
stat 682.54
Ster nutramentū quāuis ualidi-
dus à pectore impactus hu-
mores euellit 679.14
Ster nutramentū Ibi.1. Fied ad solē,
& quare 130.61. Interdū ex
accidenti conducit extremen-
tis pectoris educendis, pur-
gatis uentrē & gulam 682.57
Ster nutramentum interdū expulsa,
quæ reijci per uisum non pote-
rant 681.6

Sternutationem quid prouocet
1074.35. 1108.17
Sternutationis usus 1035.20.
Eius utilitas 111.1
Sternutatio plurimum iuvat cap-
ut, nisi ob defecationem ac-
cidat 679.23
Sternutatio miragatoriorum ad-
missionem leniunt 1207.4. & 11
Sternor quomodo accidat 100.10
Stribi facultas 1220.3
Stimmi culus sit facultatis 1125.
uers. 17
Stipantia cutim quæ sint 890.61
Stipatio duplex 897.24. 905.45
Stipatio in finibus uasorum um-
ide contingat 916.4
Stipatione quæ excident 905.11
Stipationis curatio 916.19
Simpes à uatura gubernant 71.
28. Duplici de causa corrum-
puntur 954.5. Habent con-
gruentiū sensum, & prædix-
sunt quatuor facultatibus na-
turalib. 90.25. Plato uocat a-
nimalia Ibid. 46. Quo mo-
do gignantur 117.59
Scirpius inesse soli appetitui
uim, ait Plato 117.28
Scirpius inesse anima uergetrix
71.29
Serenb conducere ad celestē cō-
coctionem uinorū 1107.61.
1251.11
Serebas quā habeat uim 1108.5
Sericos de anima opinio 70.27
Stomachica Asclepiadis 1250.37
Stomachica debent habere aspi-
ritoria uim prepolientē 1251.57
Stomachica Galli 1250.19
Stomachicū Alter dictū Asclepi-
dis, inexpugnabile 1252.33
Stomachus 217.39
Stomatia acerbissima cōficien-
di ratio 1255.14
Stomatia inflammationib. in-
duratis apta Ibid. 21
Stomaci diamoron cōpositio
apta omnibus est 1252.24
Stomatice ex multo cōpositio
1253.59
Stomatice ex succo nucum qua-
druplex cōpositio 1251.10
Stomatice ex succo nucū uiridiū
ad oris inflammationes cōue-
nientissimā cōpositio 1251.60
Stomaticum ad omnia oris uti-
tia 1254.55
Stomaticū Andromachi ex befa-
sa, anginis cōgruens Ibid. 19
Stomaticū Andromachi ex mu-
sto Ibid. 24
Stomaticum Asclepiadis Ibid. 63
Stomaticum ex nucibus deuo-
randum non est 1253.8
Stomaticum ex punicorum suc-

co 1232.66
Stomaticum ex succo nucū, cer-
teris omnibus præstat Ibid. 18
Stomacū Sorani ad fortēs gin-
giuas & humore prægnantes
1255.61
Stomomatis squama 1220.19
Strabulismus 677.8
Stranguria quando uescit sym-
ptoma, uel eius affectus exi-
stat 772.17. & 41
Stranguria quibus de causis fiat
690.63
Strangurias quæ sanct 1098.64
Stratosius cuius sit facultatis
1108.11
Streptū à statu profectū eō ac-
tiorē adī, quō status ipse ma-
gis tenuiora intestina perua-
dit: grauiorē, quō magis uer-
sus crassiora defecet 689.
Streptus murmurillus pu-
rus stridēs qd indicet 689.30
Strigmenta balneon quam uim
habeant 1076.11
Strumæ quando fiant 949.16
Struma & cisternæ 709.23
Struma quid 934.43
Strumas quid discutiāt 1089.14
Struthion quā habeat uim 1108.
Strutitæ causā 681.2. 718.64 (15)
Strutina quid 718.31. 739.33
Strupfacientibus miscent calfa-
cientia, ut eorū malignitatem
corrigan, eorumq. uires de-
ducant 1251.2
Stupidos frigiditas efficit 71.42
730.35
Stuporis dispositio qualis 732.
Stupor medioctis dolorem (24)
soluit 730.51. Omnib. acci-
dere partibus potest Ibid. 62
Stupor quid 1060.40. Quo fiat
modo 677.11. Quos infe-
stet 730.54
Sturni aluntur cicuta 120.12
Stryacis differentie 1183.19.
Eius facultas 1108.20. 1205.28
Sublario morbi sit per contraria
915.15
Substantia æreā mista est per o-
mnia sanguini 781.11
Substantia cerebri, neruorū & spi-
nalis medullæ, eadem 124.49
Substantia cuiusq. rei à qualita-
tibus primis cōstituitur 127.63
Substantia mobili, quies est mors
714.20
Substantia generum omniū su-
premiū 45.16
Substantia partium desinit atq.
mutatur 125.3
Substantia partis qd indicet 28.5
Substantia quid 356.28. Quo-
tupliciter dicitur 70.31
Substantia quot actionibus tot fa-

cultatibus prædita 68.53
Successio ad id quod uacatur
quomodo fiat 88.59
Succi aliq. acies aut computre-
scent: sola autē oleum, mel &
uinū, in longum durant tem-
pus 1034.9
Succi à quibus causis intropel-
lantur 457.62
Succi à quibus deducantur per
corpus 1036.18
Succi crassi attenuandi antequā
euacuentur 886.57. 1002.31
Succi crudi quādo deliquia ani-
mi aut syncopen inferūt 930.
36. Quādo uacūdi & qua-
do minime 991.48
Succi Cyrenæici uis 1099.19
Succi dulcis facultas 183.61
Succi omnes, præter sanguinem
sunt ex immoderato calore
Succi pingues exaspera- (79.16
ta leniunt 671.32
Succi crudis referti, cur tenuis-
simam uiscus rationem perse-
rant 459.19. Non admittit
uenæ sectionē, quia carent ro-
bore 993.21
Succi plantarū omnib. duplex
excrementum inest 1025.47
Succi uiridosi in uentriculo col-
lecti quæ conferant 1202.52
Succi uiridosi ad gignendos mor-
bos magnā habent uim 404.
40. 684.52
Succorū facultatiū differentie
1162.12
Succorum proprietates quando
cernantur 1044.17
Succorū quinam plus minusue
requirant mellis 1233.15
Succos acres quæ gignant 906.18
Succos carni cunq. hærentes e-
uaporantia 463.22
Succos frigidos, sopor: calidos,
uigilæ gignant 458.54
Succos frigidos subesse quis pul-
sus indicet 928.6
Succos lentos & crassos quid se-
cet & extenuet 1123.23
Succū melancholicū purgantia
945.8. Quæ gignant 703.16
Succus asposus alicui parti, nō
reuellitur ab altera 88.15
Succus ater 81.6
Succus cuiusuis pomi feruiscit
ut mustum 1044.13
Succus Cyrenæicus 1076.17.
Vitreus 458.13
Sudores critici quando soli sint
expectandi 643.33. Robustas
uires indicant 691.22. Frigi-
di quid significant 610.5.
Omnibus febribus sunt pro-
prij 618.54. Quos dissoluit
affectus Ibid. 58. Retinet odo-
rem

rem & colorem eius, quæ pur-
gant, humoris 691.17
Sudoris color à succo proficisci-
tur, nō à solidis animalis par-
tibus 457.39
Sudoris materia & generationis
modus 1130.41
Sudoris tum nimis fluentis tum
suppressi causæ 691.29
Sudor 714.43. Saluginosus
1130.31
Sudor luxurum uniuersi corpo-
ris nota 457.11
Suffocantur animalia ob quali-
tatem penuriam, dum respira-
tio cohibetur 487.13
Suffocantis medicæ expiratio
434.55
Suffocatio quid 682.11. Quan-
do accidit 661.50
Suffusione laborantes, quinam
cernere possint 347.12
Suffusionem incipientem quid
perferant 1223.41
Suffusiones gigni inter crysalli-
num & cornu 263.4. Quo-
modo differant à uaporib; ad
oculos à utriculo etiam 749
Suffusioni curandæ quæ no-
tiones sint necessarie 321.2
Eidem quæ accidant 367.30
Suffusionū purgandarum ratio
267.55
Suffusorum quinam possint ui-
sum recipere 668.61
Suffusorum remedia 1220.33
Suffusillatio vel hypopion quid
sit 1223.54. Curatio ibi.60
Suffusillatorū medicamentum Heræ
1224.43
Suffusillatorum pharmaca ab Ar-
chigene prodita Ibid.31
Sulfuris uires 1121.47
Sua extremæ partes epileptica
conferunt 1007.4
Sumpcionum differentie qua-
tuor 315.12
Supercilia ambientia cauitates
oculū quibus coherēt 195.56
Supercilia & frons unde uerum
propagines accipiunt 163.43
Superciliorum usus 268.51
Superciliatuiusculi partia, illius
propriâ dispositionē indicat
613.31. Superciliatuius mor-
dax & acris quibus effluat 782.33
Superuacantes expellantur semper
à fortioribus ad imbecillo-
res particula 934.35
Suppuratio qd 1032.1. Quan-
do accidit 773.16. In abscis-
sibus quæ ipsam prohibeant
779.7. Quando & quib; me-
dicamentis molenda 1133.31
Suppurati quid dicantur 773.14
Sura quæ uocetur 1188.13

Sura tora carnositas 319.62
Surdaftri contrarij praefidij o-
pula laboris, qsi qui auris do-
loribus infestantur 111.17
Surditatis remedia ab Achig-
ne conscripta 1212.12
Sursum aspicere quid 210.37
Sui magna, apitimus ad ana-
tomen spirituum organon
187.61
Suspirantes ex luctu, cur post lon-
gum tempus inspiratione non
gram efficient 300.14
Sutura coronalis per mediū an-
teriorum utriculorū cerebri
fertur transfusa 320.16
Suturæ capinae quinq 131.46
Suturæ cerebri tres 264.23
Sutura labeoidea 339.51. In
quo capite percat 264.37
Sutura media quo 132.16
Sutura per capita longitudine
semper servatur 132.40
Sutura quid lib. 3. Recta 260.15
Suturæ cranij qualis ovis deinde
rentur 258.11
SYSCOMORVM subtilitas &
facultas 186.39
Sycophantarū quorūdam frau-
dulentij mores 581.21
Sydera praedra esse summa intel-
ligentia 70.59
Symmetria omnia duplici ratio-
ne dicitur 430.42
Symmetriū quid dicat 1064.13
Symphyia quid 131.45. Dupli-
citer differt 132.6
Symphyti magni uia 1108.61
Petrificatae libid. 50
Symptoma duplex 844.2. A
passione & morbo quid differe
at 665.8
Symptoma largia sumptū quid
663.3. Proprie dictū triplex
est libid. 16
Symptoma sequi morbū lib. 1
Symptoma symptomatū succed-
it 667.11
Symptomata ex se, nec curatio-
nis ratione indicant, nec pri-
mū mutant 321.47. Quae
sele mutas ac necessariū le-
quantur, & quae non 693.69
Symptomata quae dicenda 668.3
Symptomata submouere negle-
cto morbo quī cognatur 95.7
Symptomata crinorū du-
plex natura 618.19. & 12
Symptomatum differentia tres
263.3. 699.19. 935.36
Symptomata in corpore afflic-
tis consistū, differentia
prima quāduplex 667.23
Symptomata in uniuersa actio-
nibus tria reperitū genera
684.43

Synanchas quaa nocet Hippoc.
Synanche quid 771.32 (772.32)
Synarthrofia 131.32. Eius tri-
plex species 131.1
Syncret nihil in corpore 238.32
Synchondrofia 132.2
Synscipitis oia quadrilatera Ib.
Synscoia stomachica quo- (63
modo uires exoluar 764.39
Synscope quid 691.10. Duplex
est 719.47
Synscoia laboribus omnibus
quae uiuiri fit exhibendae 918.
Synscope puercae est uiuiri (16
lapius 929.13. Quibus suc-
cedat caufis 931.17
Synscoes ab ore uentriculi ortae
curatio 930.29. A cruditate
928.14
Synscoia 132.10
Synochi generatio 802.14
Synochi quando oriant 899.2
Synochi uniuersum tempus est
unica accessio 791.1.802.30
Synochorates tres diffinitae 791.
36. Curatio 913.51
Synochoa non incidit in imbe-
cillia uires 920.41
Synscofia 132.10
Synscolem reperiri quae effluant
proportionē respiciat 709.31
Synscole naturalia est relaxatio a-
ctiōis 709.33

T

T a s a cor quib. de causa pos-
sit corripi 789.33
Tabes 661.11. Eius compositio
quæ 803.3. Quibus super ne-
nire cœsuerit lb.11. 789.34
Exquiritur quidò dicat 787.
39. Incurabilla quærit sit 806.
27. Nō sit, nisi auctis prin-
cipio affecto 803.18
Tabes omnes quo modo finit cu-
rande 806.10
Tabes quis sit morbus, & unde
gignatur 479.10. 888.31.
Quorū affectus dicat 803.58.
Simplex quæ 803.2. Quib. de
causa accidit lbi.8. Synco-
pulis quidò accidit 806.7.
Vera cur ex æquo partes om-
nes occupet 803.63
Tabidæ partes qualia alimenta
posulent 803.19
Tabidi & putridum expirantes
fugendi 781.42
Tabidæ arteriæcū opmū 124.1
Tabidū torridū causa 806. 55.
13. Quatoneci obliatur
808.15
Tactum nostrum qui motus re-
pellant 850.18
Tactum non possumus explorare
in hydropi, humorē ne aspi-
ritum in ventris regione con-

rinentur	331.38	gidi & humidis indicia	824.50	Etuum variant	974.13
Tactus cognoscendarum qualita-		32.49. Frigidi indicia	824.14	Temperies quæ sequantur	73.7
tatum est instrumentum	48.49	Humidi indicia	Ibid.32.	Temperie media prædictum, quo	
Tactus & gustus quibus interce-		Moderati indicia	66.52.833.	modo cognoscatur	1030.44
dentibus fiant	347.23	62. Sicci indicia	824.19	Temperie medium utriusque exire-	
Tactus facultas omnium crassissi-		In Temperamentis iudicandis spe-		mis inferuit	1027.33
ma 128.50. Hominis tempe-		standæ mutationes, ex quib.		Temperies ævis pefima quæ 41.9	
rati medius est omnium tangibi-		in quæ fiant	35.5	Temperies calida dicitur uel a-	
lium 1052.47. Iudex est duri		Temperamento calidiori absque		ctu uel potestate	44.3.
& molli 515.38. Iudicaturus		excessu humiditatis aut siccita-		da & sicca, hirsuta 50.19. Ca-	
temperamentum, si acquisitionis		tatis, quæ adhiat	473.53	lida facit iracundos	71.10.
rum qualitatibus expers	61.51.	Temperamento calido absque hu-		Duplex est 914.60. Labori-	
1031.3. Omnibus sensibilibus est		moris & siccitatis excessu,		ris, quid indicit	Ibid.28.
communis sensus	665.56.671.5	quantum uisui offerendum	473.33	Necessario species seu forma est	
Per manus uolam fit exquisiti-		Temperamento calido & sicco		69.23. Non temperata quæ	
nisimus 328.47. Partium ma-		prædicti, rarius mollioribus ex-		43.30. Optima corpori in a-	
gis ægagat	673.13. Multo gra-	cercitationibus exercendi	474.13	dolescentia accedit	473.17.
uius afficit quam reliqui gen-		Qualis uictus ratio conueniat		Optima semper feruida	915.
sus	665.49. Solus est calido-	475.32		27. Optima unde concilietur	
rum actus iudex	46.58	Temperamentorum collationes di-		68.28. Proba confert ad ani-	
Talparum oculi inclusi imperfec-		uerfæ 41.47. Differentiæ no-		mæ uirtutem	68.31
tibus 398.7. Propter imbecilli-		uem 43.42. Frigidorum diffe-		Sicca cur	
tatis naturæ non erupit	119.22	rentiæ tres	476.1	per pefima	476.4.
Talus quid & ubi	138.37.111.28	Temperamentorum indicia	825.4	Singularium	
Tamaricis facultas	1097.10	Temperamentum calidum & hu-		partium, ex quorum functioni-	
Tangendi uis in manu à quo ten-		midum, quæ cura maxime de-		bis pensanda	32.62.
dine fiat	203.27	ceat	475.59.	Temperata quæ	43.48
Tangenti arteriam, ad digno-		Calidum & siccum,		Tempora auxiliorum morborum	
scum pulsuum quæ simul sint		si per decremendi tempus in fri-		non eadem	182.18
perpendenda	338.28	gidum & siccum delabit, quæ		Tempora generationis fortium	
Tarditas & uelocitas ab omni		sequantur	824.65	quatuor quæ	109.58. & 60.
motu inseparabilia	302.22	Temperamentum ceterarum uictus		110.2. & 6	
Tarsi offectria	211.59	ratione mutatur, custodiuntur		Temporaliū musculorum usus	169.
Tarsus	140.2. 269.14	autem simili	475.34.	Tempora morbi non dierum (50	
Tarsus æquiparatur carpo	211.21.	Fit per		numero definiuntur	622.14
Proportione respondet carpo		qualitates	90.6	Tempora morbi totius sunt qua-	
212.19		Temperamentum frigidum & hu-		tuor	Ibid.8
TEMPTAS corticis uis	1102.1	midum quæ deceat uictus ra-		Tempora morborum	182.2.
Telix aranei uis	1118.41	tio 476.30. Frigidum in u-		Ab animalium ætate quomodo diffe-	
Teliphi facultas	1110.7	trog excessu se moderate ha-		rant	716.37
Tellinarum salutarum uisum fa-		bens, quæ cura deceat	Ibi.33.	Tempora morborum ac remedia-	
cultas	1141.39	Hominis quomodo conside-		rum re ipsa distinguunt	18.33
Temperamenta asciscina, pulvis ut		randum	52.30.	Tempora morborum, differentiæ	
naturalia mutant	571.29	Humidum licet		remediorum non indicant	20.12
Temperamenta complent parti-		in principio deterius, tempo-		Tempora, quod à facultate requiri-	
cularum substantiam	196.57	ris tamè progressu fit alijs me-		tur, interuertitur interdum	18.53
Temperamenta corporis, animæ		lius 475.57. Modicum con-		Tempora tria circa nutrimenti co-	
morem uariant, illamque explo-		ficitur ex duobus immodiciis		cocionem distributionemque	
dunt	70.3	atque contrariis	850.14.	87.56	
Temperamenta isominum & ci-		Plantarum cognoscitur olfactu et		Temporibus singulis qui cibi co-	
borum consideranda	370.2	gustu	390.14.	ueniant	735.33
Temperamenta inculcata, simi-		Redditur sic-		Tempori parcendum	809.39
lia postulant	895.54	cus dum immodicus calor		Temporum differentiæ apud me-	
Temperamenta non indefinite ex-		humorem absorbunt	473.62.	dicos duplex	18.2
nata in excrementorum ui di-		Siccum & frigidum qua ratio-		Temporum musculi	94.14. 170.7.
canda	55.11	ne fit calfaciendum simul & hu-		Temporum ortus	617.43
Temperamenta seruantur similibus,		medandum	476.7	Tempus alimendi nec quantitate	
alterantur ceterisque	474.60	Temperans quis	329.47	nec qualitate interdum	19.48
Temperamenta uitiosa quando		Temperantiæ naturales quo dif-		Tempus à primo conceptu quar-	
similia, & quando cetera re-		ferant à morbofis	825.50	tum	124.32
quirant	895.55	Temperata natura aliarum om-		Tempus morborum comparata	
Temperamenti calidi & humidis		nium canon	49.47	in animalium	716.28
indicia	824.31. Calidi & siccis	Temperatum nullum, calidum &		Tendines hanc sine periculo co-	
indicia	Ibid.25. 890.1. Calidioris	& humidum	41.7	sumunt	1164.53
indicia	824.5. Calidius tri-	Temperatura ad iustitiam	42.54	Tendines mouentes digitos	152.60
plex differentia	473.28. Fri-	Temperatura calida quæ	43.52	Tendinum atque uiciorum affe-	
		Temperaturæ corporum tripli-		ctus quæque periculosi sunt, ean-	
		citer assumuntur	43.50	demque medendi rationes desi-	
		Frigidæ & siccæ indicia	824.60.	derant	
		60. Partium, curationes affe-			

- derant 116.4.43
Tendinum capira 152.23
Tendium uisens munimentū 153.6
Tendo 11.16. In calcaneū infertus ex tribus alijs tendoni-
bus cōstat 114.39. Nervū fa-
perat quibuscūq; in locis crassi-
tudine sexcupla & decupla
93.21
Tēdo nō omīs sensus exps 93.13
Tendones cur uestiti membra-
tis, atq; rotundi 199.47
Tendones digitorū unde oriantur
201.36. Extendant & fle-
ctunt carpum 207.2. Indu-
rati qua ratione curent 94.5.
18. Mouentes digitos proce-
dunt ā cubiti musculis 199.
28. Nervosa corpora sunt
731.44
Tendonū generatio & usus 91.
33. 199.32. 204.41. 281.30.
874.25. In articulo digito-
rum infertiois ratio 200.39.
Lateralium consideratio 201.
57. Mouentium digitos pe-
dum, duo tantum genera pro-
ducunt ā musculis tibie 213.
uers.34
Tendonum uatura media est in-
ter ligamentum & neruum
91.8
Tendouum, qui inferuntur pedi-
bus, implicationes 215.58
Tendo omnis in os inferitur 91.
33. Primū motus instrumen-
tum 281.31. Tanō durior
neruo, quātō mollior liga-
mento 91.8
Tenebrę perterrefaciunt 681.31
Tenebris uerum augecere
16.14
Tenera & inerescentia omnia, fa-
culantibus sunt moderata
414.29
Tensio comitatur repleta 9.12
Tensio duplex omnib; inest mu-
sculis 201.65
Tensio & contractio unde fiat
384.27
Tensio neruorū quibus de cau-
sis contingat 716.5
Tensioris causę 677.14. 699.
8. & 31. 1056.61
Tensio quid indicet 699.46
Tensio quid uocetur Ibid.5
Tenuandi facultas aceto atque
melle intenditur: remittit au-
tem oleo 414.51
Tenuē facilius alteratur crasso
781.16
Tenuē omne, crassum a cūitate
superat 671.60
Tenuē, siue ileoti, intestinum ter-
tium 280.47
Tenuia faciliē digerit 462.19
Tenuia nō omīa sunt ignis 1017.
52. Promptē incalciscunt argi-
refrigerant 1016.32. Quidō
miscenda astringentib; 925.62
Tenuium ac crassarum partium
quę dicant 1012.59. 1040.43
Tenuium partium omne prom-
ptē alteratur 63.54
Tepida si admoueatur, dissoluūt
uentriculī firmitudinē 895.37
Terebellę usum in fracturis capi-
tis Galenus damnat 878.63
Terebinthi facultas 1109.38
Terebinthina resina 1152.29
Terebinthina soluit aluū abster-
gitiū uiscera 470.25
Terebinthine facultas 1176.42.
1256.35
Terebithing prerogatiua 1156.
Termitus forū primū tem-
(8
poris quis 123.14
Terminus tertianę exquisitē lou-
gissimus, septem absolutū cir-
cuiribus 630.50
Terra accensa sit pruta 1040.
30. 55.64
Terra Ampelites 1117.8
Terra Cadmix & Creticę facul-
tas 1117.8
Terra Chire uis 1116.28
Terra Cimolix uis Ibid.38
Terra differentia 1114.63
Terra Ereticis facultas 1117.12
Terra infusa est uis superiorum
corporum 318.52
Terra intestini uis 1275.4
Terra elementaris cuiusmodi ef-
fe debeat 35.34
Terra passim uocatę differentię
complexus 1115.20
Terra Pignitis facultas 1117.21
Terra Scitunis uis 1116.28
Terra purgandę ratio 1115.30
Terra igni admodū notū soluitur
1116.55
Terram abluendi ratio 1115.59
Terra quæuis siccandi uim pos-
sident Ibid.54
Terra Samia 1116.2
Terrestrium quę sunt tenuiū par-
tium 1162.18
Tertiana ab ardētē cōtinua quo
modo differat 714.51
Tertianę causa 791.7
Tertianę exquisitę accessio, duo
decim ad summū horas com-
plectitur 960.44. Curatio
961.1
Tertianę notię curatio 961.61
Tertiana ex intermitentib; bre-
uissima mitissimaq; 960.22
Tertiana exquisita quę 792.7.
Quando iudicetur 960.36
Tertianę duas copulatas inua-
dere singulis diebus 630.45
Tertianis exquisitis quę uictus
ratio conueniat 961.43
Tertianis notis consert uomi-
tus post cibum prouocatus
962.26. Victus ratio conue-
niens Ibid.14
Testis uis 1124.46
Testacea durę carnis quib; con-
sistat 402.15
Testaceorū succi crassi 406.48
Testaceorum succus alium sub-
ducit 402.1
Testaceorum succus omnis aluū
deicit 406.50
Testarum citieris uires 1139.13
Testes alterant totū corpus 113.
15. Arieriū mali sunt succi
394.34. Beneuolendi princi-
piū sunt 113.24. Cur celeriter
morti corpori seminis quali-
tatem cōmunicent lib.50. Fer-
minarū carent seroto 104.60
Gallinacii tenui uictui nō cō-
perant 417.22. Gallinaceone
præstant corpori laudabile a-
limentū 394.29. 398.39. 407.
6. Inflammari cur statim fe-
bres accendant 604.37. Ma-
rium humidiores sunt ac mol-
liores femineis 304.6. Quo
nomine præsent cordi 113.9
Semen conficiūt lib.41. Sunt
ex genere glandularū 394.34
Trahunt serosum humorem
114.3. Viriles muliebrib; cur
semen exactius concoquant
301.17
Testiculi canis facultas 1099.44
Testiculi feminarū quales 145.
63. 198.52
Testiculi masculini calidiores fer-
mineis 198.58
Testiculorū arterię 315.21. Cali-
dorū & siccorū indicia 813.22
Flexus eorum uariiformes
259.10. Fæmineorū posino
104.52. 301.5. 302.62. Pelli-
cula 104.60. Eorum tempe-
raturas quę significēt 823.4
Testiculus dexter masculon, sinis-
ter potius feminas gignit
118.41
Testiculus sinister in uirio, & ma-
trix sinistra in feminis, reci-
pit impurissimū sanguinem
299.55
Testum ablatio in feminis peri-
culosior, & quare 112.60
Calidorū & humidiorū indi-
cia 823.22. Eorū corpus nu-
tritur ab humore seroso, quē
continent 113.40. Fæmineo-
rum ac uiriliū diferimē 104.
34. Fæmineorū uis lib.63.
Frigidorum & humidiorū in-
dicia 823.40. Frigidorum &
VV 5

ficcorū indicia 813.48. Eo-
rum situs diuersi 113.10
Tetanus quid 716.18. Quando
fiat 96.12
Tetrapharmacium 869.1. Ex
quibus conficit 1136.16
Tenuis 1109.49
Thalictri facultas 1081.37
Thiapiā bimula expirat prorsus
1165.51
Thapſie facultas 654.21. 1081.
41. 1189.55. Sanguinem at-
trahit ad partes quibus fuerit
applicata 951.61
THESEAR 200.39
Theorema quid dicatur 10.61
Theorema omne ad propofitionē rei
speciem referendum 10.12.
Aeternū, firmū, perpetuū, ue-
rum, utile, cōfensuens eſſe de-
bet 9.47. 11.1
Theoremata artis punctiorē 31.
58. In quibus cōſiſtant 10.60
Theriaca ad mortuū uulnē, auxi-
lia moriū canis rabidi 1277.
Theriaca Andromachi ex- (61
teris præfertur 1276.1
Theriaca cu ignis purgatorium
1278.11
Theriaca Euclidis 1286.35
Theriaca conſtituentiū plar-
macorum qualitates totę per
totas miſcentur, conſpirant
in naturalem quidam cōmū-
nēz omnīū temperiē 1275.56
Theriaca duodecim annis ad
perfectionē cōcoqui, eſſeque ua-
lidam uſq; ad triginta annos,
iuares ſexagenariū 1276.51
Theriaca reponendū ratio 1b.39
Theriaca perfectā pharmacorū
purgantium operationē ſup-
primunt 1270.14
Theriaca Aſclē 1286.25
Theriaca corporis & animi aſſe-
ctibus auxiliatur 1277.22
Theriaca elephantis cōſert, co-
meſta illiſq; 984.11
Theriaca in quartana principio
exhibita, quid moria 963.13
Theriaca, Mithridatium ab uſu
expulit 1280.19
Theriaca poſſe crudos ſuccos
mouere, concoquere autē aut
diſcutere per halitū minimē
646.13
Theriaca puerorū corpora diſ-
ſoluit 1278.46
Theriaca quibus affectibus conue-
niat 912.38. 1273.36. 1276.60
Theriaces antidoti ſecundū An-
dromachū cōpoſitio 1272.63.
1276.28. Eius opportuno uſu
Eudemū liberauit 647.20.
Vt ſit probanda 1276.55. Pro

pinandę quantitas 1278.36.
Quadrimeſtris facultas 870.
28. Eius uſus quibus partib.
& temporibus congruat, &
quibus minimē 1278.41
Theriaca urendum poſt abſolu-
tam coctionem 1b.14
Theriacorum artificioſorū præpa-
ratio 1272.53
Theſſali temeritas & impudētia
840.41. 841.2
Thiaſpi quū uim habeat 1081.64
Thorace inflammato, quę ſit cu-
randi ratio 975.25
Thoracis capacitati in duas diui-
ſa laxitates 176.5. Dolentiſ
qualis reſpiratio 760.26. In
ſtructura eius quos ſibi natu-
ra propoſuerit ſcopos 292.14
Eius intemperies, tumorēſq;
qualem pulſus alteratiōē in-
ducant 601.36 Eius laritudo
caliditatis indicium 820.53.
Morborū eius cognitio 827.
32. Morus ab anima 243.60.
Muſculi 122.9. A quib; uenis
alanſ 146.1. Oſuſ eius conſi-
deratio 135.61. Partes eius
inflammate expurgantur per
aſperam arteriā 715.33. Situs
219.13. 820.59. Uſus 458.50.
Vt optius uentre cōſolide, pe-
rit & uox & reſpiratio 232.42
Thorax cur ex oſibus ſimul &
muſculis cōſtat 249.35. Cur
in duos uētres diſtinctus 232.
34. Duodecim conſtat uerte-
bris 202.32
Thorax neceſſarius uoci atq; reſ-
pirationi 1b.11. Principa-
liſſimū reſpirationis organū
109.56. 291.44. 760.23
Thorax quid 186.42. 231.40
Eſt ueluti murus cordi & pul-
moni 122.23
Thracē lapidis uires 1119.25
Thunni falſi, ſunt meliores re-
centibus 401.30
Thuris cortex aſtringit & ſiccāt
936.4
Thuris cortex & manna 1220.22
Thuris facultates 851.20. 1093.
20. 1156.14. 1176.32. 1183.39
Thus carnem gignit 1152.46.
Dolorem lenit, concoquit
1219.41. Puri mouēdo qua-
tenus idoneum 935.63
Thyites quas habeat uires 1118.
uerſ.36
Thymus 143.21. 233.1. 709.51
Eius facultas 1083.19
THYRA 212.60
Tibię anterioris muſculi ſunt ſex
aut ſeptem 214.47
Tibię conſideratio 178.23. Mu-
ſculi exteriores tres 159.46.

Nerui 166.59. Poſterioris
partis ſex muſculi 214.45.
Eius ſtructura 211.11
Tibia tredecim tendonū inſunt
capita 214.5
Tibia minor ſæmōre, & quare
216.7
Tympanum aluum ſiſtit, & crudos
humores gignit 172.1
Timor affectus iracundię con-
trarius eſt 560.9
Timor diuturnus, corpus reſri-
gerat 582.15. 681.51. Inuete-
ratus ad triſtitia nō diſſert 573.
20. Subitus quando perimat
682.7. Vehemens quia ratio-
ne pulſus inæquales efficiat
560.15
Tineſi deſcriptio 769.48.
Eius ortus 690.28
Tithymali uis 1110.17
Tithymalorum genera ſeptem
1110.36. Quibus affectibus
medetur 1b.15
Tityi ſibula 142.43. 327.58.
718.24
TROFOSUM generatio unde,
& quare incurabiles 1269.3
Tonſillę 709.52
Tonſillarū inflammatarū curatio
ſecundū Archigenē 1217.51
Tonſillis inflammatis, uenę ſub
lingua, uel iuxta angulos co-
lorū quādo incidendę 1b.64
Tophos articulariū quid diſci-
nat 1229.2
Torcular 829.65
Tormina fieri, eduliorū contra-
rijs facultatibus inter ſe pu-
gnantibus 168.58
Torpedinis marinę uis 1141.65
486.44. Piſcatoris manum
reddit torpidam per medium
tridentem 771.53
Torpedo, paſſinaca, raiā 402.44
Torpor quibus de cauſa oriri
ſoleat 671.9. 718.35
Tragacantha quam facultatē ha-
beat 1110.44
Tragii uis 1b.48
Tragion quibus affectibus me-
detur 1b.51
Tragorigani uis 1099.35
Tragus 405.50. Quomodo præ-
paretur 374.10
Trahem omne, expeditus ex di-
recte oppoſitis trahit 227.24
Trahentia omnia, calida ſint ne-
ceſſe eſt 1060.12
Trahere totum ex toto 86.54
Trahit quod eſt ualenſius, eua-
cuaturq; imbecillius 1b.62
Triſſigutinū quā figura faciliſ
ſiat 763.19
Transiſus ad ſimilia 634
Translationi materiā quid re-
quiratur

requiratur 237.46
 Transmutatio semper fit in alterum 14.17
 Transpiratio fit per arterias, earumque motu 757.30.774.57
 Transpirationes uode prohibeantur 916.2
 Tractionum duo genera 88.53
 Tremens mulierem ob purgamenta post partum retenta, scilicet in malleolo uena curauit Hippocrates 712.33
 Tremore cur senes iuuenesque interperantes corripiantur 677.54
 Tremor quid, & quomodo fiat 677.34. & 41. 710.20. & 46. 711.37. 712.54
 Tremoris causae diuersae 712.22
 Tribolius 2110.61
 Trichomanes cuius sit facultas 1111.9
 Trisoli facultas 1094.27
 Trisoli odorati uis 1095.53
 Trisolum affligit partes sanas 1212.6
 Tryptylis uis 1105.25. 1111.5
 Tripoli facultas 1111.2
 Trisibus intro conuertitur calor motus 573.10
 Tristitia quae signa arguant 617.2
 Tristitia quid 331.23. Quae motionem fornat 682.4. Refrigerat 573.16
 Tristitiae differentiae 370.60.415.19
 Tristici elixir in omnia 572.54. 415.25
 Tristici facultas 1103.49. Eius succus 415.23
 Tristitia mansum furunculosisque leuissime concoquit 84.22. 1130.52
 Trineu uim habet trahendi humorem sibi uicinum 76.55
 Trochanteres 138.18
TUBER 407.2
 Tuber quam habet facultatem 191.18
 Tuberculum 709.14
 Tuber terit quam uim habet 1111.43
 Tumor corporis non semper signum plethorae 700.13
 Tumores compositi 1203.41. Iunctum cum maxiali interperie 65.46. Propter naturam coarctantes septum transuersum, paruum, uelocem, & densum faciunt spiritum 409.57. 949.61 Pro humoru affluentium differentijs variantur 662.43
 Tumor scifolus a uariis quomodo differat, & qualia medicamenta possit 1225.13
 Tumores gutturis quae conse-

rant 1076.42
 Tumoris color, causam ipsius declarat 947.39. Flarulentum curatio 977.54. Inscirrhum abeuntis curatio 979.16. Suppurati curatio Ibi.51
 Tumorem causae, humoru est affluxus 636.43
 Tumoru praeter naturae uarietas unde nascitur 934.17
 Tunica amphibileptoides 346.6
 Tunica eadem uestiuntur (43 la, pharynx, larynx, & interna asperx arteria 1240.44
 Tunicae instrumentorum hepar purgantium externae & internae quales 129.18. Molles quando sint agiliores ad motum, & quid tardiores 509.59
 Tunigarum uisum in pulmone comutatio quare 235.18
 Tunica uentriculi, gulae, & omnium quae in ore sunt, cur sit una continua 219.51. Quae fibrae illae adfint 219.48
 Turba hominum calfacit aeternam 905.43
 Turtur & torpedio 417.3
 Turturis marinae aculeus 744.4
 Tusi in ueterat auxilium 664.1056.10
 Tusi laginis uel ungulae caballinae uis 1074.43
 Tusi excitantia non necessaria sunt mordacia & acris, sed eodem 1025.7
 Tusi omnigenae medicamentum optimum 1244.23
 Tusi quid auxilietur 1074.43. 1108.20
 Tusi rescienda, quae cuncti spiritum interceptiunt 679.14
 Tusi capiti nihil coducit 679.22. Eius causa, & usus 682.52. 1025.22. Eius in pleuritiderano 27.8. Magna, pauca expuit duabus de causis 758.2. Naturale est symptoma 761.26. Ob refrigerata respirationis organa, spiritus colubatione prohibetur 679.40. Quid sit Ibi.9. Quando excutitur 243.45. 351.64 Quoi uim animali indita 761.25. Quos humores e periclore facile educat 679.13.
TYMPANITES 551.43. 579.11. Vniuersum corpus replet spiritu 579.10
 Typha 174.10
 Typi compositi qui 810.28. Duplicatione admittentes q. sint 812.30. Histerici qui 810.16. Mobiles Ibi.23. Permanentes 810.22. Primi & secundi Ibi.16. Proleptici Ibi.14.

Quartani accurata descriptio 811.47. Quartani omnibus ceteris diuturniores Ibi.54. Simples qui 810.27
 Typorum hemeritacorum proprium 811.14
 Typorum differentiae 810.14
 Typum quartanum quae consequuntur 811.47. Quotidianum quae comititur 810.47. Tertium quae sequuntur Ibi.8
 Typus accessionum quid Ibi.4
 Typus febrilis unde metiendus 809.57
 Typus hemeritacus ferus, periculosis undecumque portendens 811.25
 Typus quartanus duplex 812.57
 Typus quartanus qui 810.41
 Typus quidam duplex 811.23
 Typus quotidianus quartano iunctus Ibi.44
 Typus quotidianus qui 810.19
 Typus quotidianus tertiano & quartano iunctus 812.41.47
 Typus quotidianus uentriculo male affecto constituit 810.57
 Typus tertianus duplex 812.34.58
 Typus tertianus quartano iunctus Ibi.55
 Typus tertianus qui 810.42
 Tyrrae Damocritae uires & compositio 1181.48

V

VACVANDI modus unde pendendus 917.49
 Vacuandi protinus sunt, qui ab his, quae temperant naturam habet, exasperantur 1023.65
 Vacuandi qui sint liberalius, & qui parcius 995.5
 Vacuandi qui sint vere ineunte, & quomodo 1005.12
 Vacuandum corpus cur ante fit, quod obstructionibus liberandum 891.25
 Vacuandum in accessionibus, per superiora: in remissionibus, per inferiora 1005.14
 Vacuandum semper per communiantes uenas 712.42
 Vacuantes quae sint 917.49. 917.7
 Vacuare discit ut capitis humores quae commodum possint 968.19
 Vacuare quando corpus conueniat 915.12
 Vacuari in quem modum singulae partes debent 975.7
 Vacuatio fiat per trahentia 30.10
 Vacuationem piruitae qui morbi possunt 1003.19
 Vacuationes copiosas qui ferat facili, qui difficiliter 8.7
 Vacuationes fieri ob causas quae

Ulas postullit 428.17. Immo ducat quibus de causis succedant 652.12	103.18	paganur 164.3
Vacuatioe immoderate quidlo & quomodo accidant 1039.3	Vasorum omnium à corde pro sectorū orificiis quādam mem branz sunt infixæ 316.43	Venæ habentes arterias adiacen tes 148.53
Vacuatiois modus quomodo à fi gura partis affectū sumat 888. 42. Eius quāntitas ex quibus metienda sit 991.32	Vasorum referatio unde contin gat 688.16. 1039.37	Venæ in cubito tres 996.42
Vacuatiois modi diuersi 1053.	Vasorum secundæ progressus 105.	Venæ in cutim cruris dissemina te 167.18
Vacuatio optima quæ 28.61 (33)	Vas plenum aut uacuum (49 quomodo dicatur 535.20	Venæ infirmato hepate quæ se candæ 917.44
Vacuatio per frictionem solam, quibus & quomodo admini stranda 927.1. Per partē læ sam non est molienda, uniuer so corpore pleno 816.46.	Varij qui sint & dicantur 663.4	Venæ intestinorū utrūculij nu trinoni dicant 324.53
Quando fit in duos partien da dies 996.34	Vbera duo ut matricis duæ ma licibus infunt 297.33	Venæ malleolorū & poplitū dis sectæ, quibus affectus partib. auxilientur 997.8
Vacuum nihil in orbe dat 535.7	Velocitatis causarum eductus, utilitas urgens, facultatis ro bur, organorum promptitu do 491.12	Venæ medicis cōsideratio 164.42
Valere & agrotare quando fe ci cant homines 842.33	Vena à liene in uentriculum de riviāns 180.54	Venæ mēstruæ primū con sistunt sanguinem 324.49
Vapor extenuatus est humor 673.24. 1014.36	Vena arteriosa 143.11. 183.35	Venæ preparat alimentū eodem modo, quo lepat 217.52
Varices 709.35	Vena arteriosa à dextro cordis specu oritur 236.12	Venæ quæ secandæ 165.10
Varices curandi ratio 941.46	Vena arteriosa duab. cōstitans tu nicis, fertur ad pulmones ex dextro cordis utrūculo 183.2	Venæ quæ ratione exactius con spiciantur 164.55
Varices prius sanandæ, quibus ab eis fluxum recipiēs 358.15.	Vena arteriosa membranas ha bet quādam adiunctas 236.19	Venæ quibus laxe & quibus ex iguz infunt mulieribus 994.7
Quando sint excidendæ 1171. 20. Vnde oriuntur 701.63	Vena caua 176.27. 399.34. Eius ab hepate origo 109.52. 123.24	Venæ quibus nulla subest arte ria 145.23
Vari descriptio & curatio 663.5 1225.8	Vena caua lumborū, origo uena rum partiū inferiorū 145.40	Venæ secundæ ratio in diuersæ parium affectibus 938.6
Varium est quod præter naturā exiit 489.47	Vena caua suggerit alimentum uniuerso corpori 324.43.	Venæ secundæ ratio in fluxioni bus quæ decumbūt ad coxā, uterum, thoracem, pulmonē, caput & collum 128.46
Varorum calloforum remediū 1225.49	Trunco bisido est diuisa, ue loxi sequitur mors 222.36	Venæ sectæ quæ menses promo ueant 997.38
Varorū remediū Critonius lib.43	Vena cōstat una tantum tuni ca 181.18. 183.13	Venæ sectione indigent pericis, qui tamen extra plenitudinē sunt 989.22
Vasā cōspicua corroborandi ra tio 943.26	Venæ abq. arterijs quæ sint 148. 41. 317.60	Venæ sectione perperam admini strata, plures perierit 988.49
Vasā emulgēna 299.88	Venæ alentes matricem, mam misy eam colligantes, fetus gratia cōstruunt 300.34	Venæ sub lingua secandæ sunt gutturæ & aspera arteria infixā maris, post apertam in cubito uenam 997.50
Vasā excidendæ ratio 941.37	Venæ arteriosæ membranz tres etymologia 237.35	Venæ sunt communes uerberibus &atrici 1062.10
Vasā in renes inserta à magna ue na & arteria 181.22. In testes delata 181.49	Venæ arteriosæ tres adnascunt membranz, intrus foras ue rgentes 236.33	Venæ totius manus musculos pe netrantes, quæ 144.38
Vas apertum obstrui quorupli citer possit 863.63	Venæ à uentriculo cibum elabo ratū suggerunt hepati 217.45	Venæ tunica multifariarum fi brarum 86.1
Vasā quæ dolum admittant, & quæ minus 1182.3	Venæ causæ considerant 141.5.	Vena humeralis quando secan da 464.19
Vasā quæ intra matricem fetui alendo gignantur 305.35	Eius diuisio & processus 123. 28. 142.26. 218.15. 318.55. 319.35	Vena in loco infirmo non secan da 165.3
Vasā quib. modis distumpi pos sint 687.62. Quorupliciter malè affecta dicantur 688.3	Venæ causæ ducenti ad cor san guinem, tres infixæ sunt foris membranz intrō uergētes 237.	Vena in quibus non fit secanda 1204.28
Vasā seminaria infixā habēt uim generandi semen 111.56. Sem per plena semine sunt 114.37.	Venæ causæ indumentum (28 221.31. Infectio in cordis ue triculū dextrum 218.35. Pro gressus ad superiora 235.5	Vena interna in quibus tunden da 464.21
Vitalem spiritum cum serolo humore rapiunt Ibid.19	Venæ causæ securitas 232.42	Vena iuxta magnū oculi angu lum, & quæ in fronte est secta, quibus auxiliatur affectibus 997.55
Vasā spermatica dextra oriūtur à magna dorsi uena & arteria rarō autem ab emulgētib. dextris 199.41. Sinistra à fi nistris oriuntur emulgētib. 299.50	Venæ cibi prompuariū 235.51	Venam caul in fortibus In arte riam uenofam petundi, atq. hanc in magnā arteria 307.12
Vasū radix quid 564.62	Venæ cor nutritis unde 185.12	Vena media quæ a pericda 464.21
Vasorum generatio 217.3	Venæ cruris interiora innaden tes 167.28	Venam
Vasorū in testē implantationes	Venæ duæ in rotam manū pro	

Venam sepius in anno incidere
non expedit 1000.47
Vena nec admodum pueri neg
senibus secunda 8.3
Vena prætergressa umbilicū in fi
ma hepatis infertur 305.48
Vena porta duplex 111.20
Vena porta quæ 319.37
Vena reſerta in naribus confert
capitis doloribus 1206.22
Venarū alius perperantiū cubi
tum confideratio 144.32
Venarum arteriarumq; genera
tio 109.22
Venarum arteriarumq; in cōce
ptibus confideratio 148.29
Venarū cubi quæ in quibus af
fectibus ſint ſecundæ 996.36.
Venarū hepatis explaratio 766.
9. Interiora thoracis peruen
dientium cōſideratio 144.44
Venarum inter utericulum &
hepat duplex miniſteriu 96.48
Venarum meſeraicarū inæqua
lis diſtributio 120.4
Venarum nutritio unde 142.1
Venarum opus à quibus cauſis
uariari poſſit 445.52
Venarū radicatio ſecur 342.24
Venarū tumor quidō plenitudi
nē ſanguinis indicet 700.26
Venarum tunice ſanguinem gi
gnere nequeunt 140.64
Venarum uſus 199.25
Venarum uſus cerebro & cordi
gignendis neceſſarius 306.57
Venas amputatas regenerariſq;
uide Galenus 111.63
Venas habentes anguſtas, impa
tientes ſunt inediæ 49.9. La
ras habentes, facile cibo abſti
nent 49.11
Venas ſecantib; ſiſiongiſſimē re
cedendum ab arterijs 164.65
Vena teſticularis 112.18
Veneno extincti, quale fortian
tur corpus 775.63
Venere voluptatis appetitiuq;
cauſa in materia & inſtrumen
tis quoq; eſt 300.57
Venere ex uſu redditū imbecil
iores, ex exolui, aut refrige
rant, qua ratione corrigi de
beant 453.43
Veneri tempus aptum quod ſit
830.64
Veni ad utericulum & intesti
na per tinentibus ineſt uſus ſan
guifica 223.36
Veni arterioſa cur tunice durę
tribuz 243.33
Veni cōmunicari pulſu & re
ſpirationis uſus 238.40
Veni cubiti obſcuris, poſſumus
in ulna ab eis diductas ſecare
996.48

Veni ineſt facultas ſanguifica
74.13. 223.45
Veni in ſimis hepatis ſolis ſub
ditæ ſunt arteriæ 221.59
Veni latioribus prædicti, calido
res ſunt: anguſtioribus, frigi
diores 43.60
Venter animalibus eſt, quod ar
boribus terra 318.54
Venter craſſus haud parū ſubti
lem mentem 363.46
Venter cur circa elbos contrah
tur 87.42
Venter eſuriens per uenas meſe
raicas ſibi alimentū trahit 88.
12. Hepati alimentum præco
quit 225.26
Venter quibus in ore inueniaſ
85.26
Venter tantō magis ſequēri tem
pore aſtringitur, quantō ma
gis fuerit ſiccatus 470.37
Ventrem tutō ſoluentia 470.22
Ventriculi actionis ſymptoma
ta quæ 666.35
Ventriculi actio propria eſt con
coctio 226.47
Ventriculi affectib; medicamen
ta Archigenia 1252.47
Ventriculi affectus ſiccus, reddit
toſū corpus gracilius 885.42
Ventriculi aliteratio ex calido &
frigido curatu ſaciliſſima 880.
Ventriculi à frigidiori ali
mentorū uſu reſrigerari, me
dicamentum 651.25
Ventriculi calidi indicia 825.34
Ventriculi cerebri anteriores,
grandiores 193.51
Ventriculi cerebri tres Ibid.55
Ventriculi ulcerari poſſunt, tutius
purgat deiectione quā uo
mitu 869.50
Ventriculi facultates quatuor nu
tritioni inſeruentes 85.39
Ventriculi frigidam affectionē
ſignificat, proſus nihil ſicire
1250.31
Ventriculi frigidi indicia 825.
uerſ.41
Ventriculi fundus in dextra ani
malis parte, inibiſq; ab hepate
caleſcit 219.19
Ventriculi gallinacei auferiniſq;
præſtantiffimi 409.16
Ventriculi grauiffimē laboran
tis ob deſluxū humoris à capi
te deſcendentis curatio 887.28
Ventriculi humidi notæ 825.30
Ventriculi intemperantiæ corri
gendæ ſunt contrarij 885.60
Ventriculi intemperantiæ quibus
copulatus eſt humor, qua ra
tione curentur 886.3
Ventriculi intemperies frigida &
ſicca omnib; peſſima 885.64

Ventriculi interna tunica uetiſ
ta 85.1
Ventriculi morbi duplices 885.40
Ventriculi morbi unde cognō
ſcendi 827.26
Ventriculi manus 217.39
Ventriculi orificiū ſuperius cur
inferiore lauius 219.35
Ventriculi reſentrix & expulſrix
facultas 678.48
Ventriculi ſicci indicia 825.14
Ventriculi ſtatus peſſimus quia
480.41
Ventriculi temperati intempera
tily notæ 53.35
Ventriculi tertia tunica 220.58
Ventriculi tunica, cuius grana ſit
duplex 229.26
Ventriculi tunici humores craſ
ſi alius imbibiti, quæ medica
menta poſſunt 1250.25
Ventriculi uitiōſi per quos me
tus excrementa 753.37
Ventriculi uoluctrium ſunt ueti
393.27
Ventriculi uolulofie diſpoſitio
nes curandæ ſunt per odora
ta 1251.21
Ventriculo admodum ſiccō, &
modicē incaleſcenti præter na
turam, quæ uictus ratio con
ueniat 885.18
Ventriculo æſtuanti quid auxi
lietur 3102.25
Ventriculo affecto quæ pharma
ca ſint fugienda 1251.1
Ventriculo calido coſtūte cum
capite frigido, quomodo ſue
currendum 431.8
Ventriculo demittuntur inter
dum humores per eadem ue
nia, per quos hepati ſuggeri
tur alimentum 704.62
Ventriculo duæ ſunt tumec 83.
46. 180.18
Ventriculo frigido, in quē piri
ta deſcendit à capite, quomo
do ſuccurrendum 480.44
Ventriculo inſunt quatuor natu
rales facultates 218.37. Siccō
& frigidiori reddido, quæ un
ctiones conueniant 884.33
Ventriculo ſiccō, modicē reſri
frigerato, quæ medendi ratio
debeatur Ibid.26
Ventriculo ſoli ſenſum indige
at: contrulit naturā, & quare
218.46
Ventriculo ſtomacholy affectis,
ſolis ſalia exhibēda qualia ab
affectibus exiguntur 975.41
Ventriculū eſſe uelut promptua
rium cōmune omnium parti
cularum corpora 217.35
Ventriculum infirmum quæ ro
borent 891.14

- Ventriculū qui habent biliosum
facilius cibos cōcoquant cor-
rupti difficiliter 368.39
- Ventriculū roborantia 966.31
- Ventriculus sfluans, cibos in ua-
pores nidorosos corrumpit
685.13
- Ventriculus affectus, quales pul-
sus efficiat 602.18
- Ventriculus alienam qualitatē
resequit 81.35
- Ventriculus anserinus suauissi-
mus 398.28
- Ventriculus cerebelli cur ante-
rioribus minor 356.17
- Ventriculus cerebri posterior ma-
ximus, ab anterioribus per in-
signem meatū, animale mē-
strum recipit Ibid.7
- Ventriculus cerebri sinister & dex-
ter 193.9
- Ventriculus cerebri tertius Ibid.14
- Inter duos priores & quartū
posteriore, reperitur medius
Ibid.61
- Ventriculus cibos cōplectitur
totus 85.30
- Ventriculus cibis excipiendis cō-
ditus 177.56
- Ventriculus crassus ac carnosus
melius coquit graciliori 229.40
- Ventriculus cur oblongus 219.
30. Duas habet tunicas in-
ter se differentes, ratione di-
uerforum uisulorum 224.10
- Ventriculus id quod cōtinet to-
tum complectitur 81.1
- Ventriculus imbecillus, nisi cor-
roboretur cibo, recipit totius
corporis excrementa 480.2
- Ventriculus imbecillus nō recte
concoquit 81.9. In tempe-
re laborans calida, cum humidi-
tate mediocri, facile frigide po-
tione curatur 885.18. Nutri-
menti inopia impletur excre-
mentis biliosis, pituitosis &
serosis 87.16
- Ventriculus promptuariū cibo-
rum 674.16. Quare rotun-
dus 219.34
- Ventriculus quatenus inseruiat
visceribus atque uenis 673.35
- Ventriculus quibus inflammā-
tione concoquant 516.5
- Ventriculus quo pelat exundan-
tia excrementa 185.32
- Ventriculus sua ipsius causa nu-
trimentum fulcipit 464.47.
- Sui gratia tantum circa cibos
contractus 141.3
- Ventriculus trahit uillis rectis,
transuersis expellit cibum &
potum 219.47
- Ventriculus, uerus, & intestina,
quale præbeant nutrimentū
595.50
- Ventris differentię pro ciborum
differentiis à natura constru-
ctę 178.14
- Ventris mergi nullus usus 1157.
uers.33
- Ventris partes unde & quando
gignantur 123.38. Eius pro-
fluus quid auxiliē 1098.20
- Venus immoderata, spermatica
organa ualde debilitat, & cur
114.9
- Venus quę somnū excipiat, à flo-
rentibus exercenda 428.57
- Venus quatenus sit salubris 310.
60. Quibus innoxia 476.
16. Reddit corpus laxius, fri-
gidius, imbecillus & ficius
455.55. Siccie & frigidis tem-
peramentis inimicissima 475.
26. 476.12
- Veraces esse nō possunt, qui ma-
gnatū pdes frequentat 420.23
- Veratrum facultas & species 1079.
uers.15
- Veratrum alit coturnices, homi-
nes enecat 60.22.
- 1038.52. 1172.10
- Veratrum epotum, quem faciat
pulsū 579.31
- Veratrum nigrum succū melan-
cholicum educit 1189.35
- Verbasci species & facultas quę
1112.22 (16)
- Verbenacę rectę facultas 1206.
- Verecundia ut moueat 681.65
- Veris temperamenti in medio
omnis excessus cōsistit 40.46
- Veritas omnibus odium parit
420.62
- Ver mediū temperamenti 41.28.
375.17
- Ver medium, temperatissimum,
quo tēpore corpora optime
habent 569.24
- Vermes latos qd enecat 1097.3
- Vermes perimunt amaris medi-
camentis 955.4
- Vermicularē corpus trāsitui spi-
rituum præest 257.16
- Ver non dicendū calidum & hu-
midum 41.5
- Verrucę curatio 955.36. 1108.
- Ver saluberrimum 40.49 (42)
- Vertebra ad costas duodecim
114.40. Ad lumbos quinq;
Ibid. In collo septem Ibid.
- Vertebra spinalis medullę mu-
nimentum 350.43
- Vertebrae superiores decima, ac-
cliuę productiones habent
conuexas; decliuę autē, con-
cauas; inferiores autem deci-
ma, contrā 289.27
- Vertebrae tonus spinę uiginti-
quatuor 283.55
- Vertebrarum contextus diuisio
114.15. Earum foramina an-
gustiora sunt paulatim Ibid.14
- Vertebrarum humiditas 192.16
- Ligamentum Ibid.31
- Vertebrarum primarum cur lati-
tudo maxima 287.3
- Vertebrarum processus 114.60
- Verticis ossa cur rara simul & ca-
uerna 281.7
- Vertiginis causa 746.8
- Verrigo ad cerebrum pertinet
Ibid.2
- Verum unde existimetur 102.
- Vesica 178.6
- Vesica, bilis exceptrix Ibid.5
- Vesica claudi potest absque mu-
sculo 231.2
- Vesicę collo incumbētia lapi-
dis indicia 713.36
- Vesicę collo incumbētis lapidis
curatio 721.41
- Vesicę calculos quę cōminuant
1100.4
- Vesicę actio, appria quę 774.48
- Vesicę collo innatę carunculae,
argumenta Ibid.60
- Vesicę collum trifariam obstrui-
tur Ibid.14
- Vesicę doloris quid profit
1112.15
- Vesicę & uulue unica tunica
180.19
- Vesicę fellis situs 180.28
- Vesicę musculus 227.11
- Vesicę officium unicū est, con-
tractio 772.64
- Vesicę osculum quare ex causa cō-
niueat 690.50
- Vesicę situs 101.10
- Vesicę ulcera eadem quę & ute-
ri & pudendi medicamēta po-
stulant 1265.32
- Vesicę ulceri & urinx difficul-
tati remedium 1267.10
- Vesicę urinarię sex uasa 228.10
- Vesicę urinarię tunica qualis
229.16
- Vesicę usus 824.38
- Vesicę utriusque tunica 305.
uers.46
- Vesicę utriusque uasa unde exor-
tiantur 228.18
- Vesica fellis netruorum experta
86.51
- Vesica fellis trahit bilem 81.40
- Vesica fellis unicū habet imbe-
cillitatis principium 768.12
- Vesica non trahit à renibus
771.44
- Vesica pro clystere Galenus uti-
tur 867.50
- Vesicarum tunicae, rectos, circa
uiles, & obliquos possident
229.38
- Vesica fubdita renibus uelut ci-
sterna 227.9
- Vesica

INDEX.

Vefica urinaria quare plures & maiores neruosi fit fortita 319.14.
 Vefica urrag; cur ad fuam nutritionē alia uafa, præter poros, defideret 228.3
 Vefimenta à nobis calcfata nos recalcifiant 1037.45
 Vefetes temperantiores 65.33
 Veteris lethargig; caufæ 675.17
 Vetula quædam Athenienfis alēbatur cicuta 1036.58
 VIBRATIO quid 591.33
 Victoria nō fugiēdo, fed fortiter pugnando paratur 567.22
 Viçtui tenui quæ animalia magis conducant 416.43
 Viçtuus diu quæ uitæ ratio fit fequenda 415.62
 Viçtus & remediū ratio iuxta tēpora morbi inftituitur 722.1
 Viçtus humidus febrientib; omnib; cōuenit 896.4. 961.45
 Viçtus iecori uētriculoig; inflammaro cōueniens 938.41
 Viçtus inftitui non poterit, nifi præfial status morbi 627.64
 Viçtus pro partium ratione uariatur 918.37
 Viçtus reftorioratio quomodo adminiftretur 883.6
 Viçtus ratio humida quibus cōueniat 412.26
 Viçtus ratio iuxta ftatū inftituitur 640.37
 Viçtus ratio proba fine præcognitione uigoris & crifis morbi nunq; inftitui potef 612.6
 Viçtus ratio quicquid cōueniens 405.11
 Viçtus ratio falubris 5.61
 Viçtus ratio fingulis lafitudinū generib; cōueniens 411.25
 Viçtus falubris geminus fcopus 410.11
 Vigefimi index eſt decimūſep̄tismus 619.45
 Vigiliæ cognatæ ſunt ſenibus 187.37
 Vigiliæ digerunt 927.35
 Vigiliæ immodicæ 571.21
 Vigiliæ quibus ſunt aduerſiſſimæ 883.54
 Vigiliarū cauſa ſiccitas 602.56. 676.1. 701.16. 738.62
 Vigiliarum notæ 956.53
 Vigiliæ qui morbi inferant 718.46
 Vigiliæ maceratorum ſigna quæ 617.9
 Vigor accēſſionis quid 599.50
 Vigor in ſingulis rebus ſumma eſt magnitudo 717.1
 Vigoris laetudo in morbiſqu; eſſe ſolet 615.15
 Vina alba & tenuia minimū om

nium nutriunt 403.41. Vrinam mouent 411.17. 418.57
 Vina amara immodicè ſiccant 885.1
 Vina antidotis emplaſtriſq; cōmoda, qualia eſſe debeant 1281.24.
 Vina auſtera fluxiones ſiſtunt 431.47. Ventrículo roborant, caputq; minimè teuant, ſyncopē tamen prehenſis nō conferunt 929.2
 Vina calida à quibus cōcoquantur celerius 1042.39. Craſſa & dulcia, cot magis proſint thoracis morbis 419.8
 Vina cruditati aduerſantia 461. uerſ. 14
 Vina dulcia quam habeant uim 403.44
 Vina extenuando corpori apta quæ ſint 951.25
 Vina igni admoda, dulciora ſiūt 1044.40
 Vina igni maturata, capitis dolorem conciliant 1281.19
 Vina impenſe calida nō ſunt offerenda liabentibus caput imbecillum 928.61
 Vina odorata & cæteris ualidiora, caput teuant 411.43. 419.1
 Vina oligophora quæ 412.37
 Vina quæ celerrimè omnī innetentur 1280.56. Quæ cōmendantur 418.62. Quæ leuiter acēſcūt, cruditatib; ſunt comoda 461.12
 Vina quæ quibus ſint accommoda 411.35
 Vina quæ ſint uiranda Ibid. 64
 Vina reponendi ratio 1281.6
 Vina rubra & craſſa ſanguini gignēdo accommodatiſſima 403.33. Rutila replent pronius caput 412.18
 Vina uetula impēſus calcifiūt, recentia nullatenus 412.11. 1044.22
 Vinciendi ratio in phlegmonis 938.33
 Vinci eſt alterari 84.13
 Vini appoſitio ad corpora, ut ceſſet, ita minimè diuturna eſt ſit 572.43
 Vini facultas 69.62. 1098.43. 1256.22
 Vini modicæ ſumpti nis 661.19
 Vini opera 416.18. Viſus quib; proſit aut obſit 882.46
 Vini circa duodecimū annum pueris Plato interdicit 71.51. & 61
 Vini modicè potō, quales pulſus gignantur 554.62
 Vinorum craſſorū, nigrorūq;

& dulcium facultas 418.55
 Vinorum differentia 403.32. 411.20. 461.30. 928.40
 Vinorum ponticorū uis 419.16
 Vinorū quæ nā acēſcant 1045.10
 Vinorū recentium noxæ 412.4
 Vinorum tenuium ac aquoſiorū leniter ſaſtringentium comoda 412.19
 Vinorum uariorū uſus 882.47.
 Veteraſcentium qualitas quæ 1281.2
 Vinum acerbiter ſenectæ lenit 71.56
 Vinum acuta febrilibus porrigit Hippocrates 891.54
 Vinum ad quid utile 435.17
 Vinū albū & purū promptius corpus digerit nigro 89.41
 Vinum album modicè ſaſtringē uires addit uentriculo, & minimè teuat caput 764.18
 Vinum album quod calidum ſit reperitur nullum 928.52
 Vinum album nō reperiri dulce 418.51
 Vinum animę facultatibus tanq; tyrannus imperat 72.3
 Vinū antiquius uentriculo reſergero conſurgit 884.60.
 Aquoſum promouet omnes euacuationes 917.57. Calidiſſimū, frigidiffimis intēperantiſ eſt utile 472.37. Calidum imbecillo propinadum uentriculo 966.40
 Vinū celerrimè ipſos pulſus immutat 573.13
 Vinum citiſſimè aſimilal 56.40
 Vinum cinis aqua excipit à uenis 89.40
 Vinum creſcentibus aduerſatur 71.61
 Vinum cur ne adultis, niſi modicè propinadū 415.11. Cur pulſum q; cibis maiorē & celeriotem reddat 572.44. Cui tabi conferat 808.59
 Vinum dulce quibus fit propinandum 411.34. Flauū, calidiſſimū, albū uerō minimè calidum 468.32
 Vinum frigida temperarū uires exoluit ob immodicæ euacuationes, inſtaurat 967.42
 Frigidis & ſiccis naturis triſtiſſimum 472.21. Fugientiū eſt in phlegmones ſuſpicio 861.56. Immodicè hauſtum frigidos parit affectus 57.30
 Vinum mediocre, mediocri naturæ dandum 472.26
 Vinum meracius inducit uigiliæ, & quare 756.63
 Vinum modicè ſumptum aſert ſomnum 718.53

EPITOMES GALENI

Vinū mærorem discit 69.60	initio morbi unde resoluant 905.62	Vitæ facultas 1082.22
Vinum mutatur celeriter 57.19	Vires imbecilliores reddunt ob excreticis motus immoderatos, quomodo reficiendæ sint 950.49	Vitæ sit per rectas lineas 271.24
Vinum nona parte, olei pondus excedit 1291.14	Vires in diarijs febribus quare negligantur 900.43	Visionis modus 270.64
Vinum omne crassum & dulce, est tigrum 411.25	Vires indicant nutriendi formam 921.8	Vitæ oculorum est actio 842.17
Vinum omni ulceri optimū medicamentum 852.52	Vires quando præbeant indicationes utiles, & quando minime 901.51	Vitæ quomodo fiat 245.17
Vinū quæ senibus cōmoda præstet 468.15	Vires resoluuntur quog ob excreticem vim immodicè concitatam 930.44	Vitæ quæ acuat 1141.12
Vinū qualiter pulsum immuet 514.17	Vires robustas quis pulsus indicet 995.16	Vitæ quæ obundant 672.44
Vinū quidō exhiberi possit per continentes febres 918.14	Vires sunt feruandæ 926.17	Vitæ hallucinationes 271.32
Vinum quibus ephemeris conueulat 957.44	Vir femina calidior & siccior 566.62	Vitæ hebetudinem a crassitie ortam, quæ iuuent 1113.46
Vinū quibus nō dandū 965.46	Virgæ virilæ & collo matriæ cur plures nervi inferant 303.	Vitæ instrumentū lucidum, & cur 128.59- 347.43
Vinum refrigeratis omnibus utile, qualens esse debeat 1037.	Viri in uniuersum mulieribus habent pulsum longē maiore & uehementiore 566.60	Vitæ quib. modis exoluit 748.5
Vinum semper adauget sitim 1018.45	Viri optimi cur se subducant in solitudinem 645.41	Vitæ sensibile, est color 346.56
Vinum senibus aptissimū 468.23. Ex cur 72.61	Viris duplex adest euacuano fuliginosorum excrementorū 277.44	Vitæ sensorium quale 253.49
Vinū tenue mouet urinā 411.43	Viris naturalē robur laboribus crescit 567.16	Vitæ, actio animæ 484.44
Vinum tenuissā correptis quando propinandum 961.8	Viriū consideratio, ad morborū curationē quid faciat 900.31	Vitæ brevis, ars longa 534.41
Vinum uetus generosumq; & calidum, auxiliari uenis refrigerantibus 1037.16	Virium essentia in quibus consistat 929.16	Vitæ terminus, cordis uacuitas est ab actioibus 805.40
Violæ foliorum uires 1082.27	Virium lapsum quibus succedat Ibid.42	Vitæ una species, non omnibus potest accommodari 471.33
Viperæ alijs feris minus obnoxie facultatis tabificæ, ideo ad antidotum ab Andromacho electæ 1273.34	Virium robori custodiendo que requirantur 910.5	Vitæ humana tota desiderat ad exactam pulsuum dignotionem 538.53
Viperæ caput, non caudam, abijcere oportet ad conficiendos artificios theriacos 1134.40	Virium robur in quibus affectibus unica salus sit 907.19	Vitæ manente nec pulsus nec respiratio perit 492.58
Viperæ ceruicibus & caudis uenenum gerunt 1272.48	Virtus, est unus ex curatiōis scopis 914.58	Vitanda in capitis dolorib. quæ sint 1198.56
Viperæ cōbustæ ab igne salutes redduntur 1279.5	Virtus quot modis seruet 902.2	Vitæ, sunt uires, aut ipsarū actiones 902.8
Viperæ cōcinnatio 984.5	Virtus semper sui custodiam indicat 991.65	Vitellina bilis nimis percocta, uertitur in speciem atræ exultæ 81.18
Viperæ cur appellentur dipśades 1134.26	Virtutis inuictæ opus 215.5	Vitelli ouorum facilius quam alba concoquuntur 961.53
Viperæ fœminæ masculij discrimina 1276.20	Virtutis uia laboriosa 424.3	Vitex obstructis confert, mentesq; promouet 1066.31
Viperæ pellicula mirè pilos regit 1274.62	Virus a bestia relictu qua ratione uacuandum 937.5	Vitex ueneres intemperantias compefcit Ibid.21
Viperæ quales deligendæ 1276.12	Viscera quæ concutiant 446.3	Vitæ omnia trifariā grauiā redduntur 860.32
Viperæ quando uenande Ibid.	Viscera unde nervos recipiant 184.40	Vitæ facultas 1066.11
Viperæ solæ morbis, ab ipsismet factis, opitulantur 1275.17	Visceribus uniuersis nervi iudicant 111.17	Vitæ semē capitis grauitatem parit 1066.17
Vipera ore excipit genituram a mare, eiusq; caput abscindit post semen exceptū 1274.23	Viscerum inflammationib. iam concoctis quod pharmacum conueniat 1252.23	Vitilignes quid detergat 2078.2. 2110.10
Viperarum eius sitim maximam infert 1134.24	Viscerū intemperantijs quæ remedia maximè cōueniunt 1256.19	Vitiorum igniculi in nobis delitescunt 72.56
Viperarum moribus pharmacum 2287.23	Viscerū obstructiōes quid expurget 1113.11	Vitiorum incrementum restringendum Ibid.58
Viperæ uenandi ratio 1281.33	Vitæ agrestis facultas 2069.48	Vitæ alba & nigra uis Ibid.56
Viperæ prolem iniuriæ patre uindictæ, matris uenerem perficere, atque sic nasci 2274.28	Vitæ nigra uis Ibid.66	Vitæ sanæ uis Ibid.52
Vires a quibus ledantur 925.52	Vitæ humor 265.1. & 13	Vitæ uirtus 1116.uerf.63
Vires die primo aut secundo ab	Vitæ uirtus 1116.uerf.63	Vitæ uirtus 1116.uerf.63

Viuerē ex affectu, & secundū rationem, qui dicitur 334.49
 Viuerē licet nobis etiā si uiter cibos nō cōterat: sanguificatio-
 ne aut percute, nō itē 340.4
 Viuerē sine alimento non licet 368.11
 ¶ Vlcera cacoethē uō omnia dyspūlotica 333.10
 Vlcera cacoethē quē dicantur 89.10. 115.4.10
 Vlcera cacoethē quorū talia euan-
 dant 837.11
 Vlcera curaturā cauēt ab extre-
 mē calfacientibus atq; refri-
 gerantibus 834.11
 Vlcera igni ambusta quid iuuēt 1111.14
 Vlcera malignantis naturę quę
 sint 1173.49
 Vlcera maligna, qualia medica-
 mēta exigūt 971.49. 1177.3
 Vlcera maligna quid persanēt 1111.31
 Vlcera maligniora, ualētiora re-
 quirunt remedia 3172.39
 Vlcera uō sunt exasperata prius
 quā corpus uniuersum fir-
 purum 88.53
 Vlcera quę sanēcere prohibēt
 Ibid. 38
 Vlcera quomodo sint tractanda 1170.38
 Vlcera transuersa diligentius q̃
 recta ringenda sunt 836.18
 Vlcerebus contumacibus aduer-
 santur tum oleosa tum acia 1170.51. Et cur 1173.51
 Vlcerebus contumacib. pharmacū
 temperatū describit 1171.61
 Vlcerebus dyspūloticis atq; ma-
 lignis medicamēto cōueniens 1154.11
 Vlcerebus frigidū mordax 1039.
 uerf.49
 Vlcerebus incipientibus potiora
 esse astringentia 1151.37
 Vlcerebus iuuenatū partū quę
 medicamenta pro sunt 861.48
 Vlcerebus inueteratis quę pro-
 sine 1091.61
 Vlcerebus nihil humectans est
 uisū 1151.38
 Vlcerebus qua ratione medica-
 mēta medeantur 1169.50
 Vlcerebus tor desiderari pharma-
 ca, quot ipsorū sunt differen-
 tię 1169.14
 Vlcere cauo quę medicamenta
 conueniant 1174.1
 Vlcere curādo quę requirantur 857.8
 Vlcere recti expedit ut ex co sta-
 tum fiat sanguis 861.1
 Vlcere caui curatio 835.15
 Vlcere caui curationis duplex

scopus 849.19
 Vlcere caui generalis curatio 1155.17
 Vlcere cui uarix incumbit cura-
 tio 1171.11
 Vlcere deligandi ratio 836.16
 Vlcere diuturnitas est succi ui-
 tiōis indicium 839.11
 Vlcere si addit tumor, in prima
 curandus est 835.19
 Vlcere iulsiatū curatio 1157.
 Vlcere labra quando exci- 39
 denda sint 857.51
 Vlcere, ppria curatio unde pro-
 ficiscitur 831.47
 Vlcere pulmonū, asperę arterię
 & faucium discrimen 758.50
 Vlcere relicti in parte secia, cu-
 ratio 936.10
 Vlcere simplicis differentię pro-
 prie unde fumendę 851.59
 Vlcere sordida & caui curandi
 ratio Ibid.6
 Vlcere curandorū cōsilia uni-
 uersa 1157.35
 Vlcere curatio immutata pluri-
 mū per singulas animalis par-
 tes 868.57
 Vlcere malignorū summus
 scopus quis 1171.50
 Vlcere nomina uaria 845.16
 Vlcere tempora quatuor quę
 710.16
 Vlcere caui in sano corpore cu-
 randi ratio 1156.51
 Vlcere tum caui tum plenū qua-
 lia nam remedia possunt 851.60. 855.1. 859.33. 861.
 41. 971.47
 Vlcere curandū cōtrarię, corpus
 autē ulceratū, similib. 1156.40
 Vlcere, electo pure, quibus sit ab-
 luendum 972.37
 Vlcere in humidiori natura mi-
 nus siccandum: in sicciori, ue-
 hementius est 851.64
 Vlcere nō possit curari nisi caro
 subiecta pro naturali modo
 se habeat 854.11
 Vlcere qd 11.60. 845.11. 856.41
 Vlcere simplex omne tum siccari
 tum astringi debet 851.59
 Vlcere simplex solam agglutina-
 tionem desiderat 851.65
 Vlcere tenuium crassorumq; in-
 testinorū quomodo digno-
 scendum 716.61
 Vlcere unde fiat 763.61
 Vlcere unitatis solutio 64.30
 Vlcere facultas 1105.19
 Vlcere cōstat duob. oñibus 98.51
 Vlcere extrematarū figura 107.41
 Vlcere positio recta 107.11
 Vlcere quatuor motus 104.10
 Vlystis iracūdiā ratione cōtr-
 cuit. 316.31

Vlystis in ancillas exandescen-
 tia 1155.59
 ¶ Vmbilicę arterię uinculo
 interceptis, omnes quę in se-
 cundis habentur, pulu desti-
 tuuntur 340.14
 Vmbilicę regio, totius corporis
 adamūsum media 311.51
 Vmbilicę uasū quatuor 305.3
 Vmbilicę ueneris uirtus 1089.35
 Vmbilicus quid 105.53
 ¶ Vncia Antuerpiensis, Bru-
 xellensis, Colonienfis, Roma-
 nam superant tribus obolis
 1190.56
 Vncia constat octo drachmis
 1154.59. 1160.12. 1190.35
 Vncia Hispanica, Romana oboli
 duobus est maior 1190.54
 Vncia libra est duodecima para
 1165.66
 Vncie nota medicinalis 1191.11
 Vncia Parisiēsis, Romana est ma-
 ior integra ferē drachma 1190
 uerf.55
 Vncia Venera, Romana est mi-
 nor ferē sciquidrachma 1191.1
 Vnctio ex oleo obstat, quo mi-
 nus digerantur ac resoluūt
 succi 881.11
 Vnctiones ex papauere mandra-
 gorū eufugiendę 481.49
 Vnctiones roborantes uentri-
 cum 480.19
 Vnctio qualis esse debeat 419.59
 Vnctuosus nihil arinet ad gu-
 stum 1010.7
 Vnderimus quaterdecimi est in-
 dex 609.46
 Vnedinis facultas 187.4
 Vnguē calfacienda sunt in du-
 plici uase 895.39
 Vnguē omnia liquanda sunt
 in duplici uase 1168.11
 Vnguē relaxantia 431.14
 Vnguē hedychiroi preparatio
 1173.16
 Vnguē foliatum 480.11
 Vnguē spicatum Ibid.15
 Vngues ad apprehendendū apti
 digitorū summitatibus ex-
 quentur 196.35
 Vngues cur mediocriter duri
 197.19
 Vngues cur semper augeantur
 Ibid.10
 Vngues rotundi securitatis gra-
 tia faciūt Ibid.16
 Vngues oculi 709.60
 Vngues oculi primariā ratione
 pupillam obscurat 670.11
 Vnguē augmētum in longum
 tantum 197.35
 Vnguē caprillorū asinino-
 rumq; uires 1118.15
 Vnguē consideratio 161.14

- Vnguū genos gratia eius qd me-
lus est conditum 197.16
Vnguū radici quæ iussit 161.31
Volo, io partibus instrumenta-
ris solutus, est impossibilis
314.11
Vniōē carnis solutæ, quæ præ-
cedant Ibid. 17
Vniōnem præstat natura Ibi. 33
Voitans solutus 356.40
Vnitaris solutio cōmunis mor-
bus familiarium & instrumen-
taliū partium 31.48
Vnū in singulis præstantissimū
141.1
Vnum pluribus coeterarium di-
ci nequit 10.10
Vnum quid 156.36
Vnum esse, quod secundum natu-
ram est 439.45
Vocē qui efficiant 755.51
Vocē qui affectus unēt 755.50
Voci impedire aut raurē, ob in-
flammas affectiones circa la-
ryngem, aut asperam arteria
obortas, qualis oīctus & me-
dicinæ ratio cōueniat 124.11
Voci interceptæ arteriæ Cris-
tis 124.2.39
Voci necessarius est faucū ma-
dor 146.18
Vocis acutæ grauitas causæ 316.
Vocis lenis & asperæ cau-
sæ Ibid. 19
Vocis magnitudinis & paruita-
tis causæ Ibid. 17
Vocis materia efflatio 150.15
311.62. 141.60. 333.42. 753.
10. 755.29
Vocis organa 754.40. 1240.16
Vocē primō in larynge formari
244.41
Vocis propria instrumenta quæ
713.15
Vocis ratio causæ 755.12. 816.12
Vola manus cur glabra 52.1
Vole manus musculi 152.43
Volucra biliosis cōgruētia 890.
Volucrū carnes quæ faci-
lius egriis coquas 397.57
Volucrum maius cuius sit facul-
tatis 1100.58
Voluntas equini similis 439.11
Voluntas quatenus respiratio-
nis sit causa 483.16
Voluptas nō in bonis ponenda
330.17
Voluptas quando fiat 671.15
Voluptas quid 710.41
Voluptas uitalem firmitudinem
potest dissoluere 114.35
Voluptates habent similitudinē
inter se, cōmunionem autem
secundum genus 354.35
Voluptates quæ sequendæ, quæ
sugendæ 354.16
Voluuli causa 636.18. 770.45
Voluulo affectus uix liberatur
770.44
Voluulus qualis affectus Ibi. 39
Vomendo inepti qui 1003.44
Vomere nemo nisi ad uomendū
proditus, cogendus 716.16
Vomitū cur non utendū per cru-
ditates lassitudini copularas
461.41
Vomitui quomodo ægri præpa-
randi 1003.39
Vomitum qua ratione olim sin-
gulis mētibz ceteris prouo-
cabant 116.50
Vomitū quādo utendū 461.60
Vomitus ante cibū quibus con-
ducat 478.1
Vomitus à quibz causis mouean-
tur 81.51. 683.10
Vomitus quibus & per quæ pro-
uocandus 856.59
Vomitū signa quæ sint 644.10
Vox cogitationum mentis nut-
cia 311.13
Vox fieri nō potest, nisi transitus
sit angustior 145.60
Vox sit breuior tano, quāto de-
creuit efflatio 188.9
Vox principalissima omnīū ani-
mæ actio 311.13
Vox qua ex causa perire aut oī-
tari possit 754.52
Vox quādo in acumen & magni-
tudinem uoluerit 755.6
Vox quādo incipiat 1240.13
Vox qua ratione efficiat 311.13
Vox quibus percat 671.55
VRAGOS 105.65. 121.44
Vreteres quid 127.11
Vreteres una tunica constant
181.31
Vreterū oblique insertionis u-
sus 131.4
Vreterū uisum intra uescicam
opercula 181.16
Vrina alba, cruditate indicat
419.17
Vrina aquosa & tenuis quid in-
dicet 457.30. 626.40
Vrina eroda quæ 616.31. 711.11
Vrinaculi usus 306.5
Vrina cur appareat nobis frigi-
da in balneo 1030.61. 1032.2
Vrina farinæ hordeaceæ similis
quid significet 637.11
Vrinæ color, exercitiū temporis
est nota 439.16
Vrinæ excretio à quibus fiat
714.10
Vrinæ excretio or fiat 306.31
Vrinæ humanæ facultas 1131.11
Vrinæ humanæ portione multi-
pessillenti morbo liberat sunt
Ibid. 10
Vrinæ laminas repræsentantes,
forfurem, qd notent 617.15
Vrinæ meatus ex quibus occa-
sionibus obstruatur 690.46
Vrinæ permutationis species ua-
riæ 477.40
Vrinæ præcipue spectandæ in fe-
bribus 614.19
Vrinæ purgandæ cur duo in-
strumenta, alijs excrementis
purgandis tantū unūcū cum
sit 117.40
Vrinæ quæ habet multam sub-
sidentiam 617.1
Vrinæ quæ in oīris ac molieribz
& quæ in pueris sint exitiales
Ibid. 54
Vrinæ reddito inuolūtaria quā-
do accidat 773.35
Vrinæ subrofa, subdusa, & sub-
rubæ 617.54
Vrinæ suppressæ causa 773.17
Vrinæ suppressæ uariæ curatio-
nes, pro diuersitate causarum
16.35
Vrina sæctus cur per uescicæ col-
lum non excretatur 306.19
Vrina humana omnīū imbecillī-
ma 1131.10
Vrina indicat coactionē quæ
sit in uenis 614.5
Vrina in ephemeris qualis 956.
uers. 41
Vrina interitum febrium
singulis propria 956.10
Vrina leralis quæ 711.15
Vrina lauida, ferida, & oleagina
sa unde 617.10
Vrina modicè pallida quid in-
dicet 419.41
Vrinam quæ prouocet 961.14
Vrinam sæctā à sanguine, per
renes, io uescicam demitti
416.18
Vrina nigra cur pessima 617.10
Vrina nigra perinde or sputum
nigrum, mortem denonciat
617.14
Vrina omnis facultate est calida
1131.6
Vrina optima ab humoribus pu-
rescentibus, aut pessima, qua-
lis 785.6
Vrina optima quæ 616.8. & 49.
617.31. 711.5
Vrina pallida & suppalida quæ
616.47
Vrinæ cur crudarū pessima quæ
Ibid. 19
Vrinariū meatum inferio-
rem 119.50
Vrina rufa qd significet 419.39
Vrinæ turbidarum differen-
tia triplex 616.19
Vrina sola indicat naturam hu-
morū in uenis delitescentiā
416.7
Vrinæ

INDEX.

Vrinae quid prouocet 1099.4	Vteri prouidentia in propellen-	Vux non maturefcit in frigidis
Vrina succorum qui in uafis cō-	do fecit 82.50	regionibus 381.4
tinentur, nota 457.13	Vteri ftomachus, uia eft partus	Vux paffix feminis expertes cre-
Vrina fuppreffa ob refolutam ex-	& feminis 86.17	fcunt in Cilicia Ibid.2
cernendi uim quomodo ex-	Vteri fuffocatione affligente per	Vux paffix fi astringentes non
pellenda 713.16	arterias tantū fit peripiratio	fini, nō conducunt bene & lie
Vrina fuppreffa, quæ finit con-	1266.41	piti tumefcentibus, fed thorax
deranda 711.4	Vteri fuffocatione periclitantes,	cus afflicto 418.11
Vrina turbida qd indicat, 457.13	quibus iuuentur 1139.34	Vux paffix uis 1071.10. 1126.15
Vrina unde fupprimatur 690.15	Vteri fuffocationes quæ fequant	Vux paffix, uis ualentius nu-
Vrica aluum deicit 189.29	symptomata 1266.16	trunt 381.13
Vrica fcilicet 1068.3	Vteri fuffocationis caufa Ibid.45	Vux quæ magis nutrit, & prō-
Vrica extimulat venem Ibid.5	Vteri fuffocationis curatio 966.	ptius deficiantur 381.14
Vrica fubducit aluū nullatione	10. 1266.49	Vux uinofæ facultas Ibid.38
magis iij purgatione Ibid.10	Vteri fuffocatio quibus contin-	Vux non abicienda radicibus
¶ V T R V M differētiæ 1114.51	gat, & quæ de caufa 774.59	276.17
Vfus incrementi uel remiffiones,	Vteri uafa 104.2	Vux quid 691.8. 708.52
ex calido & frigido conftant	Vteri uenæ 146.15	Vuarum afferuatatum discrimi-
384.11	In Vtero facultas retentrix & ex-	na 381.14
Vfus partis quid 318.6	pulerix cernitur 81.65	Vuarum paffarum discrimina et
Vfus puluim abundantia calori	Vterum conftituunt duæ tunicæ	facultates Ibid.54
augetur, uel exhaustio ani-	obuerfa in pofitæ 104.16	Vuarum paffarum quæ, quale et
malis fpiritu 562.45	Vterus in cōceptione ad puden-	quantū corpori alimentū prę-
Vfus puluim quando urgetur	dum procurrit, femini ut fiat	ftent 321.8
561.18	obuiam 107.20	Vuarum paffarum quæ præftant
¶ V T R I A affectus fine eius per-	Vterus inter uentricum & inteflinū	tiores 381.63
uerfionibus cōtingentis, cau-	rectum 103.15	Vuas afferuandi uariatio Ibidem
fa 777.5	Vterus nō præftat arteriæ fecun-	276.10
Vteri affectuum differentię funt	dum motum 340.28	Vux ficut gurgulio aut columbell
plurimæ 774.18	Vterus prægnantium craffior	la confert ad uocis conciuni-
Vteri collū mufculofum, natiuit	104.49	la confert ad uocis conciuni-
carne carnaginea 104.11	Vterus quæ ratione uideatur ua-	coërte 860.39
Vteri connexio 105.47	gari 776.18	Vulnera articulorū euadunt ca-
Vteri conniuentia & relaxatio	Vterus, uelut animal, defiderio	coërte 860.39
opportuna 678.35	prolis afficitur 106.17	Vulnera nullū ex pinguib. medi-
Vteri corpus à quibus caufis di-	Vile theorema qmōdo digno-	camitis admouendū 972.13
uerfi poffit 691.16	fcatur 10.18	Vulnus 11.55
Vteri duricie quid auxilium 1090	Vtilitas animalibus prima ab ac-	X
Vteri erofio magna ex par-	tionē accedit, fecunda à par-	XANTHUS uis 1098.19
te in ceruice cōtingit 778.12	tibus 318.17	Xenophonis miles 166.18
Vteri inflammationes iuuant ui-	Vtilitas partis non ritè exponit,	Xyris culus fit facularis 1098.
nis in crure lectis 997.13	nifi totius instrumenti actio-	ueri, 31
Vteri locus affectus quomodo	ne inuenta 151.47	Y
conftitendus 777.11	Vtilitatis partium cognitio facit	Y Davidæ 169.8
Vteri moderat magnitudinem quæ	chirurgos intrepidus 120.18	Z
103.15	Vtilitatis partium cognitio facit ad	Zea & typha idem frumētū ge-
Vteri natura & operatio 81.15	cognofcēdos affectus 320.17	nus 415.59
Vteri offenfionis triplex caufa	¶ V V A austeræ, acidæ, acer-	Zea ficut feltra, media inter hor-
86.18	bæzæ facultas 381.35	deum & triticum 174.16
Vteri os cōiunct & in conceptione,	Vux dulces quam uim habeant	¶ Z I X giberis facultas 1080.40
& dum phlegmone affligi-	Ibid.32	Zingiber quid 460.16
tur 81.48	Vux generofæ quæ finit Ibid.17	Zoropafte offa 271.58
Vteri puerueritatem ad menftrua	Vux minus alunt iij ficus, defen-	Zygoma quid uocetur 181.35.
fequuntur fuppreffa 777.1	dunt iij uelociter 380.62	Zythi facultas 1080.62

Errata operis sic castigato.

Col.5.uerf.44. lege, fumus, pro fumus. 81.1. rodit. 86.13. abortus. 161.60. perit. 92.4. tendoue. 93.65. agunt. 188.4. inspirationem. 228.56. inuifus. 253.55. percipere. 265.51. femifecta. 266.51. duritie. 304.50. fement. 318.14. eniam. 451.12. halitum. 476.36. circa. 481.31. egit. 617.65. æquilibrium. 685.8. fan-guificatio. 737.7. propriam. Ibid.18. paratifsimū. 754.30. pleuride. 782.30. mordax. 790.39. differentis. 824.11. calidior autem & humidior. 895.35. tole-rem. 897.16. copiofos. 906.18. accendunt. 912.16. expeditiffima. 965.64. ere-nim. 1060.63. adiuuabunt. 1107.64. pure. 1153.36. aliud. 1158.54. indultia. 1186.45. labores. 1206.37. ac perfectæ. 1210.64. accio.







